

Tentamen: Numerisk Analys
MMG410, GU
2025-01-07

- Ansvarig: Larisa Beilina, tel. 031 - 772 35 67, (mob.) 072 - 961 44 47, e-post: larisa@chalmers.se.
- Resultat: e-post från LADOK.
- Betygsgränser: 12 poäng, av maximalt 26, räcker för godkänt, 19 poäng för VG.
- Lösningsförslag: på www. Jag kommer meddela på www-sidan när tentan är rättad.
- Hjälpmedel: godkända enkla miniräknare och kursens formelblad eller godkända ordlistor/formelblad (1 sida på A4 lappen).

Iakttag följande:

- Skriv tydligt och disponera papperet på ett lämpligt sätt.
 - Börja varje ny uppgift på nytt blad.
 - Fullständiga lösningar och motiveringar krävs! Specialfall ger inga poäng, när allmänna lösningar krävs.
 - Sortera Dina lösningar i nummerordning.
 - Läs igenom alla uppgifterna. De är inte sorterade efter svårighetsgrad.
-

Ge kortfattade motiveringar/lösningar till nedanstående uppgifter! Ett korrekt svar utan motivering ger inga poäng!

1.

- a) Låt \hat{x} är en approximation av ett exakt värde x där $|x - \hat{x}| \leq \delta$. Använd Taylors formel för att uppskatta $|f(x) - f(\hat{x})|$ givet funktionen $f(x) = 15x^2 + 5x + 1$. Notera, att vi känner \hat{x} och δ men inte x .
(2p)
- b) Skriv talet -9 i binär form som flyttal i dubbel precision. Skriv den sedan i hexadecimalt (bas 16) form.
(3p)
- c) Antag att matrisen $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ har rank n . Visa att $A^T A$ är symmetrisk och positivt definit.
(1p)
- d) Givet en lokalt konvergent fixpunktsiteration $x_{k+1} = g(x_k)$. Använd Taylors formel för $g(x_k)$ och ge en bevis för att vi får kvadratisk konvergens för fixpunktsiteration $x_{k+1} = g(x_k)$ om $g'(x^*) = 0$.
(3p)

2.

Vi vill hitta en funktion på formen

$$f(x) = \cos ax + \sin bx + e^{cx^2},$$

som satisfierar följande villkor: $f(1) = 1, f'(1) = 10, f''(1) = 5$ (a, b och c skall alltså bestämmas). Ställ upp ett system av ekvationer för problemet, och formulera sedan Newtons metod för detta system. Försök inte att lösa systemet för hand.

(3p)

3.

- a) Hur beräknar vi $p(t) = -10t^3 + 5t^2 - 3t + 1$ med hjälp av Horners metod?

(1p)

- b) Transformerade Chebyshevpunkterna

$$t_k = -\cos \left[\frac{(2k-1)\pi}{2n} \right], \quad k = 1, 2, \dots, n, t_k \in [-1, 1]$$

från intervallet $[-1, 1]$ till punkterna c_k som är på intervallet $[10, 15]$. Skriv hur ska beräknas transformerade Chebyshevpunkterna c_k .

(2p)

4.

- a) Beräkna integralet

$$\int_5^{10} f(t) dt = \int_5^{10} (5t + 1) dt$$

med hjälp av Gausskvadratur med 3 vikter.

Notera, att Gausskvadratur med 3 vikter är:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^3 w_i f(x_i),$$

var $x_1 = -\sqrt{3/5}, x_2 = 0, x_3 = \sqrt{3/5}, w_1 = w_3 = 5/9, w_2 = 8/9$.

(2p)

- b)

Beräkna w, x_1, x_2 , i kvadraturformeln nedan, så att den får så högt polynomiellt gradtal m som möjligt. Vad blir detta gradtal? Notera: använd inte Gausskvadratur i den här övningen.

$$\int_{-1}^1 x^k dx = wx_1^k + wx_2^k, \quad k = 0, 1, \dots, m.$$

(2p)

5.

- a) Skriv om följande problem som första ordningens system:

$$\begin{cases} x'(t) &= 3t + xy + z'(t)y'(t), \\ y''(t) &= 5t^2 + y(t)z'(t) + y'(t), \\ z''(t) &= z(t) - y'(t) + t, \\ x(0) &= 1, \\ y(0) &= 1, \\ y'(0) &= 2, \\ z(0) &= 2, \\ z'(0) &= 2. \end{cases}$$

(2p)

- b) Sätt upp implicit Eulers, eller bakåt-Eulers, metod och första iteration i den för problemet

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)t - y(t)t^2 + \cos(\pi t), \\ y'(t) = 5x(t) + 10y(t) - \sin(\pi t), \\ x(0) = 0. \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

(2p)

6.

Vi har följande modell med känt $C = \text{const.} > 0$:

$$R \approx Ce^{(p_1 + p_2 T + p_3 T^2)/(1 + p_2)}$$

och vill bestämma parametrarna p_1, p_2, p_3 givet mätvärden $(T_1, R_1), (T_2, R_2), \dots, (T_m, R_m)$. Gör en lämplig transformation och ställ upp ett linjärt minstakvadratproblem i formen $\min_p \|Ap - b\|_2^2$. Matrisen A samt vektorerna b och p skall redovisas.

(3p)