

OR 과제 - 2

20192208 김형훈

2025-03-21

4.3-5

수식을 다시 재구성해보면 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \text{Maximize } Z - 3x_1 - 4x_2 - 5x_3 &= 0 \\ \text{Subject to } x_4 &= 150 - 3x_1 - x_2 - 5x_3 \\ x_5 &= 120 - x_1 - 4x_2 - x_3 \\ x_6 &= 105 - 2x_1 - 2x_3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 &\geq 0 \end{aligned}$$

reduce cost 중 가장 작은 값은 x_3 . 따라서 x_3 를 pivot variable로 선택한다.

이후 min ratio test를 진행한다.

선택하지 않은 x_1 과 x_2 는 0을 대입하고 진행한다.

$$\begin{aligned} x_4 &= 150 - 5x_3 \geq 0 & x_3 &\leq 30 \\ x_5 &= 120 - x_3 \geq 0 & x_3 &\leq 120 \\ x_6 &= 105 - 2x_3 \geq 0 & x_3 &\leq 52.5 \end{aligned}$$

x_4 채택. $x_3 = 30 - \frac{3}{5}x_1 - \frac{1}{5}x_2 - \frac{1}{5}x_4$.

다시 수식을 재구성하면 아래와 같다.

$$\begin{aligned} Z - 3x_2 + x_4 - 150 &= 0 \\ x_3 &= 30 - \frac{3}{5}x_1 - \frac{1}{5}x_2 - \frac{1}{5}x_4 \\ x_5 &= 90 - \frac{2}{5}x_1 - \frac{19}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_4 \\ x_6 &= 45 - \frac{4}{5}x_1 + \frac{2}{5}x_2 + \frac{2}{5}x_4 \end{aligned}$$

reduce cost 중 x_2 가 가장 작다. 따라서 x_2 를 pivot variable로 선택한다.

다시 한번 min ratio test 진행.

$$\begin{aligned} x_3 &= 30 - \frac{1}{5}x_2 \geq 0 & x_2 &\leq 150 \\ x_5 &= 90 - \frac{19}{5}x_2 \geq 0 & x_2 &\leq 23.68 \\ x_6 &= 45 + \frac{2}{5}x_2 \geq 0 & x_2 &\leq 112.5 \end{aligned}$$

$$x_5 \text{ 채택. } x_2 = \frac{450}{19} - \frac{2}{19}x_1 + \frac{1}{19}x_4 - \frac{5}{19}x_5.$$

다시 수식을 재구성 해보자.

$$\begin{aligned} Z &+ \frac{6}{19}x_1 + \frac{16}{19}x_4 + \frac{15}{19}x_5 - \frac{1500}{19} \\ x_2 &= \frac{450}{19} - \frac{2}{19}x_1 + \frac{1}{19}x_4 - \frac{5}{19}x_5 \\ x_3 &= \frac{480}{19} - \frac{11}{19}x_1 - \frac{4}{19}x_4 + \frac{1}{19}x_5 \\ x_6 &= \frac{630}{19} - \frac{16}{19}x_1 + \frac{8}{19}x_4 - \frac{2}{19}x_5 \end{aligned}$$

이제 reduced cost를 확인해보면, 모든 변수의 계수가 음수가 아니므로 최적해에 도달했다.

따라서 최적해는 아래와 같다.

- $x_1 = 0$
- $x_2 = \frac{450}{19}$
- $x_3 = \frac{480}{19}$
- $x_4 = 0$
- $x_5 = 0$
- $x_6 = \frac{630}{19}$
- $Z = \frac{1500}{19}$

4.3-6

a

수식을 다시 재구성해보면 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \text{Maximize } & Z - 5x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 0 \\ \text{Subject to } & x_4 = 20 - 2x_1 - x_2 - x_3 \\ & x_5 = 30 - 3x_1 - x_2 - 2x_3 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

x_2 와 x_3 는 0이 아니고, 5개의 변수 중 2개는 0이므로, x_1, x_4, x_5 중 하나는 0이 아니다.

b

4.3-7

a

b

4.4-6

a

수식을 다시 재구성해보면 아래와 같다.

$$\begin{aligned}
 &\text{Maximize } Z - 3x_1 - 5x_2 - 6x_3 = 0 \\
 &\text{Subject to } x_4 = 4 - 2x_1 - x_2 - x_3 \\
 &\quad x_5 = 4 - x_1 - 2x_2 - x_3 \\
 &\quad x_6 = 4 - x_1 - x_2 - 2x_3 \\
 &\quad x_7 = 3 - x_1 - x_2 - x_3 \\
 &\quad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0
 \end{aligned}$$

reduce cost 중 가장 작은 값은 x_3 . 따라서 x_3 를 pivot variable로 선택한다.

이후 min ratio test를 진행한다.

선택하지 않은 x_1 과 x_2 는 0을 대입하고 진행한다.

$$\begin{aligned}
 x_4 = 4 - x_3 \geq 0 & \quad x_3 \leq 4 \\
 x_5 = 4 - x_3 \geq 0 & \quad x_3 \leq 4 \\
 x_6 = 4 - 2x_3 \geq 0 & \quad x_3 \leq 2 \\
 x_7 = 3 - x_3 \geq 0 & \quad x_3 \leq 3
 \end{aligned}$$

x_6 채택. $x_3 = 2 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_6$.

다시 수식을 재구성하면 아래와 같다.

$$\begin{aligned}
 &Z - 2x_2 + 3x_6 - 12 = 0 \\
 &x_3 = 2 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_6 \\
 &x_4 = 2 - \frac{3}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_6 \\
 &x_5 = 2 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_6 \\
 &x_7 = 1 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_6
 \end{aligned}$$

역시 한 번에 끝나지 않았다. 다음 pivot variable은 x_2 . 부연설명 없이 계속 진행해보겠다.

- min ratio test

$$x_3 = 2 - \frac{1}{2}x_2 \geq 0 \quad x_2 \leq 4$$

$$x_4 = 2 - \frac{1}{2}x_2 \geq 0 \quad x_2 \leq 4$$

$$x_5 = 2 - \frac{3}{2}x_2 \geq 0 \quad x_2 \leq \frac{4}{3}$$

$$x_7 = 1 - \frac{1}{2}x_2 \geq 0 \quad x_2 \leq 3$$

- x_5

$$Z - \frac{44}{3} + \frac{2}{3}x_1 + \frac{7}{3}x_6 + \frac{4}{3}x_5 = 0$$

$$x_2 = \frac{4}{3} - \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_6 - \frac{2}{3}x_5$$

$$x_3 = \frac{4}{3} - \frac{1}{3}x_1 - \frac{4}{6}x_6 + \frac{1}{3}x_5$$

$$x_4 = \frac{4}{3} - \frac{4}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_6 + \frac{1}{3}x_5$$

$$x_7 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_6 + \frac{1}{3}x_5$$

종료.

- $x_1 = 0$
- $x_2 = \frac{4}{3}$
- $x_3 = \frac{4}{3}$
- $x_4 = \frac{4}{3}$
- $x_5 = 0$
- $x_6 = 0$
- $x_7 = \frac{1}{3}$
- $Z = \frac{44}{3}$

b

c

gurobi를 이용해서 최적해를 구해보자.

```
from gurobipy import *

model = Model("ex4.4-6")
```

```
model.setParam('OutputFlag', 0)
```

Restricted license - for non-production use only - expires 2026-11-23

CPU랑 OS 정보가 출력되서 로그는 꺼줬습니다.

```
x1 = model.addVar(vtype=GRB.CONTINUOUS, name="x1")
x2 = model.addVar(vtype=GRB.CONTINUOUS, name="x2")
x3 = model.addVar(vtype=GRB.CONTINUOUS, name="x3")

model.setObjective(3 * x1 + 5 * x2 + 6 * x3, GRB.MAXIMIZE)

model.addConstr(2 * x1 + x2 + x3 <= 4)
model.addConstr(x1 + 2 * x2 + x3 <= 4)
model.addConstr(x1 + x2 + 2 * x3 <= 4)
model.addConstr(x1 + x2 + x3 <= 3)

model.optimize()

for var in model.getVars():
    print(f"{var.varName}: {var.x}")
print("Obj: ", model.objVal)
```

x1: 0.0

x2: 1.3333333333333335

x3: 1.3333333333333333

Obj: 14.666666666666668

알맞게 나오는 모습.

4.4-8