ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭХ СААТУУЛАХ ТӨВ

АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗЛҮҮЛЭХ ГАРЫН АВЛАГА









ОСГОЛТ, ХӨЛДӨЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭЭ!

Хүний биеийн амархан хөлддөг хэсгүүд

Хөлдөлтийн шинж тэмдэг



Чих, хамар, хацар

Хуруу

Хөлдсөн хэсгээр өвдөх, халуун оргих, хорсох мэдрэмж төрөх хавагнах

Хөлдсөн хэсэгт 24 цагийн дараа цэврүү үүсэх

Арьсны өнгө хэвийн үеийнхээс цайрах, хүйтэн, хуурай болох

АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ



Халуун бүлээн шингэн уух



Нойтон хувцсаа тайлах



Хөлдсөн хэсгийг бүлээн усанд 30 минут байлгах



Нүүр, чихэнд бүлээн алчуураар жин тавих

ХИЙЖ БОЛОХГҮЙ ЗҮЙЛС



Арьсыг үрж дулаацуулж болохгүй



Галд ээх, халуун жин тавих зэргээр арьсыг халааж, дулаацуулж болохгүй



Үүссэн цэврүүг хагалж болохгүй

ХӨЛДӨЛТ ОСГОЛТЫН ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ АНХНЫ ТУСЛАМЖ



ТҮРГЭН ТУСЛАМЖ ДУУДАХ



ДУЛААН ХӨНЖЛӨӨР ХУЧИЖ ХЭВТҮҮЛНЭ



АМЬСГАЛ, СУДАСНЫ ЦОХИЛТЫГ ШАЛГАНА



ГЭМТСЭН ХҮНЭЭ ХУУРАЙ ДУЛААН ГАЗАР БАЙРЛУУЛАХ





ХАЛУУН ШИНГЭН ЗҮЙЛ УУЛГАХ

Хөлдөлтийн үед юу хийх вэ

ШИНЖ ТЭМДЭГ

1. Хөлдсөн хэсэг мэдээ алдах
2. Хөлдсөн хэсэгт хатгах, чимхэх мэт мэдрэмж төрөх
3. Арьс цайрч, сааралтах (Хөлдөлтийн 1-р зэрэг)
4. Арьсан дээр цэврүү үүсэх (Хөлдөлтийн 2-р зэрэг)
5. Арьс харлах, үхжих (Хөлдөлтийн 3-р зэрэг)

АНХНЫ ТУСЛАМЖ

1. Дулаан газарт оруулж, хүйтэн хувцсыг тайлах (Хүйтэнд хөлдсөн хэсгийг үрж арчих нь эрсдэлтэй)

2. Хөлдсөн хэсгийг дулаан боолтоор боох:
   1. Эхлээд бинтээр
   2. Зузаан хөвөнгөөр
   3. Дахин бинтээр
   4. Сунадаг давуугаар
   5. Ноосон давуугаар тус тус ороох



3. Хөлдсөн хэсгийг усанд дүрэх (40 минутын турш аажмаар усыг +20°C-с +40°C хүртэл нэмэгдүүлж, зөөлөн иллэг хийх)

4. Дулаан хучлага нөмрүүлэн, бүлээн чихэртэй шингэн уулгах

! 103 Сайтар ажиглан хөлдөлтийн 2 ба 3-р зэргийн шинж тэмдэг илэрвэл яаралтай түргэн тусламж дуудах

ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ

1. Хөлдсөн хэсгийг цасаар үрэх (Шарх үүсэж, халдвар орох эрсдэлтэй)
2. Галд ээх, халуун усанд дүрж хурдан хугацаанд дулаацуулах (Хөлдсөн хэсгийн судасанд тромбо үүсэж, үхжилт явагдана)
3. Согтууруулах ундаа хэрэглэх (Согтууруулах ундаа нь судсыг тэлж дулаан мэдрэмж төрүүлдэг боловч дулаацуулдаггүй)

УГААРТСАН ҮЕД

ГЭРИЙН НӨХЦӨЛД АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙГ ХЭРХЭН ҮЗҮҮЛЭХ ВЭ?



ТУХАЙН ГЭР, БАЙШИНГААС ЯАРАЛТАЙ ГАРГАЖ, ХАЖУУГААР НЬ ХЭВТҮҮЛЭХ



ЦЭЭЖИЙГ ИЛ ГАРГАХ БА БИЕИЙН БУСАД ХЭСГИЙГ ХУЧИЖ ДУЛААН БАЙЛГАХ



НҮҮР, ЦЭЭЖИЙГ ХҮЙТЭН УСААР НОРГОЖ АРЧИХ, ҮРЭХ, ТОЛГОЙД ХҮЙТЭН ЖИН ТАВИХ



АЛЬ БОЛОХ УНТУУЛАХГҮЙ, ХАМАРТ СПИРТ, ГАВАР ҮНЭРЛҮҮЛЭХ



ХАЛУУН БҮЛЭЭН ШИНГЭН ЗҮЙЛ УУЛГАХ



АМ, ХАМАР ЗАЛГИУРЫГ САВХАНД ОРООСОН САМБАЙ ЗЭРГЭЭР ЦЭВЭРЛЭХ




ШААРДЛАГАТАЙ ҮЕД ХИЙМЭЛ АМЬСГАЛ ХИЙХ



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ХАНДАХ

ОСОЛД ӨРТӨЖ УХААН АЛДСАН ИРГЭНД ХЭРХЭН ХАЖУУГИЙН БАЙРЛАЛД ОРУУЛАХ АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ ВЭ?

1



УХААН АЛДСАН ИРГЭНИЙ ХАЖУУД ӨВДӨГЛӨЖ СУУНА.

2



НЭГ ХӨЛИЙГ НЬ ӨВДГӨӨР НЬ НУГАЛНА, ТЭР ТАЛЫН ГАРЫГ НӨГӨӨ ТАЛЫН МӨРӨН ДЭЭР НЬ ТАВИНА.

3



1 ГАРААРАА НУГАЛСАН ӨВДӨГНИЙ ҮЕЭЭС БАРЬЖ , НӨГӨӨ ГАРААРАА ДАВУУЛСАН ГАРЫН ДАЛ МӨРНӨӨС БАРЬЖ ХАЖУУГИЙН БАЙРЛАЛД ОРУУЛНА

4



ХАЖУУГИЙН БАЙРЛАЛД ОРУУЛСНЫ ДАРАА НУГАЛСАН ХӨЛИЙГ ДАВУУЛАН, МӨРӨН ДООРХИ ГАРЫГ ЭВТЭЙХЭН БАЙРЛУУЛЖ, ТОЛГОЙГ БАГА ЗЭРЭГ ГЭДРЭГ ХАЖУУ ДООШ ЧИГЛЭЛТЭЙ БАЙРЛУУЛНА.

5 УХААН АЛДСАН ИРГЭНИЙ АМЬСГАЛ, СУДАСНЫ ЦОХИЛТЫГ 10 СЕКУНД ОРЧИМ ШАЛГАНА.




МУУЖРАХ БУЮУ ТҮР ЗУУР УХААН АЛДАХ ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ

- Тархины цусан хангамж муудах
- Артерийн даралт буурах зэргээс шалтгаалан муужрах бөгөөд хурдан унаж, өөрөө аяндаа богино хугацаанд сэргэдэг.

Сагнуур

Доош харж унасан бол болгоомжтой дээш харуулна.

1



Хөлөн дор юм хийж, хөлийг зүрхэн тушаа өндөрлөн 15 минут орчим хэвтүүлнэ

2



Дараах зүйлсийг хориглоно!



Амаар шингэн зүйл уулгах

Нүүр рүү цохих, алгадах

Ганцааранг нь орхих

Дараах зүйлсийг анхаарна уу!

- Сэргэхгүй удах
- Унахдаа гэмтэх
- Бусад шинж тэмдэгүүд хавсарсан зэргийн үед ЗАЙЛШГҮЙ ЭМЧИД ХАНДАН ҮЗҮҮЛЭХ шаардлагатай.

Шалтгаан нь амь насанд аюултай өвчин байж болзошгүй!!!

ХҮҮХЭД ХАХСАН ҮЕД

ҮЗҮҮЛЭХ АНХНЫ ТУСЛАМЖ

1

Зогсоо байрлалд бага зэрэг бөхийлгөөд, хоёр далны хооронд 5 удаа гарынхаа алгаар хүчтэй цохиж доргионо.

/Ингэхдээ бага зэрэг түлхэж байгаа мэт даралт өгөх/



2

Гараа атгаж, эрхий хуруугаа аюулхай дээр нь байрлуулж нөгөө гараараа атгасан гарыг давхар атгаж, доороос дээш чиглэлтэй хүчтэй огцом хөдөлгөөнөөр хэвлий рүү нь шахаж 5 удаа татна.





Хүүхдийн хахсан зүйлийг гаргасны дараа эмчид заавал үзүүлэх хэрэгтэй.

Хахаж буй хүүхдийн ам руу хураагаа хийхгүй байхыг анхааруулж байна. Учир нь гадны биетийг гаргаж чадахгүй бүр гүн оруулах эрсдэлтэй.

Зүрх, амьсгал зогссон хүнд үзүүлэх анхны тусламж



1. Ухаан алдсан хүнийг эгц дээш нь харуулан тэгш, хатуу гадаргуу дээр хэвтүүлнэ. Хүзүүг нь гэдийлгэж амьсгалын замыг нь нээнэ.



2. Нэг гараар хамрыг нь чимхэж, нөгөө гараараа эрүүг нь дэмжиж амыг хагас нээнэ.



3. Амыг нь аманд умхэж, амьсгалаа тухайн хүний ам руу адилхан, нэг секунд орчим гаргана. Ингэхдээ цээжийг нь ажиглана. Хэрвээ таны амьсгалаар гаргасан агаар тухайн хүний уушгинд орж байгаа бол цээж нь тэлнэ. Хоймсл амьсгалыг дахин нэг удаа давтана. Ингэхэд өвөрж байвал агаар уушгинд бус, ходоодонд орж буйг илтгэнэ. Ийм тохиолдолд хүзүү, эрүүний байрлалыг өөрчилж үзнэ.



4. Дараа нь зүрхний иллэгийг хийнэ. Нэг гарын алгаа тухайн хүний цээжний (өвчүүний) тавд байрлуулж, нөгөө гараа ижил байдлаар давхарлана. Хөөр гарын хүчээр цээжийг нь 4-5 см доошилтол дарна. Хэт зөөлөн дарвал үр дүнгүй, харин хэт чанга дарвал хавирга хугарах аюултайг санаарай. Цээж бүрэн тэнийсний дараа дарахыг давтана. Ийм маягаар цээжийг 30 удаа дарна.

5. Хоймсл амьсгалыг дахин 2 удаа давтана. Ингэхдээ уушги нь агаараар дүүрсэнийг цээж нь тэлж байгаа эсэхээр нь нятална.

6. Цээжийг дахин 30 удаа дарж зүрхний иллэгийг хийнэ.

Дээрх дарааллын дагуу хоймсл амьсгал, зүрхний иллэгийг 2 минутын турш эзлэлзэн хийнэ. Тухайн хүний өөрийн амьсгал сэргэсэн эсэхийг шалгана. Хэрвээ өөрөө амьсгалж байгаа шинж тэмдэг байхгүй бол хоймсл амьсгал, зүрхний иллэгийг эмнэлгийн тусламж иртэл дээрх дарааллаар үргэлжлүүлнэ.

Анхны тусламж








ЯС ХУГАРАЛТ

- Ил юм уу, битүү хугаралтын аль алинд нь (цус тогтоож, ариутгасан боодол
- тавьсны дараа) эмч иртэл гэмтсэн мөчийг хөдөлгөөнгүй байлгана. Энэ нь өвдөлтийг багасгаж, хугарсан ясны цаашдын шилжилтийг зогсоодог.
- Хөдөлгөөнгүй байлгахын тулд бэлэн чиг баригч болон саваа, банз, шугам, фанерийн өөдөс гэх мэтийг ашиглана. Битүү хугаралтын үед нэрвэгдэгчийн хувцсыг тайлах хэрэггүй. Харин чиг баригчийг шууд хувцас дээр тавих хэрэгтэй. Өвдөлтийг багасгахын тулд бэртсэн газар хүйтэн жин тавих шаардлагатай.


ХОРОМ™.com
Mongolian free portal site

ЦУС АЛДАЛТЫН ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ АНХНЫ ТУСЛАМЖ



1. Өөрийгөө халдвараас хамгаалан бээлий өмсөх, байхгүй бол самбай, цэвэр даавуу, ариун цэврийн хэрэглэл зэрэг ус үл нэвтрэх материалыг ашиглах боломжтой. Хэрэв эдгээр зүйлс байхгүй бол осолдогчийн гарыг шархны дээр тавьж даруулах.

2. Цус алдсан хэсгийг олох, хувцсыг тайлан шархыг ил гаргах.
3. Цус алдалтыг шалгах, хэрэв гадны биет зоогдсон байвал сугалж авахгүй, тухайн биетийг тойруулан боолт хийх.
4. Самбай, алчуур гэх мэт цэвэр даавуугаар шархыг бүрхэж, жижиг шарх бол хуруугаар, том шарх бол гарын алгаар дарах.









5. Шархыг 5-аас доошгүй минут жигд, чанга дарах.
6. Цус алдалт 10 минутын дотор зогсохгүй бол самбайг давхарлах, өмнөх цустай самбайг авахгүй.
7. Боолт хийх, хэт чанга боолт хийж болохгүй, цусны эргэлт хаагдах аюултай.
8. Цус алдалт үргэлжилсээр байвал 103-руу залгах, их хэмжээтэй, цус олгойдон гарч байвал даралтаар зогсоох боломжгүй тул чангалуур ашиглан цусны эргэлтийг саатуулах боломжтой.

9. Чангалуур хэрэглэсэн тохиолдолд хэрэглэж эхэлсэн цагийг тэмдэглэх.
10. Цус алдалт зогссон үед бээлийгээ хаяж, гараа угаах.

