

PRODOTTO	PHOTOXAL-8
CATEGORIA	DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I
PRINCIPI ATTIVI	ACIDO 5-AMINOLEVULINICO 8 % L'acido 5-aminolevulinico (5-ALA) è usato per la terapia fotodinamica di lesioni cutanee come la cheratosi attinica e i tumori cutanei superficiali, e per il fotoringiovanimento. Viene applicato sulla pelle e assorbito in modo selettivo dalle cellule malate. Successivamente, l'esposizione a una fonte luminosa di specifica lunghezza d'onda (circa 630 nm) attiva il 5-ALA, portando alla distruzione delle cellule anomale e alla rigenerazione di cellule sane. <i>Meccanismo d'azione</i> • Applicazione: Si applica una crema o un impacco contenente 5-ALA sulla zona interessata. • Assorbimento selettivo: La sostanza viene assorbita principalmente dalle cellule con un metabolismo più rapido, come quelle tumorali, pre-tumorali o invecchiate dal sole. • Attivazione luminosa: Dopo un tempo di assorbimento (da 2 a 6 ore), la pelle viene esposta a una luce specifica (di solito rossa a led). • Produzione di ROS: La luce attiva il 5-ALA all'interno delle cellule malate, facendolo convertire in protoporfirina IX (PpIX). La PpIX reagisce con l'ossigeno, producendo specie reattive dell'ossigeno (ROS) che causano la morte cellulare (apoptosi). VIT. E acetato 1 % Contribuisce ad aumentare la sintesi di collagene, glicoproteine e acido ialuronico. Svolge un'importante azione antiossidante protettiva contro i radicali liberi e partecipa al mantenimento dell'elasticità cutanea.
INDICAZIONI	Cheratosi attiniche: Lesioni pre-cancerose causate da un'eccessiva esposizione solare. Carcinoma basocellulare superficiale: Un tipo di tumore cutaneo. Malattia di Bowen: Carcinoma squamoso in situ. Fotoringiovanimento: Per migliorare l'aspetto della pelle danneggiata dal sole