

統計検定準1級 チートシート

目次

1	事象と確率	3
2	確率分布と母関数	4
3	分布の特性値	6
4	変数変換	8
5	離散型分布	9
6	連続型分布と標本分布	10
7	主要分布 早見表（使う場面・確率関数・期待値・分散・累積分布関数・モーメント母関数・特性関数）	12
8	極限定理，漸近理論	16
9	統計的推定の基礎	17
10	区間推定	19
11	検定の基礎と検定法の導出	19
12	正規分布に関する検定	20
13	一般の分布に関する検定法	20
14	ノンパラメトリック法	21
15	マルコフ連鎖	22
16	確率過程の基礎	22
17	重回帰分析	23
18	回帰診断法	24

19	質的回帰	25
20	回帰分析その他	26
21	分散分析と実験計画法	27
22	標本調査法	28
23	主成分分析	29
24	判別分析	29
25	クラスター分析	31
26	因子分析・グラフィカルモデル	31
27	その他の多変量解析手法	32
28	時系列解析	32
29	分割表	34
30	不完全データの統計処理	36
31	モデル選択	37
32	ベイズ法	38
33	シミュレーション	39

1 事象と確率

事象 A が起きる確率を $P(A)$ と表す。

包除原理

事象 A, B について、 A または B が起きる（和事象）確率は一般に次の式で求められる。

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

右辺第3項は、 A と B がどちらも起きる（積事象）確率を表す。事象 A と B が**排反**（同時には起きない）ならば、

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

事象の独立

事象 A と B について、次の式が成り立つこと。

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

条件付き確率

A が起きたもとで B が起きる確率を次の式の右辺で定義する。

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

両辺に $P(A)$ をかけると、（ A と B が独立の場合との違いに注意）

$$P(A \cap B) = P(B | A) P(A)$$

$P(B | A)P(A) = P(A | B)P(B)$ が成り立つことから、両辺を $P(B)$ でわると次の**ベイズの定理**が得られる。

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)} = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B | A)P(A) + P(B | A^c)P(A^c)}$$

A^c は A の**余事象**。例えば、ある病気に罹患している確率を $P(A)$ 、検査で陽性となる確率を $P(B)$ とすると、 $P(A)$ は**事前確率**、 $P(A | B)$ は**事後確率**と呼ばれる。

条件付き独立

事象 A, B, C について、 C を与えたもとで A と B が条件付き独立であるとは、

$$P(A \cap B | C) = P(A | C) P(B | C)$$

確率変数

事象に対して実数を対応させる関数。離散型・連続型がある。

確率関数

離散型確率変数 X のとりうるすべての値について、

$$p(x) \geq 0, \quad \sum_x p(x) = 1$$

確率密度関数

連続型確率変数 X の定義域全体について,

$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

期待値 (平均)

確率変数がとりうる値の起きやすさを加味した平均。離散型:

$$E[X] = \sum_x x p(x), \quad E[g(X)] = \sum_x g(x) p(x)$$

連続型:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$$

X, Y が離散型でも連続型でも, a, b, c を定数として,

$$E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c$$

分散

確率変数がとりうる値の期待値からのばらつき具合の平均。 $E[X] = \mu$ として, 離散型:

$$V[X] = \sum_x (x - \mu)^2 p(x)$$

連続型:

$$V[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

a, b を定数として,

$$V[aX + b] = a^2 V[X]$$

分散の正の平方根を標準偏差という。

2 確率分布と母関数

累積分布関数

$F(x) = P(X \leq x)$ 。非減少関数で, 分布関数ともいう。 X が連続型で F が微分可能, f が連続ならば $F'(x) = f(x)$ 。

同時累積分布関数

$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 。

同時確率関数

離散型 X, Y について $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$ 。周辺確率関数:

$$p_X(x) = \sum_y p(x, y)$$

条件付き確率関数

$p_X(x) \neq 0$ のとき,

$$p_{Y|X}(y | x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)}$$

同時確率密度関数

$F(x, y)$ が 2 回連続微分可能なとき,

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du, \quad f(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x, y)$$

$f(x, y) \geq 0$, 全体で積分すると 1。周辺確率密度関数:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

条件付き確率密度関数

$f_X(x) \neq 0$ のとき,

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

条件付き期待値

$$E[Y | X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y | x) dy$$

離散型でも同様に定義できる。くり返しの法則:

$$E[E[Y | X]] = E[Y]$$

条件付き分散

$$V[Y | X = x] = E[(Y - E[Y | X = x])^2 | X = x] = E[Y^2 | X = x] - (E[Y | X = x])^2$$

全分散の公式 (分散分解の公式)

$$V[Y] = E[V(Y | X)] + V[E(Y | X)]$$

右辺第 1 項は, X を与えたもとでの Y の条件付き分散を X の分布で平均したもの (X を知ってもなお残る変動=群内変動)。第 2 項は, X の値によって条件付き期待値 $E[Y | X]$ 自体が動くことで生じる変動 (X で説明できる変動=群間変動)。両者の和が Y の分散全体に一致する。

確率変数の独立

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad (\text{または } p(x, y) = p_X(x)p_Y(y))$$

条件付き独立

$Z = z$ を与えたとき,

$$f(x, y | z) = f_{X|Z}(x | z) f_{Y|Z}(y | z)$$

確率母関数

離散型 X の確率関数を $p(x)$ とし, 1 に十分近いすべての s に対して次のべき級数が収束する

とき,

$$G_X(s) = E[s^X] = \sum_x s^x p(x)$$

$s = 1$ での微分から, 階乗モーメント

$$G_X^{(k)}(1) = E[X(X-1)\cdots(X-k+1)]$$

が求まり, これより期待値・分散が得られる。

モーメント (積率) 母関数

0 に十分近いすべての t に対し次の期待値が存在するとき,

$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

$t = 0$ での微分から原点まわりのモーメント $M_X^{(k)}(0) = E[X^k]$ が求まる。 X, Y が独立なら,

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t)$$

3 分布の特性値

分位点

F が増加関数のとき, $F(x_{0.25}) = 0.25$ を満たす $x_{0.25}$ を第 1 四分位数, $x_{0.5}$ ($F(x_{0.5}) = 0.5$) を中央値, $x_{0.75}$ を第 3 四分位数, $x_{0.75} - x_{0.25}$ を四分位範囲という。

最頻値 (モード)

$f(x)$ (または $p(x)$) を最大にする x 。

変動係数

非負値の確率変数 X について,

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

標準偏差 σ を平均 μ で割ることで単位が相殺され, 無次元量になる。そのため, 単位や平均の水準が異なる複数のデータ間でも, 相対的なばらつきの大きさを直接比較できる (標準偏差同士の単純比較ではこれができない)。

歪度

$E[X] = \mu$, $V[X] = \sigma^2$ として,

$$\gamma_1 = E\left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^3\right]$$

右に長い裾なら正, 左に長い裾なら負, 左右対称なら 0。

尖度

$$\gamma_2 = E\left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^4\right]$$

正規分布では 3 になるので, これとの差で分布形状を比較することがある。

共分散

$E[X] = \mu_X$, $E[Y] = \mu_Y$ として,

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - \mu_X \mu_Y$$

独立なら $\text{Cov}(X, Y) = 0$ で, このとき $E[XY] = E[X]E[Y]$ 。 a, b, c, d を定数として,

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y)$$

分散について,

$$V[X \pm Y] = V[X] + V[Y] \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

特に独立なら $V[X \pm Y] = V[X] + V[Y]$ 。

相関係数

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V[X]}\sqrt{V[Y]}} \in [-1, 1]$$

偏相関係数

Z が X, Y の両方に相関があるとき, 直接的な相関がなくても擬似相関が生じる。 Z の影響を除いた X, Y の偏相関係数は,

$$\rho_{XY \cdot Z} = \frac{\rho_{XY} - \rho_{XZ}\rho_{YZ}}{\sqrt{(1 - \rho_{XZ}^2)(1 - \rho_{YZ}^2)}}$$

【直感的な意味】 Z から X を回帰した際の残差と, Z から Y を回帰した際の残差 (=いずれも Z で説明できない部分) どうしの相関係数に一致する。つまり, 共通要因 Z の影響を取り除いたあとに残る, X と Y 固有の関係の強さを表す。

加重平均

重み $w_1, \dots, w_n$ に対し,

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

$w_1 = \dots = w_n = 1/n$ のとき算術平均に一致。

幾何平均

正のデータについて,

$$\left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n}$$

調和平均

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

確率変数ベクトル・平均ベクトル

$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_p)^T$ について, $E[\mathbf{x}] = (E[x_1], \dots, E[x_p])^T$ 。 A を $r \times p$ 定数行列, $\mathbf{b}$ を r 次元定数ベクトルとして,

$$E[A\mathbf{x} + \mathbf{b}] = AE[\mathbf{x}] + \mathbf{b}$$

分散共分散行列

$$\Sigma = (\text{Cov}[x_i, x_j])_{i,j=1,\dots,p}$$

半正定値対称行列。

標本分散共分散行列

サイズ n の標本に対し, (i, j) 成分を

$$s_{ij} = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_{ki} - \bar{x}_i)(x_{kj} - \bar{x}_j)$$

とする p 次正方行列。

相関行列・標本相関行列

(i, j) 成分を $\rho[x_i, x_j]$ (または標本相関係数) とする半正定値対称行列。

4 変数変換

$Y = g(X)$ の確率密度関数

X, Y を連続型, $y = g(x)$ が単調増加または単調減少で逆関数 $x = g^{-1}(y)$ が微分可能なとき,

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

(例) $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x > 0$), $y = g(x) = 1 - e^{-x}$ ($0 < y < 1$) のとき, $x = g^{-1}(y) = -\log(1-y)$ より,

$$f_Y(y) = \lambda(1-y)^{\lambda-1}, \quad 0 < y < 1$$

$X + Y$ の確率密度関数

X, Y が独立な連続型確率変数のとき, $Z = X + Y$ の確率密度関数は畳み込みで与えられる。

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-t) f_Y(t) dt$$

(変数変換 $(x, y) \rightarrow (z, t) = (x + y, y)$ のヤコビアンは 1)

Box-Cox 変換

非負のデータ x を正規分布に近づける変換。

$$x^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{x^\lambda - 1}{\lambda}, & \lambda \neq 0 \\ \log x, & \lambda = 0 \end{cases}$$

λ を変化させることで様々な変換が可能で, 正規分布に近づくものを選ぶ。

5 離散型分布

離散一様分布

$\{1, \dots, k\}$ 上で等確率。

$$p(x) = \frac{1}{k} \quad (x = 1, \dots, k), \quad E[X] = \frac{k+1}{2}, \quad V[X] = \frac{k^2-1}{12}, \quad G_X(s) = \frac{s(1-s^k)}{k(1-s)}$$

ベルヌーイ分布 $\text{Bin}(1, p)$

$$p(x) = p^x(1-p)^{1-x} \quad (x = 0, 1), \quad E[X] = p, \quad V[X] = p(1-p), \quad G_X(s) = 1-p+ps$$

二項分布 $\text{Bin}(n, p)$

$$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad E[X] = np, \quad V[X] = np(1-p), \quad G_X(s) = (1-p+ps)^n$$

再生性： $X_1 \sim \text{Bin}(n_1, p)$, $X_2 \sim \text{Bin}(n_2, p)$ 独立なら $X_1 + X_2 \sim \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$ 。

超幾何分布 $HG(N, M, n)$

$$p(x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad E[X] = \frac{nM}{N}, \quad V[X] = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$$

$n, M/N$ を一定にして $N \rightarrow \infty$ とすると $\text{Bin}(n, M/N)$ に収束する。

ポアソン分布 $Po(\lambda)$

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad E[X] = \lambda, \quad V[X] = \lambda, \quad G_X(s) = e^{\lambda(s-1)}$$

再生性あり。二項分布で $np = \lambda$, $n \rightarrow \infty$ とすると $Po(\lambda)$ に分布収束（少数の法則）。

幾何分布 $Geo(p)$

（初成功までの失敗回数 X ）：

$$p(x) = (1-p)^x p \quad (x = 0, 1, 2, \dots)$$

$$E[X] = \frac{1-p}{p}, \quad V[X] = \frac{1-p}{p^2}, \quad G_X(s) = \frac{p}{1-(1-p)s}$$

初成功までの試行回数 $Y = X + 1$ の場合：

$$p(y) = (1-p)^{y-1} p \quad (y = 1, 2, \dots)$$

無記憶性：任意の非負整数 m, n に対し

$$P(X \geq m+n \mid X \geq m) = P(X \geq n)$$

負の二項分布 $NB(r, p)$

(r 回目の成功までの失敗回数) :

$$p(x) = \binom{x+r-1}{x} p^r (1-p)^x, \quad E[X] = \frac{r(1-p)}{p}, \quad V[X] = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

$$G_X(s) = \left(\frac{p}{1 - (1-p)s} \right)^r$$

$r = 1$ で幾何分布に一致。再生性: $X_1 \sim NB(r_1, p), X_2 \sim NB(r_2, p)$ 独立なら $X_1 + X_2 \sim NB(r_1 + r_2, p)$ 。

多項分布 $M(n; p_1, \dots, p_k)$

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! \dots x_k!} p_1^{x_1} \dots p_k^{x_k}, \quad \sum_i x_i = n, \quad \sum_i p_i = 1$$

$k = 2$ で二項分布に一致。周辺分布 $X_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$ 。 $i \neq j$ に対し,

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j, \quad \rho(X_i, X_j) = -\sqrt{\frac{p_i p_j}{(1-p_i)(1-p_j)}}$$

6 連続型分布と標本分布

連続一様分布 $U(a, b)$

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad (a < x < b), \quad E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad V[X] = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}$$

正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$E[X] = \mu, \quad V[X] = \sigma^2, \quad M_X(t) = \exp(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$$

$\mu = 0, \sigma^2 = 1$ を標準正規分布という。再生性: $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 独立なら

$$aX_1 + bX_2 \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$$

指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (x > 0), \quad E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad V[X] = \frac{1}{\lambda^2}, \quad M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$$

無記憶性: 任意の正数 a, b に対し $P(X \geq a+b \mid X \geq a) = P(X \geq b)$ 。

ガンマ分布 $Ga(a, b)$

(a : 形状母数, b : 尺度母数)

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(a)b^a} x^{a-1} e^{-x/b} \quad (x > 0), \quad E[X] = ab, \quad V[X] = ab^2, \quad M_X(t) = (1 - bt)^{-a}$$

$a = 1$ で $\text{Exp}(1/b)$ に一致。再生性: $X_1 \sim Ga(a_1, b), X_2 \sim Ga(a_2, b)$ 独立なら $X_1 + X_2 \sim Ga(a_1 + a_2, b)$ 。

ベータ分布 $Be(a, b)$

$$f(x) = \frac{1}{B(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} \quad (0 < x < 1)$$

$$E[X] = \frac{a}{a+b}, \quad V[X] = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$

対数正規分布 $\Lambda(\mu, \sigma^2)$

$Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X = e^Y$ 。

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (x > 0)$$

$$E[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}, \quad V[X] = (e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu+\sigma^2}$$

多変量正規分布 $N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{k/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right)$$

2変量の場合、相関係数を ρ として、

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right]$$

このとき $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, かつ

$$aX_1 + bX_2 \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2 + b^2\sigma_2^2)$$

$X_1 = x_1$ を与えたときの X_2 の条件付き分布は、

$$X_2 | X_1 = x_1 \sim N\left(\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2)\right)$$

混合正規分布

例えば $N(0, 1)$ の密度 φ_1 , $N(4, 1)$ の密度 φ_2 として、

$$f(x) = 0.3\varphi_1(x) + 0.7\varphi_2(x)$$

一般に、 $\pi_1 + \dots + \pi_k = 1$ ($\pi_i > 0$), 正規密度 $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ として $f = \sum_i \pi_i \varphi_i$ 。

EM アルゴリズム

(2成分混合正規分布 $f = \pi\varphi_1 + (1-\pi)\varphi_2$, $\boldsymbol{\theta} = (\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \pi)$ の推定) :

1. 初期値 $\boldsymbol{\theta}^{(0)}$ を決める。
2. **E ステップ**: 観測値 x_i が $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ から得られる確率を γ_i として、

$$\gamma_i^{(k+1)} = \frac{\pi^{(k)} \varphi_1(x_i; \mu_1^{(k)}, \sigma_1^{2(k)})}{\pi^{(k)} \varphi_1(x_i; \mu_1^{(k)}, \sigma_1^{2(k)}) + (1-\pi^{(k)}) \varphi_2(x_i; \mu_2^{(k)}, \sigma_2^{2(k)})}$$

3. **M ステップ**: $\gamma_i^{(k+1)}$ を用いて $\theta^{(k+1)}$ (重み付き平均・分散・混合比) を計算。
4. 2,3 を収束するまで繰り返す。

カイ 2 乗分布 $\chi^2(n)$

$Ga(n/2, 2)$ 。特徴①: $Z \sim N(0, 1) \Rightarrow Z^2 \sim \chi^2(1)$ 。 $Z_1, \dots, Z_n$ 独立標準正規なら $\sum Z_i^2 \sim \chi^2(n)$ 。

特徴②: $X \sim \chi^2(m), Y \sim \chi^2(n)$ 独立なら $X + Y \sim \chi^2(m + n)$ 。

特徴③: $E[X] = n, V[X] = 2n$ 。

非心カイ 2 乗分布 $\chi^2(n, \lambda)$

$\lambda = \mu_1^2 + \dots + \mu_n^2 > 0$ として, $\sum_i (Z_i + \mu_i)^2 \sim \chi^2(n, \lambda)$ 。再生性 (一般化): $X_i \sim \chi^2(n_i, \lambda_i)$ 独立なら $\sum X_i \sim \chi^2(\sum n_i, \sum \lambda_i)$ 。

t 分布 $t(n)$

$Z \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n)$ 独立として,

$$T = \frac{Z}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$$

$t(1)$ はコーシー分布, $n \rightarrow \infty$ で標準正規分布に分布収束。 $n > 1$ で $E[X] = 0$, $n > 2$ で $V[X] = n/(n-2)$ 。 $Z \sim N(\lambda, 1)$ のとき, T は自由度 n , 非心度 λ の非心 t 分布。

F 分布 $F(n_1, n_2)$

$X_1 \sim \chi^2(n_1), X_2 \sim \chi^2(n_2)$ 独立として,

$$F = \frac{X_1/n_1}{X_2/n_2} \sim F(n_1, n_2)$$

$T \sim t(n)$ のとき $T^2 \sim F(1, n)$ 。 $X_1 \sim \chi^2(n_1, \lambda), X_2 \sim \chi^2(n_2)$ 独立なら, 上の F は自由度 (n_1, n_2) , 非心度 λ の非心 F 分布。

7 主要分布 早見表 (使う場面・確率関数・期待値・分散・累積分布関数・モーメント母関数・特性関数)

各分布の先頭には, その分布がどのような状況を記述するために使われるか (「使う場面」) を付した。

以下, $M_X(t) = E[e^{tX}]$ (モーメント母関数), $\varphi_X(t) = E[e^{itX}] = M_X(it)$ (特性関数) とする。特性関数は任意の分布で必ず存在するが, モーメント母関数は裾の重い分布 (t 分布, F 分布, 対数正規分布など) では存在しないことがある (その場合は「存在しない」と明記)。離散型の $F(x)$ は「 x 以下」の意味の階段関数 ($[x]$ で和を打ち切る)。初等関数で閉じない箇所は, 正規分布の分布関数 Φ , 正則化不完全ガンマ関数 $P(a, z) = \gamma(a, z)/\Gamma(a)$, 正則化不完全ベータ関数 $I_x(a, b)$, クンマーの合流型超幾何関数 ${}_1F_1$ を用いて表す (数値は数表・統計ソフトで求める)。

離散型分布

項目	内容
ベルヌーイ分布 $\text{Bin}(1, p)$	
使う場面	成功・失敗 (1/0) の 2 値をとる 1 回だけの試行のモデル。二項分布・幾何分布・負の二項分布を組み立てる最小単位であり、ロジスティック回帰やプロビット回帰の応答変数もこの分布に従う。
確率関数	$p(x) = p^x(1-p)^{1-x} \ (x=0, 1)$
期待値・分散	$E[X] = p, \quad V[X] = p(1-p)$
累積分布関数	$F(x) = 0 \ (x < 0), \quad 1-p \ (0 \leq x < 1), \quad 1 \ (x \geq 1)$
モーメント母関数	$M_X(t) = 1-p+pe^t$
特性関数	$\varphi_X(t) = 1-p+pe^{it}$
二項分布 $\text{Bin}(n, p)$	
使う場面	成功確率 p の独立な試行を n 回繰り返したときの成功回数。母比率の推定・検定、符号検定の帰無分布などに用いる。 n が大きく p が小さい (np が一定) ならポアソン分布で、 $np(1-p)$ が十分大きければ正規分布で近似できる。
確率関数	$p(x) = \binom{n}{x} p^x(1-p)^{n-x}$
期待値・分散	$E[X] = np, \quad V[X] = np(1-p)$
累積分布関数	$F(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k} = I_{1-p}(n - \lfloor x \rfloor, \lfloor x \rfloor + 1)$
モーメント母関数	$M_X(t) = (1-p+pe^t)^n$
特性関数	$\varphi_X(t) = (1-p+pe^{it})^n$
ポアソン分布 $Po(\lambda)$	
使う場面	一定の時間・面積・個体あたりに、まれな事象が起こる回数 (事故件数, 来店客数, キズの個数)。ポアソン過程の計数過程, ポアソン回帰や分割表の対数線形モデルの応答分布として使う。 $E[X] = V[X] = \lambda$ が特徴で、これを超える散らばり (過分散) があるときは負の二項分布を検討する。
確率関数	$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$
期待値・分散	$E[X] = \lambda, \quad V[X] = \lambda$
累積分布関数	$F(x) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\lambda^k}{k!} = \frac{\Gamma(\lfloor x \rfloor + 1, \lambda)}{\lfloor x \rfloor!}$ (Γ は上側不完全ガンマ関数)
モーメント母関数	$M_X(t) = e^{\lambda(e^t-1)}$
特性関数	$\varphi_X(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)}$
幾何分布 (失敗回数) $\text{Geo}(p)$	
使う場面	初めて成功するまでに要した失敗回数, すなわち離散版の待ち時間。無記憶性 $P(X \geq s+t X \geq s) = P(X \geq t)$ をもつ唯一の離散分布で、連続型の指数分布に対応する。
確率関数	$p(x) = (1-p)^x p \ (x=0, 1, 2, \dots)$
期待値・分散	$E[X] = \frac{1-p}{p}, \quad V[X] = \frac{1-p}{p^2}$
累積分布関数	$F(x) = 1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor + 1} \ (x \geq 0)$
モーメント母関数	$M_X(t) = \frac{p}{1 - (1-p)e^t} \ (t < -\log(1-p))$
特性関数	$\varphi_X(t) = \frac{p}{1 - (1-p)e^{it}}$
負の二項分布 $NB(r, p)$	
使う場面	r 回目の成功が出るまでの失敗回数 ($r=1$ で幾何分布)。またポアソン分布の平均 λ がガンマ分布に従うとした混合分布でもあり、 $V[X] > E[X]$ となる過分散のカウントデータのモデルとして使われる。
確率関数	$p(x) = \binom{x+r-1}{x} p^r(1-p)^x$
期待値・分散	$E[X] = \frac{r(1-p)}{p}, \quad V[X] = \frac{r(1-p)}{p^2}$
累積分布関数	$F(x) = I_p(r, \lfloor x \rfloor + 1)$
モーメント母関数	$M_X(t) = \left(\frac{p}{1 - (1-p)e^t} \right)^r \ (t < -\log(1-p))$
特性関数	$\varphi_X(t) = \left(\frac{p}{1 - (1-p)e^{it}} \right)^r$
超幾何分布 $HG(N, M, n)$	

項目	内容
使う場面	有限母集団 (N 個中に当たりが M 個) から n 個を非復元抽出したときの当たりの個数。抜取検査や、 2×2 分割表に対する Fisher の正確検定の帰無分布に現れる。 n/N が小さければ二項分布 $\text{Bin}(n, M/N)$ で近似でき、分散に掛かる $\frac{N-n}{N-1}$ が有限母集団修正にあたる。
確率関数	$p(x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$
期待値・分散	$E[X] = \frac{nM}{N}, \quad V[X] = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$
累積分布関数	$F(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \quad (\text{閉じた初等表示なし})$
モーメント母関数	台が有限なので存在するが、初等関数では表せない (一般化超幾何関数を要する)
特性関数	同上 (初等関数では表せない)

連続型分布

項目	内容
一様分布 $U(a, b)$	
使う場面	区間内のどこも等しくもつともらしい, という「情報のない」状態のモデル。逆関数法による乱数生成の出発点, ベイズ法の無情報事前分布, また連続分布のもとで帰無仮説が正しいときの p 値の分布 ($p \sim U(0, 1)$) としても現れる。
確率密度関数	$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad (a < x < b)$
期待値・分散	$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad V[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$
累積分布関数	$F(x) = \frac{x-a}{b-a} \quad (a \leq x \leq b), \quad x < a \text{ で } 0, \quad x > b \text{ で } 1$
モーメント母関数	$M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)} \quad (t \neq 0), \quad M_X(0) = 1$
特性関数	$\varphi_X(t) = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)} \quad (t \neq 0), \quad \varphi_X(0) = 1$
指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$	
使う場面	ポアソン過程で事象が起こる間隔 (次の事象までの待ち時間), 故障率 (ハザード) が一定な機器の寿命。無記憶性をもつ唯一の連続分布。 $\text{Exp}(\lambda) = \text{Ga}(1, 1/\lambda)$ であり, $2\lambda X \sim \chi^2(2)$ となる。
確率密度関数	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (x > 0)$
期待値・分散	$E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad V[X] = \frac{1}{\lambda^2}$
累積分布関数	$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad (x \geq 0)$
モーメント母関数	$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t} \quad (t < \lambda)$
特性関数	$\varphi_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - it}$
ガンマ分布 $\text{Ga}(a, b)$	
使う場面	正の値をとり右に歪んだ量の一般的なモデル。 a が整数なら $\text{Exp}(1/b)$ の a 個の和, すなわち a 回目の事象が起こるまでの待ち時間になる。ベイズ法ではポアソン分布の λ や正規分布の精度 $1/\sigma^2$ の共役事前分布として使う。
確率密度関数	$f(x) = \frac{1}{\Gamma(a)b^a} x^{a-1} e^{-x/b} \quad (x > 0)$
期待値・分散	$E[X] = ab, \quad V[X] = ab^2$
累積分布関数	$F(x) = P\left(a, \frac{x}{b}\right) \quad (x \geq 0)$
モーメント母関数	$M_X(t) = (1 - bt)^{-a} \quad (t < 1/b)$
特性関数	$\varphi_X(t) = (1 - ibt)^{-a}$
カイ 2 乗分布 $\chi^2(n) = \text{Ga}(n/2, 2)$	

項目	内容
使う場面	標準正規変数の2乗和 $\sum_{i=1}^n Z_i^2$ の分布。正規母集団の分散の推定・検定 ($\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$), 適合度検定・独立性検定の Pearson 統計量, 尤度比検定統計量 $-2\log \lambda$ の漸近分布 (Wald 検定・スコア検定も同様) として使う。
確率密度関数	$f(x) = \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2} \quad (x > 0)$
期待値・分散	$E[X] = n, \quad V[X] = 2n$
累積分布関数	$F(x) = P\left(\frac{n}{2}, \frac{x}{2}\right) \quad (x \geq 0)$
モーメント母関数	$M_X(t) = (1 - 2t)^{-n/2} \quad (t < 1/2)$
特性関数	$\varphi_X(t) = (1 - 2it)^{-n/2}$
正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$	
使う場面	中心極限定理により, 標本平均や多数の微小な要因の和の近似分布として最も広く使われる。回帰分析の誤差項の仮定, 最尤推定量の漸近分布 $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \rightarrow N(0, I(\theta)^{-1})$, 各種検定統計量の基礎になる。
確率密度関数	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$
期待値・分散	$E[X] = \mu, \quad V[X] = \sigma^2$
累積分布関数	$F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right), \quad \Phi(z) = \frac{1}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)\right]$
モーメント母関数	$M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right)$
特性関数	$\varphi_X(t) = \exp\left(i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right)$
対数正規分布 $\Lambda(\mu, \sigma^2)$	
使う場面	対数をとると正規分布になる, 正の値をとり右に大きく歪んだ量 (所得, 株価, 粒径, 生存時間など)。多数の要因が乗法的に効く場合, 対数をとると和になり中心極限定理が働くため, この分布が現れる。
確率密度関数	$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (x > 0)$
期待値・分散	$E[X] = e^{\mu + \sigma^2/2}, \quad V[X] = (e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu + \sigma^2}$
累積分布関数	$F(x) = \Phi\left(\frac{\log x - \mu}{\sigma}\right) \quad (x > 0)$
モーメント母関数	存在しない (各次のモーメントは有限だが, $t > 0$ で発散)
特性関数	初等関数では表せない (複雑な級数表示のみ知られる)
ベータ分布 $Be(a, b)$	
使う場面	$[0, 1]$ 上の値, すなわち割合や確率そのもののモデル。ベイズ法では二項分布の p に対する共役事前分布 (事後分布もベータ分布) として使う。一様分布の順序統計量 $U_{(k)} \sim Be(k, n - k + 1)$ でもある。
確率密度関数	$f(x) = \frac{1}{B(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} \quad (0 < x < 1)$
期待値・分散	$E[X] = \frac{a}{a+b}, \quad V[X] = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$
累積分布関数	$F(x) = I_x(a, b) \quad (0 < x < 1)$
モーメント母関数	$M_X(t) = {}_1F_1(a; a+b; t)$ (クンマーの合流型超幾何関数)
特性関数	$\varphi_X(t) = {}_1F_1(a; a+b; it)$
t 分布 $t(n)$	
使う場面	母分散が未知のため σ を標本標準偏差 s で置き換えた統計量の分布。1 標本・2 標本の母平均の検定と区間推定, 回帰係数の t 検定に用いる。正規分布より裾が重く, $n \rightarrow \infty$ で $N(0, 1)$ に収束する。
確率密度関数	$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$
期待値・分散	$E[X] = 0 \quad (n > 1), \quad V[X] = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2)$
累積分布関数	$F(x) = 1 - \frac{1}{2} I_{\frac{n}{n+x^2}}\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad (x \geq 0), \quad x < 0 \text{ では } F(x) = 1 - F(-x)$
モーメント母関数	存在しない ($t \neq 0$ で発散)
特性関数	初等関数では表せない (第2種変形ベッセル関数を要する)

項目	内容
F 分布 $F(n_1, n_2)$	
使う場面	2つの不偏分散の比 s_1^2/s_2^2 の分布で、等分散性の検定に用いる。分散分析では級間平均平方と級内平均平方の比として、重回帰分析ではモデル全体の有意性の検定や、変数群を追加する価値をみる部分 F 検定として現れる。
確率密度関数	$f(x) = \frac{(n_1/n_2)^{n_1/2}}{B(\frac{n_1}{2}, \frac{n_2}{2})} \frac{x^{n_1/2-1}}{(1 + \frac{n_1}{n_2}x)^{(n_1+n_2)/2}} \quad (x > 0)$
期待値・分散	$E[X] = \frac{n_2}{n_2 - 2} \quad (n_2 > 2), \quad V[X] = \frac{2n_2^2(n_1 + n_2 - 2)}{n_1(n_2 - 2)^2(n_2 - 4)} \quad (n_2 > 4)$
累積分布関数	$F(x) = I_{\frac{n_1 x}{n_1 x + n_2}}\left(\frac{n_1}{2}, \frac{n_2}{2}\right) \quad (x \geq 0)$
モーメント母関数	存在しない ($t > 0$ で発散)
特性関数	初等関数では表せない (合流型超幾何関数を要する)

8 極限定理，漸近理論

確率変数列 $X_1, X_2, \dots$ の収束の強さの順：

概収束 $\Rightarrow$ 確率収束 $\Rightarrow$ 分布収束, 平均二乗収束 $\Rightarrow$ 確率収束

概収束

(例：大数の強法則)：

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = Y\right) = 1$$

平均二乗収束

(例：大数の弱法則，確率収束の例でもある)：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[(X_n - Y)^2] = 0$$

確率収束

$(X_n \rightarrow_p Y)$ ：任意の $\varepsilon > 0$ に対し，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - Y| > \varepsilon) = 0$$

分布収束（法則収束）

$(F_n \rightarrow_d G)$ ： G のすべての連続点 x で，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = G(x)$$

大数の弱法則

$X_1, \dots, X_n$ が平均 μ ，分散有限の同一分布に独立に従うとき，標本平均は μ に平均二乗収束する。

中心極限定理

$X_1, \dots, X_n$ が平均 μ ，分散 σ^2 の同一分布に独立に従うとき，

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow_d N(0, 1)$$

連続修正

$X \sim \text{Bin}(n, p)$, $Y \sim N[np, np(1-p)]$ として, $P(a \leq X \leq b)$ を $P(a - 0.5 \leq Y \leq b + 0.5)$ で近似する。

連続写像定理

$X_n \rightarrow_d X$ で h が連続なら $h(X_n) \rightarrow_d h(X)$ 。

スルツキーの補題

$U_n \rightarrow_d U$, $V_n \rightarrow_p a$ のとき,

$$U_n + V_n \rightarrow_d U + a, \quad U_n V_n \rightarrow_d aU$$

デルタ法

$\sqrt{n}(U_n - \mu) \rightarrow_d N(0, \sigma^2)$ のとき, 導関数が連続で $h'(\mu) \neq 0$ を満たす h に対し,

$$\sqrt{n}(h(U_n) - h(\mu)) \rightarrow_d N(0, h'(\mu)^2 \sigma^2)$$

(例) 対数正規分布 $\Lambda(\mu, \sigma^2)$ の中央値 e^μ の推定: X_i 独立に $\Lambda(\mu, \sigma^2)$, $Y_i = \log X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

$\sqrt{n}(\bar{Y}_n - \mu) \rightarrow_d N(0, \sigma^2)$ に $h(x) = e^x$ を適用して,

$$\sqrt{n}(e^{\bar{Y}_n} - e^\mu) \rightarrow_d N(0, e^{2\mu} \sigma^2)$$

9 統計的推定の基礎

独立に同一の分布 $f(x; \theta)$ に従う標本 $X_1, \dots, X_n$ の観測値をもとに, パラメータ θ を推測することを**統計的推定**という。標本の関数 $h(X_1, \dots, X_n)$ を用いてパラメータの値を推定することを**点推定**, h を**推定量**, 観測値を代入した $h(x_1, \dots, x_n)$ を**推定値**, 標本のみの関数を**統計量**という。

順序統計量

$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 。

モーメント

$E[X^k]$ を原点まわりの k 次モーメント, $E[(X - \mu)^k]$ を平均まわりの k 次モーメントという。

モーメント法

大数の法則に基づく母数推定法。 k 次までのモーメントが $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ の関数として表されているとき, j 次モーメントを $\frac{1}{n} \sum X_i^j$ で置き換えて $\theta_1, \dots, \theta_k$ について解く。(例) $X \sim \text{Bin}(n, p)$ ($E[X] = np$, $V[X] = np(1-p)$) で, 標本分散 S^2 を用いて,

$$\hat{p} = 1 - \frac{S^2}{\bar{X}}, \quad \hat{n} = \frac{\bar{X}}{\hat{p}} = \frac{\bar{X}^2}{\bar{X} - S^2}$$

最尤法

観測値 $x_1, \dots, x_n$ に対する**尤度関数**

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

を最大にする θ (**最尤推定値**) を, 対数尤度 $\log L(\theta)$ の導関数を 0 とおいて求める。 $g(\theta)$ の最尤推定量は θ の最尤推定量を g で変換したものに等しい (**不変性**)。(例) $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$

のとき,

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

これらは μ, σ^2 の一致推定量 ($n \rightarrow \infty$ で真値に確率収束) である。

漸近正規性

適当な正則条件のもとで, $n \rightarrow \infty$ のとき,

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \rightarrow_d N\left(0, \frac{1}{J_1(\theta)}\right)$$

$J_1(\theta)$ はフィッシャー情報量

$$J_n(\theta) = E\left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log L(\theta)\right)^2\right]$$

で $n = 1$ としたもの。ある条件下で,

$$J_1(\theta) = -E\left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f(X; \theta)\right]$$

バイアス・バリエンス分解

$$E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = V[\hat{\theta}] + (E[\hat{\theta}] - \theta)^2$$

(平均 2 乗誤差 = 分散 + バイアス²)

不偏推定量

バイアスが 0 の推定量。標本分散はバイアスがあるが, 不偏分散

$$U^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

は母分散の不偏推定量。

ジャックナイフ推定量

バイアスを補正する方法。① 標本全体からの推定量 $\hat{\theta}$ 。② X_i を除いた推定量 $\hat{\theta}_{(i)}$ の平均 $\overline{\hat{\theta}_{(.)}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{\theta}_{(i)}$ 。③ 新推定量 $= n\hat{\theta} - (n-1)\overline{\hat{\theta}_{(.)}}$ 。

UMVUE

不偏推定量の中で分散最小のもの (一様最小分散不偏推定量)。

クラメル・ラオの不等式

不偏推定量 $\hat{\theta}$ に対し,

$$V[\hat{\theta}] \geq \frac{1}{nJ_1(\theta)}$$

漸近有効推定量

$n \rightarrow \infty$ で分散がクラメル・ラオの下限を達成する一致推定量。

有効推定量: 不偏推定量の中でクラメル・ラオの下限を達成するもの (= UMVUE)。

十分統計量

$T(\mathbf{X}) = t$ を与えたときの $\mathbf{X} = \mathbf{x}$ の条件付き確率が θ に依存しないこと。同値な条件（フィッシャー・ネイマンの分解定理）：

$$f(\mathbf{x}; \theta) = g(T(\mathbf{x}); \theta) h(\mathbf{x})$$

(例) $X_1, \dots, X_n$ 独立に $Po(\lambda)$ のとき、同時確率関数は

$$\prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_i}}{x_i!} = e^{-n\lambda} \lambda^{\sum x_i} \prod_i \frac{1}{x_i!}$$

より $\sum x_i$ が λ の十分統計量。

10 区間推定

母平均・母分散の区間推定（母集団分布が正規分布）、多項分布の信頼区間は2級内容。

分散の比の区間推定

2つの正規母集団から求めた不偏分散を U_A^2, U_B^2 （独立）、母分散を σ_A^2, σ_B^2 として、信頼度 95% の信頼区間：

$$\frac{U_A^2/U_B^2}{F_{0.025}(n_B-1, n_A-1)} \leq \frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} \leq \frac{U_A^2/U_B^2}{F_{0.975}(n_B-1, n_A-1)}$$

$F_{0.025}, F_{0.975}$ は自由度 (n_B-1, n_A-1) の F 分布の上側 2.5% 点・上側 97.5% 点。

多項分布の差の信頼区間

$(X_1, \dots, X_k) \sim M(n; p_1, \dots, p_k)$ として、 $p_1 - p_2$ の信頼度 95% の信頼区間：

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1) + \hat{p}_2(1-\hat{p}_2) + 2\hat{p}_1\hat{p}_2}{n}}$$

ただし $\hat{p}_1 = x_1/n, \hat{p}_2 = x_2/n$ 。

11 検定の基礎と検定法の導出

1. 母数に関して、帰無仮説（否定したい仮説）と対立仮説（正しいことが期待される仮説）を設定する。
2. 帰無仮説のもとでの検定統計量の分布を求め、有意水準と棄却域を決める。
3. 検定統計量の実現値が棄却域に落ちれば帰無仮説を棄却し、そうでなければ受容する。

検出力とサンプルサイズ

母比率 p 、有意水準 2.5% の片側検定、帰無仮説 $p = p_0$ 、対立仮説 $p = p_1$ ($p_1 > p_0$)。棄却限界値は

$$p_0 + 1.96 \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$$

対立仮説のもとでの検出力は、標準正規分布に従う Z を用いて $P(Z \geq -c)$ で計算でき、

$$p_1 - p_0 = 1.96 \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} + c \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n}}$$

が成り立つ。2つの正規分布 $N(\mu_0, \sigma^2/n), N(\mu_1, \sigma^2/n)$ の場合は,

$$\mu_1 - \mu_0 = 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} + c \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

両辺を σ でわった左辺をエフェクトサイズという：

$$\frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma} = \frac{1.96 + c}{\sqrt{n}}$$

エフェクトサイズが大きいほど、一定の検出力を得るためのサンプルサイズは小さくてすむ。

生産者危険

帰無仮説が正しいのに誤って棄却する誤り（**第一種の過誤**）。不良品率 p_0 ，サンプルサイズ n ，合格基準値 c として，

$$P(\text{不良品数} > c) = \sum_{x=c+1}^n \binom{n}{x} p_0^x (1-p_0)^{n-x}$$

消費者危険

対立仮説が正しいのに誤って帰無仮説を受容する誤り（**第二種の過誤**）。不良品率 p_1 として，

$$P(\text{不良品数} \leq c) = \sum_{x=0}^c \binom{n}{x} p_1^x (1-p_1)^{n-x}$$

12 正規分布に関する検定

母集団分布が正規分布であることを仮定する検定。1 標本・2 標本の平均の検定，1 標本の分散の検定，2 標本の等分散の検定はいずれも 2 級内容。

13 一般の分布に関する検定法

母比率・母比率の差の検定は 2 級内容。

ポアソン分布に関する検定

λ が大きいとき $Po(\lambda) \approx N(\lambda, \lambda)$ 。 $\lambda = \lambda_0$ を帰無仮説として，

$$Z = \frac{X - \lambda_0}{\sqrt{\lambda_0}} \sim N(0, 1) \quad (\text{近似})$$

適合度検定

$(X_1, \dots, X_k) \sim M(n, p_1, \dots, p_k)$ ，帰無仮説 $p_i = p_{i0}$ 。期待度数 np_{i0} 。

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(x_i - np_{i0})^2}{np_{i0}} \sim \chi^2(k-1) \quad (\text{近似})$$

パラメータを ℓ 個推定した場合は自由度 $k - \ell - 1$ 。**イエーツの補正**：分子を $(|x_i - np_{i0}| - 0.5)^2$ に置き換える（第一種の過誤を犯しにくくなる）。

尤度比検定

$\theta = (\theta_1, \theta_2)$ のうち θ_1 を定数に固定する帰無仮説に対し、

$$\lambda = \frac{L(\hat{\theta})}{L(\hat{\theta} | H_0)}$$

サンプルサイズが大きいとき、帰無仮説のもとで

$$2 \log \lambda \rightarrow_d \chi^2(p)$$

(p : 固定したパラメータの個数)。

14 ノンパラメトリック法

母集団分布を有限個のパラメータで記述するのがパラメトリック法、そうでないのがノンパラメトリック法。対応するパラメトリック検定: 1 標本の中央値検定 $\leftrightarrow$ 符号検定・符号付き順位検定, 2 標本の差の検定 (対応なし) $\leftrightarrow$ ウィルコクソンの順位和検定, 3 群以上の差の検定 $\leftrightarrow$ クラスカル・ウォリス検定。

符号検定

$Z = X - m_0$ (1 標本) または $Z = X - Y$ (対応 2 標本)。手順: ① Z の符号を「+」「-」に分け, 0 は除く (サイズを改めて n)。② + の個数 T が帰無仮説下で $\text{Bin}(n, 1/2)$ に従うことを用いて P 値を計算 (n が大なら $N(n/2, n/4)$ で近似)。

符号付き順位検定

母集団分布の対称性を仮定。① Z の符号を分ける。② $|Z|$ の小さい順に順位付け。③ + の順位合計 T_+ を検定統計量とし, n が大でタイなしなら

$$T_+ \sim N\left(\frac{n(n+1)}{4}, \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}\right) \quad (\text{近似})$$

ウィルコクソンの順位和検定

$X_1, \dots, X_m \sim F, Y_1, \dots, Y_n \sim G$ 独立, F, G は分布形が同じと仮定。① 全データを合わせて順位付け。② 一方の群の順位和 W が, m, n 大でタイなしのとき

$$W \sim N\left(\frac{m(m+n+1)}{2}, \frac{mn(m+n+1)}{12}\right) \quad (\text{近似})$$

並べ替え検定

標本を固定したもとで統計量 T (平均値・中央値など) の分布をつくり, 観測値以上に極端な値となる確率 (P 値) を求める。

クラスカル・ウォリス検定

k 群, サイズ $n_1, \dots, n_k$ ($N = \sum n_i$), 順位和 $R_1, \dots, R_k$, 順位平均 $\bar{R}_1, \dots, \bar{R}_k$ 。タイなしなら,

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^k n_i \left(\bar{R}_i - \frac{N+1}{2} \right)^2 \rightarrow_d \chi^2(k-1)$$

順位相関係数

タイなしのサイズ n の 2 変量順位データ $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ 。

スピアマンの順位相関係数

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}{n(n^2 - 1)}$$

ケンドールの順位相関係数

正の組数 P , 負の組数 N ($(x_i - x_j)(y_i - y_j)$ の符号) として,

$$\tau = \frac{P - N}{n(n-1)/2}$$

15 マルコフ連鎖

$\{1, \dots, N\}$ 上の確率変数列 $X_0, X_1, X_2, \dots$ が,

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

を満たすとき**マルコフ連鎖**という。 $\{1, \dots, N\}$ を**状態空間**という。条件付き確率が n によらないとき**斉時的**という。

状態確率ベクトル

$\pi_n = (p_n(1), \dots, p_n(N))$ 。 π_0 を**初期分布**という。

推移確率行列: $\pi_{n+1} = \pi_n Q$ を満たす N 次正方行列 Q 。

定常分布: $\pi = \pi Q$ を満たす π 。ある条件下でただ 1 つ存在する。

パラメータの推定

観測データ $X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n$ を用いた最尤推定は,

$$P(X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) = P(X_0 = x_0) \prod_{t=1}^n P(X_t = x_t \mid X_{t-1} = x_{t-1})$$

を尤度関数として行う。

16 確率過程の基礎

確率過程

$X_1, X_2, \dots$ を離散時間の確率過程, $t \geq 0$ 実数全体をとる $X = (X_t)$ を連続時間の確率過程という。

ブラウン運動

$B = (B_t)$ が次を満たす。

1. $B_0 = 0$, パスは連続。
2. **独立増分性**: 任意の $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n$ に対し, $B_{t_1} - B_{t_0}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}}$ は互いに独立。
3. **定常増分性**: 任意の $t > s \geq 0$ に対し, $B_t - B_s \sim N(0, \sigma^2(t-s))$ 。

時間間隔 Δ ごとの増分 $Z_k \sim N(\mu\Delta, \sigma^2\Delta)$ から, μ, σ を最尤推定できる:

$$\hat{\mu} = \frac{\bar{Z}}{\Delta}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{\Delta} \cdot \frac{1}{n} \sum_k (Z_k - \bar{Z})^2$$

ポアソン過程

強度 λ のポアソン過程 $N = (N_t)$ は次を満たす。

1. $N_0 = 0$ 。
2. 独立増分性。
3. 定常増分性: $N_t - N_s \sim Po(\lambda(t-s))$ ($t > s \geq 0$)。

イベント発生時刻を $T_1, \dots, T_n$, 時間間隔 $W_k = T_k - T_{k-1} \sim Exp(\lambda)$ 独立。 λ の推定量: n/T_n , または時間間隔 Δ ごとの観測回数を用いて $N_{n\Delta}/(n\Delta)$ 。いずれも (イベント総数) $\div$ (観測期間)。

複合ポアソン過程

$N = (N_t)$ がポアソン過程, (U_k) が独立同分布で N と独立として,

$$X_t = \sum_{k=1}^{N_t} U_k$$

$E[N_t] = \lambda t$, $E[U_k] = \mu$, $V[U_k] = \sigma^2$ のとき,

$$E[X_t] = \lambda \mu t, \quad V[X_t] = \lambda t(\mu^2 + \sigma^2)$$

17 重回帰分析

$\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T$, 説明変数行列 $X = (x_{ij})$, $\boldsymbol{\beta} = (\beta_0, \dots, \beta_d)^T$, $\boldsymbol{\varepsilon} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)^T$ として,

$$\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

最小 2 乗法

$X^T X$ が正則なら, 誤差平方和 $\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\varepsilon}$ を最小にする $\boldsymbol{\beta}$ (最小 2 乗推定量) は,

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y}$$

$E[\boldsymbol{\varepsilon}] = \mathbf{0}$ なら不偏。 $V[\boldsymbol{\varepsilon}] = \sigma^2 I$ なら $V[\hat{\boldsymbol{\beta}}] = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$ 。最小 2 乗推定量は最良線形不偏推定量 (BLUE) (ガウス・マルコフの定理)。

$$\hat{\mathbf{y}} = X\hat{\boldsymbol{\beta}}, \quad \mathbf{e} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}$$

残差の自由度は $n - d - 1$, $\mathbf{e}^T \mathbf{e} / (n - d - 1)$ は σ^2 の不偏推定量。

決定係数

$$R^2 = \frac{\sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{\mathbf{e}^T \mathbf{e}}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2} \in [0, 1]$$

説明変数を増やすと必ず大きくなる欠点がある。

自由度調整済み決定係数

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{n-1}{n-d-1}(1-R^2)$$

回帰係数の推定と検定

$\epsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$ なら $\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2(X^T X)^{-1})$ 。 $\beta_i = 0$ の検定：

$$\frac{\hat{\beta}_i}{\text{se}(\hat{\beta}_i)} \sim t(n-d-1)$$

$\beta_1 = \dots = \beta_d = 0$ の検定：

$$\frac{R^2/d}{(1-R^2)/(n-d-1)} \sim F(d, n-d-1)$$

一般化最小 2 乗法

誤差項が不均一分散・相関ありの場合、適切な変換を組み込んだ推定量が BLUE。

L₂ 正則化（リッジ回帰）

$$\sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^d \beta_j x_{ij} \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^d \beta_j^2 \rightarrow \min$$

$\lambda = 0$ で通常の最小 2 乗法。 λ を大きくすると回帰係数は 0 に近づく。

L₁ 正則化（Lasso 回帰）

$$\sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^d \beta_j x_{ij} \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^d |\beta_j| \rightarrow \min$$

スパース性（回帰係数が真に 0 になりやすい）があり、推定とモデル選択を同時に行える。

Elastic Net

L₁ と L₂ を混ぜたもの。変数選択と係数の縮小を同時に行う。

Fused lasso：隣接する回帰係数の差に L₁ 罰則を課す（時間的に滑らかな変化を表現）。

18 回帰診断法

残差プロット

縦軸に残差，横軸に予測値。誤差項の独立性・分散一定性の仮定が崩れていないか確認。

正規 Q-Q プロット：縦軸に標準化残差の経験分位点，横軸に標準正規分布の理論分位点。正規性が成り立てば傾き 1 の直線に沿う。

てこ比

予測値ベクトル $\hat{\mathbf{y}} = X(X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y}$ 。行列 $H = X(X^T X)^{-1} X^T$ の対角成分 h_{ii} 。

Cook の距離

i 番目のデータを除いたときの予測値の変化を用いる。 $\hat{y}_j, \hat{y}_{j(-i)}$ (i 番目を除いたときの予測値) として，

$$D_i = \frac{\sum_{j=1}^n (\hat{y}_j - \hat{y}_{j(-i)})^2}{(d+1)\hat{\sigma}^2}$$

19 質的回帰

一般化線形モデル

1 対 1 の関数 g (リンク関数) を用いて,

$$E[Y \mid X_1, \dots, X_k] = g^{-1}(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k)$$

すなわち

$$g(E[Y \mid X_1, \dots, X_k]) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k$$

Y の従う確率分布を誤差構造という。代表例: 正規分布 (恒等リンク, 線形回帰), 二項分布 (ロジットリンク, ロジスティック回帰), ポアソン分布 (対数リンク, ポアソン回帰)。

ロジスティック回帰モデル

$\beta^T \mathbf{x} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k$ として,

$$\pi_i = P(y_i = 1 \mid \mathbf{x}_i) = \frac{\exp(\beta^T \mathbf{x}_i)}{1 + \exp(\beta^T \mathbf{x}_i)}$$

これはロジット変換を用いて,

$$\log \frac{\pi_i}{1 - \pi_i} = \beta^T \mathbf{x}_i$$

とも表せる (左辺は対数オッズ)。 x_{ij} を 1 増やすと対数オッズは β_j 増加, オッズは $\exp(\beta_j)$ 倍。
ロジスティック変換 (ロジット変換の逆変換): $x \mapsto \exp(x)/(1 + \exp(x))$ 。

対数尤度関数

$$\ell(\beta) = \sum_{i=1}^n \left[y_i \log \pi_i + (1 - y_i) \log(1 - \pi_i) \right] = \sum_{i=1}^n \left[y_i \beta^T \mathbf{x}_i - \log(1 + \exp(\beta^T \mathbf{x}_i)) \right]$$

プロビット回帰モデル

標準正規分布の累積分布関数 Φ を用いて,

$$p_i = \Phi(\beta^T \mathbf{x}_i), \quad \text{すなわち} \quad \Phi^{-1}(p_i) = \beta^T \mathbf{x}_i$$

左辺の $p \mapsto \Phi^{-1}(p)$ をプロビット変換という。限界効果 (標準正規密度 φ):

$$\frac{\partial p_i}{\partial x_{ij}} = \varphi(\beta^T \mathbf{x}_i) \beta_j$$

ポアソン回帰モデル

平均 π とカウントデータについて,

$$\log \pi = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k, \quad \pi = \exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k)$$

x_i を 1 増やすと π は $\exp(\beta_i)$ 倍。

指数型分布族

$$f(y; \theta, \phi) = \exp \left\{ \frac{y\theta - b(\theta)}{a(\phi)} + c(y, \phi) \right\}$$

θ : 正準母数, ϕ : 散らばり母数。正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$ は $\theta = \mu$, $b(\theta) = \theta^2/2$, $a(\phi) = \sigma^2$, $\phi = \sigma^2$ の場合に対応。期待値・分散:

$$E[Y] = b'(\theta), \quad V[Y] = a(\phi) b''(\theta)$$

20 回帰分析その他

トービットモデル

潜在変数 $Y^* = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$ を考え, $Y^* \leq 0$ なら $Y = 0$, $Y^* > 0$ なら $Y = Y^*$. $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ 独立とすると, $y_i^* | x_i \sim N(\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2}, \sigma^2)$. $y_i > 0$ の観測に対する密度:

$$f(y_i | x_i) = \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{y_i - \beta^T x_i}{\sigma}\right)$$

$y_i = 0$ ($y_i^* \leq 0$) の確率:

$$P(y_i^* \leq 0) = \Phi\left(-\frac{\beta^T x_i}{\sigma}\right)$$

尤度関数:

$$L(\beta, \sigma) = \prod_{y_i > 0} \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{y_i - \beta^T x_i}{\sigma}\right) \prod_{y_i = 0} \Phi\left(-\frac{\beta^T x_i}{\sigma}\right)$$

生存時間

基準時点からイベント発生までの時間。

生存関数: $S(t) = P(T \geq t) = 1 - F(t)$, $S'(t) = -f(t)$ 。

ハザード関数:

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = -\frac{S'(t)}{S(t)}$$

累積ハザード関数:

$$H(t) = \int_0^t h(u) du = -\log S(t)$$

$$f(t) = h(t) S(t) = h(t) \exp(-H(t))$$

カプラン・マイヤー法

時点 t までのイベント発生時点を用いて, 生存率を

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right)$$

(d_i : 時点 t_i での発生数, n_i : 直前のリスク集合数) で推定し, 階段状にプロットしたものを**カプラン・マイヤー曲線**という。

Cox 比例ハザードモデル

共変量 $x_1, \dots, x_n$ として,

$$h(t | \mathbf{x}) = h_0(t) \exp(\beta^T \mathbf{x})$$

$h_0(t)$ は**基準ハザード** (分布形を仮定しない)。**比例ハザード性** (ハザード比が時間で不変) の確認が必要。

ニューラルネットワークモデル

入力 $x_1, \dots, x_d$, 重み $w_1, \dots, w_d$, バイアス b , 活性化関数 f として, 1 ユニットの出力は

$$f(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b) = f(b + w_1 x_1 + \dots + w_d x_d)$$

これを層状に並べたものがニューラルネットワークモデル。

21 分散分析と実験計画法

観測データに影響を与える可能性のあるもののうち実験で取り上げるものを因子, 因子がとりうる条件を水準, 複数因子の水準の組合せを処理という。

フィッシャーの3原則

①無作為化 (処理をランダムに割当), ②反復 (同じ処理を複数回), ③局所管理 (ブロック内で均一な条件)。①②のみ満たすものを完全無作為化法, ①～③すべて満たすものを乱塊法という。

1 元配置完全無作為化法

水準 $A_1, \dots, A_a$ の母平均 $\mu_1, \dots, \mu_a$, 効果 $\alpha_1, \dots, \alpha_a$ として,

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}, \quad \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2) \text{ 独立}$$

ただし $\sum_i n_i \alpha_i = 0$ ($n_1 + \dots + n_a = n$), $\mu = \frac{1}{n} \sum_i n_i \mu_i$ 。平方和の分解:

$$\underbrace{\sum_{i,j} (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2}_{S_T} = \underbrace{\sum_{i,j} (y_{ij} - \bar{y}_{i.})^2}_{S_E} + \underbrace{\sum_i n_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2}_{S_A}$$

要因	平方和	自由度	平均平方
水準間	S_A	$a - 1$	$S_A / (a - 1) =: \textcircled{1}$
誤差	S_E	$n - a$	$S_E / (n - a) =: \textcircled{2}$
全体	S_T	$n - 1$	

帰無仮説「すべての水準の母平均が等しい」を, $\textcircled{1} / \textcircled{2} \sim F(a - 1, n - a)$ を用いて検定。母平均の信頼度 95% 信頼区間:

$$\bar{y}_{i.} \pm t_{0.025}(n - a) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n_i}}$$

1 元配置乱塊法

ブロック効果 γ_j として,

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \gamma_j + \varepsilon_{ij}, \quad \sum_i \alpha_i = 0, \quad \sum_j \gamma_j = 0$$

平方和: $S_T = S_A + S_R + S_E$ 。因子の効果は $\frac{S_A / (a - 1)}{S_E / ((a - 1)(r - 1))} \sim F[a - 1, (a - 1)(r - 1)]$,

ブロックの効果は $\frac{S_R / (r - 1)}{S_E / ((a - 1)(r - 1))} \sim F[r - 1, (a - 1)(r - 1)]$ で検定。

2 元配置完全無作為化法

因子 A, B , 水準効果 α_i, β_j , 交互作用 $(\alpha\beta)_{ij}$ として,

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

ただし $\sum_i \alpha_i = 0, \sum_j \beta_j = 0, \sum_i (\alpha\beta)_{ij} = \sum_j (\alpha\beta)_{ij} = 0$ 。平方和: $S_T = S_A + S_B + S_{A \times B} + S_E$ 。

A の主効果: $\frac{S_A/(a-1)}{S_E/(ab(n-1))} \sim F[a-1, ab(n-1)]$, B の主効果, 交互作用も同様に検定。

2 元配置乱塊法

ブロック効果 γ_k を追加した構造モデル。平方和は $S_T = S_A + S_B + S_R + S_{A \times B} + S_E$ に分解。

直交表

一部の交互作用のみ取り上げて実験回数を減らす**一部実施要因計画**に用いる。例: $L_8(2^7)$ (2 水準, 7 列, 8 実験)。列の割り付けにより交互作用効果が他の主効果と区別できなくなることを**交絡**という。

22 標本調査法

調査単位と抽出単位が一致し, 各標本の抽出確率が等しい抽出法を**単純無作為抽出**という。以下, 非復元抽出を考える。

標本平均の期待値と分散

大きさ N の母集団 (母平均 μ , 母分散 σ^2) から大きさ n を非復元単純無作為抽出:

$$E[\bar{X}] = \mu, \quad V[\bar{X}] = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

$(N-n)/(N-1)$ を**有限修正項**という。 $V(\bar{X}) \leq c$ を解くと,

$$n \geq \frac{N\sigma^2}{(N-1)c + \sigma^2}$$

層化抽出法

基準を決めていくつかの層に分けた後, 各層から無作為抽出する方法。層内均質・層間異質に層化すると精度が上がる。

標本配分法

層の大きさ $N_1, \dots, N_k$ ($\sum N_j = N$), 標本の大きさ $n_1, \dots, n_k$ ($\sum n_j = n$)。

比例配分法

$$n_j = n \cdot \frac{N_j}{N}$$

(単純無作為抽出の場合の標本平均の分散を超えない。)

等配分法

$$n_j = \frac{n}{k}$$

ネイマン配分法

(分散最小) : j 番目の層の母標準偏差 σ_j として,

$$n_j = n \cdot \frac{N_j \sigma_j / \sqrt{(N_j - 1)}}{\sum_{l=1}^k N_l \sigma_l / \sqrt{(N_l - 1)}} \approx n \cdot \frac{N_j \sigma_j}{\sum_{l=1}^k N_l \sigma_l}$$

23 主成分分析

相関のある p 変数 $x_1, \dots, x_p$ を, 相関のない p 変数 $y_1, \dots, y_p$ ($V[y_1] \geq \dots \geq V[y_p]$) に再編成する手法。

標本分散共分散行列の固有値 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$, 対応するノルム 1 の固有ベクトル $\mathbf{w}_i = (w_{1i}, \dots, w_{pi})$ として, 第 i 主成分:

$$y_i = \mathbf{w}_i^T \mathbf{x} = w_{1i}x_1 + \dots + w_{pi}x_p$$

$V[y_i] = \lambda_i$, $\sum_i V[x_i] = \sum_i \lambda_i$ 。相関行列に対する主成分分析でも同様に定義し, $\sum_i \lambda_i = p$ 。

寄与率

$\lambda_i / \sum_j \lambda_j$ 。累積寄与率: 大きい方から合計。

主成分得点: 主成分軸上でのデータの値。

主成分負荷量 (分散共分散行列版, y_i と x_2 の相関係数):

$$r(y_i, x_2) = \frac{w_{2i} \sqrt{\lambda_i}}{\sqrt{V[x_2]}}$$

相関行列版では分母は 1。

自己符号化器

入力 $\mathbf{x}$ を低次元表現に符号化 $\mathbf{y} = f(W^T \mathbf{x} + \mathbf{b})$ し, 復号化器で $\hat{\mathbf{x}} = g(W'^T \mathbf{y} + \mathbf{b}')$ のように元の入力に近いデータを再構築するニューラルネットワーク。

24 判別分析

フィッシャーの線形判別分析

2 変数 (x_1, x_2) , $Y = w_1 x_1 + w_2 x_2 = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$ 。群間変動 $\mathbf{w}^T S_B \mathbf{w}$ を群内変動 $\mathbf{w}^T S_W \mathbf{w}$ でわった比を最大化:

$$S_B = (\bar{\mathbf{x}}^{(1)} - \bar{\mathbf{x}}^{(2)})(\bar{\mathbf{x}}^{(1)} - \bar{\mathbf{x}}^{(2)})^T$$

(S_W : 2 群のプールされた標本分散共分散行列)。解:

$$\mathbf{w} = S_W^{-1}(\bar{\mathbf{x}}^{(1)} - \bar{\mathbf{x}}^{(2)})$$

フィッシャーの線形判別関数:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \left(\mathbf{x} - \frac{\bar{\mathbf{x}}^{(1)} + \bar{\mathbf{x}}^{(2)}}{2} \right)$$

の符号で判別。

マハラノビス距離による判別

標本平均 $\bar{\mathbf{x}}$, 標本分散共分散行列 S として,

$$D^2(\mathbf{x}) = (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})^T S^{-1} (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})$$

2 群 $\bar{\mathbf{x}}^{(1)}, \bar{\mathbf{x}}^{(2)}$, プールされた S_W として,

$$f(\mathbf{x}) = (\bar{\mathbf{x}}^{(1)} - \bar{\mathbf{x}}^{(2)})^T S_W^{-1} \mathbf{x} - \frac{1}{2} (\bar{\mathbf{x}}^{(1)} - \bar{\mathbf{x}}^{(2)})^T S_W^{-1} (\bar{\mathbf{x}}^{(1)} + \bar{\mathbf{x}}^{(2)})$$

(フィッシャーの線形判別関数の -2 倍に等しく, 判別結果は一致)。

2 次判別分析

群 1, 2 の標本分散共分散行列 S_1, S_2 として,

$$Q(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2} \log \frac{|S_2|}{|S_1|} - \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}^{(1)})^T S_1^{-1} (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}^{(1)}) + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}^{(2)})^T S_2^{-1} (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}^{(2)})$$

の符号で判別。

ベイズ判別

ベイズの定理より,

$$\log \frac{P(G_1 | \mathbf{x})}{P(G_2 | \mathbf{x})} = \log \frac{P(\mathbf{x} | G_1)}{P(\mathbf{x} | G_2)} + \log \frac{P(G_1)}{P(G_2)}$$

$P(G_1) = P(G_2)$ かつ同一の分散共分散行列をもつ多変量正規分布を仮定すればマハラノビス距離による判別と一致。

正準判別分析

g 個の群を低次元へ射影。射影軸 $y = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$ の係数ベクトル $\mathbf{w}$ は, 群間変動対群内変動比の最大化を通して $S_W^{-1} S_B$ の最大固有値に対する固有ベクトルとして得られる。ここで,

$$S_B = \sum_{i=1}^g n_i (\bar{\mathbf{x}}^{(i)} - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}^{(i)} - \bar{\mathbf{x}})^T, \quad S_W = \sum_{i=1}^g (n_i - 1) S_i$$

ハードマージン SVM

$y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) \geq 1$ のもとで $\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2$ を最小化。解:

$$\mathbf{w} = \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i$$

サポートベクター $\mathbf{x}_+, \mathbf{x}_-$ を用い, マージンを最大化するように $\mathbf{w}, b$ を決める。

ソフトマージン SVM

スラック変数 $\xi_i \geq 0$, $y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) \geq 1 - \xi_i$ のもとで,

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + \lambda \sum_i \xi_i \rightarrow \min$$

混同行列と評価指標

$$\text{TPR (真陽性率・感度)} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{FPR (偽陽性率)} = \frac{FP}{FP + TN}$$

特異度 = $1 - \text{FPR}$ 。判別のしきい値を動かして横軸 FPR, 縦軸 TPR でプロットしたものが

ROC 曲線, その下側面積が AUC (AUC が 1 に近いほど判別器の性能が良い)。

25 クラスター分析

ユークリッド距離

$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_p), \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_p)$ に対し,

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{k=1}^p (x_k - y_k)^2}$$

階層的クラスタリング

距離の近いクラスターを順次融合。融合過程を表す図をデンドログラムという。クラスター間距離の定義:

- 最短距離法 (最近隣法): 2 クラスターから 1 個体ずつ選んだ距離のうち最小のもの。鎖効果を起こしやすい。
- 最長距離法 (最遠隣法): 距離のうち最大のもの。
- 群平均法: 2 クラスター間の全個体対の距離の平均。
- 重心法: クラスター内の重心どうしの距離。
- ウォード法: クラスター内データの重心からの距離の 2 乗和の増分が最小となるクラスターを合併。

K-means 法

1. クラスターの数を決める。
2. クラスター中心をランダムに決める。
3. 全データと各クラスター中心との距離を計算する。
4. 中心との距離が最も近いクラスターにデータを振り分ける。
5. クラスターの重心を計算して中心を更新する。
6. 3~5 をくり返し, クラスター間の移動がなくなったら終了。

26 因子分析・グラフィカルモデル

多数の観測変数間の構造を, それらに影響を与える少数の共通因子と変数ごとの独自因子で説明する分析。3 変数 x_1, x_2, x_3 (標準化済み), 2 共通因子 f_1, f_2 の 2 因子モデル:

$$x_1 = \beta_{11}f_1 + \beta_{12}f_2 + d_1, \quad x_2 = \beta_{21}f_1 + \beta_{22}f_2 + d_2, \quad x_3 = \beta_{31}f_1 + \beta_{32}f_2 + d_3$$

β_{ij} : 因子負荷量。 f_1, f_2, d_1, d_2, d_3 は互いに独立, $E[f_1] = E[f_2] = 0$, $V[f_1] = V[f_2] = 1$, $E[d_i] = 0$, $V[d_1] = \sigma_1^2$ として,

$$\beta_{11}^2 + \beta_{12}^2 + \sigma_1^2 = 1$$

$\beta_{11}^2 + \beta_{12}^2$ を共通性, σ_1^2 を独自性という。

寄与率

(f_1 の寄与率, 上の例):

$$\frac{\beta_{11}^2 + \beta_{21}^2 + \beta_{31}^2}{3}$$

因子軸の回転

直交回転の代表例がバリマックス回転, 斜交回転の代表例がプロマックス回転。

操作変数法

パス図に対応する構造方程式を, 例えば $Z = aX + bY + u$, $Y = cX + v$ とする。 $E[X] = E[Y] = E[Z] = 0$, $V[X] = V[Y] = V[Z] = 1$, u は X, Y と, v は X と無相関を仮定。構造方程式に操作変数をかけて期待値をとると,

$$Y = cX + v \Rightarrow E[XY] = cE[X^2] \Rightarrow c = r_{XY}$$

同様に, $Z = aX + bY + u$ から $r_{XZ} = a + bc$ 。 a は $X \rightarrow Z$ の直接効果, bc は $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ の間接効果, 両者の和が総合効果。

グラフィカルモデル

$(X_1, \dots, X_d)$ が d 変量正規分布のとき, 変数を頂点に, 条件付き独立性を辺の有無で表現。相関行列の逆行列の $(1, 2)$ 成分が 0 なら, X_1, X_2 は他の変数を与えたもとで条件付き独立 (辺なし)。

27 その他の多変量解析手法

多次元尺度構成法

n 次距離行列 D , n 次単位行列 I_n , 全成分 1 の n 次正方行列 J_n として,

1. $B = -\frac{1}{2} \left(I_n - \frac{1}{n} J_n \right) D^{(2)} \left(I_n - \frac{1}{n} J_n \right)$ ($D^{(2)}$ は D の各成分を 2 乗した行列) を計算。
2. B の固有値・互いに直交するノルム 1 の固有ベクトルを求める。正の固有値を並べた対角行列 Λ , 固有ベクトルを並べた U として, $B = U\Lambda U^T$ 。
3. $XX^T = B$ を満たす $X = U\Lambda^{1/2}$ をとる (d 次元座標には固有値・固有ベクトルを d 個ずつ使う)。

正準相関分析

$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_p)^T$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_q)^T$ について,

$$u = \mathbf{a}^T \mathbf{x}, \quad v = \mathbf{b}^T \mathbf{y}$$

の相関係数が最大になるよう $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ を決める。行列の固有値問題に帰着し, 最大固有値に対する固有ベクトルから第 1 正準変数 u_1, v_1 , 2 番目の固有値から第 2 正準変数 u_2, v_2 (u_1, v_1 と無相関) が得られる。

数量化法

質的データを数量化して多変量解析する手法 (数量化 I~III 類)。I 類・II 類は説明変数と目的変数 (外的基準) に二分, III 類は変数どうし対等 (主成分分析の名義尺度版, 外的基準なし)。

28 時系列解析

確率変数 Y_t ($t = 1, 2, \dots$)。

弱定常過程（共分散定常過程）

平均・分散が一定， h 次自己共分散 $\text{Cov}[Y_t, Y_{t-h}] = \gamma_h$ が時点によらない。 $V[Y_t] = \gamma_0$ ， h 次自己相関係数 γ_h/γ_0 。

ホワイトノイズ

平均 0，分散一定，0 でないラグの自己共分散がすべて 0。 U_t ：分散 σ^2 のホワイトノイズ。

p 次自己回帰過程 AR(p)

$$Y_t = c + \varphi_1 Y_{t-1} + \cdots + \varphi_p Y_{t-p} + U_t$$

AR(1) ($Y_t = c + \varphi_1 Y_{t-1} + U_t$, $|\varphi_1| < 1$ で弱定常)：

$$E[Y_t] = \frac{c}{1 - \varphi_1}, \quad V[Y_t] = \frac{\sigma^2}{1 - \varphi_1^2}, \quad \gamma_h = \varphi_1^{|h|} \frac{\sigma^2}{1 - \varphi_1^2}, \quad \rho_h = \varphi_1^{|h|}$$

q 次移動平均過程 MA(q)

$$Y_t = c + U_t + \theta_1 U_{t-1} + \cdots + \theta_q U_{t-q}$$

常に弱定常。MA(1) ($Y_t = c + U_t + \theta_1 U_{t-1}$)：

$$E[Y_t] = c, \quad V[Y_t] = (1 + \theta_1^2)\sigma^2, \quad \gamma_1 = \theta_1\sigma^2, \quad \rho_1 = \frac{\theta_1}{1 + \theta_1^2}, \quad \gamma_h = \rho_h = 0 \quad (h \geq 2)$$

(p, q) 次自己回帰移動平均過程 ARMA(p, q)

$$Y_t = c + \varphi_1 Y_{t-1} + \cdots + \varphi_p Y_{t-p} + U_t + \theta_1 U_{t-1} + \cdots + \theta_q U_{t-q}$$

$p = 0$ で MA 過程， $q = 0$ で AR 過程， $p = q = 0$ でホワイトノイズ。AR 部分が弱定常であることは，特性方程式

$$1 - \varphi_1 z - \varphi_2 z^2 - \cdots - \varphi_p z^p = 0$$

のすべての解の絶対値が 1 より大きいことと同値。

$(p, 1, q)$ 次自己回帰和分移動平均過程 ARIMA($p, 1, q$)

$\{Y_t\}$ は弱定常ではないが，差分系列 $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ が弱定常かつ反転可能な ARMA 過程。反転可能：MA 部分が AR 部分に書き直せること，

$$1 + \theta_1 z + \theta_2 z^2 + \cdots + \theta_q z^q = 0$$

のすべての解の絶対値が 1 より大きいことと同値。

ディッキーマー・フラー検定

AR(1) モデル $Y_t = \varphi Y_{t-1} + U_t$ について，帰無仮説 $\varphi = 1$ ，対立仮説 $|\varphi| < 1$ 。

状態空間モデル

状態方程式（時点 $t-1$ の状態＋誤差）と観測方程式（時点 t の状態＋観測誤差）を組み合わせたモデル。

ACF と PACF

h 次自己相関係数 γ_h/γ_0 を h の関数と見たものが**自己相関関数 (ACF)**。 Y_t, Y_{t-h} 間の相関から間の $Y_{t-1}, \dots, Y_{t-h+1}$ の影響を除いたものが偏自己相関係数で、これを h の関数と見たものが**偏自己相関関数 (PACF)**。

モデル	ACF	PACF
AR(p)	減衰	p 次で打ち切り
MA(q)	q 次で打ち切り	減衰
ARMA(p, q)	減衰	減衰

標本 ACF のグラフを**コレログラム**という。

ダービン・ワトソン検定

誤差項 u_t に AR(1) モデル $u_t = \rho u_{t-1} + U_t$ を仮定，帰無仮説 $\rho = 0$ 。最小 2 乗法の残差 e_t を用いて，

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2} \approx 2(1 - \hat{\rho})$$

DW が 2 に近ければ帰無仮説を支持，0 や 4 に近ければ棄却。

スペクトル密度関数

AR(1) モデル $Y_t = c + \varphi Y_{t-1} + U_t$ ($-1 < \varphi < 1$) :

$$f(\lambda) = \frac{\sigma^2}{2\pi} \cdot \frac{1}{1 - 2\varphi \cos \lambda + \varphi^2}$$

MA(1) モデル $Y_t = c + U_t + \theta U_{t-1}$:

$$f(\lambda) = \frac{\sigma^2}{2\pi} (1 + 2\theta \cos \lambda + \theta^2)$$

標本から求めた推定値を**ペリオドグラム**という。

29 分割表

$a \times b$ 分割表。変数を**因子**，カテゴリーを**水準**という。

相対リスク

発症率の比。喫煙群 0.15，非喫煙群 0.03 なら相対リスク = $0.15/0.03 = 5$ 。

前向き研究／後向き研究，コホート研究／ケースコントロール研究。

オッズ

$\frac{\text{成功確率}}{\text{失敗確率}}$ 。回復確率 0.8 なら，オッズ = $0.8/0.2 = 4$ 。

オッズ比：オッズの比。

標本オッズ・標本オッズ比

2×2 分割表の度数を a, b, c, d (行 1: a, b , 行 2: c, d) とすると，

$$\text{標本オッズ比} = \frac{a/b}{c/d} = \frac{ad}{bc}$$

標本オッズ比の対数の標準誤差（漸近近似）：

$$\text{se}(\log(\text{OR})) = \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}$$

フィッシャーの正確検定

2 元分割表の独立性を，超幾何分布による P 値の直接計算で検定する。行和・列和を固定した上で，観測結果以上に極端な結果となる確率を超幾何分布の確率関数の和として求める。

独立性の検定

$a \times b$ 分割表，全体度数 n ， (i, j) セルの度数 n_{ij} ，行和 $n_{i.}$ ，列和 $n_{.j}$ として，

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \frac{\left(n_{ij} - \frac{n_{i.}n_{.j}}{n}\right)^2}{\frac{n_{i.}n_{.j}}{n}} \rightarrow_d \chi^2((a-1)(b-1))$$

特に 2×2 分割表（度数 a, b, c, d ， $n = a + b + c + d$ ）：

$$\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

イエーツの補正を施した統計量：

$$\chi_{Yates}^2 = \frac{n(|ad - bc| - n/2)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

クラメールの連関係数

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(k-1)}}$$

(k ：分割表の行数・列数のうち大きくない方)。 $0 \leq V \leq 1$ 。

逸脱度

フルモデルの尤度と一部のパラメータを 0 とおいたモデルの尤度の比を λ ，観測度数 x_{ij} ，モデルのもとでの期待度数 m_{ij} として，

$$-2 \log \lambda = 2 \sum_{i,j} x_{ij} \log \frac{x_{ij}}{m_{ij}} \rightarrow_d \chi^2$$

(自由度＝帰無仮説と対立仮説の自由パラメータ数の差)

対数線形モデル

3 元分割表のフルモデルは，同時確率 p_{ijk} について，

$$\log p_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\alpha\beta\gamma)_{ijk}$$

交互作用項がある場合，それに含まれる低次の交互作用項と主効果項をすべて含むものを階層的対数線形モデル，主効果項から高次交互作用項をたどって見つかる極大項の集合を生成集合という。

無向独立グラフ

因子を頂点, 2 因子交互作用を含む頂点間に辺をひいたグラフ。

グラフィカルモデル: 無向独立グラフのクリークが生成集合となる階層的対数線形モデル。

分解可能モデル: 対応する無向独立グラフが長さ 4 以上の弦のない閉路を持たないグラフィカルモデル。

30 不完全データの統計処理

打ち切り

ある値以上 (または以下) であることはわかるが, その値自体は得られないタイプの欠測。

トランケーション: 特定の幅の値しか観測できず, この幅に入っていないデータの個数もわからないタイプの欠測。

欠測メカニズム

- **MCAR** (Missing Completely At Random): 欠測が観測データにも欠測データにも依存しない。
- **MAR** (Missing At Random): 欠測が観測データには依存するが, 欠測している値自体には依存しない。
- **MNAR** (Missing Not At Random): 欠測が欠測している値自体に依存する。

CC(complete case) 解析

欠測が生じた個体を除いた解析。サンプルサイズ減少により精度・検出力が下がり, MCAR 以外ではバイアスが生じる。

単一値代入法

平均値代入, 回帰代入, 確率的回帰代入, ホットデック法などがある。

多重代入法

複数組の擬似的な完全データを作成し, 独立に推定値を計算して統合する。不確実性を作り出し, 単一代入法での誤差の過小評価を補正する。

1 変量正規分布における推測

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 標準正規密度 φ , 累積分布関数 Φ , $a = (c - \mu)/\sigma$ として, $X \geq c$ のもとでの条件付き期待値:

$$E[X \mid X \geq c] = \mu + \sigma \cdot \frac{\varphi(a)}{1 - \Phi(a)}$$

打ち切りの場合 (c 以上が観測されない, σ^2 既知, サンプルサイズ n , 観測データサイズ $m < n$) の母平均 μ の最尤推定手順:

1. $\mu^{(0)}$ を観測サイズ m のデータの平均とする。
2. $a^{(t)} = (c - \mu^{(t)})/\sigma$ を計算する。
3. $\mu^{(t+1)} = \frac{1}{n} \left[m\bar{x}_{\text{obs}} + (n - m) \left(\mu^{(t)} + \sigma \frac{\varphi(a^{(t)})}{1 - \Phi(a^{(t)})} \right) \right]$ を計算する。
4. 収束するまで 2,3 を繰り返す。

トランケーションの場合 (c 以上のデータのみ観測, $m = n$) :

$$\mu^{(t+1)} = \bar{x}_{\text{obs}} - \sigma \frac{\varphi(a^{(t)})}{1 - \Phi(a^{(t)})}$$

2 変量正規分布における推測 (MAR, Y のみ欠測)

観測データ $(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m), x_{m+1}, \dots, x_n$ ($m < n$)。

1. サイズ n のデータから $\hat{\mu}_X = \bar{x}$ (全 n 個), $\hat{\sigma}_X^2$ の最尤推定値を計算。
2. サイズ m のデータから $\bar{x}_{(m)}, S_X^2, \bar{y}, S_Y^2, S_{XY}$ を計算。
3. X を与えたもとの Y の条件付き分布 $N(\alpha + \beta x, \tau^2)$ の α, β, τ^2 を, 最小 2 乗法の要領で計算 :

$$\beta = \frac{S_{XY}}{S_X^2}, \quad \alpha = \bar{y} - \beta \bar{x}_{(m)}, \quad \tau^2 = S_Y^2 - \beta S_{XY}$$

4. $\mu_Y = \alpha + \beta \hat{\mu}_X$, $\sigma_Y^2 = \tau^2 + \beta^2 \hat{\sigma}_X^2$, $\sigma_{XY} = \beta \hat{\sigma}_X^2$ の最尤推定値を計算。

MCAR の場合は観測されている $(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)$ のみを用いればよい。

31 モデル選択

AIC (赤池情報量規準)

$$\text{AIC} = -2 \times (\text{最大対数尤度}) + 2 \times (\text{推定パラメータ数})$$

BIC (ベイズ情報量規準)

$$\text{BIC} = -2 \times (\text{最大対数尤度}) + \log(n) \times (\text{推定パラメータ数})$$

どちらも数値が小さいモデルを最適とする。

説明変数 p 個の重回帰モデル (誤差項独立同一正規分布, サンプルサイズ n , 誤差分散の最尤推定量 $\hat{\sigma}^2$, 推定パラメータ数 $= p + 2$) :

$$\text{AIC} = n \log(2\pi\hat{\sigma}^2) + n + 2(p + 2), \quad \text{BIC} = n \log(2\pi\hat{\sigma}^2) + n + \log(n)(p + 2)$$

通常 $\log(n) > 2$ なので, BIC の方が AIC よりパラメータ数への罰則が強く, パラメータ数の少ないモデルを選ぶ傾向がある。BIC にはモデル選択の一致性があり, 真のモデルが候補にあれば $n \rightarrow \infty$ で真のモデルを選ぶ確率が 1 に収束する。

交差検証法 (クロスバリデーション)

データを訓練用・テスト用に分け, 訓練用で推定, テスト用で予測誤差を検証することを繰り返し, 予測誤差最小のモデルを選ぶ。

Leave-one-out 法

1. i 番目のデータを除いた $n - 1$ 個を訓練用としてモデルを推定する。
2. 推定モデルで i 番目のデータへの予測誤差を求める。
3. すべての i についての予測誤差の平均でモデルを評価する。

k 分割交差検証法

データを k グループに分割し, 1 グループをテスト用, 残り $k - 1$ グループを訓練用として予測誤差を k 回求める。 $k = n$ が Leave-one-out 法。

32 ベイズ法

パラメータ自体が確率分布に従うと仮定し、データを得る前の**事前分布**をデータの情報を反映した**事後分布**に更新する。

共役事前分布

事前分布と事後分布が同じタイプになる事前分布。

標本分布	事前分布	事後分布
$Y \mid \theta \sim \text{Bin}(n, \theta)$	$\theta \sim \text{Be}(a, b)$	$\theta \mid y \sim \text{Be}(a + y, b + n - y)$
$Y_i \mid \theta \sim \text{Po}(\theta)$	$\theta \sim \text{Ga}(a, 1/b)$	$\theta \mid \mathbf{y} \sim \text{Ga}\left(a + \sum y_i, \frac{1}{b + n}\right)$
$Y_i \mid \theta \sim N(\theta, \sigma^2)$	$\theta \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$	$\theta \mid \mathbf{y} \sim N\left(\frac{\sigma^2 \mu_0 + n \sigma_0^2 \bar{y}}{\sigma^2 + n \sigma_0^2}, \frac{\sigma^2 \sigma_0^2}{\sigma^2 + n \sigma_0^2}\right)$

ベータ二項モデル

n 回中 y 回成功のとき、事後分布は $\text{Be}(a + y, b + n - y)$ 。

ガンマポアソンモデル：事後分布は $\text{Ga}(a + \sum y_i, 1/(b + n))$ 。

正規-正規モデル：事後分布は上表の通り。

ベイズ推定量

事後分布の期待値。 $\text{Ga}(a, b)$ の期待値 $= ab$, $\text{Be}(a, b)$ の期待値 $= a/(a + b)$ 。

MAP 推定量：事後分布のモード。 $\text{Ga}(a, b)$ ($a > 1$) のモード $= (a - 1)b$, $\text{Be}(a, b)$ ($a, b > 1$) のモード $= (a - 1)/(a + b - 2)$ 。

ベイズ予測分布：事後分布を用いて新たなデータを予測する確率分布。

$100(1 - \alpha)\%$ **信用区間**：事後分布の積分値が $1 - \alpha$ になる区間。**95% 最大事後密度 (HPD) 区間**：事後密度の高い方から積分値 0.95 になるように区間 $[L(\mathbf{x}), U(\mathbf{x})]$ をとったもの。

MCMC 法

事後分布 $\pi(\boldsymbol{\theta} \mid \mathbf{x})$ からの多数の独立なサンプルを近似的に得る手法。

メトロポリス法

1. 初期値 $\boldsymbol{\theta}^{(0)}$ を決め、 $t = 0$ として 2 へ。
2. $\boldsymbol{\theta}' = \boldsymbol{\theta}^{(t)} + \mathbf{u}$ ($\mathbf{u}$ は成分独立に対称分布) を発生させる。
3. $v \sim U(0, 1)$ を発生させ、

$$r = \frac{\pi(\boldsymbol{\theta}' \mid \mathbf{x})}{\pi(\boldsymbol{\theta}^{(t)} \mid \mathbf{x})}$$

を計算。 $r \geq 1$ なら $\boldsymbol{\theta}^{(t+1)} = \boldsymbol{\theta}'$ 。 $r < 1$ のとき $r \geq v$ なら $\boldsymbol{\theta}^{(t+1)} = \boldsymbol{\theta}'$, $r < v$ なら $\boldsymbol{\theta}^{(t+1)} = \boldsymbol{\theta}^{(t)}$ 。

4. $t \rightarrow t + 1$ として、十分なサンプルが得られるまで 2,3 を繰り返す。

メトロポリス・ヘイスティングス法

手順 2 で $\boldsymbol{\theta}'$ を非対称な提案分布 $q(\boldsymbol{\theta} \mid \boldsymbol{\theta}^{(t)})$ から発生させ、手順 3 を、

$$r = \frac{\pi(\boldsymbol{\theta}' \mid \mathbf{x}) q(\boldsymbol{\theta}^{(t)} \mid \boldsymbol{\theta}')}{\pi(\boldsymbol{\theta}^{(t)} \mid \mathbf{x}) q(\boldsymbol{\theta}' \mid \boldsymbol{\theta}^{(t)})}$$

に置き換えたもの。

ギブスサンプリング

(2 変量の場合, 条件付き分布 $f(x | y), f(y | x)$ から抽出可能とする):

1. 初期値 $(x^{(0)}, y^{(0)})$ を決める。
2. $(x^{(j)}, y^{(j)})$ から $y^{(j+1)} \sim f(y | x^{(j)})$ を得る。
3. $y^{(j+1)}$ から $x^{(j+1)} \sim f(x | y^{(j+1)})$ を得る。
4. 2,3 をくり返す。

33 シミュレーション

擬似乱数

一定の条件下で再現できてしまう, 計算機生成の乱数。

逆関数法

$U \sim U(0, 1)$, X の累積分布関数 F_X として,

$$X = F_X^{-1}(U)$$

とすれば X の分布に従う乱数が得られる。

採択・棄却法

目標密度 $f(x)$, 扱いやすい密度 $g(x)$, 定数 R について, すべての x で $f(x) \leq Rg(x)$ が成り立つとき:

1. $y \sim g(x)$, $u \sim U(0, 1)$ を独立に発生。
2. $u \leq \frac{f(y)}{Rg(y)}$ が成り立てば y を出力し, そうでなければ 1 に戻る。

R をできるだけ小さくすると効率が上がる。

モンテカルロ法

(面積推定): 正方形 $(0, 1) \times (0, 1)$ 内の図形 A の面積 S を, 一様乱数 (u, v) を n 組発生させ, A 内に入った個数 X から $S \approx X/n$ と推定する ($X \sim \text{Bin}(n, S)$, $V[X] = nS(1 - S)$)。

モンテカルロ積分

$X \sim U(0, 1)$ のとき,

$$E[g(X)] = \int_0^1 g(x) dx$$

$X \sim U(a, b)$ のとき,

$$\int_a^b g(x) dx = (b - a)E[g(X)]$$

より一般に $X_1, \dots, X_n \sim f(x)$ ($[a, b]$ 上の密度) から,

$$\int_a^b g(x)f(x) dx \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i) =: \hat{\theta}$$

$\sigma^2 = V[g(X)]$ として,

$$V[\hat{\theta}] = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (g(X_i) - \hat{\theta})^2, \quad \text{se}(\hat{\theta}) = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$$

主部の分離

積分 $I = \int_a^b f(x) dx$ に対し,

1. $f(x)$ を近似する積分しやすい関数 $h(x)$ を決める (テーラー展開など)。
2. $g(x) = f(x) - h(x) + \mu$, $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b h(x) dx$ とおく。
3. $X_1, \dots, X_n \sim U(a, b)$ として, $\hat{I} = (b-a) \cdot \frac{1}{n} \sum_i g(X_i)$ 。

負の相関の利用

1. $g(x) = \frac{f(x) + f(a+b-x)}{2}$ とおく。
2. $X_1, \dots, X_m \sim U(a, b)$ として, $\hat{I} = (b-a) \cdot \frac{1}{m} \sum_i g(X_i)$ 。

経験分布関数

分布関数 $F(x)$ からの無作為標本 $X_1, \dots, X_n$ に対し,

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \#\{i : X_i \leq x\}$$

$F_n(x)$ は $F(x)$ に確率収束する。

ジャックナイフ法

パラメータ θ の推定量 $\hat{\theta}$ 。 X_j を除いたサイズ $n-1$ の標本による推定量 $\hat{\theta}_{(j)}$,

$$\overline{\hat{\theta}_{(\cdot)}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \hat{\theta}_{(j)}$$

標準誤差のジャックナイフ推定量:

$$\widehat{\text{se}}_{\text{jack}}(\hat{\theta}) = \sqrt{\frac{n-1}{n} \sum_{j=1}^n (\hat{\theta}_{(j)} - \overline{\hat{\theta}_{(\cdot)}})^2}$$

ブートストラップ法

独立同一分布 F に従う $X_1, \dots, X_n$ の実現値 $x_1, \dots, x_n$ から復元抽出でサイズ n の標本 $\mathbf{x}^{*(b)}$ を B 回作り,

$$\hat{\theta}^{*(1)}, \dots, \hat{\theta}^{*(B)}, \quad \bar{\hat{\theta}}^* = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat{\theta}^{*(b)}$$

バイアスと分散の推定:

$$\widehat{\text{Bias}}(\hat{\theta}) = \bar{\hat{\theta}}^* - \hat{\theta}, \quad \widehat{V}(\hat{\theta}) = \frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B (\hat{\theta}^{*(b)} - \bar{\hat{\theta}}^*)^2$$