ROADMAP PROBLEM : 19



Complete hydrolysis

(A) + (B) + (C)

(A) → Borane → (D)

(D) + $Et-O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-Et$ (1 eq.) → (E)

(E) +  (1 eq.) → (F)

(F) Number of chiral center in 'F'

(B) → Soda-lime / Δ → (G)

(G) → (i) $NaNO_2$ + HCl (ii) PCl_5 (iii) L.A.H. → (H)

(H) → HNO_3 / H^+ → (I) [O–substituted]

(I) → N.B.S. → (J)

(J) → alc.KOH / Δ → (Q)

(Q) → HBr, Peroxide → (R) → $(Me)_2CuLi$ → (S) → (i) $KMnO_4$ / OH^- (ii) H^+ → (T)

(T) → NH_3 / Δ → (U) → NaOBr → (V)

(J) → aq. KOH → (K)

(K) → CrO_3, Acetone → (L)

(L) → mcpba → (M)

(M) → Fe + NH_4Cl, 60°C → (N)

(N) → PH = 9 → (O)

(O) → Br_2 + H_2O → (P)

(Q) → H.B.O. → (W)

(W) → Fe + NH_4Cl → (X)

(X) → CrO_3 + Acetone → (Y)

(Y) → 4 < PH < 6 → (Z)

In which A and B are naturally occuring amino-acid and amino acid "B" has one chiral center

In Baeyer Villiger oxidation we assume following migrating aptitude



Rankers Academy JEE

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024