

**INTEGRALI ZADACI ( VII – DEO)**  
**Integracija nekih trigonometrijskih funkcija**

Daćemo vam savete za četiri tipa integrala trigonometrijskih funkcija.

**A) Integrali tipa  $\int R(\sin x, \cos x) dx$**

To su integrali u kojima  $\sin x$  i  $\cos x$  nemaju stepene. **Uvodimo smenu:**

$$\boxed{\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t}$$

Iz smene ćemo upotrebom formula iz trigonometrije dobiti:

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{\sin x}{1} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{\cancel{\cos^2 \frac{x}{2}} \left( 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \right)}{\cancel{\cos^2 \frac{x}{2}} \left( \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} + 1 \right)} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 1} = \frac{2t}{t^2 + 1} = \frac{2t}{1 + t^2} \\ \cos x &= \frac{\cos x}{1} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{\cancel{\cos^2 \frac{x}{2}} \left( 1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} \right)}{\cancel{\cos^2 \frac{x}{2}} \left( \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} + 1 \right)} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}\end{aligned}$$

Kako je  $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$  onda je  $\frac{x}{2} = \arctgt \rightarrow x = 2 \arctgt \rightarrow dx = \frac{2}{1 + t^2} dt$

Da rezimiramo:

Kad uzimamo smenu  $\boxed{\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t}$  menjamo:

$$\boxed{\begin{aligned}\sin x &= \frac{2t}{1 + t^2} \\ \cos x &= \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \\ dx &= \frac{2}{1 + t^2} dt\end{aligned}}$$

Smena  $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$  je *univerzalna trigonometrijska smena* i može se uvek upotrebljavati, al je lakše, zavisno od izgleda podintegralne funkcije koristiti i sledeću smenu:

**B) Integrali tipa**  $\int R(\operatorname{tg} x) dx$  i  $\int R(\sin^2 x, \cos^2 x, \sin x \cdot \cos x) dx$

To su integrali koji mogu da se sredjivanjem svedu sve na  $\operatorname{tg} x$  ili kod kojih se javljaju stepeni kod sinusa i kosinusa i proizvod  $\sin x \cdot \cos x$ .

**Uvodimo smenu:**  $\boxed{\operatorname{tg} x = t}$

Iz smene ćemo upotrebom formula iz trigonometrije dobiti:

$$\sin^2 x = \frac{\sin^2 x}{1} = \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = \text{svuda dodamo } \cos^2 x = \frac{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}}{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{\operatorname{tg}^2 x + 1} = \frac{t^2}{1 + t^2}$$

$$\cos^2 x = \frac{\cos^2 x}{1} = \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = \text{svuda dodamo } \sin^2 x = \frac{\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}}{\frac{\sin^2 x}{\sin^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}} = \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x + 1} = \frac{1}{1 + t^2}$$

$$\sin x \cdot \cos x = \frac{\sin x \cdot \cancel{\cos x}}{1} = \frac{\sin x \cdot \cos x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = \frac{\frac{\sin x \cdot \cancel{\cos x}}{\cos^2 x}}{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg}^2 x + 1} = \frac{t}{1 + t^2}$$

$$\operatorname{tg} x = t \rightarrow x = \arctgt \rightarrow dx = \frac{dt}{1 + t^2}$$

Da rezimiramo:

Kad uzimamo smenu  $\boxed{\operatorname{tg} x = t}$  menjamo:

$$\boxed{\begin{aligned} \sin^2 x &= \frac{t^2}{1 + t^2} \\ \cos^2 x &= \frac{1}{1 + t^2} \\ \sin x \cdot \cos x &= \frac{t}{1 + t^2} \\ dx &= \frac{dt}{1 + t^2} \end{aligned}}$$

### C) Integrali tipa $\int \sin^m x \cdot \cos^n x dx$

**Razlikovaćemo dve situacije:**

i) Ako su  $m$  i  $n$  celi brojevi

ii) Ako su  $m$  i  $n$  racionalni brojevi

U obe situacije uvodimo smenu  $\boxed{\sin x = u}$  ili  $\cos x = u$  ali se u situaciji i) kad su  $m$  i  $n$  **celi brojevi** integral svedu na integraciju racionalne funkcije, a u situaciji ii) kad su  $m$  i  $n$  **racionalni brojevi** svedu na integral diferencijalnog binoma.

### D) Integrali tipa $\int \sin ax \cos bxdx; \int \sin ax \sin bxdx; \int \cos ax \cos bxdx;$

**Najpre iskoristimo trigonometrijske formule:**

$$\sin ax \sin bx = \frac{1}{2} [\cos(a-b)x - \cos(a+b)x]$$

$$\sin ax \cos bx = \frac{1}{2} [\sin(a+b)x + \sin(a-b)x]$$

$$\cos ax \cos bx = \frac{1}{2} [\cos(a+b)x + \cos(a-b)x]$$

A zatim ih rastavimo na dva integrala od kojih svaki rešavamo lakom smenom.

### NEKI TRIKOVI:

Ako je u integralu izraz  $\sqrt{a^2 - x^2}$ , onda je zgodno uzeti smenu  $x = a \sin t$  jer tako uništavamo koren

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - (a \sin t)^2} = \sqrt{a^2 - a^2 (\sin t)^2} = a \sqrt{1 - \sin^2 t} = a \cos t$$

Ako je u integralu dat izraz  $\sqrt{x^2 + a^2}$ , onda je zgodno uzeti smenu  $x = a \tan t$  jer tako uništavamo koren

$$\sqrt{x^2 + a^2} = \sqrt{(a \tan t)^2 + a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 t + a^2} = a \sqrt{\tan^2 t + 1} = a \sqrt{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} + 1} = a \sqrt{\frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\cos^2 t}} = a \sqrt{\frac{1}{\cos^2 t}} = a \frac{1}{\cos t}$$

## PRIMERI

primer 1.  $\int \frac{dx}{\sin x} = ?$

Ovaj integral smo već rešavali u fajlu **Integrali zadaci I- deo** bez trigonometrijskih smena. Videćemo da je mnogo

*elegantnije* iskoristiti smenu  $\boxed{\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t}$ . Dakle:

$$\begin{aligned} \sin x &= \frac{2t}{1+t^2} \\ dx &= \frac{2}{1+t^2} dt \end{aligned}$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} dt = \int \frac{1}{t} dt = \ln|t| + C = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C$$

primer 2.  $\int \frac{2 - \sin x}{2 + \cos x} dx = ?$

I ovde ćemo koristiti smenu  $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$  jer  $\sin x$  i  $\cos x$  nemaju stepene.

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$$

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

Imamo gotove smene:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

koje menjamo u integralu:

$$\int \frac{2 - \sin x}{2 + \cos x} dx = \int \frac{2 - \frac{2t}{1+t^2}}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = \int \frac{\frac{2+2t^2-2t}{1+t^2}}{\frac{2+2t^2+1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{\cancel{1+t^2}} dt = 4 \int \frac{t^2 - t + 1}{(t^2 + 3)(1+t^2)} dt$$

Ovo je integral racionalne funkcije. Izvlačimo *na stranu* i radimo:

Pazite: oba izraza u imeniocu su nerazloživa...

$$\frac{t^2 - t + 1}{(t^2 + 3)(1 + t^2)} = \frac{At + B}{t^2 + 3} + \frac{Ct + D}{1 + t^2} \dots\dots\dots / \cdot (t^2 + 3)(1 + t^2)$$

$$t^2 - t + 1 = At + At^3 + B + Bt^2 + Ct^3 + 3Ct + Dt^2 + 3D$$

Neko piše i identički jednako umesto jednako... U suštini je po nama sve jedno al vi radite kako kaže vaš profesor...

$$t^2 - t + 1 \equiv (A + C)t^3 + (B + D)t^2 + (A + 3C)t + B + 3D$$

Upoređujemo :

$$A + C = 0, B + D = 1, A + 3C = -1 \text{ i } B + 3D = 1$$

Rešimo ovo sistemče ( ukombinujemo 1. i 3. jednačinu, a 2. i 4.) i dobijamo:

$$A = 1/2, B = 1, C = -1/2, D = 0$$

Vratimo se da vidimo kako će da ide razlaganje:

$$4 \int \frac{t^2 - t + 1}{(t^2 + 3)(1 + t^2)} dt = 4 \int \frac{\frac{1}{2}t + 1}{t^2 + 3} dt + 4 \int \frac{\frac{-1}{2}t}{1 + t^2} dt = 2 \int \frac{t + 2}{t^2 + 3} dt - 2 \int \frac{t}{1 + t^2} dt$$

Rešavanje ovih integrala smo detaljno objasnili u prethodnim fajlovima...

$$= \ln \frac{t^2 + 3}{1 + t^2} + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{3}} + C = \boxed{\ln \frac{3 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\sqrt{3}} + C}$$

primer 3.  $I = \int \frac{dx}{(2 + \cos x) \sin x} = ?$

Često se integral u radu obeležava nekim slovom , najčešće sa  $I, J \dots$

Razlog je da ga ne bi posle vazdan prepisivali, već samo upišemo  $I, J \dots$

I ovaj integral ćemo rešiti prvom , univerzalnom smenom  $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ .

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$$

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos t = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

pa je 
$$I = \int \frac{\cancel{1+t^2}}{\left(2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \cdot \cancel{1+t^2}} dt = \int \frac{dt}{\frac{2+2t^2+1-t^2}{1+t^2} \cdot t} = \int \frac{1+t^2}{(t^2+3)t} dt$$

Integracija racionalne funkcije, izdvojimo podintegralnu funkciju:

$$\frac{1+t^2}{(t^2+3)t} = \frac{A}{t} + \frac{Bt+C}{t^2+3} = \frac{At^2+3A+Bt^2+Ct}{t(t^2+3)}$$

$$1+t^2 = A(t^2+3) + (Bt+C)t$$

$$1+t^2 = At^2 + 3A + Bt^2 + Ct$$

$$1+t^2 = t^2(A+B) + Ct + 3A$$

$$A+B=1, \quad C=0, \quad 3A=1$$

$$A=1/3, \quad B=2/3, \quad C=0$$

$$I = \frac{1}{3} \int \frac{dt}{t} + \frac{2}{3} \int \frac{t}{t^2+3} dt = \text{za drugi integral smena} \left| \begin{array}{l} t^2+3=u \\ tdt = \frac{1}{2} du \end{array} \right| = \frac{1}{3} \ln|t| + \frac{1}{3} \int \frac{du}{u} + c$$

$$I = \frac{1}{3} \ln|t| + \frac{1}{3} \ln(t^2+3) + C = \boxed{\frac{1}{3} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \frac{1}{3} \ln \left( \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 3 \right) + C}$$

primer 4.

$$I = \int \frac{\sin x \cos x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx = ?$$

Kako ovde imamo stepene sinusa i kosinusa, uzećemo drugu smenu  $\boxed{tgx = t}$  pa je:

$$\begin{aligned}\sin^2 x &= \frac{t^2}{1+t^2} \\ \cos^2 x &= \frac{1}{1+t^2} \\ \sin x \cdot \cos x &= \frac{t}{1+t^2} \\ dx &= \frac{dt}{1+t^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{\sin x \cos x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx = \int \frac{\frac{t}{1+t^2}}{\left(\frac{t^2}{1+t^2}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+t^2}\right)^2} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int \frac{\frac{t}{\cancel{1+t^2}}}{\frac{t^4+1}{(\cancel{1+t^2})^2}} \frac{dt}{\cancel{1+t^2}} = \\ &= \int \frac{t}{t^4+1} dt = \int \frac{t}{(t^2)^2+1} dt = \left| \begin{array}{l} t^2 = z \\ 2t dt = dz \\ t dt = \frac{1}{2} dz \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z^2+1} = \frac{1}{2} \arctg z + C = \frac{1}{2} \arctg t^2 + C = \frac{1}{2} \arctg(tg^2 x) + C\end{aligned}$$

Ovaj zadatak smo mogli da rešimo i na drugi način, koristeći trigonometrijske formule.

Ideja je da se izraz u imeniocu transformiše. Krenemo od osnovne identičnosti:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \dots \dots \dots / ()^2$$

$$\sin^4 x + 2 \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x = 1$$

$$\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x$$

$$\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - \frac{4 \sin^2 x \cos^2 x}{2}$$

$$\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - \frac{\sin^2 2x}{2}$$

$$\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{2 - \sin^2 2x}{2}$$

$$\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{1 + \boxed{1 - \sin^2 2x}}{2}$$

$$\boxed{\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{1 + \cos^2 2x}{2}}$$

Vratimo se u integral...

$$I = \int \frac{\sin x \cos x}{1 + \cos^2 2x} dx = \int \frac{2 \sin x \cos x}{1 + \cos^2 2x} dx = \int \frac{\sin 2x}{1 + \cos^2 2x} dx \left| \begin{array}{l} \cos 2x = t \\ -\sin 2x \cdot 2 dx = dt \\ \sin 2x dx = \frac{dt}{-2} \end{array} \right| = \frac{1}{-2} \int \frac{dt}{1+t^2}$$

$$= \frac{1}{-2} \arctgt + C = \boxed{-\frac{1}{2} \arctg(\cos 2x) + C}$$

primer 5.  $\int \sqrt{a^2 - x^2} = ?$

Sećate se ovog integrala?

Rešavali smo ga do sada na dva načina: parcijalnom integracijom i metodom Ostrogradskog.

Po nama je najelegantnije koristiti trikče:

Ako uzmemo smenu  $x = a \sin t$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - (a \sin t)^2} = \sqrt{a^2 - a^2 (\sin t)^2} = a \sqrt{1 - \sin^2 t} = a \cos t$$

$$x = a \sin t \rightarrow dx = a \cos t dt$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} = \int a \cos t \cdot a \cos t dt = a^2 \int \cos^2 t dt = a^2 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt =$$

$$\frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) dt = \frac{a^2}{2} \left( t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) + C =$$

Moramo vratiti  $t$  iz smene:

$$x = a \sin t \rightarrow \sin t = \frac{x}{a} \rightarrow t = \arcsin \frac{x}{a} \quad \text{i još da sredimo :}$$

$$\frac{1}{2} \sin 2t = \frac{1}{2} \cancel{\sin t \cos t} = \sin t \cdot \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sin(\arcsin \frac{x}{a}) \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin \frac{x}{a})} =$$

$$= \frac{x}{a} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} = \frac{x}{a} \sqrt{\frac{a^2 - x^2}{a^2}} = \frac{x}{a^2} \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$\text{Rešenje je: } \frac{a^2}{2} \left( t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) + C = \frac{a^2}{2} \left( \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{a^2} \sqrt{a^2 - x^2} \right) + C = \boxed{\frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C}$$