

LINEARNA DIFERENCIJALNA JEDNAČINA

Linearna diferencijalna jednačina je oblika $y' + p(x)y = q(x)$.

Kad dobijemo diferencijalnu jednačinu, a predpostavimo da je linearna, moramo najpre da napravimo da bude oblika $y' + p(x)y = q(x)$ pa onda odatle “pročitamo” koliko je $p(x)$ i $q(x)$.

Rešenje ove jednačine je oblika : $y(x) = e^{-\int p(x)dx} (c + \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx)$

Pošto je malo komplikovano da ubacujemo $p(x)$ i $q(x)$ u gotovo rešenje, naš savet je da najpre rešite:

$\int p(x)dx$, zatim $\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx$ pa onda da to ubacite u rešenje.

Često se dešava situacija kad ne možemo linearnu diferencijalnu jednačinu rešavati “po y”, već moramo da je rešavamo “po x”, u tom slučaju pravimo oblik : $x' + p(y)x = q(y)$ a rešenje će biti oblika:

$$x = e^{-\int p(y)dy} (c + \int q(y)e^{\int p(y)dy} dy)$$

Primer 1. Reši diferencijalnu jednačinu: $y' - 2xy = (x - x^3)e^{x^2}$

Rešenje:

$$y' - 2xy = (x - x^3)e^{x^2} \text{ ovo je linearna d.j. } p(x) = -2x \text{ i } q(x) = (x - x^3)e^{x^2}$$

Nađimo prvo rešenje integrala $\int p(x)dx$

$$\int p(x)dx = \int (-2x)dx = -2 \int xdx = -2 \frac{x^2}{2} = -x^2$$

Sad rešavamo $\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx$

$$\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx = \int (x - x^3)e^{x^2} e^{-x^2} dx = \int (x - x^3)dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}$$

Sad upotrebimo formulu :

$$y = e^{-\int p(x)dx} (c + \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx) = e^{-(-x^2)} [c + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}] = e^{x^2} [c + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}]$$

$$y = e^{x^2} [c + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}] \text{ je opšte rešenje}$$

Primer 2. Reši diferencijalnu jednačinu: $xy' - x^2 + 2y = 0$

Rešenje:

Ovde moramo najpre napraviti oblik $y' + p(x)y = q(x)$

$$xy' - x^2 + 2y = 0$$

$$xy' + 2y = x^2 \quad \text{sve podelimo sa } x \quad (x \neq 0)$$

$$y' + \frac{2}{x}y = x \quad \text{odavde zaključujemo da je } p(x) = \frac{2}{x} \quad \text{i} \quad q(x) = x$$

Nađimo prvo rešenje integrala $\int p(x)dx$

$$\int p(x)dx = \int \frac{2}{x}dx = 2 \ln|x| = \ln|x|^2$$

Sad rešavamo $\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx$

$$\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx = \int xe^{\ln x^2} dx = \int xx^2 dx = \int x^3 dx = \frac{x^4}{4}$$

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(c + \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx \right) = e^{-\ln x^2} \left[c + \frac{x^4}{4} \right] = \frac{1}{x^2} \left[c + \frac{x^4}{4} \right] \quad \text{dakle:}$$

$$y = \frac{1}{x^2} \left[c + \frac{x^4}{4} \right] \quad \text{je opšte rešenje.}$$

Primer 3.

Reši diferencijalnu jednačinu: $y' \cos^2 x = \operatorname{tg} x - y$ i nađi ono partikularno rešenje koje zadovoljava uslove : $x=0$ i $y=0$

Rešenje:

$$y' \cos^2 x = \operatorname{tg} x - y$$

$$y' \cos^2 x + y = \operatorname{tg} x \quad \text{sve podelimo sa } \cos^2 x$$

$$y' + \frac{1}{\cos^2 x} y = \frac{\operatorname{tg} x}{\cos^2 x} \quad \text{Oдавde je:}$$

$$p(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \dots\dots\dots q(x) = \frac{\operatorname{tg} x}{\cos^2 x}$$

Nađimo, kao i obično, prvo rešavamo integral $\int p(x) dx$

$$\int p(x) dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x$$

$$\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx = \int \frac{\operatorname{tg} x}{\cos^2 x} e^{\operatorname{tg} x} dx = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t \\ \frac{1}{\cos^2 x} dx = dt \end{array} \right| = \int t e^t dt = \text{parcijalna integracija} \dots\dots =$$

$$\left| \begin{array}{l} t = u \quad e^t dt = dv \\ dt = du \quad e^t = v \end{array} \right| = t e^t - e^t = \operatorname{tg} x e^{\operatorname{tg} x} - e^{\operatorname{tg} x}$$

$$y = e^{-\int p(x) dx} (c + \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx) = e^{-\operatorname{tg} x} [c + \operatorname{tg} x e^{\operatorname{tg} x} - e^{\operatorname{tg} x}]$$

$y = e^{-\operatorname{tg} x} c + \operatorname{tg} x - 1$ opšte rešenje

Menjamo ovde $x=0$ i $y=0$

$$0 = e^{-\operatorname{tg} 0} c + \operatorname{tg} 0 - 1$$

$$0 = c - 1$$

$$c = 1$$

Sad ovo vratimo u opšte rešenje $y = e^{-\operatorname{tg} x} 1 + \operatorname{tg} x - 1 = e^{-\operatorname{tg} x} + \operatorname{tg} x - 1$

$y = e^{-\operatorname{tg} x} + \operatorname{tg} x - 1$

 je partikularno rešenje

Primer 4. Reši diferencialno enačbo: $dx + (e^y - x)dy = 0$

Rešenje:

Probamo da napravimo oblik “ po y”

$$dx + (e^y - x)dy = 0$$

$$(e^y - x)dy = -dx \dots\dots\dots / : dx$$

$$(e^y - x) \frac{dy}{dx} = -1$$

$$(e^y - x)y' = -1 \dots\dots\dots ?$$

Vidimo da ne može!

Onda pokušamo da napravimo oblik “ po x”

Najpre da se podsetimo da je $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{x'} \rightarrow \boxed{y' = \frac{1}{x'}}$

$$(e^y - x)y' = -1$$

$$(e^y - x) \frac{1}{x'} = -1$$

$$e^y - x = -x'$$

$$\boxed{x' - x = -e^y}$$

Sad je postupak analogan:

$$x = e^{-\int p(y)dy} (c + \int q(y)e^{\int p(y)dy} dy)$$

$$x' - 1 \cdot x = -e^y \rightarrow p(y) = -1 \wedge q(y) = -e^y$$

$$\int p(y)dy = \int (-1)dy = -y$$

$$\int q(y)e^{p(y)}dy = \int (-e^y)e^{-y}dy = \int (-1)dy = -y$$

$$x = e^{-\int p(y)dy} (c + \int q(y)e^{\int p(y)dy} dy)$$

$$x = e^{-(-y)} (c + (-y))$$

$$\boxed{x = e^y (c + y)}$$

Dobili smo opšte rešenje.

Primer 5.

Reši diferencijalnu jednačinu: $y' = \frac{y}{2y \ln y + y - x}$

Rešenje:

$$\frac{1}{x'} = \frac{y}{2y \ln y + y - x}$$

$$yx' = 2y \ln y + y - x \dots\dots\dots / : y$$

$$x' = 2 \ln y + 1 - \frac{x}{y}$$

$$x' + \frac{x}{y} = 2 \ln y + 1$$

$$x' \boxed{+\frac{1}{y}} x = \boxed{2 \ln y + 1}$$

$p(y) \qquad \qquad \qquad q(y)$

$$\int p(y) dy = \int \frac{1}{y} dy = \ln |y|$$

$$\int q(y) e^{p(y)} dy = \int (2 \ln y + 1) e^{\ln y} dy = \int (2 \ln y + 1) y dy$$

$$\int (2 \ln y + 1) y dy = \left| \begin{array}{ll} 2 \ln y + 1 = u & y dy = dv \\ \frac{1}{y} dy = dv & \frac{y^2}{2} = v \end{array} \right| = \frac{y^2}{2} (2 \ln y + 1) - \int \frac{y^2}{2} \cdot \frac{1}{y} dy = \frac{y^2}{2} (2 \ln y + 1) - \frac{1}{2} \frac{y^2}{2} = \boxed{\frac{y^2}{2} (2 \ln y + 1) - \frac{y^2}{4}}$$

$$x = e^{-\ln y} \left(c + \frac{y^2}{2} (2 \ln y + 1) - \frac{y^2}{4} \right)$$

$$x = \frac{1}{y} \left(c + \frac{y^2}{2} (2 \ln y + 1) - \frac{y^2}{4} \right)$$

$$x = \frac{1}{y} \left(c + \frac{y^2}{2} 2 \ln y \right)$$

$$\boxed{x = \frac{1}{y} (c + y^2 \ln y)}$$

Evo opšteg rešenja.