基于医疗容量的阈值策略下接触与追踪隔离的最优控制

XXX XXX

School of Mathematics and Statistics, Shaanxi Normal University

摘 要

优化的非药物干预措施对控制新发传染病、使医疗需求不超出医疗资源承载能力至关重要。容量约束下的多项最优控制研究表明，最优干预策略均含有沿容量运行的阶段：感染人数达到容量水平后保持不变，干预随易感者减少逐步放松。本文把密切接触者追踪与隔离纳入经典 SIR 模型，研究这一阈值策略下接触控制与追踪隔离应如何组合：该策略在非隔离感染者首次达到以医疗资源承载能力为依据选取的阈值时启动干预，使其保持在阈值，并在社区易感者降至常规传播临界值时恢复常规措施。本文先求仅隔离控制的解析解，再以易感者人数代替时间，把该策略下的双控制最优问题化为关于接触率函数的单控制问题，并可逐状态求解。结果表明，各控制组合的控制期累计感染由控制时长唯一确定，时长越长感染越多；在相应的干预能力允许时，仅隔离控制使控制时长和累计感染最小，代价是被隔离的未感染者最多。两种措施都可加强时，使二次干预强度成本最小的最优控制在控制后期两者并用；本文进一步给出这一最优控制唯一、连续并呈“先仅加强隔离、后两者并用”结构的充分条件。基准算例与西安参数情景的数值结果展示了这些结论。本文的结果为在以医疗资源承载能力为依据选取的阈值下组合接触控制与追踪隔离提供了理论依据。

关键词：非药物干预；接触追踪；隔离；医疗资源承载能力；阈值策略；最优控制

1 引言

SARS、甲型 H1N1 流感与 COVID-19 等新发传染病的暴发给医疗系统带来了巨大压力：医疗机构既要应对一波又一波的传播，又要救治危重患者 [1]。住院需求一旦超出医疗资源承载能力，救治质量便迅速下降，病死率随之升高，医护人员的负担也急剧加重 [1, 2]。COVID-19 早期中国各地的数据也显示，病死率与发病率显著正相关，提示病死率与医疗负担有关 [3]。因此，防控的首要目标之一是使医疗需求始终不超出承载能力，让每名感染者都能得到应有的救治 [4]。

COVID-19 暴发后，各国卫生部门认识到任由病毒传播很可能使医院容量饱和，多数国家随即采取了严格的隔离与封控措施，以阻断或减缓传播 [5]。在缺乏预防和治疗手段时，这类非药物干预是减轻发病与死亡的唯一手段：关闭学校与非必要场所、禁止聚集、保持社交距离、限制出行和佩戴口罩等措施，降低了易感者与感染者接触的频率和风险 [6]。这些措施成效显著：欧洲 11 国的数据表明，以封控为代表的主要非药物干预大幅降低了传播，使有效再生数降到 1 以下 [7]。

然而，这些措施难以长期维持，还会严重影响社会生活与经济发展 [1]。在没有疫苗时，抑制传播就意味着让人们彼此远离，抑制越强，对经济与社会活动的限制越大 [4]。社交距离、自我隔离与出行限制还使各经济部门的劳动力减少，大量就业岗位随之流失 [8]。Ferguson 等 [9] 区分了两类策略。缓解策略减缓但不一定阻断传播，目的是降低医疗需求高峰；压制策略则逆转疫情增长，把病例数压到低水平并长期维持。两类策略都需要多种措施配合。医疗资源承载能力与干预代价共同决定何时启动、采取多大强度以及何时解除措施，这些选择需要优化。例如，Duque 等 [6] 以每日新增入院人数的 7 日移动平均触发短期封控，在超出医院容量的概率约束下尽量缩短封控时间。本文则以医疗资源承载能力为依据，选取非隔离感染者的设计阈值。

若干容量约束优化问题的最优策略包含“沿容量运行”的阶段：感染人数保持在容量水平，干预随易感者减少逐步放松。Miclo 等 [4] 在 SIR 模型中以 ICU 容量为约束、以抑制措施的线性代价为目标，求得先不干预、再加强抑制并沿容量运行至群体免疫的解析策略。Kantner 和 Koprucki[10] 在扩展的 SEIR 模型中以死亡人数和干预的社会经济代价为目标，模型中 ICU 超载时病死率急剧上升；所得最优策略含有一段较长的时期，其间重症人数略低于 ICU 容量，有效再生数约为 1。Avram 等 [11] 研究固定监测时域内的干预代价，要求末状态严格越过群体免疫阈值，刻画有界干预下的可行区域与最优反馈。Angulo 等 [12] 以最短时间进入安全区为目标，进入后无需进一步干预，感染也始终不超过上限；干预能力不足时，其最优策略需要提前启动。Balderrama 等 [2] 在有限时段干预中同时约束感染人数与累计干预预算，以最终感染规模最小为目标。这些问题中，容量边界可以成为最优轨迹的一部分，其进入与离开方式依赖具体目标和约束。

维持感染水平的阶段也出现在预算约束与切换干预中。Molina 和 Rapaport[13] 在传播衰减控制的 L^1 预算下最小化 SIR 感染峰值，最优策略使感染人数保持不变，直到易感者降到群体免疫阈值，在这一阶段之外不干预。Morris 等 [14] 固定干预时长时，则得到先维持感染、后抑制传播的结构，维持阶段的长度也可以为零。Xiao 等 [15] 研究按感染水平启停干预的 Filippov 系统，分析阈值面上的滑动及长期动力学。容量阶段的最优性还取决于成本形式。Freddi 等 [16] 用 Hamilton–Jacobi 验证论证处理满足特定条件的状态依赖成本。Freddi 和 Goreac[17] 将感染人数与控制强度的积分共同计入无限时域目标，所得最优策略可在离开容量边界后继续施加最大干预。

退出方式也随优化问题改变。Miclo 等在达到群体免疫阈值时解除干预。Avram 等结束容量边界阶段后恢复常规传播，并要求固定监测终点满足严格的群体免疫目标。Angulo 等最后以最大干预强度加快进入安全区。Balderrama 等在离开容量边界后接续一段部分封控。本文在社区易感者降到常规传播临界值（常规措施下有效再生数恰为 1 时的社区易感者人数）时退出。由命题 2.2(iii)，沿阈值运行时，这是可以直接恢复常规控制而此后不再越过阈值的最早时刻；由定理 3.5，退出后保持常规控制，非隔离感染者人数严格下降。

上述容量约束研究多以单一传播率表示干预，而减少接触与追踪隔离通过不同机制减少传播：前者降低接触频率，后者把病例的接触者移出社区，其中包括尚未感染的人。高强度的密切接触者追踪及随后的隔离能有效降低控制再生数 [18]，其效果取决于覆盖比例和响应速度 [19, 20]。隔离病例与追踪隔离接触者能否控制疫情，还取决于症状出现前或无症状传播所占的比例 [21]。这类措施也耗费资源。Kucharski 等 [22] 比较措施组合时，专门估计了需要隔离的接触者人数。因此，组合选择既关系到传播，也关系到未感染者的隔离负担。实践中两种干预往往同时使用：He 等 [23] 从包括西安在内的疫情数据重构的接触率与隔离比例显示，两者都在减少新感染中起了关键作用。

本文的仓室结构、参数情景与解析方法建立在已有追踪隔离模型上。Tang 等 [18] 在 SEIR 型模型中把被追踪者按是否感染分入不同仓室。He 等 [23] 在短期暴发的五仓室模型中忽略隔离易感者回流，用动力学模型与神经网络重构接触率和隔离比例；该文为本文的西安情景提供参数与外部参照。Zhou 等 [1] 采用分段常数的接触率与隔离比例，由闭合子系统的首次积分分析感染峰值、退出后的反弹及隔离区外清零时间，并数值研究两种干预强度和启停时刻的联合选择。本文沿用这一首次积分方法，进一步研究维持同一感染阈值的全部控制组合。

联合干预的优化已有不同建模途径。Charpentier 等 [5] 在 ICU 容量约束下数值优化检测与封控：仅优化封控的情景出现长期容量饱和阶段，联合检测时这一阶段可以消失。Grundel 等 [24] 在年龄分组模型中组合大规模检测与社交距离，在其检测能力约束下，仅靠检测不足以维持 ICU 上限。Alvarez 等 [25] 在 SIR 模型的规划问题中权衡死亡人数与封控的产出损失，并表明检测—追踪—隔离与封控互补。Pollinger[26] 同时优化接触追踪与社交距离，以感染者的检测移出率表示追踪，成本也包括感染者及其接触者承受的隔离与隐私损失。其闭式约化针对小规模暴发的压制近似，令易感者基本不变，并以持续下降的感染者人数代替时间。Arnouss 等 [27] 通过调节感染者隔离率研究预算约束下的峰值最小化。与这两项工作不同，

本文的追踪隔离还把未感染接触者移出社区，控制组合因而也改变社区易感者的减少速度与隔离负担。

本文把密切接触者追踪与隔离纳入经典 SIR 模型，研究阈值策略下接触控制与追踪隔离的最优控制。模型中隔离易感者在清零之前不返回社区，回流的影响见第 8.3 节。阈值策略在非隔离感染者首次达到以医疗资源承载能力为依据选取的阈值时启动干预，此后使其保持在阈值，直到社区易感者降至常规传播临界值时退出。选择这一策略的出发点是：在 SIR 模型中，以线性干预代价为目标的容量约束最优控制正是这种结构，即先不加强干预，再沿容量运行，到群体免疫阈值时解除 [4, 11]；干预能力不足时才需要提前加强 [11]。这些模型以单一传播率表示干预，沿容量运行时控制由容量唯一确定。本文沿用这一结构，研究加入追踪隔离后新出现的问题：两种干预如何组合。控制期内有效再生数保持为 1，而不是压到 1 以下，所以阈值策略属于缓解而非压制。维持阈值只约束接触率 c 与未隔离比例 $1-q$ 的乘积 $c(1-q)$，因此在相同的启动与退出状态（社区易感者与非隔离感染者人数）之间，两种干预有无穷多种组合。组合会改变被隔离的未感染者人数，社区易感者下降的速度与退出时刻也随之改变。由此产生两个问题：（1）干预能力有限时，能否在整个控制期维持阈值直到退出？（2）以控制时长、累计感染或干预成本为目标时，最优组合分别是什么，它们与被隔离的未感染者人数如何取舍？

阈值控制期内非隔离感染者人数保持不变，社区易感者严格减少，因此可以用易感者人数代替时间。与 Pollinger 的近似约化不同，这一状态约化是精确的。维持阈值又使隔离比例由接触率唯一确定，每个控制组合因而对应接触率关于易感者人数的一个函数。可行性、控制时长、感染与隔离人数和成本于是都可以逐状态分析，最优控制问题化为在每个状态上选取接触率。主要结果如下。

(1) **仅隔离控制的解析解**（第 3 节）：定理 3.1、3.2、3.5与3.7由首次积分与 Lambert W 函数给出启动状态、隔离比例、控制时长、退出后的终点状态与累计感染的显式表达，启动与清零时间则化为一维积分。由命题 3.9，提高阈值能降低最大隔离比例、控制时长和成本，但会增加累计感染。

(2) **可行性**（第 4 节）：由定理 4.1，全部控制与接触率关于易感者人数的函数一一对应。干预能力有限时，推论 4.2给出能否完成整段控制的充要条件。这一条件只需在启动状态上检验，因为启动时社区易感者最多，维持阈值所需的干预最强。

(3) **不同目标的最优控制**（第 4 节）：由定理 4.3，控制期累计感染与被隔离的未感染者人数之和固定，二者此消彼长，并都由控制时长唯一确定。由推论 4.4–4.6，只要隔离能力足以实施仅隔离控制，它就是控制时长与累计感染最小的最优控制，代价是被隔离的未感染者最多。隔离能力不足时，最快的控制必须同时减少接触。相反，只要接触控制能力允许，仅减少接触使被隔离的未感染者最少，但控制时长最长、感染最多。

(4) **成本最优控制**（第 5 节）：由定理 5.1，二次干预强度成本的最小值可以达到，并可通过在每个状态上比较有限个候选求出。由命题 5.3与5.4，两种措施都可加强时，成本最优控制从不单独减少接触，控制后期两种措施必须并用，退出时两者的归一化强度之比趋于成本权重的反比。定理 5.2进一步表明，隔离与接触的成本权重之比不超过权重阈值 r_{cont}（介于 2 与 4 之间）时，成本最优控制唯一，并随易感者减少连续变化。此时，若干预启动时社区易感者足够多，它先仅加强隔离，再连续转为两者并用，否则从启动起就两者并用。由推论 5.6，能力约束下只需把它逐状态截断到允许范围。由命题 5.7，加重隔离的相对权重使控制期不缩短、感染不减少、被隔离的未感染者不增加。不考虑能力约束时，成本最优控制以比仅隔离控制更长的控制期和更多的感染换取更低的成本。

第 2 节建立模型并定义阈值策略。第 3–5 节依次研究仅隔离控制、联合控制与成本最优控制。第 6 节给出基准参数下联合控制的数值结果，第 7 节分析西安参数情景。第 8 节讨论结果的意义与局限，第 9 节总结全文。较长证明见附录，辅助分析及其证明见补充材料。

2 模型与阈值策略

本文以社区中的非隔离感染者人数 I 为控制对象，要求它不超过阈值 η。阈值 η 是外生给定的设计参数，主要依据医疗资源（如 ICU 床位）的承载能力选取，使感染不超过阈值时医疗需求也不超过这一承载能力；医疗需求超过承载能力时，医院趋于饱和，救治质量下降、病死率升高 [4, 12]。η 的选取也可兼顾其他防控目标与社会经济因素。本节先建立含追踪隔离的模型，再定义阈值策略下的允许控制与评价指标。

2.1 基本方程

本文在经典 SIR 模型中纳入密切接触者追踪与隔离。人群分为社区易感者 S、隔离易感者 S_q、非隔离感染者 I、隔离感染者 I_q 和移出者 R，社区传播只来自非隔离感染者。接触率为 $c(t)$，每次接触的传播概率为 β，接触者中被追踪并隔离的比例为 $q(t)$，简称隔离比例。被追踪的接触者若已感染则进入 I_q，若未感染则进入 S_q；未被追踪的新感染者进入 I。非隔离感染者和隔离感染者分别以速率 γ 和 δ_q 移出。模型沿用文献 [1] 中社区传播与接触追踪的结构（图 1）：

$$
\begin{cases}
\dot{S} = -\dfrac{c(t)[\beta + (1-\beta)q(t)]}{N} SI, \\
\dot{I} = \dfrac{\beta c(t)(1-q(t))}{N} SI - \gamma I, \\
\dot{S}_q = \dfrac{(1-\beta)c(t)q(t)}{N} SI, \\
\dot{I}_q = \dfrac{\beta c(t)q(t)}{N} SI - \delta_q I_q, \\
\dot{R} = \gamma I + \delta_q I_q.
\end{cases}
\tag{2.1}
$$

R 为移出者，即康复或确诊后隔离治疗、不再参与传播的人。把文献 [1] 的住院仓室与康复仓室合并后，流入速率为 $(\delta_I + \gamma_I)I + \delta_q I_q$，其中 δ_I、γ_I 为该文中非隔离感染者的诊断率与自然恢复率，因此本模型取 $\gamma = \delta_I + \gamma_I$。相应地，$I + I_q$ 不含已移入 R 的住院者，不等于全部临床现存感染。




图 1: 含密切接触者追踪与隔离的 SIR 型模型。S, S_q, I, I_q, R 分别为社区易感者、隔离易感者、非隔离感染者、隔离感染者和移出者。从 S 出发的三条箭头上标注的是系数，相应流量等于该系数乘以 SI/N；移出流量为 γI 与 $\delta_q I_q$。

常规控制下的接触率和隔离比例记为 c_0, q_0。下文始终设 $N, c_0, \gamma, \delta_q > 0$、$0 < \beta < 1$、$0 \le q_0 < 1$，初始仓室非负、总和为 N，且 $S_0, I_0 > 0$。人数以人计，c, γ, δ_q 的单位为时间的倒数；β 与 q 是无量纲比例，q 是接触者被追踪隔离的比例，而不是感染者被检出的速率。

本文研究一波暴发，模型作三点简化。第一，不考虑再感染与免疫丧失。截至 2022 年 5 月，中国大陆的 101 波 COVID-19 疫情一般在约 40 天内实现动态清零 [28]，而感染者在发病后约两周内普遍产生抗

体 [29]。文献 [1] 据此认为一波疫情内再次感染的可能性很小，不考虑再感染，本文沿用这一处理。第二，模型只描述一次本地暴发的传播，不含输入病例；一波暴发持续时间较短，人口出生与自然死亡也忽略不计。第三，隔离者不参与社区传播，隔离易感者在清零之前不释放，即在模型中不返回 S。Tang 等 [28] 与 He 等 [23] 对短期暴发也作了这一简化。Tang 等以干预较强、疫情持续时间短为由，假设隔离易感者在动态清零之前不返回易感者仓室。本文的指标都计算到清零时间（第 2.4 节），因而不依赖清零后是否释放；涉及 $t \to \infty$ 的结论则假设隔离易感者始终不释放。这一假设的适用范围与回流的影响见第 8.3、8.4 节与补充材料第 S7 节。

在这些简化下，社区易感者通过两条途径减少：被感染，或作为未感染的接触者被隔离。后一途径同样降低社区传播的潜力，但被隔离者没有获得免疫，这是追踪隔离区别于减少接触的关键。计算无限时刻的指标时，隔离易感者不返回的假设也延续到整个时间范围。下面的命题保证，后文考虑的全部控制都给出唯一的非负解。

命题 2.1. *设参数与初值满足上述假设，$c(t) \geq 0$ 局部有界且可测，$q(t) \in [0,1]$ 可测，则*

(i) 式(2.1)存在唯一的全局绝对连续解，方程几乎处处成立；

(ii) 各仓室非负，总和恒为 N，且对一切 $t \geq 0$ 有 $S(t), I(t) > 0$。

证明见附录 A.1。

2.2 常规轨迹

有效再生数 $R_e = \beta c(1-q)S/(\gamma N)$ 是一名非隔离感染者在移出前引起的、未被隔离的新感染数。常规控制下 $R_e = S/S_c$，其中

$$S_c = \frac{\gamma N}{\beta c_0 (1-q_0)} \tag{2.2}$$

称为常规传播临界值。社区易感者多于 S_c 时，仅靠常规措施疫情仍会增长；少于 S_c 时，有效再生数小于 1，I 下降。记 $R_c = \beta c_0(1-q_0)/\gamma$ 为全部人口易感时常规措施下的控制再生数，则 $S_c = N/R_c$，常规控制下 $R_e = R_c S/N$。S_c 在形式上与 SIR 模型的群体免疫阈值 N/R_0 相同，只是基本再生数换成了常规措施下的控制再生数。

S 与 I 的方程不依赖其余仓室，因此常规轨迹可以显式写出。记

$$\beta_1^0 = \frac{c_0[\beta + q_0(1-\beta)]}{N}, \quad \beta_2^0 = \frac{\beta c_0(1-q_0)}{N}, \quad \rho_1 = \frac{\gamma}{\beta_1^0}, \qquad \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} = \frac{\rho_1}{S_c}, \tag{2.3}$$

则常规轨迹满足首次积分 [1]

$$I(t) + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S(t) - \rho_1 \ln S(t) = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S_0 - \rho_1 \ln S_0 =: C_0, \tag{2.4}$$

即

$$I(S) = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S) + \rho_1 \ln \frac{S}{S_0}. \tag{2.5}$$

$S_0 > S_c$ 时 I 先上升；这一阶段 $I \geq I_0$，故 $\dot S \leq -\beta_1^0 I_0 S$，$S$ 在有限时间内降到 S_c，I 在此时达到峰值。$S_0 \leq S_c$ 时，I 则从一开始就下降。因此常规峰值为

$$I_{\max}^0 = \begin{cases} I_0, & S_0 \leq S_c, \\ I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S_c) + \rho_1 \ln(S_c/S_0), & S_0 > S_c. \end{cases} \tag{2.6}$$

阈值 η 约束的是仍在社区中传播的 I，而不是模型显式追踪的两个感染仓室之和 $I + I_q$，因为非隔离感染者是社区新传播的唯一来源。由于接触率不超过常规水平，限制 I 也就限制了新增感染的速率：无论新感染者进入 I 还是被追踪进入 I_q，单位时间的新增感染都不超过 $\beta c_0 S_0 \eta / N$（本模型中 $S \leq S_0$）。补充材料第 S1 节参照 Angulo 等的比例近似，由此给出重症监护需求不超过床位数的阈值选取条件。

只有常规峰值超过阈值时才需要加强干预，因此后文都设

$$S_0 > S_c, \qquad 0 < I_0 < \eta < I^0_{\max}, \tag{2.7}$$

即常规轨迹在达到峰值之前触及阈值。记首次触及的时刻为 t_1，$S^* = S(t_1)$，则 $S^* > S_c$。阈值 η 以人数计，后文始终设 $\eta > 1$，从而恢复常规控制后 I 会降到 1，清零时间（第 2.4 节）有定义；记 $\theta = \eta/N$ 为阈值比例。下面的命题给出启动与退出时刻的动力学含义。

命题 2.2. *设常规轨迹在有限时刻 t_1 首次由下方到达 $I = \eta$，且 $S(t_1) = S^* > S_c$，则*

(i) 常规轨迹在 $[0, t_1)$ 上满足 $I < \eta$，而 $\dot I(t_1) > 0$，因此在 t_1 之后继续采用 (c_0, q_0) 会立即越过阈值；

(ii) 在 $I = \eta$ 的状态上，$\dot I \le 0$ 当且仅当

$$\frac{\beta c(1-q)S}{N} \le \gamma,$$

且若在某个时间区间上 $I \equiv \eta$，则该区间上几乎处处取等号；

(iii) 从状态 (S, η) 恢复并保持 (c_0, q_0) 后始终有 $I \le \eta$，当且仅当 $S \le S_c$，因此对任一从 (S^*, η) 出发并持续维持 $I = \eta$ 的允许轨迹，S 首次降到 S_c 的时刻是该轨迹上可以直接恢复常规控制的最早时刻。

证明见附录 A.2。由 (i)，t_1 是常规控制不能再维持阈值的时刻；由 (iii)，$S = S_c$ 是沿阈值运行时可以直接恢复常规控制的最早时刻。阈值策略的强化干预只在这两个时刻之间实施，对应引言所述沿容量运行的阶段。

2.3 允许控制

阈值策略在 t_1 启动后维持 $I = \eta$，到 S 首次降至 S_c 的时刻 t_2 恢复常规控制，$[t_1, t_2]$ 称为阈值控制期。退出强化控制只指恢复 (c_0, q_0)，不瞬时释放隔离易感者；本模型中 S_q 仍不返回。维持 $I = \eta$ 只约束接触率与未隔离比例的乘积 $c(1-q)$：由命题 2.2(ii)，阈值控制期内几乎处处有

$$\frac{\beta c(t)(1-q(t))S(t)}{N} = \gamma, \tag{2.8}$$

即有效再生数保持为 1。每名非隔离感染者在移出前恰好引起一例未被隔离的新感染，非隔离感染者人数因而既不增长也不下降。随着易感者减少，维持这一平衡所需的干预逐渐减弱。固定 $c = c_0$ 时，式(2.8)唯一确定隔离比例，所得控制称为仅隔离控制（第 3 节）；固定 $q = q_0$ 时，它唯一确定接触率 $c = c_0 S_c/S$，所得控制称为仅减少接触。两者之间还有无穷多种控制组合。

定义 2.1. 设条件(2.7)成立。阈值策略下的全部控制记为 $\mathcal{A}(\eta)$，它由满足以下条件的有界可测控制 (c, q) 组成（几乎处处相等的控制视为同一控制）：

(i) 启动前保持常规控制：$t < t_1$ 时 $(c, q) = (c_0, q_0)$；

(ii) 维持阈值直到退出：存在有限时刻 $t_2 > t_1$，使相应的绝对连续解在 $[t_1, t_2]$ 上满足 $I(t) \equiv \eta$，且 t_2 是 S 首次到达 S_c 的时刻；

(iii) 控制强度有界：在 $[t_1, t_2]$ 上几乎处处有

$$0 < c(t) \le c_0, \qquad q_0 \le q(t) \le 1; \tag{2.9}$$

(iv) 退出后恢复常规控制：$t > t_2$ 时 $(c, q) = (c_0, q_0)$。

由条件 (i) 与 (ii)，$\mathcal{A}(\eta)$ 中的控制在 t_1 时都处于状态 (S^*, η)，并都在 (S_c, η) 退出，这里的状态指 (S, I)；由命题 2.2(ii)，式(2.8)在阈值控制期内几乎处处成立。退出时刻 t_2 与退出时的 S_q, I_q, R 则可以不同。比较全过程指标时，各控制还采用同一完整初值。后文的比较与优化都在 $\mathcal{A}(\eta)$ 或其子类中进行。提前干预、在 $I < \eta$ 下运行或改变退出规则的策略属于另一类控制问题；本文只研究已有容量约束最优控制中沿容量运行的这一阶段。

2.4 评价指标

评价一个控制要看三类指标：时间、累计人数和干预成本。所有时刻都从初始时刻起算。控制时长为 $\Delta t = t_2 - t_1$；$\mathcal{A}(\eta)$ 中各控制的 t_1 相同，t_2 与 Δt 随控制组合改变。清零时间 t_{end} 是 I 上升后再次降到 1 的时刻，即满足 $I(t_{\text{end}}) = 1$、$\dot{I}(t_{\text{end}}) < 0$ 的时刻。由定理 3.5，对 $\mathcal{A}(\eta)$ 中的控制，这一时刻唯一且大于 t_2。这一判据沿用文献 [1]，标志社区传播基本结束；它不要求 I_q 同时归零，也不表示模型在有限时间内灭绝。

累计人数只计初始时刻以后的新增流入，不含初始感染者。对统计终点 T，进入 I 和进入 I_q 的累计新增感染分别为

$$I_{\text{cum}}(T) = \int_0^T \frac{\beta c(1-q)}{N} SI\,dt, \qquad I_{q_{\text{cum}}}(T) = \int_0^T \frac{\beta c q}{N} SI\,dt,$$

总累计新增感染为 $I_{t_{\text{cum}}}(T) = I_{\text{cum}}(T) + I_{q_{\text{cum}}}(T)$。不写终点时，$I_{t_{\text{cum}}}$ 统计至 t_{end}，其他终点（如 $t \to \infty$）另行标明。阈值控制期的累计新增感染为 $I_{t_{\text{cum}}}(t_2) - I_{t_{\text{cum}}}(t_1)$。新增隔离易感者人数是 S_q 的增量，不写时段时指阈值控制期内的 $S_q(t_2) - S_q(t_1)$。由式(2.1)，这些计数满足

$$I_{\text{cum}}(T) = I(T) - I_0 + \gamma \int_0^T I(t)\,dt, \qquad S_q(T) - S_q(0) = \frac{1-\beta}{\beta} I_{q_{\text{cum}}}(T). \tag{2.10}$$

干预成本只计相对于常规水平的额外强度。两种干预的线性强度积分为

$$J_c = \int_{t_1}^{t_2} \frac{(c_0 - c(t))_+}{c_0}\,dt, \qquad J_q = \int_{t_1}^{t_2} \frac{(q(t) - q_0)_+}{1 - q_0}\,dt, \tag{2.11}$$

其中 $(x)_+ = \max\{x, 0\}$。给定正权重 w_c, w_q，二次干预强度成本为

$$J = \int_{t_1}^{t_2} \left[w_c \left(\frac{(c_0 - c(t))_+}{c_0} \right)^2 + w_q \left(\frac{(q(t) - q_0)_+}{1 - q_0} \right)^2 \right] dt, \tag{2.12}$$

两项强度都归一化到 $[0, 1]$，1 分别对应停止全部接触与追踪隔离全部接触者。默认取 $w_c = 1, w_q = 2$，即同等归一化强度下，加强追踪隔离的代价按减少接触的两倍计；第 6.4 节考察其他权重比。二次形式表示干预的边际代价随强度递增：轻度减少接触或少量追踪的代价较小，接近封控或大范围隔离时代价迅速上升。就同一时刻且总强度相同的代价而言，适当分担干预比集中于一种措施更省；总成本还取决于控制时长（第 5 节）。

J_c, J_q 只是分项强度积分，J 是二次加权积分，并非二者的加权和；三者都只在阈值控制期内积分，单位为天。权重没有换算为货币；J 不计隔离人天等资源占用，也不惩罚控制的快速调整。

3 仅隔离控制

仅隔离控制保持常规接触率 $c = c_0$，只靠提高隔离比例维持 $I = \eta$。它是后文比较的基准，控制函数、控制时长和累计新增感染都有闭式表达。由定理 4.3与推论 4.6，只要追踪隔离能力足以实施，它在全部控制中控制时长最短、累计新增感染最少。$\mathcal{A}(\eta)$ 中的控制都从 (S^*, η) 启动、在 (S_c, η) 退出，所以定理 3.1的启动状态与定理 3.5的退出后动态对它们全部成立。

3.1 控制轨迹

常规轨迹在 I 上升和下降时各经过 $I = \eta$ 一次，阈值策略在第一次经过时启动。把 $I = \eta$ 代入首次积分(2.4)，启动状态可以用 Lambert W 函数写出。记

$$z_\eta = -\frac{1}{S_c} \exp\left[-\frac{C_0 - \eta}{\rho_1} \right] = -\frac{S_0}{S_c} \exp\left[-\frac{S_0}{S_c} + \frac{\eta - I_0}{\rho_1} \right]. \tag{3.1}$$

定理 3.1. *设条件(2.7)成立，记 W_{-1} 为 Lambert W 函数的下实分支，则*

(i) $z_\eta \in (-e^{-1}, 0)$，启动状态唯一，为

$$S^* = -S_c W_{-1}(z_\eta), \qquad S_c < S^* < S_0; \tag{3.2}$$

(ii) 启动时刻为

$$t_1 = \frac{1}{\beta_1^0}\int_{S^*}^{S_0} \frac{dS}{S[I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S) + \rho_1 \ln(S/S_0)]} > 0. \tag{3.3}$$

证明. (i) 将 $I = \eta$ 代入式(2.4)，并利用 $\beta_2^0/\beta_1^0 = \rho_1/S_c$，得 $(-S/S_c)e^{-S/S_c} = z_\eta$。由式(2.6)（$S_0 > S_c$），

$$z_\eta = -e^{-1}\exp\left[-\frac{I_{\max}^0 - \eta}{\rho_1}\right],$$

再由触发条件(2.7)中的 $\eta < I_{\max}^0$，得 $z_\eta \in (-e^{-1}, 0)$。在此区间上 $W_0(z) \in (-1, 0)$、$W_{-1}(z) < -1$[30]。前者给出小于 S_c 的状态，即 I 下降时的交点。式(2.5)在 $S \in (S_c, S_0)$ 上关于 S 严格递减，端点处的值分别为 $I_{\max}^0$ 与 I_0；由触发条件中的 $I_0 < \eta < I_{\max}^0$，该区间上恰有一个交点，由 W_{-1} 给出。

(ii) 沿常规易感者方程分离变量即得式(3.3)。积分区间上 $I(S) \geq I_0 > 0$，所以 t_1 有限。 □

启动时 $S^* > S_c$，常规隔离比例不足以阻止 I 上升，因此隔离比例必须立即提高。记

$$\bar{S} = \frac{(1-\beta)\gamma N}{\beta c_0}, \qquad \frac{\bar{S}}{S_c} = (1-\beta)(1-q_0) < 1. \tag{3.4}$$

$\bar{S}$ 刻画维持阈值时保持不变的一股接触流。维持 $I = \eta$ 即保持 $R_e = 1$：每名非隔离感染者单位时间须恰好引起 γ 例未被隔离的新感染，未被追踪的接触以概率 β 传播，所以每名感染者单位时间还有 $(1-\beta)\gamma/\beta$ 次未被追踪的接触落在未感染者身上，这些人留在 S 中。这股既未传播、也未被追踪的接触流恒为 $c_0\bar{S}\eta/N$，$\bar{S}$ 就是它按常规接触率折算的易感者人数；比值 $\bar{S}/S_c = (1-\beta)(1-q_0)$ 则是常规控制下与易感者的接触中这类接触所占的比例。下面的定理表明，阈值控制期内 S 以指数速率 $c_0\eta/N$ 趋向 $\bar{S}$；由于 $\bar{S} < S_c$，S 在有限时间内降到 S_c。S 的下降速度与 $S - \bar{S}$ 成正比：易感者越多，维持阈值所需的隔离比例越高，每名感染者的接触中被追踪隔离的未感染者也越多。

定理 3.2. *设条件(2.7)成立，并固定 $c(t) = c_0$，则*

(i) 阈值控制期内保持 $I(t) = \eta$ 所需的隔离比例唯一，为

$$q_c(S) = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S}, \qquad S_c \leq S \leq S^*; \tag{3.5}$$

(ii) 相应的状态轨迹和控制时长为

$$S(t) = \bar{S} + (S^* - \bar{S})e^{-c_0\eta(t-t_1)/N}, \qquad I(t) = \eta, \tag{3.6}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{N}{c_0\eta}\ln\frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}}; \tag{3.7}$$

(iii) 以式(3.6)代入式(3.5)定义 $q_c(t)$，则完整控制

$$c(t) = c_0, \qquad q(t) = \begin{cases} q_0, & t < t_1, \\ q_c(t), & t_1 \leq t \leq t_2, \\ q_0, & t > t_2 \end{cases} \tag{3.8}$$

使 $I(t) \leq \eta$ 对一切 $t \geq 0$ 成立。

证明. (i)(ii) 由命题 2.2(ii)，维持 $I = \eta$ 时式(2.8)几乎处处成立；取 $c = c_0$，即唯一解出式(3.5)。利用 $\beta + (1-\beta)q_c(S) = 1 - \bar{S}/S$，代入 S 的方程得

$$\dot{S} = -\frac{c_0\eta}{N}(S - \bar{S}), \qquad S(t_1) = S^*,$$

故有式(3.6)。由定理 3.1与式(3.4)，$S^* > S_c > \bar{S}$，所以轨迹严格下降，并在式(3.7)给出的有限时刻首次到达 S_c。该区间上 $q_c(S_c) = q_0$、$q_0 \leq q_c(S) < 1$，控制满足界限。

(iii) 反过来，把所得的时间函数 $q_c(t)$ 代回原方程，式(3.6)与 $I = \eta$ 满足前两个方程及启动初值，其余仓室由线性方程或积分确定。由命题 2.1中解的唯一性，该控制确实使 $I \equiv \eta$，而不只是形式上满足 $\dot{I} = 0$。由 t_1 的定义，启动前 $I < \eta$；由命题 2.2(iii)，退出后 $S < S_c$、$\dot{I} < 0$。因此全程不超过阈值。 □

将式(3.6)代入式(3.5)，隔离比例可以写成时间的显式函数：

$$\begin{aligned} q_c(t) &= 1 - \frac{1}{\left[\dfrac{\beta c_0 S^*}{\gamma N} + \beta - 1\right] e^{-c_0\eta(t-t_1)/N} + 1 - \beta} \\ &= 1 - \frac{1}{\left[\dfrac{q_0}{1-q_0} + \beta\right] e^{c_0\eta(t_2-t)/N} + 1 - \beta}. \end{aligned} \tag{3.9}$$

两种写法分别以启动时刻和退出时刻为参照。

推论 3.3. *对定理 3.2中的仅隔离控制，*

(i) 隔离比例在 t_1 从 q_0 跳升至

$$q_{\max} = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S^*} > q_0, \tag{3.10}$$

在 (t_1, t_2) 上严格递减，并在 t_2 连续恢复为 q_0；

(ii) 设隔离比例受能力约束 $q \le q_{\text{cap}}$，其中 $q_0 \le q_{\text{cap}} < 1$，则上述仅隔离控制可实施，当且仅当

$$q_{\max} \le q_{\text{cap}} \iff \frac{\beta c_0 (1 - q_{\text{cap}}) S^*}{N} \le \gamma,$$

且该条件成立时，能力约束不改变上述控制轨迹、控制时长及成本公式。

证明. (i) 由式(3.5)，$q_c(S)$ 关于 S 严格增加，$S^* > S_c$ 给出启动时的跳升。由链式法则与式(3.6)，沿控制轨迹

$$\frac{dq_c(t)}{dt} = -\frac{\gamma\eta}{\beta}\frac{S(t) - \bar{S}}{S(t)^2} < 0. \tag{3.11}$$

又 $q_c(S_c) = q_0$，故退出时连续。

(ii) 由 (i)，隔离比例在启动时取得最大值，因此全时段的能力约束等价于检查这一最大值；由式(3.10)整理即得上述等价式。该条件成立时，原控制满足能力约束，故控制轨迹、控制时长与成本公式都不变。$q_{\text{cap}} = q_{\max}$ 时，控制只在启动时恰好达到能力上限，随后严格低于上限。 □

追踪隔离的需求在启动时最大。此时社区易感者最多，常规措施下的有效再生数最高，需要隔离的接触比例也最高。若 $q_{\text{cap}} < q_{\max}$，启动状态上即使取 $q = q_{\text{cap}}$ 也有 $\dot{I} > 0$，因此只有同时减少接触才能维持 $I = \eta$；这时能否实施由推论 4.2判断。

图 2给出基准参数下仅隔离控制的三阶段轨迹。基准参数取自文献 [1] 图 3 的示例，取值见图注。该例的两个移出率 $\gamma_I = 0.1$、$\delta_I = 0.2504$ 之和即本模型的 γ；该例没有给出 δ_q，本文取 $\delta_q = \gamma$。常规控制下非隔离感染者的峰值约为 300.4 人，远高于阈值 $\eta = 38.15$ 人。仅隔离控制在非隔离感染者首次达到阈值时（$t_1 \approx 3.175$ d）启动，隔离比例跳升至 $q_{\max} \approx 0.7565$，此后随易感者减少而下降，约 5.903 d 后回到 q_0。

3.2 隔离比例的拐点

拐点是隔离比例下降最快的时刻，也就是放松隔离最急的时刻。记 $\nu = \bar{S}/S$。由式(3.5)与(3.4)，$\nu = (1-\beta)(1-q_c)$，即仅隔离控制下与易感者的接触中既未传播、也未被追踪的比例；由式(3.6)，

$$\dot{\nu} = \frac{c_0\eta}{N}\,\nu(1-\nu).$$

这一比例因而在阈值控制期内按 logistic 规律从 $\bar{S}/S^*$ 增长到 $\bar{S}/S_c$。隔离比例是 ν 的线性减函数，所以它在 ν 增长最快的 $\nu = 1/2$ 处下降最快，即在 S 经过 $2\bar{S}$ 之时。

定理 3.4. *设条件(2.7)成立，则*

(i) $q_c(t)$ 在 (t_1, t_2) 内存在唯一拐点，当且仅当

$$S_c < 2\bar{S} < S^*, \tag{3.12}$$




图 2: 基准参数下仅隔离控制与常规控制的时间轨迹：$N = 763$，$S_0 = 762$，$I_0 = 1$，$S_q(0) = I_q(0) = R(0) = 0$，$\beta = 0.155$，$\gamma = \delta_q = 0.3504$，$c_0 = 10$，$q_0 = 0.01526$，$\eta = 0.05N = 38.15$。阈值控制期 $[t_1, t_2]$ 内 $I \equiv \eta$。

等价地，$\frac{1}{2} < (1-\beta)(1-q_0) < -\frac{1}{2}W_{-1}(z_\eta)$；

(ii) 内部拐点存在时，

$$S(t_{\inf}) = 2\bar{S}, \quad t_{\inf} = t_1 + \frac{N}{c_0\eta}\ln\frac{S^* - \bar{S}}{\bar{S}}, \quad q_{\inf} = 1 - \frac{1}{2(1-\beta)}, \tag{3.13}$$

且 $q_0 < q_{\inf} < q_{\max}$，隔离比例的下降速度在 $t_{\inf}$ 唯一达到最大值。

证明. (i) 由链式法则与式(3.6)，对式(3.11)求导，得

$$\frac{d^2 q_c(t)}{dt^2} = \frac{\gamma c_0 \eta^2}{\beta N}\frac{(S-\bar{S})(2\bar{S}-S)}{S^3}. \tag{3.14}$$

由式(3.4)，阈值控制期内 $S \geq S_c > \bar{S}$，故其符号由 $2\bar{S} - S$ 决定。S 从 S^* 严格下降至 S_c，所以恰在式(3.12)成立时穿过 $2\bar{S}$，且只穿过一次。由式(3.4)与(3.2)，$2\bar{S}/S_c = 2(1-\beta)(1-q_0)$，$S^*/S_c = -W_{-1}(z_\eta)$，即得等价形式。

(ii) 将 $S = 2\bar{S}$ 代入式(3.6)及(3.5)，即得时间和隔离比例。由于 $q_c(S)$ 关于 S 严格增加且 $S_c < 2\bar{S} < S^*$，有 $q_0 = q_c(S_c) < q_{\inf} < q_c(S^*) = q_{\max}$。二阶导数先负后正，而一阶导数始终为负，故 $|dq_c/dt|$ 在该时刻唯一达到最大值。 □

拐点存在时，拐点前的时长占控制时长的比例为

$$\lambda = \frac{t_{\inf} - t_1}{t_2 - t_1} = \frac{\ln[(S^* - \bar{S})/\bar{S}]}{\ln[(S^* - \bar{S})/(S_c - \bar{S})]} \in (0, 1), \tag{3.15}$$

λ 越大，下降最快的时刻在控制期内越靠后；其参数敏感性见补充材料第 S3 节。拐点处 $\nu = 1/2$，即 $(1-\beta)(1-q_{\inf}) = 1/2$，所以拐点处的隔离比例 $q_{\inf}$ 只依赖 β：只要内部拐点存在，隔离放松最急时的隔离水平就与阈值和常规接触率无关，二者只改变这一时刻出现的早晚。条件(3.12)即 ν 在控制期内穿过 $1/2$：$\bar{S}/S_c = (1-\beta)(1-q_0) > 1/2$ 要求传播概率与常规隔离比例都不太大，$S^* > 2\bar{S}$ 要求干预启动时易感者足够多。否则没有内部拐点：$q_c(t)$ 在整个控制期内严格凹（$2\bar{S} \leq S_c$）或严格凸（$2\bar{S} \geq S^*$）。

3.3 清零时间与累计感染

退出后 $S < S_c$，常规控制下的有效再生数小于 1，I 从 η 开始下降。由常规控制下的首次积分，剩余易感者人数可由 Lambert W 函数写出，清零时间可化为一维积分。

定理 3.5. 设 t_2 时 $(S, I) = (S_c, \eta)$，此后恢复常规控制，则

(i) $S(t)$ 和 $I(t)$ 在 (t_2, ∞) 上严格递减，且

$$\lim_{t\to\infty} I(t) = 0, \qquad \lim_{t\to\infty} S(t) = S_\infty := -S_c W_0\left(-e^{-1-\eta/\rho_1}\right) \in (0, S_c); \tag{3.16}$$

(ii) 存在唯一的 $t_{\text{end}} > t_2$，满足 $I(t_{\text{end}}) = 1$、$\dot I(t_{\text{end}}) < 0$；记 $S_{\text{end}} = S(t_{\text{end}})$，则

$$S_{\text{end}} = -S_c W_0\left(-e^{-1-(\eta-1)/\rho_1}\right), \tag{3.17}$$

$$t_{\text{end}} = t_2 + \frac{1}{\beta_1^0}\int_{S_{\text{end}}}^{S_c} \frac{dS}{S[\eta + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_c - S) + \rho_1 \ln(S/S_c)]}. \tag{3.18}$$

证明见附录 A.3。其余仓室也有极限。由 $\lim_{t\to\infty} I(t) = 0$，流入 I_q 的感染趋于零；又 $\delta_q > 0$，故 $\lim_{t\to\infty} I_q(t) = 0$。$S_q$ 与 R 单调有界，因而也收敛。

注记 3.6. 设在 t_2 恢复常规控制的同时，另把比例 $\xi \in [0, 1]$ 的隔离易感者一次性转回 S。记 $S_q(t_2^-)$ 为转回前的隔离易感者人数，转回时 I, I_q, R 连续，总人口不变，则

$$S(t_2^+) = S_c + \xi S_q(t_2^-), \qquad R_e(t_2^+) = 1 + \frac{\xi S_q(t_2^-)}{S_c}, \qquad \dot I(t_2^+) = \gamma\eta\,\frac{\xi S_q(t_2^-)}{S_c}.$$

因此 $\xi S_q(t_2^-) > 0$ 时，I 在 t_2 之后立即超过 η，即退出时一次性解除对未感染接触者的隔离，会使社区感染重新增长。$\mathcal{A}(\eta)$ 中的退出不作这种释放（$\xi = 0$），定理 3.5针对的正是这一情形。

累计新增感染可以分三段计算：前后两个常规阶段的感染流入与 $-\dot S$ 成正比，阈值控制期内则可以把时间积分换成对 S 的积分。

定理 3.7. 设条件(2.7)成立，则仅隔离控制下统计至 t_{end} 的总累计新增感染为

$$\begin{aligned} I_{t_{\text{cum}}} = {} & \frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)}(S_0 - S^* + S_c - S_{\text{end}}) \\ & + \beta\left[S^* - S_c + \bar S \ln\frac{S^* - \bar S}{S_c - \bar S}\right]. \end{aligned} \tag{3.19}$$

将 S_{end} 替换为 S_∞，即得计算至无限时刻的累计新增感染。

证明. 由式(2.1)，常规控制下总新增感染的流入为 $\beta c_0 SI/N$，而 $-\dot S = c_0[\beta + (1-\beta)q_0]SI/N$，故前后常规阶段均有

$$\frac{\beta c_0 SI}{N} = \frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)}(-\dot S),$$

所以两段的积分分别由 $S_0 - S^*$、$S_c - S_{\text{end}}$ 给出。阈值控制期内用 $dt = -N\,dS/[c_0\eta(S - \bar S)]$，得

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\beta c_0 S\eta}{N}\,dt = \beta\int_{S_c}^{S^*} \frac{S}{S - \bar S}\,dS = \beta\left[S^* - S_c + \bar S \ln\frac{S^* - \bar S}{S_c - \bar S}\right].$$

三段相加即得结论；无限时刻的表达由极限得到。 □

式中第一项来自启动前和退出后，对 $\mathcal{A}(\eta)$ 中的全部控制相同。第二项是阈值控制期的新增感染，由式(3.7)可写成 $\beta(S^* - S_c) + (1-\beta)\gamma\eta\Delta t$；第 4 节对全部控制证明了同一形式（式(4.11)）。

3.4 参数的影响

各参数都通过启动状态 S^* 影响控制过程，除 η 外的参数还同时改变 S_c 或 $\bar S$。以下偏导数都在触发条件内部计算，求导时固定 N, S_0, I_0 与其余参数。对 η 求导时 N 不变，符号因而与对 $\theta = \eta/N$ 求导相同；对 q_0 求导时，在端点 $q_0 = 0$ 处取右导数。各项符号汇总于附录表 5。

引理 3.8. *在条件(2.7)下，启动状态满足*

$$\frac{\partial S^*}{\partial \eta} < 0, \qquad \frac{\partial S^*}{\partial c_0} > 0, \qquad \frac{\partial S^*}{\partial \beta} > 0, \qquad \frac{\partial S^*}{\partial q_0} < 0. \tag{3.20}$$

证明见附录 A.4。提高阈值使 S^* 减小，也使阈值控制期内 S 的下降速率 $c_0\eta(S-\bar{S})/N$ 增大，两者都减轻干预负担；代价是社区中维持的非隔离感染者更多。

命题 3.9. *设条件(2.7)成立，则仅隔离控制满足*

$$\frac{\partial t_1}{\partial \eta} > 0, \quad \frac{\partial q_{\max}}{\partial \eta} < 0, \quad \frac{\partial \Delta t}{\partial \eta} < 0, \quad \frac{\partial J_q}{\partial \eta} < 0, \quad \frac{\partial J}{\partial \eta} < 0, \tag{3.21}$$

且 $\partial I_{t_{\mathrm{cum}}}/\partial \eta > 0$；计算至无限时刻的累计新增感染也随 η 严格增加。

证明见附录 A.5。阈值越高，干预启动越晚、持续越短、强度越低，代价是更多的人被感染。清零时间还包含退出后的下降过程，需由式(3.18)单独判断。常规接触率的影响则不单调。接触率越高，控制期要消耗的易感者 $S^* - S_c$ 越多，但 S 也下降得越快；两种作用方向相反，控制时长因此可增可减。触发边界与完整的参数影响见补充材料第 S2.1 节。

这一取舍并不对称（图 3）。图中以总累计新增感染为横轴，每条曲线对应一个常规接触率，沿曲线向左阈值降低。$c_0 = 10$ 时把 η/N 从 2% 降到 0.2%，控制时长由 15.04 d 增至 152.1 d，二次干预强度成本也增大约十倍，总累计新增感染却只由 233.8 人减至 173.0 人。原因在于控制时长含因子 $N/(c_0\eta)$（式(3.7)），而累计新增感染只通过 S^* 与 S_{end} 依赖阈值（式(3.19)）。因此在这一范围内，降低阈值换来的感染减少有限，代价却是控制期成倍延长。四个常规接触率下取舍的形态相同。在所算范围内，清零时间也随阈值提高而缩短；各指标随阈值与常规接触率的完整扫描及低阈值下的渐近行为见补充材料第 S2.2 节。




图 3: 基准参数下仅隔离控制的阈值取舍：(a) 控制时长 Δt 与 (b) 成本 J 对总累计新增感染。$c_0 = 5, 8, 10, 12\ \mathrm{d}^{-1}$ 各一条曲线（颜色区分），η/N 由 0.2% 变到 5%，其余参数同图 2；标记形状区分 $\eta/N = 0.2\%, 0.5\%, 1\%, 2\%, 5\%$。时间与成本以天计，累计新增感染以人计。

4 联合控制

阈值控制期内 S 严格下降，因此可以用易感者人数代替时间。每个控制组合对应接触率的一个状态函数，控制时长、感染与隔离人数都化为对 S 的积分。本节及后文的最优控制都指阈值策略下的最优控制，即在 $\mathcal{A}(\eta)$ 或其能力约束下的控制类中取最优。

4.1 状态参数化

记接触率与隔离比例的状态函数为 $c_c(S)$、$q_c(S)$，控制为 $c(t)=c_c(S(t))$、$q(t)=q_c(S(t))$。由平衡式(2.8)与 $\bar{S}$ 的定义(3.4)，易感者方程化为

$$\dot{S}=-\frac{\eta}{N}\left[c_c(S)S-c_0\bar{S}\right], \tag{4.1}$$

其中 $c_0\bar{S}\eta/N$ 是第 3 节所述既未传播、也未被追踪的接触流，对所有控制组合都相同。因此接触率越高，S 下降越快：有效再生数固定为 1 时，保留的接触越多，所需的隔离比例越高，被追踪隔离的未感染接触者也越多。状态函数 c_c 的两个极端是仅隔离控制 $c_c\equiv c_0$ 和仅减少接触 $c_c=c_0S_c/S$。

定理 4.1. 设条件(2.7)成立，则

(i) 在几乎处处相等的意义下，$\mathcal{A}(\eta)$ 中的控制与满足

$$\frac{c_0S_c}{S}\le c_c(S)\le c_0,\qquad S\in[S_c,S^*], \tag{4.2}$$

的有界可测函数 c_c 一一对应，隔离比例由

$$q_c(S)=1-\frac{\gamma N}{\beta c_c(S)S}=1-\frac{c_0(1-q_0)S_c}{c_c(S)S} \tag{4.3}$$

确定；

(ii) 状态轨迹与控制时长满足

$$t-t_1=\frac{N}{\eta}\int_{S(t)}^{S^*}\frac{du}{c_c(u)u-c_0\bar{S}}, \tag{4.4}$$

$$\Delta t[c_c]=\frac{N}{\eta}\int_{S_c}^{S^*}\frac{dS}{c_c(S)S-c_0\bar{S}}, \tag{4.5}$$

式(4.4)唯一确定严格递减的 $S(t)$；

(iii) 选取满足式(4.2)的逐点代表后，c 与 q 在 t_2 处的左极限分别为 c_0 与 q_0；若 $c_c(S)$ 连续，则两控制在阈值控制期内部连续。

证明见附录 A.6。

现实中接触率不能无限压低，追踪隔离也有能力上限，本文把这两类限制统称为能力约束：接触率不低于 $c_{\min}$，隔离比例不超过 q_{cap}，其中 $0\le c_{\min}\le c_0$、$q_0\le q_{\mathrm{cap}}<1$。能力约束只限制两种干预的强度，不限制调整速度。能力约束下的控制类为

$$\mathcal{A}(\eta;c_{\min},q_{\mathrm{cap}})=\left\{(c,q)\in\mathcal{A}(\eta):c(t)\ge c_{\min},\ q(t)\le q_{\mathrm{cap}}\ \text{在}[t_1,t_2]\ \text{上几乎处处成立}\right\}.$$

由式(4.3)，给定 S 后 q 由 c 唯一确定，因此两项能力约束把式(4.2)收窄为逐状态区间 $[c^-(S),c^+(S)]$：

$$c^-(S)=\max\left\{c_{\min},\frac{c_0S_c}{S}\right\},\qquad c^+(S)=\min\left\{c_0,\frac{c_0(1-q_0)S_c}{(1-q_{\mathrm{cap}})S}\right\}. \tag{4.6}$$

推论 4.2. 设条件(2.7)成立，则

(i) 能力约束等价于 $c^-(S)\le c_c(S)\le c^+(S)$；

(ii) $\mathcal{A}(\eta;c_{\min},q_{\mathrm{cap}})$ 非空，即从 S^* 到 S_c 的整段阈值控制可行，当且仅当

$$\frac{\beta c_{\min}(1-q_{\mathrm{cap}})S^*}{N}\le\gamma, \tag{4.7}$$

或等价地 $c_{\min}(1-q_{\mathrm{cap}})\le c_0(1-q_{\max})$，其中 $q_{\max}$ 由式(3.10)给出。

证明. (i) 由 $c_c\ge c_{\min}$ 与式(4.2)得下界 c^-。由式(4.3)，$q_c\le q_{\mathrm{cap}}$ 等价于 $c_c(S)\le c_0(1-q_0)S_c/[(1-q_{\mathrm{cap}})S]$，与式(4.2)合起来得上界 c^+。

(ii) 在 $S\in[S_c,S^*]$ 上已有 $c_0S_c/S\le c_0$、$c_0S_c/S\le c_0(1-q_0)S_c/[(1-q_{\mathrm{cap}})S]$ 及 $c_{\min}\le c_0$，故只需检验

$$c_{\min}\le\frac{c_0(1-q_0)S_c}{(1-q_{\mathrm{cap}})S}.$$

其最严格处为 $S=S^*$，即式(4.7)。由式(3.10)，$\beta c_0(1-q_{\max})S^*/N=\gamma$，故该式等价于 $c_{\min}(1-q_{\mathrm{cap}})\le$

$c_0(1-q_{\max})$。条件成立时取 $c_c=(c^-+c^+)/2$，由定理 4.1得到可行控制；条件不成立时，启动状态附近不存在允许控制。 □

减少接触扩大了可行范围：仅隔离控制的条件 $q_{\max}\le q_{\mathrm{cap}}$ 即 $c_0(1-q_{\mathrm{cap}})\le c_0(1-q_{\max})$，而推论中的条件只是把左端的 c_0 换成 $c_{\min}$。当 $q_{\mathrm{cap}}<q_{\max}$ 而式(4.7)成立时，启动后的一段时间内必须同时减少接触：由式(4.6)，只要 $S>(1-q_0)S_c/(1-q_{\mathrm{cap}})$，就有 $c^+(S)<c_0$。易感者降到这一水平以下后，$c_c=c_0$ 重新落入允许区间。若式(4.7)不成立，等到 $I=\eta$ 才启动的阈值策略不可行；提前干预会改变启动状态，其可行性需另行分析。

提高阈值使可行条件更容易满足。由引理 3.8，S^* 随 η 严格下降，式(4.7)左端随之减小。因此，若某一阈值可行，则所有更高且仍触发控制的阈值都可行（其余参数与能力约束固定）。反过来，降低阈值使启动状态 S^* 增大，启动时所需的干预更强，可能超出能力约束。

4.2 显式控制族

常数 $\alpha\in[0,1]$ 给出一族连接两种单控制的控制：

$$c_c(S;\alpha)=c_0\left[\alpha+(1-\alpha)\frac{S_c}{S}\right], \tag{4.8}$$

$$q_c(S;\alpha)=1-\frac{(1-q_0)S_c}{S_c+\alpha(S-S_c)}. \tag{4.9}$$

式(4.8)给出的接触率满足式(4.2)。$\alpha=0$ 对应仅减少接触，$\alpha=1$ 对应仅隔离控制；第 6 节用 $\alpha=0.5$ 作对照，后文的最优控制则在全部允许的 $c_c(S)$ 中求取。完整状态轨迹、控制时长、能力约束下的参数范围及证明见补充材料第 S4 节。

4.3 不同目标的最优控制

控制期的感染与隔离人数可以由一个计数关系得到。维持 $I=\eta$ 要求未被追踪的新感染以恒定速率 $\gamma\eta$ 进入 I。阈值控制期内 S 共减少 S^*-S_c，对所有控制都相同，其中 $\gamma\eta\Delta t$ 是这类感染，其余是被追踪的接触者。

定理 4.3. 设 c_c、$c_c^{(1)}$、$c_c^{(2)}$ 是 $\mathcal{A}(\eta)$ 中控制的状态函数。

(i) 若 $c_c^{(1)}(S)\ge c_c^{(2)}(S)$ 几乎处处成立，则 $\Delta t[c_c^{(1)}]\le\Delta t[c_c^{(2)}]$，且前一不等式在正测度集合上严格成立时后一不等式严格；特别地，

$$\frac{N}{c_0\eta}\ln\frac{S^*-\bar S}{S_c-\bar S}\le\Delta t[c_c]\le\frac{N(S^*-S_c)}{c_0\eta(S_c-\bar S)}, \tag{4.10}$$

左侧等号成立当且仅当 $c_c(S)=c_0$ 几乎处处（仅隔离控制），右侧等号成立当且仅当 $c_c(S)=c_0S_c/S$ 几乎处处（仅减少接触）；

(ii) 显式族的 $\Delta t(\alpha)$ 在 $[0,1]$ 上严格递减；

(iii) 沿 c_c 对应的控制，阈值控制期累计新增感染与新增隔离易感者人数分别满足

$$I_{t_{\mathrm{cum}}}(t_2)-I_{t_{\mathrm{cum}}}(t_1)=\beta(S^*-S_c)+\gamma\eta(1-\beta)\Delta t, \tag{4.11}$$

$$S_q(t_2)-S_q(t_1)=(1-\beta)\left[S^*-S_c-\gamma\eta\Delta t\right]; \tag{4.12}$$

(iv) 阈值控制期累计新增感染是控制时长的严格增函数，新增隔离易感者人数是控制时长的严格减函数。

证明. (i) 式(4.5)的被积函数关于 $c_c(S)$ 严格递减。$c_c^{(1)}\ge c_c^{(2)}$ 几乎处处成立时，两被积函数之差几乎处处非负，积分即得 $\Delta t[c_c^{(1)}]\le\Delta t[c_c^{(2)}]$；差在正测度集合上为正时，不等式严格。由式(4.2)又有

$$\frac{1}{c_0(S-\bar S)}\le\frac{1}{c_c(S)S-c_0\bar S}\le\frac{1}{c_0(S_c-\bar S)},$$

积分即得两界。等号成立要求相应非负积分差为零，即两个状态函数几乎处处相等。

(ii) 显式族中 $c_c(S;\alpha)$ 对 $S > S_c$ 随 α 严格增加，由 (i)，其控制时长严格减少。

(iii) 积分式(4.1)，得

$$S^* - S_c = \frac{\eta}{N}\int_{t_1}^{t_2} c(t)S(t)\,dt - \frac{c_0\eta\bar{S}}{N}\Delta t.$$

右端积分项乘以 β 即为阈值控制期总新增感染；由 $\beta c_0\bar{S}/N = \gamma(1-\beta)$，得到式(4.11)。阈值控制期离开 S 的人群分为新感染者与未感染的隔离者，故

$$S^* - S_c = I_{t_{\text{cum}}}(t_2) - I_{t_{\text{cum}}}(t_1) + S_q(t_2) - S_q(t_1),$$

代入前式得到式(4.12)。

(iv) 由 $0 < \beta < 1$，式(4.11)中 Δt 的系数 $\gamma\eta(1-\beta)$ 为正，式(4.12)中的系数 $-(1-\beta)\gamma\eta$ 为负，其余各项对所有控制相同。 □

被追踪的接触者中比例 β 已感染、$1-\beta$ 未感染，追踪隔离因而也把未感染者移出社区，加快 S 的下降。控制越快，未被追踪的感染越少、被追踪的接触者越多，因而控制期感染越少、被隔离的未感染者越多；不考虑能力约束时，两端分别是仅隔离控制与仅减少接触。这一同序与反序依赖于各控制在同一状态 (S^*,η) 进入、(S_c,η) 退出，以及隔离易感者不返回社区；隔离易感者返回的情形不在本定理范围内。

推论 4.4. 设式(4.7)成立，则

(i) $\mathcal{A}(\eta;c_{\min},q_{\text{cap}})$ 中的任一控制满足

$$\Delta t[c^+] \le \Delta t[c_c] \le \Delta t[c^-], \tag{4.13}$$

其中两端由式(4.5)分别代入 $c^+(S)$、$c^-(S)$ 计算，均可达到，且达到左、右等号分别要求 $c_c = c^+$、$c_c = c^-$ 几乎处处成立；

(ii) c^+ 与 c^- 对应的控制分别使阈值控制期累计新增感染在该控制类中最少和最多。

证明. (i) 由推论 4.2(i)，可行控制满足 $c^- \le c_c \le c^+$；按定理 4.3(i) 的方式在式(4.5)中比较，即得式(4.13)及等号条件。两个边界函数连续且满足能力约束，由定理 4.1对应可行控制，故两端均可达到。

(ii) 由 (i) 与定理 4.3(iv) 得到。 □

推论 4.5. 设两个允许控制在启动前及退出后均采用 (c_0,q_0)，并从同一初始状态首次到达同一阈值 η，则

(i) 二者的清零时间与总累计新增感染满足

$$t_{\text{end}}^{(1)} - t_{\text{end}}^{(2)} = \Delta t^{(1)} - \Delta t^{(2)}, \tag{4.14}$$

$$I_{t_{\text{cum}}}^{(1)} - I_{t_{\text{cum}}}^{(2)} = \gamma\eta(1-\beta)\big(\Delta t^{(1)} - \Delta t^{(2)}\big), \tag{4.15}$$

第二式对计算至无限时刻的累计新增感染同样成立；

(ii) 设式(4.7)成立，则在 $\mathcal{A}(\eta;c_{\min},q_{\text{cap}})$ 中，$c^+(S)$ 同时达到最短的控制时长、最早的清零时间和最少的全过程累计新增感染。

证明. (i) 两个控制在启动前相同，由命题 2.1中解的唯一性，控制前两条轨迹相同，故 t_1, S^* 相同。退出时的状态均为 (S_c,η)，由常规系统解的唯一性，退出后的 S,I 轨迹只相差时间平移；因此两者从退出到 $I = 1$ 所需的时间相同，退出后的新增感染积分也相同。消去两者共同的前后两段，再用式(4.11)，即得所列等式。

(ii) 由推论 4.4，c^+ 的控制时长最短，再由 (i) 即得。 □

由以上两个推论与式(4.12)，在能力约束下，以控制时长、清零时间或累计新增感染为目标的最优控制都是 $c^+(S)$，以新增隔离易感者人数为目标的最优控制是 $c^-(S)$，两者都在几乎处处意义下唯一。两端之间的每个控制时长也都可以实现：取 $c_c = (1-x)c^- + xc^+$，控制时长随 $x \in [0,1]$ 连续变化。能力足够时，两端就是两种单控制。

推论 4.6. *对能力约束下的控制类 $\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\mathrm{cap}})$，*

(i) *若 $q_{\mathrm{cap}} \geq q_{\max}$，则 $c^{+}(S) \equiv c_0$，因此无论 $c_{\min}$ 取何值，仅隔离控制都是该控制类中控制时长最短、累计新增感染最少的控制；*

(ii) *若 $c_{\min} \leq c_0 S_c / S^{*}$，则 $c^{-}(S) = c_0 S_c / S$，因此无论 q_{cap} 取何值，仅减少接触都使该控制类中的新增隔离易感者人数最少。*

证明. 由式(3.10)与(2.2)，$1 - q_{\max} = (1 - q_0) S_c / S^{*}$，故 $q_{\mathrm{cap}} \geq q_{\max}$ 等价于 $(1 - q_{\mathrm{cap}}) S^{*} \leq (1 - q_0) S_c$，从而对 $S \leq S^{*}$ 有 $c_0 (1 - q_0) S_c / [(1 - q_{\mathrm{cap}}) S] \geq c_0$，由式(4.6)得 $c^{+} \equiv c_0$。若 $c_{\min} \leq c_0 S_c / S^{*}$，则对 $S \leq S^{*}$ 有 $c_0 S_c / S \geq c_{\min}$，故 $c^{-}(S) = c_0 S_c / S$。两种情形下式(4.7)都成立，其余结论由推论 4.4、4.5与式(4.12)得到。 □

此外，若只对控制时长、清零时间和累计新增感染设上限，则存在满足上限的控制当且仅当 c^{+} 满足这些上限。

5 成本最优控制

以控制时长、感染或隔离人数为目标时，最优控制取允许区间的一端（第 4.3 节）。二次干预强度成本 J（式(2.12)）同时计入两种干预的强度，最优控制一般落在区间内部。本节先把最小化 J 约化为逐状态问题，再给出最优组合的结构，然后讨论它随阈值、能力约束与成本权重的变化。

5.1 逐状态约化

与控制时长一样，J 可以写成对 S 的积分。由式(4.3)与(4.4)，

$$J[c_c] = \frac{N}{\eta} \int_{S_c}^{S^{*}} f(S, c_c(S))\, dS, \tag{5.1}$$

其中

$$f(S, c) = \frac{w_c (1 - c/c_0)^2 + w_q \left(1 - \dfrac{c_0 S_c}{cS}\right)^2}{cS - c_0 \bar{S}}. \tag{5.2}$$

被积项 $(N/\eta) f(S, c)$ 是 S 每减少一人所付的成本：分子是两种归一化强度 $(c_0 - c)/c_0$ 与 $(q - q_0)/(1 - q_0) = 1 - c_0 S_c / (cS)$ 的平方加权和，分母与 S 的下降速度成正比（式(4.1)）。

下文记 $[c^{-}(S), c^{+}(S)]$ 为状态 S 上的允许区间：不考虑能力约束时 $c^{-}(S) = c_0 S_c / S$、$c^{+}(S) = c_0$（式(4.2)），考虑能力约束时由式(4.6)给出。对每个 S 取 $f(S, \cdot)$ 在允许区间上的一个最小点，所得函数称为*逐状态最小化选择*，记为 c_c^{*}，相应的隔离比例记为 q_c^{*}（式(4.3)）。

定理 5.1. *设条件(2.7)成立；考虑能力约束时另设式(4.7)成立。在 $\mathcal{A}(\eta)$ 或 $\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\mathrm{cap}})$ 中：*

(i) *二次干预强度成本的最小值可以达到，且*

$$\min_{c_c} J[c_c] = \frac{N}{\eta} \int_{S_c}^{S^{*}} \min_{c^{-}(S) \leq c \leq c^{+}(S)} f(S, c)\, dS; \tag{5.3}$$

(ii) *允许控制 c_c 达到最小值，当且仅当对几乎所有 S，$c_c(S)$ 是 $f(S, \cdot)$ 在允许区间上的最小点；*

(iii) *对每个 $S > S_c$，这样的最小点只能是 $c^{-}(S)$、$c^{+}(S)$ 或区间内 $f(S, \cdot)$ 的驻点，驻点方程可化为关于 c 的五次多项式方程（附录式(A.8)）。*

证明见附录 A.7。因此每个状态只需比较至多七个候选（$S = S_c$ 时允许区间退化为 $c = c_0$），不需要 $f(S, \cdot)$ 凸或单峰。在 S 坐标下，约束只限制每个状态上的接触率，各状态的选择互不影响；总时长、累计预算等跨状态约束会打破这种分离（第 8.4 节）。成本最优控制由五次方程的根逐状态给出，时间轨迹再由式(4.4)积分得到；两种单控制的成本则有闭式（附录 B）。

5.2 最优组合的结构

记隔离与接触的成本权重之比为 $r = w_q/w_c$。最优组合的结构由两个与阈值无关的量决定：状态

$$S_{\mathrm{sw}} = \frac{3S_c + \sqrt{9S_c^2 - 8S_c\bar{S}}}{2} \tag{5.4}$$

与权重阈值

$$r_{\mathrm{cont}}(b) = \frac{16}{\left(b + \sqrt{b^2 - 8b + 8}\right)^2}, \qquad b = \frac{\bar{S}}{S_c} = (1-\beta)(1-q_0). \tag{5.5}$$

b 是常规控制下与易感者的接触中既未传播、也未被追踪的比例（第 3 节），只依赖传播概率与常规隔离比例。由 $0 < b < 1$，S_{sw} 介于常规传播临界值的两倍与三倍之间；r_{cont} 随 b 严格增，且 $2 < r_{\mathrm{cont}} < 4$。

定理 5.2. *设条件(2.7)成立，$0 < r \le r_{\mathrm{cont}}$，不考虑能力约束，则*

(i) *对每个 $S > S_c$，$f(S,\cdot)$ 在 $[c_0S_c/S, c_0]$ 上有唯一最小点 $c_c^*(S)$，c_c^* 在 (S_c,∞) 上连续，且在 S_c 处的右极限为 c_0；*

(ii) *$S \ge S_{\mathrm{sw}}$ 时 $c_c^*(S) = c_0$，$S_c < S < S_{\mathrm{sw}}$ 时 $c_0S_c/S < c_c^*(S) < c_0$；*

(iii) *成本最优控制几乎处处等于连续的状态反馈 c_c^*，且 $S^* > S_{\mathrm{sw}}$ 时它在 $S \ge S_{\mathrm{sw}}$ 上为仅隔离控制，并在 S_{sw} 处连续地转为两种措施并用；$S^* \le S_{\mathrm{sw}}$ 时阈值控制期内部两种措施并用。*

证明见附录 A.10。权重条件保证每个状态上的成本单峰，成本最优控制因而唯一，并随易感者减少连续调整。

有没有仅隔离段由启动状态决定。S^*/S_c 正是启动时常规措施下的有效再生数，所以仅隔离段要求这一再生数超过 S_{sw}/S_c，即介于 2 与 3 之间的某个值，而不只是超过 1。这一条件也可以直接用阈值判断。设 $S_0 > S_{\mathrm{sw}}$，记 η_{sw} 为常规轨迹(2.5)在 $S = S_{\mathrm{sw}}$ 处的非隔离感染者人数。常规轨迹上 S 从 S_0 降到 S_c 时 I 严格增加，所以 $S^* > S_{\mathrm{sw}}$ 当且仅当 $\eta < \eta_{\mathrm{sw}}$，即常规轨迹在易感者降到 S_{sw} 之前就达到阈值。

因此，仅隔离段在两种情形下消失。一是常规传播较弱：初始时常规措施下的有效再生数 S_0/S_c 不超过 S_{sw}/S_c（例如不超过 2），这时无论阈值取多少，成本最优控制都从启动起就两者并用。二是启动较晚：$\eta \ge \eta_{\mathrm{sw}}$，达到阈值时易感者已经降到 S_{sw} 以下。由引理 3.8，降低阈值、提高常规接触率或传播概率都使 S^* 增大；后两者还使 S_c 与 S_{sw} 减小。所以常规传播越强、阈值越低，越可能出现仅隔离段；提高常规隔离比例的作用相反。原因在于易感者多时，减少接触会放慢易感者的下降，其代价超过所节省的隔离强度（见命题 5.3后的说明）。“先仅隔离、后两者并用”因而不是阈值策略固有的时间顺序，而是由传播强度与启动时机共同决定的结构。

默认权重 $r = 2$ 对所有允许参数都满足 $r \le r_{\mathrm{cont}}$；两组参数下 r_{cont} 分别约为 3.1358 与 2.5477。两组算例的启动状态又都满足 $S^* > S_{\mathrm{sw}}$（比值见表 1与表 3的注），所以算例中“先仅隔离、后两者并用”的结构（第 6.2、7.2 节）是定理的结论。

下面的命题对任意权重成立，给出定理中不依赖 $r \le r_{\mathrm{cont}}$ 的部分。

命题 5.3. *设条件(2.7)成立，$w_c, w_q > 0$，则*

(i) *不考虑能力约束时，对每个 $S \in (S_c, S^*]$，仅减少接触的取值 $c = c_0S_c/S$ 不是 $f(S,\cdot)$ 在允许区间 $[c_0S_c/S, c_0]$ 上的局部最小点；*

(ii) *不考虑能力约束时，对 $S \in (S_c, S^*]$，仅隔离控制的取值 $c = c_0$ 在 $S > S_{\mathrm{sw}}$ 时是严格局部最小点，在 $S < S_{\mathrm{sw}}$ 时不是局部最小点；*

(iii) *因此，$\mathcal{A}(\eta)$ 中的任一成本最优控制在几乎所有 $S \in (S_c, S^*]$ 上满足 $q_c^*(S) > q_0$，在几乎所有 $S \in (S_c, \min\{S_{\mathrm{sw}}, S^*\})$ 上满足 $c_0S_c/S < c_c^*(S) < c_0$，即两种措施同时强于常规水平；*

(iv) *考虑满足 $c_{\min} < c_0$、$q_{\mathrm{cap}} > q_0$ 与式(4.7)的能力约束时，$\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\mathrm{cap}})$ 中的成本最优控制同样满足 (iii) 的两条结论。*

证明见附录 A.8。在 $c = c_0$ 处接触项的代价与导数都为零，因此略减接触只有两个一阶效应：所需的隔离强度降低，S 的下降却放慢。二者都与 w_q 成正比，故 S_{sw} 与权重无关；$S > S_{\mathrm{sw}}$ 时后一效应占优，$S = S_{\mathrm{sw}}$ 时二者相抵，命题在此不作分类。所以，无论权重如何，成本最优控制都不单独减少接触，仅隔离段也都要求启动时 $S^* > S_{\mathrm{sw}}$；定理 5.2进一步在 $r \le r_{\mathrm{cont}}$ 时把 (ii) 中的局部最优加强为全局最优。

权重更大时，S_{sw} 以上可能出现成本更低的内部局部最优，仅隔离段因而提前结束（第 6.4 节）。补充命题 S5.4进一步证明，对任意权重，成本最优控制在阈值控制期内部至多跳变一次，跳变时接触率与隔离比例同时下降；$r > r_{\mathrm{cont}}$ 时状态反馈恰有一次跳变，所以定理 5.2的权重阈值不能放宽。

退出附近的组合则由权重直接决定。

命题 5.4. *设 $w_c, w_q > 0$，c_c^* 为任一逐状态最小化选择。*

(i) 不考虑能力约束时，存在 $\delta > 0$，使 $S_c < S < S_c + \delta$ 时

$$\frac{c_0 S_c}{S} < c_c^*(S) < c_0, \qquad q_0 < q_c^*(S) < 1, \tag{5.6}$$

即两种干预均严格强于常规水平；并且

$$\begin{aligned} \lim_{S \to S_c^+} \frac{(c_0 - c_c^*(S))/c_0}{1 - S_c/S} &= \frac{w_q}{w_c + w_q}, \\ \lim_{S \to S_c^+} \frac{(q_c^*(S) - q_0)/(1 - q_0)}{1 - S_c/S} &= \frac{w_c}{w_c + w_q}; \end{aligned} \tag{5.7}$$

(ii) 不考虑能力约束时，最小成本严格小于仅减少接触与仅隔离控制各自的成本；

(iii) 考虑满足 $c_{\min} < c_0$、$q_{\mathrm{cap}} > q_0$ 的能力约束时，(i) 仍成立；(ii) 中与某一种单控制的严格成本比较，在该单控制整段可行时仍成立。

证明见附录 A.9。退出附近，无论怎样组合，两种归一化强度之和都近似等于 $1 - S_c/S$，而组合对 S 下降速度的影响是高阶小量，因此最优做法是按二次代价分担这一总强度：两种归一化强度之比趋于 w_q/w_c，即权重的反比。默认权重下，两者分别占总强度的 2/3 与 1/3。

由命题 5.3(iii)、命题 5.4(ii) 与定理 4.3，不考虑能力约束时，成本最优控制的控制时长、控制期累计新增感染与新增隔离易感者人数都严格介于两种单控制之间：与仅隔离控制相比，它以更长的控制期和更多的感染换取更低的成本。

5.3 参数与约束的影响

阈值只通过系数 N/η 与积分上限 $S^*(\eta)$ 进入式(5.3)，二者都随 η 增大而减小；每个状态上的最优选择则与阈值无关。

命题 5.5. *固定 $N, S_0, I_0, \beta, \gamma, c_0, q_0$ 与能力约束，记 $J_{\min}(\eta)$ 为阈值 η 下式(5.3)的最小值。*

(i) 在控制被触发且式(4.7)成立的阈值范围内，$J_{\min}$ 随 η 严格下降；对其中任意两个阈值，可以选取成本最优控制，使二者在共同经过的易感者状态上取相同的 $c_c^*(S)$ 与 $q_c^*(S)$；

(ii) 固定阈值时，降低 $c_{\min}$ 或提高 q_{cap} 不会增大最小成本。

证明见附录 A.12。成本最优控制因而可以取成同一个状态反馈，阈值只决定从哪个 S^* 开始使用它。能力约束下，单峰性给出成本最优控制的显式形式。

推论 5.6. *设 $0 < r \le r_{\mathrm{cont}}$，式(4.7)成立，$c_c^*$ 为定理 5.2中不考虑能力约束的成本最优控制。则 $\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\mathrm{cap}})$ 中的成本最优控制几乎处处等于*

$$c_{\mathrm{cap}}^*(S) = \min\bigl\{c^+(S), \max\{c^-(S), c_c^*(S)\}\bigr\}, \tag{5.8}$$

其中 $c^{\pm}$ 见式(4.6)。

单峰函数在闭子区间上的最小点，就是原最小点截断到该子区间（附录 A.10）。干预能力不足时，只需在每个状态上把理想的组合推到能力边界，不必重新规划整个控制过程；第 6.3 节给出两个代表点上的这种轨迹。

成本权重的影响不需要单峰性也可以确定。

命题 5.7. 固定 $w_c > 0$ 与控制类 $\mathcal{A}(\eta)$ 或 $\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\mathrm{cap}})$（后者设式(4.7)成立）。对 $r = w_q/w_c$，记 c_r^* 为任一逐状态最小化选择，q_r^* 为相应的隔离比例。

(i) 若 $0 < r_1 < r_2$，则对每个 $S \in (S_c, S^*]$ 有 $c_{r_2}^*(S) \le c_{r_1}^*(S)$、$q_{r_2}^*(S) \le q_{r_1}^*(S)$；因此，成本最优控制的控制时长与阈值控制期累计新增感染随 r 不减，新增隔离易感者人数随 r 不增；最小成本 $J_{\min}/w_c$ 是 r 的凹且不减的函数；

(ii) 固定 r，$q_r^*(S)$ 随 S 不减，即隔离比例在阈值控制期内随时间不增。

证明见附录 A.11。追踪隔离的相对代价提高时（例如流调人力或隔离场所紧张），成本最优控制在每个状态上不多用追踪隔离、不少减少接触，社区易感者的下降因而不会加快。接触率没有类似的时间单调性：在定理 5.2的条件下，它在 S_{sw} 以下低于 c_0，退出时又回到 c_0。不考虑能力约束时，仅隔离控制的成本 $J[c_0]$ 与 r 成正比，而 $J_{\min}/w_c$ 是 r 的凹函数，且 $\lim_{r\to 0^+} J_{\min}/w_c = 0$，所以比值 $J_{\min}/J[c_0]$ 随 r 不增：隔离的相对代价越低，仅隔离控制越接近成本最优。

6 联合控制的数值结果

本节用基准参数展示第 4、5 节的结果：先比较四种控制，再给出能力约束与成本权重下的计算结果。西安参数下的相应结果见第 7.2 节。

6.1 参数与方法

本节采用基准参数（图 2），这是一个小人口算例，用来演示解析结果。阈值策略的比较采用无回流模型(2.1)，控制属于 $\mathcal{A}(\eta)$ 或其能力约束子类；各指标的统计时段见第 2.4 节，成本权重取默认值。

控制时长、累计新增感染、新增隔离易感者人数与成本由第 3–5 节的闭式解或对 S 的一维积分（式(4.5)、(5.1)）得到，成本最优控制按定理 5.1逐状态选取。两感染仓室人数之和的峰值由完整仓室方程直接积分得到，控制以按名义模型预先算出的开环形式输入；求解器与核验见补充材料第 S8 节。第 6.3、6.4 节只在有限个代表点和网格点上计算。η 与其余参数、初值固定时，δ_q 不影响无回流模型中闭合的 (S, I) 子系统，因而不改变控制律、控制时长、累计新增感染与 J；它只影响 I_q, R 及含这些仓室的派生指标，包括 $\max(I + I_q)/\eta$。

6.2 四种控制的比较

成本最低的控制不是最快的控制。表 1比较不考虑能力约束时的四种控制。控制时长从长到短依次为仅减少接触、$\alpha = 0.5$、成本最优控制与仅隔离控制；由定理 4.3(iv) 与推论 4.5，这一排序同时决定了清零时间、累计新增感染与新增隔离易感者人数的排序。与最快的仅隔离控制相比，成本最优控制使 J 降低约 4.7%，控制时长与总累计新增感染分别增加约 31.4% 与 7.3%。

成本最优控制先仅隔离、后两者并用，这是定理 5.2的结论：默认权重满足定理的条件，启动状态 S^* 又高于 S_{sw}（比值见表 1注）。逐点的数值核对见补充材料第 S8 节。前段较短，约 1.61 d，却完成了阈值控制期 S 下降的一半以上：S 越大，下降越快，所以控制期的大部分时间落在两者并用的后段。

成本最优控制与仅隔离控制在 $S \ge S_{\mathrm{sw}}$ 上相同，J 与 Δt 的差别全部来自 $S < S_{\mathrm{sw}}$ 一段。成本最优控制在这里取 $c_c(S) < c_0$，于是 S 下降变慢，控制期延长；同时接触减少分担了维持 $I = \eta$ 所需的干预，隔离强度降低，二次干预强度成本因而下降。后段的接触减少并不大：接触率最多降低约 19.8%。

追踪隔离越强的控制，两感染仓室人数之和 $I + I_q$ 在这组参数下越高：I 维持在 η，被追踪的感染者则不断进入 I_q。追踪隔离把一部分感染者从社区转入隔离，控制了社区传播，隔离点的负荷则随之增加。按补充材料第 S1 节的比例近似，这也意味着重症监护需求更高；控制时长的比较以各控制共用同一阈值为前提。仅隔离控制、成本最优控制与仅减少接触下，$\max(I + I_q)/\eta$ 分别约为 1.92、1.89 与 1.02（表 1，图 4(c)）。这一峰值出现在后段，成本最优控制的隔离较弱，因此峰值略低。

表 1: 基准参数下不考虑能力约束时四种控制的比较（$w_c = 1, w_q = 2$）

控制	Δt（d）	t_{end}（d）	$I_{t_{\text{cum}}}$	ΔS_q	J（d）	$\max_t (I + I_q)/\eta$
仅减少接触	36.26	64.13	628.6	40.9	11.94	1.02
显式族 $\alpha = 0.5$	9.24	37.11	323.4	346.2	2.55	1.64
仅隔离控制	5.90	33.77	285.7	383.9	2.22	1.92
成本最优控制	7.75	35.62	306.6	363.0	2.12	1.89

注：$\Delta S_q = S_q(t_2) - S_q(t_1)$；$I_{t_{\text{cum}}}$ 与 ΔS_q 以人计，峰值统计至 t_{end}。四种控制采用同一完整初值（图 2）。$S^*/S_c \approx 4.044$，S_{sw}/S_c（式(5.4)）≈ 2.265。




图 4: 基准参数下不考虑能力约束时四种控制的时间轨迹（$w_c = 1, w_q = 2$）。(a) 接触率；(b) 隔离比例；(c) 两感染仓室人数之和与阈值之比 $(I + I_q)/\eta$；(d) 社区易感者比例。红色虚线依次为 q_0、1 与 S_c/N。各轨迹画至自身的清零时间，t 以天计。

6.3 能力约束

能力约束把能力平面分成三个区域（图 5(a)）：至少一种单控制可行，只有联合控制可行，以及阈值策略不可行。由推论 3.3，仅隔离控制可行当且仅当 $q_{\text{cap}} \geq q_{\max}$。仅减少接触的接触率 $c_0 S_c/S$ 在 $S = S^*$ 处最低，因此它可行当且仅当 $c_{\min} \leq c_0 S_c/S^*$。两者都不成立时，联合控制是否可行由推论 4.2判断。

代表能力组合（图 5(a) 中的红点）落在只有联合控制可行的区域。仅隔离控制需要 $q_{\max} \approx 0.7565$，仅减少接触需要把接触率降低约 75.3%，都超出能力，因此由推论 4.4，最快与最慢的控制 $c^{+}(S)$、$c^{-}(S)$ 都不是单控制。在这一点上，能力约束提高了最小成本，也延长了控制期：能力约束下的成本最优控制给出 $J \approx 2.361$ d、$\Delta t \approx 8.34$ d，都高于表 1中的值。最小成本的增加与命题 5.5一致，控制时长的增加则是这一代表点上的数值结果。

增加的成本与时长全部来自能力约束起作用的前一段。启动后的一段时间内，隔离比例停在上限，接触率同时降低，降幅随 S 下降而减小（图 5(b)）；易感者降到 $(1-q_0)S_c/(1-q_{\text{cap}})$ 以下后，仅隔离控制重新可行（第 4.1 节）。由推论 5.6，能力约束下的成本最优控制是把不考虑能力约束的控制截断到允许区间；在代表点上，后者此后也满足两项能力约束，因此能力约束下的控制在同一 S 上与它取相同的 $c_c(S)$、$q_c(S)$，只是到达得更晚。由于 J 与 Δt 都是对 S 的积分，增量只来自此前的一段（各段时长见补充材料第 S8 节）。




图 5: 基准参数下能力约束的可行区域与代表轨迹。(a) 横轴为最大接触减少比例 $1 - c_{\min}/c_0$，纵轴为隔离比例上限 q_{cap}；灰色、浅红色、浅蓝色分别表示阈值策略不可行、只有联合控制可行、至少一种单控制可行，边界归入可行侧；红点为代表能力组合 $c_{\min}/c_0 = 0.5$、$q_{\text{cap}} = 0.6$。(b) 该代表点上能力约束下的成本最优控制：蓝线为隔离比例 q，绿线为接触减少比例 $1 - c/c_0$，同色虚线为相应的能力上限 q_{cap} 与 $1 - c_{\min}/c_0$；画至退出后 1 天，t 以天计。

6.4 成本权重

“先仅隔离、后两者并用”的结构在隔离的相对权重不大时保持不变。最优选择只通过 $r = w_q/w_c$ 依赖权重，因此固定 $w_c = 1$。图 6给出 $r \in [1, 20]$ 内不考虑能力约束时的成本最优控制，即加强隔离的相对代价不低于减少接触的情形。图中颜色与等高线表示 y，即接触率降幅占仅减少接触时降幅的比例，$y = 0$ 对应仅隔离控制。$r = 1$ 时，成本最优控制只比仅隔离控制节省约 2.3%；由于 $J_{\min}/J[c_0]$ 随 r 不增（第 5.3 节），$r < 1$ 时节省不超过这一比例。因此在这一算例中，隔离的相对代价不高于接触时，直接采用仅隔离控制几乎不损失成本。

成本最优控制的结构按权重分为三档。$r \le r_{\text{cont}}$（约 3.1358）时，由定理 5.2，切换发生在 S_{sw} 处且控制连续，默认的 $r = 2$ 属于这一档。$r_{\text{cont}} < r \le \hat{r}$（$\hat{r}$ 约 3.2051，见补充命题 S5.2）时，仅隔离段仍在 S_{sw} 处结束，此后跳变一次，$r = \hat{r}$ 时跳变即发生在 S_{sw} 处。跳变位置有闭式（补充命题 S5.4），放大图见补充图 S6。$r > \hat{r}$ 时切换提前。仅隔离控制仍是局部最优，但另一个内部局部最优的成本更低，因此接触率在切换处由 c_0 跳到内部值，此后连续变化直至退出。r 越大，切换越早，超过约 13.10 后仅隔离段消失，整个阈值控制期都两者并用；各转折所在的括区与闭式值见补充表 S1。

图 6(b)(c) 给出几个权重的控制。由命题 5.7(i)，权重增大时，每个状态上的接触率与隔离比例都不增，在共同的仅隔离段上则相同。由命题 5.7(ii)，隔离比例在每个权重下都随时间不增；接触率的时间变化形

态则依赖权重：$r = 1, 2, 3.17$ 时在 S_{sw} 以下先降后回升，$r = 5$ 时跳入两者并用后一直回升，$r = 15$ 时从启动起一直回升。退出时 y 对所有 r 都趋于 $r/(1+r)$，即两种归一化强度之比趋于权重的反比（命题 5.4）；图中的等高线因而在 S_c 附近趋于水平线 $r = y/(1-y)$。




图 6: 基准参数下固定 $w_c = 1$、改变 $r = w_q/w_c$ 时不考虑能力约束的成本最优控制。(a) 纵轴 r 为对数刻度，颜色与红色点划等高线表示 $y = (1 - c_c^*/c_0)/(1 - S_c/S)$，黑色数字为等值：$y = 0$ 为仅隔离控制，$y = 1$ 为仅减少接触，等高线只画在两者并用的区域。黑色实线为在 S_{sw} 处的连续切换，红色实线为由仅隔离控制跳入两者并用，紫色实线为两个内部取值之间的跳变（很短，放大见补充图 S6）；菱形为 $(S_{\mathrm{sw}}/S_c, \hat{r})$，三角为仅隔离段在 S^* 处消失的权重；彩色虚线为 (b)(c) 所用的权重。(b)(c) 这些权重的接触率与隔离比例，竖直虚线为 S_{sw}/S_c，竖直点线连接跳变两侧，点划线为 q_0。随时间推进，S 从左向右减小。

7 西安参数情景

本节说明在全市参数下沿设计阈值实施缓解策略意味着什么：先给出西安参数下阈值策略的控制组合，再与 TDINN 重构的实际干预对照。计算采用无回流模型(2.1)，数值方法同第 6.1 节，参数与初值的来源见第 7.1 节。

7.1 数据与参数

西安案例的病例数据与外部参照都取自 He、Tang 和 Xiao 的工作 [23]。观测窗口为 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 17 日的 40 个日区间，其间社区发现 583 例、隔离发现 1467 例，共 2050 例（图 7）。他们用 TDINN 方法从这些数据重构了时变的接触率与隔离比例。本文采用其表 3 中西安的结果 $c_2(t), q_2(t)$：

$$c_{\mathrm{TDINN}}(t) = (12.8872 - 3.4625)e^{-(0.0463t)^2} + 3.4625,$$

$$q_{\mathrm{TDINN}}(t) = (0.3230 - 0.9844)e^{-(0.0452t)^2} + 0.9844.$$

两函数在 $t = 0$ 的值取作常规控制水平 c_0, q_0（表 2）。

模型参数中只有初始感染人数 I_0 由数据拟合，因为原文没有给出初值；其余参数取自统计资料与文献（表 2）。本文取 $S_q(0) = I_q(0) = R(0) = 0$、$S_0 = N - I_0$，时间原点 $t = 0$ 为 2021 年 12 月 9 日的开始，

表 2: 西安参数与初始条件

符号	含义（单位）	取值	来源
N	总人口（人）	13 163 000	统计资料 [31]
β	传播概率	0.1498	文献 [23]
γ	非隔离感染者移出率（d^{-1}）	0.2953	文献 [23]
δ_q	隔离感染者移出率（d^{-1}）	0.3531	文献 [23]
c_0	常规接触率（d^{-1}）	12.8872	控制函数 [23] 在初始时刻的值
q_0	常规隔离比例	0.3230	同上
I_0	初始感染人数（人）	$\approx 1.00659 \times 10^{-3}$	最小二乘拟合（见正文）
S_0	初始易感人数（人）	$N - I_0$	总人口关系
$S_q(0), I_q(0), R(0)$	其余初始仓室（人）	0	本文设定
η	阈值（人）	$0.001N = 13\,163$	按重症监护床位与重症比例选取（补充材料第 S6.3 节）

注：I_0 在计算中使用未取整值。

并用最小二乘估计 I_0。拟合准则为社区与隔离两类病例的日新增与累计数共四项均方误差之和，四项等权；模型的日新增取进入 I 与 I_q 的流量在日区间上的积分，累计数自 $t = 0$ 起计，不含初始感染者。

所得 I_0 远小于 1：时间原点与控制函数都已给定，I_0 只是使连续模型在这一原点下与观测相符的初值，不是实际病例数。图 7的拟合只用于确定初值，不检验模型的预测能力。初值的误差主要使整个过程平移。把拟合的 I_0 缩小或放大 10 倍，启动时刻与清零时间约后移或提前 2.28 d，即初期近似指数增长下的 $\ln 10/g$，其中 $g = \beta c_0(1 - q_0) - \gamma$ 为初期增长率；仅隔离控制与成本最优控制的控制时长与成本几乎不变，总累计新增感染的最大相对变化约为 4.5×10^{-9}。




图 7: 西安疫情观测窗口内的日新增病例与 TDINN 重构。(a) 社区发现病例；(b) 隔离发现病例。空心圆为观测值，绿色实线为拟合 I_0 与 TDINN 控制下的模型结果；观测窗口为 2021 年 12 月 9 日起的 40 个日区间。

7.2 控制组合

阈值策略中各控制的排序与结构在西安参数下与基准算例相同（表 3）。控制时长从长到短仍依次为仅减少接触、$\alpha = 0.5$、成本最优控制与仅隔离控制；与仅隔离控制相比，成本最优控制使 J 降低约 6.7%，

控制时长与总累计新增感染分别增加约 27.8% 与 6.8%。启动状态 S^* 高于 S_{sw}（比值见表注），由定理 5.2，成本最优控制同样先仅隔离、后两者并用，前段约 51.41 d，后段接触率最多降低约 28.2%。两感染仓室人数之和的峰值出现在启动后约 9.36 d，仍在两者相同的前段，因此仅隔离控制与成本最优控制的这一峰值相同。

表 3: 西安参数下不考虑能力约束时四种控制的比较（$w_c = 1, w_q = 2$）

控制	Δt（d）	t_{end}（d）	$I_{t_{\mathrm{cum}}}$	ΔS_q	J（d）	$\max_t (I + I_q)/\eta$
仅减少接触	621.97	840.66	3.786	6.547	221.34	1.46
显式族 $\alpha = 0.5$	250.01	468.70	2.556	7.776	89.88	3.32
仅隔离控制	170.63	389.32	2.294	8.038	82.12	5.06
成本最优控制	218.10	436.79	2.451	7.881	76.62	5.06

注：$\eta = 0.001N$；$I_{t_{\mathrm{cum}}}$ 与 ΔS_q 以 10^6 人计，峰值统计至 t_{end}。四种控制采用同一完整初值（表 2）。$S^*/S_c \approx 4.402$，$S_{\mathrm{sw}}/S_c \approx 2.548$。

能力约束与成本权重的作用也与基准算例一致（图 8）。代表能力组合同样只有联合控制可行：两种单控制都超出能力，能力约束下的成本最优控制给出 $J \approx 84.06$ d、$\Delta t \approx 234.4$ d，都高于表 3中的值，结构与基准代表点相同（各段时长见补充材料第 S8 节）。成本权重的三档界限为 $r_{\mathrm{cont}} \approx 2.5477$ 与 $\hat{r} \approx 2.7090$，超过约 7.51 后仅隔离段消失；默认的 $r = 2$ 仍在定理 5.2的范围内。$r = 1$ 时成本最优控制只比仅隔离控制节省约 3.0%。因此隔离的相对代价不高于接触时，仅隔离控制在这组参数下也几乎不损失成本。




图 8: 西安参数下的能力约束与成本权重。(a) 能力约束的可行区域，坐标与颜色同图 5(a)，红点为代表能力组合 $c_{\min}/c_0 = 0.5$、$q_{\mathrm{cap}} = 0.75$。(b) 固定 $w_c = 1$、改变 $r = w_q/w_c$ 时不考虑能力约束的成本最优控制，颜色、红色点划等高线、实线与标记同图 6(a)，黑色数字为等值，点线为默认权重 $r = 2$。随时间推进，S 从左向右减小。

7.3 TDINN 参照

TDINN 重构是外部参照：它与阈值策略完成的是不同的控制任务。TDINN 控制按拟合函数同时降低接触率、提高隔离比例，既不把感染维持在某一阈值，也不要求在某一状态退出。仅隔离控制则保持 $c = c_0$，在 I 首次达到设计阈值 $\eta = 0.001N$ 时启动，维持 $I = \eta$ 直到 $S = S_c$；成本最优控制在同一阈值上运行，控制后期同时减少接触（第 7.2 节）。常规控制始终取 (c_0, q_0)，是不加额外干预的反事实基准。四种策略从表 2的同一初值出发，各自计算至清零时间（图 9，表 4）。

两者的感染结果相差悬殊：仅隔离控制的总累计新增感染约为 2.29×10^6 人、清零时间约为 389.3 d，TDINN 分别约为 2106 人与 45.29 d。差别源于阈值策略把有效再生数维持在 1，而 TDINN 把它压到 1 以下，即一为缓解、一为压制。常规控制下 $R_e(0)\approx4.43$（R_e 的定义见第 2.2 节），感染迅速增长。

TDINN 控制强度高而持续短，仅隔离控制强度低而持续长。TDINN 控制同时使用两种高强度干预，接触率趋向常规水平的约 27%，隔离比例趋向约 0.98；R_e 因而较快降到 1 以下，疫情在易感者仍接近全市人口时就结束了（图 9(b)(c)(e)）。仅隔离控制只需保持 $R_e=1$（式(2.8)），隔离比例最高约 0.85，此后随易感者减少而下降（补充表 S2）。非隔离感染者人数 I 因而停在 η，易感者不断被感染或作为未感染接触者被隔离，直到 S 降到 S_c 后 I 才开始下降。前者在易感者几乎未减少时结束，后者要求 S 降到 S_c，累计新增感染因而有下界，下一节给出这一下界。

成本最优控制改变的只是阈值控制期内两种措施的组合。它同样把 R_e 保持在 1，后期减少接触使 S 下降变慢，控制期更长、累计新增感染略多（表 4）；与 TDINN 的差别仍是缓解与压制之别，下一节的下界对它同样成立。




图 9: $\eta=0.001N$ 时四种策略的全过程比较。(a) 非隔离感染者人数 $I(t)$，对数纵轴，水平虚线为 η；(b) 接触率 $c(t)$；(c) 隔离比例 $q(t)$；(d) 总累计新增感染 $I_{t_{\mathrm{cum}}}(t)$，对称对数纵轴（线性区阈值为 100 人），散点为观测累计量；(e) 有效再生数 $R_e(t)$，水平虚线为 $R_e=1$。各轨迹画至自身的清零时间，t 以天计；黑色竖点线标记两种阈值控制共同的启动 t_1 与仅隔离控制的退出 t_2，紫色竖点线标记成本最优控制的退出，灰色竖点线标记观测窗口结束。

表 4: 西安参数下四种策略的模型结果

策略	$\max_t I$（人）	$I_{t_{\mathrm{cum}}}$（人）	t_{end}（d）
TDINN 控制	153	2106	45.29
仅隔离控制	13 163	2 293 939	389.32
成本最优控制	13 163	2 450 824	436.79
常规控制	1 377 552	4 587 183	75.57

注：$\eta = 0.001N$；各策略计算至自身的清零时间，人数取整。TDINN 与阈值策略完成的任务不同（见正文）。仅隔离控制的启动时刻、退出时刻与控制时长分别为 16.20、186.83、170.63 d，成本最优控制分别为 16.20、234.31、218.10 d；TDINN 的非隔离感染者峰值与总累计新增感染的未取整值为 152.55 与 2105.63。

7.4 低阈值与退出的代价

由命题 3.9，阈值越低，控制时长越长；在所算范围内，控制时长还近似与阈值成反比。设计阈值 $\eta = 0.001N$ 按全国人均重症监护床位折算的名义床位数与需要重症监护的比例选取（补充材料第 S6.3 节）。原因是阈值控制期内 S 的下降速率 $c_0\eta(S-\bar{S})/N$ 与 η 成正比，而退出仍要求 S 降到同一个 S_c：式(3.7)中，Δt 等于 $N/(c_0\eta)$ 乘一个只通过启动状态 S^* 依赖 η 的对数因子。在西安参数下把 η/N 从 0.01 降到 0.0001，控制时长由 16.6 d 增至 1711 d，与反比关系相符（补充表 S2，补充图 S7）。若把阈值降到 TDINN 的非隔离感染者峰值 152.55 人，控制时长约为 40.5 年，按每年 365 d 计（补充图 S8）。

在常规传播临界值退出本身就要求大量感染。由模型(2.1)，总新增感染的流入为 $\beta cSI/N$，而 $-\dot{S} = c[\beta + (1-\beta)q]SI/N$，因此

$$\frac{dI_{t_{\mathrm{cum}}}}{dt} = \frac{\beta}{\beta + (1-\beta)q(t)}(-\dot{S}) \geq \beta(-\dot{S}),$$

即离开 S 的人中感染者的比例至少为 β。从初始时刻积分到退出时刻，对任何使 S 降到 S_c 的控制都有

$$I_{t_{\mathrm{cum}}}(t_2) \geq \beta(S_0 - S_c) \approx 1.53 \times 10^6,$$

已远高于 TDINN 在其清零时间的约 2106 人。$S_0 \approx N$ 时，这一下界约为 $\beta N(1 - 1/R_c)$，其中 $1 - 1/R_c$ 是使常规措施下的有效再生数降到 1 所需移出的人口比例。在阈值策略内，控制组合只改变式(4.11)中与 Δt 成正比的一项，不能绕开这一下界。因此，在无回流模型与西安全市参数下，像 TDINN 那样低的累计新增感染与在 S_c 退出不相容。

这些长时结果是固定参数、无回流、全市人口下的模型计算结果，不是对真实政策年限的预测：传播参数来自观测窗口内的拟合，那时 $S(t) \approx N$，退出却要求 S 降到 S_c。完整的阈值与接触率扫描见补充材料第 S6 节。

7.5 有效人口

全市结果依赖有效混合人口 N_{eff}，即实际相互接触、共同参与传播的人口。达到退出状态所需减少的易感者人数大致与 N_{eff} 成正比，而这次疫情的 N_{eff} 未知；例如封控把城市分割成许多相对隔离的区域时，N_{eff} 可能远小于全市人口。由补充命题 S6.1与S6.2，固定归一化初值与阈值比例 $\theta = \eta/N$ 时，仅隔离控制的控制时长与二次干预强度成本不随 N 单独改变，以 $I = 1$ 为终点的清零时间与计算至该终点的累计新增感染则仍含人口尺度，且随 N 严格增加。固定绝对阈值 η 时，减小有效人口会提高 θ；J 含因子 $1/\theta$，其余只通过启动状态依赖 θ，在所考察的低阈值范围内控制时长也近似与 θ 成反比（第 7.4 节）。沿用全市拟合的绝对初值 I_0 时，初始感染比例 I_0/N 随人口改变，这两条命题不能直接套用；在 $\theta = 0.001$ 下取六个人口规模、不重新拟合，控制时长均约为 170.63 d，启动时刻则由 10.70 d 增至 16.20 d（补充材料第 S6.1 节）。

TDINN 轨迹本身给出有效人口的一个必要下界。易感者离开 S 只有三条去路：成为非隔离感染者、成为隔离感染者，或作为未感染接触者被隔离。记重构轨迹在其清零时间的社区与隔离累计新增感染为 $I^{\mathrm{T}}_{\mathrm{cum}}$、$I^{\mathrm{T}}_{q_{\mathrm{cum}}}$。

命题 7.1. *设无回流模型(2.1)的总人口为 N_{eff}，$S_q(0) = 0$。若它的一条解在某一时刻的社区与隔离累计新增感染分别等于重构轨迹的 $I^{\mathrm{T}}_{\mathrm{cum}}$ 与 $I^{\mathrm{T}}_{q_{\mathrm{cum}}}$，则*

$$N_{\mathrm{eff}} \geq N_{\mathrm{floor}} := I^{\mathrm{T}}_{\mathrm{cum}} + \frac{I^{\mathrm{T}}_{q_{\mathrm{cum}}}}{\beta}. \tag{7.1}$$

证明. 记该时刻为 T。由式(2.10)与 $S_q(0) = 0$，$S_q(T) = (1-\beta)I_{q_{\mathrm{cum}}}(T)/\beta$。易感者的流出由上述三部分组成，故

$$S_0 - S(T) = I_{\mathrm{cum}}(T) + I_{q_{\mathrm{cum}}}(T) + S_q(T) = I_{\mathrm{cum}}(T) + \frac{I_{q_{\mathrm{cum}}}(T)}{\beta}.$$

再由 $S(T) \geq 0$ 与 $S_0 \leq N_{\mathrm{eff}}$ 即得。 □

代入 TDINN 轨迹（$I^{\mathrm{T}}_{\mathrm{cum}} = 607.96$、$I^{\mathrm{T}}_{q_{\mathrm{cum}}} = 1497.67$）得 $N_{\mathrm{floor}} \approx 1.06 \times 10^4$，约为其总累计新增感染 2105.63 人的 5.04 倍。多出的部分是被隔离的未感染者：平均每隔离一名感染者，就同时隔离 $(1-\beta)/\beta \approx 5.7$ 名未感染者（式(2.10)）。这一下界是参照轨迹在无回流模型中成立的必要条件，而不是 N_{eff} 的估计；它说明，高强度追踪隔离涉及的人群远多于感染者本身。

8 讨论

本文在含追踪隔离的模型中，研究了阈值策略下接触控制与追踪隔离的组合。下面讨论这些结果对干预设计的意义、与已有工作的关系，以及隔离易感者回流和其他简化带来的局限。

8.1 结果的意义

在隔离易感者不返回社区的模型中，阈值控制期离开社区的易感者总数不随控制组合改变，控制组合改变的是其中多少人被感染、多少人作为未感染者被隔离。这一总数为 $S^* - S_c$；由式(4.11)与(4.12)，控制期每少一例感染，新增隔离易感者人数就多一人。由定理 4.3，加强追踪隔离使更多未感染的接触者离开社区，S 因而更快降到 S_c，控制期缩短，未被追踪的感染随之减少；代价是被隔离的未感染者增多。追踪隔离能力不足时，只靠隔离无法维持阈值，最快的控制也要辅以减少接触。因此，“控制期短”与“感染少”是一致的目标，二者都与“少隔离未感染者”相冲突：缩短控制期的代价由被隔离的未感染接触者承担。

不考虑能力约束时，成本最优控制在两者之间折中，让两种措施分担维持阈值所需的干预强度。二次干预强度成本惩罚强度的平方，因此在同一时刻、总强度相同时，按权重适当分担比集中于一种措施更省：退出附近两种归一化强度之和近似固定，两者之比趋于权重的反比（命题 5.4）。控制前段则不同。易感者较多时，略减接触虽能降低所需的隔离强度，却放慢 S 的下降、延长控制期，而追踪隔离同时维持阈值并较快缩小社区易感人群（命题 5.3）；在定理 5.2的权重范围内，启动时易感者多于 S_{sw} 的控制前段因而只加强隔离。加重隔离的相对权重时，成本最优控制在每个状态上不多用追踪隔离、不少减少接触，控制期因而不缩短，控制期累计新增感染不减少，新增隔离易感者人数不增加（命题 5.7）。在本文的二次强度成本与两组参数下，仅隔离控制的成本接近最小成本，仅减少接触的成本则是最小成本的数倍（表 1、3）；因此，看重控制时长或感染时，偏向仅隔离控制在成本上代价不大。

退出要求也限制了累计新增感染能降到多低。要在 S_c 退出，社区易感者必须先降到 S_c，此时累计新增感染至少为 $\beta(S_0 - S_c)$（第 7.4 节），控制组合与阈值只改变超出的部分（式(4.11)，命题 3.9）。降低阈值能压低峰值，却不能把感染降到这一水平以下，控制期还会变得极长。在无回流模型中，若在社区仍有

感染者时恢复并一直保持常规控制，恢复后 I 不再上升当且仅当此时 $S \le S_c$（第 2.2 节）；因此，在清零之前恢复常规控制、且此后感染不再上升的策略，到恢复时都至少已有这么多感染。在 $S = S_c$ 恢复常规控制时仍有 $I = \eta > 0$，此后感染者虽下降，新增感染仍会继续；这部分尾部感染及其随阈值的变化，由定理 3.7的常规阶段项给出。

TDINN 控制逐步加强两种干预，到清零终点时仍维持较强干预。它在易感者几乎未减少时就把社区传播压到清零终点，累计新增感染因而很少。但清零后若恢复常规措施，按名义参数的有效再生数约为 4.42。清零终点取 $I = 1$，此时社区中仍可能有残余感染者；有效再生数大于 1 时，即使没有输入病例，残余感染也可能使本地传播再次扩增，传播真正中断后出现输入病例也是如此。阈值策略到达清零终点时 S 已低于 S_c。隔离易感者此后仍不释放时，常规措施下的有效再生数低于 1，残余感染与输入病例引起的本地传播都会逐渐消退；若清零后释放，以隔离为主的控制 $S + S_q$ 仍远高于 S_c，与 TDINN 面临同样的风险。因此，比较不同策略时要连同退出要求一起考虑。

8.2 与已有工作的关系

本文的阈值策略对应已有最优策略中沿容量运行的阶段。它在常规传播临界值退出，这一时刻对应 Miclo 等 [4] 解除干预、Avram 等 [11] 的最优反馈恢复常规传播的时刻。仅隔离控制给出了这一阶段的显式形式：隔离比例在启动时跳升，此后随易感者减少严格递减（推论 3.3），对应已有最优策略中的逐步放松。本文关注的则是这一阶段内两种措施的组合自由度。

在共同的阈值、启动规则与退出要求下，本文解析刻画了两种干预的全部可行组合，并将组合自由度与控制时长、累计新增感染、被隔离的未感染者人数和成本联系起来。Miclo 等、Avram 等、Angulo 等 [12] 和 Balderrama 等 [2] 以单一传播率表示干预，沿容量运行时控制由容量唯一确定；本文维持阈值只约束乘积 $c(1-q)$，不同组合通过改变社区易感者的减少速度产生上述取舍。Pollinger[26] 已研究两种干预的联合选择与状态约化，本文的差别在于固定感染水平下的精确人数关系和成本结构。与 Zhou 等 [1] 的分段常数干预及其数值联合选择相比，本文允许控制随状态变化以维持阈值，首次积分仍给出启动状态与退出后终点状态的闭式表达。

Angulo 等以最短时间进入无需进一步干预的安全区为目标，Balderrama 等以最终感染规模最小为目标。在本文的阈值策略内，到达 S_c 正是此后无需再干预、感染也不超过阈值的最早时刻（命题 2.2(iii)）；各控制的启动时刻相同，因此前一目标对应控制时长最短。在无回流模型中，这两个目标由同一控制达到（推论 4.5），即能力允许的最快控制；其代价是隔离最多的未感染者。

8.3 隔离易感者回流

本文的理论结果针对隔离易感者在清零前不释放的情形。若被隔离者在疫情过程中陆续返回社区，补充材料第 S7 节在平均停留 14 d 的指数回流情景中作了数值比较：两组参数下，仅隔离控制仍是控制时长最短的数值解，在所比较的控制中仅减少接触最长；数值求得的成本最优控制仍先仅隔离、后两种措施并用；所比较的固定控制律退出后感染也未再越过阈值。改变的是量级：控制时长明显延长，累计新增感染接近总易感者降到 S_c 所需的人数 $U(0) - S_c$（$U = S + S_q$），各控制之间的感染差别明显缩小。被隔离的未感染者返回社区后重新面临感染风险，追踪隔离对他们的保护是暂时的。

8.4 局限与展望

模型前提限定了结论的适用范围。正文的解析约化依赖隔离易感者不回流。不回流使 S 在阈值控制期内严格下降；以 S 参数化控制、由控制时长排序感染与隔离（定理 4.3）、退出后感染者不再上升（定理 3.5）都以此为前提。这一假设要求被隔离的未感染者从强化干预开始到清零都不释放。基准算例中这一时段约一个月，与实际的隔离期同一量级；西安全市情景中超过一年（仅隔离控制约 373 d），相应结果

依赖持续隔离的假设。退出强化控制也只恢复常规措施，不释放隔离易感者（注记 3.6）。常规传播临界值与退出时累计新增感染的下界依赖均匀混合及本文的人口流量结构；接触活动度等异质性会改变解除干预的条件 [32]，相应下界需在结构化模型中重新推导。模型是不含潜伏期的确定性模型，清零取 $I = 1$ 是操作性终点，低人数阶段的随机灭绝需由随机模型描述 [33]。阈值 η 按名义的重症监护床位与重症比例选取，未经当地临床标定；西安的长时结果是固定观测窗口内拟合的参数、按全市人口计算得到的，其时长也超出了不考虑再感染与人口变动所依据的短期范围。有效混合人口也未知，且可能随干预改变，需由接触调查、出行信息等外部资料确定（第 7.5 节）。

实施与成本的设定是另一类限制。数值控制按名义模型预先计算，这种开环控制在执行中会遇到误差。触发要依据监测数据判断，而监测得到的是新增确诊而非非隔离感染者存量 I；参数失配与执行延迟会使感染偏离阈值，开环控制不能自行纠正。检测与追踪延迟还会削弱及时隔离的效果 [19, 20]。提前干预与安全余量的设计，需要在含观测与执行误差的模型中另行分析。二次干预强度成本只计相对常规水平的额外强度，权重没有换算为货币，也不计隔离人天：隔离比例回到 q_0 后成本为零，已隔离的人却仍占用资源。“先仅隔离”的结构以及仅隔离控制的成本接近最小成本，都是在这种按比例归一化的强度成本下得到的；若按每日追踪隔离的人数计价，仅隔离控制在启动时每日隔离的未感染者最多，控制前段的选择可能改变。能力约束也不限制调整速度：控制在启动时须立即跳变，例如基准参数下仅隔离控制的隔离比例由 0.01526 升至约 0.7565。计入隔离人天、累计预算、控制时长或调整速度的限制后，各状态上的选择会相互影响，因此逐状态分离（式(5.3)）须重新分析。

几个问题尚未解决，它们决定上述结论能推广到多大范围。隔离的相对权重超过 $\hat{r}$ 后，仅隔离段结束的位置与它消失时的权重目前只有数值结果。能力约束下隔离权重超过 r_{cont} 时的结构也未刻画，其他退出要求下的组合问题也有待研究。更一般的问题是，在带容量状态约束、同时含两种干预的最优控制问题中，最优控制是否仍沿阈值运行；答案可能随目标而不同。

9 结论

在隔离易感者不返回社区的模型中，接触控制与追踪隔离的组合不改变阈值策略进入与退出时的社区易感者与非隔离感染者人数，只改变其间的路径；控制时长把这条路径上的速度、感染与未感染者的隔离联系在一起，因此不同目标对应不同的最优控制。最快、感染最少的控制以追踪隔离为主，代价是被隔离的未感染者最多，以减少接触为主的控制则相反。成本最优控制在两种措施都可加强时于控制后期让两者分担干预强度，不考虑能力约束时居于两者之间。

无回流下的感染排序依赖未感染接触者持续退出社区传播。在平均停留 14 d 的指数回流数值情景中，两组参数下仍可见仅隔离控制最快、成本最优控制先仅隔离后两者并用的结构，但控制时长明显延长，各控制之间的累计新增感染差别明显缩小（补充材料第 S7 节）；含回流模型中最优组合的解析刻画仍有待研究。

A 证明

A.1 解的适定性

本小节证明命题 2.1。

证明. 由 c 局部有界可测、$q \in [0,1]$ 可测，方程右端关于时间可测，在有界状态集上关于状态 Lipschitz，且右端与 Lipschitz 常数在有限时间区间上可积。由 Carathéodory 存在唯一性定理，方程有唯一的局部绝对连续解，并几乎处处满足方程。下面先证该解满足 (ii)，再由 (ii) 把它延拓到全部 $t \geq 0$。

S 与 I 的方程关于各自是线性的，积分得

$$S(t) = S_0 \exp\left[-\int_0^t \frac{c(s)[\beta + (1-\beta)q(s)]}{N} I(s)\, ds\right],$$

$$I(t) = I_0 \exp\left[\int_0^t \left(\frac{\beta c(s)(1-q(s))}{N} S(s) - \gamma\right) ds\right],$$

故在解存在的区间上 $S, I > 0$。S_q 的初值与流入都非负；I_q 的方程是以非负项为源的线性方程，由常数变易公式保持非负；R 的流入 $\gamma I + \delta_q I_q \geq 0$。五式相加得总人数恒为 N。由非负性与守恒，各分量都在 $[0, N]$ 中，解不会在有限时间内爆破，因而可以延拓到全部 $t \geq 0$，即得 (i)。 □

A.2 触发与退出

本小节证明命题 2.2。

证明. (i) 由首次到达的定义，常规轨迹在 $[0, t_1)$ 上满足 $I < \eta$。由 $S^* > S_c$ 与式(2.2)，

$$\dot{I}(t_1) = \eta\left[\frac{\beta c_0(1-q_0)S^*}{N} - \gamma\right] > 0,$$

故继续采用 (c_0, q_0) 时，I 在 t_1 之后立即超过 η。

(ii) 在 $I = \eta$ 处，由式(2.1)的第二式，

$$\dot{I} = \eta\left[\frac{\beta c(1-q)S}{N} - \gamma\right],$$

故 $\dot{I} \leq 0$ 当且仅当所列不等式成立。若 I 在某个区间上恒等于 η，由 I 绝对连续，该区间上几乎处处有 $\dot{I} = 0$，即等号几乎处处成立。

(iii) 恢复常规控制后

$$\dot{I} = \gamma I\left(\frac{S}{S_c} - 1\right), \qquad \dot{S} = -\frac{c_0[\beta + (1-\beta)q_0]}{N} SI < 0.$$

若恢复时 $S \leq S_c$，此后 S 严格下降，以后各时刻都有 $\dot{I} < 0$，I 不再超过 η。若恢复时 $S > S_c$，则恢复后的一个右邻域内 $\dot{I} > 0$，I 立即超过 η。故所述等价性成立。

下证最早退出时刻的结论。由 (ii)，在 $I \equiv \eta$ 的区间上几乎处处有 $c(1-q) = \gamma N/(\beta S) > 0$，故 $c > 0$，$\dot{S} = -c[\beta + (1-\beta)q]S\eta/N < 0$，$S$ 严格下降。因此 S 首次降到 S_c 之前始终有 $S > S_c$，由上一段，此前不能直接恢复常规控制；首次降到 S_c 时则可以恢复。 □

A.3 退出后的动态

本小节证明定理 3.5。

证明. (i) 由命题 2.1，$S, I > 0$，故恢复常规后 $\dot{S} < 0$；又 $\dot{I} = \gamma I(S/S_c - 1)$，所以对一切 $t > t_2$ 有 $S < S_c$ 和 $\dot{I} < 0$。任取 $t_a > t_2$，令 $\varepsilon = \gamma - \beta_2^0 S(t_a)$。由 $S(t_a) < S_c = \gamma/\beta_2^0$，$\varepsilon > 0$；又 S 递减，故 $t \geq t_a$ 时 $\dot{I} \leq -\varepsilon I$，从而

$$I(t) \leq I(t_a) e^{-\varepsilon(t-t_a)}, \qquad t \geq t_a.$$

因此 $\lim_{t\to\infty} I(t) = 0$，且 $\int_{t_a}^{\infty} I(t)\, dt < \infty$。将其代入附录 A.1中 S 的指数表示，得到严格正的下界，故 $S_\infty \in (0, S_c)$。退出后的首次积分为

$$I(t) = \eta + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_c - S(t)) + \rho_1 \ln\frac{S(t)}{S_c}. \tag{A.1}$$

在该式中令 t 趋于无穷，由 $\lim_{t\to\infty} I(t) = 0$ 与 $0 < S_\infty < S_c$ 选择 W_0 分支，得到式(3.16)。

(ii) 由 (i)，I 从 $\eta > 1$ 严格下降至零，故存在唯一有限的 t_{end}。在式(A.1)中令 $I = 1$，同样取 W_0 分支，得到式(3.17)。最后沿常规易感者方程分离变量积分，即得式(3.18)。 □

A.4 启动状态的导数

本小节证明引理 3.8。

证明. 令

$$F(S;\eta,c_0,\beta,q_0)=I_0+\frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0-S)+\rho_1\ln(S/S_0)-\eta.$$

$F(S^*)=0$ 即启动条件 $I(S^*)=\eta$。利用 $\beta_2^0/\beta_1^0=\rho_1/S_c$，在 $S=S^*>S_c$ 处

$$\frac{\partial F}{\partial S}=\rho_1\left(\frac{1}{S^*}-\frac{1}{S_c}\right)<0.$$

因此隐函数定理适用。$\partial F/\partial\eta=-1$，而在固定 $S=S^*$ 时

$$\begin{aligned}
\frac{\partial F}{\partial c_0}&=-\frac{\rho_1}{c_0}\ln\frac{S^*}{S_0}>0,\\
\frac{\partial F}{\partial\beta}&=\frac{q_0(1-q_0)}{[\beta+q_0(1-\beta)]^2}(S_0-S^*)-\frac{\rho_1(1-q_0)}{\beta+q_0(1-\beta)}\ln\frac{S^*}{S_0}>0,\\
\frac{\partial F}{\partial q_0}&=-\frac{\beta}{[\beta+q_0(1-\beta)]^2}\left[(S_0-S^*)-\bar S\ln\frac{S_0}{S^*}\right]<0.
\end{aligned}$$

最后一个符号使用 $\bar S<S^*<S_0$ 及 $\ln x<x-1$。记 κ 为 η,c_0,β,q_0 中的任一参数，由 $\partial S^*/\partial\kappa=-(\partial F/\partial\kappa)/(\partial F/\partial S)$ 即得所列符号。特别地，

$$\frac{\partial S^*}{\partial\eta}=\frac{1}{\rho_1(1/S^*-1/S_c)},\qquad \frac{\partial S^*}{\partial c_0}=\frac{\ln(S^*/S_0)}{c_0(1/S^*-1/S_c)}.\tag{A.2}$$

另两个偏导数的完整表达为

$$\frac{\partial S^*}{\partial\beta}=\frac{\dfrac{q_0(1-q_0)(S_0-S^*)}{[\beta+q_0(1-\beta)]^2}-\dfrac{\rho_1(1-q_0)}{\beta+q_0(1-\beta)}\ln(S^*/S_0)}{\rho_1(1/S_c-1/S^*)},\tag{A.3}$$

$$\frac{\partial S^*}{\partial q_0}=-\frac{\beta[(S_0-S^*)-\bar S\ln(S_0/S^*)]}{[\beta+q_0(1-\beta)]^2\rho_1(1/S_c-1/S^*)}.\tag{A.4}$$

固定 N 且使用 $\theta=\eta/N$ 时，有 $\partial S^*/\partial\theta=N\partial S^*/\partial\eta$。 □

A.5 阈值的取舍

本小节证明命题 3.9。

证明. 式(3.3)的被积函数不含 η，η 只通过下限 S^* 进入。由 $I(S^*)=\eta$，

$$\frac{\partial t_1}{\partial\eta}=-\frac{1}{\beta_1^0 S^*\eta}\frac{\partial S^*}{\partial\eta}>0.$$

式(3.10)给出 $\partial q_{\max}/\partial\eta=\gamma N[\beta c_0(S^*)^2]^{-1}\partial S^*/\partial\eta<0$。由式(3.7)，控制时长满足

$$\frac{\partial\Delta t}{\partial\eta}=-\frac{\Delta t}{\eta}+\frac{N}{c_0\eta(S^*-\bar S)}\frac{\partial S^*}{\partial\eta}<0.$$

又 $(q_c(S)-q_0)/(1-q_0)=1-S_c/S$，$c=c_0$ 时接触项为零，且由式(3.6)，$dt=-N\,dS/[c_0\eta(S-\bar S)]$，故

$$J_q=\frac{N}{c_0\eta}\int_{S_c}^{S^*}\frac{1-S_c/S}{S-\bar S}\,dS,\qquad J=\frac{w_qN}{c_0\eta}\int_{S_c}^{S^*}\frac{(1-S_c/S)^2}{S-\bar S}\,dS.\tag{A.5}$$

被积函数不含 η 且在区间内部为正，系数 $1/\eta$ 和上限 S^* 均随 η 增大而减小，故两个成本严格下降。两积分的初等表达列于附录 B。

对累计新增感染，把式(A.1)中 $I=1$ 的条件对 η 求导得

$$\frac{\partial S_{\text{end}}}{\partial\eta}=-\frac{1}{\rho_1(1/S_{\text{end}}-1/S_c)}<0.$$

对式(3.19)求导，

$$\frac{\partial I_{t_{\text{cum}}}}{\partial\eta}=\left[\frac{\beta S^*}{S^*-\bar S}-\frac{\beta}{\beta+q_0(1-\beta)}\right]\frac{\partial S^*}{\partial\eta}-\frac{\beta}{\beta+q_0(1-\beta)}\frac{\partial S_{\text{end}}}{\partial\eta}>0.\tag{A.6}$$

其中使用 $\beta S_c/(S_c-\bar{S}) = \beta/[\beta+q_0(1-\beta)]$，以及 $S/(S-\bar{S})$ 在 $S>\bar{S}$ 上非增。因此方括号非正，其与 $\partial S^*/\partial\eta<0$ 的乘积非负，最后一项严格为正。将终点替换为 $I=0, S=S_\infty$，同样的隐式微分给出无限时刻的结论。 □

A.6 状态参数化

本小节证明定理 4.1。

证明. (i) 由命题 2.2(ii)，在 $I=\eta>0$ 上几乎处处有

$$c(t)(1-q(t))S(t) = \frac{\gamma N}{\beta} = c_0(1-q_0)S_c. \tag{A.7}$$

因此在 $I=\eta>0$ 上 $q<1$。由 $q\geq q_0$ 和 $c\leq c_0$，可得式(4.2)和(4.3)；反之，满足式(4.2)的 c_c 经式(4.3)给出的 q_c 满足 $q_0\leq q_c<1$。

(ii) 利用式(A.7)，易感者方程化为式(4.1)。由式(4.2)，$c_c(S)S\in[c_0S_c, c_0S]$，故下降速度满足

$$0<c_0(S_c-\bar{S})\leq c_c(S)S-c_0\bar{S}\leq c_0(S^*-\bar{S}).$$

因此 S 在有限时间从 S^* 到达 S_c，分离变量即得式(4.4)和(4.5)。

下证 (i) 中对应的另一方向。给定满足式(4.2)的可测函数，可在零测集上修改使界限处处成立。式(4.4)右侧随积分下限严格递减；由上面的速度界，该时间变换及其逆函数均为 Lipschitz 函数，故定义唯一绝对连续的 $S(t)$，且保持零测集与可测性。用式(4.3)构造时间控制，令 $I=\eta$，则前两个状态方程几乎处处成立；其余仓室由原模型确定。所以 (i) 中的对应在几乎处处相等意义下成立。

(iii) 由 (ii)，S 连续且严格减，$S(t_2)=S_c$，故 $t<t_2$ 时 $S(t)>S_c$，且 $\lim_{t\to t_2^-}S(t)=S_c$。又 $c_0S_c/S(t)\leq c(t)\leq c_0$，由夹逼得 $\lim_{t\to t_2^-}c(t)=c_0$；再由式(4.3)，$\lim_{t\to t_2^-}q(t)=q_0$。若 c_c 连续，则 $c(t)=c_c(S(t))$ 与由式(4.3)给出的 $q(t)$ 都是连续函数的复合，在阈值控制期内部连续。 □

A.7 最小值的存在性

本小节证明定理 5.1。

证明. (i) 允许区间上 $c\geq c_0S_c/S$，故式(5.2)的分母满足 $cS-c_0\bar{S}\geq c_0(S_c-\bar{S})>0$，$f$ 在允许区域上连续有限。每个状态上的允许区间紧且非空，故逐状态最小值存在，任意允许控制的成本均不小于式(5.3)右侧。为证明这一下界可以达到，将允许区间写为 $c=c^-(S)+x[c^+(S)-c^-(S)]$，$x\in[0,1]$，并记

$$H(S,x)=f\big(S,c^-(S)+x[c^+(S)-c^-(S)]\big),\quad m(S)=\min_{0\leq x\leq 1}H(S,x).$$

H 在紧集上连续，因而 m 连续。取各最小化解集中最小的元素 $x_*(S)$。对任意 $0<a\leq 1$，

$$\{S: x_*(S)<a\}=\bigcup_{\substack{a'\in\mathbb{Q}\\ 0\leq a'<a}}\left\{S:\min_{0\leq x\leq a'}H(S,x)=m(S)\right\}.$$

右侧为可数个闭集的并，故 x_* 可测。于是 $c_c^*(S)=c^-(S)+x_*(S)[c^+(S)-c^-(S)]$ 是可测的逐状态最小化选择，由定理 4.1产生可行时间控制并达到下界。

(ii) 任意允许控制与逐状态最小值之差非负，因此二者的积分差为零，当且仅当逐点差几乎处处为零。

(iii) 固定 S，对式(5.2)关于 c 求偏导，并乘以正数 $c^3(cS-c_0\bar{S})^2/S$，驻点方程化为

$$\begin{aligned}0 = {} & w_c\frac{c^3}{c_0^2}(c-c_0)\left(c+c_0-\frac{2c_0\bar{S}}{S}\right)\\ & +w_q\left(c-\frac{c_0S_c}{S}\right)\left(-c^2+\frac{3c_0S_c}{S}c-\frac{2c_0^2\bar{S}S_c}{S^2}\right).\end{aligned} \tag{A.8}$$

该多项式最高次系数为 $w_c/c_0^2>0$，至多有五个实根。连续可微函数在闭区间上的最小点只能是端点或内部驻点。 □

A.8 端点的局部性质

本小节证明命题 5.3。

证明. (i)(ii) 记 $n(c) = w_c(1 - c/c_0)^2 + w_q(1 - c_0 S_c/(cS))^2$。$f$ 关于 c 的导数与

$$n'(c)(cS - c_0\bar{S}) - Sn(c)$$

同号。在左端点 $c = c_0 S_c/S$，该量为

$$-2w_c\left(1 - \frac{S_c}{S}\right)(S_c - \bar{S}) - Sw_c\left(1 - \frac{S_c}{S}\right)^2 < 0,$$

故向允许区间内部增大 c 即可降低成本，得 (i)。在右端点 $c = c_0$，该量为

$$-\frac{w_q}{S}\left(1 - \frac{S_c}{S}\right)(S^2 - 3S_c S + 2S_c\bar{S}).$$

由 $\bar{S} < S_c$，括号内二次式的较小根小于 S_c，较大根为 S_{sw}，所以该量在 $S > S_{\mathrm{sw}}$ 时为负，在 $S_c < S < S_{\mathrm{sw}}$ 时为正；前者表示 $f(S,\cdot)$ 向 c_0 严格减，后者表示严格增，得 (ii)。

(iii) 由定理 5.1(ii)，成本最优控制几乎处处取逐状态最小点；由 (i)(ii)，它不取左端点，在 $S_c < S < \min\{S_{\mathrm{sw}}, S^*\}$ 上也不取右端点，故得 (iii) 的两条结论。

(iv) 考虑能力约束时，由式(4.6)及 $c_{\min} < c_0$、$q_{\mathrm{cap}} > q_0$，对 $S \in (S_c, S^*)$ 有 $c^-(S) < c_0$、$c^+(S) > c_0 S_c/S$，允许区间 $[c^-(S), c^+(S)]$ 不退化。若 $c^-(S) = c_0 S_c/S$，左端点处向区间内部的单侧比较照旧，它不是最小点；若 $c^-(S) > c_0 S_c/S$，区间内处处有 $q > q_0$。右端点的讨论相同，只需把 (i) 换成 (ii)：$S < S_{\mathrm{sw}}$ 时，若 $c^+(S) = c_0$，右端点不是最小点；若 $c^+(S) < c_0$，区间内处处有 $c < c_0$。再由定理 5.1，两条结论对 $\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\mathrm{cap}})$ 中的成本最优控制成立。 □

A.9 退出附近的控制组合

本小节证明命题 5.4。

证明. (i) 令 $\epsilon = 1 - S_c/S$，则 $S > S_c$ 时 $0 < \epsilon < 1$，且 $\lim_{S \to S_c^+} \epsilon = 0$。把允许接触率写为 $c = c_0(1 - \epsilon x)$、$0 \le x \le 1$，于是

$$\frac{q_c - q_0}{1 - q_0} = \frac{\epsilon(1 - x)}{1 - \epsilon x}, \qquad \frac{f(S, c_0(1 - \epsilon x))}{\epsilon^2} = \frac{w_c x^2 + w_q(1 - x)^2/(1 - \epsilon x)^2}{c_0[S(1 - \epsilon x) - \bar{S}]}.$$

记上式右侧为 $g_S(x)$，并记

$$g(x) = \frac{w_c x^2 + w_q(1 - x)^2}{c_0(S_c - \bar{S})},$$

则 $\lim_{S \to S_c^+} \sup_{0 \le x \le 1} |g_S(x) - g(x)| = 0$。$g$ 严格凸，唯一最小点为 $x^* = w_q/(w_c + w_q)$。记 $X(S)$ 为 g_S 在 $[0,1]$ 上的最小点集合，下证

$$\lim_{S \to S_c^+} \sup_{x \in X(S)} |x - x^*| = 0.$$

否则存在 $S_n > S_c$ 与 $x_n \in X(S_n)$，使 $\lim_{n \to \infty} S_n = S_c$，而 $|x_n - x^*|$ 有正下界；取收敛子列，由一致收敛，其极限是 g 的另一个最小点，与唯一性矛盾。因此存在 $\delta > 0$，使 $S_c < S < S_c + \delta$ 时所有最小点都位于 $x \in (0,1)$，即得式(5.6)。又由 $(c_0 - c)/c_0 = \epsilon x$ 与上面第一式，式(5.7)中的两个比值分别等于 x 与 $(1 - x)/(1 - \epsilon x)$，令 S 从右侧趋于 S_c 即得式(5.7)。

(ii) 在 $(S_c, S_c + \delta)$ 上，两种单控制分别对应 $x = 0$ 和 $x = 1$，均达不到逐状态最小值，其非负成本差的积分严格为正。

(iii) 考虑满足 $c_{\min} < c_0$、$q_{\mathrm{cap}} > q_0$ 的能力约束时，由式(4.6)，$S_c < S < \min\{c_0 S_c/c_{\min}, (1 - q_0)S_c/(1 - q_{\mathrm{cap}})\}$ 时允许区间仍为 $[c_0 S_c/S, c_0]$；这一上限大于 S_c（$c_{\min} = 0$ 时第一项理解为 $+\infty$），故 (i) 的论证照旧成立；单控制整段可行时，它是能力约束下的允许控制，(ii) 的论证也照旧成立。 □

A.10 连续结构

本小节证明定理 5.2与推论 5.6。令 $\zeta = S/S_c$、$p = cS/(c_0 S_c)$，则允许区间 $[c_0 S_c/S, c_0]$ 对应 $p \in [1, \zeta]$：$p = 1$ 为仅减少接触，$p = \zeta$ 为仅隔离控制。由 $c/c_0 = p/\zeta$、$(q-q_0)/(1-q_0) = 1-1/p$ 与 $cS - c_0\bar{S} = c_0 S_c(p-b)$，

$$f(S,c) = \frac{w_c}{c_0 S_c}\, G(p;\zeta), \qquad G(p;\zeta) = \frac{(1-p/\zeta)^2 + r(1-1/p)^2}{p-b}.$$

固定 S 时 p 是 c 的严格增函数，只需讨论 $G(\cdot;\zeta)$。记 $G = A + rB$，$A = (1-p/\zeta)^2/(p-b)$，$B = (1-1/p)^2/(p-b) \geq 0$，并记 $\zeta_{\mathrm{sw}} = S_{\mathrm{sw}}/S_c = (3+\sqrt{9-8b})/2 \in (2,3)$。直接计算得 $G_p = E/(p-b)^2$，其中

$$E(p,\zeta) = \frac{p^2-2bp}{\zeta^2} + \frac{2b}{\zeta} - 1 + r\varphi(p), \qquad \varphi(p) = \frac{(p-1)(3p-p^2-2b)}{p^3},$$

并且

$$E_p = 2(p-b)\Big[\frac{1}{\zeta^2} - r\psi(p)\Big], \quad \psi(p) = \frac{2p-3}{p^4}; \qquad E_\zeta = -\frac{2[(p-b)^2 + b(\zeta-b)]}{\zeta^3} < 0. \tag{A.9}$$

两端的值为 $E(1,\zeta) = -(\zeta-1)(\zeta+1-2b)/\zeta^2 < 0$ 与 $E(\zeta,\zeta) = r\varphi(\zeta)$；后者在 $1 < \zeta < \zeta_{\mathrm{sw}}$ 时为正，在 $\zeta > \zeta_{\mathrm{sw}}$ 时为负（命题 5.3）。下面的引理用于排除内部驻点曲线的折叠。

引理 A.1. 设 $0 < b < 1$，$\sigma_c = \sqrt{r_{\mathrm{cont}}}$。对 $p > 3/2$ 与 $\sigma > 0$，记

$$F(p;\sigma) = \sigma^2 X(p) - 2\sigma b p\sqrt{2p-3} + p^3, \qquad X(p) = p^3 - 6p^2 + 6p + 2b(3p-4).$$

则 $0 < \sigma < \sigma_c$ 时 $F(p;\sigma) > 0$；$\sigma = \sigma_c$ 时 $F(p;\sigma_c) \geq 0$，且等号仅在 $p = 2$ 成立。

证明. 由式(5.5)，$\sigma_c = 4/(b+\sqrt{b^2-8b+8}) \in (\sqrt{2},2)$ 满足 $(1-b)\sigma_c^2 + b\sigma_c - 2 = 0$，即 $b = (\sigma_c^2-2)/[\sigma_c(\sigma_c-1)]$。令 $w = \sqrt{2p-3}$，代入并展开得

$$F(p;\sigma_c) = \frac{(w-1)^2\, Q(w,\sigma_c)}{8(\sigma_c-1)},$$

$$\begin{aligned} Q(w,\sigma) &= (\sigma-1)(\sigma^2+1)w^3(w+2) + 12(\sigma-1)w^2 \\ &\quad - 2(\sigma^3+3\sigma^2-11\sigma+3)w + (9\sigma^2+11\sigma-\sigma^3-27). \end{aligned}$$

在 $\sigma \in (\sqrt{2},2)$ 上逐项估计 Q 的系数。常数项 $9\sigma^2+11\sigma-\sigma^3-27$ 的导数 $18\sigma+11-3\sigma^2$ 为正，故常数项随 σ 增，不小于其在 $\sigma = \sqrt{2}$ 处的值 $9(\sqrt{2}-1)$。一次项系数为 $-2(\sigma^3+3\sigma^2-11\sigma+3)$，括号内的导数 $3\sigma^2+6\sigma-11$ 为正，故该系数随 σ 减，不小于其在 $\sigma = 2$ 处的值 -2。二次项系数 $12(\sigma-1)$ 大于 $12(\sqrt{2}-1)$，三、四次项非负。所以对 $w \geq 0$ 有 $Q \geq 9(\sqrt{2}-1) - 2w + 12(\sqrt{2}-1)w^2 > 0$（判别式为负），从而 $F(p;\sigma_c) \geq 0$，等号仅在 $w = 1$ 即 $p = 2$ 成立。

下证 $0 < \sigma < \sigma_c$ 的情形。F 是 σ 的二次式，且 $F(p;0) = p^3 > 0$。若 $X(p) \leq 0$，F 在 $\sigma > 0$ 上严格减，故 $F(p;\sigma) > F(p;\sigma_c) \geq 0$。若 $X(p) > 0$ 且 F 有实根 $\sigma_1 \leq \sigma_2$，则判别式非负给出 $X \leq b^2 w^2/p$，于是

$$\sigma_2 \geq \frac{bpw}{X} \geq \frac{p^2}{bw} > \frac{p^2}{\sqrt{2p-3}} \geq 4 > \sigma_c;$$

由 $F(p;\sigma_c) \geq 0$ 得 $\sigma_c \leq \sigma_1$，故 $F(p;\sigma) > 0$。若 F 无实根，亦有 $F > 0$。 □

定理 5.2的证明. 分三步：内部驻点组成一条曲线 $\zeta = \zeta_s(p)$；由引理 A.1，这条曲线严格增；由此 $G(\cdot;\zeta)$ 单峰。

第一步：内部驻点曲线。 由 $\varphi'(p) = -2(2p-3)(p-b)/p^4$，$\varphi$ 在 $(1,\zeta_{\mathrm{sw}})$ 上为正，最大值为 $\varphi(3/2) = (9-8b)/27$，在 $p \geq \zeta_{\mathrm{sw}}$ 时不为正。又 $b^2-8b+8 = 2(2-b)^2 - b^2$，展开得 $(b+\sqrt{b^2-8b+8})^2 = 2(2-b)^2 + 2b\sqrt{b^2-8b+8} \geq 2(2-b)^2$，故 $r_{\mathrm{cont}} \leq 8/(2-b)^2$；而 $27(2-b)^2 - 8(9-8b) = 27b^2 - 44b + 36 > 0$（判别式为负），故 $r_{\mathrm{cont}} < 27/(9-8b)$。设 $r \leq r_{\mathrm{cont}}$，则对所有 $p > 1$ 有 $r\varphi(p) < 1$。固定 $p > 1$，由式(A.9)，$E(p,\cdot)$ 在 $[p,\infty)$ 上严格减，且

$$E(p,p) = r\varphi(p), \qquad \lim_{\zeta\to\infty} E(p,\zeta) = r\varphi(p) - 1 < 0.$$

因此满足 $1<p<\zeta$、$E(p,\zeta)=0$ 的点恰好组成一条曲线 $\zeta=\zeta_s(p)$，$p\in(1,\zeta_{\mathrm{sw}})$。由隐函数定理，$\zeta_s$ 连续可微，且 $\zeta_s'=-E_p/E_\zeta$，所以沿曲线 ζ_s' 与 E_p 同号。下面估计 $\zeta_s(p)-p$。记 $\kappa=2(1-b)^2/(\zeta_{\mathrm{sw}}+1)^3$。由式(A.9)，当 $1<p<\zeta_{\mathrm{sw}}$、$p\le\zeta\le p+1$ 时 $E_\zeta\le -2(p-b)^2/\zeta^3<-\kappa$。若 $r\varphi(p)<\kappa$，取 $h=r\varphi(p)/\kappa\in(0,1)$，则 $E(p,p+h)<E(p,p)-\kappa h=0$，由 $E(p,\cdot)$ 严格减得 $\zeta_s(p)<p+h$，即

$$0<\zeta_s(p)-p<\frac{r\varphi(p)}{\kappa}.$$

又 φ 连续，且 $\varphi(1)=\varphi(\zeta_{\mathrm{sw}})=0$，故

$$\lim_{p\to1^+}\zeta_s(p)=1,\qquad \lim_{p\to\zeta_{\mathrm{sw}}^-}\zeta_s(p)=\zeta_{\mathrm{sw}}.$$

第二步：曲线单调。$p\le 3/2$ 时 $\psi(p)\le 0$，故 $E_p>0$。若曲线上某点 $p>3/2$ 处 $E_p=0$，则 $1/\zeta=\sqrt{r\psi(p)}$；代入 $E=0$ 并乘以 $-p^3$，得 $F(p;\sqrt{r})=0$。先设 $r<r_{\mathrm{cont}}$。由引理 A.1，曲线上处处 $E_p\neq0$；而 $p\le3/2$ 时 $E_p>0$，由 E_p 沿曲线连续，曲线上处处 $E_p>0$。再设 $r=r_{\mathrm{cont}}$。由引理 A.1，曲线上 E_p 的零点只可能在 $p=2$。又 E 关于 r 连续且 $E_\zeta<0$，所以对每个 p，$\zeta_s(p)$ 随 r 连续变化；在 $r<r_{\mathrm{cont}}$ 时的不等式 $E_p(p,\zeta_s(p))>0$ 中令 r 从左侧趋于 r_{cont}，得曲线上 $E_p\ge0$。两种情形下 ζ_s 都在 $(1,\zeta_{\mathrm{sw}})$ 上严格增；结合第一步的两个极限，它是该区间到自身的连续双射。

第三步：单峰性。对 $1<\zeta<\zeta_{\mathrm{sw}}$，$E(\cdot,\zeta)$ 在 $(1,\zeta)$ 内恰有一个零点 $p^*(\zeta)=\zeta_s^{-1}(\zeta)$；又 $E(1,\zeta)<0<E(\zeta,\zeta)$，所以 E 在 p^* 处由负变正，$G(\cdot;\zeta)$ 先严格减、后严格增，最小点唯一且在内部。对 $\zeta\ge\zeta_{\mathrm{sw}}$，$E(\cdot,\zeta)$ 在 $(1,\zeta)$ 内没有零点且 $E(1,\zeta)<0$，所以 G 严格减，最小点为 $p=\zeta$。由第二步，p^* 是 $(1,\zeta_{\mathrm{sw}})$ 到自身的严格增连续双射，故

$$\lim_{\zeta\to1^+}p^*(\zeta)=1,\qquad \lim_{\zeta\to\zeta_{\mathrm{sw}}^-}p^*(\zeta)=\zeta_{\mathrm{sw}}.$$

回到原变量，$S_c<S<S_{\mathrm{sw}}$ 时 $c_c^*(S)=c_0S_cp^*(S/S_c)/S$，$S\ge S_{\mathrm{sw}}$ 时 $c_c^*(S)=c_0$。由上述两个极限，

$$\lim_{S\to S_c^+}c_c^*(S)=\lim_{S\to S_{\mathrm{sw}}^-}c_c^*(S)=c_0,$$

故 c_c^* 在 (S_c,∞) 上连续，即得 (i)(ii)。由定理 5.1(ii)，成本最优控制几乎处处等于 c_c^*，再由 (ii) 即得 (iii)。 □

推论 5.6的证明. 能力约束下的允许区间 $[c^-(S),c^+(S)]\subset[c_0S_c/S,c_0]$ 对应 p 的闭子区间。由定理 5.2的证明，$G(\cdot;\zeta)$ 在 $[1,\zeta]$ 上先严格减、后严格增（或严格减），它在任一闭子区间上的最小点唯一，等于 p^* 截断到该子区间；换回 c 即得式(5.8)。 □

A.11 权重单调性

本小节证明命题 5.7，沿用上一小节的记号。

证明. (i) 由于 $A_p=-(\zeta-p)(\zeta+p-2b)/[\zeta^2(p-b)^2]$，$A$ 在 $[1,\zeta]$ 上严格减。固定 S，设 p_1、p_2 分别是 $r_1<r_2$ 下的最小点，二者属于同一允许区间。两个最优性不等式相加，得 $(r_2-r_1)[B(p_2)-B(p_1)]\le0$，即 $B(p_2)\le B(p_1)$。若 $p_2>p_1$，则 $A(p_2)<A(p_1)$，于是 $A(p_2)+r_1B(p_2)<A(p_1)+r_1B(p_1)$，与 p_1 在 r_1 下最优矛盾。故 $p_2\le p_1$，而 c、q 都随 p 增，即得逐状态结论。由式(4.5)，接触率处处不增时控制时长不减；再由式(4.11)与(4.12)得到感染与隔离的结论。对任一允许控制，J/w_c 是 r 的仿射函数，斜率为非负的隔离强度积分，所以其下确界 $J_{\min}/w_c$ 是 r 的凹且不减的函数。

(ii) 由式(A.9)，$G_{p\zeta}=E_\zeta/(p-b)^2<0$。设 $\zeta_1<\zeta_2$，p_i 是 ζ_i 下的最小点。反设 $p_2<p_1$。不考虑能力约束时允许区间为 $[1,\zeta]$，考虑时为 $[\max\{1,c_{\min}\zeta/c_0\},\min\{\zeta,(1-q_0)/(1-q_{\mathrm{cap}})\}]$，两端都随 ζ 不减，所以 p_1、p_2 在两个状态上都允许。由最优性，

$$[G(p_1;\zeta_2)-G(p_2;\zeta_2)]-[G(p_1;\zeta_1)-G(p_2;\zeta_1)]\ge0,$$

而左侧等于 $\int_{\zeta_1}^{\zeta_2}\int_{p_2}^{p_1}G_{p\zeta}\,dp\,d\zeta<0$，矛盾。故 p^* 随 ζ 不减，$q^*=1-(1-q_0)/p^*$ 亦然；阈值控制期内 S 严格减，所以隔离比例随时间不增。 □

A.12 阈值与能力约束的影响

本小节证明命题 5.5。

证明. 记 $m(S)=\min_{c^-(S)\le c\le c^+(S)} f(S,c)$。被积函数与允许界限都不含 η，m 连续；对 $S>S_c$，两项强度不能同时为零，故 $m(S)>0$。因此

$$J_{\min}(\eta)=\frac{N}{\eta}\int_{S_c}^{S^*(\eta)} m(S)\,dS.$$

(i) 由引理 3.8，S^* 随 η 严格减。对两个可行阈值 $\eta_1<\eta_2$，有 $N/\eta_1>N/\eta_2$ 与 $S^*(\eta_1)>S^*(\eta_2)$，又 $m>0$，故 $J_{\min}(\eta_1)>J_{\min}(\eta_2)$。把较低阈值下的逐状态最小化选择限制到较高阈值经过的区间上，它在每个状态仍达到 $m(S)$，即得兼容的成本最优控制。

(ii) 放宽任一能力约束，每个状态的允许区间都包含原区间，最小被积函数值不增，积分即得结论。 □

A.13 敏感性汇总

表 5: 仅隔离控制中主要量的参数敏感性

分析量	β	q_0	c_0	η	依据
启动状态 S^*	>0	<0	>0	<0	引理 3.8
控制时长 Δt	>0	<0	不定	<0	命题 3.9、补充命题 S2.2
拐点处隔离比例 $q_{\inf}$	<0	$=0$	$=0$	$=0$	定理 3.4
拐点相对位置 λ	>0	不定	>0	<0	补充命题 S3.1

注：各单元格表示对列示参数求偏导的符号，固定初始状态、人口及其余参数。前两行要求控制被触发；后两行还要求内部拐点存在。不定指在所述参数域内没有统一符号。固定 N 时以 $\theta=\eta/N$ 替换 η 不改变符号。

B 成本积分

取默认权重 $w_c=1$、$w_q=2$。

B.1 仅隔离控制

仅隔离控制下 $c=c_0$，接触项为零。由式(3.5)，隔离项的归一化强度为 $(q_c(S)-q_0)/(1-q_0)=1-S_c/S$；由式(3.6)，$dt=-N\,dS/[c_0\eta(S-\bar S)]$。代入式(2.11)与(2.12)，得到状态积分(A.5)。由 $0<\bar S<S_c$，两个被积函数有部分分式

$$\frac{1-S_c/S}{S-\bar S}=\frac{S_c/\bar S}{S}+\frac{1-S_c/\bar S}{S-\bar S},$$
$$\frac{(1-S_c/S)^2}{S-\bar S}=\frac{S_c(2\bar S-S_c)}{\bar S^2 S}-\frac{S_c^2}{\bar S S^2}+\frac{(1-S_c/\bar S)^2}{S-\bar S}.$$

在 $[S_c,S^*]$ 上逐项积分，得

$$J_q=\frac{N}{c_0\eta}\left[\frac{S_c}{\bar S}\ln\frac{S^*}{S_c}+\left(1-\frac{S_c}{\bar S}\right)\ln\frac{S^*-\bar S}{S_c-\bar S}\right], \tag{B.1}$$

$$\begin{aligned}J=\frac{2N}{c_0\eta}\Bigg[&\frac{S_c(2\bar S-S_c)}{\bar S^2}\ln\frac{S^*}{S_c}+\frac{S_c^2}{\bar S}\left(\frac{1}{S^*}-\frac{1}{S_c}\right)\\&+\left(1-\frac{S_c}{\bar S}\right)^2\ln\frac{S^*-\bar S}{S_c-\bar S}\Bigg].\end{aligned} \tag{B.2}$$

$\bar S$ 很小或 S^* 接近 S_c 时，闭式中有相近的量相减，数值计算宜直接用积分式(A.5)。

B.2 仅减少接触

仅减少接触时 $c_c(S) = c_0 S_c/S$、$q \equiv q_0$，隔离项为零。由式(4.1)，$c_c(S)S - c_0\bar{S} = c_0(S_c - \bar{S})$，即 S 的下降速度恒为 $c_0(S_c - \bar{S})\eta/N$。接触项的归一化强度为 $1 - c_c/c_0 = 1 - S_c/S$，代入式(5.1)与(5.2)，得

$$J = \frac{N}{c_0\eta(S_c - \bar{S})} \int_{S_c}^{S^*} \left(1 - \frac{S_c}{S}\right)^2 dS.$$

展开被积函数为 $1 - 2S_c/S + S_c^2/S^2$ 并逐项积分，即得

$$J = \frac{N}{c_0\eta(S_c - \bar{S})} \left[S^* - \frac{S_c^2}{S^*} - 2S_c \ln \frac{S^*}{S_c}\right]. \tag{B.3}$$

参考文献

[1] Hao Zhou et al. “Model analysis and data validation of structured prevention and control interruptions of emerging infectious diseases”. In: *Journal of Mathematical Biology* 88 (2024), p. 62. DOI: 10.1007/s00285-024-02083-y.

[2] Rocío Balderrama et al. “Optimal control for an SIR model with limited hospitalised patients”. In: *Mathematical Biosciences* 378 (2024), p. 109317. DOI: 10.1016/j.mbs.2024.109317.

[3] Yunpeng Ji et al. “Potential association between COVID-19 mortality and health-care resource availability”. In: *The Lancet Global Health* 8.4 (2020), e480. DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30068-1.

[4] Laurent Miclo, Daniel Spiro, and Jörgen Weibull. “Optimal epidemic suppression under an ICU constraint: An analytical solution”. In: *Journal of Mathematical Economics* 101 (2022), p. 102669. DOI: 10.1016/j.jmateco.2022.102669.

[5] Arthur Charpentier et al. “COVID-19 pandemic control: balancing detection policy and lockdown intervention under ICU sustainability”. In: *Mathematical Modelling of Natural Phenomena* 15 (2020), p. 57. DOI: 10.1051/mmnp/2020045.

[6] Daniel Duque et al. “Timing social distancing to avert unmanageable COVID-19 hospital surges”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117.33 (2020), pp. 19873–19878. DOI: 10.1073/pnas.2009033117.

[7] Seth Flaxman et al. “Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe”. In: *Nature* 584.7820 (2020), pp. 257–261. DOI: 10.1038/s41586-020-2405-7.

[8] Maria Nicola et al. “The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review”. In: *International Journal of Surgery* 78 (2020), pp. 185–193. DOI: 10.1016/j.ijsu.2020.04.018.

[9] Neil M. Ferguson et al. *Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand*. Imperial College London, Mar. 16, 2020. URL: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/disease-areas/covid-19/report-9-impact-of-npis-on-covid-19/ (visited on 10/21/2026).

[10] Markus Kantner and Thomas Koprucki. “Beyond just ‘flattening the curve’: Optimal control of epidemics with purely non-pharmaceutical interventions”. In: *Journal of Mathematics in Industry* 10.1 (2020), p. 23. DOI: 10.1186/s13362-020-00091-3.

[11] Florin Avram, Lorenzo Freddi, and Dan Goreac. “Optimal control of a SIR epidemic with ICU constraints and target objectives”. In: *Applied Mathematics and Computation* 418 (2022), p. 126816. DOI: 10.1016/j.amc.2021.126816.

[12] Marco Tulio Angulo et al. “A simple criterion to design optimal non-pharmaceutical interventions for mitigating epidemic outbreaks”. In: *Journal of the Royal Society Interface* 18 (2021), p. 20200803. DOI: 10.1098/rsif.2020.0803.

[13] Emilio Molina and Alain Rapaport. “An optimal feedback control that minimizes the epidemic peak in the SIR model under a budget constraint”. In: *Automatica* 146 (2022), p. 110596. DOI: 10.1016/j.automatica.2022.110596.

[14] Dylan H. Morris et al. “Optimal, near-optimal, and robust epidemic control”. In: *Communications Physics* 4.1 (2021), p. 78. DOI: 10.1038/s42005-021-00570-y.

[15] Yanni Xiao, Xiaxia Xu, and Sanyi Tang. “Sliding Mode Control of Outbreaks of Emerging Infectious Diseases”. In: *Bulletin of Mathematical Biology* 74.10 (2012), pp. 2403–2422. DOI: 10.1007/s11538-012-9758-5.

[16] Lorenzo Freddi et al. “SIR Epidemics with State-Dependent Costs and ICU Constraints: A Hamilton–Jacobi Verification Argument and Dual LP Algorithms”. In: *Applied Mathematics & Optimization* 86.2 (2022), p. 23. DOI: 10.1007/s00245-022-09884-x.

[17] Lorenzo Freddi and Dan Goreac. “Infinite Horizon Optimal Control of a SIR Epidemic Under an ICU Constraint”. In: *Journal of Convex Analysis* 31.2 (2024), pp. 525–562. DOI: 10.68381/jca31028.

[18] Biao Tang et al. “Estimation of the Transmission Risk of the 2019-nCoV and Its Implication for Public Health Interventions”. In: *Journal of Clinical Medicine* 9.2 (2020), p. 462. DOI: 10.3390/jcm9020462.

[19] Joel Hellewell et al. “Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts”. In: *The Lancet Global Health* 8.4 (2020), e488–e496. DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30074-7.

[20] Luca Ferretti et al. “Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing”. In: *Science* 368.6491 (2020), eabb6936. DOI: 10.1126/science.abb6936.

[21] Christophe Fraser et al. “Factors that make an infectious disease outbreak controllable”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 101.16 (2004), pp. 6146–6151. DOI: 10.1073/pnas.0307506101.

[22] Adam J. Kucharski et al. “Effectiveness of isolation, testing, contact tracing, and physical distancing on reducing transmission of SARS-CoV-2 in different settings: a mathematical modelling study”. In: *The Lancet Infectious Diseases* 20.10 (2020), pp. 1151–1160. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30457-6.

[23] Mengqi He, Sanyi Tang, and Yanni Xiao. “Combining the dynamic model and deep neural networks to identify the intensity of interventions during COVID-19 pandemic”. In: *PLOS Computational Biology* 19.10 (2023), e1011535. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1011535.

[24] Sara Grundel et al. “How much testing and social distancing is required to control COVID-19? Some insight based on an age-differentiated compartmental model”. In: *SIAM Journal on Control and Optimization* 60.2 (2022), S145–S169. DOI: 10.1137/20M1377783.

[25] Fernando Alvarez, David Argente, and Francesco Lippi. “A simple planning problem for COVID-19 lock-down, testing, and tracing”. In: *American Economic Review: Insights* 3.3 (2021), pp. 367–382. DOI: 10.1257/aeri.20200201.

[26] Stefan Pollinger. “Optimal Contact Tracing and Social Distancing Policies to Suppress a New Infectious Disease”. In: *The Economic Journal* 133.654 (2023), pp. 2483–2503. DOI: 10.1093/ej/uead024.

[27] Mohamed Arnouss, Yezekael Hayel, and Karam Allali. “Adaptive optimal resource allocation for isolation interventions: Flattening the curve”. In: *IFAC Journal of Systems and Control* 35 (2026), p. 100367. DOI: 10.1016/j.ifacsc.2026.100367.

[28] Sanyi Tang et al. “Threshold conditions for curbing COVID-19 with a dynamic zero-case policy derived from 101 outbreaks in China”. In: *BMC Public Health* 23.1 (2023), p. 1084. DOI: 10.1186/s12889-023-16009-8.

[29] Juanjuan Zhao et al. “Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with novel coronavirus disease 2019”. In: *Clinical Infectious Diseases* 71.16 (2020), pp. 2027–2034. DOI: 10.1093/cid/ciaa344.

[30] Robert M. Corless et al. “On the Lambert W function”. In: *Advances in Computational Mathematics* 5 (1996), pp. 329–359. DOI: 10.1007/BF02124750.

[31] 西安市统计局. *2021 年西安市国民经济和社会发展统计公报*. 2022. URL: https://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tjxx/tjgb_240/sqgb/202204/t20220408_2216664.html (visited on 10/21/2026).

[32] Tom Britton, Frank Ball, and Pieter Trapman. “A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2”. In: *Science* 369.6505 (2020), pp. 846–849. DOI: 10.1126/science.abc6810.

[33] Linda J. S. Allen. “A primer on stochastic epidemic models: Formulation, numerical simulation, and analysis”. In: *Infectious Disease Modelling* 2.2 (2017), pp. 128–142. DOI: 10.1016/j.idm.2017.03.001.