

物理 光：スネルの法則 reverse-refractive-index-2 10 もんだい

なまえ： _____

- 1 $\sin r = 0.75$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$
- 2 $\sin r = 0.6$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$
- 3 $\sin r = 0.3333333333333333$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$
- 4 $\sin r = 0.24$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$
- 5 $\sin r = 0.4$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$
- 6 $\sin r = 0.2666666666666666$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$
- 7 $\sin r = 0.3$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$
- 8 $\sin r = 0.75$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$
- 9 $\sin r = 0.3$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$
- 10 $\sin r = 0.4$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$

こたえ

1 $\sin r = 0.75$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 θ の $2.50 \times 10^{-6} \text{ m}$ の $2.50 \times 10^{-6} \text{ m}$ の媒質2, 媒質

こたえ：1.2

2 $\sin r = 0.6$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 媒質2の屈折

こたえ：2

3 $\sin r = 0.33333333333333337$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 $n_2 = \sin i = 1$ と仮定し、入射角 i と屈折角 r の関係を求めよう。

こたえ：1.2

4 $\sin r = 0.24$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.24$, 入射角 $i = 0.375$, 媒質1の屈折率媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$

こたえ：1.2

5 $\sin r = 0.4$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i のとき, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折

こたえ：1.2

6 $\sin r = 0.266666666666666666$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 $n_2 = \sin i = 1$

こたえ：2

7 $\sin r = 0.3$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i のとき, 媒質1の屈折率媒質2の屈折

こたえ：1.5

8 $\sin r = 0.75$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$ 入射角 θ の光が媒質1の屈折率 n_2 媒質2の屈折率 n_3 の媒質2に入射し、媒質2で全反射が起こる。媒質2の屈折率 n_2 の範囲を求めよ。

こたえ：1.2

9 $\sin r = 0.3$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\cos i = \frac{1}{5}$, 媒質1の屈折率媒質2の屈折

こたえ：1.2

10 $\sin r = 0.4$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.22$, 入射角 i の $\cos i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折

こたえ：2