

物理 単振動：変位と加速度の大きさ basic-acceleration 07 ふんだい

なまえ： _____

- 1 角速度の2乗 $\omega^2 = 2.25 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2$, の0.05倍
- 2 角速度の2乗 $\omega^2 = 4.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2 = 0.1$ 倍
- 3 角速度の2乗 $\omega^2 = 6.25 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2$, の0.04倍
- 4 角速度の2乗 $\omega^2 = 2.25 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2$, つり合い
- 5 角速度の2乗 $\omega^2 = 1.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2 = 0.2$ 倍
- 6 角速度の2乗 $\omega^2 = 4.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2 = 0.1$ 倍
- 7 角速度の2乗 $\omega^2 = 9.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2 = 0.1$ 倍
- 8 角速度の2乗 $\omega^2 = 4.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2$, の0.1倍
- 9 角速度の2乗 $\omega^2 = 4.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x| = 0.09$ 倍
- 10 角速度の2乗 $\omega^2 = 16.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2$, の0.1倍

物理 単振動：変位と加速度の大きさ basic-acceleration 07 たえ

なまえ： _____

- 角速度の2乗 $\omega^2 = 2.25 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2$, の場合
こたえ： 0.1125 m/s^2 こたえ： 1.25 m/s^2
- 角速度の2乗 $\omega^2 = 4.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2 = 0.1$ の場合
こたえ： 0.6 m/s^2 こたえ： 0.0375 m/s^2
- 角速度の2乗 $\omega^2 = 6.25 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2$, の場合
こたえ： 0.25 m/s^2 こたえ： 4 m/s^2
- 角速度の2乗 $\omega^2 = 2.25 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2$, の場合
こたえ： 0.27 m/s^2 こたえ： 1.8 m/s^2
- 角速度の2乗 $\omega^2 = 1.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2 = 0.2$ の場合
こたえ： 0.25 m/s^2 こたえ： 0.0625 m/s^2
- 角速度の2乗 $\omega^2 = 4.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2 = 0.1$ の場合
こたえ： 0.16 m/s^2 こたえ： 0.25 m/s^2
- 角速度の2乗 $\omega^2 = 9.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2 = 0.1$ の場合
こたえ： 0.9 m/s^2 こたえ： 1.28 m/s^2
- 角速度の2乗 $\omega^2 = 4.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2$, の場合
こたえ： 0.4 m/s^2 こたえ： 0.15 m/s^2
- 角速度の2乗 $\omega^2 = 4.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2 = 0.09$ の場合
こたえ： 0.32 m/s^2 こたえ： 0.98 m/s^2
- 角速度の2乗 $\omega^2 = 16.0 \text{ s}^{-2}$, つり合いの角速度の2乗の変位の大きさ $|x|^2$, の場合
こたえ： 1.6 m/s^2 こたえ： 0.45 m/s^2