

物理 交流：コイルのリアクタンス reverse-inductance 10 なんだい

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 1.256 \Omega$, 12π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 周波数 $f = 0.628 \text{ Hz}$ のとき、リアクタンスの近似値は 25.12Ω である。
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 6.28 \Omega$, 12π の近似値 $\pi \approx 3.14$ であるとき、周波数 $f = 250 \text{ Hz}$ のとき、リアクタンスの近似値は 157.08Ω である。
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 6.28 \Omega$, 13π の近似値 $\pi \approx 3.14$ であるとき、周波数 $f = 1205 \text{ Hz}$ のとき、リアクタンスの近似値は 753.60Ω である。
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 7.5360 \Omega$, 100π の近似値 $\pi \approx 3.14$ であるとき、リアクタンスの近似値は 2356.18Ω である。
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 25.120 \Omega$, 150π の近似値 $\pi \approx 3.14$ であるとき、リアクタンスの近似値は 376.99Ω である。
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 62.800 \Omega$, 160π の近似値 $\pi \approx 3.14$ であるとき、リアクタンスの近似値は 3141.59Ω である。
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 31.400 \Omega$, 170π の近似値 $\pi \approx 3.14$ であるとき、リアクタンスの近似値は 508.14Ω である。
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 314.0 \Omega$, 8π の近似値 $\pi \approx 3.14$ であるとき、周波数 $f = 50 \text{ Hz}$ のとき、リアクタンスの近似値は 157.08Ω である。
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 7.8500 \Omega$, 100π の近似値 $\pi \approx 3.14$ であるとき、リアクタンスの近似値は 2356.18Ω である。
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 15.700 \Omega$, 200π の近似値 $\pi \approx 3.14$ であるとき、リアクタンスの近似値は 471.24Ω である。

物理 交流：コイルのリアクタンス reverse-inductance 10 ことえ

なまえ： _____

- 1 コイルのリアクタンス $X_L = 1.256 \Omega$, 12π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 周波数 $f = 0.628 \text{ Hz}$ のとき
ことえ： 0.01 H ことえ： 0.01 H
- 2 コイルのリアクタンス $X_L = 6.28 \Omega$, 12π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 周波数 $f = 250 \text{ Hz}$ のとき
ことえ： 0.01 H ことえ： 0.2 H
- 3 コイルのリアクタンス $X_L = 6.28 \Omega$, 13π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 周波数 $f = 1505 \text{ Hz}$ のとき
ことえ： 0.02 H ことえ： 0.02 H
- 4 コイルのリアクタンス $X_L = 7.536 \Omega$, 100π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 周波数 $f = 256.28 \text{ Hz}$ のとき
ことえ： 0.02 H ことえ： 0.01 H
- 5 コイルのリアクタンス $X_L = 25.12 \Omega$, 150π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 周波数 $f = 40.28 \text{ Hz}$ のとき
ことえ： 0.2 H ことえ： 0.1 H
- 6 コイルのリアクタンス $X_L = 62.8 \Omega$, 160π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 周波数 $f = 46.28 \text{ Hz}$ のとき
ことえ： 0.2 H ことえ： 0.02 H
- 7 コイルのリアクタンス $X_L = 31.4 \Omega$, 100π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 周波数 $f = 50.28 \text{ Hz}$ のとき
ことえ： 0.5 H ことえ： 0.05 H
- 8 コイルのリアクタンス $X_L = 314.0 \Omega$, 8π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 周波数 $f = 1570 \text{ Hz}$ のとき
ことえ： 0.5 H ことえ： 0.01 H
- 9 コイルのリアクタンス $X_L = 7.85 \Omega$, 100π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 周波数 $f = 25.28 \text{ Hz}$ のとき
ことえ： 0.05 H ことえ： 0.01 H
- 10 コイルのリアクタンス $X_L = 15.7 \Omega$, 200π の近似値 $\pi \approx 3.14$, 周波数 $f = 40.28 \text{ Hz}$ のとき
ことえ： 0.05 H ことえ： 0.5 H