

物理 気体分子の運動：圧力・状態方程式・温度 穴埋め 04 もんだい

なまえ： _____

- 1 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、絶対温度 T のとき $\frac{3}{2}kT$ である。ここで k はボルツマン定数である。
- 2 気体の圧力は、気体分子が容器の壁に衝突する回数と関係している。理想気体の圧力は、絶対温度 T と体積 V の関係は $pV = nRT$ である。
- 3 気体の圧力は、気体分子が容器の壁に衝突する回数と関係している。理想気体の圧力は、絶対温度 T と体積 V の関係は $pV = nRT$ である。
- 4 気体の圧力は、気体分子が容器の壁に衝突する回数と関係している。理想気体の圧力は、絶対温度 T と体積 V の関係は $pV = nRT$ である。
- 5 理想気体の状態方程式は $pV = nRT$ と表される。ここで p は圧力、 V は体積、 n は物質量、 R は気体定数、 T は絶対温度である。
- 6 理想気体の状態方程式は $pV = nRT$ と表される。ここで p は圧力、 V は体積、 n は物質量、 R は気体定数、 T は絶対温度である。
- 7 理想気体の状態方程式は $pV = nRT$ と表される。ここで p は圧力、 V は体積、 n は物質量、 R は気体定数、 T は絶対温度である。
- 8 ボイルの法則では、温度一定のとき $pV = \text{一定}$ である。理想気体の状態方程式は $pV = nRT$ である。
- 9 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、絶対温度 T のとき $\frac{3}{2}kT$ である。ここで k はボルツマン定数である。
- 10 理想気体全体の内部エネルギーは、絶対温度 T と体積 V の関係は $U = \frac{3}{2}nRT$ である。

物理 気体分子の運動：圧力・状態方程式・温度 穴埋め 04 こたえ

なまえ： _____

- 1 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、絶対温度の内部エネルギーは、絶対温度に比例する。こたえ：比例
- 2 気体の圧力は、気体分子が容器の壁に衝突する回数に比例する。こたえ：壁
- 3 気体の圧力は、気体分子が容器の壁に衝突する回数に比例する。こたえ：壁
- 4 気体の圧力は、気体分子が容器の壁に衝突する回数に比例する。こたえ：壁
- 5 理想気体の状態方程式は $pV=nRT$ と表される。こたえ： $pV=nRT$
- 6 理想気体の状態方程式は $pV=nRT$ と表される。ボイルの法則では、温度一定のとき pV は一定である。こたえ： $pV=nRT$
- 7 理想気体の状態方程式は $pV=nRT$ と表される。こたえ： $pV=nRT$
- 8 ボイルの法則では、温度一定のとき pV は一定である。理想気体の内部エネルギーは、絶対温度に比例する。こたえ：一定
- 9 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、絶対温度に比例する。理想気体の状態方程式は $pV=nRT$ と表される。こたえ：比例
- 10 理想気体の内部エネルギーは、絶対温度に比例する。気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、絶対温度に比例する。こたえ：比例