

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー もろだ 熱力学

なまえ： _____

- 1 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を _____ 1 J 単原子分子理想気体の内部エネルギーは _____
- 2 単原子分子理想気体の内部エネルギーは 気体分子1個あたりの平均運動エネルギー
- 3 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を _____ 1 J を表す $Q < 0$ は、外部が気体に仕事を _____
- 4 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは 気体絶対温度あたりの平均運動エネルギー
- 5 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする W_{off} を 熱が外部から気体へされた仕事とする
- 6 単原子分子理想気体の内部エネルギーは 気体分子1個あたりの平均運動エネルギー
- 7 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは $Q > 0$ 絶対温度が外部から熱を _____ J
- 8 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を _____ 1 J 単原子分子理想気体の内部エネルギーは _____
- 9 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする W_{off} を 熱が外部から気体へされた仕事とする
- 10 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは $Q > 0$ 絶対温度が外部から気体へされた仕事とする

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 1 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を _____ 1c 単原子分子理想気体の内部エネルギーは
こたえ：受け取る こたえ： $3nRT/2$
- 2 単原子分子理想気体の内部エネルギーは 1b 気体分子1個あたりの平均運動エネルギー
こたえ： $3nRT/2$ こたえ：比例
- 3 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を _____ 1c W を表す Q は、外部が気体に仕事を _____
こたえ：受け取る こたえ：する
- 4 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは 1d 気体絶対温度あたりの平均運動エネルギー
こたえ：比例 こたえ：比例
- 5 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする 1e Q は、熱が外部から気体にされた仕事とする
こたえ： $Q + W_{on}$ こたえ： $Q + W_{on}$
- 6 単原子分子理想気体の内部エネルギーは 1b 気体分子1個あたりの平均運動エネルギー
こたえ： $3nRT/2$ こたえ：比例
- 7 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは 1d $Q > 0$ 絶対温度が外部から熱を _____ こたえ：受け取る
こたえ：比例
- 8 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を _____ 1c 単原子分子理想気体の内部エネルギーは
こたえ：受け取る こたえ： $3nRT/2$
- 9 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする 1e Q は、熱が外部から気体にされた仕事とする
こたえ： $Q + W_{on}$ こたえ： $Q + W_{on}$
- 10 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは 1d $Q > 0$ 絶対温度が外部から気体にされた仕事とする
こたえ：比例 こたえ： $Q + W_{on}$