

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 basic-delta-u 03 もんだい

なまえ： _____

- 1 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=110$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _on-10
- 2 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=120$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _on-10
- 3 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=130$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _on-50
- 4 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=140$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _on-5
- 5 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=150$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _on-5
- 6 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=160$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _on-5
- 7 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=170$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _on-5
- 8 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=180$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _on-5
- 9 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=190$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _on-50
- 10 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=200$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _on-5

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 basic-delta-u 03 こたえ

なまえ： _____

- | | | | | |
|----|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 1 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=110$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=110$ |
| | こたえ： 0 J | | こたえ： 0 J | |
| 2 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=120$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=120$ |
| | こたえ： 700 J | | こたえ： -300 J | |
| 3 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=130$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=130$ |
| | こたえ： -100 J | | こたえ： 700 J | |
| 4 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=140$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=140$ |
| | こたえ： -600 J | | こたえ： 700 J | |
| 5 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=150$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=150$ |
| | こたえ： -700 J | | こたえ： 900 J | |
| 6 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=160$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=160$ |
| | こたえ： -300 J | | こたえ： 100 J | |
| 7 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=170$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=170$ |
| | こたえ： 0 J | | こたえ： 600 J | |
| 8 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=180$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=180$ |
| | こたえ： 900 J | | こたえ： -100 J | |
| 9 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=190$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=190$ |
| | こたえ： 700 J | | こたえ： 300 J | |
| 10 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=200$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=200$ |
| | こたえ： 300 J | | こたえ： 700 J | |