

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 reverse-work 10 もんだい

なまえ： _____

- 1 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -200 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の~~変~~放出は負) 700 J , 気体
- 2 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 300 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の~~変~~放出は負) 100 J , 気体
- 3 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の~~変~~放出は負) 100 J , 気体
- 4 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -100 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の~~変~~放出は負) 300 J , 気体
- 5 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の~~変~~放出は負) 500 J , 気体
- 6 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 400 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の~~変~~放出は負) 600 J , 気体
- 7 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 0 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量 Q の~~変~~放出は負) $= 3000 \text{ J}$, 気体
- 8 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 0 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量 Q の~~変~~放出は負) $= 3000 \text{ J}$, 気体
- 9 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 100 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の~~変~~放出は負) 200 J , 気体
- 10 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の~~変~~放出は負) 300 J , 気体

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 reverse-work 10 こたえ

なまえ： _____

- 1 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -200 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の变化(放出は負) 700 J , 気体
こたえ： 100 J こたえ： 200 J
- 2 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 300 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の变化(放出は負) 100 J , 気体
こたえ： 200 J こたえ： -400 J
- 3 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の变化(放出は負) 100 J , 気体
こたえ： -200 J こたえ： -400 J
- 4 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -100 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の变化(放出は負) 300 J , 気体
こたえ： -200 J こたえ： 200 J
- 5 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の变化(放出は負) 500 J , 気体
こたえ： 200 J こたえ： -400 J
- 6 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 400 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の变化(放出は負) 600 J , 気体
こたえ： -100 J こたえ： 100 J
- 7 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 0 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量 Q の変化(放出は負) $= 300 \text{ J}$, 気体
こたえ： 100 J こたえ： -200 J
- 8 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 0 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量 Q の変化(放出は負) $= 300 \text{ J}$, 気体
こたえ： 100 J こたえ： -200 J
- 9 内部エネルギーの変化 $\Delta U = 100 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の变化(放出は負) 200 J , 気体
こたえ： 200 J こたえ： 100 J
- 10 内部エネルギーの変化 $\Delta U = -300 \text{ J}$, 気体が受け取る熱量の变化(放出は負) 300 J , 気体
こたえ： -200 J こたえ： 200 J