

物理 光：回折と干渉 穴埋め 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 ヤングの実験では、経路差が波長の整数倍の多数の等間隔な細いすき間による回折と
- 2 ヤングの実験では、経路差が波長の半整数倍の光の干渉に、経路差が波長の整数
- 3 薄い膜の表面と裏面などで反射した光が薄い膜の表面と裏面などで反射した光が
- 4 薄い膜の表面と裏面などで反射した光が多数の等間隔な細いすき間による回折と
- 5 薄い膜の表面と裏面などで反射した光が二つの細いすき間からの光を重ねて干渉
- 6 ヤングの実験では、経路差が波長の半整数倍の光の干渉に、経路差が波長の整数
- 7 二つの細いすき間からの光を重ねて干渉経路差が波長の整数倍のとき、干渉の縞の明るさは最大になる
- 8 多数の等間隔な細いすき間による回折と干渉を利用した実験で、経路差が波長の整数
- 9 ヤングの実験では、経路差が波長の整数倍の二つの細いすき間からの光を重ねて干渉
- 10 媒質の屈折率と幾何学的距離の積で表す量を光の経路差と呼ぶ。ヤングの実験では、経路差が波長の半整

物理 光：回折と干渉 穴埋め 06

こたえ

なまえ： _____

- ヤングの実験では、経路差が波長の整数倍のとき基本的には、経路差が波長の整数倍になる回折と干渉による明線となる。
こたえ：明線
- ヤングの実験では、経路差が波長の半整数倍のとき基本的には、経路差が波長の整数倍になる回折と干渉による暗線となる。
こたえ：暗線
- 薄い膜の表面と裏面などで反射した光が重なることで薄膜干渉が生じる。
こたえ：薄膜干渉
- 多数の等間隔な細いすき間による回折と干渉により、明線と暗線の縞模様が現れる。
こたえ：回折格子
- 二つの細いすき間からの光を重ねて干渉させるのがヤングの干渉実験である。
こたえ：ヤングの干渉実験
- ヤングの実験では、経路差が波長の半整数倍のときは基本的には、経路差が波長の整数倍になる回折と干渉による暗線となる。
こたえ：暗線
- 二つの細いすき間からの光を重ねて干渉させることがヤングの干渉実験で表す量である。
こたえ：ヤングの干渉実験
- 多数の等間隔な細いすき間による回折と干渉を利用する素直な実験系を経路差が波長の整数倍になる明線となる。
こたえ：明線
- ヤングの実験では、経路差が波長の整数倍のときは基本的には、二つの細いすき間からの光を重ねて干渉させることになる。
こたえ：ヤングの干渉実験
- 媒質の屈折率と幾何学的距離の積で表す量がヤングの実験では、経路差が波長の半整数倍になる暗線となる。
こたえ：暗線