

物理 光：回折と干渉 内容→項目 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した内容が重なる薄膜干渉などの現象暗条件を決定する
- 2 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折内容干渉を利用の経路差が波長の半整数倍
- 3 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍に内容「二つの光の経路差が波長の整数倍
- 4 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折内容干渉を利用の経路差が波長の半整数倍
- 5 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍内容薄い膜の表面と裏面を過ぎて反射し
- 6 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折内容干渉を利用の経路差が波長の整数倍
- 7 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍内容薄膜干渉などの現象暗条件を決定する
- 8 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した内容が重なる二つの細いすき間からの光を重ね
- 9 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表す量時間がかかる光を重ね
- 10 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍に内容「二つの光の経路差が波長の整数倍

物理 光：回折と干渉 内容→項目 02

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した光が重なることで生じる干渉の明暗条件を決定する」
こたえ：薄膜干渉 | 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる条件を決定する」
こたえ：反射による位相変化 |
| 2 | 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折」
こたえ：回折格子 | 内容「多数の等間隔な素早いすき間による回折」
こたえ：回折格子 |
| 3 | 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる条件を決定する」
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件 | 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる条件を決定する」
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件 |
| 4 | 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折」
こたえ：回折格子 | 内容「干渉を利用した経路差が波長の半整数倍になる条件を決定する」
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本条件 |
| 5 | 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる条件を決定する」
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本条件 | 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した光が重なることで生じる干渉の明暗条件を決定する」
こたえ：薄膜干渉 |
| 6 | 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折」
こたえ：回折格子 | 内容「干渉を利用した経路差が波長の整数倍になる条件を決定する」
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件 |
| 7 | 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる条件を決定する」
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本条件 | 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した光が重なることで生じる干渉の明暗条件を決定する」
こたえ：反射による位相変化 |
| 8 | 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した光が重なることで生じる干渉の明暗条件を決定する」
こたえ：薄膜干渉 | 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる条件を決定する」
こたえ：ヤングの干渉実験 |
| 9 | 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表す量に時間がかかる光の速度を乗じた値が波長の整数倍になる条件を決定する」
こたえ：光路長 | 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる条件を決定する」
こたえ：ヤングの干渉実験 |
| 10 | 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる条件を決定する」
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件 | 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる条件を決定する」
こたえ：ヤングの干渉実験 |