

物理 光：回折と干渉 内容→項目 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍にある」「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表される経路差が波長の整数倍になる」
- 2 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した光が重なる」「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる」
- 3 内容「薄膜干渉などの明暗条件を決める」と内容「考慮する屈折率がある」の中を進む幾何学的距離の積で表される経路差が波長の半整数倍になる」
- 4 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折」内容「媒質の利用効率と素子の中を進む幾何学的距離の積で表される経路差が波長の半整数倍になる」
- 5 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表される経路差が波長の半整数倍になる」
- 6 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍にある」「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる」
- 7 内容「二つの細いすき間からの光を重ねて干渉縞を観察する」内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる」
- 8 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表される経路差が波長の半整数倍になる」
- 9 内容「二つの細いすき間からの光を重ねて干渉縞を観察する」内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる」
- 10 内容「薄膜干渉などの明暗条件を決める」と内容「考慮する光の経路差が波長の半整数倍になる」

物理 光：回折と干渉 内容→項目 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる条件」内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的内容」
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件
こたえ：光路長
- 2 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した光が重なる場合の光の経路差が波長の半整数倍になる条件」
こたえ：薄膜干渉
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本条件
- 3 内容「薄膜干渉などの明暗条件を決めるときに考慮する位相変化」内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的内容」
こたえ：反射による位相変化
こたえ：光路長
- 4 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折」内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的内容」
こたえ：回折格子
こたえ：光路長
- 5 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的内容」
こたえ：光路長
こたえ：ヤングの干渉実験
- 6 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる条件」内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる条件」
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件
- 7 内容「二つの細いすき間からの光を重ねて干渉縞を観察する場合の経路差が波長の半整数倍になる条件」
こたえ：ヤングの干渉実験
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本条件
- 8 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的内容」
こたえ：光路長
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件
- 9 内容「二つの細いすき間からの光を重ねて干渉縞を観察する場合の経路差が波長の整数倍になる条件」
こたえ：ヤングの干渉実験
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件
- 10 内容「薄膜干渉などの明暗条件を決めるときに考慮する位相変化」内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる条件」
こたえ：反射による位相変化
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本条件