

物理 光：回折と干渉 内容→項目 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表す経路差が波長の半整数倍に等しいとき、反射光と透過光の強度が異なることを説明する。
- 2 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した光が重なることで、光の経路差が波長の半整数倍になると干渉が起きることを説明する。
- 3 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折と干渉を利用する素子からの光を重なるように制御する素子の構造を説明する。
- 4 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になると、媒質の屈折率と項目を書き進む幾何学的距離の積で表す経路差が波長の半整数倍になると干渉が起きることを説明する。
- 5 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になると、二つの光の経路差が波長の整数倍になると干渉が起きることを説明する。
- 6 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折と干渉を利用する素子の構造を説明する。
- 7 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した光が重なることで、薄膜干渉などの明暗条件が決定されることを説明する。
- 8 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表す経路差が波長の整数倍になると干渉が起きることを説明する。
- 9 内容「二つの細いすき間からの光を重ねて干渉を観察する素子の構造を説明する。
- 10 内容「薄膜干渉などの明暗条件を決定する素子の構造を説明する。

物理 光：回折と干渉 内容→項目 10

こたえ

なまえ： _____

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表される経路差が波長の半整数倍になる場合、干渉による明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：光路長 | | |
| | | 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる場合、干渉による明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：薄膜干涉 | |
- | | | | |
|---|---|--|--|
| 2 | 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した光を重ねて観察する際の明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：薄膜干涉 | | |
| | | 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折を利用する装置からの光を重ねて観察する際の明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本 | |
- | | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折を利用する装置からの光を重ねて観察する際の明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：回折格子 | | |
| | | 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる場合、干渉による明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：ヤングの干渉実験 | |
- | | | | |
|---|---|---|--|
| 4 | 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる場合、干渉による明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本 | | |
| | | 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表される経路差が波長の半整数倍になる場合、干渉による明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：光路長 | |
- | | | | |
|---|--|--|--|
| 5 | 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる場合、干渉による明暗条件は明線となる基本条
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本 | | |
| | | 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる場合、干渉による明暗条件は明線となる基本条
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本 | |
- | | | | |
|---|--|--|--|
| 6 | 内容「多数の等間隔な細いすき間による回折を利用する装置からの光を重ねて観察する際の明暗条件は明線となる基本条
こたえ：回折格子 | | |
| | | 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる場合、干渉による明暗条件は明線となる基本条
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本 | |
- | | | | |
|---|---|--|--|
| 7 | 内容「薄い膜の表面と裏面などで反射した光を重ねて観察する際の明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：薄膜干涉 | | |
| | | 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる場合、干渉による明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：反射による位相変化 | |
- | | | | |
|---|---|--|--|
| 8 | 内容「媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表される経路差が波長の半整数倍になる場合、干渉による明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：光路長 | | |
| | | 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる場合、干渉による明暗条件は明線となる基本条
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本 | |
- | | | | |
|---|--|---|--|
| 9 | 内容「二つの細いすき間からの光を重ねて観察する際の明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：ヤングの干渉実験 | | |
| | | 内容「二つの光の経路差が波長の半整数倍になる場合、干渉による明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：ヤングの実験で暗線になる基本 | |
- | | | | |
|----|---|--|--|
| 10 | 内容「薄膜干涉などの明暗条件を決めるときに考慮する際の明暗条件は暗線となる基本条
こたえ：反射による位相変化 | | |
| | | 内容「二つの光の経路差が波長の整数倍になる場合、干渉による明暗条件は明線となる基本条
こたえ：ヤングの実験で明線になる基本 | |