

なまえ： _____

- 1 「ヤングの干渉実験」について「二つの細いすき間の干渉実験」による干渉縞を扱う
- 2 「回折格子」について「多数の等間隔な細いすき間の干渉回折」と干渉を利用する
- 3 「ヤングの実験の明線」について「基本的に経路差が波長の整数倍となる位置に現れる
- 4 「ヤングの実験の明線」について「基本的に経路差が波長の整数倍となる位置に現れる
- 5 「ヤングの実験の明線」について「境界に於けるヤングの実験を考慮する必要はない
- 6 「ヤングの干渉実験」について「境界に於ける回折格子相変化を考慮する必要はない
- 7 「ヤングの実験の明線」について「境界に於ける薄膜干渉の相変化を考慮する必要はない
- 8 「薄膜干渉」について「膜の複数の境界で反射と透過の実験の明線と関係する膜の厚さ
- 9 「ヤングの実験の暗線」について「多数の等間隔な細いすき間に於ける回折と干渉を利用する
- 10 「回折格子」について「多数の等間隔な細い薄膜干渉による回折と干渉を利用する

なまえ： _____

- 1 「ヤングの干渉実験」について「二つの細いすき間の干渉実験」による干渉縞を扱うの
こたえ：○ こたえ：○
- 2 「回折格子」について「多数の等間隔な細いすき間に干渉回折」と干渉を利用境界の
こたえ：○ こたえ：×
- 3 「ヤングの実験の明線」について「基本的に経路差が波長の整数倍となる位置に現
こたえ：○ こたえ：×
- 4 「ヤングの実験の明線」について「基本的に経路差が波長の整数倍の複数の位置に現
こたえ：○ こたえ：○
- 5 「ヤングの実験の明線」について「境界にヤングの干渉実験を考慮する必要がな
こたえ：×
- 6 「ヤングの干渉実験」について「境界に回折格子相変化を考慮する必要がある
こたえ：×
- 7 「ヤングの実験の明線」について「境界に薄膜干渉の相変化を考慮する必要がある
こたえ：×
- 8 「薄膜干渉」について「膜の複数の境界で反射と干渉の実験の明線」と関係する膜の
こたえ：○ こたえ：×
- 9 「ヤングの実験の暗線」について「多数の等間隔な細いすき間に境界回折と干渉を
こたえ：×
- 10 「回折格子」について「多数の等間隔な細い薄膜干渉の反射回折と干渉を利用基本的
こたえ：○ こたえ：×