

なまえ： _____

- 1 「ヤングの実験の暗線」について「~~二つの細い光の間の実験の明線~~による干渉縞を多数
- 2 「ヤングの実験の暗線」について「~~基本的に経路差が波長の~~半整数倍となる位置に
- 3 「薄膜干渉」について「膜の複数の境界で~~反射した光の重ね合わせ~~と関係基本的には
- 4 「薄膜干渉」について「屈折率と幾何学的距離の積で表せる実験」は正しいで「~~二つの~~
- 5 「ヤングの干渉実験」について「基本的に経路差が波長の半整数倍となる細い位置に間
- 6 「ヤングの実験の明線」について「基本的に経路差が波長の整数倍となる位置に明
- 7 「ヤングの干渉実験」について「二つの細い光の間からの光に」多数の縞縞を散ら細
- 8 「薄膜干渉」について「屈折率と幾何学的距離の積で表せる」では屈折率と幾何学
- 9 「ヤングの実験の暗線」について「~~二つの細い光の間からの光に~~膜の複数の境界で
- 10 「薄膜干渉の反射」について「基本的に経路差が波長の整数倍となる位置に現れ

なまえ： _____

- 1 「ヤングの実験の暗線」について「~~二つの細い光の間から~~の明線による干渉縞を多数
こたえ：× こたえ：×
- 2 「ヤングの実験の暗線」について「~~基本的に経路差が波長の~~半整数倍となる位置に
こたえ：○ こたえ：○
- 3 「薄膜干渉」について「膜の複数の境界で~~反射した光の重ね合わせと関係基本的には~~
こたえ：○ こたえ：×
- 4 「薄膜干渉」について「屈折率と幾何学的距離の積で表せる」は正しい。「~~二つの~~
こたえ：× こたえ：○
- 5 「ヤングの干渉実験」について「~~基本的に経路差が波長の~~半整数倍となる細い位置に
こたえ：× こたえ：×
- 6 「ヤングの実験の明線」について「~~基本的に経路差が波長の~~整数倍となる位置に
こたえ：○ こたえ：○
- 7 「ヤングの干渉実験」について「~~二つの細い光の間から~~の光に、~~多数の経路差が~~細
こたえ：○ こたえ：×
- 8 「薄膜干渉」について「屈折率と幾何学的距離の積で表せる」は正しい。「~~屈折率と幾何学~~
こたえ：× こたえ：×
- 9 「ヤングの実験の暗線」について「~~二つの細い光の間から~~の光に、~~膜の複数の境界で~~
こたえ：× こたえ：×
- 10 「薄膜干渉の反射」について「~~基本的に経路差が波長の~~整数倍となる位置に現れる
こたえ：× こたえ：×