

なまえ： _____

- 1 「回折格子」について「多数の等間隔な細いすき間による回折」と干渉を利用する」の
- 2 「薄膜干渉」について「膜の複数の境界で反射した光の干渉実験を合わせと関係する」の
- 3 「光路長」について「多数の等間隔な細いすき間による回折と干渉を利用可能な」の
- 4 「ヤングの実験の暗線」について「二つの細いすき間から出た光の干渉実験を扱う」のは正「基本的
- 5 「ヤングの実験の明線」について「基本的に経路差が波長の整数倍となる位置に明線が現れる」の
- 6 「ヤングの実験の明線」について「屈折率と経路差の積で表せる」基本的には正「基本的
- 7 「光路長」について「二つの細いすき間からの光の干渉実験を扱う」のは正「基本的
- 8 「ヤングの実験の暗線」について「基本的に経路差が波長の半整数倍となる位置に暗線が現れる」の
- 9 「回折格子」について「境界によって位相変換を考慮する必要が膜の複数の境界」の
- 10 「薄膜干渉の反射」について「境界によって位相変換を考慮する必要が基本

物理 光：回折と干渉 正誤 08

こたえ

なまえ： _____

- 1 「回折格子」について「多数の等間隔な細いすき間による回折と干渉を利用する」
こたえ：○ こたえ：○
- 2 「薄膜干渉」について「膜の複数の境界で反射した光の重ね合わせと関係する」の
こたえ：○ こたえ：○
- 3 「光路長」について「多数の等間隔な細いすき間による回折と干渉を利用可能な」
こたえ：× こたえ：○
- 4 「ヤングの実験の暗線」について「二つの細いすき間から反射光による干渉縞を扱う」
こたえ：× こたえ：○
- 5 「ヤングの実験の明線」について「基本的に経路差が波長の整数倍となる位置に現れる」
こたえ：○ こたえ：×
- 6 「ヤングの実験の明線」について「屈折率と膜の厚さの積で表せる」基本的に
こたえ：× こたえ：×
- 7 「光路長」について「二つの細いすき間からの光による干渉縞を扱う」は正「基本」
こたえ：× こたえ：○
- 8 「ヤングの実験の暗線」について「基本的に経路差が波長の半整数倍となる位置に現れる」
こたえ：○ こたえ：○
- 9 「回折格子」について「境界によっては位相変換を考慮する必要が膜の複数の境界」
こたえ：× こたえ：○
- 10 「薄膜干渉の反射」について「境界によっては位相変換を考慮する必要が基本」
こたえ：○ こたえ：○