

物理 光：伝わり方・反射・屈折・分散・偏光 穴埋め 02 もんだい

なまえ： _____

- 異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を反射と呼ぶ。反射の法則では入射角と反射角が等しい。異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を屈折と呼ぶ。屈折の法則では入射角と屈折角が等しい。異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を分散と呼ぶ。分散の法則では入射角と分散角が等しい。異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を偏光と呼ぶ。偏光の法則では入射角と偏光角が等しい。
- 異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を反射と呼ぶ。反射の法則では入射角と反射角が等しい。
- 屈折率が波長によって異なるため光が波長によって分散する現象を分散と呼ぶ。分散の法則では入射角と分散角が等しい。
- 光の振動方向が特定の方向に限られた状態を偏光と呼ぶ。偏光の法則では入射角と偏光角が等しい。
- 反射の法則では入射角と反射角が等しい。異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を屈折と呼ぶ。屈折の法則では入射角と屈折角が等しい。
- 反射の法則では入射角と反射角が等しい。真空中の光速を媒質中の光速で割った量を屈折率と呼ぶ。
- 異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を反射と呼ぶ。反射の法則では入射角と反射角が等しい。異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を屈折と呼ぶ。屈折の法則では入射角と屈折角が等しい。
- 真空中の光の速さは約3.0×10⁸ m/sである。真空中の光速を媒質中の光速で割った量を屈折率と呼ぶ。
- 反射の法則では入射角と反射角が等しい。異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を屈折と呼ぶ。屈折の法則では入射角と屈折角が等しい。
- 真空中の光の速さは約3.0×10⁸ m/sである。反射の法則では入射角と反射角が等しい。

物理 光：伝わり方・反射・屈折・分散・偏光 穴埋め 02

こたえ

なまえ： _____

- 異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を反射の法則では入射角と反射角が等しい異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を屈折では入射角と屈折角が等しい
こたえ：屈折
こたえ：偏光
- 異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を反射の法則では入射角と反射角が等しい異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を屈折では入射角と屈折角が等しい
こたえ：屈折
こたえ：反射角
- 屈折率が波長によって異なるため光が波長ごとに振動方向が異なる現象を反射の法則では入射角と反射角が等しい異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を分散では入射角と分散角が等しい
こたえ：分散
こたえ：偏光
- 光の振動方向が特定の方向に限られた状態を反射の法則では入射角と反射角が等しい異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を偏光では入射角と偏光角が等しい
こたえ：偏光
こたえ：反射角
- 反射の法則では入射角と反射角が等しい異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を反射角では入射角と反射角が等しい異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を屈折では入射角と屈折角が等しい
こたえ：反射角
こたえ：屈折
- 反射の法則では入射角と反射角が等しい真空中の光速を媒質中の光速で割った量を反射角では入射角と反射角が等しい真空中の光速を媒質中の光速で割った量を屈折率では入射角と屈折率が等しい
こたえ：反射角
こたえ：屈折率
- 異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を反射の法則では入射角と反射角が等しい異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を偏光では入射角と偏光角が等しい
こたえ：屈折
こたえ：偏光
- 真空中の光の速さは約3.0×10⁸ m/sである。8 真空中の光速を媒質中の光速で割った量を3.0×10⁸ m/sである。8 真空中の光速を媒質中の光速で割った量を屈折率では入射角と屈折率が等しい
こたえ：3.0×10⁸ m/s
こたえ：屈折率
- 反射の法則では入射角と反射角が等しい異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を反射角では入射角と反射角が等しい異なる媒質の境界で光の進行方向が変わる現象を屈折では入射角と屈折角が等しい
こたえ：反射角
こたえ：屈折
- 真空中の光の速さは約3.0×10⁸ m/sである。20 反射の法則では入射角と反射角が等しい
こたえ：3.0×10⁸ m/s
こたえ：反射角