

物理 気体分子の運動：ボイルの法則 basic-final-pressureも0.2い

なまえ： _____

- 1 変化前の圧力 $p_1 = 100 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化前の圧力, 変化後の体積 V_2 , 変化前の体積
- 2 変化前の圧力 $p_1 = 200 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化前の圧力, 変化後の体積 V_2 , 変化前の体積
- 3 変化前の圧力 $p_1 = 120 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化前の圧力, 変化後の体積 V_2 , 変化前の体積
- 4 変化前の圧力 $p_1 = 120 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化前の圧力, 変化後の体積 V_2 , 変化前の体積
- 5 変化前の圧力 $p_1 = 160 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化前の圧力, 変化後の体積 V_2 , 変化前の体積
- 6 変化前の圧力 $p_1 = 80 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化前の圧力, 変化後の体積 V_2 , 変化前の体積
- 7 変化前の圧力 $p_1 = 80 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化前の圧力, 変化後の体積 V_2 , 変化前の体積
- 8 変化前の圧力 $p_1 = 160 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化前の圧力 p_2 , 変化後の体積 V_2 , 変化前の体積
- 9 変化前の圧力 $p_1 = 160 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化前の圧力, 変化後の体積 V_2 , 変化前の体積
- 10 変化前の圧力 $p_1 = 80 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化前の圧力, 変化後の体積 V_2 , 変化前の体積

物理 気体分子の運動：ボイルの法則 basic-final-pressure 02 2え

なまえ： _____

- 変化前の圧力 $p_1 = 100 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の体積 aV_1 , 変化前の温度 T_1
こたえ：200 kPa こたえ：100 kPa
- 変化前の圧力 $p_1 = 200 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の体積 $\frac{1}{8} V_1$, 変化前の温度 T_1
こたえ：200 kPa こたえ：480 kPa
- 変化前の圧力 $p_1 = 120 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の体積 $\frac{7}{8} V_1$, 変化前の温度 T_1
こたえ：240 kPa こたえ：80 kPa
- 変化前の圧力 $p_1 = 120 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の体積 $\frac{1}{8} V_1$, 変化前の温度 T_1
こたえ：240 kPa こたえ：200 kPa
- 変化前の圧力 $p_1 = 160 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の体積 $\frac{1}{8} V_1$, 変化前の温度 T_1
こたえ：400 kPa こたえ：32 kPa
- 変化前の圧力 $p_1 = 80 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の体積 $\frac{1}{8} V_1$, 変化前の温度 T_1
こたえ：200 kPa こたえ：400 kPa
- 変化前の圧力 $p_1 = 80 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の体積 Na_1 , 変化前の温度 T_1
こたえ：80 kPa こたえ：240 kPa
- 変化前の圧力 $p_1 = 160 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の体積 $\frac{1}{8} V_1$, 変化前の温度 T_1
こたえ：800 kPa こたえ：100 kPa
- 変化前の圧力 $p_1 = 160 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の体積 $\frac{1}{8} V_1$, 変化前の温度 T_1
こたえ：40 kPa こたえ：400 kPa
- 変化前の圧力 $p_1 = 80 \text{ kPa}$, 変化前の体積 V_1 , 変化後の体積 $N\alpha_1$, 変化前の温度 T_1
こたえ：80 kPa こたえ：60 kPa