

物理 気体分子の運動：ボイルの法則 reverse-final-volume 06

なまえ： _____

- 1 変化後の圧力 $p_2 = 80.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 4.0 \text{ dm}^3$, 変化後の体積 $V_2 = ? \text{ dm}^3$
- 2 変化後の圧力 $p_2 = 120.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 40.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 6.0 \text{ dm}^3$, 変化後の体積 $V_2 = ? \text{ dm}^3$
- 3 変化後の圧力 $p_2 = 60.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 4.0 \text{ dm}^3$, 変化後の体積 $V_2 = ? \text{ dm}^3$
- 4 変化後の圧力 $p_2 = 64.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 40.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 6.0 \text{ dm}^3$, 変化後の体積 $V_2 = ? \text{ dm}^3$
- 5 変化後の圧力 $p_2 = 160.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 40.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 6.0 \text{ dm}^3$, 変化後の体積 $V_2 = ? \text{ dm}^3$
- 6 変化後の圧力 $p_2 = 50.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 4.0 \text{ dm}^3$, 変化後の体積 $V_2 = ? \text{ dm}^3$
- 7 変化後の圧力 $p_2 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 40.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 6.0 \text{ dm}^3$, 変化後の体積 $V_2 = ? \text{ dm}^3$
- 8 変化後の圧力 $p_2 = 30.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 4.0 \text{ dm}^3$, 変化後の体積 $V_2 = ? \text{ dm}^3$
- 9 変化後の圧力 $p_2 = 48.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 4.0 \text{ dm}^3$, 変化後の体積 $V_2 = ? \text{ dm}^3$
- 10 変化後の圧力 $p_2 = 96.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 40.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 6.0 \text{ dm}^3$, 変化後の体積 $V_2 = ? \text{ dm}^3$

物理 気体分子の運動：ボイルの法則 reverse-final-volume 06

なまえ： _____

- 1 変化後の圧力 $p_2 = 80.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 5 \text{ L}$
こたえ: 2 L
- 2 変化後の圧力 $p_2 = 120.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$
こたえ: 2 L
- 3 変化後の圧力 $p_2 = 60.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 2 \text{ L}$
こたえ: 10 L
- 4 変化後の圧力 $p_2 = 64.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 5 \text{ L}$
こたえ: 10 L
- 5 変化後の圧力 $p_2 = 160.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 4 \text{ L}$
こたえ: 5 L
- 6 変化後の圧力 $p_2 = 50.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 2 \text{ L}$
こたえ: 2 L
- 7 変化後の圧力 $p_2 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 4 \text{ L}$
こたえ: 10 L
- 8 変化後の圧力 $p_2 = 30.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 2 \text{ L}$
こたえ: 4 L
- 9 変化後の圧力 $p_2 = 48.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 2 \text{ L}$
こたえ: 10 L
- 10 変化後の圧力 $p_2 = 96.0 \text{ kPa}$, 変化前の圧力 $p_1 = 20.0 \text{ kPa}$, 変化前の体積 $V_1 = 1 \text{ L}$
こたえ: 5 L