

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 01

なまえ： _____

- 1 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か、変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき、変化後の絶対温度 T_2 は 546 K である。
- 2 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か、変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき、変化後の絶対温度 T_2 は 546 K である。
- 3 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か、変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき、変化後の絶対温度 T_2 は 546 K である。
- 4 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か、変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき、変化後の絶対温度 T_2 は 546 K である。
- 5 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か、変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき、変化後の絶対温度 T_2 は 546 K である。
- 6 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か、変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき、変化後の絶対温度 T_2 は 546 K である。
- 7 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か、変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき、変化後の絶対温度 T_2 は 546 K である。
- 8 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か、変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき、変化後の絶対温度 T_2 は 546 K である。
- 9 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か、変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき、変化後の絶対温度 T_2 は 546 K である。
- 10 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か、変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき、変化後の絶対温度 T_2 は 546 K である。

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 01

なまえ： _____

- 1 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 100 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 40 \text{ K}$
こたえ: 100 L
- 2 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 5 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 25 \text{ K}$
こたえ: 5 L
- 3 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 2.5 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 10 \text{ K}$
こたえ: 2.5 L
- 4 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 30 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 25 \text{ K}$
こたえ: 30 L
- 5 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 80 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 5 \text{ K}$
こたえ: 80 L
- 6 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 25 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 30 \text{ K}$
こたえ: 25 L
- 7 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 160 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 20 \text{ K}$
こたえ: 160 L
- 8 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 5 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 5 \text{ K}$
こたえ: 5 L
- 9 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 5 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 5 \text{ K}$
こたえ: 5 L
- 10 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 160 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 20 \text{ K}$
こたえ: 160 L