

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 02

なまえ： _____

- 1 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か, 変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき, 変化後の体積 V_2 は 30 L である。
- 2 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か, 変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき, 変化後の体積 V_2 は 10 L である。
- 3 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か, 変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき, 変化後の体積 V_2 は 15 L である。
- 4 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か, 変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき, 変化後の体積 V_2 は 60 L である。
- 5 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か, 変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき, 変化後の体積 V_2 は 40 L である。
- 6 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か, 変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき, 変化後の体積 V_2 は 12 L である。
- 7 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か, 変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき, 変化後の体積 V_2 は 90 L である。
- 8 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か, 変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき, 変化後の体積 V_2 は 15 L である。
- 9 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か, 変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき, 変化後の体積 V_2 は 60 L である。
- 10 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の何倍か, 変化前の絶対温度 T_1 は 273 K のとき, 変化後の体積 V_2 は 10 L である。

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 02

なまえ： _____

- | | |
|----|---|
| 1 | 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ：10 L |
| 2 | 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ：60 L |
| 3 | 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ：25 L |
| 4 | 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ：80 L |
| 5 | 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ：20 L |
| 6 | 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ：20 L |
| 7 | 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ：30 L |
| 8 | 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ：50 L |
| 9 | 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ：10 L |
| 10 | 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0V_K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ：60 L |