

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 03

なまえ： _____

- 1 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 2 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 3 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 4 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 5 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 6 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 7 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 8 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 9 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 10 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 03

なまえ： _____

- 1 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 5 L こたえ : 2.5 L
- 2 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 10 L こたえ : 160 L
- 3 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 80 L こたえ : 40 L
- 4 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 10 L こたえ : 60 L
- 5 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 30 L こたえ : 20 L
- 6 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 20 L こたえ : 100 L
- 7 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 5 L こたえ : 20 L
- 8 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 40 L こたえ : 25 L
- 9 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 10 L こたえ : 60 L
- 10 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度比前の体積 $0K$, 変化前の絶対温度絶対
こたえ : 40 L こたえ : 40 L