

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 04

なまえ： _____

- 1 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 2 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 3 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 4 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 5 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 6 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 7 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 8 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 9 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$
- 10 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 273 \text{ K}$

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 04

なまえ： _____

- | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 100 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 40 \text{ K}$ | こたえ: 100 L | こたえ: 40 L |
| 2 | 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 10 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 20 \text{ K}$ | こたえ: 10 L | こたえ: 20 L |
| 3 | 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 80 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 15 \text{ K}$ | こたえ: 80 L | こたえ: 15 L |
| 4 | 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 5 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 15 \text{ K}$ | こたえ: 5 L | こたえ: 15 L |
| 5 | 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 50 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 5 \text{ K}$ | こたえ: 5 L | こたえ: 50 L |
| 6 | 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 40 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 50 \text{ K}$ | こたえ: 40 L | こたえ: 50 L |
| 7 | 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 25 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 80 \text{ K}$ | こたえ: 25 L | こたえ: 80 L |
| 8 | 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 50 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 7.5 \text{ K}$ | こたえ: 50 L | こたえ: 7.5 L |
| 9 | 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 20 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 20 \text{ K}$ | こたえ: 20 L | こたえ: 20 L |
| 10 | 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 20 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 20 \text{ K}$ | こたえ: 20 L | こたえ: 20 L |