

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 08

なまえ： _____

- 1 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の $\frac{1}{2}$ 倍, 変化前の絶対温度 T_1 は 300 K のとき, 変化後の体積 V_2 は L である。
- 2 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の $\frac{1}{2}$ 倍, 変化前の絶対温度 T_1 は 300 K のとき, 変化後の体積 V_2 は L である。
- 3 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の $\frac{1}{2}$ 倍, 変化前の絶対温度 T_1 は 300 K のとき, 変化後の体積 V_2 は L である。
- 4 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の $\frac{1}{2}$ 倍, 変化前の絶対温度 T_1 は 300 K のとき, 変化後の体積 V_2 は L である。
- 5 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の $\frac{1}{2}$ 倍, 変化前の絶対温度 T_1 は 300 K のとき, 変化後の体積 V_2 は L である。
- 6 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の $\frac{1}{2}$ 倍, 変化前の絶対温度 T_1 は 300 K のとき, 変化後の体積 V_2 は L である。
- 7 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の $\frac{1}{2}$ 倍, 変化前の絶対温度 T_1 は 300 K のとき, 変化後の体積 V_2 は L である。
- 8 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の $\frac{1}{2}$ 倍, 変化前の絶対温度 T_1 は 300 K のとき, 変化後の体積 V_2 は L である。
- 9 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の $\frac{1}{2}$ 倍, 変化前の絶対温度 T_1 は 300 K のとき, 変化後の体積 V_2 は L である。
- 10 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 は T_1 の $\frac{1}{2}$ 倍, 変化前の絶対温度 T_1 は 300 K のとき, 変化後の体積 V_2 は L である。

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 08

なまえ： _____

- 1 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 60 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 20 \text{ K}$
こたえ: 20 L
- 2 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 50 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 50 \text{ K}$
こたえ: 50 L
- 3 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 160 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 10 \text{ K}$
こたえ: 160 L
- 4 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 20 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 160 \text{ K}$
こたえ: 20 L
- 5 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 5 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 60 \text{ K}$
こたえ: 5 L
- 6 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 5 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 30 \text{ K}$
こたえ: 5 L
- 7 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 10 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 40 \text{ K}$
こたえ: 10 L
- 8 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 7.5 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 5 \text{ K}$
こたえ: 7.5 L
- 9 変化前の体積 $V_1 = 40 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 100 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 40 \text{ K}$
こたえ: 100 L
- 10 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 5 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 30 \text{ K}$
こたえ: 5 L