

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 10

なまえ： _____

- 1 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 は何 L か。
- 2 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 は何 L か。
- 3 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 は何 L か。
- 4 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 は何 L か。
- 5 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 は何 L か。
- 6 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 は何 L か。
- 7 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 は何 L か。
- 8 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 は何 L か。
- 9 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 は何 L か。
- 10 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 300 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$ のとき、変化後の体積 V_2 は何 L か。

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 basic-final-volume 10分

なまえ： _____

- 1 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 400 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$
こたえ: 20 L
- 2 変化前の体積 $V_1 = 20 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 100 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$
こたえ: 5 L
- 3 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 250 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 100 \text{ K}$
こたえ: 25 L
- 4 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 200 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 100 \text{ K}$
こたえ: 200 L
- 5 変化前の体積 $V_1 = 50 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 40 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$
こたえ: 40 L
- 6 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 80 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 200 \text{ K}$
こたえ: 80 L
- 7 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 100 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 300 \text{ K}$
こたえ: 100 L
- 8 変化前の体積 $V_1 = 10 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 20 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 100 \text{ K}$
こたえ: 20 L
- 9 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 10 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 300 \text{ K}$
こたえ: 10 L
- 10 変化前の体積 $V_1 = 30 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 $T_2 = 40 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 $T_1 = 300 \text{ K}$
こたえ: 40 L