

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 reverse-initial-volume 01

なまえ： _____

- 1 変化後の体積 $V_2 = 100.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 40.0 K , 変化前の絶対温度の絶対
- 2 変化後の体積 $V_2 = 5.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 0 K , 変化前の絶対温度の絶対
- 3 変化後の体積 $V_2 = 2.5 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 0 K , 変化前の絶対温度の絶対
- 4 変化後の体積 $V_2 = 30.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 0 K , 変化前の絶対温度の絶対
- 5 変化後の体積 $V_2 = 80.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 0 K , 変化前の絶対温度の絶対
- 6 変化後の体積 $V_2 = 25.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 0 K , 変化前の絶対温度の絶対
- 7 変化後の体積 $V_2 = 160.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 80.0 K , 変化前の絶対温度の絶対
- 8 変化後の体積 $V_2 = 5.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 0 K , 変化前の絶対温度の絶対
- 9 変化後の体積 $V_2 = 5.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 0 K , 変化前の絶対温度の絶対
- 10 変化後の体積 $V_2 = 160.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 80.0 K , 変化前の絶対温度の絶対

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 reverse-initial-volume 01

なまえ： _____

- 1 変化後の体積 $V_2 = 100.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 40.0 K , 変化前の絶対温度の体積 20.0 K
こたえ：50 L こたえ：10 L
- 2 変化後の体積 $V_2 = 5.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 10 K , 変化前の絶対温度の体積 50 K
こたえ：10 L こたえ：50 L
- 3 変化後の体積 $V_2 = 2.5 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 10 K , 変化前の絶対温度の体積 50 K
こたえ：10 L こたえ：10 L
- 4 変化後の体積 $V_2 = 30.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 50 K , 変化前の絶対温度の体積 10 K
こたえ：30 L こたえ：50 L
- 5 変化後の体積 $V_2 = 80.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 10 K , 変化前の絶対温度の体積 40 K
こたえ：40 L こたえ：10 L
- 6 変化後の体積 $V_2 = 25.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 10 K , 変化前の絶対温度の体積 30 K
こたえ：50 L こたえ：30 L
- 7 変化後の体積 $V_2 = 160.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 80.0 K , 変化前の絶対温度の体積 40.0 K
こたえ：40 L こたえ：20 L
- 8 変化後の体積 $V_2 = 5.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 10 K , 変化前の絶対温度の体積 10 K
こたえ：10 L こたえ：10 L
- 9 変化後の体積 $V_2 = 5.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 10 K , 変化前の絶対温度の体積 20 K
こたえ：10 L こたえ：20 L
- 10 変化後の体積 $V_2 = 160.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度の体積 80.0 K , 変化前の絶対温度の体積 40.0 K
こたえ：40 L こたえ：10 L