

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 reverse-initial-volume 07

なまえ： _____

- 1 変化後の体積 $V_2 = 30.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
- 2 変化後の体積 $V_2 = 40.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
- 3 変化後の体積 $V_2 = 40.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
- 4 変化後の体積 $V_2 = 40.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
- 5 変化後の体積 $V_2 = 60.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
- 6 変化後の体積 $V_2 = 20.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
- 7 変化後の体積 $V_2 = 30.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
- 8 変化後の体積 $V_2 = 20.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
- 9 変化後の体積 $V_2 = 50.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
- 10 変化後の体積 $V_2 = 20.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 reverse-initial-volume 07

なまえ： _____

- 1 変化後の体積 $V_2 = 30.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ：30 L こたえ：10 L
- 2 変化後の体積 $V_2 = 40.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ：40 L こたえ：50 L
- 3 変化後の体積 $V_2 = 40.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ：40 L こたえ：50 L
- 4 変化後の体積 $V_2 = 40.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ：40 L こたえ：50 L
- 5 変化後の体積 $V_2 = 60.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ：30 L こたえ：10 L
- 6 変化後の体積 $V_2 = 20.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ：40 L こたえ：20 L
- 7 変化後の体積 $V_2 = 30.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ：30 L こたえ：10 L
- 8 変化後の体積 $V_2 = 20.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ：20 L こたえ：30 L
- 9 変化後の体積 $V_2 = 50.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ：50 L こたえ：10 L
- 10 変化後の体積 $V_2 = 20.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ：20 L こたえ：40 L