

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 reverse-initial-volume 09

なまえ： _____

- 1 変化後の体積 $V_2 = 10.0\text{ L}$, 変化後の絶対温度後の体積 $V_0\text{ K}$, 変化前の絶対温度絶対
- 2 変化後の体積 $V_2 = 80.0\text{ L}$, 変化後の絶対温度後の体積 $V_0\text{ K}$, 変化前の絶対温度絶対
- 3 変化後の体積 $V_2 = 30.0\text{ L}$, 変化後の絶対温度後の体積 $V_0\text{ K}$, 変化前の絶対温度絶対
- 4 変化後の体積 $V_2 = 12.5\text{ L}$, 変化後の絶対温度後の体積 $V_0\text{ K}$, 変化前の絶対温度絶対
- 5 変化後の体積 $V_2 = 20.0\text{ L}$, 変化後の絶対温度後の体積 $V_0\text{ K}$, 変化前の絶対温度絶対
- 6 変化後の体積 $V_2 = 5.0\text{ L}$, 変化後の絶対温度後の体積 $V_0\text{ K}$, 変化前の絶対温度絶対
- 7 変化後の体積 $V_2 = 10.0\text{ L}$, 変化後の絶対温度後の体積 $V_0\text{ K}$, 変化前の絶対温度絶対
- 8 変化後の体積 $V_2 = 10.0\text{ L}$, 変化後の絶対温度後の体積 $V_0\text{ K}$, 変化前の絶対温度絶対
- 9 変化後の体積 $V_2 = 20.0\text{ L}$, 変化後の絶対温度後の体積 $V_0\text{ K}$, 変化前の絶対温度絶対
- 10 変化後の体積 $V_2 = 20.0\text{ L}$, 変化後の絶対温度後の体積 $V_0\text{ K}$, 変化前の絶対温度絶対

物理 気体分子の運動：シャルルの法則 reverse-initial-volume 09

なまえ： _____

- 1 変化後の体積 $V_2 = 10.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ: 10 L こたえ: 40 L
- 2 変化後の体積 $V_2 = 80.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ: 20 L こたえ: 10 L
- 3 変化後の体積 $V_2 = 30.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ: 30 L こたえ: 30 L
- 4 変化後の体積 $V_2 = 12.5 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ: 50 L こたえ: 40 L
- 5 変化後の体積 $V_2 = 20.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ: 40 L こたえ: 40 L
- 6 変化後の体積 $V_2 = 5.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ: 20 L こたえ: 40 L
- 7 変化後の体積 $V_2 = 10.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ: 20 L こたえ: 20 L
- 8 変化後の体積 $V_2 = 10.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ: 20 L こたえ: 20 L
- 9 変化後の体積 $V_2 = 20.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ: 10 L こたえ: 50 L
- 10 変化後の体積 $V_2 = 20.0 \text{ L}$, 変化後の絶対温度 T_2 の体積 $V_0 \text{ K}$, 変化前の絶対温度 T_0
こたえ: 20 L こたえ: 10 L