

# 物理 気体分子の運動：シャルルの法則 reverse-initial-volume 10

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 変化後の体積  $V_2 = 20.0\text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2\text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対
- 2 変化後の体積  $V_2 = 40.0\text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2\text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対
- 3 変化後の体積  $V_2 = 10.0\text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2\text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対
- 4 変化後の体積  $V_2 = 5.0\text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2\text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対
- 5 変化後の体積  $V_2 = 50.0\text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2\text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対
- 6 変化後の体積  $V_2 = 40.0\text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2\text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対
- 7 変化後の体積  $V_2 = 30.0\text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2\text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対
- 8 変化後の体積  $V_2 = 10.0\text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2\text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対
- 9 変化後の体積  $V_2 = 7.5\text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2\text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対
- 10 変化後の体積  $V_2 = 30.0\text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2\text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対

# 物理 気体分子の運動：シャルルの法則 reverse-initial-volume 10

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 変化後の体積  $V_2 = 20.0 \text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2 \text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対  
こたえ：20 L こたえ：10 L
- 2 変化後の体積  $V_2 = 40.0 \text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2 \text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対  
こたえ：20 L こたえ：10 L
- 3 変化後の体積  $V_2 = 10.0 \text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2 \text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対  
こたえ：10 L こたえ：50 L
- 4 変化後の体積  $V_2 = 5.0 \text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2 \text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対  
こたえ：10 L こたえ：50 L
- 5 変化後の体積  $V_2 = 50.0 \text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2 \text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対  
こたえ：50 L こたえ：40 L
- 6 変化後の体積  $V_2 = 40.0 \text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2 \text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対  
こたえ：10 L こたえ：40 L
- 7 変化後の体積  $V_2 = 30.0 \text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2 \text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対  
こたえ：30 L こたえ：50 L
- 8 変化後の体積  $V_2 = 10.0 \text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2 \text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対  
こたえ：10 L こたえ：10 L
- 9 変化後の体積  $V_2 = 7.5 \text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2 \text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対  
こたえ：30 L こたえ：10 L
- 10 変化後の体積  $V_2 = 30.0 \text{ L}$ , 変化後の絶対温度後の体積  $V_2 \text{ K}$ , 変化前の絶対温度絶対  
こたえ：30 L こたえ：10 L