

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 02

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 333.30 \text{ K}$,
圧力 $p \text{ (Pa)}$ / (絶対温度 $T \text{ (K)}$) × 気体定数 R
- 2 圧力 $p = 800.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 999.90 \text{ K}$,
圧力 $p \text{ (Pa)}$ / (絶対温度 $T \text{ (K)}$) × 気体定数 R
- 3 圧力 $p = 160.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 800.00 \text{ K}$,
圧力 $p \text{ (Pa)}$ / (絶対温度 $T \text{ (K)}$) × 気体定数 R
- 4 圧力 $p = 120.00000000000001 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 333.30 \text{ K}$,
圧力 $p \text{ (Pa)}$ / (絶対温度 $T \text{ (K)}$) × 気体定数 R
- 5 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 400.00 \text{ K}$,
圧力 $p \text{ (Pa)}$ / (絶対温度 $T \text{ (K)}$) × 気体定数 R
- 6 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 800.00 \text{ K}$,
圧力 $p \text{ (Pa)}$ / (絶対温度 $T \text{ (K)}$) × 気体定数 R
- 7 圧力 $p = 320.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 666.66 \text{ K}$,
圧力 $p \text{ (Pa)}$ / (絶対温度 $T \text{ (K)}$) × 気体定数 R
- 8 圧力 $p = 1200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 999.90 \text{ K}$,
圧力 $p \text{ (Pa)}$ / (絶対温度 $T \text{ (K)}$) × 気体定数 R
- 9 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 200.00 \text{ K}$,
圧力 $p \text{ (Pa)}$ / (絶対温度 $T \text{ (K)}$) × 気体定数 R
- 10 圧力 $p = 266.6666666666667 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3 / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 800.00 \text{ K}$,
圧力 $p \text{ (Pa)}$ / (絶対温度 $T \text{ (K)}$) × 気体定数 R

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 02

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1500 \text{ J}$
こたえ： 1.5 mol こたえ： 0.5 mol
- 2 圧力 $p = 800.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 999 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1500 \text{ J}$
こたえ： 2 mol こたえ： 2.5 mol
- 3 圧力 $p = 160.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1500 \text{ J}$
こたえ： 1 mol こたえ： 1 mol
- 4 圧力 $p = 120.00000000000001 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1500 \text{ J}$
こたえ： 1.5 mol こたえ： 2.5 mol
- 5 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1500 \text{ J}$
こたえ： 2.5 mol こたえ： 0.5 mol
- 6 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1500 \text{ J}$
こたえ： 1 mol こたえ： 0.5 mol
- 7 圧力 $p = 320.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 666 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1500 \text{ J}$
こたえ： 2 mol こたえ： 1 mol
- 8 圧力 $p = 1200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 999 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1500 \text{ J}$
こたえ： 1.5 mol こたえ： 2.5 mol
- 9 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1500 \text{ J}$
こたえ： 2 mol こたえ： 0.5 mol
- 10 圧力 $p = 266.6666666666667 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 気体分子の運動エネルギー $E_k = 1500 \text{ J}$
こたえ： 2 mol こたえ： 1 mol