

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-temperature

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 圧力定数 600.0 Pa , 物質質量 $(\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$
- 2 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 圧力定数 100.0 Pa , 物質質量 $(\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$
- 3 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 圧力定数 400.0 Pa , 物質質量 $(\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$
- 4 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 圧力定数 $99.99999999999999 \text{ Pa}$, 物質質量 $(\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$
- 5 圧力 $p = 80.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 圧力定数 200.301 Pa , 物質質量 $(\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$
- 6 圧力 $p = 80.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 圧力定数 200.301 Pa , 物質質量 $(\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$
- 7 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 圧力定数 200.301 Pa , 物質質量 $(\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$
- 8 圧力 $p = 533.3333333333334 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 圧力定数 $666.6666666666667 \text{ Pa}$, 物質質量 $(\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$
- 9 圧力 $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 3.0 \text{ mol}$, 圧力定数 180.301 Pa , 物質質量 $(\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$
- 10 圧力 $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 3.0 \text{ mol}$, 圧力定数 180.301 Pa , 物質質量 $(\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-temperature

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ | 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ |
| | こたえ: 400 K | こたえ: 800 K |
| 2 | 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ | 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ |
| | こたえ: 400 K | こたえ: 200 K |
| 3 | 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ | 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ |
| | こたえ: 800 K | こたえ: 400 K |
| 4 | 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ | 圧力 $p = 999.9999999999999 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ |
| | こたえ: 200 K | こたえ: 799.9999999999999 K |
| 5 | 圧力 $p = 80.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ | 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ |
| | こたえ: 200 K | こたえ: 800 K |
| 6 | 圧力 $p = 80.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ | 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ |
| | こたえ: 400 K | こたえ: 400 K |
| 7 | 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ | 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ |
| | こたえ: 200 K | こたえ: 400 K |
| 8 | 圧力 $p = 533.3333333333334 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ | 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ |
| | こたえ: 800 K | こたえ: 800 K |
| 9 | 圧力 $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ | 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ |
| | こたえ: 199.99999999999997 K | こたえ: 800 K |
| 10 | 圧力 $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ | 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ |
| | こたえ: 199.99999999999997 K | こたえ: 400 K |