

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-temperature

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 温度 $T = 300.0 \text{ K}$
- 2 圧力 $p = 800.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 温度 $T = 300.0 \text{ K}$
- 3 圧力 $p = 160.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 温度 $T = 300.0 \text{ K}$
- 4 圧力 $p = 120.00000000000001 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 3.333333333333333 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 温度 $T = 300.0 \text{ K}$
- 5 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 温度 $T = 300.0 \text{ K}$
- 6 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 温度 $T = 300.0 \text{ K}$
- 7 圧力 $p = 320.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 温度 $T = 300.0 \text{ K}$
- 8 圧力 $p = 1200.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 温度 $T = 300.0 \text{ K}$
- 9 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 温度 $T = 300.0 \text{ K}$
- 10 圧力 $p = 266.6666666666667 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, 温度 $T = 300.0 \text{ K}$

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-temperature

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 圧力 $p = 200.0$ kPa, 物質質量 $n = 1.5$ mol, 圧気体定数 $R = 8.314$ J/(mol·K) | 圧力 $p = 333.333$ kPa, 物質質量 $n = 3.333$ mol, 圧気体定数 $R = 8.314$ J/(mol·K) |
| | こたえ : 400 K | こたえ : 200 K |
| 2 | 圧力 $p = 800.0$ kPa, 物質質量 $n = 2.0$ mol, 圧気体定数 $R = 999.9999999999999$ J/(mol·K) | 圧力 $p = 999.9999999999999$ kPa, 物質質量 $n = 999.9999999999999$ mol, 圧気体定数 $R = 999.9999999999999$ J/(mol·K) |
| | こたえ : 400 K | こたえ : 399.99999999999994 K |
| 3 | 圧力 $p = 160.0$ kPa, 物質質量 $n = 1.0$ mol, 圧気体定数 $R = 100.8$ J/(mol·K) | 圧力 $p = 160.0$ kPa, 物質質量 $n = 1.0$ mol, 圧気体定数 $R = 100.8$ J/(mol·K) |
| | こたえ : 800 K | こたえ : 800 K |
| 4 | 圧力 $p = 120.00000000000001$ kPa, 物質質量 $n = 3.333333333333333$ mol, 圧気体定数 $R = 333.333$ J/(mol·K) | 圧力 $p = 333.333$ kPa, 物質質量 $n = 3.333$ mol, 圧気体定数 $R = 333.333$ J/(mol·K) |
| | こたえ : 400 K | こたえ : 399.99999999999994 K |
| 5 | 圧力 $p = 200.0$ kPa, 物質質量 $n = 2.5$ mol, 圧気体定数 $R = 100.8$ J/(mol·K) | 圧力 $p = 100.8$ kPa, 物質質量 $n = 0.5$ mol, 圧気体定数 $R = 100.8$ J/(mol·K) |
| | こたえ : 399.99999999999994 K | こたえ : 200 K |
| 6 | 圧力 $p = 400.0$ kPa, 物質質量 $n = 1.0$ mol, 圧気体定数 $R = 100.8$ J/(mol·K) | 圧力 $p = 100.8$ kPa, 物質質量 $n = 0.5$ mol, 圧気体定数 $R = 100.8$ J/(mol·K) |
| | こたえ : 800 K | こたえ : 800 K |
| 7 | 圧力 $p = 320.0$ kPa, 物質質量 $n = 2.0$ mol, 圧気体定数 $R = 66.66666666666666$ J/(mol·K) | 圧力 $p = 266.66666666666667$ kPa, 物質質量 $n = 6.666666666666667$ mol, 圧気体定数 $R = 66.66666666666666$ J/(mol·K) |
| | こたえ : 800 K | こたえ : 800 K |
| 8 | 圧力 $p = 1200.0$ kPa, 物質質量 $n = 1.5$ mol, 圧気体定数 $R = 999.9999999999999$ J/(mol·K) | 圧力 $p = 999.9999999999999$ kPa, 物質質量 $n = 999.9999999999999$ mol, 圧気体定数 $R = 999.9999999999999$ J/(mol·K) |
| | こたえ : 800 K | こたえ : 799.9999999999999 K |
| 9 | 圧力 $p = 200.0$ kPa, 物質質量 $n = 2.0$ mol, 圧気体定数 $R = 100.8$ J/(mol·K) | 圧力 $p = 100.8$ kPa, 物質質量 $n = 0.5$ mol, 圧気体定数 $R = 100.8$ J/(mol·K) |
| | こたえ : 200 K | こたえ : 400 K |
| 10 | 圧力 $p = 266.66666666666667$ kPa, 物質質量 $n = 8.314$ mol, 圧気体定数 $R = 8.314$ J/(mol·K) | 圧力 $p = 800.0$ kPa, 物質質量 $n = 8.314$ mol, 圧気体定数 $R = 8.314$ J/(mol·K) |
| | こたえ : 400 K | こたえ : 800 K |