

12. Seguimiento y mensajes clínicos

Cada intervención debe nacer con una medida basal, una fecha de revisión y una decisión prevista para cada resultado.

Momento	Registrar	Decisión
Antes	NRS/EVA, sueño, medicación, tarea provocadora, distancia de marcha, fuerza/ROM y objetivo del paciente.	¿Qué resultado mínimo justificaría repetir/escalar?
15-30 min tras bloqueo diagnóstico	Misma tarea provocadora y porcentaje de alivio; evitar preguntas vagas.	Concordante, parcial o negativo; anotar duración esperada del anestésico.
48-72 h	Reacción postpunción, glucemia si riesgo, signos de infección/neurológicos.	Instrucciones claras de alarma y contacto.
2-6 semanas	Dolor, función, sueño, carga y adherencia a ejercicio.	Mantener, progresar, revisar diagnóstico o derivar.
6-12 semanas	Cambio clínicamente importante y objetivos alcanzados.	No repetir técnica ineficaz; escalar solo si diagnóstico sigue concordante.

GUIÓN UNIVERSAL

“El objetivo de esta técnica es aliviar el dolor y comprobar cuánto procede de esta estructura. Si responde, usaremos esa ventana para recuperar movimiento, fuerza, sueño y actividad. Si no responde, no significa que su dolor no sea real: significa que debemos revisar el generador en vez de repetir el mismo tratamiento.”

TRAS ARTROCENESIS

“He extraído ____ cc de líquido de aspecto ____ (transparente/turbio; amarillo-ámbar/hemático). El aspecto por sí solo no identifica la causa. Si existe sospecha de infección o cristales, lo enviaremos a analizar antes de decidir el tratamiento definitivo.”

OA DE RODILLA

“El corticoide puede aliviar a corto plazo. El ácido hialurónico tiene un beneficio medio incierto y no se recomienda de rutina; el PRP puede ayudar a algunos pacientes, pero tampoco regenera el cartílago. Elegiremos según su perfil, evidencia, coste y objetivo.”

ROTURA DE MANGUITO

“El PRP no cose ni regenera una rotura completa. Puede tener un efecto analgésico en algunos escenarios, pero si hay debilidad o una rotura relevante debemos valorar el tamaño, la función y si necesita opinión quirúrgica.”