CONSTIPATION

ENGLISH	TAGALOG	BIKOL
MAIN SUBJECT: CONSTIPATION **WHAT IS CONSTIPATION?** Having fewer than three bowel movements a week is technically the definition of constipation. But how often you poop varies widely from person to person. Some people poop several times a day while others only poop one to two times a week. Whatever your bowel movement pattern is, it's unique and normal for you — as long as you don't stray too far from your pattern. **HOW DOES CONSTIPATION HAPPEN?** Constipation happens because your colon (large intestine) absorbs too much water from your poop. This dries out your poop, making it hard in consistency and difficult to push out of your body. To understand it, as food normally moves through your digestive tract, your intestines gradually absorb the nutrients. The partially digested food (waste) that passes from your small intestine to your large intestine becomes your poop. Your colon absorbs water from this waste, which makes it more solid. If you have constipation, food may move too slowly through your digestive tract. This gives your colon more time, too much time to absorb water from the waste. The stool becomes dry, hard and difficult to push out. **WHAT CAUSES CONSTIPATION?** There are many causes of constipation, including lifestyle factors, medications and medical conditions. **LIFESTYLE FACTORS** Common lifestyle causes of constipation include: - Not eating enough fiber. - Not drinking enough water. - Not getting enough exercise. - Changes in your regular routine,	**PANGUNAHING PAKSA: PAGTITIBI (CONSTIPATION)** **ANO ANG PAGTITIBI?** Ang pagdumi nang mas kaunti sa tatlong beses sa isang linggo ay teknikal na depinisyon ng pagtitibi. Pero kung gaano ka kadalas tumae ay nag-iiba kada tao. May ilang tao na dumudumi nang ilang beses sa isang araw, samantalang ang iba naman ay dumudumi lamang nang isa hanggang dalawang beses sa isang linggo. Anuman ang nakasanayan mong dalas ng pagdumi, ito ay natatangi at normal para sa iyo — hangga't hindi ito masyadong lumalayo sa iyong karaniwang pattern ng pagdumi. **PAANO NANGYAYARI ANG PAGTITIBI?** Nangyayari ang pagtitibi dahil sumisipsip ng sobrang tubig mula sa iyong dumi ang iyong colon (malaking bituka). Dahil dito, natutuyo ang iyong dumi, nagiging matigas ang pagkakabuo nito, at nagiging mahirap ilabas mula sa iyong katawan. Upang mas maunawaan ito, habang normal na dumadaloy ang pagkain sa iyong digestive tract, unti-unting sinisipsip ng iyong mga bituka ang mga sustansiya mula sa pagkain. Ang bahagyang natunaw na pagkain (dumi) na dumadaan mula sa iyong maliit na bituka patungo sa iyong malaking bituka ay nagiging iyong dumi. Sinisipsip ng iyong colon ang tubig mula sa mga tirang ito, kaya nagiging mas buo at matigas ang mga ito. Kung ikaw ay may pagtitibi, maaaring masyadong mabagal ang pagdaan ng pagkain sa iyong sistemang panunaw. Dahil dito, nagkakaroon ng mas maraming oras o sobrang tagal ma-absorba ang tubig mula sa mga tira ng pagkain. Nagiging tuyo at matigas ang dumi, kaya nagiging mahirap itong ilabas. **ANO ANG MGA SANHI NG**	**PANGUNANG SIMUNO: PAGTITIBI (CONSTIPATION)** **UNO ANA PAGTITIBI?** Ana pag-udo na laka gatikot sa tulong beses sa usad na semana ay teknikal na depinasyon kana pagtitibi. Kin gaumno ika kadalas mag udo ay nag-iiba kada two. Agko ibang tawo na nag uudo sa pirang beses sa usad na aldow, agko mag iba na nag-uudo sana sa usad o labi pang usad sa usad na semana. Uno man a nakagawian mong dalas kana pag-udo, adi ay naiiba ag normal para kanimo - hanggang diri adi masyadong nararayo sa pattern ka kanimong pag udo. **PAUNO NANGYAYARI ANA PAGTITIBI?** Nangyayari ana pagtitibi kwasa sinusupsop ka sobrang tubig na galin sa kanimong ati ana kanimong colon (dakulong bituka). Dahil kadi, namamara ana kanimong ati, na nagkukusa ana pagbilog kadi, ag nagiging mas masakit iluwas ka kanimong awak. Nganing mas maintindihan adi, laning normal na nagdadaloy ana pagkaon sa kanimong digestive tract, gurugatikot na sinusupsop kana kanumong bituka ana mga sustansiya na galin sa pagkaon. Ana bahagyang natunow na pagkaon (ati) na nag-aagi galin sa kanimong saday na bituka paiyan sa kanimong dakulong bituka ay nagiging ati. Sinusupsop kana kanimong colon ana tubig galin sa mga natudang adi, kaya nagiging mas bilog ag mas makusa ana mga adi. Kin ika agko pagtitibi, puwedeng masyadong maluway ana pag-agi kana pagkaon sa kanimong sistemang pantunow. Dahil kadi, nagkaka-agko mas dakol na oras o sobrang uban ma-absorba ana tubig galin sa mga tudang pagkaon. Nagiging mara ag makusa ana ati, kaya nagiging mas masakit ana pag-luwas.

such as traveling or eating, or going to bed at different times.
- Consuming large amounts of milk or cheese.
- Stress.
- Resisting the urge to have a bowel movement.

SYMPTOMS OF CONSTIPATION
Constipation symptoms include:
- You have fewer than three bowel movements a week.
- Your stools are dry, hard and/or lumpy.
- Your stools are difficult or painful to pass.
- You have a stomachache or cramps.
- You feel bloated and nauseated.
- You feel that you haven't completely emptied your bowels after a movement.

RISK FACTORS OF CONSTIPATION
People of all ages can have an occasional bout of constipation. But certain risk factors make people more likely to become consistently constipated ("chronic constipation"). These factors include:
- Age. People older than 65 are often less active, have a slower metabolism, and have less muscle contraction strength along their digestive tract than when they were younger.
- Changes in your hormones may make you more prone to constipation.
- Not eating enough high-fiber foods. Fiber keeps food moving through your digestive system.
- Taking certain medications.
- Having certain neurological diseases of the brain and spinal cord and digestive diseases.

CAN CONSTIPATION CAUSE INTERNAL DAMAGE OR LEAD TO OTHER HEALTH PROBLEMS?
There are a few complications that could happen if you don't have soft, regular bowel movements. Some complications include:
- Swollen, inflamed veins in your rectum (hemorrhoids).
- Tears in the lining of your anus from hardened stool trying to pass

PAGTITIBI?
Maraming posibleng sanhi ng pagtitibi, kabilang ang mga salik sa pamumuhay, mga gamot, at mga kondisyong medikal.

MGA SALIK SA PAMUMUHAY
Kabilang sa mga karaniwang sanhi ng pagtitibi na may kaugnayan sa pamumuhay ang:
- Hindi pagkain ng sapat na pagkaing mayaman sa fiber.
- Hindi pag-inom ng sapat na tubig.
- Hindi pagkakaroon ng sapat na ehersisyo.
- Pagbabago sa iyong regular na nakagawian, tulad ng paglalakbay o pagkain, o pagtulog sa iba't ibang oras.
- Pagkonsumo ng maraming gatas o keso.
- Stress.
- Pagpigil sa pagnanais na dumumi.

MGA SINTOMAS NG PAGTITIBI
Kabilang sa mga sintomas ng pagtitibi ang:
- Dumudumi ka nang mas kaunti sa tatlong beses sa isang linggo.
- Ang iyong dumi ay tuyo, matigas, at/o bukol-bukol.
- Mahirap ilabas ang iyong dumi.
- Nakakaramdam ka ng pananakit ng tiyan o pamumulikat.
- Nakakaramdam ka ng kabag o pagkahilo.
- Pakiramdam mo ay hindi lubusang nailabas ang laman ng iyong bituka pagkatapos dumumi.

MGA SALIK NA NAGPAPATAAS NG PANGANIB NG PAGTITIBI
Maaaring makaranas ng paminsan-minsang pagtitibi ang mga tao sa lahat ng edad. Pero may ilang salik na nagpapataas ng posibilidad na makaranas ang isang tao ng palagiang pagtitibi ("chronic constipation").
Kabilang sa mga salik na ito ang:
- Edad. Ang mga taong higit sa 65 taong gulang ay kadalasang hindi gaanong aktibo, may mas mabagal na metabolismo, at mas mahina ang pag-urong ng mga kalamnan sa kanilang sistemang panunaw kumpara noong mas bata pa sila.

UNO ANA MGA RASON KANA PAGTITIBI?
Dakol na posibleng sanhi kana pagtitibi, kaiba ana mga salik sa pambuhay, mga bulong, ag mga kondisyong medikal.

MGA SALIK SA PAMBUHAY
Kaiba sa mga pirmeng dahilan kana pagtitibi na agko kaugnayan sa pambuhay ana:
- Diri pagkaon sa tamang pagkaon na mayaman sa fiber.
- Diri pag-inom sa tamang tubig.
- Diri pagka agko sapat na ehersisyo.
- Pagbabago kana kanimong regular na nakasanayan, arug kana paglalakbay or pagkaon, o pagturog sa ibat ibang oras.
- Pagkunsumo kana dakol na gatas o keso.
- Pagpupugol kana pagkagustong mag-udo.

MGA SINTOMAS KANA PAGTITIBI
Kaiba sa mga sintomas kana pagtitibi ana:
- Nag-uudo ika sa mas gatikot sa tulong beses sa usad na semana.
- Ana kanimong ati ay mara, makusa, ag/o bukol-bukol.
- Masakit iluwas ana kanimong ati.
- Nakakamati ika sa pangungulog kana buros o pamumulikat.
- Nakakamati ika sa kabag o pagka-libong.
- Pagmati mo ay diri mo nailuwas ngamin na luog kana kanimong bituka pakatapos mag-udo.

MGA SALIK NA NAGPAPALANGKAW KANA PELIGRO KANA PAGTITIBI
Puwedeng makamati sa paminsan-minsang pagtitibi kana mga tawo sa ngaming na edad. Pero agko pirang salik na nagpapalangkaw kana posbilidad na makamati ana usad na tawo sa pirmehang pagtitibi ("chronic constipation").
Kaiba sa mga salik na adi ana:
- Edad. Ana mga tawong higit pa sa 65 anyos ay kadalasang diri gaumno ka aktibo, agko mas mabagal na metabolismo, ag mas maluway ana pag-urong kana mga kalamnan sa kanirang sistemang pantunow kumpara kadtong mas igin pa sira.

through (anal fissures).
- An infection in the pouches (diverticula) that sometimes form off your colon wall from stool that's become trapped and infected (diverticulitis).
- A pile-up of too much poop in your rectum and anus (fecal impaction).
- Damage to your pelvic floor muscles from straining to move your bowels. These muscles help control your bladder, among other things. Too much straining for too long may cause urine to leak from your bladder (stress urinary incontinence).

CAN CONSTIPATION CAUSE TOXINS TO BUILD UP IN MY BODY AND MAKE ME SICK?

This usually isn't the case. Although your colon holds on to stool longer when you're constipated and you may feel uncomfortable, it's an expandable container for your waste. It takes a severe illness in your colon for the walls to leak toxins into your body (toxic megacolon).

MANAGEMENT AND TREATMENT

HOW DO YOU RELIEVE CONSTIPATION?

You can manage most cases of mild to moderate constipation at home. Self-care starts by taking an inventory of what you eat and drink and then making changes.

Some recommendations for immediate constipation relief at home include:

- Drink two to four extra glasses of water a day. Avoid caffeine-containing drinks and alcohol, which can cause dehydration. Also, avoid juice and high-sweetened beverages.
- Avoid processed meats, fried foods and refined carbs like white bread, pasta and potatoes. It's OK to eat lean meats like poultry and low-fat dairy products.
- Add fruits, vegetables, whole grains and other high-fiber foods to your daily diet. Eat fewer high-fat foods, like meat, eggs and cheese.
- Eat prunes, bran cereal and other high-fiber fruits like oranges, pineapples, berries, mangos,

- Mga pagbabago sa hormones. Maaaring maging mas madaling kapitan ng pagtitibi ang isang tao dahil sa mga pagbabago sa hormones.
- Hindi pagkain ng sapat na pagkaing mayaman sa fiber. Tinutulungan ng fiber na mapanatiling gumagalaw ang pagkain sa iyong sistemang panunaw.
- Pag-inom ng ilang partikular na gamot.
- Pagkakaroon ng ilang partikular na sakit sa nerbiyos at sistemang panunaw. Kabilang sa mga sakit sa nerbiyos ang mga sakit sa utak at spinal cord o gulugod.

MAAARI BANG MAGDULOT NG PANLOOB NA PINSALA O IBA PANG PROBLEMANG PANGKALUSUGAN ANG PAGTITIBI?

May ilang komplikasyong maaaring mangyari kung hindi ka nagkakaroon ng malambot at regular na pagdumi. Kabilang sa mga komplikasyong ito ang:

- Pamamaga ng mga ugat sa tumbong (Almoranas o "hemorroids").
- Mga punit sa lining ng puwit na dulot ng matigas na dumi na pilit na dumadaan palabas (anal fissures).
- Impeksiyon sa maliliit na supot (diverticula) na kung minsan ay nabubuo sa dingding ng colon na puwedeng maipon at maging impeksyon (Diverticulitis).
- Labis na pag-iipon ng dumi sa tumbong at puwit (Pagbara ng dumi o "fecal impaction").
- Maaaring mapinsala ang mga kalamnan ng pelvic floor dahil sa labis na pag-iri habang dumudumi. Ang mga kalamnang ito ay tumutulong sa pagkontrol ng pantog, bukod sa iba pang mga tungkulin. Ang sobrang pag-iri sa loob ng mahabang panahon ay maaaring magdulot ng hindi sinasadyang pagtagas ng ihi mula sa pantog (stress urinary incontinence).

MAAARI BANG MAGDULOT ANG PAGTITIBI NG PAG-IIPON NG MGA LASON SA AKING KATAWAN AT MAGPASAKIT SA AKIN?

Karaniwang hindi ito nangyayari.

- Mga pagbabago sa hormones. Puwedeng mas madaling makapitan sa pagtitibi ana usad na tawo dahil sa mga pagbabago kana hormones.
- Diri pagkaon sa tamang pagkaon na mayaman sa fiber. Tinatabangan kana fiber na mapanatiling nag-iiwag ana pagkaon sa kanimong sistemang pantunow.
- Pag-inom kana pirang partikular na bulong.
- Pagkaka-agko pirang partikular na ilang sa nerbiyos ag sistemang pantunow. Kaiba sa mga ilang sa nerbiyos ana mga ilang sa utak ag spinal cord o gulugod.

PUWEDE BANG MAGDARA SA PAGLUOG NA PINASALA O IBA PANG PROBLEMANG PANGKALUSUGAN ANA PAGTITIBI?

Agko pirang komplikasyong puwedeng mangyari kin diri ika nagkaka-agko malambot ag regular na pag-ati. Kaiba sa mga komplikasyon adi ana:

- Pamamaga kana mga ugat sa tumbong (Almoranas o "hemorroids").
- Mga rapak sa lining kana lubot na dara kana makusang ati na pirit pinapaluwas (anal fissures).
- Impkesyon sa satsaday na supot (diverticula) na kin minsan ay nagbibilog sa ringring kana colon na puwedeng matipon ag maging impeksyon (Diverticulitis).
- Labis na pagtitipon kana mg ati sa tumbong ag lubot (Pagbara ng dumi o "fecal impaction").
- Puwedeng mapinsala ana mga kalamnan kana pelvic floor kwasa sa labis na pag-iri habang nag-uudo. Ana mga kalamnang adi ay nagtatabang sa pagkontrol kana pantog, bukod sa iba pang mga tungkulin. Ana sobrang pagrag-us sa luog kana maabang panahpn ay puwedeng magdara sa diri sinasadyang pagtagas kana tabid galin sa pantog (stress urinary incontinence).

PUWEDE BANG MAGDARA ANA PAGTITIBI KANA PAGTITIPON KA MGA LASON SA KANAKONG AWAK AG MAGPASAKIT KANAKO?

Karaniwang diri adi nangyayari. Mas

avocados and papaya.
- Keep a food diary and single out foods that constipate you.
- Get moving — exercise.
- Check how you sit on the toilet. Raising your feet, leaning back or squatting may make pooping easier.
- Don't read or use your phone or other devices while trying to move your bowels.
- Avoid holding the urge to use the bathroom. Eventually, it will block the signal from your colon to your brain to relax and let the poop out.

PREVENTION OF CONSTIPATION

Use the same home-based methods you used to treat constipation to prevent it from becoming a chronic problem:
- Eat a well-balanced diet with plenty of fiber. Good sources of fiber are fruits, vegetables, legumes, and whole-grain breads and cereals. Fiber and water help your colon pass stool.
- Most of the fiber in fruits is found in the skin, such as in apples. Fruits with seeds you can eat, like strawberries, have the most fiber.
- If you have diverticulitis, you might be advised to avoid fruits with seeds.
- Drink eight 8-ounce glasses of water a day. (Note: Milk can cause constipation in some people.) Liquids that contain caffeine, such as coffee and soft drinks, can dehydrate you. You may need to stop drinking these products until your bowel habits return to normal.
- Exercise regularly. It doesn't need to be much, even walking helps a lot.
- Move your bowels when you feel the urge. Don't wait.

Habang mas matagal na nananatili ang dumi sa iyong colon kapag ikaw ay may pagtitibi at maaari kang makaramdam ng hindi komportableng pakiramdam, ang colon ay isang napapalawak na sisidlan para sa iyong mga dumi.Kailangan ng isang malubhang sakit sa iyong colon upang tumagas ang mga lason mula sa mga dingding nito papunta sa iyong katawan (toxic megacolon).

PAMAMAHALA AT PAGGAMOT

PAANO MAPAPAGINHAWA ANG PAGTITIBI?

Maaari mong pamahalaan sa bahay ang karamihan sa mga banayad hanggang katamtamang kaso ng pagtitibi. Nagsisimula ang pangangalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong mga kinakain at iniinom, at pagkatapos ay paggawa ng mga kinakailangang pagbabago.

Kabilang sa mga rekomendasyon para sa agarang pagpapaginhawa ng pagtitibi sa bahay ang:
- Uminom ng dalawa hanggang apat na karagdagang baso ng tubig bawat araw. Iwasan ang mga inuming may caffeine at alkohol dahil maaari itong magdulot ng dehydration o kakulangan sa tubig sa katawan. Iwasan din ang mga juice at inuming mataas ang dami ng asukal.
- Iwasan ang mga naprosesong karne, pritong pagkain, at mga pinong carbohydrate tulad ng puting tinapay, pasta, at patatas. Mainam namang kumain ng mga produktong walang gaanong taba.
- Dagdagan ang prutas, gulay, whole grains, at iba pang pagkaing mayaman sa fiber sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Bawasan ang mga pagkaing mataas sa taba, tulad ng karne, itlog, at keso.
- Kumain ng prunes, bran cereal, at iba pang prutas na mayaman sa fiber tulad ng mga dalandan, pinya, berries, mangga, abokado, at papaya.
- Magtala ng mga pagkaing kinakain mo. Tukuyin ang mga pagkaing nagdudulot sa iyo ng pagtitibi.
- Kumilos at mag-ehersisyo.

mauban na nananatili ana ati sa kanimong colon kapag ika ay agko pagtitibi ag puwedeng ikang makaramdam kana diri komportableng pagmati, ana colon ay usad sa nagpapalawak na butanga para ka kanimong mga ati. Kaipuhang sa usad na malalang ilang sa kanimong colon nganing mag tagas ana mga lason galin sa mga ringring kadi paiyang awak (toxin megacolon).

PAMAMAHALA AG PAGBULONG

PAUNO MAPAPAGINHAWA ANA PAGTITIBI?

Puwede mong pamahalaan sa baloy ana kadaklan sa mg abanayad hanggang katamtamang kaso kana pagtitibi. Nagpupuon adi sa pag-aataman kana sadiri sa pamamaagi kana pagsusuri ka kanimong mga kinakaon ag iniinom, ag pagkatapos ay paggibo kana mga kinakaipuhang pagbabago.

Kaiba sa mga rekomendasyon nganing mapaginahawa tulos ana pagtitii sa baloy ana:
- Pag-inom sa darawa hanggang upat na karagdagang baso kana tubig bawat aldow. Likayan ana mga inumong agko caffeine ag alkohol kwasa puwede ading magdara sa dehydration o kakulangan sa tubig sa awak. Likayan ana mga juice ag inumong alangkaw sa asukar.
- Likayan ana mga prosesong karne, pritong pagkaon, ag mga inong cabohydrate arug kana putting tinapay, pasta ag patatas. Mas maray na kumaon sa mga produktong uda gaumnong taba.
- Rugangan ana prutas, gulay, whole grains, ag iba pang pagkaon na mayaman sa fiber sa kanimong pang uru-aldow na pagkaon. Bawason ana mga pagkaong alangkaw sa taba, arug kana karne, itlog, ag keso.
- Kumaon sa prunes, bran cereal, ag iba pang prutas na mayaman sa fiber arug kana mga dalandan, pinya, berries, mangga, abokado, ag papaya.
- Maglista kana mga pagkaong pinagkakaon mo. Isihon ang mga pagkaong nagdadara kanimo sa pagtitibi.

	- Suriin ang iyong posisyon habang nakaupo sa inidoro. Ang pagtaas ng iyong mga paa, pag-upo nang parang naka-squat ay maaaring makatulong upang mas madaling dumumi. - Huwag magbasa o gumamit ng cellphone o iba pang mga elektronikong kagamitan habang sinusubukang dumumi. - Huwag pigilan ang pagnanais na gumamit ng banyo. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong maputol ang signal mula sa iyong colon papunta sa iyong utak na nagsasabi sa iyong mga kalamnan na magrelaks at ilabas ang dumi. **PAG-IWAS SA PAGTITIBI** Gamitin ang parehong mga pamamaraan sa pangangalaga sa sarili na ginagamit sa paggamot ng pagtitibi upang maiwasan itong maging isang pangmatagalang problema: - Kumain ng balanseng pagkain na maraming fiber. Kabilang sa magagandang mapagkukunan ng fiber ang mga prutas, gulay, legumbre (tulad ng beans at gisantes), at mga tinapay at cereal na gawa sa whole grains. Tinutulungan ng fiber at tubig ang iyong colon na mailabas ang dumi. - Karamihan sa fiber ng mga prutas ay matatagpuan sa balat ng mga ito, tulad ng mansanas. - Ang mga prutas na may mga butong maaaring kainin, tulad ng strawberry, ay may pinakamaraming fiber. - Kung mayroon kang diverticulitis, maaaring payuhan ka na iwasan ang mga prutas na may mga buto. - Uminom ng walong baso ng tubig na may tig-8 onsa bawat araw. (Tandaan: Maaaring magdulot ng pagtitibi ang gatas sa ilang tao.) Ang mga inuming may caffeine, tulad ng kape at soft drinks, ay maaaring magdulot ng dehydration. Maaaring kailanganin mong ihinto muna ang pag-inom ng mga produktong ito hanggang sa bumalik sa normal ang iyong pagdumi. - Regular na mag-ehersisyo. Hindi kailangang mabigat ang ehersisyo, kahit ang paglalakad ay malaking tulong.	- Magkilos ag mag-ehersisyo. - Surion ana kanimong posisyong hanag nakaula sa inodoro. Ana paglangkaw ka kanimong mga tiil, pag-ula na bana naka squat ay puwedeng makatabang nganing mas madaling dumumi. - Diri magbasa o gumamit sa selpon o iba pang mga elektronik na kagamitan habang ikay nag aati. - Diri pagpugulan ana pagustong gumamait sa banto. Sa paglipas kana panahon, puwedeng maputol kadi ana signal galin sa kanimong colon paiyang mga kalamnann na nag relaks ag iluwas ana mga ati. **PAGLIKAY SA PAGTITIBI** Gamiton ana parehong mga pamamaagi sa pangangataman sa sadiri na ginagamit sa pagbubulong kana pagtitibi nganing malikayan ading maging usad na pangmaubanang problema: -Kumaon sa balanseng pagkaon na dakol ana fiber. Kaiba sa magagayong pagkuonan sa fiber ana mga prutas, gulay, legumbr (arug kana beans ag gisantes), ag mga tinapay ag cereal na gibo sa whole grains. Tintabangan kana fiber ag tubig ana kanimong colon na mailuwas ana ati. - Kadaklan sa fiber na mga prutas ay maaanapan sa mga balat kadi, arug kana masanas. - Ang mga prutas na agko mga butong puwedeng kaunon, arug kana strawberry, ay agko pinakadakol na fiber. - Kin agko ika diverticulitis, puwedeng payuhan ka na likayan ana mga prutas na agko mga buto. - Uninom sa walong baso sa tubig na agko tig 8 onsa kada aldow. (Rumruman: Puwedeng magdara sa pagtitibi ana gatas sa pirang katawo.) Ana mga inumong agko caffeine, arug kana kape ag softdrinks, ay puwedeng magdara sa dehydration. Puwedeng kaipuhanan mong munang ipundo ana paginom kana mga produktong adi hanggang sa bumalik sa normal ana kanimong pag-ati. - Regular na mag ehersisyo. Diri kaipuhang magubat ana ehersisyo, dawa mag-agi-agi ay dakulong

	- Dumumi kapag naramdaman mo na ang pagnanais na dumumi. Huwag magpara ulat.	tabang. - Mag udo kapag nakakamati na nais mong mag ati. Diri mag para pugol.

COUGH

ENGLISH	TAGALOG	BIKOL
MAIN SUBJECT: COUGH **WHAT IS A COUGH?** A cough is a reflex that forces bursts of air through your airways and out of your throat and mouth. You usually feel a tickly or scratchy feeling in your throat that makes you cough. A cough is your body's way of protecting you from foreign substances that find their way into your airways. It also clears mucus out of your lungs and airways, which also gets rid of germs and irritants. You might have a dry, non-productive cough (without mucus) or a wet, productive cough (with mucus). A cough might be barky (a sign of croup) or end with a whoop (a sign of whooping cough). It might come on suddenly and go away within a few weeks. Or it might seem like it's been going on forever and will never go away (chronic cough). **POSSIBLE CAUSES** **WHAT ARE THE MOST COMMON CAUSES OF COUGH?** Some common causes of cough include: - Acid reflux or GERD (gastroesophageal reflux disease). - Allergens, like pollen, pet dander and molds. - Asthma. - Certain medications, like ACE inhibitors and nasal sprays. - COPD and other chronic lung diseases. - Infections, like colds, flu, whooping cough, bronchitis and pneumonia. - Irritants, like smoke, dust and strong smells.	**PANGUNAHING PAKSA: UBO** **ANO ANG UBO?** Ang ubo ay isang lakas na tugon ng katawan na nagtutulak ng bugso ng hangin palabas sa pamamagitan ng mga daanan ng hangin, lalamunan, at bibig. Pwede kang makaramdam ng pangangati o tila may kumikiliti sa iyong lalamunan na nagiging sanhi ng pag-ubo. Ang pag-ubo ay paraan ng iyong katawan upang protektahan ang sarili laban sa mga banyagang bagay na nakapasok sa iyong mga daanan ng hangin. Tinutulungan din nitong alisin ang plema mula sa iyong mga baga at mga daanan ng hangin, na nag-aalis din ng mga mikrobyo at mga bagay na nagdudulot ng iritasyon. Maaaring magkaroon ka ng tuyong ubo na walang plema o basang ubo na may plema. Ang ubo ay maaaring may tunog na parang tahol (na palatandaan ng croup) o nagtatapos sa isang matinis na tunog na kasunod ng pag-ubo. Maaaring bigla itong magsimula at mawala sa loob ng ilang linggo. O kaya naman, maaaring maramdaman mong napakatagal na nitong nararanasan at tila hindi na ito mawawala (pangmatagalang ubo). **MGA POSIBLENG SANHI** **ANO ANG MGA PINAKAKARANIWANG SANHI NG UBO?** Kabilang sa mga karaniwang sanhi ng ubo ang: - Acid reflux o GERD (gastroesophageal reflux disease). - Mga allergen, tulad ng pollen,	**PANGUNANG SIMUNO: UBO** **UNO ANA UBO?** Ana ubo ay usad na kusog na tugon kana awak na nagbubusol kana angin paluwas sa pamamaagi kana mga agihan sa angin, lalamunan, at nganga. Puwede ikang makamati sa gatol o bana nang kukudok sa kanimong lalamunan na nagiging rason kana pag ubo. Ana pag ubo ay paagi kana kanimong awak nganing protektaran ana sadiri laban sa mga banyagang bagay na nakakaluog sa kanimong mga agihan sa angin. Tinatabangan kadi na tanggalon ana plema galin sa kanimong baga ag mga agihan sa angin, na nag-tatanggal sa mga mikrobyo ag mga bagay na nagdadara sa iritasyon. Puwedeng magka agko ika marang ubo na uda plema o basang ubo na agko plema. Ana ubo ay puwedeng agko tunog na parang batok (palatandaan na agko croup) o nagtatapossa usad na matinis na tunog na kasunod kana pag-ubo. Puwedeng bigla ading mag puon ag mauda sa luog kana usad na linggo. O kaya man, puwedeng mamatian mong lang uban nang namamatian ag tila diri adi nauuda (pang maubanang ubo). **MGA POSIBLENG RASON** **UNO ANA MGA KARANIWANG RASON KANA UBO?** Kaiba na sa karaniwang rason kana ubo ana: - Acid reflux o GERD (gastroesophageal reflux disease). - Mga allergen, arug kana pollen, balakubak kana balat kana mga

- Postnasal drip. Less common causes include cancers that affect your lungs, heart disease and vocal cord disorders. **COMPLICATIONS** Too much coughing or forceful coughing can lead to: - Asthma attacks. - Difficulty breathing. - Choking. - Fainting. - Headache. - Muscle pain and strains. - Rib fractures. - Vomiting. **CARE AND TREATMENT** **WHAT IS THE BEST MEDICINE FOR A COUGH?** Some over-the-counter treatments might help with a cough. These include: Cough drops, throat lozenges and throat sprays. - These might numb or soothe your throat for temporary relief from the tickly cough feeling. Cough suppressants. - Cough suppressants like dextromethorphan help calm the part of your brain that tells you to cough. Decongestants - Decongestants might help if postnasal drip is causing a cough or making it worse. Expectorants - Expectorants like guaifenesin help thin out mucus. This makes it easier for you to cough out what's irritating your airways. Honey - Some studies suggest that a spoonful of honey works as well as medications to calm a cough. But you shouldn't give honey to kids under a year old. Don't give cough medications to children unless their health provider	balakubak ng balat ng mga alagang hayop, at mga amag. - Hika. - Ilang partikular na gamot, tulad ng ACE inhibitors at mga nasal spray. - COPD at iba pang pangmatagalang sakit sa baga. - Mga impeksiyon, tulad ng sipon, trangkaso, whooping cough, bronchitis, at pneumonia. - Mga bagay na nagdudulot ng iritasyon, tulad ng usok, alikabok, at matapang na mga amoy. - Postnasal drip (pagdaloy ng uhog mula sa likod ng ilong pababa sa lalamunan). Kabilang sa mga hindi gaanong karaniwang sanhi ang mga kanser na nakaaapekto sa mga baga, sakit sa puso, at mga karamdaman sa mga vocal cord o kuwerdas ng boses. **MGA KOMPLIKASYON** Ang labis o malakas na pag-ubo ay maaaring magdulot ng: - Mga atake ng hika. - Hirap sa paghinga. - Pagkabulunan. - Pagkahimatay. - Pananakit ng ulo. - Pananakit at pagkapuwersa ng mga kalamnan. - Pagkabali ng mga tadyang. - Pagsusuka. **PANGANGALAGA AT PAGGAMOT** **ANO ANG PINAKAMAINAM NA GAMOT PARA SA UBO?** Maaaring makatulong ang ilang gamot na nabibili nang walang reseta upang maibsan ang ubo. Kabilang dito ang: Mga cough drop, lozenges para sa lalamunan, at throat spray. - Maaaring mamanhid o mapakalma ng mga ito ang iyong lalamunan upang pansamantalang maibsan ang pakiramdam ng pangangati na nagdudulot ng ubo. Mga gamot na pampigil ng ubo. - Ang mga gamot na pampigil ng ubo, tulad ng dextromethorphan, ay tumutulong na pakalmahin ang bahagi ng iyong utak na nagbibigay	atamang hayop, ag mga amag. - Hika. - Pirang partikular na bulong, arug kana ACE inhibators ag mga nasal spray. - COPD ag iba pang pang maubanang ilang sa baga. - Mga impeksyon, arug kana sip-on, trangkaso, whooping cough, bronchitis, ag pneumonia. - Mga bagay na nagdadara sa iritasyon, arug kana aso, alikabok, ag makusog na parong. - Postnasal drip (pag-agi kana uhog galin sa likod kana urong pababa sa lalamunan). Kaiba sa mga diri gaumnong kadalasang rason kana mga kanser na nakakaapektar sa mga baga, ilang sa puso, at mga kamatian sa mga kuwerdas kana boses. **MGA KOMPLIKASYON** Ana labis o makusog na pag-ubo ay puwedeng magdara kana: - Mga atake kana hika. - Sakit sa pag angos. - Pagkabulunan. - Pagkahimatay. - Pangungulog kana payo. - Pangungulog ag pagkapuwersa kana mga kalamnan. - Pagkabari kana mga tadyang. - Pagsusuka. PANGANGATAMAN AG PAGBULONG **UNO ANA PINAKAMARAY NA BULONG PARA SA UBO?** Puwedeng makatabang ana pirang bulong na nababakal na uda resseta nganing maibsan ana ubo. Kaiba sadi ana: Mga cough drop, lozenges para kana tutulnan, ag throat spray. - Puwedeng mamanhid o mapakalma kana mga di ana kanimong tutulnan nganing pansamantalang mapamaray ana pag mati na pangagatol na nagdadara sa ubo. Mga bulong na pampugol kana ubo. - Ana mga bulong na pampugol kana ubo, arug kana dextromethorphan, ay nakakatabang na pakalmahon ana parte kana kanimong utol na

says it's OK. **FREQUENTLY ASKED** **WHEN SHOULD I WORRY ABOUT A COUGH?** Talk to a healthcare provider if you or your child has: - A cough that lasts longer than a few weeks or gets worse over time. - A cough that makes a barking or whooping sound. - Vomiting from a cough. - A fever that lasts more than a day or two. - Yellow, green or bloody mucus. **HOW DO I STOP UNCONTROLLABLE COUGHING?** Taking a sip of water, sucking on a cough drop (carefully to avoid choking) or sitting in a steamy shower might help stop a coughing fit. But uncontrollable coughing can be scary and hard to manage. It can make it hard to breathe and cause you to throw up or choke. If you have frequent coughing fits, see a healthcare provider. **WHAT DOES IT MEAN IF I COUGH AFTER EATING?** Coughing soon after eating could be a sign of acid reflux. Or if you cough while eating, food may have gone "down the wrong way" (aspiration). This means it went towards your lungs instead of your stomach. You cough to try to force the food out, so it doesn't get into your lungs.	ng senyas upang ikaw ay umubo. Decongestants (Mga gamot na pampaluwag ng baradong ilong). - Maaaring makatulong ang mga decongestant kung ang postnasal drip ang sanhi ng iyong ubo o nagpapalala nito. Expectorants (Mga gamot na pampalabas ng plema). - Ang mga expectorant, tulad ng guaifenesin, ay tumutulong na palabnawin ang plema. Dahil dito, mas madali mong mailalabas sa pamamagitan ng pag-ubo ang mga bagay na nagdudulot ng iritasyon sa iyong mga daanan ng hangin. Honey (Pulot). - Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang isang kutsarang pulot ay maaaring kasing-epektibo ng mga gamot sa pagpapakalma ng ubo. Ngunit hindi dapat bigyan ng pulot ang mga batang wala pang isang taong gulang. Huwag magbigay ng mga gamot para sa ubo sa mga bata maliban kung pinahintulutan ito ng kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. **MGA MADALAS ITANONG** **KAILAN AKO DAPAT MAG-ALALA SA UBO?** Kumonsulta sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ikaw o ang iyong anak ay nakararanas ng: - Ubo na tumatagal nang higit sa ilang linggo o patuloy na lumalala sa paglipas ng panahon. - Ubo na may tunog na parang tahol o matinis na tunog. - Pagsusuka dahil sa pag-ubo. - Lagnat na tumatagal nang higit sa isa o dalawang araw. - Plema na kulay dilaw, berde, o may kasamang dugo. **PAANO KO MAPIPIGIL ANG HINDI MAKONTROL NA PAG-UBO?** Ang pag-inom ng kaunting tubig, pagsipsip ng cough drop (nang	nagtatao sa senyales nganing ika ay mag ubo. Decongestants (Mga bulong na pampaluwag kana baradong urong). - Puwedeng makatabang ana mga decongestant kin ana postnasal drip ana raso akan kanimong ubo o nagpapalala kadi. Expectorants (Mga bulong na pampaluwas kana plema). - Ana mga expectorant, arug kana guaifenesin, ay nakakatabang na palabnawon ana plema. Dahil kadi, mas madali mong mailuluwas sa pamamaagi kana pag ubo ana mga bagay na nagdadara kana iritasyon sa kanimong mga agihan sa angin. Honey (Pulot). - Ipinapabayad kana pirang pag-aadal na ana usad na kutsarang pulot ay puwedeng kasing epiktibo kana mga bulong sa pampakalma kana ubo. Pero diri dapat tawan sa pulot ana mga igin na uda pa sa usad na anyos. Diri magtao sa mga bulong na para sa ubo kana mga igin maliban kun pinahintulutan adi kana kandang mga tagapatao sa pag-aatamang pangkalusugan. **MGA PIRMENG INUUNGA** **KUNO AKO DAPAT NA MAG-ALALA KANA UBO?** Magpa kunsulta sa usad na tagapagtao sa pagaataman sa pangkalusugan kun ika o ana kanimong igin ay nakakamati kana: - Ubo na nag uuban sa pirang semana o padagos na naglala sa paglipas kana panahon. - Ubo na agko tunog na parang batok o matinis na tunog. - Pagsusuka dahil kana pag-ubo. - Lagnat na nag-uuban higit sa usad o darawang aldow. - Plema na kulay dilaw, bede o agko kaibang rugo. **PAUNO KO MAPUPUGOL ANA DIRI MAKONTROL NA PAG-UBO?** Ana pag-inom sa gatikot na tubig, pagsupsop kana cough drop (nang

	maingat upang maiwasan ang pagkabulunan), o pag-upo sa loob ng banyong may singaw ay maaaring makatulong upang mapahinto ang sunod-sunod na pag-ubo. Ngunit ang hindi makontrol na pag-ubo ay maaaring nakakatakot at mahirap pamahalaan. Maaari nitong pahirapan ang paghinga at magdulot ng pagsusuka o pagkabulunan. Kung madalas kang makaranas ng sunod-sunod na pag-ubo, magpatingin sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. **ANO ANG IBIG SABIHIN KUNG UMUUBO AKO PAGKATAPOS KUMAIN?** Ang pag-ubo kaagad pagkatapos kumain ay maaaring palatandaan ng acid reflux. O kaya naman, kung umuubo ka habang kumakain, maaaring ang pagkain ay napunta sa maling daanan (aspiration). Nangangahulugan ito na ang pagkain ay napunta sa direksiyon ng iyong mga baga sa halip na sa iyong tiyan. Umuubo ka upang subukang itulak palabas ang pagkain, upang hindi ito makapasok sa iyong mga baga.	maingat nganing malikayan ana pagkabulunan), o pag-ulo sa luog kana banyong agko singaw ay puwedeng makatabang nganing mapugulan ana sunod-sunod na pag-ubo. Pero ana diri makontrol na pag-ubo ay puwedeng nakakatakot ag masakit pangatamanan. Puwedeng kading pasakitan ana pag-inga ag magdara sa pagsusuka o pagkabulunan. Kin madalas ikang makamati sa sunod-sunod na pag-ubo, magpa abyad na sa usad na tagapagtao sa pangangataman sa pangkalusugan. **UNO ANA IBIG SABIHON KIN NAG UUBO AKO PAKATAPOS MAGKAON?** Ana pag-ubo tulos pakatapos magkaon ay puwedeng palatandaan na acid reflux. O kaya man, kin nag uubo ika habang nagkakaon, puwedeng ana pagkaon ay naiyan sa salang agihan (aspiration). Nangangahulugang adi na ana pagkaon ay naiyan sa direksyon kana kanimong mga baga sa halip na sa kanimong buros. Umubo ika nganing subukang ibusol paluwas ana pagkaon, nganing diri adi makaluog sa kanimong mga baga.

DIARRHEA

ENGLISH	TAGALOG	BIKOL
MAIN SUBJECT: DIARRHEA **WHAT IS DIARRHEA?** Diarrhea is when you have loose, watery poop more often than normal. Almost everyone gets it from time to time. Most cases are mild. It usually passes within a few days. Even though diarrhea is common, it can sometimes become serious. Frequent watery diarrhea causes your body to lose water and electrolytes, which can lead to dehydration. Dangerous for certains groups such as: - Babies and young children.	**PANGUNAHING PAKSA: PAGTATAE** **ANO ANG PAGTATAE?** Ang pagtatae ay ang pagkakaroon ng malambot at matubig na dumi nang mas madalas kaysa sa karaniwan. Halos lahat ng tao ay nakararanas nito paminsan-minsan. Karamihan sa mga kaso ay banayad lamang at karaniwang nawawala sa loob ng ilang araw. Kahit karaniwan ang pagtatae, maaari rin itong maging malubha. Ang madalas na paglabas ng matubig na dumi ay nagiging sanhi ng pagkawala ng tubig at mga electrolyte, na maaaring humantong sa dehydration.	**PANGUNANG SIMUNO: PAG UDO-UDO** **UNO ANA PAG UDO-UDO?** Ana pag uudo-udo ay ana pagkakaagko malambot at matubig na ati nang mas madalas kaysa sa karaniwan. Halos ngamin na tawo ay nakakamati kadi paminsan-minsan. Kadaklan sa mga kaso ay tama sana ag kadalasang nauuda sa luog kana pirang aldow. Dawa karaniwan ana pag uudo-udo, puwedeng man ading maging malala. Ana kadalasang pagluwas kana matubig na ati ay nagiging rason sa pagka uda sa tubig ag mga electrolyte, na puwedeng maabot sa dehydration.

- Adults age 65 and up.
- People who have a weakened immune system.

Most people can manage mild diarrhea at home. You need to stay hydrated and get plenty of rest. But you may need medical treatment if it lasts longer than expected or keeps coming back. It's also important to see a healthcare provider if you have diarrhea along with symptoms like severe pain, fever or bloody poop.

TYPES OF DIARRHEA

Healthcare providers describe diarrhea based on how long it lasts:
- Acute diarrhea: Lasts a few days or less and usually goes away on its own.
- Persistent diarrhea: Lasts two to four weeks.
- Chronic diarrhea: Lasts longer than four weeks or keeps coming back.

SYMPSTOMS
- Stomach cramps.
- Stomachache or bloating.
- An urgent need to poop.
- Nausea.
- Vomiting.
- Fever.

Most diarrhea symptoms improve within a few days. But severe pain, bloody poop or signs of dehydration can mean you need medical care.

CAUSES
- Viral, bacterial or parasitic infections.
- Food poisoning.
- Medicines, especially antibiotics.
- Food intolerances, including lactose intolerance.
- Digestive conditions, like irritable bowel syndrome (IBS), Crohn's disease and ulcerative colitis.
- Surgery involving your digestive tract.

RISKS FACTORS

Anyone can get diarrhea, but your risk is higher if you:

- Have close contact with someone who's sick.

Maaaring maging mapanganib ang pagtatae para sa mga sumusunod na grupo:
- Mga sanggol at maliliit na bata.
- Mga matanda na nasa 65 taon at pataas.
- Mga taong may mahinang sistemang panlaban sa sakit.

Karamihan sa mga tao ay kayang pangalagaan ang banayad na pagtatae sa bahay. Mahalagang manatiling sapat ang tubig sa katawan at magkaroon ng sapat na pahinga. Ngunit maaaring kailanganin mo ng medikal na paggamot kung ang pagtatae ay tumatagal at paulit-ulit na bumabalik. Mahalaga ring magpatingin sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung nakararanas ka ng pagtatae na may kasamang mga sintomas tulad ng matinding pananakit, lagnat, o dumi na may dugo.

MGA URI NG PAGTATAE

Inilalarawan ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang pagtatae batay sa tagal nito:
- Acute diarrhea (Biglaang pagtatae): Tumatagal nang ilang araw o mas maikli pa at karaniwang kusang nawawala.
- Persistent diarrhea (Patuloy na pagtatae): Tumatagal nang dalawa hanggang apat na linggo.
- Chronic diarrhea (Pangmatagalang pagtatae): Tumatagal nang higit sa apat na linggo o paulit-ulit na bumabalik.

MGA SINTOMAS

Kabilang sa mga sintomas ng pagtatae ang:
- Pamumulikat ng tiyan.
- Pananakit ng tiyan o kabag.
-Biglaang pangangailangang dumumi.
- Pagduduwal.
- Pagsusuka.
- Lagnat.

Karamihan sa mga sintomas ng pagtatae ay bumubuti sa loob ng ilang araw. Ngunit ang matinding pananakit, dumi na may dugo, o mga palatandaan ng dehydration ay

Puwedeng maging mapanganib ana pag uudo-udo para sa mga sumsunod na grupo:
- Mga igin ag satsaday na igin.
- Mga gurang na nasa 65 anyos ag palangkaw.
- Mga tawong agko maluyang sisteman panlaban sa ilang.

Kadaklan s amga tawo ay kayang pangatamanan ana katamtamang pag uudo-udo sa baloy. Importanteng pirmeng sapat ana tubig sa awak ag magka agko tamang paingalo. Pero puwedeng kaipuhanan mo sa medikal na pagbulong kin ana pag uudo-udo ay nag uuban ag pa uru-utro ana pag balik. Importanteng magpabayad sa usad na tagapagtao kana pangangatamang pangkalusugan kin nakakamati ika sa pag uudo-udo na agko kaibang mga sintomas arug kana grabeng pangungulog, lagnat, o ati na agko kaibang rugo.

MGA URI KANA PAG UUDO-UDO

Ayon sa mga tagapagtao sa pangangataman sa pangkalusugan na ana pag uudo-udo ay naka batay sa uban kadi:
- Acute diarrhea (Biglaang pag uudo-udo): Nag uuban sa pirang aldow o mas mas gatikot ag kadalasang kusang nauuda.
- Persistent diarrhea (Padagos na pag uudo-udo): Nag uuban sa darawa hanggang upat na semana.
- Chronic diarrhea (Pangmaubanang pag uudo-udo): Nag uuban sa labi sa uat na semana o pa uro-utro na binabalik.

MGA SINTOMAS

Kaiba sa mga sintomas kana pag uudo-udo ana:
- Pamumulikat kana buros.
- Pangungulog kana buros o kabag.
-Biglang kaipuhang mag ati.
- Pagduduwal.
- Pagsusuka.
- Lagnat.

Kadaklan sa mga sintomas ng pag uudo-udo ay nag mamaray sa luog kana usad na aldow. Pero ana mga grabeng angungulog, ati na agko

- Eat or drink contaminated food or water.
- Travel to areas with poor sanitation.
- Take antibiotics or certain other medicines.
- Have a digestive condition like IBS or inflammatory bowel disease (IBD).

TOO LOWER RISKS
- Washing your hands often with soap and water.
- Preparing and storing food safely.
- Drinking safe water, especially while traveling.
- Staying up-to-date on recommended vaccines, including the rotavirus vaccine for infants

MANAGEMENT

IF YOU HAVE DIARRHEA
The most important diarrhea treatment is replacing the fluids your body is losing. Drink plenty of water and fluids that contain electrolytes, like oral rehydration solutions or broth. If plain water upsets your stomach, try taking small sips throughout the day.

Eat small, frequent meals if you feel hungry. Foods to eat when you have diarrhea include bananas, rice, applesauce and toast. These bland foods are easier to tolerate while your digestive system recovers. It also helps to avoid foods and drinks that make symptoms worse. These can include caffeine, alcohol and greasy foods.

WHAT TO TAKE FOR DIARRHEA?
Diarrhea treatment depends on what's causing it. Medications may include:

- Over-the-counter medicines, like loperamide or bismuth subsalicylate.
- Antibiotics or antiparasitic medicines for certain infections.
- Medicines to treat conditions like IBD.
- Sometimes probiotics, if your provider recommends them.

Don't take over-the-counter diarrhea medicine if you have bloody diarrhea

maaaring mangahulugan na kailangan mo ng medikal na pangangalaga.

MGA SANHI
Kabilang sa mga sanhi ng pagtatae ang:
- Mga impeksiyong dulot ng virus, bacteria, o parasito.
- Pagkalason sa pagkain (food poisoning).
- Mga gamot, lalo na ang mga antibiotic.
- Hindi pagpapahintulot ng katawan sa ilang pagkain (food intolerances), kabilang ang lactose intolerance o hindi pagtanggap ng katawan sa lactose na matatagpuan sa gatas.
- Mga kondisyon sa sistemang panunaw, tulad ng irritable bowel syndrome (IBS), Crohn's disease, at ulcerative colitis.
- Mga operasyong may kinalaman sa sistemang panunaw.

MGA SALIK NA NAGPAPATAAS NG PANGANIB
Maaaring magkaroon ng pagtatae ang sinuman, ngunit mas mataas ang iyong panganib kung ikaw ay:
- May malapit na pakikisalamuha sa isang taong may sakit.
- Kumakain o umiinom ng kontaminadong pagkain o tubig.
- Naglalakbay sa mga lugar na may mahinang sanitasyon o hindi maayos na kalinisan.
- Umiinom ng antibiotic o ilang partikular na gamot.
- May kondisyon sa sistemang panunaw tulad ng IBS o inflammatory bowel disease (IBD).

PAANO MAPAPABABA ANG PANGANIB NG PAGTATAE?
- Madalas na paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig.
- Ligtas na paghahanda at pag-iimbak ng pagkain.
- Pag-inom ng ligtas na tubig, lalo na kapag naglalakbay.
- Pagtiyak na updated ang mga inirerekomendang bakuna, kabilang ang bakuna laban sa rotavirus para sa mga sanggol.

PAMAMAHALA

rugo, o mga palatandaan na dehydration ay puwedeng mangahulugan na kaipuhan mo sa medikal na pangangataman.

MGA RASON
Kaiba sa mga rason kana pag uudo-udo ana:
- Mga impeksyong dara kana virus, bacteria, o parasito.
- Pagkalason sa pagkaon.
- Mga bulong, lalo na ana mga antibiotic.
- Diri pagpayagan ana awak sa pirang pagkaon (foo intolerences), kaiban ana lactose intolerance o diri pagtanggak kana awak sa lactose na maanapan sa gatas.
- Mga karamdaman sa sistemang pantunow, arug sa irritable bowel syndrome (IBS), Crohn's disease, ag ulcerative colitis.
- Mga operasyong agko kinalaman sa sistemang patunow.

MGA SALIK NA NAGPAPALANGKAW KANA PELIGRO
Puwedeng magka agko pag uudo-udo ana si-isay man, pero mas alangkaw ana kanimong peligro kin ika ay:
- Agko sobrang pakikiusad sa mga tawong agko ilang.
- Nagkakaon o nag-iinom sa mga kontaminadong pagkaob o tubig.
- Nag-iiyan sa mga lugar na agko maluyang sanitasyon o diri mausay na kalinigan.
- Nag iinom sa antibiotic o pirang partikular na bulong.
- Agko kondisyon sa sistemang pantunow arug kana IBS o inflammatory bowel disease (IBD).

PAUNO MAPAPABABA ANA PELIGRO KANA PAG UUDO-UDO?
- Dalasan ana pag uugas kana mga kamot gamit ana sabon ag tubig.
- Ligtas na pag-aapag ag pag-iimbak kana pagkaon.
- Pag inom sa ligtas na tubig, lalo na kin naglalakbay.
- Pagtiyak na updated ana mga inererekomendang bakuna, kaiba ana bakuna panlaban sa rotavirus para sa mga igin na saday.

PAMAMAHALA

or a high fever unless your provider tells you it's safe. **FREQUENTLY ASKED** **WHAT DOES IT MEAN IF I HAVE YELLOW DIARRHEA?** Poop comes in all different colors. If you have yellow diarrhea, you may have eaten something with a yellowish hue to it. But if it lasts more than a few days, talk to a healthcare provider. It could be a sign of a more serious condition. **HOW LONG DOES DIARRHEA LAST?** Most cases of acute diarrhea gets better within a few days. Persistent diarrhea lasts between two and four weeks. Chronic diarrhea lasts longer than four weeks. **WHAT IF MY BABY HAS DIARRHEA?** Babies and young children can become dehydrated much faster than adults. Contact your child's pediatrician if your baby has severe diarrhea or signs of dehydration. **IS DIARRHEA CONTAGIOUS?** Sometimes. Diarrhea caused by viruses, bacteria or parasites can spread from person to person through contaminated food, water or surfaces. Washing your hands often and handling food safely can help reduce the spread. Diarrhea caused by medications, food intolerances or chronic digestive conditions isn't contagious.	**KUNG IKAW AY MAY PAGTATAE** Ang pinakamahalagang paggamot para sa pagtatae ay ang pagpapalit ng mga likidong nawawala sa iyong katawan. Uminom ng maraming tubig at mga likidong naglalaman ng electrolytes, tulad ng oral rehydration solution o sabaw. Kung sumasama ang pakiramdam ng iyong tiyan kapag umiinom ng simpleng tubig, subukang uminom ng maliliit na lagok sa buong araw. Kumain nang kaunti, kadalsang pagkain kung nakakaramdam ikaw ng gutom. Mga pagkain na puwedeng kainin kung ikaw ay may pagtatae ay saging, kanin, masanas na niluto at minasa at tinapay na tinusta. Ang mga pagkain na ito ay madaling kainin habang ang iyong digestive system ay nagpapamaray. Nakakatulong upang makaiwas sa pagkain at inumin na nagapalala ng sintomas. Kasama na dito ang caffeine, alcohol at matatabang pagkain. **ANO ANG DAPAT INUMIN O GAMITIN PARA SA PAGTATAE?** Ang paggamot sa pagtatae ay nakadepende sa sanhi nito. Maaaring kabilang sa mga gamot ang: - Mga gamot na nabibili nang walang reseta, tulad ng loperamide o bismuth subsalicylate. - Mga antibiotic o gamot laban sa parasito para sa ilang partikular na impeksiyon. - Mga gamot para sa paggamot ng mga kondisyon tulad ng IBD. - Mga probiotic, kung inirerekomenda ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Huwag uminom ng mga gamot para sa pagtatae na nabibili nang walang reseta kung mayroon kang pagtatae na may kasamang dugo o mataas na lagnat, maliban kung sinabi ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na ligtas itong gamitin.	**KIN IKA AY AGKO PAG UUDO-UDO** Ana pinaka importanteng pag bulong para sa pag uudo-udo ay ana pagbabalyo kana mga likidong nauuda sa kanimong awak. Mag inom sa dakol ag mga likidong nag luluog sa eloctrolytes, arug kana oral dehydration solution o sabow. Kin nag raraot ana pag mati kana kanimong burow kapag nag iinom kana simpleng tubig, subukan mag inom sa satsaday na lagok sa bilog na aldow. Kumaon sa gatikmay, dalasan pagkaon kin nakakamati ika sa alup. Mga pagkaon na puwedeng kaunon kin ika agko pag uudo-udo ay saging, kanon, mansanas na pinagluto ag minasa ag tinapay na tinusta. ANa mga pagkaon na adi ay madaling kaunon habang ana kanimong digestive system nagpaparay. Nakakatabang nganing malikay sa pagkaon ag inumon na nagpalala kana sintomas. Kaiba na sadi ana caffeine, alcohol ag matatabang pagkaon. **UNO ANA DAPAT INUMON O GAMITON PARA KANA NAG UUDO-UDO?** Ana pag bulong kana pag uudo-udo ay nakadepende ka rason kadi. Puwedeng kaiba sa mga bulong ana: - Mga bulong na nababakal na uda reseta, arug kana loperamide o bismuth subalicylate. - Mga antibiotic o bulong laban sa parasito sa pirang partikular na impeksyon. - Mga bulong para sa pagbulong kana mga kondisyon arug kana IBD. - Mga probiotic, kin inrerekomendar kana kanimong tagapagtao sa pangangatamang pangkalusugan. Diri mag ino sa mga bulong para sa pag uudo-udo na nababakal na uda reseta kin agko ika pag uudo-udo na agko kaibang udo o mas alangkaw na lagnat, maliban kin sinabi kana kanimong tagapagtao sa pangangatamang pangkalusugan na ligtas ading gamiton.

	MGA MADALAS ITANONG **ANO ANG IBIG SABIHIN KUNG DILAW ANG AKING PAGTATAE?** Ang dumi ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kulay. Kung mayroon kang dilaw na pagtatae, maaaring nakakain ka ng isang bagay na may kulay na dilaw o bahagyang madilaw. Pero kung tumatagal ito nang higit sa ilang araw, kumonsulta sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Maaari itong maging palatandaan ng isang mas malubhang kondisyon. **GAANO KATAGAL TUMATAGAL ANG PAGTATAE?** Karamihan sa mga kaso ng biglaang pagtatae ay bumubuti sa loob ng ilang araw. Ang patuloy na pagtatae ay tumatagal nang dalawa hanggang apat na linggo. Ang pangmatagalang pagtatae ay tumatagal nang higit sa apat na linggo. **PAANO KUNG ANG AKING SANGGOL AY MAY PAGTATAE?** Ang mga sanggol at maliliit na bata ay maaaring mas mabilis na makaranas ng dehydration kaysa sa mga nasa hustong gulang. Makipag-ugnayan sa pediatrician ng iyong anak kung ang iyong sanggol ay may malubhang pagtatae o mga palatandaan ng dehydration. **NAKAKAHAWA BA ANG PAGTATAE?** Minsan. Ang pagtatae na dulot ng mga virus, bacteria, o parasito ay maaaring kumalat mula sa isang tao patungo sa ibang tao sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain, tubig, o mga bagay. Ang madalas na paghuhugas ng mga kamay at paghahanda ng pagkain ay makakatulong upang mabawasan ang pagkalat. Ang pagtatae na dulot ng mga gamot, hindi pagpapahintulot ng katawan sa ilang pagkain, o mga pangmatagalang kondisyon sa sistemang panunaw ay hindi nakakahawa.	**MGA PIRMENG INUUNGA** **UNO ANA IBIG SABIHON KIN DILAW ANA KANAKONG PAG UUDO-UDO?** Ana ati ay puwedeng magka agko kin uno-unong kulay. Kin agko ika dilaw na pag uudo-udo, puwedeng nakakaon ika sa usad na bagay na agko kulay na dilaw o puwedeng madilaw. Pero kin nag uuban adi sa mas higit sa usad na aldow, magpa kunsulta sa usad na tagapagtao kana pangangatamang pangkalusugan. Puwedeng ading maging palatanadaan sa usad na mas malubhang kondisyon. **GAUMNO KAUBAN NANAG-UUBAN ANA PAG UUDO-UDO?** Kadaklan sa mga kaso kana biglaang pag uudo-udo ay nagraray sa luog kana pirang aldow. Ana padagos na pag uudo-udo ay nag uuban sa darawa haggang upat na semana. Ana pang maubanang pag uudo-udo ay nag uuban nang labi pa sa upat na semana. **PAUNO KIN ANA KANAKONG IGIN NA AY AGKO PAG UUDO-UDO?** Ana mga igin ag satsaday na igin ay puwedeng mas maispid na makamati ng dehydration kesa kana mga nasa saktong anyos. Makipag-ugnayan sa pediatrcian kana kanimong igin kin ana kanimong sanggol ay agko malubhang pag uudo-udo o mga senyales kana dehydration. **NAKAKAUMALIW BA ANA PAG UUDO-UDO?** Minsan. Ana pag uudo-udo na nagdadara kana mga virus, bacteria, o parasito ay puwedeng kumalat galin sa usad na tawo paiyan sa iba pang tawo sa pamamaagi kana kontaminadong pagkaon, tubig, o mga bagay. Ana kadalasang pag uugas kana mga kamot ag pang iimo kana pagkaon ay makakatabang nganing mabawasan ana pagkalat. Ana pag uudo-udo na dara kana mga bulog, diri pagpahintulutan ana awak sa pirang pagkaon, o mga pang maubanang kondisyon sa sistemang

		pantunow ay diri nakaka-umaliw.

LOW BLOOD PRESSURE

ENGLISH	TAGALOG	BIKOL
MAIN SUBJECT: LOW BLOOD PRESSURE **WHAT IS LOW BLOOD PRESSURE?** Hypotension, or low blood pressure, is when your blood pressure is much lower than expected. It can happen either as a condition on its own or as a symptom of a wide range of conditions. It may not cause symptoms. But when it does, you may need medical attention. **TYPES OF LOW BLOOD PRESSURE** Hypotension has two definitions: **ABSOLUTE HYPOTENSION** - Your resting blood pressure is below 90/60 millimeters of mercury (mm Hg). **ORTHOSTATIC HYPOTENSION** - Your blood pressure stays low for longer than three minutes after you stand up from a sitting position. (It's normal for your blood pressure to drop briefly when you change positions, but not for that long.) The drop must be 20 mm Hg or more for your systolic (top) pressure and 10 mm Hg or more for your diastolic (bottom) pressure. Another name for this is postural hypotension because it happens with changes in posture. Measuring blood pressure involves two numbers: Systolic (top number) - This is the pressure on your arteries each time your heart beats. Diastolic (bottom number) - This is how much pressure your arteries are under between heartbeats. **SYMPTOMS** - Dizziness or feeling lightheaded. - Fainting or passing out (syncope). - Nausea or vomiting. - Distorted or blurred vision.	**PANGUNAHING PAKSA: MABABANG PRESYON NG DUGO** **ANO ANG MABABANG PRESYON NG DUGO?** Ang hypotension, o mababang presyon ng dugo, ay ang kondisyon kung saan ang presyon ng iyong dugo ay mas mababa kaysa sa inaasahan. Maaari itong mangyari bilang isang kondisyon mismo o bilang sintomas ng iba't ibang kondisyon. Maaaring hindi ito magdulot ng mga sintomas. Ngunit kapag nagdulot ito ng mga sintomas, maaaring kailanganin mo ng medikal na atensyon. **MGA URI NG MABABANG PRESYON NG DUGO** May dalawang depinisyon ang hypotension: **ABSOLUTE HYPOTENSION** - Ang presyon ng iyong dugo habang nagpapahinga ay mas mababa sa 90/60 milimetro ng mercury (mm Hg). **ORTHOSTATIC HYPOTENSION** - Nananatiling mababa ang presyon ng iyong dugo nang higit sa tatlong minuto pagkatapos mong tumayo mula sa pagkakaupo. (Normal na pansamantalang bumaba ang presyon ng iyong dugo kapag nagbabago ka ng posisyon, ngunit hindi ito dapat tumagal nang ganoon.) Ang pagbaba ay dapat na 20 mm Hg o higit pa para sa iyong systolic (itaas na numero) na presyon at 10 mm Hg o higit pa para sa iyong diastolic (ibaba na numero) na presyon. Ang isa pang tawag dito ay postural hypotension dahil nangyayari ito kapag nagbabago ang iyong postura o posisyon ng katawan. Ang pagsukat ng presyon ng dugo ay kinabibilangan ng dalawang numero: Systolic (itaas na numero) - Ito ang presyon sa iyong mga	**PANGUNANG SIMUNO: MABABANG PRESYON KANA RUGO** **UNO ANA ABABANG PRESYON KANA RUGO?** Ana hypotension, o ababang presyon kana rugo, ay ana kondisyon kin sari ana presyon kana kanimong rugo ay mas ababa kaysa kana inaasahan. Puwede ading mangayari bilang usad na kondisyon mismo o bilang sintomas kana iba't ibang kondisyon. Puwedeng diri adi magdara sa sintomas. Pero kin magdara adi sa sintomas, puwedeng kaipuhanan mo sa medikal na atensyon. **MGA URI KANA ABABANG PRESYONSA RUGO** Agko darawang depenasyon ana hypotension: **ABSOLUTE HYPOTENSION** - Ana presyon kana kanimong rugo labing nagpapa-ingalo ay mas ababa sa 90/60 milimetro kana mercury (mm Hg). **ORTHOSTATIC HYPOTENSION** - Nananatiling ababa ana presyon kana kanimong rugo na higit sa tulong minuto pagkatapos mong mag tindog galin sa pagkaka-ula. (Normal na pansamantalang umababa ana presyon kana kanimong rugo kapag nagbabago ika sa posisyon, pero diri adi dapat mag-uban sa arug kan.) Ana pagbaba ay dapat na 20 mm Hg o labi pa para ka kanimong systolic (itaas na numero) na presyon ag 10 mm Hg o labi pa ka kanimong diastolic (ababang numero) na presyon. Ana usad pang tawo ay postural hypotension kwasa nangyayari adi kapag nagbabago ana kanimong postura o posisyon kana awak. Ana pagsukol kana presyon kana rugo ay kinaiibanan kana darawan

- Fast, shallow breathing.
- Fatigue or weakness.
- Feeling tired, sluggish or lethargic.
- Confusion or trouble concentrating.
- Agitation or other unusual changes in behavior (a person not acting like themselves).

For people with symptoms, the effects depend on why hypotension is happening, how fast it develops and what caused it. Slow decreases in blood pressure happen normally, so hypotension becomes more common as people get older. Fast decreases in blood pressure can mean certain parts of your body aren't getting enough blood flow. That can have effects that are unpleasant, disruptive or even dangerous.

Usually, your body can automatically control your blood pressure and keep it from dropping too much. If it starts to drop, your body tries to make up for that, either by speeding up your heart rate or constricting blood vessels to make them narrower. Symptoms of hypotension happen when your body can't offset the drop in blood pressure.

POSSIBLE SIGNS OF LOW BLOOD PRESSURE

Your healthcare provider may observe these signs of low blood pressure:
- A heart rate that's too slow or too fast.
- A skin color that looks lighter than it usually does.
- Cool kneecaps.
- Low cardiac output (how much blood your heart pumps).
- Low urine (pee) output.

CAUSES

Hypotension can happen for a wide range of reasons. Causes of low blood pressure include:

Orthostatic hypotension
- This happens when you stand up too quickly and your body can't compensate with more blood flow to

arterya sa tuwing tumitibok ang iyong puso.
Diastolic (ibaba na numero)
- Ito ang antas ng presyon sa iyong mga arterya sa pagitan ng mga tibok ng puso.

MGA SINTOMAS
- Pagkahilo o pakiramdam na parang mahihimatay.
- Pagkahimatay o pagkawala ng malay (syncope).
- Pagduduwal o pagsusuka.
- Malabo o distorted na paningin.
- Mabilis at mababaw na paghinga.
- Pagkapagod o panghihina.
- Pakiramdam na pagod, matamlay o walang sigla.
- Pagkalito o hirap sa pagtuon ng atensyon.
- Pagkabalisa o iba pang hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali (ang isang tao ay hindi kumikilos gaya ng dati).

Para sa mga taong may mga sintomas, ang mga epekto ay nakadepende sa dahilan ng pagkakaroon ng hypotension, kung gaano ito kabilis umunlad at kung ano ang sanhi nito. Karaniwang nangyayari ang mabagal na pagbaba ng presyon ng dugo, kaya mas nagiging karaniwan ang hypotension habang tumatanda ang mga tao. Ang mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo ay maaaring mangahulugan na ang ilang bahagi ng iyong katawan ay hindi nakatatanggap ng sapat na daloy ng dugo. Maaari itong magdulot ng mga epektong hindi kanais-nais, nakaaabala o maging mapanganib.

Karaniwan, awtomatikong nakokontrol ng iyong katawan ang presyon ng iyong dugo at pinipigilan itong bumaba nang sobra. Kung nagsisimula itong bumaba, sinusubukan ng iyong katawan na bumawi, sa pamamagitan ng pagpapabilis ng tibok ng iyong puso o pagpapakitid ng mga daluyan ng dugo. Lumilitaw ang mga sintomas ng hypotension kapag hindi kayang mapigilan ng iyong katawan ang pagbaba ng presyon ng dugo.

numero:
Systolic (alangkaw na numero)
- Adi ana resyon sa kanimong mga arterya sa kapag nag titibok ana kanimong puso.
Diastolic (ababan numero)
- Adi ana antas kana presyon ka kanimong ma arterya sa pagitan akan mga tibok kana puso.

MGA SINTOMAS
- Pagkalibong o pagmati na bana hihimatayon.
- Pagkahimaty o pagka uda kana malay (syncope).
- Pagsusuka.
- Malabo o distorted ana panilon.
- Maispid ag ababaw ana paingalo.
- Pagkapagal o panluluya.
- Pag mati na pagal, uda gana.
- Pagkalito o sakit sa pagtuon kana atensyon.
- Pagka balisa o iba pang diri pangkaraniwang pagbabago sa pag uugal (ana usad na tawo ay diri nag iiwag arug ku dati).

Para kana mga twong agko sintomas, ana mga epekto ay nakadepende sa dahilan kana pagkaka agko hypotention, kin gaumno adi kaispid umunlad ag kin uno ana rason kadi. Kadalasang nangyayari ana mabagal na pag-ababa kana presyon kana rugo, kaya mas nagiging karaniwan ana hypotension labing nagguurang ana mga tawo. Ana maisipid na pag-ababa kana presyon akan rugo ay puwedeng mangahulugang na ana pirang bahagi kana awak ay diri nakatanggap kana taman daloy kana rugo. Puwede ading magdara sa epektar na diri kanais-nais, nakakaabala o maging mapeligro.

Kadalasan, awtomatikong nakokontrol ana kanimong awak ana presyon kana kanimon rugo ag pinupugulan ading umababa sa subra. Kin nagpupuon ading umababa, sinusubukan kana kanimong awak na magbawi, sa pamamaagi kana pagpapa-ispid kana tibok kana kanimong puso o pagpapakitid kana mga labusan kana rugo. Naglilitaw ana mga sintomas kana hypotension kapag diri na

your brain.
Central nervous system diseases
- Conditions like Parkinson ' s disease can affect how your nervous system controls your blood pressure. People with these conditions may feel the effects of low blood pressure after eating because their digestive systems use more blood as they digest food.

Low blood volume
- Blood loss from severe injuries can cause low blood pressure. Dehydration can also contribute to low blood volume.

Life-threatening conditions
- These conditions include irregular heart rhythms (arrhythmias), pulmonary embolism (PE), heart attacks and collapsed lung. Life-threatening allergic reactions (anaphylaxis) or immune reactions to severe infections (sepsis) can also cause hypotension.

Heart and lung conditions
- You can get hypotension when your heart beats too quickly or too slowly, or if your lungs aren ' t working as they should. Advanced heart failure (weak heart muscle) is another cause.

Prescription medications
- Hypotension can happen with medications that treat high blood pressure, heart failure, erectile dysfunction, neurological problems, depression and more. Don ' t stop taking any prescribed medicine unless your provider tells you to stop.

Alcohol or recreational drugs
- Recreational drugs can lower your blood pressure, as can alcohol (for a short time). Certain herbal supplements, vitamins or home remedies can also lower your blood pressure. This is why you should always include these when you tell your healthcare provider what medications you ' re taking.

Pregnancy
- Orthostatic hypotension is possible in the first and second trimesters of pregnancy. Bleeding or other complications of pregnancy can also cause low blood pressure.

Extreme temperatures

MGA POSIBLENG PALATANDAAN NG MABABANG PRESYON NG DUGO

Maaaring mapansin ng iyong healthcare provider ang mga sumusunod na palatandaan ng mababang presyon ng dugo:
- Tibok ng puso na masyadong mabagal o masyadong mabilis.
- Kulay ng balat na mas maputla kaysa sa karaniwan.
- Malalamig na tuhod.
- Mababang cardiac output (kung gaano karaming dugo ang ibinobomba ng iyong puso).
- Kaunting nailalabas na ihi.

MGA SANHI

Maaaring mangyari ang hypotension sa iba't ibang dahilan. Kabilang sa mga sanhi ng mababang presyon ng dugo ang:

Orthostatic hypotension
- Nangyayari ito kapag masyado kang mabilis na tumayo at hindi kayang bumawi ng iyong katawan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng daloy ng dugo sa iyong utak.

Mga sakit sa central nervous system
- Ang mga kondisyon tulad ng Parkinson's disease ay maaaring makaapekto sa paraan ng pagkontrol ng iyong nervous system sa presyon ng iyong dugo. Maaaring maramdaman ng mga taong may ganitong kondisyon ang mga epekto ng mababang presyon ng dugo pagkatapos kumain dahil mas maraming dugo ang ginagamit ng kanilang digestive system habang tinutunaw ang pagkain.

Mababang dami ng dugo
- Ang pagkawala ng dugo mula sa malubhang pinsala ay maaaring magdulot ng mababang presyon ng dugo. Maaari ring mag-ambag ang dehydration sa mababang dami ng dugo.

Mga kondisyong nagbabanta sa buhay
- Kabilang sa mga kondisyong ito ang hindi regular na ritmo ng puso (arrhythmias), pulmonary embolism (PE), atake sa puso at pagbagsak ng baga. Ang mga reaksiyong alerhiya na nagbabanta sa buhay (anaphylaxis) o mga reaksiyon ng immune system sa kayang pugulan kana kanimon awak ana pag -ababa kana presyon kana rugo.

MGA POSIBLENG TANDAAN KANA MGA ABABANG PRESYON

Puwedeng mamangno kana kanimong tagapagtao sa pangangataman pangkalusugan ana mga sumsunod na palatandaan kana ababang presyon kana rugo:
- Tibok kana puso na masyadong maluway o masyadong maispid.
- Kulay kana balay na mas maputla kaysa kana kadaklan.
- Malalamih na tuwod.
- Ababang cardiac output (kin gaumno kadako na rugo ana ibinobomba kana kanimong puso).
- Gatikot na nilluluwas na tabid.

MGA RASON

Puwedeng mangyari ana hypotension sa ibat ibang rason. Kaiba na sa mga rason ana ababang presyon kana rugo ana :

Orthostatic hypotension
- Nangyayri adi kapag masyadoikang maipid ag diri kayang bumawi kana kanimon awak sa pamamaagi kana pagrurugang kana bulos kana rugo sa kanimong utak.

Mga ilang sa central nervous sytem
- Ana mga kondisyon arug kana Parkinson's disease ay puwedeng makaapektar sa paagi kana pagkontrol kana kanimong nervous system sa presyon kana kanimong rugo. Puwedeng makamati kana mga tawong agko aru kading pagmati ana mga epektar kana ababang presyon kana rugo pagkatapos kumaon kwasa mas dakol ana rugong pinagagamit kana kanirang digestive system labing tinutunow ana pagkaon.

Ababang dakol kana rugo
- Ana pagka uda kana rugo galin sa matinding pinsala ay puwedeng magdara sa ababang presyon kana rugo. Puwedeng mag-tao ana dehydration sa ababang dakol kana rugo.

Mga kondisyong nagbabanta kana buway
- Kaiba sa mga kondisyon adi ana diri regular na ritmo kana puso (arrhythmias), pulmonary embolism

- Being too hot or too cold can affect hypotension and make its effects worse.

COMPLICATIONS OF LOW BLOOD PRESSURE

Complications that can happen because of hypotension include:

Falls and fall-related injuries

- These are the biggest risks with hypotension because it can cause dizziness and fainting. Falls can lead to broken bones, concussions and other serious or even life-threatening injuries. If you have hypotension, preventing falls should be one of your biggest priorities.

Shock

- When your blood pressure is low, that can affect your organs by reducing the amount of blood they get. That can cause organ damage or even shock (where your body starts to shut down because of limited blood flow and oxygen).

Heart problems or stroke

- Low blood pressure can cause your heart to try to compensate by pumping faster or harder. Over time, that can cause permanent heart damage and even heart failure. It can also cause problems like deep vein thrombosis (DVT) and stroke because blood isn't flowing like it should, causing clots to form.

WHAT IS CONSIDERED LOW BLOOD PRESSURE?

Low blood pressure is below 90/60 mm Hg. Normal blood pressure is above that, up to 120/80 mm Hg.

HOW COMMON IS LOW BLOOD PRESSURE?

Because low blood pressure is common without any symptoms, it's impossible to know how many people it affects. However, orthostatic hypotension seems to be more and more common as you get older. An estimated 5% of people have it at age 50, while that figure climbs to more than 30% in people over 70.

malubhang impeksiyon (sepsis) ay maaari ring magdulot ng hypotension.

Mga kondisyon ng puso at baga

- Maaari kang magkaroon ng hypotension kapag masyadong mabilis o masyadong mabagal ang tibok ng iyong puso, o kung hindi gumagana nang maayos ang iyong mga baga. Ang advanced heart failure (panghihina ng kalamnan ng puso) ay isa pang sanhi.

Mga iniresetang gamot

- Maaaring mangyari ang hypotension dahil sa mga gamot na ginagamit sa paggamot ng mataas na presyon ng dugo, heart failure, erectile dysfunction, mga problemang neurological, depresyon at iba pa. Huwag itigil ang pag-inom ng anumang iniresetang gamot maliban kung sabihin ng iyong healthcare provider na itigil ito.

Alak o mga recreational drug

- Maaaring magpababa ng presyon ng iyong dugo ang mga recreational drug, gayundin ang alak (sa maikling panahon). Ang ilang herbal supplement, bitamina o mga remedyo sa bahay ay maaari ring magpababa ng presyon ng iyong dugo. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong palaging isama ang mga ito kapag sinasabi mo sa iyong healthcare provider kung anong mga gamot ang iyong iniinom.

Pagbubuntis

- Posible ang orthostatic hypotension sa una at ikalawang trimester ng pagbubuntis. Ang pagdurugo o iba pang komplikasyon ng pagbubuntis ay maaari ring magdulot ng mababang presyon ng dugo.

Matinding temperatura

- Ang sobrang init o sobrang lamig ay maaaring makaapekto sa hypotension at magpalala ng mga epekto nito.

MGA KOMPLIKASYON NG MABABANG PRESYON NG DUGO

Kabilang sa mga komplikasyong maaaring mangyari dahil sa hypotension ang:

Pagkahulog at mga pinsalang dulot ng pagkahulo

- Ito ang pinakamalalaking panganib

(PE), atake sa puso ah pagbagsak kana baga. Ana mga reaksyong alerhiya na nagbabanta kana buway (anaphylaxis) o mga reaksiyon kana immune system sa matinding impeksyon (sepsis) ay puwedeng man magdara kana hypotension.

Mga pagmati kana puso ag baga

- Puwede ikang mgka ako hypotension kapag masyadong maispid o masyadong maluway ana tibok kana kanimong puso, o kin diri ginagana sa mausay ana kanimong mga baga. Ana advance heart failure (pangluluta kana kalamnan ag puso) ay usad pang rason.

Mga inireresetang bulong

- Puwedeng mangyari ana hypotension kwasa sa mga bulong na pinagagamit sa pagbulong kana alangkaw na presyon kana rugo, heart failure, erectile dysfuction, mga problemang neurological, depresyon ag iba pa. Diri ipundo ana pinag iinum na kin unumang niresetang bulong maliban kin sabihon kana kanimong tagapagtao sa pangangataman sa pangkalusugan na ipundo adi.

ALak o mga recreational drug

- Puwedeng magpa-ababa kana presyon kana kanimong rugo ana mga recreational drug, pati man ana alak (sa saday na panawon). Ana pirang herbal suplemeny, bitamina o mga remedyo sa baloy na puwede man magpa-ababa kana presyon kana kanimong rugo. Adi ana rason kin ngata kaipuhan mong pirmeng isabi ana mga adi sa kanimon tagapagtao sa pangangataman sa kalusugan kin uno ana mga bulong na kanimong iinumon.

Matinding temperatura

- Ana labing init o labing agnow ay puwedeng makaapektar sa hypotension ag magpaalala kana mga epektar kadi.

MGA KOMPLIKASYON KANA ABABANG PRESYON KANA RUGO

Kaiba sa mga komplikasyon puwedeng mangyari kwasa sa hypotension ana:

Pagka-ulog ag mga pinasalang dara kana pagka-ulog

- Adi ana pinakadakulong peligro

WHO DOES LOW BLOOD PRESSURE AFFECT?

Hypotension can affect people of any age and background, depending on why it happens. However, it's more likely to cause symptoms in people over 50 (especially orthostatic hypotension). It can also happen (with no symptoms) to people who are very physically active, which is more common in younger people.

HOW IS LOW BLOOD PRESSURE DIAGNOSED?

Hypotension itself is easy to diagnose. Taking your blood pressure is all you need to do. But figuring out why you have hypotension is another story. If you have symptoms, a healthcare provider will likely use a variety of tests to figure out why it's happening and if there's any danger to you because of it.

HOW DO I TAKE CARE OF MYSELF?

If you have hypotension with symptoms, the best thing you can do is follow your healthcare provider's guidance on managing this condition. Their recommendations may include any of the following:

- Managing your diet: Following diet recommendations, especially how much salt you should have in your diet, can help prevent symptoms of hypotension.
- Taking your medication: These can help you avoid the disruptive symptoms and effects of low blood pressure.
- Dressing up: Compression socks, which put light pressure on your legs and feet, can push blood upward and raise your blood pressure.
- Taking it slow: Avoid standing up too quickly, especially with orthostatic hypotension. That can help you avoid the dizziness and fainting effects of hypotension.
- Having a seat: If you notice yourself feeling dizzy or lightheaded, sit down. Falling from a standing height can put you at risk for severe or even catastrophic injuries, such as a broken hip, concussion, skull fracture

ng hypotension dahil maaari itong magdulot ng pagkahilo at pagkahimatay. Ang pagkahulog ay maaaring humantong sa mga bali ng buto, concussion at iba pang malubha o maging mga pinsalang nagbabanta sa buhay. Kung mayroon kang hypotension, ang pag-iwas sa pagkahulog ay dapat isa sa iyong mga pangunahing prayoridad.

Shock

- Kapag mababa ang iyong presyon ng dugo, maaari nitong maapektuhan ang iyong mga organo sa pamamagitan ng pagbawas sa dami ng dugong natatanggap ng mga ito. Maaari itong magdulot ng pinsala sa mga organo o maging shock (kung saan nagsisimulang huminto ang paggana ng iyong katawan dahil sa limitadong daloy ng dugo at oxygen).

Mga problema sa puso o stroke

- Maaaring maging sanhi ang mababang presyon ng dugo upang subukang bumawi ang iyong puso sa pamamagitan ng mas mabilis o mas malakas na pagbomba. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala sa puso at maging heart failure. Maaari rin itong magdulot ng mga problema tulad ng deep vein thrombosis (DVT) at stroke dahil hindi dumadaloy ang dugo gaya ng nararapat, na nagiging sanhi ng pagbuo ng mga namuong dugo.

ANO ANG ITINUTURING NA MABABANG PRESYON NG DUGO?

Ang mababang presyon ng dugo ay mas mababa sa 90/60 mm Hg. Ang normal na presyon ng dugo ay mas mataas dito, hanggang 120/80 mm Hg.

GAANO KAKARANIWAN ANG MABABANG PRESYON NG DUGO?

Dahil karaniwan ang mababang presyon ng dugo na walang mga sintomas, imposibleng malaman kung ilang tao ang naaapektuhan nito. Gayunpaman, tila mas nagiging karaniwan ang orthostatic hypotension habang tumatanda ang isang tao. Tinatayang 5% ng mga tao ang mayroon nito sa edad na 50, habang tumataas ang bilang na ito sa mahigit 30% sa mga taong lampas 70

kana hypotension kwasa puwedeng ading magdara kana pagkalibong ag maudaan sa malay. Ana pagka ulog ay puwedeng maiyan sa mga bari kana tulang, concussion ag iba pang malala o maging mapinsakang nagbabanta kana buway. Kin agko ika hypotension, ana pag likay sa pagka-ulo ay dapat usad sa kanimong mga pangunahong prayoridad.

Shock

- Kapag ababa ana kanimong presyon kana rugo, puwedeng adi maapektaran ana kanimong mga organ sa pamamaagi akan pag-bawas kana dakol ka rugong natatanggap kana mga adi. Puwede ading magdara sa pinsala sa mga organ o maging shock (kin sari nagpupuon ana magpundo ana panggana kana kanimong awak kawasa limitado ana daloy kana ruo ag oxygen).

Mga problema sa puso o stroke.

- Puwedeng maging rason ana ababang presyon kana rugo nganing subukong magbawi ana kanimong puso sa pamamaagi kana mas maispid o mas makusog na pagbomba. Sa paglipas kana panahon, puwedeng ading magdara kana permanenteng pinsala sa puso ag maging heart failure. Puwede mad ading magdara kana mga problema arug kana deep vein thrombosis (DVT) ag stroke kwasa diri nagdadaloy ana rugo arog kana nararapat, na nagiging rason kana pag bilog kana mga nabibilog na rugo.

UNO ANA PINAGTUTURING NA ABABANG PRESYON KANA RUGO?

Ana ababang presyon kana ruo ay mas ababa sa 90/60 mm Hg. Ana normal na presyon kana ruo ay mas alangkaw kadi, hanggang 120/80 mm Hg.

GAUMNO KARANIWAN ANA ABABANG PRESYON KANA RUGO?

Kwasa kaaniwan ana ababang presyon kana rugo na uda sintomas, imposibleng maisihan kin pirang tawo ana naaapektaran kadi. Arug pa man kan, mas nagiging karaniwan ana orthostatic hypotension labin naggugurang ana usad na tawo.

or broken ribs. **MANAGEMENT** **HOW IS LOW BLOOD PRESSURE TREATED?** Low blood pressure treatment usually starts with finding out why it's happening. If a provider can treat that cause directly, hypotension will usually get better on its own. For example, hypotension can happen because of an injury and blood loss. Repairing that injury and replacing the lost blood with a blood transfusion will stop hypotension as long as the repair to the injury holds. **PREVENTION** **HOW CAN I LOWER MY RISK OF LOW BLOOD PRESSURE?** It's usually not possible to reduce your risk of or prevent hypotension. The only exception is avoiding circumstances or actions that can lead to it, such as taking recreational drugs or supplements/herbal remedies that can lower your blood pressure. Eating smaller meals with fewer carbohydrates may help you avoid having low blood pressure after meals.	taong gulang. **SINO ANG NAAAPEKTUHAN NG MABABANG PRESYON NG DUGO?** Maaaring makaapekto ang hypotension sa mga tao sa anumang edad at pinagmulan, depende sa dahilan ng paglitaw nito. Gayunpaman, mas malamang na magdulot ito ng mga sintomas sa mga taong lampas 50 taong gulang (lalo na ang orthostatic hypotension). Maaari rin itong mangyari (nang walang mga sintomas) sa mga taong lubhang aktibo sa pisikal na gawain, na mas karaniwan sa mga nakababatang tao. **PAANO NASUSURI ANG MABABANG PRESYON NG DUGO?** Madaling masuri ang hypotension mismo. Ang pagsukat lamang ng iyong presyon ng dugo ang kailangan. Ngunit ibang usapan na ang pagtukoy kung bakit mayroon kang hypotension. Kung mayroon kang mga sintomas, malamang na gumamit ang isang healthcare provider ng iba't ibang pagsusuri upang malaman kung bakit ito nangyayari at kung may anumang panganib sa iyo dahil dito. **PAANO KO PANGANGALAGAAN ANG AKING SARILI?** Kung mayroon kang hypotension na may mga sintomas, ang pinakamainam na magagawa mo ay sundin ang gabay ng iyong healthcare provider sa pamamahala ng kondisyong ito. Maaaring kabilang sa kanilang mga rekomendasyon ang alinman sa mga sumusunod: - Pamamahala sa iyong diyeta: Ang pagsunod sa mga rekomendasyon sa diyeta, lalo na kung gaano karaming asin ang dapat mong kainin, ay makatutulong upang maiwasan ang mga sintomas ng hypotension. - Pag-inom ng iyong mga gamot: Makakatulong ang mga ito upang maiwasan ang mga nakaaabala na sintomas at epekto ng mababang presyon ng dugo. - Pagsusuot ng angkop na damit: Ang compression socks, na nagbibigay ng banayad na presyon sa iyong mga	Tinatayang 5% kana mga tawo anaagko kadi sa edad na 50, labing nag tataas ana bilang kadi sa mahigit na 30% sa mga tawong lagpas 70 anyos. **SIISAY ANA MGA NAAPEKTARAN KANA ABABANG PRESYON KANA RUGO?** Puwedeng makaapektar ana hypotension sa mga tawo sa kin unnumang edad ag pinag-galinan, depende sa dahilan kana pagluwa kadi. Arug pa man kan, mas mataas na magdara adi kana mga sintomas sa mga tawong lagpas 50 anyos (lalo na ana orthostatic hypotension). Puwede man ading mangyari (nauda sintomas) sa mga tawong labis na aktibo sa pisikal na gibo, na mas kadalasan sa mga nakababatang tawo. **PAUNO NABABAYD ANA ABABANG PRESYON KANA RUGO?** Madaling mabayad ana hypotension mismo. Ana pagsukol sana kana kanimong presyon kana ruo ana kaipuhan. Pero ibang usipan na ana pag-isi kin ngata agko ika hypotension. Kin agko ika sintomas, malamang na maggamit ana usad na na tagapagtao sa pag-aatamang pang kalusugan sa ibat iban pagbabayd nganing maisihan kin ngata adi nangyayri ag kin ako unumang peligro kanimo dahil kadi. **PAUNO KO PANGANGATAMANAN ANA KANAKONG SADIRI?** Kin agko ika hypotension na agko mga sintomas, ana pinakamaray na magigibo mo ay undon ana sumusunod na tinao kanimo kana tagapagtao sa pag-aatamang pangkalusugan sa pamamahala kana kondisyong adi. Puwedeng kaiba sa kanirang mga rekomendasyon ana arin man sa sumsunod: - Pag-inom ka kanimong mga bulong: Makakatabang ana mga adi nganin malikayan ana mga nakakaantala na sintomas ag epektar kana ababang presyon kana rugo. - Pagsusupong sa angkop na bado: Ana compression socks, na nagtatao kana banayad na presyon sa kanimon

	binti at paa, ay maaaring magtulak ng dugo pataas at magpataas ng iyong presyon ng dugo. - Dahan-dahang pagkilos: Iwasang tumayo nang masyadong mabilis, lalo na kung mayroon kang orthostatic hypotension. Makakatulong ito upang maiwasan ang pagkahilo at pagkahimatay na dulot ng hypotension. - Pag-upo: Kung napansin mong nahihilo ka o parang mahihimatay, umupo. Ang pagkahulog mula sa taas ng pagkakatayo ay maaaring magdulot ng panganib ng malubha o maging napakalalang mga pinsala, tulad ng bali sa balakang, concussion, bali sa bungo o bali sa mga tadyang. **PAMAMAHALA** **PAANO GINAGAMOT ANG MABABANG PRESYON NG DUGO?** Karaniwang nagsisimula ang paggamot sa mababang presyon ng dugo sa pagtukoy kung bakit ito nangyayari. Kung direktang magagamot ng healthcare provider ang sanhi nito, karaniwang bubuti ang hypotension nang kusa. Halimbawa, maaaring mangyari ang hypotension dahil sa isang pinsala at pagkawala ng dugo. Ang pag-aayos sa pinsalang iyon at pagpapalit sa nawalang dugo sa pamamagitan ng pagsasalin ng dugo ay magpapatigil sa hypotension hangga't nananatiling maayos ang pagkukumpuni sa pinsala. **PAG-IWAS** **PAANO KO MABABAWASAN ANG PANGANIB NG PAGKAKAROON NG MABABANG PRESYON NG DUGO?** Karaniwang hindi posibleng mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng hypotension o maiwasan ito. Ang tanging eksepsiyon ay ang pag-iwas sa mga sitwasyon o gawain na maaaring magdulot nito, tulad ng paggamit ng mga recreational drug o mga supplement/herbal na remedyo na maaaring magpababa ng iyong presyon ng dugo.	mga binti ag tiil, ay puwedeng magbusol pataas ag magpa alangkaw kana kanimong presyon kana rugo. - Luway-luway na pag-iwag: Likayang mag tindog sa masyadong maispid, lalo na kin agko ika orthostatic hypotension. Makakatabang adi naning malikayan ana pagka-libong ag pagka-uda sa malay na nagdadara kana hypotension. - Pag-ula: Kin namangno mong nalilibong ika o parang ma-uudaan sa malay, umula. Ana pagka-ulog galing taas kana pagkakatindo ay puwedeng magdara sa peligro na malala o maging napakalalang mga pinsala, aru kana bari sa balakang, concussion, bari sa bungo o bari sa mga tadyang. **PANGANGATAMAN** **PAUNO BINUBULONG ANA ABABANG PRESYON KAA RUGO?** Kadalasang nagpupuon ana pag bulong sa ababang presyon kana rugo sa pag -isi kin ngata adi nangyayari. Kin direktang mabubulong kana tagapagtao sa pangangatamang pangkalusugan ana rason kadi, karaniwang mig maray ana hypotension na sadiri. Arug kana, puwedeng mangyari ana hypotension kwasa sa usad na pinsala ag pagka-uda kana rugo. Ana pag-uusay kana pinsalang adi ag pagbabalyo kana udang rugo sa pamamaagi kana pagsasalin kana rugo ay nagpapa-pundo sa hypotension hanggat nananatiling usay ana pag-iiray kana pinsala. **PAGLIKAY** **PAUNO KO MABABAWASAN ANA PELIGRO KANA PAGKAKA-AGKO ABABANG PRESYON KANA RUGO?** Kadalasang diri posibleng mabawasan ana peligro kana pagkaka-agko kana hypotension o malikayan adi. Ana dapat eksipsyon ay ana paglikay kana mga sitwasyon o gibo na puwedeng magdara kadi, arug kana pag-gait kana ga recreational drug o mga supplement/herbal na remedyo na puwedeng magpa-ababa kana

	Ang pagkain ng mas maliliit na bahagi ng pagkain na may mas kaunting carbohydrates ay maaaring makatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng mababang presyon ng dugo pagkatapos kumain.	kanimong presyon kana rugo. Ana pagkaon kana mas satsaday na parte kana pagkaon na agko gatikmay na carbohydrates ay puwdeng makataban nganing alikayn ana pagkaka-agkko kana ababang presyon kana rugo pakatapos magkaon.

TOOTHACHE

ENGLISH	TAGALOG	BIKOL
MAIN SUBJECT: TOOTHACHE **WHAT IS TOOTHACHE?** A toothache refers to pain in or around your tooth. Minor toothaches can occur from a temporary gum irritation that you can treat at home. More severe toothaches result from cavities, infection or other dental conditions that won't get better on their own. If you have a severe toothache, you'll need professional dental treatment. **TYPES OF TOOTHACHE** There are different types of tooth pain depending on the underlying cause. Specific toothache symptoms can vary but may include: - A dull ache that doesn't go away. - Sharp, jabbing tooth pain. - Throbbing tooth pain. - Teeth sensitivity. - Swelling in your gums. - Headaches. - Fever. - Chills. - Bad breath or bad taste. **CAUSES** There are many reasons why people develop tooth pain. Possible toothache causes include: - Cavities. - Abscessed tooth. - Cracked tooth. - A damaged dental restoration (like a filling or crown). - Teeth grinding or clenching (bruxism). - Gum disease. **MANAGEMENT AND TREATMENT**	**PANGUNAHING PAKSA: SAKIT NG NGIPIN** **ANO ANG SAKIT NG NGIPIN?** Ang sakit ng ngipin ay tumutukoy sa pananakit sa loob o paligid ng iyong ngipin. Ang banayad na sakit ng ngipin ay maaaring mangyari dahil sa pansamantalang iritasyon ng gilagid na maaari mong gamutin sa bahay. Ang mas matinding sakit ng ngipin ay nagmumula sa mga cavity, impeksiyon o iba pang kondisyon ng ngipin na hindi kusang gagaling. Kung mayroon kang matinding sakit ng ngipin, kakailanganin mo ng propesyonal na paggamot sa ngipin. **MGA URI NG SAKIT NG NGIPIN** May iba't ibang uri ng pananakit ng ngipin depende sa pinagbabatayang sanhi. Maaaring mag-iba ang mga partikular na sintomas ng sakit ng ngipin ngunit maaaring kabilang dito ang: - Mapurol na pananakit na hindi nawawala. - Matalim at biglaang pananakit ng ngipin. - Tumitibok na pananakit ng ngipin. - Sensitibong mga ngipin. - Pamamaga ng iyong gilagid. - Pananakit ng ulo. - Lagnat. - Panginginig. - Mabahong hininga o masamang lasa sa bibig. **MGA SANHI** Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng pananakit ng ngipin ang mga tao. Kabilang sa mga posibleng sanhi ng sakit ng ngipin	**PANGUNAHONG PAKSA: ILANG KANA NGIPON** **UNO ANA ILANG KANA NGIPON?** Ana ilang kana ngipon ay nagtutukoy kana pangungulog ka luog o palibot kana kanimong ngipon. Ana banayad na ilag kana ngipon ay puwedeng mangyari kwasa sa pansaantalang iritasyon kana gilagid na puwede mong bulungon sa baloy. Ana mas grabeng ilang sa ngion ay naggagalin sa mga cavity, impeksyon o iba pang kondisyon kana ngipon na diri kusang nagraray. Kin agko ika labing kulo kana ngipon, kakaiuhanan mo kana propesyonal na bulong kana ngipon. **MGA URI KANA ILANG KANA NGIPON** Agko ibat ibang uri kana pangungulog kana ngipon depende kana pinagbabantayang rason. Puwedeng mag-iba ana mga partikular na sintomas kana ilang kana ngipon pero puwedeng kaiba sadi ana: - Mapural na pangungulog na diri nauuda. - Matalim ag biglaang pangungulog kana ngipon. - Nagtitibok kana pangungulog kana ngipon. - Sensitibong mga ngipon. - Pamamaga kana kanimong gilagid. - Pangungulog kana payo. - Lagnat. - Pangungubog. - Mabatang hininga o masamang lasa kana nganga. **MGA RASON** Puwedeng dahilan kin ngata nagkaka-agko pangungulog kana ngipon ana

HOW DO DENTISTS TREAT TOOTHACHES?

A dentist will perform an examination and ask about your symptoms. They may also take a dental X-ray to see if there are any issues going on beneath your gums.

There are several toothache treatments available. The one that's right for you depends on the severity of your situation.

Toothache medicine

Antibiotics and pain relievers can ease toothache symptoms, but their effects are temporary. Even if an infection goes away after you take antibiotics, it will come back unless you treat the underlying issue.

Dental fillings

If you have a small cavity — or if a small piece of your tooth has broken off — your dentist will probably recommend a dental filling. During this procedure, they'll remove any damaged portions of your tooth, and then fill in the void with a strong dental filling material.

Dental crowns

A larger cavity or fracture may require a dental crown. This tooth-shaped "cap" fits over your entire tooth, strengthening it and reducing the risk of further damage.

Inlays or onlays

Sometimes, a cavity or crack is too big for a filling but not large enough to warrant a crown. In these instances, your dentist may recommend an inlay or onlay. This type of custom ceramic restoration fits into your tooth like a tiny puzzle piece.

Root canal therapy

If bacteria from a cavity or crack invade your tooth pulp, you'll need a root canal. This procedure removes inflamed nerves, blood vessels and connective tissues from inside your tooth. Next, your dentist will clean the inside tooth surfaces, then fill your pulp chamber and root canals with a filling material. In most cases,

ang:

- Mga cavity.
- Abses sa ngipin.
- Bitak na ngipin.
- Sirang dental restoration (tulad ng pasta o crown).
- Paggigiling o pagkikiskisan ng mga ngipin (bruxism).
- Sakit sa gilagid.

PAMAMAHALA AT PAGGAMOT

PAANO GINAGAMOT NG MGA DENTISTA ANG SAKIT NG NGIPIN?

Magsasagawa ng pagsusuri ang dentista at magtatanong tungkol sa iyong mga sintomas. Maaari rin silang kumuha ng dental X-ray upang makita kung may mga problemang nangyayari sa ilalim ng iyong gilagid.

May ilang paggamot na magagamit para sa sakit ng ngipin. Ang angkop para sa iyo ay nakadepende sa kalubhaan ng iyong kondisyon.

Gamot sa Sakit ng Ngipin

Maaaring maibsan ng mga antibiotic at pain reliever ang mga sintomas ng sakit ng ngipin, ngunit pansamantala lamang ang mga epekto nito. Kahit mawala ang impeksiyon pagkatapos mong uminom ng antibiotic, babalik ito maliban kung gagamutin mo ang pinagbabatayang problema.

Dental Fillings

Kung mayroon kang maliit na cavity o kung may maliit na bahagi ng iyong ngipin na nabali, malamang na magrerekomenda ang iyong dentista ng dental filling. Sa prosesong ito, aalisin nila ang anumang sirang bahagi ng iyong ngipin, at pagkatapos ay pupunuin ang puwang gamit ang matibay na materyal para sa pasta.

Dental Crowns

Maaaring mangailangan ng dental crown ang mas malaking cavity o bali. Ang hugis-ngiping "takip" na ito ay bumabalot sa buong ngipin, pinatitibay ito at binabawasan ang panganib ng karagdagang pinsala.

Inlays o Onlays

Minsan, ang cavity o bitak ay

mga tawo. Kaiba sa mga posibleng rason kana ilang kana ngipon ana:

- Mga cavity.
- Abses ka ngipon.
- Bitak kana ngipon.
- Raot na dentsl restoration (arug kana pasta o crown).
- Paggigiling o pagkikiskisan kana mga ngipon (bruxism).
- Kulog kana gilagid.

PANGANGATAMAN AG PAGBULONG

PAUNO BINUBULONG KANA MGA DENTISTA ANA ILANG KANA NGIPON?

Migsagibo kana pagbabayad ana dentista ag mag-uunga manungod kana kanimong mga sintomas. Puwedeng man sirang kumuko kana dental X-ray nganing mabayad kin agko mga problemang nangyayari sa irarom kana kanimon gilagid.

Agko pirang pagbulon na nagagamit para sa ilang kana ngipon. Ana angkop para kanio ay nakadepende kana kalubhaan kana kanimong kondisyon.

Bulong sa Ilang kana Ngipon

Puwedeng maibsan kana mga antibiotic ag pain reliver ana mga sintomaskana ilang kana ngipon, pero pansamantala lamang ana mga epekto kadi. Dawa mauda ana ipeksypn pakatapos mong uminom kana antibiotic, bumabalik adi maliban kin bubulunon mo ana pinagbabantayang problema.

Dental Fillings

Kin agko ika satsaday na cavity o kin agko saday na parte kana kanimong ngipon na nabari, malamang na migrekomenda ana kanmong dentista kana dental filling. Sa prosesong adi, tatanggalon nira ana unumang sirangparte kana kanimong ngipon, ag pakatapos ay pupunuon ana puwang gamit ana matibay na materyal para sa pasta.

Dental Crowns

Puwedeng mangaipuhang kana dental crown ana mas dakulong cavity o bari. Ana hugis-ngipong "takop" na adi ay nagbabaot sa bilog na ngipon,

you'll also need a crown to protect and strengthen your tooth.

Tooth extraction
Most dentists prefer to save natural teeth when they can. But sometimes, it's not possible. If your tooth is badly damaged, you may need a tooth extraction. During this procedure, your dentist will carefully remove your tooth from its socket and clean out any infection.

If you need a tooth pulled, talk to your dentist about replacement options. Once you've healed from your extraction, they can replace it with a dental bridge or dental implant. They can also make you a temporary tooth to wear until you get your permanent replacement.

ARE THERE HOME REMEDIES FOR TOOTHACHES?
Home remedies can offer some mild toothache relief. But if you have tooth pain that doesn't go away, you'll need to see a dentist for treatment.

If you have mild pain, there are a few toothache remedies you can try at home:

Saltwater rinse
Salt is a natural disinfectant. Rinsing with warm saltwater rinse can reduce inflammation, heal wounds in your mouth and offer toothache pain relief. Mix 1/2 teaspoon of salt into 8 ounces of warm water. Swish for 30 seconds, and then spit it out.

Hydrogen peroxide rinse
Rinsing with hydrogen peroxide can also ease tooth pain and inflammation. It helps heal bleeding gums, too. If you have a history of gum disease, this might be a good step to try.

You should never rinse your mouth with pure hydrogen peroxide. Be sure to dilute it with equal parts water. After swishing, spit it out in the sink. Don't swallow.

masyadong malaki para sa pasta ngunit hindi sapat ang laki upang mangailangan ng crown. Sa mga ganitong pagkakataon, maaaring magrekomenda ang iyong dentista ng inlay o onlay. Ang ganitong uri ng pasadyang ceramic restoration ay inilalagay sa iyong ngipin na parang isang maliit na piraso ng puzzle.

Root Canal Therapy
Kung makapasok ang bakterya mula sa cavity o bitak sa pulp ng iyong ngipin, kakailanganin mo ng root canal. Inaalis ng prosesong ito ang mga namamagang nerbiyos, daluyan ng dugo at connective tissue mula sa loob ng iyong ngipin. Susunod, lilinisin ng iyong dentista ang mga panloob na ibabaw ng ngipin, pagkatapos ay pupunuin ang pulp chamber at mga root canal ng materyal na pampasta. Sa karamihan ng mga kaso, kakailanganin mo rin ng crown upang protektahan at patibayin ang iyong ngipin.

Pagbunot ng Ngipin
Mas pinipili ng karamihan sa mga dentista na panatilihin ang natural na mga ngipin kung maaari. Ngunit kung minsan, hindi ito posible. Kung malubha ang pagkasira ng iyong ngipin, maaaring kailanganin itong bunutin. Sa prosesong ito, maingat na aalisin ng iyong dentista ang ngipin mula sa kinalalagyan nito at lilinisin ang anumang impeksiyon.

Kung kailangan mong magpabunot ng ngipin, makipag-usap sa iyong dentista tungkol sa mga opsyon sa pagpapalit nito. Kapag gumaling ka na mula sa pagbunot, maaari nila itong palitan ng dental bridge o dental implant. Maaari rin silang gumawa ng pansamantalang ngipin na maaari mong isuot hanggang makuha mo ang permanenteng kapalit nito.

MAY MGA HOME REMEDY BA PARA SA SAKIT NG NGIPIN?
Maaaring magbigay ng kaunting ginhawa ang mga home remedy para sa sakit ng ngipin. Ngunit kung mayroon kang pananakit ng ngipin na hindi nawawala, kakailanganin mong

pinatitibay adi ag binabawasan ana peligro kana karagdagang pinsala.

Inlays o Onlays
Minsan, ana cavity o bitak ay masyadong dakulo para kana pasta pero diri tama ana dakulo nganing mangaipuhan kana crown. Sa mga arug kadinpagkakataon, puwedeng magrekomendar ana kanimong dentista kana inlay o onlay. Ana arug kading uri kana pasadyang ceramic restoraton ay ibinubutang sa kanimong ngipon na bana usad na saday na piraso kana puzzle.

Root Canal Therapy
Kin makaluog ana bakterya galin sa cavity o bitak sa pulp kana kanimong ngipon, kakaipuhanan mo kana root canal. Iginagalin kana prosesong adi ana mga namamagang nerbiyos, labusan kana rugo ag connective tissue galin sa luog kana kanimong ngion. Sumusunod, lilinigan kana kanimong dentista anna mga panluog na ibabow kana ngipon, pakatapos ay pupunuon ana pulp chamber ag mga root canal ana materyal na pampasta. Sa kadaklan kana mga kaso, kaipuhan mo man kana crown nganing protektahan ag patibayon ana kanimong ngipon.

Pagbunot kana Ngipon
Mas pinipili kana kadaklan ka mga dentista napanatilihon ana natural na mga ngipon kin puwede. Pero kin minsan, diri adi posible. Kin malubha ana pagkaraot kana kanimong ngipon, puwedeng kaipuhanan ading bunuton. Sa prosesong adi, mag ingay na tanggalon ana kanimong dentista ana ngipon galin sa kinabubutangan kadi ag linigon ana unumang impeksyon.

Kin kaupuhan mong magpabunot kana ngipon, makipag-usip ka kaniong dentista manungod ka ga opsyon sa pagpapabalyo kadi. Kapag minaray ika galin sa pagbunot, puwedeng nira ading balyuhan ana dental bridge o dental implant. Puwedeng man sirang gumibo kana pansamantalang ngipon na puwedeng mong isupong hanggang makuko mo ana

Ice packs
Applying ice to the affected area helps shrink blood vessels and reduce pain and inflammation. You can wrap a bag of ice or frozen veggies in a clean towel, and then hold it against your outside jaw for about 20 minutes. Repeat several times a day.

FREQUENTLY ASKED
HOW LONG DOES A TOOTHACHE LASTS?
There's no way to know how long your toothache will last. It depends on the underlying cause. For instance, if you have temporary gum irritation, it should go away on its own in a day or two. But if you have a cavity or abscess, the pain may come and go somewhat, but it won't go away completely.

WHEN SHOULD I SEE A DENTIST?
Call a dentist right away if you develop
- A toothache that lasts longer than two days.
- Swelling in your face or jaw.
- Pain when opening your mouth wide.

CAN A TOOTHACHE GO AWAY ON IT'S OWN?
Tooth pain can go away on its own in certain situations. For example, if you have irritated gums from biting into something hard, your discomfort will likely go away in a day or two. But a true toothache pain that originates from the tooth itself usually means you have an issue that needs treatment. If you have a toothache whether it comes and goes or lingers you should see a dentist as soon as possible. Treating the issue early can keep it from getting worse or causing more pain.

PREVENT TOOTHACHES
You can't always prevent toothaches. Sometimes, they occur for reasons out of your control.
But there are things you can do to reduce your risk:
- Brush your teeth two to three times a day using a fluoride toothpaste and a soft-bristled toothbrush.

magpatingin sa dentista para sa paggamot.

Kung mayroon kang banayad na pananakit, may ilang remedyo para sa sakit ng ngipin na maaari mong subukan sa bahay:
Pagmumog ng Tubig na May Asin
Ang asin ay isang natural na disinfectant. Ang pagmumog ng maligamgam na tubig na may asin ay maaaring makabawas sa pamamaga, magpagaling ng mga sugat sa iyong bibig at magbigay ng ginhawa sa sakit ng ngipin. Ihalo ang 1/2 kutsarita ng asin sa 8 onsa ng maligamgam na tubig. Imumog ito nang 30 segundo, pagkatapos ay iluwa.

Pagmumog ng Hydrogen Peroxide
Ang pagmumog ng hydrogen peroxide ay maaari ring makapagpagaan ng pananakit ng ngipin at pamamaga. Nakakatulong din ito sa pagpapagaling ng dumudugong gilagid. Kung mayroon kang kasaysayan ng sakit sa gilagid, maaaring magandang subukan ito.

Hindi mo dapat pagmumugan ang iyong bibig ng purong hydrogen peroxide. Tiyaking palabnawin ito gamit ang kaparehong dami ng tubig. Pagkatapos magmumog, iluwa ito sa lababo. Huwag itong lunukin.

Ice Packs
Ang paglalagay ng yelo sa apektadong bahagi ay nakatutulong upang paliitin ang mga daluyan ng dugo at mabawasan ang pananakit at pamamaga. Maaari mong balutin ang isang supot ng yelo o mga nakapirming gulay sa malinis na tuwalya, pagkatapos ay idikit ito sa panlabas na bahagi ng iyong panga nang humigit-kumulang 20 minuto. Ulitin nang ilang beses sa isang araw.

MGA MADALAS ITANONG

GAANO KATAGAL ANG SAKIT NG NGIPIN?
Walang paraan upang malaman kung gaano katagal ang sakit ng iyong ngipin. Nakadepende ito sa pinagbabatayang sanhi. Halimbawa,

permanenteng kabalyo kadi.

AGKO BA MGA HOME REMEDY PARA KA ILANG KANA NGIPON?
Puwedeng magtao kana gaitkot na ginhawa ana mga home remedy para kana mga ilang kana ngipon. Ngunit kin ako ika pangungulog kana ngipon na diri nauuda, kinakaipuhan mong magpabayad sa dentista para sa pagbulong.

Kin agko ika gatikot na pangungulog, agko pirang rmedyo para ka kulog kana ngipon na puwedeng ong subukon sa baloy:
Pagmamalimogmog kana Tubi na Ako
Ana asin ay usad sa natural na disinfectant. Ana pagmamalimogmog kana maligamgam na tubig na agko asing ay puwedeng makabawak kana pamamaga, magpamaray kana mga maapros kana kanimong nganga ag magtao kana ginhawa kana kulog ka ngipon. Ihalo ana 1/2 kustarita kana asin sa 8 onsa kana maligamgam na tubig. Imalimogmog adi sa 30 segundo, pakatapos ay iluwa.

Pagmamalimogmog kana Hydrogen Peroxide
Ana pagmaalimogmog kana hydroen peroxide ay puwedeng man makapagpagaan kana pangungulog kana ngipon ag pamamaga. Nakakatabang man adi sa pagpapamaray kana nagrurugong gilagid. Kin agko ika kasaysayan kana kulog ka gilagi, puwedeng magayong subukan adi.

Diri mo dapat pagmalimogmugan ana kanimong nganga kana purong hydrogen peroxide. Siguraduhong palabnawon adi gamit ana kaparehong dakol akan tubig. Pakatapos magmalimogmog, iluwa adi sa lababo. Diri mo adi paglunukon.

Ice Packs
Ana pagbubutang kana yelo sa apektarang parte ay nakaktabang nganing maasaya ana mga labusan kana rugo a mabawasan ana pangungulog ag pamamaga. Puwedeng mo ading putuson ana usad na putos kana yelo o mga

- Floss between your teeth once a day. - Use an antibacterial mouthwash twice a day. - Limit your intake of sugary foods and drinks. - Visit your dentist regularly for exams and cleanings. - Ask your dentist about sealants and fluoride treatments.	kung mayroon kang pansamantalang iritasyon ng gilagid, dapat itong kusang mawala sa loob ng isa o dalawang araw. Ngunit kung mayroon kang cavity o abses, maaaring mawala at bumalik ang pananakit, ngunit hindi ito tuluyang mawawala. **KAILAN AKO DAPAT MAGPATINGIN SA DENTISTA?** Tumawag agad sa dentista kung nakararanas ka ng: - Sakit ng ngipin na tumatagal nang higit sa dalawang araw. - Pamamaga ng iyong mukha o panga. - Pananakit kapag ibinubuka nang malaki ang iyong bibig. **MAAARI BANG KUSANG MAWALA ANG SAKIT NG NGIPIN?** Maaaring kusang mawala ang pananakit ng ngipin sa ilang pagkakataon. Halimbawa, kung naiirita ang iyong gilagid dahil sa pagkagat sa isang matigas na bagay, malamang na mawala ang iyong nararamdamang sakit sa loob ng isa o dalawang araw. Ngunit ang tunay na sakit ng ngipin, pananakit na nagmumula mismo sa ngipin, ay karaniwang nangangahulugang mayroon kang problemang nangangailangan ng paggamot. Kung mayroon kang sakit ng ngipin, pabalik-balik man ito o nagpapatuloy, dapat kang magpatingin sa dentista sa lalong madaling panahon. Ang maagang paggamot sa problema ay makatutulong upang hindi ito lumala o magdulot ng mas matinding pananakit. **PAG-IWAS SA SAKIT NG NGIPIN** Hindi mo palaging maiiwasan ang sakit ng ngipin. Minsan, nangyayari ito dahil sa mga dahilan na hindi mo kontrolado. Ngunit may mga bagay kang maaaring gawin upang mabawasan ang iyong panganib: - Magsipilyo ng iyong mga ngipin dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw gamit ang fluoride toothpaste at malambot na sipilyo. - Gumamit ng dental floss sa pagitan ng iyong mga ngipin isang beses sa isang araw.	nakapirming gulay sa malini na tuwalya, pakatapos ay irukot adi sa panluwas na parte kana kanimong panga na humigit kumulang na 20 minuto. Utruhon aadi sa pirang beses sa usad na aldow. **MGA MADALAS IUNGA** **GAUMNO KAUBAN ANA ILANG KANA NGIPON?** Uda paagi nganing maisihan kin gaumno kauban ana ilang kana kanimong ngipon. Nakadepende adi sa pinagbabatayang rason. Arug kana, kin agko ika pansamantalang iritasyon kana gilagid, dapat adi kusang mauda sa luog kana usad o darawang aldow. Pero kin agko ika cavity o abses, puwedeng mauda ag bumalik ana pangungulo, pero diri adi padagos na mauuda. **KUNO AKO KAIPUHAN NA MAGPABAYAD SA DENTISTA?** Bumaoy tulos sa dentista kin nakakamati ika kana: - Kulog kana ngipon na nag-uuban sa pirang adlow. - Pamamaga kana kanimong lalawgon o panga. - Pangungulog kapag ibinubuka sa dakulo ana kanimong nganga. **PUWEDENG BANG KUSANG MAUDA ANA ILANG KANA NGIPON?** Puwedeng kusang mauda ana pangungulo kana ngipon sa pirang taon. Arug kana, kin naiirita ana kanimong gilagid kwasa sa pagkagat sa usad na makusang bagay, malamang na mauda ana kanimon namamatiang kulog sa luog kana usad o darawang aldow. Pero ana tunay na kulo kana ngipon, pangungulog na nagpupula mismo ana ngipon, ay kadalasang nangangahulugang ako ika problemang nangangaipuhan kana pagbulong. Kin agko ika kulog sa ngipon na pabalikbalik man adi o nagpapadago, dapat ikang magpabayad sa dentista sa lalong madaling panawon. Ana amag na pagbulong kana problema ay makakatabang nagning diri adi maglala o magdara kana mas

	- Gumamit ng antibacterial mouthwash dalawang beses sa isang araw. - Limitahan ang iyong pagkonsumo ng mga pagkaing at inuming matamis. - Regular na magpatingin sa iyong dentista para sa mga pagsusuri at paglilinis ng ngipin. - Tanungin ang iyong dentista tungkol sa mga sealant at fluoride treatment.	matinding pangungulog. **PAGLIKAY KANA KULON GKANA NGIPON** Diri mo pirmeng malilikayan ana kulong kana ngipon. Minsan, nangyayari adi ta kwasa agko ga dahilan na diri mo kontrolado. Pero agko mga bagay ikang puwedeng gibuhon nganing mabawasan ana kanimong peligro: - Magsipilyo ka kanimong mga ngipon darawa hangga tulong beses sa uad na aldow gamit ana fluoride toothpaste ag malambot na sipilyo. - Maggamit kana dental floss sa pagitan kana kanimong mga ngipon usad na beses sa usad na aldow. - Maggamit kana antibacterial mouthwash darawang beses sa usad na aldow. - Limitaduhon ana kanimong pagkunsumo kana mga pagkaon ag inumong matam-is. - Regula na magpa bayad ka kanimong dentista para kana pagpapabayd ag paglilinig kana ngipon. - Ungaon ana kanimong dentista manungod ka ga sealant ag flouride treatment.

CHICKENPOX

ENGLISH	**TAGALOG**	**BIKOL**
MAIN SUBJECT: CHICKENPOX **WHAT IS CHICKENPOX?** Chickenpox is very contagious. Symptoms include an itchy, blister-like rash in addition to other symptoms. Chickenpox illness usually lasts about 4 to 7 days. Children usually miss 5 to 6 days of school or childcare due to chickenpox. For most people, getting chickenpox once provides immunity for life. A person can get chickenpox more than once, but it is uncommon. **SIGN AND SYMPTOMS** The classic symptom of chickenpox is a rash that turns into itchy, fluid-filled blisters that eventually turn into scabs. The rash may first show up on the chest, back, and face, before it	**PANGUNAHIN PAKSA: BULUTONG-TUBIG** **ANO ANG BULUTONG-TUBIG?** Ang bulutong-tubig ay lubhang nakahahawa. Kabilang sa mga sintomas nito ang makating pantal na parang mga paltos, bukod sa iba pang mga sintomas. Ang sakit na bulutong-tubig ay karaniwang tumatagal nang humigit-kumulang 4 hanggang 7 araw. Karaniwang lumiliban ang mga bata sa paaralan o childcare nang 5 hanggang 6 na araw dahil sa bulutong-tubig. Para sa karamihan ng mga tao, ang pagkakaroon ng bulutong-tubig nang isang beses ay nagbibigay ng panghabambuhay na immunity. Maaaring magkaroon ng bulutong-tubig ang isang tao nang higit sa isang	**PANGUNAHONG PAKSA: BULUTONG-TUBIG** **UNO ANA BULUTONG-TUBIG?** Ana bulutong -tubig ay lubhang nakaka-umali. Kaiba sa ga sintomas kadi ana mga magatolna pantal na bana mga paltos, bukod ka ibang pang mga sintomas. Ana ilang na bulutong-tubi ay kadalasang nag-uuban ka humigit-kumulang 4 hanggang 7 aldow. Kadalasang nagliliban ana mga igin sa paaralan o childcare na 5 hanggang 6 na aldow kwasa sa bulutong-tubig. Para sa kadaklan ana mga tawo, ana pagkaka-agko kana bulutong-tubig kana usad na beses ay nagtatao kana panghabang buway na immunity. Puwedeng magka agko kana bulutong-tubi ana usad na tawo kana

spreads to the rest of the body. A person with chickenpox may have as many as 500 blisters. It usually takes about 1 week for all of the blisters to become scabs.

Some people who have been vaccinated against chickenpox can still get the disease. However, they usually have milder symptoms.
People who have never had chickenpox or the chickenpox vaccine can become ill. Typical symptoms that may begin to appear 1 to 2 days before rash include:
- Fever.
- Tiredness.
- Loss of appetite.
- Headache.

WHO IS AT RISK?
Anyone who has not had chickenpox or gotten the chickenpox vaccine can get the disease.

Some people who get chickenpox may have more severe symptoms and may be at higher risk for complications. Chickenpox can also be serious, even life-threatening, especially during pregnancy, in babies, adolescents, adults, and people with weakened immune systems. People with weakened immune systems have a lowered ability to fight germs and sickness.

HOW IT SPREADS
Contact with someone with chickenpox
Chickenpox is a highly contagious disease caused by varicella-zoster virus (VZV). It mainly spreads from unvaccinated people with chickenpox to others who have never had the virus. Up to 90% of people who are not immune and close to someone with chickenpox will also get infected.

A person with chickenpox is contagious 1 to 2 days before the rash begins, until all the chickenpox lesions have crusted (scabbed over).

If a vaccinated person gets the disease, they can still spread it to others. Vaccinated people who get

beses, ngunit hindi ito pangkaraniwan.

MGA PALATANDAAN AT SINTOMAS
Ang karaniwang sintomas ng bulutong-tubig ay isang pantal na nagiging makati at puno ng likidong mga paltos na kalaunan ay nagiging mga langib. Maaaring unang lumitaw ang pantal sa dibdib, likod at mukha bago kumalat sa iba pang bahagi ng katawan. Maaaring magkaroon ang isang taong may bulutong-tubig ng hanggang 500 paltos. Karaniwang tumatagal nang humigit-kumulang isang linggo bago maging mga langib ang lahat ng paltos.

Ang ilang taong nabakunahan laban sa bulutong-tubig ay maaari pa ring magkaroon ng sakit na ito. Gayunpaman, karaniwang mas banayad ang kanilang mga sintomas.

Maaaring magkasakit ang mga taong hindi pa nagkaroon ng bulutong-tubig o hindi pa nabakunahan laban dito. Kabilang sa mga karaniwang sintomas na maaaring magsimulang lumitaw 1 hanggang 2 araw bago lumabas ang pantal ang:
- Lagnat.
- Pagkapagod.
- Kawalan ng gana sa pagkain.
- Pananakit ng ulo.

SINO ANG NANGANGANIB?
Maaaring magkaroon ng bulutong-tubig ang sinumang hindi pa nagkaroon nito o hindi pa nabakunahan laban sa bulutong-tubig.

Ang ilang taong nagkakaroon ng bulutong-tubig ay maaaring makaranas ng mas malulubhang sintomas at magkaroon ng mas mataas na panganib ng mga komplikasyon. Maaari ring maging malubha at maging nagbabanta sa buhay ang bulutong-tubig, lalo na sa panahon ng pagbubuntis, sa mga sanggol, kabataan, matatanda at mga taong may mahinang immune system. Ang mga taong may mahinang immune system ay may nabawasang kakayahang labanan ang mga

labing usad na beses, pero diri adi pangkaraniwan.

MGA PALATANDAAN AG SINTOMAS
Ana kadalasang sintomas kana bulutong-tubig ay usad na pantal na nagiging magatol ag puno ana likidong mga paltos na kalaunan ay nagiging langib. Puwedeng ading lumitaw ana pantal sa ruruggan, likod ag mga lalawgon bago kumalat sa iba pang parte kana awak. Puwedeng magka-agko ana usad na tawong agko bulutong-tubig kana labing 500 paltos. Kadalasang nag uuban kana humigit kumulang usad na semana bago maging mga lagib ana ngamin na paltos.

Ana pirang taong nabakunahan laban sa bulutong-tubig ay puwedeng pa mang magka-agko ilang na arug kadi. Arug pa man kan, kadalasang mas banayad ana kandang mga sintomas.

Puwedeng magka ilang ana mga yawong diri pa nagkaka agko mga bulutong-tubig o diri pa nabakunahan laban kadi. Kaiba sa mga kadalasang sintomas na puwedeng magpuong lumuwas 1 hanggang 2 aldow bago lumuwasa ana pantal ana:
- Lagnat.
- Pagkapagal.
- Kaudaan sa gana na magkaon.
- Pangungulog kana payo.

SIISAY ANA MGA ARANI SA PELIGRO?
Puwedeng magka-agko bulutong-tubig ana isay man na diri pa nagkaka agko kadi o diri pa nabakunahan laban sa buluton-tubig.

Ana pirang taon nagkakaagko kana bulutong-tubig ay puwedeng makaranas kana mga mas malalang sintomas ag magka agko kana mas alangkaw na peligro kana mga komplikasyon. Puwedeng man magin malala ag maging nagbabanta kana buway ana bulutong-tubig, lalo na sa panawon na pagmamabros, sa mga igin na sady, kaiginan, mga gurang ag ga tawong agko maluyang immune system. Ana mga tawong agko tawong agko maluyang kakayahan

chickenpox may develop lesions that do not crust. These people are contagious until no new lesions have appeared for 24 hours. **PREVENTION** Protect yourself with the vaccine. The best way to prevent chickenpox is to get the chickenpox vaccine. Everyone including children, adolescents, and adults should get 2 doses of chickenpox vaccine if they have never had chickenpox or were never vaccinated. Most people who get the vaccine will not get chickenpox.	mikrobyo at sakit. **PAANO ITO KUMAKALAT** Pakikisalamuha sa Taong May Bulutong-Tubig Ang bulutong-tubig ay isang lubhang nakahahawang sakit na dulot ng varicella-zoster virus (VZV). Pangunahing kumakalat ito mula sa mga taong hindi nabakunahan at may bulutong-tubig patungo sa ibang mga taong hindi pa nagkaroon ng virus. Hanggang 90% ng mga taong walang immunity at malapit sa isang taong may bulutong-tubig ay mahahawa rin. Ang isang taong may bulutong-tubig ay nakahahawa 1 hanggang 2 araw bago magsimula ang paglitaw ng pantal, hanggang sa ang lahat ng mga sugat ng bulutong-tubig ay magkaroon ng langib. Kung ang isang taong nabakunahan ay magkaroon ng sakit, maaari pa rin niya itong maipasa sa iba. Ang mga taong nabakunahan ngunit nagkaroon ng bulutong-tubig ay maaaring magkaroon ng mga sugat na hindi nagkakaroon ng langib. Ang mga taong ito ay nakahahawa hanggang sa walang bagong sugat na lumitaw sa loob ng 24 na oras. **PAG-IWAS** Protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng bakuna. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang bulutong-tubig ay ang pagpapabakuna laban dito. Ang lahat kabilang ang mga bata, kabataan at matatanda, ay dapat makatanggap ng 2 dosis ng bakuna laban sa bulutong-tubig kung hindi pa sila nagkaroon nito o hindi pa nabakunahan. Karamihan sa mga taong nabakunahan ay hindi magkakaroon ng bulutong-tubig.	labanan ana mga mikrobyo ag ilang. **PAUNO ADI KUMAKALAT** Pakikisalamuha sa Tawong Agko Bulutong-Tubig Ana buluton-tubig ay usad na lubhang nakaka-umaliw na ilang na dara kana varicella-zoster virus (VZV). Pangunahong kumakalat adi galin sa mga tawon diri nabakunahan ag agko bulutong-tubig paiyan paiyan sa ibang mga twong diri pa nagkaka-agko virus. Hanggang 90% kana mga tawong udang immunity ag arani sa usad na tawo agko bulutong-tubig ag makakaumaliw man. Ana usad na tawong agko bulutong-tubig ay nakakaumaliw 1 hanggang 2 aldow bago magpuon ana pagluwas kana pantal, hanggang sa ana ngaming kana mga maapros kana bulutong-tubig ay magka-agko kana langib. Kin ana usad na tawo nabakunahan ay magka-agko kana ilang, puwedeng pa man niya ading maipasa sa iba. Ana mga tawong nabakunahan nganing nagka-agko kana bulutong-tubig ay puwedeng magka-agko kana mga maapros na diri magka-agko kana langib. Ana mga tawong adi ay nakaka-umaliw hanggang sa uda bagong maapros na lumuwas sa luog kana 24 oras. **PAGLIKAY** Protektaran ana kanimong sadiri sa pamamaagi kana bakuna. Ana pinakamaray na paagi nganin malikayan ana bulutong-tubig ay ana pagbabakuna laban kadi. Ana ngamin kaiba ana mga igin, kabataan ag gurang, ay dapat makatanggap kana 2 dosis kana bakuna laban sa bulutong-tubig kin diri pa sira nagkaka-agko kadi o diri pa nabakunahan. Kadalasan ana mga tawong nabakunahan ay diri magkaka-agko kana bulutong-tubig.

FEVER

ENGLISH	TAGALOG	BIKOL
MAIN SUBJECT: FEVER	**PANGUNAHING PAKSA: LAGNAT**	**PANGUNAHONG PAKSA: LAGNAT**

WHAT IS A FEVER?

A fever is a temporary rise in body temperature. It's one part of an overall response from the body's immune system. A fever is usually caused by an infection.

For most children and adults, a fever may be uncomfortable. But it usually isn't a cause for concern. For infants, however, even a low fever may mean there's a serious infection.

Fevers generally go away within a few days. A number of over-the-counter medications lower a fever. But you don't necessarily need to treat a fever if it's not causing discomfort.

SYMPTOMS

Body temperatures vary slightly from person to person and at different times of day. The average temperature has traditionally been defined as 98.6 F (37 C). A temperature taken using a mouth thermometer (oral temperature) that's 100 F (37.8 C) or higher is generally considered to be a fever.

Depending on what's causing a fever, other fever signs and symptoms may include:

- Sweating.
- Chills and shivering.
- Headache.
- Muscle aches.
- Loss of appetite.
- Irritability.
- Dehydration.
- General weakness.
- Taking a temperature.

To take a temperature, you can choose from several types of thermometers, including oral, rectal, ear (tympanic) and forehead (temporal artery) thermometers.

Oral and rectal thermometers generally provide the most accurate measurement of core body temperature. Ear or forehead thermometers, although convenient, provide less accurate temperature measurements.

ANO ANG LAGNAT?

Ang lagnat ay pansamantalang pagtaas ng temperatura ng katawan. Isa ito sa mga bahagi ng pangkalahatang tugon ng immune system ng katawan. Karaniwang sanhi ng lagnat ang impeksiyon.

Para sa karamihan ng mga bata at matatanda, maaaring hindi komportable ang pagkakaroon ng lagnat. Ngunit karaniwan, hindi ito dapat ika bahala. Gayunpaman, para sa mga sanggol, kahit ang bahagyang lagnat ay maaaring mangahulugan ng malubhang impeksiyon.

Karaniwang nawawala ang lagnat sa loob ng ilang araw. May ilang nabibiling gamot nang walang reseta na nagpapababa ng lagnat. Ngunit hindi naman kailangang gamutin ang lagnat kung hindi ito nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam.

MGA SINTOMAS

Bahagyang nagkakaiba ang temperatura ng katawan ng bawat tao at sa iba't ibang oras ng araw. Tradisyonal na itinuturing na 98.6°F (37°C) ang karaniwang temperatura ng katawan. Ang temperaturang sinusukat gamit ang thermometer sa bibig (oral temperature) na 100°F (37.8°C) o mas mataas ay karaniwang itinuturing na lagnat.

Depende sa sanhi ng lagnat, maaaring kabilang sa iba pang mga palatandaan at sintomas nito ang:

- Pagpapawis.
- Panginginig at pangingatal.
- Pananakit ng ulo.
- Pananakit ng mga kalamnan.
- Kawalan ng gana sa pagkain.
- Pagiging iritable.
- Dehydration.
- Pangkalahatang panghihina.
- Pagsukat ng temperatura.

Upang masukat ang temperatura, maaari kang pumili mula sa ilang uri ng thermometer, kabilang ang oral, rectal, ear (tympanic) at forehead (temporal artery) thermometers.

UNO ANA LAGNAT?

Ana lagnat ay pansamantalang paglangkaw kana temperature kana awak. Usad adi sa mga parte kana pangkangaminang tuon kana immune system kana awak. Karaniwan rasong kana lagnat ana impeksyon.

Para sa kadaklan ana mga igin ag mga gurang, puwdeng diri komportable ana pagkaka-agko kana lagnat. Pero kadalasan, diri kadi dapat ika bahala. Arug pa man kan, para ka mga igin na saday, dawa ana bahagyang lagnat ay puwedeng mangahulugang kana malalang impeksyon.

Kadalasan nauuda ana lanay sa luog kana pirang aldow. Agko pirang nababakal na bulong na uda reseta na nagpapa-ababa kana lagnat. Pero diri naman kaipuhan bulungon ana lagnat kin diri adi nagdadara kana diri komportableng pag mati.

MGA SINTOMAS

Bahagyang nagkakaiba ana temperatura kana awak kana kada tawo ag ibat ibang oras kana aldow. Tradisyonal na itinuturing na 98.6°F (37°C) ana karaniwang temperatura kana awak. Ana temperaturang sinusukol gamit ana thermometor sa nganga (oral temperature) 100°F (37.8°C) omas alankaw ay kadalasang itinuturing na lagnat.

Depende kana rason kana lagnat, puwedeng kaiba sa iba pangmga palatandaaan ag sintomas kadi ana:

- Pagpapabag-ot.
- Pangungubug-kubog at pangingatal.
- Pangungulog kana payo.
- Pangungulog kana mga awak.
- Kaudaan kana gana sa pagkaon.
- Pagiging iritable.
- Dehydration.
- Pangka ngaminang pangluluya.
- Pagsukol kana temperatura.

Nganing masukol ana temperatura, puwedeng ikang pumili galin sa pirang uri kana thermometer, kaiba ana oral, rectal, ear (tympanic) ag forehead (temporal artery) thermometers.

CAUSES Typical body temperature is a balance of heat production and heat loss. An area in the brain called the hypothalamus also known as your body's "thermostat" — monitors this balance. Even when you're healthy, your body temperature varies slightly throughout the day. It can be lower in the morning and higher in the late afternoon and evening. When your immune system responds to disease, the hypothalamus can set your body temperature higher. This prompts complex processes that produce more heat and restrict heat loss. The shivering you might experience is one way the body produces heat. When you wrap up in a blanket because you feel chilled, you are helping your body retain heat. Fevers below 104 F (40 C) associated with common viral infections, such as the flu, may help the immune system fight disease and are generally not harmful. Fever or elevated body temperature might be caused by: - A viral infection. - A bacterial infection. - Heat exhaustion. - Certain inflammatory conditions such as rheumatoid arthritis — inflammation of the lining of your joints (synovium). - A cancerous (malignant) tumor. - Some medications, such as antibiotics and drugs used to treat high blood pressure or seizures. - Some immunizations, such as the diphtheria, tetanus and acellular pertussis (DTaP), pneumococcal or COVID vaccine. **RISK FACTORS** A fever is a vital sign rather than a medical condition. That means a fever itself doesn't have risk factors. Conditions that cause fevers, such as infections, have risk factors. For example, getting surgery or having contact with a person who is sick	Karaniwang nagbibigay ng pinakatumpak na sukat ng pangunahing temperatura ng katawan ang oral at rectal thermometers. Ang ear o forehead thermometers, bagama't maginhawa gamitin, ay nagbibigay ng hindi gaanong tumpak na mga sukat ng temperatura. **MGA SANHI** Ang karaniwang temperatura ng katawan ay resulta ng balanse sa pagitan ng paggawa ng init at pagkawala ng init. Sinusubaybayan ng isang bahagi ng utak na tinatawag na hypothalamus na kilala rin bilang “thermostat” ng iyong katawan ang balanseng ito. Kahit malusog ka, bahagyang nag-iiba ang temperatura ng iyong katawan sa buong araw. Maaari itong mas mababa sa umaga at mas mataas sa huling bahagi ng hapon at gabi. Kapag tumutugon ang iyong immune system sa sakit, maaaring itakda ng hypothalamus ang temperatura ng iyong katawan sa mas mataas na antas. Nag-uudyok ito ng mga masalimuot na proseso na gumagawa ng mas maraming init at naglilimita sa pagkawala ng init. Ang panginginig na maaari mong maranasan ay isang paraan ng katawan upang makagawa ng init. Kapag nagbalot ka ng kumot dahil giniginaw ka, tinutulungan mo ang iyong katawan na mapanatili ang init. Ang mga lagnat na mas mababa sa 104°F (40°C) na nauugnay sa mga karaniwang impeksiyong viral, tulad ng trangkaso, ay maaaring makatulong sa immune system na labanan ang sakit at karaniwang hindi nakapipinsala. Ang lagnat o pagtaas ng temperatura ng katawan ay maaaring sanhi ng: - Impeksiyong viral. - Impeksiyong bacterial. - Heat exhaustion o matinding pagkapagod dahil sa init. - Ilang kondisyon ng pamamaga tulad ng rheumatoid arthritis pamamaga ng lining ng iyong mga kasukasuan	Kadalasang nagtatao kana pinakatumbok na sukol kana pangunahong temperatura kana awak, ana oral ag rectal thermometers. Ana ear o forehead thermometers, bagamat maluwag gamiton, ay nagtatao kana diri gaumnong tumbok na mga sukol kana temperatura. **MGA RASON** Ana kadalasang temperatura kana awak ay resulta kana balanse sa pagitan kana paggibo kana init ag pag-uda kana init. Sinusubaybayan kana usad na parte kana utok na binabaoy hypothalamus na bisto man bilang “thermostat” kana kaninyong awak ana balanseng adi. Dawa malusog ika, bahagyang nagbabago ana temperatura kana kanimong awak sa buong aldow. Puwede ading mas ababa sa umaga ag mas alangkaw sa uring parte kana apon ag gab-I. Kapag nagtutugon ana kanimong immune system sa ilang, puwedeng itala kana hyputhalamus ana temperatura kana kanimong awak sa mas alangkaw na antas. Nag-uudyok adi sa masalim-t na paagi na nagigino kana mas dakol na init ag naglilimitar sa pagka-uda kana init. Kapag nagputos kana sa isapoy kwasa inaagnow na ika, tinatabangan mo ana kanimong awak na mapanatili ana init. Ana mga lagnat na mas ababa sa 104°F (40°C) na naguugnay sa mga kadalasang impeksyong viral, arug kana trangkaso, ay puwedeng makatabang sa immune system na labanan ana kulog ag kadalasang diri nakakapinsala. Ana lagnat o pag langkaw kana temperatura kana awak ay puwedeng rason kana: - Impeksiyong viral. - impeksyong bacterial. - Heat exhaustion o labis na pagkapagal kwasa sa init. - Pirang kondisyon kana pamamaga aru kana rheumatoid arthritis pamamaga kana lining kana kanimong

raises the risk of infection.	(synovium). - Kanser na tumor (malignant). - Ilang gamot, tulad ng mga antibiotic at gamot na ginagamit sa paggamot ng mataas na presyon ng dugo o mga seizure. - Ilang bakuna, tulad ng bakuna laban sa diphtheria, tetanus at acellular pertussis (DTaP), pneumococcal o COVID. **MGA SALIK NA NAGPAPATAAS NG PANGANIB** Ang lagnat ay isang mahalagang palatandaan ng kalusugan (vital sign) sa halip na isang medikal na kondisyon. Nangangahulugan ito na ang lagnat mismo ay walang mga salik na nagpapataas ng panganib. Ang mga kondisyong nagdudulot ng lagnat, tulad ng mga impeksiyon, ay may mga salik na nagpapataas ng panganib. Halimbawa, ang pagsailalim sa operasyon o pakikisalamuha sa isang taong may sakit ay nagpapataas ng panganib ng impeksiyon.	mga kalamanan. - Kanser na tumor (malignant). - Pirang bulong, arug kana mga antibiotic ag bulong na pinaggagamit sa pagbulong kana alangkaw na presyon kana rugo o mga seizure. - Piran bakuna, arug kana bakuna laban sa diphteria, tetanus ag acellular pertussis (DTaP), pneumococcal o COVID. **MGA SALIK NA NAGPAPALANGKAW KANA PELIGRO** Ana lagnat ay usad na importanteng palatandaan kana kalusugan (vital sign) sa halip na usad na medikal na kondisyon. Nangangahulugan adi na ana lagnat mismo ay uda mga salik na nagpapalangkaw kana peligro. Ana mga kondisyong nagdadara kana lagnat, arug kana mga impeksyon, ay agko mga salik na nagpapalangkaw kana peligro. Arug kana, ana pagsairarum sa operasyon o pakikisalak sa usad na tawong agko ilang ay nagpapalangkaw kana peligro kana impeksyon.

RHINORRHEA (RUNNY NOSE)

ENGLISH	TAGALOG	BIKOL
MAIN SUBJECT: RHINORRHEA (RUNNY NOSE) **WHAT IS RHINORRHEA (RUNNY NOSE)?** Rhinorrhea (runny nose) is mucus (snot) dripping or "running" out of your nose. It has several possible causes, such as cold and/or dry air, allergies or the common cold. A related condition is rhinitis. Rhinitis is the inflammation of your nasal tissues. The consistency and color of the mucus that runs out of your nose can vary. Allergies, eating spicy food and being in cold temperatures typically cause a more watery nasal discharge. When you have a cold or another infection, your body usually makes thicker mucus.	**PANGUNAHING PAKSA: RHINORRHEA (TUMUTULONG SIPON)** **ANO ANG RHINORRHEA (TUMUTULONG SIPON)?** Ang rhinorrhea (tumutulong sipon) ay ang pag-agos o pagtulo ng mucus (sipon) mula sa iyong ilong. May ilang posibleng sanhi nito, tulad ng malamig at/o tuyong hangin, mga allergy o karaniwang sipon. Ang isang kaugnay na kondisyon ay rhinitis. Ang rhinitis ay ang pamamaga ng mga tisyu sa iyong ilong. Maaaring mag-iba ang lapot at kulay ng mucus na lumalabas sa iyong ilong. Ang mga allergy, pagkain ng maanghang na pagkain at pananatili sa malamig na temperatura ay karaniwang nagdudulot ng mas	**PANGUNAHONG PAKSA: RHINORRHEA (NAGTUTURONG SIP-ON)** **UNO ANA RHINORRHEA (NAGTUTURONG SIP-ON)?** Ana rhinorrhea (nagtuturong sip-on) ay ana pag-agos o pagturo kana mucus (sip-on) galin sa kanimong urong. Agko pirang posibleng rason kadi, arug kana maagnow ag/o marang angin, mga allergy o kadalasang sip-on. Ana usad na kaugnayan kana kondisyon ay rhinitis. Ana rhinitis ay ana pamamaga kana mga tisyu sa kanimong urong. Puwedeng mag-iba ana lapot ag kulay kana mucus na nagluluwas sa kanimong urong. Ana mga allergy, pagkaon kana maaling pagkaon ag pananatili sa maanow na temperatura

Rhinorrhea can occur on its own, but it often happens alongside the following symptoms:
- Nasal congestion (stuffy nose).
- Sneezing.
- Postnasal drip. This is when more mucus than normal gathers and drips down the back of your throat. It can cause a sore throat and cough.
- Itchy or watery eyes.

Most cases of a runny nose are temporary, but some people can have chronic rhinorrhea.

HOW DOES RHINORRHEA (RUNNY NOSE) HAPPEN?

Several nasal structures and bodily processes can contribute to a runny nose, including:
- Nasal mucus glands: Your mucus glands produce mucus constantly to keep the inside of your nose moist and healthy. Mucus also helps protect you from germs and other irritants. Stimulation of your parasympathetic nervous system (PSNS) leads to an increase in mucus production and release.
- Epithelial cells: These are the cells that line the inside of your nasal cavities. They can release cells called cytokines as part of your body's inflammatory response, which leads to mucus production and a runny nose.
- Blood vessels in your nose: Your blood vessels can constrict (tighten) and dilate (widen). This regulates congestion of your nasal passage during an inflammatory response. In a process called vascular permeability, fluids move through blood vessel walls. In your nose, fluid from your blood vessels can "leak" out and lead to a runny nose. Histamine (the chemical that triggers allergic reactions) stimulates vascular permeability and dilation of blood vessels, resulting in a runny nose.
- Your immune system: When you're sick, it's because pathogens have gotten past the mucus lining of your nose and respiratory system. Your immune system releases special substances to seek out and destroy

malabnaw na sipon. Kapag mayroon kang sipon o iba pang impeksiyon, karaniwang gumagawa ang iyong katawan ng mas malapot na mucus.

Maaaring mangyari ang rhinorrhea nang mag-isa, ngunit madalas itong kasabay ng mga sumusunod na sintomas:
- Baradong ilong (nasal congestion).
- Pagbahing.
- Postnasal drip. Ito ay kapag mas maraming mucus kaysa sa normal ang naiipon at tumutulo sa likod ng iyong lalamunan. Maaari itong magdulot ng pananakit ng lalamunan at pag-ubo.
- Pangangati o pagluha ng mga mata.

Karamihan sa mga kaso ng tumutulong sipon ay pansamantala, ngunit ang ilang tao ay maaaring magkaroon ng chronic rhinorrhea.

PAANO NANGYAYARI ANG RHINORRHEA (TUMUTULONG SIPON)?

Maaaring mag-ambag ang ilang istruktura ng ilong at proseso ng katawan sa pagkakaroon ng tumutulong sipon, kabilang ang:
- Mga glandula ng mucus sa ilong: Patuloy na gumagawa ng mucus ang iyong mga glandula upang mapanatiling basa at malusog ang loob ng iyong ilong. Nakakatulong din ang mucus na protektahan ka mula sa mga mikrobyo at iba pang irritant. Ang pagpapasigla sa iyong parasympathetic nervous system (PSNS) ay nagdudulot ng pagtaas sa produksyon at paglabas ng mucus.
- Mga epithelial cell: Ito ang mga selulang bumabalot sa loob ng iyong mga nasal cavity. Maaari silang maglabas ng mga selulang tinatawag na cytokines bilang bahagi ng inflammatory response ng iyong katawan, na nagdudulot ng produksyon ng mucus at tumutulong sipon.
- Mga daluyan ng dugo sa iyong ilong: Ang iyong mga daluyan ng dugo ay maaaring sumikip (constrict) at lumuwang (dilate). Kinokontrol nito ang pagbabara ng iyong daanan ng ilong sa panahon ng inflammatory response. Sa prosesong tinatawag na vascular permeability, ang mga likido

ay kadalasang nagdadara kana mas malabnaw na sip-on. Kapag agko ika sip-on o iba pang impeksyon, kadalasang naggigibo kana kanimong awak kana mas malagkot na mucus.

Puwedeng mangyari ana rhinorrhea kana mag-usad, pero madalasa ading kasabay kana mga sumsunod na sintomas:
- Baradong uron (nasal congestion).
- Pagbahing.
- Postnatal drip. Adi ay kapag mas puwedeng mucus kesa sa normal ana natitipon ag nagtuturo sa likod kana kanimong lalamunan. Puwede ading magdara kana pangungulog kana lalamunan ag pag-ubo.
- Panggagatol o pagluwa kana mga mata.

Kadaklan sa mga kaso kana nagtuturong sip-on ay pansamantala, pero ana pirang tawo ay uwedeng magka agko chronic rhinorrhea.

PAUNO NANGYAYARI KANA RHINORRHEA (NAGTUTURONG SIP-ON)?

Puwedeng mag-ambag kana pirang istruktura kana urong ag proseso ag awak sa pagkaka-agko kana tumuturong sip-on, kaiba ana:
- Mga glanduda kana musuc sa urong: Padagos kana gumigibo kana mucus ana kanimon mga glandula nganing mapanatiling basa ag mapusog ana luog kana kanimong urong. Nakakatabang man ana mucus na protektaran puon galin sa mga mikrobyo ag iba pang irritant. Ana pagpapasigla sa kanimong parasympathetic nervous system (PSNS) ay nagdadara kana paglangkaw sa produksyon ag pagluwas kana mucus.
- Mga epithelial cell: Adi ana mga selulang nagsusupot kana luo kana kanimong mga nasal activity. Puwedeng sirang magluwas kana mga selulang binabaoy na cytokines bilang parte kana inflammatory resonse kana kanimong awak, na nagdadara kana produksyon kana mucus ag nagtuturong sip-on.
- Mga labusan kana rugo sa kanimong urong: Ana kanimong mga labusan kana rugo ay puwedeng sumikip ag umalwag. Pinagkokontrol adi ana

the pathogens. Those same substances instruct cells in your nose to generate more mucus to clear out other potentially harmful pathogens. As mucus production goes into overdrive, your nose starts to run and get congested. Once your body clears the pathogens, your immune system decreases its alarm bells, and your mucus lining returns to normal. Your immune system is also involved in allergies. It thinks the allergens are harmful (even though they're not) and goes into attack mode.

POSSIBLE CAUSES

The two most common causes of a runny nose include:

- Allergies (allergic rhinitis) such as from pollen, pet dander or dust.
- Viral infections, like the common cold, flu and COVID-19.

Allergens are harmless to most people. But if you have allergic rhinitis, your immune system thinks the allergen is intruding. Your immune system tries to protect your body by releasing histamine. It causes mucous membranes in your nose, eyes and throat to become inflamed and itchy as they work to eject the allergen. Histamine also causes a runny nose. Allergies typically cause more watery nasal discharge.

Breathing in a virus irritates the lining of your nose and sinuses (air-filled pockets around your face). Your nose starts to make a lot of clear mucus in response. This mucus traps the virus and helps flush it out of your nose and sinuses. If the virus makes it past your mucus lining, you get sick. Your body produces more mucus, which may change color and become white or yellow. Sometimes, the mucus may turn a greenish color.

CARE AND TREATMENT

In most cases, runny noses go away on their own. Generally, they don't need treatment. But there are exceptions, including:

Sinus infections

- Sinus infections can go away on their own. But if your symptoms don't

ay dumadaan sa mga dingding ng daluyan ng dugo. Sa iyong ilong, maaaring "tumagas" ang likido mula sa iyong mga daluyan ng dugo at magdulot ng tumutulong sipon. Ang histamine (ang kemikal na nagdudulot ng mga reaksiyong alerhiya) ay nagpapasigla sa vascular permeability at pagluwang ng mga daluyan ng dugo, na nagreresulta sa tumutulong sipon.

- Ang iyong immune system: Kapag may sakit ka, ito ay dahil nakalampas ang mga pathogen sa lining ng mucus ng iyong ilong at respiratory system. Naglalabas ang iyong immune system ng mga espesyal na sangkap upang hanapin at sirain ang mga pathogen. Ang mga sangkap ding ito ang nagtuturo sa mga selula sa iyong ilong na gumawa ng mas maraming mucus upang alisin ang iba pang posibleng mapaminsalang pathogen. Kapag labis na ang produksyon ng mucus, nagsisimulang tumulo at bumara ang iyong ilong. Kapag naalis na ng iyong katawan ang mga pathogen, binabawasan ng iyong immune system ang mga senyales ng alarma nito, at bumabalik sa normal ang lining ng mucus. Kasangkot din ang iyong immune system sa mga allergy. Iniisip nitong mapaminsala ang mga allergen (kahit hindi naman) at nagsisimula itong umatake.

MGA POSIBLENG SANHI

Ang dalawang pinakakaraniwang sanhi ng tumutulong sipon ay:

- Mga allergy (allergic rhinitis): Tulad ng mga allergy mula sa pollen, balahibo ng alagang hayop o alikabok.
- Mga impeksiyong viral: Tulad ng karaniwang sipon, trangkaso at COVID-19.

Hindi nakapipinsala ang mga allergen sa karamihan ng mga tao. Ngunit kung mayroon kang allergic rhinitis, iniisip ng iyong immune system na pumapasok ang allergen sa iyong katawan. Sinusubukan ng iyong immune system na protektahan ang iyong katawan sa pamamagitan ng paglalabas ng histamine. Nagdudulot ito ng pamamaga at pangangati ng mga mucous membrane sa iyong

pagbabara ka kanimong agiha kana urong sa panawon kana inflammatory response. Sa paaging binabaoy na vascular permeability, ana mga likido ay nag aagi sa mga rining kana agihan kana ruo. Sa kanimong urong, puwedeng "tumagas " ana likido galin sa kanimong mga agihan kana rugo ag magdara kana nagtuturo sip-on. Ana histmatine (anakemikal na nagdadara kana mga reaksiyong alerhiya) ay nagpapasigla sa vascular permeability a pagluwag kana mga agihan kana ruo, na nagreresulta sa natuturon sip-on.

- Ana kanimong immune system: Kapag agko ika ilang, adi ay dahil nakalagpas ana mga pathogen sa linig kana mucus kana kanimong urong ag resporitairy system. Naguluwas ana kanimong immune system kana mga espesyal na sangkap nganing anapin ag rauton ana mga pathoen. Ana mga sangkap na man adi ana nagtuturo kana selyula sa kanimong urong na naggigibo kana mas dakol na mucus nganing tangalon ana iba pang posibleng mapaminsalang pathogen. Kapag nailuwas kana kanimon awak ana mga pathogen, binabawasan ana kaimong immune system ana mga senyales kana alarma kadi ag bumbalik sa normal ana kanimong immune sytem sa mga allegery. Iisipon kading mapaminsala ana mga allergen (kahit dira man) ag nagpupuon ading umatake.

MGA POSIBLENG RASON

Ana darawang pinakadalasang rason kana nagtuturong sip-on ay:

- Mga allergy (allergic rhinitis): Aruf kana mga allergy galin sa pollen, bugaybo kana atamang ayop o alikabok.
- Mga impeksiyong viral: Arug kana kadalasang sip-on, trangkaso ag COVID-19.

Diri nakararaot ana ma allergen sa kadaklan na mga tawo. Pero kin agko ika allergic rhinitis, iisipon kana kanimong immune system na alumuog ana allergen sa kanimong awak. Pinagsusubukan kana kanimong immune system na protektaran ana kanimong awak sa

improve after 10 days, a healthcare provider may prescribe antibiotics, oral or topical decongestants, or intranasal steroid sprays.

Chronic rhinitis
- If you have a chronic (long-term) runny nose, your provider might refer you to an ear, nose and throat specialist (ENT) to determine the underlying cause. You may need surgery for structural problems such as nasal polyps, a deviated septum or enlarged adenoids.

Nasal foreign bodies
- An object stuck in your (or your child's) nose needs to be removed. Providers use multiple removal techniques, including instruments like tweezers or forceps, forced exhalation and suctioning.

HOW CAN I STOP A RUNNY NOSE?
Rhinorrhea typically runs its course. There's nothing you can do to immediately stop it. It usually goes away in time. But certain at-home remedies and medicines may provide some relief.

At-Home Runny Nose Remedies
Try the following to help with runny nose symptoms:
- Resting.
- Drinking plenty of fluids, especially water.
- Applying a warm, moist washcloth to your face.
- Inhaling steam two to four times a day. One way to do this is to sit in the bathroom with the shower running. Don't inhale very hot steam.
- Using a humidifier or vaporizer at your bedside. This can combat congestion worsened by dry air.
- Using a saline nasal spray to help clear out mucus. Limit the use of decongestant nasal sprays to no longer than a few days, as instructed on package labels.

RUNNY NOSE MEDICINES
Certain over-the-counter (OTC) medications can help, including:
- Expectorants: These medications can thin mucus to help clear it from

ilong, mga mata at lalamunan habang sinusubukan nilang ilabas ang allergen. Nagdudulot din ang histamine ng tumutulong sipon. Karaniwang nagdudulot ang mga allergy ng mas malabnaw na sipon.

Ang paglanghap ng virus ay nakakairita sa lining ng iyong ilong at mga sinus (mga puwang na puno ng hangin sa paligid ng iyong mukha). Nagsisimulang gumawa ng maraming malinaw na mucus ang iyong ilong bilang tugon dito. Kinukulong ng mucus na ito ang virus at tumutulong na ilabas ito mula sa iyong ilong at mga sinus. Kung makalampas ang virus sa lining ng iyong mucus, magkakasakit ka. Gumagawa ang iyong katawan ng mas maraming mucus, na maaaring magbago ng kulay at maging puti o dilaw. Minsan, maaaring maging kulay berde ang mucus.

PANGANGALAGA AT PAGGAMOT
Sa karamihan ng mga kaso, kusang nawawala ang tumutulong sipon. Karaniwan, hindi ito nangangailangan ng paggamot. Ngunit may mga eksepsiyon, kabilang ang:

Mga impeksiyon sa sinus
- Maaaring kusang mawala ang mga impeksiyon sa sinus. Ngunit kung hindi bumuti ang iyong mga sintomas pagkatapos ng 10 araw, maaaring magreseta ang healthcare provider ng mga antibiotic, oral o topical decongestant, o intranasal steroid spray.

Chronic rhinitis
- Kung mayroon kang chronic (pangmatagalang) tumutulong sipon, maaaring i-refer ka ng iyong provider sa isang espesyalista sa tainga, ilong at lalamunan (ENT) upang matukoy ang pinagbabatayang sanhi. Maaaring kailanganin mo ng operasyon para sa mga problemang istruktural tulad ng nasal polyp, deviated septum o paglaki ng adenoids.

Mga dayuhang bagay sa ilong
- Ang bagay na nakabara sa iyong ilong (o sa ilong ng iyong anak) ay

pamamaagi kana pagluwas kana histamine. Nagdadara adi kana pamamaga ag panggagatol kana mga mucous membrane sa kanimon urong, mga mata ag lalamunan labin sinusuka nirang iluwas ana allergen. Nagdadara man ana histamine kana nagtuturong sip-on.

Ana pagsang-ab kana virus ay nakakairita sa lining kana kanimong urong ag mga sinus (mga puwang na puno kana angin sa palibot kana kanimong lalawgon). Nagpupuong gumibo kana dakol na malinaw na mucus ana kanimong urong bilang tugon kadi. Pinagkukulong kana mucus na adi ana virus ag nakakatabang na iluwas adi galin galin sa kanimong urong ag mga sinus. Kin makalampas ana virus sa lining kana kanimong mucus, migka ilang ika. Naggigibo ana kanimong awak kana mas dakol na mucus, na puwedeng magbago kana kulay ag maging puti o dilaw. Minsan, puwedeng maging kulay berde ag mucus.

PANGANGATAMAN AG PAGBUBULONG
Sa kadaklan kana mga kaso, kusang nauuda ana nagtuturong sip-on. Kadaklan, diri adi nangangaipuhan sa pagbulong. Pero agko mga eksepsyio, kaiba ana:

Mga impeksiyon sa sinus
- Puwedeng kusang mauda ana mga impeksyon sa sinus. Pero kin diri magmaray ana kanimong sintomas pagkatapos kana 10 aldwo, puwedeng magreseta ana tagapagtao sa pangangatamang pangkalusugan kana ma antibiotic, oral o topical decongestant, o intransal steroid spray.

Chronic rhinitis
- Kin agko ika chronic (pang maubanang) nagtuturon sip-on, puwedeng I-refer kana kanimong provider sa usad na espesyalista sa talinga, urong ag lalamunan (ENT) nganing maisihan ana pinagbabatayan rason. Puwedeng kaipuhanan mong kana operasyon para kana mga problemang

your chest. It may help a runny nose, too.
- Decongestants: These medications shrink and dry up your nasal passages. They may help dry up a runny or stuffy nose.
- Antihistamines: These medications can help if your runny nose is due to allergies.

Check with your healthcare provider to see what over-the-counter medicines are appropriate for you. Always follow the instructions on the medications.

Unless your provider recommends it, don't give over-the-counter cold medicines to a child under 6 years old.

HOW LONG DOES A RUNNY NOSE LAST?
How long a runny nose lasts depends on the underlying cause.

With a viral infection, such as a cold, a runny or stuffy nose can last up to 10 to 14 days. A runny nose from allergies usually lasts as long as you're exposed to the allergen. If you're allergic to pollen, it can last six weeks during pollen seasons in the spring, summer or fall. You should see your healthcare provider if you've had a runny nose for more than three weeks that isn't from a known allergy.

CAN A RUNNY NOSE CAUSE COMPLICATIONS?
In some cases, a runny nose can lead to mild complications, including:

Postnasal drip
- Excess mucus can build up and drip down the back of your throat. This can make your throat sore and cause coughing.

Sinus infection
- If a sinus passage becomes blocked, it can lead to a sinus infection, which is often painful. You may need prescription medication to treat it.

Ear pain or ear infection
- If excess mucus backs up into your

kailangang alisin. Gumagamit ang mga provider ng iba't ibang pamamaraan sa pagtanggal, kabilang ang mga instrumento tulad ng sipit o forceps, sapilitang pagbuga ng hangin at suction.

PAANO KO MAPAPATIGIL ANG TUMUTULONG SIPON?
Karaniwang kusang nawawala ang rhinorrhea. Walang magagawa upang agad itong mapatigil. Karaniwan, nawawala ito sa paglipas ng panahon. Ngunit maaaring magbigay ng kaunting ginhawa ang ilang remedyo sa bahay at mga gamot.

Mga Remedyo sa Bahay para sa Tumutulong Sipon
Subukan ang mga sumusunod upang makatulong sa mga sintomas ng tumutulong sipon:
- Magpahinga.
- Uminom ng maraming likido, lalo na ng tubig.
- Maglagay ng maligamgam at mamasa-masang bimpo sa iyong mukha.
- Lumanghap ng singaw dalawa hanggang apat na beses sa isang araw. Ang isang paraan upang gawin ito ay ang pag-upo sa banyo habang umaandar ang shower. Huwag lumanghap ng sobrang init na singaw.
- Gumamit ng humidifier o vaporizer sa tabi ng iyong higaan. Makakatulong ito laban sa pagbabarang lumalala dahil sa tuyong hangin.
- Gumamit ng saline nasal spray upang makatulong sa pag-alis ng mucus. Limitahan ang paggamit ng decongestant nasal spray nang hindi hihigit sa ilang araw, ayon sa mga tagubilin sa label ng pakete.

MGA GAMOT PARA SA TUMUTULONG SIPON
Maaaring makatulong ang ilang nabibiling gamot nang walang reseta (OTC), kabilang ang:

Expectorants
-Maaaring palabnawin ng mga gamot na ito ang mucus upang makatulong sa pag-alis nito mula sa iyong dibdib. Maaari rin itong makatulong sa

istruktural arug kana nasal polyp, deviated septum o pagdakulo kana adenoids.

Mga dayuhang bagay sa urong
- Ana bagay na nakabara sa kanimong urong (o sa urong kana kanimong igin) ay kaipuhang tanggalan. Gumamit ana mga provide kana ibat ibang pamamaagi sa pagtangal, kaiba ana mga instrumento arug kana sipit o forceps, sailitang pagbuga kana angin ag suction.

PAUNO KO MAPUPUGULAN ANA NAGTUTURONG SIP-ON?
Kadalsang kusan nauuda ana rhinorrhea. Uda magiginibo nganing mapugol adi tulos. Kadalasan, nauudaadi sa paglipas kana panawon. Ngunit puwedeng magtao kana gatikot na ginhawa ana pirang remedyo sa baloy ag mga bulong.

Mga Remedyo sa Baloy para sa Nagtuturong Sip-on
Subuka ana mga sum-sunod nganing makatabang sa mga sintomas kana nagtuturon sip-on:
- Magpa-ingalo.
- Uminom kana dakol na likido, lalo na tubig.
- Magbutang kana maligamgam ag mabasa-basang bimpo sa kanimong lalawgon.
- Mag sang-ab kana singaw darawa hanggang upat na beses sa usad na aldow. Ana usa na paagi nganing gibuhon adi ay ana pag-ula sa banyo labing nag-aandar ana shower. Diri mag sang-ab kana sobrang init na singaw.
- Maggamit kana humidifier o vaporizer sa tabi kana kanimong batangan. Makakatabang adi laban sa pagbabatang naglala kwasa kana marang angin.
- Maggamit kana saline nasal spary nganing makatabang sa pag-galin kana mucus. Limitaduhon ana paggamit kana decongestant nasal spray nang diri labi pa sa usad na aldow, ayon sa mga nakabutang sa label kana pakete.

MGA BULONG PARA SA NAGTUTURONG SIP-ON

eustachian tube, it can result in ear pain or an ear infection.

CAN I PREVENT A RUNNY NOSE?
You can't always prevent a runny nose. But there are steps you can take to try to avoid getting a viral infection. Here are some simple tips to stop germs from spreading:
- Wash your hands often.
- Keep away from those who have colds or infections.
- Eat healthily and exercise regularly to help boost your immune system.
- Cough and sneeze into the inside of your elbow, not into your hand.
- Clean and disinfect common surfaces such as tables and countertops, toys, door handles, phones and bathroom fixtures.
- Stay up to date with all vaccines.

tumutulong sipon.

Decongestants
- Pinapaliit at pinatutuyo ng mga gamot na ito ang iyong mga daanan ng ilong. Maaari silang makatulong na patuyuin ang tumutulong o baradong ilong.

Antihistamines
- Maaaring makatulong ang mga gamot na ito kung ang iyong tumutulong sipon ay dulot ng mga allergy.

Kumonsulta sa iyong healthcare provider upang malaman kung anong mga nabibiling gamot nang walang reseta ang angkop para sa iyo. Palaging sundin ang mga tagubilin sa mga gamot.

Maliban kung inirerekomenda ng iyong provider, huwag magbigay ng mga nabibiling gamot sa sipon nang walang reseta sa batang wala pang 6 na taong gulang.

GAANO KATAGAL ANG TUMUTULONG SIPON?
Ang tagal ng tumutulong sipon ay nakadepende sa pinagbabatayang sanhi nito.

Sa isang impeksiyong viral, tulad ng karaniwang sipon, maaaring tumagal nang hanggang 10 hanggang 14 na araw ang tumutulong o baradong ilong. Ang tumutulong sipon mula sa mga allergy ay karaniwang tumatagal hangga't nalalantad ka sa allergen. Kung allergic ka sa pollen, maaari itong tumagal nang anim na linggo sa panahon ng pollen sa tagsibol, tag-init o taglagas.

Dapat kang magpatingin sa iyong healthcare provider kung mayroon kang tumutulong sipon nang higit sa tatlong linggo na hindi nagmumula sa isang kilalang allergy.

MAAARI BANG MAGDULOT NG MGA KOMPLIKASYON ANG TUMUTULONG SIPON?
Sa ilang pagkakataon, maaaring magdulot ang tumutulong sipon ng

Puwedeng makatabang ana pirang nababakal na bulong na uda reseta (OTC), kaiba ana:

Epectorants
- Puwedeng palabnawon kana mga bulong na adi ana mucus nganin makatabang sa pag-tanggal kadi galin sa kanimong ruruggan. Puwede man ading makatabang sa nagtuturon sip-on.

Decongestants
- Pinapasaday ag pinapamara kana mga bulong na adi ana kanimong mga agihan kana urong. Puwede sirang makatabang na pamarahon ana nagtuturo o baradong urong.

Antihistamines
- Puwedeng makatabang ana mga bulong na adi kin ana kanimong nagtuturong sip-on ay dara kana mga allergy.

Magpa kunsulta ka kanimong tagapagtao kana pangangataman pangkalusugan nganing maisihan kin uno ana mga nababakal na bulong na uda reseta ana angkop para kanimo. Permeng sundon ana mga nakabutang sa bulong.

Maliban kin inenerekomendar kana kanimong tagapagtao sa pangangalagang pangkalusugan, diri magtao kana mga nababakal na bulong sa sip-on na uda reseta sa igin na uda pang 6 na anyos.

GAUMNO KAUBAN ANA NAGTUTURON SIP-ON?
Ana uban kana nagtuturong sip-on ay nakadepende sa pinagbabatayang rason kadi.

Sa usad na impeksiyong viral, aru kana kadalasang sip-on, puwedeng mag-uban na 10 hanggan 14 na aldow ana nagtuturo o baradong urong. Ana nagtuturon sip-on galin sa mga allergy ay kadalasang nag-uuban hanggat nalalantad ika sa allergen. Kin allergic ika sa pollen, puwedeng ading mag-uban sa unom na linggo sa panawon kana pollen sa tagsibol, tag-init o tag-lagas.

	mga banayad na komplikasyon, kabilang ang: Postnasal drip - Maaaring maipon ang sobrang mucus at tumulo sa likod ng iyong lalamunan. Maaari nitong pasakitin ang iyong lalamunan at magdulot ng pag-ubo. Impeksiyon sa sinus - Kung mabara ang isang daanan ng sinus, maaari itong humantong sa impeksiyon sa sinus, na kadalasang masakit. Maaaring kailanganin mo ng iniresetang gamot upang magamot ito. Pananakit ng tainga o impeksiyon sa tainga - Kung bumalik at maipon ang sobrang mucus sa iyong eustachian tube, maaari itong magresulta sa pananakit ng tainga o impeksiyon sa tainga. **MAAARI KO BANG MAIWASAN ANG TUMUTULONG SIPON?** Hindi mo palaging maiiwasan ang tumutulong sipon. Ngunit may mga hakbang kang maaaring gawin upang subukang maiwasan ang pagkakaroon ng impeksiyong viral. Narito ang ilang simpleng tip upang mapigilan ang pagkalat ng mga mikrobyo: - Madalas na maghugas ng iyong mga kamay. - Lumayo sa mga taong may sipon o impeksiyon. - Kumain nang masustansiya at regular na mag-ehersisyo upang makatulong na palakasin ang iyong immune system. - Umubo at bumahing sa loob ng iyong siko, hindi sa iyong kamay. - Linisin at i-disinfect ang mga karaniwang ibabaw tulad ng mga mesa at countertop, laruan, hawakan ng pinto, telepono at mga kagamitan sa banyo. - Tiyaking napapanahon ang lahat ng iyong mga bakuna.	Dapat ikang magpabayad sa kanimong tagapagtao sa pangangatamang pangkalusugan kin agko ika nagtuturong sip-on na labi pa sa tulong semana na diri nagagalin sa usad na bistong allergy. **PUWEDE BANG MAGDARA KANA MGA KOMPLIKASYON ANA NAGTUTURONG SIP-ON?** Sa pirang pagkakaton, puwedeng magdara ana nagtuturon sip-on kana mga banayad na komplikasyon, kaiba ana: Postnasal drip - Puwedeng matipon ana sobrang mucus ag magturo sa likod kana kanimong lalamunan. Puwdeng ading pakulugon ana kanimong lalamunan ag magdara kana pag-ubo. Impeksyon sa sinus - Kin mabara ana usad na agihan kana sinus, puwedeng ading maiyan sa impeksyon sa sinus, na kadaklan makulog. Puwedeng kaipuwanan mo sa niresetang bulong nganing mabulong adi. Pangungulog kana talinga o impeksyon sa talinga - Kin bumbalik ag matipon ana sobrang mucus kanimong eustachian tube, puwede ading magresulta sa pangungulog kana talinga o impeksyon sa talinga. **PUWEDE KO BANG MALIKAYAN ANA NAGTUTURONG SIP-ON?** Diri mo permeng malilikayan ana nagtuturong sip-on. Pero agko mga hakbang ikang puwedeng gibuwon nganing subukang malikayan ana pagkaka-agko kana impeksyong viral. Adi ana pirang simpleng tip nganing mapugulan ana pagkalat kana mga mikrobyo: - Kadalasang pag-uugas kana kanimong kamot. - Rumayo sa mga tawong agko sip-on o impeksyon. - Kumaon sa masustansiya ag regular na mag-ehersisyo nagning makatabang na pakusugon ana kanimong immune system. - Umubo ag bumahing sa luog kana kanimong siko, diri sa kanimong

		kamot. - Linigan ag I-disinfect ana mga kadalasang ibabow arug kana mga mesa ag countertop, ngayamanan, kakaptan kana pinto, telepono ag mga kagamitan sa banyo. - Tiyakong napapanahon ana ngamin na kanimong bakuna.

PHARYNGITIS (SORE THROAT)

ENGLISH	TAGALOG	BIKOL
MAIN SUBJECT: PHARYNGITIS (SORE THROAT) **WHAT IS A SORE THROAT?** A sore throat, or "pharyngitis," is a scratchy, painful feeling in the back of your throat (pharynx). It happens when the tissue lining your throat (mucosa) becomes inflamed. If you have a sore throat, it may hurt to swallow or talk. Many things cause pharyngitis, from viral and bacterial infections to allergies and sleeping with your mouth open. Most sore throat symptoms go away with home care within a few days. But you should contact a healthcare provider if your sore throat lasts longer than a week, gets worse or you develop symptoms like a fever or swollen lymph nodes. Types Of Pharyngitis There are two main types of pharyngitis. Healthcare providers categorize them based on how long symptoms last: Acute pharyngitis - A sore throat that lasts from about three to 10 days. Most sore throats are acute pharyngitis. Chronic pharyngitis - A sore throat that lasts for more than 10 days (usually several weeks) or that keeps returning after you get better. **SYMPTOMS** Pharyngitis may start with a raspy feeling in your throat, as if your throat is dry. If your sore throat gets worse, you may feel a sharp pain in your throat when you swallow or talk.	**PANGUNAHING PAKSA: PHARYNGITIS (MASAKIT NA LALAMUNAN)** **ANO ANG MASAKIT NA LALAMUNAN?** Ang masakit na lalamunan, o "pharyngitis," ay isang magaspang at masakit na pakiramdam sa likod ng iyong lalamunan (pharynx). Nangyayari ito kapag namamaga ang tissue na bumabalot sa iyong lalamunan (mucosa). Kung masakit ang iyong lalamunan, maaaring sumakit ito kapag lumulunok o nagsasalita ka. Maraming bagay ang maaaring magdulot ng pharyngitis, mula sa mga impeksiyong dulot ng virus at bacteria hanggang sa mga allergy at pagtulog nang nakabukas ang bibig. Karamihan sa mga sintomas ng masakit na lalamunan ay nawawala sa loob ng ilang araw sa pamamagitan ng pangangalaga sa bahay. Ngunit dapat kang makipag-ugnayan sa isang healthcare provider kung tumagal nang higit sa isang linggo ang pananakit ng iyong lalamunan, lumala ito, o magkaroon ka ng mga sintomas tulad ng lagnat o namamagang lymph nodes. Mga Uri ng Pharyngitis May dalawang pangunahing uri ng pharyngitis. Inuuri ito ng mga healthcare provider batay sa kung gaano katagal ang mga sintomas: Acute pharyngitis - Masakit na lalamunan na tumatagal nang humigit-kumulang tatlo hanggang 10 araw. Karamihan sa mga kaso ng masakit na lalamunan ay	**PANGUNAHONG PAKSA: PHARYNGITIS MAKULOG NA TUTULNAN)** **UNO ANA MAKULOG NA TUTULNAN** Ana makulog na tutulnan, o "pharyngitis," ay usad na magaspang ag makulog na pagmati sa likod kana kanimong tutulnan (pharynx). Nangyayari adi kin namamaga ana tissue na nagpuputos kana kanimong tutulnan (mucosa). Kin makulog ana kanimong tutulnan , puwedeng mangulog adi kapag lumulunok o nagsasarita ika. Dakol na bagay ana puwedeng magdara kana pharyngitis, galin sa mga impeksyon na dara kana virus ag bacteria hanggang sa mga allergy ag pagturog na nakabuka ana nganga. Kadaklan kana mga sintomas kana makulog na tutulnan ay kusang nagraray sa luog kana pirang aldaw sa paagi kana pangangataman sa baloy. Pero kaipuhan mong makipag-ugnayan sa usad na tagapagtao sa pangangatamang pangkalusugan kin nagpadagos ana pangungulog kana kanimong tutulnan na lagpas sa usad na semana, naglala adi, o nagkaagko ika kana mga sintomas arug kana lagnat o namamagang lymph nodes. Mga Uri Kana Pharyngitis Agko darawang pangunang uri kana pharyngitis. Pinag-uuri adi kana mga tagapagtao sa pangangatamang pangkalusugan base sa kin gaumno kaubana ana mga sintomas: Acute Pharyngitis - Makulog na tutulnan na nag-uuban humigit-kumulang tulong hanggang 10 aldow. Kadaklan kana mga kaso

You may feel the pain in your ears or down the side of your neck.
If an infection is causing your sore throat, additional symptoms may include:
- Fever.
- Headache.
- Upset stomach.
- Swollen lymph nodes.
- Nasal congestion (stuffy nose).
- Runny nose.
- Cough.
- Fatigue.
- Hoarseness.
- Redness or swelling in your throat and tonsils.
- White patches, spots or streaks in your throat and tonsils.

CAUSES
Most sore throats happen because you have a viral infection, like the common cold or flu. Less often, a sore throat (pharyngitis) may be a sign of the following conditions or issues:
Bacterial infection
- Conditions like strep throat and bacterial sinus infections may cause a sore throat

Tonsillitis
- Tonsillitis occurs when your tonsils become infected and inflamed. Bacteria and viruses can both cause tonsillitis.

Allergies
- Allergic reactions from pollen, dust mites, pets or mold can cause mucus from your nose to drip down the back of your throat (postnasal drip). This can lead to a sore throat.

Acid reflux
- People with gastroesophageal reflux disease (GERD) feel burning and pain in their throats. This pain, called heartburn, happens when acid from your stomach backs up into your food tube (esophagus).

Overuse or irritants
- You can strain your throat by yelling or screaming. You may also develop a sore throat if you eat spicy food, smoke or drink very hot liquids.
Mouth breathing: You may have a

acute pharyngitis.
Chronic pharyngitis
- Masakit na lalamunan na tumatagal nang higit sa 10 araw (karaniwang ilang linggo) o paulit-ulit na bumabalik matapos kang gumaling.

MGA SINTOMAS
Maaaring magsimula ang pharyngitis sa isang magaspang na pakiramdam sa iyong lalamunan, na para bang tuyo ito. Kung lumala ang pananakit ng iyong lalamunan, maaari kang makaramdam ng matinding kirot sa iyong lalamunan kapag lumulunok o nagsasalita. Maaari mo ring maramdaman ang pananakit sa iyong mga tainga o sa gilid ng iyong leeg.
Kung impeksiyon ang sanhi ng pananakit ng iyong lalamunan, maaaring kabilang sa mga karagdagang sintomas ang:
- Lagnat.
- Sakit ng ulo.
- Pananakit ng tiyan.
- Namamagang lymph nodes.
- Baradong ilong.
- Tumutulong sipon.
- Ubo.
- Pagkapagod.
- Pamamaos.
- Pamumula o pamamaga ng iyong lalamunan at tonsils.
- Mga puting bahagi, batik o guhit sa iyong lalamunan at tonsils.

MGA SANHI
Karamihan sa mga kaso ng masakit na lalamunan ay nangyayari dahil mayroon kang impeksiyong dulot ng virus, tulad ng karaniwang sipon o trangkaso. Hindi gaanong madalas, ang masakit na lalamunan (pharyngitis) ay maaaring senyales ng mga sumusunod na kondisyon o problema:

Impeksiyong dulot ng bacteria
- Ang mga kondisyon tulad ng strep throat at mga bacterial sinus infection ay maaaring magdulot ng masakit na lalamunan.

Tonsillitis
- Nangyayari ang tonsillitis kapag nagkaroon ng impeksiyon at pamamaga ang iyong tonsils.

kana makulog na tutulnan ay acute pharyngitis.
Chronic Pharyngitis
- Makulog na tutulnan na nag-uuban na lagpas sa 10 aldaw (kadaklan, pirang semana) o pabalik-balik pakatapos mong mamaray.

MGA SINTOMAS
Puwedeng magpuon ana pharyngitis sa usad na magaspang na pagmati sa kanimong tutulnan, na arug bana mara adi. Kin naglala ana pangungulog kana kanimong tutulnan, puwede ika makamati kana sobrang kirot sa tutulnan kapag lumulunok o nag ngangabil ika. Puwede mo man mamatian ana pangungulog sa kanimong mga talinga o sa gilid kana kanimong liog.
Kin impeksyon ana rason kana pangungulog kana kanimong tutulnan, puwedeng kaiba sa mga rugang na sintomas ana:
- Lagnat.
- Kulog kana payo.
- Pangungulog kana buros.
- Namamagang lymph nodes.
- Baradong urong.
- Nagtuturong sip-on.
- Ubo.
- Kapagalan.
- Pamamaos.
- Pamumula o pamamaga kana kanimong tutulnan ag tonsils.
- Mga puting parte, batik o guhit sa kanimong tutulnan ag tonsils.

MGA RASON
Kadaklan kana mga kaso kana makulog na tutulnan ay nangyayari ta agko ika impeksyon na dara kana virus, arug kana ordinaryong sip-on o trangkaso. Mas bihira, ana makulog na tutulnan (pharyngitis) ay puwedeng maging senyales kana mga sumusunod na kondisyon o problema:

Impeksyon na Dara kana Bacteria
- Ana mga kondisyon arug kana strep throat ag mga bacterial sinus infection ay puwedeng magdara kana makulog na tutulnan.

Tonsillitis
- Nangyayari ana tonsillitis kin nagka

sore throat if you breathe through your mouth instead of your nose when you're sleeping.

Tumors
- Although a sore throat rarely means cancer, it's one potential symptom of throat cancer or benign (noncancerous) growths.

MANAGEMENT AND TREATMENT

HOW IS A SORE THROAT TREATED?
Treatment depends on what's causing your pharyngitis. Viral infections usually clear up on their own within a week. In the meantime, your healthcare provider may recommend over-the-counter (OTC) medicines to ease your sore throat.
Other treatments for a sore throat may include:
Antibiotics
- You may need antibiotics to treat a bacterial infection. Most people need to take them for 10 days.
Over-the-counter antihistamine medications: Antihistamines may dry postnasal drip related to allergies.

Over-the-counter antacids
- Antacids may help with acid reflux that causes heartburn and sore throats. Other steps, like avoiding big meals right before bedtime, may help.

Prescription mouthwash
- For a severe sore throat related to conditions like cancer, your provider may prescribe a special mouthwash (sometimes called "magic mouthwash") that contains a mix of a numbing agent (like lidocaine), Benadryl® and Maalox®.

PREVENTION

HOW CAN I PREVENT A SORE THROAT?
Viral infections like colds and the flu often cause pharyngitis. You can reduce your chances of getting a sore throat by protecting yourself against these common infections. You can:

- Stay up to date on vaccinations for

Parehong maaaring magdulot ng tonsillitis ang bacteria at mga virus.

Mga allergy
- Ang mga reaksiyong alerhiya mula sa pollen, dust mites, mga alagang hayop o amag ay maaaring magdulot ng pagdaloy ng mucus mula sa iyong ilong pababa sa likod ng iyong lalamunan (postnasal drip). Maaari itong humantong sa masakit na lalamunan.

Acid reflux
- Ang mga taong may gastroesophageal reflux disease (GERD) ay nakakaramdam ng pag-aapoy at pananakit sa kanilang lalamunan. Ang pananakit na ito, na tinatawag na heartburn, ay nangyayari kapag umaakyat pabalik ang asido mula sa iyong tiyan papunta sa iyong tubong dinaraanan ng pagkain (esophagus).

Sobrang paggamit ng lalamunan o mga irritant
- Maaaring mapuwersa ang iyong lalamunan dahil sa pagsigaw o pagtili. Maaari ka ring magkaroon ng masakit na lalamunan kung kakain ka ng maanghang na pagkain, maninigarilyo o iinom ng napakainit na likido.

Paghinga sa pamamagitan ng bibig
- Maaaring sumakit ang iyong lalamunan kung humihinga ka sa pamamagitan ng iyong bibig sa halip na sa iyong ilong habang natutulog.

Mga tumor
- Bagama't bihirang nangangahulugan ng kanser ang masakit na lalamunan, isa ito sa mga posibleng sintomas ng kanser sa lalamunan o ng mga benign (hindi cancerous) na bukol.

PAMAMAHALA AT PAGGAMOT

PAANO GINAGAMOT ANG MASAKIT NA LALAMUNAN?
Nakadepende ang paggamot sa sanhi ng iyong pharyngitis. Karaniwang kusang nawawala ang mga impeksiyong dulot ng virus sa loob ng isang linggo. Samantala, maaaring magrekomenda ang iyong healthcare

agko na ika impeksyon ag pamamaga kana kanimong tonsils. Parehong puwedeng magtao kana tonsillitis ana bacteria ag mga virus.

Mga Allergy
- Ana mga reaksiyong alerhiya galin sa pollen, dust mites, mga atamang hayop o amag ay puwedeng magdara kana pagbulog kana mucus galin sa kanimong urong paibaba sa likod kana kanimong tutulnan (postnasal drip). Puwede adi magdara kana makulog na tutulnan.

Acid Reflux
- Ana mga tawo na agko gastroesophageal reflux disease (GERD) ay nakakamati kana pag-aapoy ag pangungulog sa tutulnan. Ana pangungulog na adi, na tinatawag na heartburn, ay nangyayari kin nag-guguno pabalik ana asido galin sa kanimong buros paiyan sa tubong dinaran kana pagkaon (esophagus).

Sobrang Paggamit kana tutulnan o Mga Irritant
- Puwedeng mapuwersa ana kanimong tutulnan kwasa sa pagrait o pagtili. Puwede man ikang magkaagko makulog na tutulnan kin makakaon ika kana maaling na pagkaon, naninigarilyo o iinom kana sobrang mainit na likido.

Pag-inga Gamit ana Nganga
- Puwedeng mangulog ana kanimong tutulnan kin naggiginhawa ika gamit ana kanimong nganga imbes na uron labing nagtuturog.

Mga Tumor
- Dawa bihira na nangangahulugan kana kanser ana makulog na tutulnan, usad adi sa mga posibleng sintomas kana kanser sa tutulnan o mga benign (diri cancerous) na bukol.

PANGANGATAMAN AG PAGBULONG

PAUNO BINUBULONG ANA MAKULOG NA TUTULNAN?
Nakadepende ana pagbulong sa rason kana kanimong pharyngitis. Kadaklan, kusang nagraray ana mga impeksyon

the flu and COVID-19.
- Wash your hands often, using soap and water or alcohol-based sanitizers.
- Avoid sharing food, drinks or utensils.
- Avoid people with colds or other contagious respiratory infections.
- Avoid being around others when you're sick to reduce the risk of spreading infectious diseases.

HOW DO I TAKE CARE OF MYSELF?
It may take some time to cure what's causing your pharyngitis. In the meantime, there are at-home remedies you can try to relieve your sore throat. You can:
- Take over-the-counter pain relievers. Acetaminophen (Tylenol®), naproxen sodium (Aleve®) and ibuprofen (Advil®) are all options that may help with a sore throat.
- Suck on throat lozenges or hard candy. This increases spit (saliva) production, which adds soothing moisture to your throat. But never try this with children under 5, who may choke.
- Try ice or cold foods. You can also try sucking on ice chips or popsicles to ease sore throat pain.
- Drink soothing liquids. Drinking tea with lemon and honey, broth or bouillon may help dry, scratchy throats. If coolness feels better on the back of your throat, try sipping ice water.
- Gargle saltwater. Gargling a mixture that's ½ teaspoon of salt per 1 cup of water can ease inflammation and irritation in your throat.
- Use a humidifier or vaporizer. Adding moisture to your environment, especially to your bedroom when you're sleeping, helps ease dry throats.
- Rest your voice. If your throat is sore from shouting, screaming, singing or even talking a lot, resting your voice may help.
- Avoid irritants. Avoid exposure to secondhand smoke, and steer clear of spicy foods and very hot liquids that may irritate your sore throat. If you smoke, work with your healthcare provider to quit.

provider ng mga over-the-counter (OTC) na gamot upang maibsan ang pananakit ng iyong lalamunan.
Maaaring kabilang sa iba pang paggamot para sa masakit na lalamunan ang:
Antibiotics
- Maaaring kailanganin mo ng antibiotics upang gamutin ang impeksiyong dulot ng bacteria. Karamihan sa mga tao ay kailangang uminom ng mga ito sa loob ng 10 araw.

Mga over-the-counter na antihistamine na gamot
- Maaaring patuyuin ng antihistamines ang postnasal drip na may kaugnayan sa mga allergy.

Mga over-the-counter na antacid
- Maaaring makatulong ang antacids sa acid reflux na nagdudulot ng heartburn at pananakit ng lalamunan. Maaari ring makatulong ang iba pang hakbang, tulad ng pag-iwas sa pagkain ng malalaking meal bago matulog.

Mouthwash na may reseta
- Para sa matinding pananakit ng lalamunan na may kaugnayan sa mga kondisyon tulad ng kanser, maaaring magreseta ang iyong healthcare provider ng espesyal na mouthwash (minsan ay tinatawag na "magic mouthwash") na naglalaman ng pinaghalong pampamanhid (tulad ng lidocaine), Benadryl® at Maalox®.

PAG-IWAS

PAANO KO MAIIWASAN ANG MASAKIT NA LALAMUNAN?
Ang mga impeksiyong dulot ng virus, tulad ng sipon at trangkaso, ay kadalasang nagdudulot ng pharyngitis. Maaari mong mabawasan ang posibilidad na magkaroon ng masakit na lalamunan sa pamamagitan ng pagprotekta sa iyong sarili laban sa mga karaniwang impeksiyong ito. Maaari mong:
- Tiyaking napapanahon ang iyong mga bakuna laban sa trangkaso at COVID-19.
- Madalas na maghugas ng iyong mga

na dara kana virus sa luog kana usad na semana. Samantala, puwedeng magrekomendar ana kanimong tagapagtao sa pangangatamang pangkalusugan kana mga over-the-counter (OTC) na bulong nganing maibsan ana pangungulog kana kanimong tutulnan.
Puwedeng kaiba sa iba pang pagbulong para sa makulog na tutulnan ana:
Antibiotics
- Puwedeng kaipuwanan mo kana antibiotics nganing mabulong ana impeksyon na dara kana bacteria. Kadaklan kana mga tawo ay kaipuwang inumon adi sa luog kana 10 aldaw.

Mga Over-the-Counter na Antihistamine
- Puwedeng pamarahon kana antihistamines ana postnasal drip na agko kaugnayan sa mga allergy.

Mga Over-the-Counter na Antacid
- Puwedeng makatabang ana antacids sa acid reflux na nagdadara kana heartburn ag pangungulog kana tutulnan. Puwede man makatabang ana iba pang mga paagi, arug kana paglikay sa pagkaon kana dakol na pagkaon bago magturog.

Mouthwash na Agko Reseta
- Para sa matinding pangungulog kana tutulnan na agko kaugnayan sa mga kondisyon arug kana kanser, puwedeng magreseta ana kanimong tagapagtao sa pangangatamang pangkalusugan kana espesyal na mouthwash (minsan binabaoy na "magic mouthwash") na agko salak pampamanhid (arug kana lidocaine), Benadryl® ag Maalox®.

PAGLIKAY

PAUNO KO MAIIWASAN ANA MAKULOG NA TUTULNAN?
Ana mga impeksyon na dara kana virus, arug kana sip-on ag trangkaso, ay nagdadara kana pharyngitis. Puwede mong mabawasan ana posibilidad na magka agko makulog na tutulnan sa paagi kana pagprotekta ka kanimong sadiri laban

	kamay gamit ang sabon at tubig o mga alcohol-based sanitizer. - Iwasang magbahagi ng pagkain, inumin o mga kagamitan sa pagkain. - Iwasan ang mga taong may sipon o iba pang nakahahawang impeksiyon sa paghinga. - Iwasang makisalamuha sa iba kapag ikaw ay may sakit upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng mga nakahahawang sakit. **PAANO KO PANGANGALAGAAN ANG AKING SARILI?** Maaaring abutin ng ilang panahon bago magamot ang sanhi ng iyong pharyngitis. Samantala, may mga remedyo sa bahay na maaari mong subukan upang maibsan ang pananakit ng iyong lalamunan. Maaari mong: - Uminom ng mga over-the-counter na gamot na pampawala ng sakit. Ang acetaminophen (Tylenol®), naproxen sodium (Aleve®) at ibuprofen (Advil®) ay mga opsiyong maaaring makatulong sa masakit na lalamunan. - Sumipsip ng throat lozenges o matitigas na kendi. Pinapataas nito ang produksyon ng laway, na nagbibigay ng nakagiginhawang halumigmig sa iyong lalamunan. Ngunit huwag itong subukan sa mga batang wala pang 5 taong gulang dahil maaari silang mabulunan. - Subukan ang yelo o malamig na pagkain. Maaari mo ring subukang sumipsip ng maliliit na piraso ng yelo o popsicles upang maibsan ang pananakit ng lalamunan. - Uminom ng mga nakagiginhawang likido. Ang pag-inom ng tsaa na may lemon at honey, sabaw o bouillon ay maaaring makatulong sa tuyo at magaspang na lalamunan. Kung mas nakagiginhawa ang lamig sa likod ng iyong lalamunan, subukang uminom ng paunti-unting malamig na tubig na may yelo. - Magmumog ng tubig na may asin. Ang pagmumog ng pinaghalong ½ kutsarita ng asin sa bawat 1 tasa ng tubig ay maaaring makapagpabawas ng pamamaga at iritasyon sa iyong lalamunan. - Gumamit ng humidifier o vaporizer. Ang pagdaragdag ng halumigmig sa	sa mga ordinaryong impeksyon na adi. Puwede mong: - Siguruhon na napapanahon ana kanimong mga bakuna laban sa trangkaso ag COVID-19. - Pirmeng maghugas kana kanimong mga kamot gamit ana sabon ag tubig o mga alcohol-based sanitizer. - Likayan ana pag-share kana pagkaon, inumon o mga kagamitan sa pagkaon. - Likayan ana mga tawo na agko sip-on o iba pang nakakaumaliw na impeksyon sa pag-inga. - Likayan ana pakikisalamuha sa iba kin agko ika ilang nganing mabawasan ana peligro kana pagkalat kana mga nakakahawang ilang. **PAUNO KO PANGANGATAMANON ANA KANIMONG SADIRI?** Puwedeng abuton kana pirang panahon bago mabulong ana rason kana kanimong pharyngitis. Samantala, agko mga remedyo sa baloy na puwede mong subukan nganing maibsan ana pangungulog kana kanimong tutulnan. Puwede mong: - Uminom kana mga over-the-counter na bulong para sa pangungulog. Ana acetaminophen (Tylenol®), naproxen sodium (Aleve®) ag ibuprofen (Advil®) ay mga opsyon na puwedeng makatabang sa makulog kana tutulnan. - Sumipsip kana throat lozenges o makusang kendi. Pinapalangkaw kadi ana produksyon kana liwoy, na nagtatao kana nakagiginhawang halumigmig sa kanimong tutulnan. Pero diri mo adi dapat subukan sa mga igin na uda pa 5 anyos ta puwede sirang mabulunan. - Subukan ana yelo o maagnow na pagkaon. Puwede mo man subukon ana pagsupsop kana satsaday piraso kana yelo o popsicles nganing maibsan ana pangungulog kana tutulnan. - Uminom kana mga nakagiginhawang likido. Ana pag-inom kana tsaa na agko lemon ag honey, sabaw o bouillon ay puwedeng makatabang sa mara ag magaspang na tutulnan. Kin mas nakagiginhawa ana agnow sa likod kana kanimong tutulnan,

	iyong kapaligiran, lalo na sa iyong silid-tulugan habang natutulog, ay nakatutulong na maibsan ang pagkatuyo ng lalamunan. - Ipahinga ang iyong boses. Kung sumakit ang iyong lalamunan dahil sa pagsigaw, pagtili, pagkanta o kahit sa sobrang pagsasalita, maaaring makatulong ang pagpapahinga ng iyong boses. - Iwasan ang mga irritant. Iwasang malantad sa usok ng sigarilyo mula sa ibang tao, at umiwas sa mga maanghang na pagkain at napakainit na likido na maaaring makairita sa iyong masakit na lalamunan. Kung naninigarilyo ka, makipagtulungan sa iyong healthcare provider upang tumigil sa paninigarilyo.	subukan ana pag-inom kana gurugatikot na maanow na tubig na agko yelo. - Magmalimogmog kana tubig na agko asin. Ana pagmalimugmog kana halong ½ kutsarita kana asin sa kada 1 tasa kana tubig ay puwedeng makabawas kana pamamaga ag iritasyon sa kanimong tutulnan. - Gumamit kana humidifier o vaporizer. Ana pagrugang kana halumigmig sa kanimong kapaligiran, lao na sa kanimong kwarto habang nagtuturog, ay nakakatabang nganing maibsan ana pagkamara kana tutulnan. - Ipaingalo ana kanimong boses. Kin nangulog ana kanimong tutulnan kwasa sa pagrait, pagtili, pagkanta o sobrang pagngangabil, puwedeng makatabang ana pagpapahingalo kana kanimong boses. - Likayan ana mga irritant. Likayang malantad sa aso kana sigarilyo galin sa ibang tawo, ag lumikay sa mga maaling na pagkaon ag sobrang mainit na likido na puwedeng makairita sa makulog mong tutulnan. Kin naninigarilyo ika, makipagtabangan sa kanimong tagapagtao sa pangangatamang pangkalusugan nganing magpundo sa paninigarilyo.

LEPTOSPIROSIS

English	Tagalog	Bikol-Iriga
What is Leptospirosis? Leptospirosis is a disease caused by a bacterium, *Leptospira*. Human disease is associated with contact with wild and domestic animal urine. It is extremely rare, with only about one human case reported annually in Illinois. **What are the symptoms?** Symptoms of leptospirosis include high fever, headache, chills, muscle aches, conjunctivitis (red eyes), diarrhea, vomiting, and kidney or liver problems (which may include jaundice), anemia and,	**Ano ang Leptospirosis?** Ang leptospirosis ay isang sakit na dulot ng isang uri ng bakterya na tinatawag na Leptospira. Ang pagkakaroon ng sakit na ito sa mga tao ay nauugnay sa pakikisalamuha o pagkakadikit sa ihi ng mga ligaw at alagang hayop. Napakabihira ng sakit na ito sa Illinois, kung saan humigit-kumulang isang kaso lamang sa tao ang naiuulat bawat taon. **Ano-ano ang mga Sintomas?** Kabilang sa mga sintomas ng leptospirosis ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo, panginginig, pananakit ng mga	**Uno a Leptospirosis?** A leptospirosis usad na klase sa ilang na galin sa bakterya na binabaoy na Leptospira. A mga tawong pwedeng maumaliwan ka ilang na adi kin maruktan sira sa tabid ka mga ayop, arog ka mga ayop na inaasikaso sa baloy. Bihira a arog kading ilang, arog sa Illinois. Mga pirang tawo sana a narereport kada taon **Uno a mga sintomas?** A mga sintomas ka leptospirosis amo a alangkaw na kalintura, kulog sa payo, inaagnow, kulog ka kalamnan, pamumula ka mga mata, pag udo udo, maski mga

sometimes, rash. Symptoms may last from a few days to several weeks. Although deaths have occurred, they are rare. In some persons, the infection can be mild and without obvious symptoms. **What is the treatment for Leptospirosis?** The antibiotics of choice include penicillin, streptomycin, tetracycline or erythromycin. Kidney dialysis may be necessary in some cases.	kalamnan, conjunctivitis o pamumula ng mga mata, pagtatae, pagsusuka, at mga problema sa bato o atay na maaaring magdulot ng paninilaw ng balat at mga mata (jaundice). Maaari rin itong magdulot ng anemia o kakulangan sa malusog na pulang selula ng dugo at, kung minsan, mga pantal sa balat. Maaaring tumagal ang mga sintomas mula ilang araw hanggang ilang linggo. Bagama't may mga naitalang pagkamatay dahil sa sakit na ito, bihira ang mga ito. Sa ilang tao, maaaring banayad lamang ang impeksiyon at walang kapansin-pansing sintomas. **Ano ang Paggamot sa Leptospirosis?** Kabilang sa mga pangunahing antibiotic na ginagamit sa paggamot ng leptospirosis ang penicillin, streptomycin, tetracycline, at erythromycin. Sa ilang kaso, maaaring kailanganin ang dialysis sa bato upang matulungan ang katawan na alisin ang mga dumi at sobrang likido kapag hindi na gumagana nang maayos ang mga bato.	problema sa kidney o atay na pwedeng magresulta sa pagdilaw ka kulit maski mata. Pwedeng magka agko man sa anemia o kakulangan sa malusog na pulang selula ka rugo, maski minsan, mga pantal sa kulit. A mga sintomas pwedeng mag uban sa pirang aldow abot sa pirang semana. Agko mga tawong nakakamati na dahil kadi ilang na adi, pero bihira man adi. Sa ibang tawo, maluya sana a impeksyon ag pwede sirang uda risang sintomas. **Pauno binubulong a Leptospirosis?** A mga antibiotic na ginagamit sa pagbulong ka Leptospirosis ay Penicillin, streptomycin, tetracyline, maski erthyromycine. Sa ibang kaso, kaipuwan a kidney dialysis o proseso na nagtatao sa tabang ka paglinig ka rugo kin diri na nag Gagana sa tama a kidney.

HEADACHE

English	Tagalog	Bikol-Iriga
What is Headache? Headache refers to pain in your head or face. They can feel like pressure, throbbing, a constant ache, or even sharp pain. The type of pain, how bad it is, where it hurts, and how often you get headaches can vary from person to person. **Common Types of Headaches** · Tension Headaches · Migraine Headaches · Chronic Daily Headaches · Cluster Headaches · Sinus Headaches · Posttraumatic Headaches	**Ano ang Pananakit ng Ulo (Headache)?** Ang pananakit ng ulo ay tumutukoy sa sakit na nararamdaman sa ulo o mukha. Maaari itong maramdaman na parang may pumipisil o dumidiin sa ulo, pumipintig, tuloy-tuloy na pananakit, o matinding sakit na parang tinutusok. **Mga Karaniwang Uri ng Pananakit ng Ulo** • Tension Headache • Migraine Headache • Chronic Daily Headache • Cluster Headache • Sinus Headache • Posttraumatic Headache	**Uno a kulog sa payo?** A kulog sa payo nagtutukoy sa kulog na namamati sa payo o sa lalawgun. Pwede ading mamati na parang agko nagpipisil o nag ruruon sa payo, nagpipintig, dagos dagos na pangungulog o malang kulog na parang agko nagtutusok. **Mga komon na klase sa kulog sa payo** · Tension Headache · Migraine Headache · Chronic Daily Headache · Cluster Headache · Sinus Headache · Posttraumatic Headache

What causes Headaches? The pain you feel during a headache comes from a mix of signals between your brain, blood vessels, and nearby nerves. Specific nerves in your blood vessels and head muscles switch on and send pain signals to your brain. But it isn't clear how these signals get turned on in the first place. **How are Headaches Treated?** Your doctor may recommend different types of treatments. They might also suggest more testing or refer you to appropriate experts, such as ear, nose, and throat specialists, neurologists, optometrists, physical therapists, or a headache specialist.	**Ano ang mga Sanhi ng Pananakit ng Ulo?** Ang sakit na nararamdaman kapag sumasakit ang ulo ay nagmumula sa pinagsamang mga senyales sa pagitan ng utak, mga daluyan ng dugo, at mga kalapit na nerbiyos. Ang ilang partikular na nerbiyos sa mga daluyan ng dugo at kalamnan sa ulo ay nagiging aktibo at nagpapadala ng mga senyales ng pananakit papunta sa utak. Gayunpaman, hindi pa ganap na malinaw kung paano nagsisimulang maging aktibo ang mga senyales na ito. **Paano Ginagamot ang Pananakit ng Ulo?** Maaaring magrekomenda ang doktor ng iba't ibang uri ng paggamot depende sa sanhi at kalubhaan ng pananakit ng ulo. Maaari rin siyang magmungkahi ng karagdagang pagsusuri o mag-refer sa mga angkop na espesyalista, tulad ng doktor sa tainga, ilong, at lalamunan (ENT specialist), neurologist o espesyalista sa utak at mga nerbiyos, optometrist o espesyalista sa pagsusuri ng paningin, physical therapist, o espesyalista sa pananakit ng ulo.	**Uno a mga kwasa ka pagkukulog sa payo?** A kulog na namamatian pag nagkukulog a payo ay nagpupuon sa pinag iba ibang mga senyales sa pagitan ka utok, mga labusan ka rugo, maski mga araning nerves. A pirang particular na nerves sa mga labusan ka rugo ag kalamnan sa payo nagiging aktibo at nagpapaatod sa mga senyales ka pangungulog paiyan sa utok. Kinding diri pa malinaw kin pauno nagpupuon na maging aktibo a mga senyales kadi **Pauno binubulong a pangungulog sa payo?** Pwedeng mag rekomenda a doctor sa iba ibang klase ka pagbulong depende sa dahilan ag kalubhaan ka pangungulog sa payo. Pwede man iyang magsabi sa mga mga karagdagang pagbayad o mag refer sa mga espesyalista, arog ka doktor sa talinga, urong, ag tutulnan (ENT Specialist), neurologist o espesyalista sa utok ag mga nerves, optometrist o espesyalista sa pagbabayad ka panilong, physical therapist o espesyalista sa pangungulog ka payo.

MEASLES

English	Tagalog	Bikol-Iriga
What is Measles? Measles is a highly contagious disease caused by a virus. It spreads easily when an infected person breathes, coughs or sneezes. It can cause severe disease, complications, and even death.	**Ano ang Tigdas (Measles)?** Ang tigdas ay isang nakahahawang sakit na dulot ng virus. Madali itong kumalat kapag ang isang taong may impeksiyon ay humihinga, umuubo, o bumabahing. Maaari itong magdulot ng malubhang	**Uno a Tigdas?** A tigdas usad na nakakaumaliw na ilang na dulot ka virus. Madali ading magkalat pag a usad na tawong agko impeksyon ay nag iinga, nag uubo, o nag aatsing. Pwede ading mag dulot sa malalang

Signs and Symptoms · Fever · Running Nose · Cough · Red and watery eyes · Small white spots inside the cheeks **Treatment** There is no specific treatment for measles. Caregiving should focus on relieving symptoms, making the person comfortable and preventing complications. Drinking enough water and treatments for dehydration can replace fluids lost to diarrhoea or vomiting. Eating a healthy diet is also important. **Prevention** Community-wide vaccination is the most effective way to prevent measles. All children should be vaccinated against measles. The vaccine is safe, effective and inexpensive. Children should receive two doses of the vaccine to ensure they are immune. The first dose is usually given at 9 months of age in countries where measles is common and 12–15 months in other countries. A second dose should be given later in childhood, usually at 15–18 months.	sakit, mga komplikasyon, at maging kamatayan. **Mga Palatandaan at Sintomas** • Lagnat • Sipon • Ubo • Namumula at nagluluhang mga mata • Maliliit na puting batik sa loob ng mga pisngi **Paggamot** Walang partikular na gamot para sa tigdas. Ang pangangalaga ay nakatuon sa pagpapagaan ng mga sintomas, pagbibigay ng ginhawa sa pasyente, at pag-iwas sa mga komplikasyon. Ang pag-inom ng sapat na tubig at paggamot sa dehydration ay nakatutulong upang mapalitan ang mga likidong nawala dahil sa pagtatae o pagsusuka. Mahalaga rin ang pagkain ng masustansiyang pagkain. **Pag-iwas** Ang pagbabakuna sa buong komunidad ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang tigdas. Dapat mabakunahan laban sa tigdas ang lahat ng bata. Ligtas, mabisa, at mura ang bakuna. Dapat makatanggap ang mga bata ng dalawang dosis ng bakuna upang matiyak na mayroon silang panlaban sa sakit. Karaniwang ibinibigay ang unang dosis sa edad na 9 na buwan sa mga bansang laganap ang tigdas at sa edad na 12–15 buwan sa ibang mga bansa. Ang ikalawang dosis ay dapat ibigay sa susunod na yugto ng pagkabata, karaniwang sa edad na 15–18 buwan.	ilang, mga komplikasyon ag pwedeng maging kagranan Mga palatandaan ag mga sintomas · Kalintura · Sip-on · Ubo · Namumula ag nagluluwang mata · Sasaday na putting batik batik sa loog ka pisngi **Pagbulong** Uda particular na bulong para ka tigdas. A pag aataman nakapokus sa pagpaparay ka mga sintomas, pagtatao sa Karayan sa pasyente ag pag iwas sa mga komplikasyon. A pag inom sa sapat na tubig ag pag bulong sa pagkapaha nakakatabang nganing mabalyuwan a mga likidong nauda dahil ka pag uudo udo o pagsusuka. Mahalaga man a pagkaon sa mga masususstansyang pagkaon **Pag likay** A pagpapa bakuna sa bilog na komunidad a pinaka maray na paraan nganing malikayan a tigdas. Dapat mapa bakunahan laban sa tigdas a ngamin na igin. Ligtas, mabisa ag barato a bakuna. Dapat makatanggap a mga igin sa darwang dose sa bakuna nganing matiyak na agko sira panlaban sa ilang. Kadalasan na tinatao a unang dose sa edad na 9 na bulan sa mga bansang laganap a tigdas ag sa edad na 12-15 na bulan sa ibang bansa. A ikarwang dose dapat naitatao sa susunod na yugto ka pagka igin, karaniwan sa edad na 15-18 na bulan

STRESS

English	Tagalog	Bikol-Iriga
What is Stress? Stress can be defined as a state of worry or mental tension	**Ano ang Stress?** Ang stress ay maaaring ilarawan bilang estado ng pag-	**Uno a Stress?** A stress pwedeng ilarawan bilang istado sa pag aalala o

caused by a difficult situation. Stress is a natural human response that prompts us to address challenges and threats in our lives. Everyone experiences stress to some degree. The way we respond to stress, however, makes a big difference to our overall well-being.

What are the signs of stress?
Stress makes it hard for us to relax and can come with a range of emotions, including anxiety and irritability. When stressed, we may find it difficult to concentrate. We may experience headaches or other body pains, an upset stomach or trouble sleeping. We may find we lose our appetite or eat more than usual. Chronic stress can worsen pre-existing health problems and may increase our use of alcohol, tobacco and other substances.

How can I manage stress?

- Be consistent. Go to bed at the same time each night and get up at the same time each morning, including on the weekends.
- If possible, make your sleeping area quiet, dark, relaxing and at a comfortable temperature.
- Limit your use of electronic devices, such as TVs, computers and smart phones, before sleeping.
- Avoid large meals, caffeine and alcohol before bedtime.
- Get some exercise. Being physically active during the day can help you fall asleep more easily at night.

aalala o tensiyon sa isip na dulot ng mahirap na sitwasyon. Ang stress ay natural na tugon ng tao na nagtutulak sa atin na harapin ang mga hamon at banta sa ating buhay. Lahat ay nakararanas ng stress sa iba't ibang antas. Gayunpaman, malaki ang epekto ng paraan ng pagtugon natin sa stress sa ating pangkalahatang kalusugan at kapakanan.

Ano ang mga Palatandaan ng Stress?
Pinahihirapan tayo ng stress na magrelaks at maaari itong magdulot ng iba't ibang emosyon, kabilang ang pagkabalisa at pagiging iritable. Kapag stressed, maaaring mahirapan tayong magpokus. Maaari tayong makaranas ng pananakit ng ulo o iba pang bahagi ng katawan, pananakit ng tiyan, o hirap sa pagtulog. Maaari ring mawalan tayo ng gana sa pagkain o kumain nang higit sa karaniwan. Ang matagal na stress ay maaaring magpalala ng dati nang mga problema sa kalusugan at magpataas ng paggamit ng alak, tabako, at iba pang mga substansiya.

Paano Ko Mapamamahalaan ang Stress?

- Maging regular. Matulog sa parehong oras bawat gabi at gumising sa parehong oras bawat umaga, kabilang ang mga araw ng katapusan ng linggo.
- Kung maaari, panatilihing tahimik, madilim, nakakarelaks, at may komportableng temperatura ang lugar na tinutulugan.
- Limitahan ang paggamit ng mga elektronikong kagamitan, tulad ng telebisyon, computer, at smartphone, bago matulog.
- Iwasan ang pagkain ng maraming pagkain, pag-inom ng caffeine, at

tension sa isip na gibo ka masakit na sitwasyon. A stress natural na sa usad na tao na nagtutulak kanato na atubangon a mga pagsubok sa buway tah. Ngamin nakakaranas sa stress sa iba ibang antas. Pero dakulo a epekto ka paraan ka pagtugon ta sa stress sa kanatong pang ngaminan na kalusugan ag kapakanan

Uno a mga palatandaan ka Stress?
Pinapasakitan kita ka stress na mag relaks ag pwede ading magdara sa iba ibang emosyon, kaiba na sadi a pagkamundo ag pagiging iritable. Pag stress kita, nasasakitan kitang mag pokus. Pwede man kitang makaranas sa pangungulog ka payo o iba pang parte ka kanatong awak, pagkulog ka buros, o sakit sa pag turog. Pwede man na maudaan kita sa ganang magkaon o magkaon sa dakol kumpara sa dati. A Mauban na stress pwedeng magpalala sa mga naka agi nang mga problema sa kalusugan tah ag magpataas sap ag gamit sa alak, tabako ag iba pang mga substansya

Pauno ko maaataman a Stress?

- Dapat maging regular, maturog sa paryas na oras kada gab-e ag mag gisong sa paryas na oras kada ramrag, kaiba na sadi a mga aldow ka katapusan ka usad na semana
- Kin kaya, dapat bukong maribok, madiklom, nakaka relaks ag agko komportableng temperature sana a lugar na pinag tuturugan
- Pagtaga bawasan a pag gamit sa mga elektroniks na mga gamit, arog ka TV, Computer ag mga selpon bago maturog
- Pagtaga likayan a pagkaon sa dakol, pag inom sa mga

	pag-inom ng alak bago matulog. • Mag-ehersisyo. Ang pagiging aktibo sa pisikal sa araw ay makatutulong upang mas madali kang makatulog sa gabi.	substansyang agko caffeine, ag a pag inom sa alak bago maturog • Mag eherisisyo. A pagiging aktibo sa pisikal na aldow nakakatabang nganing mas madaling makaturog pag gab-e

FOODBORNE ILLNESS

English	Tagalog	Bikol-Iriga
Foodborne Illness A foodborne disease is an illness caused by eating or drinking contaminated food or water containing harmful microorganisms, such as bacteria, viruses, parasites, or toxins. **Symptoms:** · Diarrhea · Nausea and vomiting · Abdominal pain · Fever · Headache · Weakness · Dehydration **Prevention:** · Wash your hands before preparing and eating food. · Wash fruits and vegetables thoroughly. · Cook meat, fish, and other foods properly. · Avoid eating raw or undercooked foods. · Use clean water for cooking and drinking. · Separate raw foods from cooked foods to prevent contamination. · Store food properly in the refrigerator to prevent bacterial growth. · Keep food preparation areas and utensils clean. · Avoid eating spoiled or expired food.	**Sakit na dulot ng kontaminadong pagkain** Ang foodborne disease ay sakit na dulot ng pagkain o pag-inom ng kontaminadong pagkain o tubig na may mapaminsalang mikroorganismo, tulad ng bakterya, virus, parasito, o lason. **Mga Sintomas:** · Pagtatae · Pagduduwal at pagsusuka · Pananakit ng tiyan · Lagnat · Pananakit ng ulo · Panghihina · Dehydration o kakulangan sa likido ng katawan **Mga Paraan ng Pag-iwas**: · Maghugas ng kamay bago maghanda at kumain. · Hugasan nang mabuti ang mga prutas at gulay. · Lutuin nang maayos ang karne, isda, at iba pang pagkain. · Iwasan ang pagkain ng hilaw o kulang sa lutong pagkain. · Gumamit ng malinis na tubig sa pagluluto at pag-inom. · Ihiwalay ang hilaw na pagkain sa lutong pagkain upang maiwasan ang kontaminasyon. · Itago nang maayos ang pagkain sa refrigerator upang maiwasan ang pagdami ng bakterya.	**Ilang na galin sa kontaminadong pagkaon** A foodborne disease ilang na dulot sa pagkaon o pag tumar sa kontaminadong pagkaon o tubig na agko mapangraot na mikroorganismo, arog ka bakterya, virus, parasite o lason **Mga sintomas** · Pag uudo-udo · Pagsusuka · Pangungulog ka buros · Kalintura · Pangungulog ka payo · Pangluluya · Pamamaha o kulang sa tubig sa awak **Mga paagi sa paglikay** · Mag ugas sa kamot bago mag preparer ag magkaon · Ugasan sa maray a mga prutas ag gulay · Lutuon sa pakaray a karne, isura, ag iba pang mga pagkaon · Pagtaga iwasan a pagkaon sa ilow o kulang sa lutong mga pagkaon · Mag gamit sa malinig na tubig sa pagluluto ag pag inom · Isuway a ilow na pagkaon sa mga lutong pagkaon nganing malikayan a kontaminasyon · Itago sa pakaray a pagkaon sa refrigerator nganing malikayan a pagdakol ka bakterya · Panataliwong malinig a mga gamit ag lugar na pinag prepreparan ka

	· Panatilihing malinis ang mga kagamitan at lugar na pinaghahandaan ng pagkain. · Iwasang kumain ng panis o expired na pagkain.	pagkaon · Pagtaga iwasan magkaon sa pan-os o expired na pagkaon

OVARIAN CANCER

English	Tagalog	Bikol-Iriga
Ovarian cancer is a type of cancer that begins in the ovaries, the female reproductive organs responsible for producing eggs and hormones such as estrogen and progesterone. **Symptoms** · Abdominal Bloating or swelling · Pelvic or abdominal pain · Madalas na pag-ihi o biglaang pagnanais na umihi · Frequent urination or an urgent need to urinate · Changes in bowel habits · Unexplained weight loss · Fatigue · Back pain **Prevention** · Maintain a healthy lifestyle and balanced diet. · Exercise regularly and maintain a healthy weight. · Discuss family history of ovarian or breast cancer with a healthcare professional. · Consider genetic counseling and testing if there is a strong family history of ovarian or breast cancer. · Discuss risk-reducing options with a healthcare professional if at high risk.	Ang ovarian cancer ay isang uri ng kanser na nagsisimula sa mga obaryo, ang mga bahagi ng sistemang reproduktibo ng babae na responsable sa paggawa ng mga itlog at mga hormone tulad ng estrogen at progesterone. **Mga sintomas** · Paglobo o pamamaga ng tiyan · Pananakit ng balakang o tiyan · Hirap kumain o mabilis mabusog · Madalas na pag-ihi o biglaang pagnanais na umihi · Pagbabago sa pagdumi · Hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang · Pagkapagod · Pananakit ng likod **Pag iwas** · Panatilihin ang malusog na pamumuhay at balanseng pagkain. · Regular na mag-ehersisyo at panatilihin ang tamang timbang. · Talakayin sa propesyonal sa kalusugan ang kasaysayan ng kanser sa obaryo o suso sa pamilya. · Isaalang-alang ang genetic counseling at genetic testing kung may matibay na kasaysayan ng kanser sa obaryo o suso sa pamilya. · Talakayin sa propesyonal sa kalusugan ang mga opsyon upang	A Ovarian Cancer usad na uri sa kanser na nagpupuon sa mga obaryo, a mga parte ka sistemang reproduktibo ka mga babayi na responsible ka pag gibo ka mga itlog ag mga hormone arog ka estrogen ag progesterone **Mga kwasa** · Paglobo o pag ubag ka buros · Pangungulog ka puputulan o buros · Sinasakitan magkaon o matandos mabusog · Madalas na pagtabid o biglang gustong magtabid · Pagbabago sa pag udo · Diri maipaliwanag na pag ababa ka timbang · Pagka pagal · Pangungulog ka likod **Pag likay** · Panatiliwon a malusog na pagbuhay buhay ag balanseng pagkaon · Regular na mag ehersisyo ag panatiliwon a tamang timbang · Talakayun sa propesyonal sa kalusugan a kasaysayan ka kanser sa obaryo o suso sa pamilya · Isaalang alang a genetic counseling ag genetic testing kin agko matibay na kasaysayan ka kanser sa obaryo o suso sa pamilya · Talakayun sa propesyonal sa kalusugan a mga opsyon nganing

	mabawasan ang panganib kung mataas ang posibilidad na magkaroon nito.	mabawasan a panganib kin mataaas a posibilidad na magka agko kadi

COLD (SIPON)

English	Tagalog	Bikol-Iriga
The common cold is an infection of the upper respiratory tract, usually caused by a virus, that affects the nose and throat. **Symptoms** · Sneezing · Stuffy or runny nose · Sore throat · Cough · Mild headache · Fatigue · Sometimes fever **Prevention** · Wash hands regularly with soap and water. · Avoid touching the eyes, nose, and mouth with unclean hands · Cover the mouth and nose when coughing or sneezing. · Avoid close contact with people who have a cold. · Eat nutritious food and get enough sleep. · Keep the surroundings clean and well-ventilated.	Ang karaniwang sipon ay impeksiyon sa itaas na bahagi ng sistema ng paghinga na karaniwang dulot ng virus at nakaaapekto sa ilong at lalamunan. **Mga sintomas** · Pagbahing · Barado o tumutulong ilong · Pananakit ng lalamunan · Pag-ubo · Banayad na sakit ng ulo · Pagkapagod · Minsan ay lagnat **Pag iwas** · Regular na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. · Iwasang hawakan ang mga mata, ilong, at bibig gamit ang maruming kamay. · Takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing. · Iwasan ang malapitang pakikisalamuha sa mga taong may sipon. · Kumain ng masustansiyang pagkain at matulog nang sapat. · Panatilihing malinis at maaliwalas ang kapaligiran.	A karaniwang sip-on impeksyon sa itaas na parte ka Sistema ka pag inga na kadalasang dahil sa virus ag nakaka apekto sa urong ag tutulnan **Mga sintomas** · Pag atsing · Baradong urong o nagtuturong sip-on · Pagkulog ka tutulnan · Pag ubo · Banayad na kulog sa payo · Pagka pagal · Minsan kalintura **Pag likay** · Regular na mag ugas sa kamot gamit a sabon ag tubig · Pagtaga iwasang kaptan a mga mata, urong, ag Nganga gamit a maating kamot · Tawban a Nganga ag urong kapag inuubo o nag aatsing · Pagtaga iwasan a aranihang pakiki iba sa mga tawong agko sip-on · Magkaon sa masustansyang pagkaon ag maturog sa sapat · Panatiliwong malinig ag maaliwalas a kapaligiran.

DIARRHEA

English	Tagalog	Bikol-Iriga
Ang diarrhea o pagtatae ay ang madalas na paglabas ng malambot o matubig na dumi, karaniwang tatlong beses o higit pa sa loob ng isang araw. Madalas itong dulot ng impeksyon, kontaminadong pagkain o tubig, at maruming	Ang diarrhea o pagtatae ay ang madalas na paglabas ng malambot o matubig na dumi, karaniwang tatlong beses o higit pa sa loob ng isang araw. Madalas itong dulot ng impeksyon, kontaminadong pagkain o tubig, at maruming	A diarrhea o pag uudo-udo amo a madalas na pag luwas ka malambot ag matubig na udo, na kadalasang tulong beses o sobra pa sa loog sa usad na aldow. Madalas ading dahil sa impeksyon, kontaminadong pagkaon o tubig, ag maating

kapaligiran. **Signs and Symptoms** · Madalas na pagdumi. · Malambot o matubig na dumi. · Pananakit o paghilab ng tiyan. · Pagduduwal at pagsusuka. · Lagnat. · Pagkahilo at panghihina. · Pagkatuyo ng bibig at matinding pagkauhaw (senyales ng dehydration). **Prevention** · Palaging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. · Uminom ng malinis at ligtas na tubig. · Lutuing mabuti ang pagkain. · Hugasan ang mga prutas at gulay bago kainin. · Iwasan ang panis o kontaminadong pagkain. · Panatilihing malinis ang katawan at kapaligiran.	kapaligiran. **Mga senyales at sintomas** · Madalas na pagdumi. · Malambot o matubig na dumi. · Pananakit o paghilab ng tiyan. · Pagduduwal at pagsusuka. · Lagnat. · Pagkahilo at panghihina. · Panunuyo ng bibig at matinding pagkauhaw **Pag iwas** · Palaging maghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. · Uminom ng malinis at ligtas na tubig. · Lutuing mabuti ang mga pagkain. · Hugasan ang mga prutas at gulay bago kainin. · Iwasan ang pagkain ng panis o kontaminadong pagkain. · Panatilihing malinis ang katawan at kapaligiran.	kapalibutan **Mga senyales ag sintomas** · Madalas na pag uudo-udo · Malambot ag matubig na udo · Pangungulog ka buros · Pagduwal ag pagsusuka · Kalintura · Pagkalibong ag pangluluya · Pagkamara ka Nganga ag matinding pagkapaha **Pag likay** · Pirming mag ugas sa kamot gamit a sabon ag malinig na tubig · Mag inom sa malinig ag ligtas na tubig · Lutuon sa maray a mga pagkaon · Ugasan a mga prutas ag gulay bago kaunon · Iwasan a pagkaon sa panis o kontaminadong pagkaon · Dapat pirming malinig a awak ag kapalibutan

ALLERGIC RHINITIS

English	Tagalog	Bikoll-Iriga
Allergic rhinitis is an allergic reaction that occurs when the immune system reacts to allergens such as dust, pollen, mold, or pet dander. It causes inflammation of the nose and can lead to cold-like symptoms. **Signs and Symptoms** · Frequent sneezing. · Runny or stuffy nose. · Itchy nose, throat, or eyes. · Watery eyes. · Postnasal drip (mucus dripping down the throat). · Nasal congestion. **Prevention** · Avoid exposure to dust, pollen, and other allergens.	Ang allergic rhinitis ay isang uri ng allergy na nangyayari kapag ang katawan ay tumutugon sa mga bagay tulad ng alikabok, amag, o balahibo ng hayop. Nagdudulot ito ng pamamaga sa loob ng ilong at mga sintomas na katulad ng sipon. **Mga senyales at sintomas** · Madalas na pagbahing. · Sipon o baradong ilong. · Pangangati ng ilong, lalamunan, o mata. · Pagluluha ng mga mata. · Pagdaloy ng sipon papunta sa lalamunan. · Hirap sa paghinga	A allergic rhinitis usad na klase sa allergy na nangyayari kin a awak nag tutugon sa mga bagay arog ka talbo, amag, bagaybu sa ayop. Nagdadara di ka pamamaga sa loog ka urong ag mga sintomas na arog ka sip-on **Mga senyales ag sintomas** · Madalas na pag atsing · Sip-on ag baradong urong · Pag gatol ka urong, tutulnan ag mata · Pagluluwa ka nga mata · Pagdaloy ka sip-on paiyan sa tutulnan · Sakit sa pag inga sa urong dahil ka pagbabara **Pag likay** · Pagtaga iwasan a talbo

· Keep the house clean and dust-free. · Wash bed sheets and pillowcases regularly. · Avoid cigarette smoke and strong fragrances. · Wear a mask when cleaning or exposed to dust. · Keep windows closed when pollen or dust levels are high.	sa ilong dahil sa pagbabara. **Pag iwas** · Iwasan ang alikabok at iba pang sanhi ng allergy. · Panatilihing malinis ang bahay. · Regular na labhan ang mga kumot at punda. · Iwasan ang usok ng sigarilyo at matatapang na pabango. · Magsuot ng mask kapag naglilinis o nalalantad sa alikabok. · Isara ang mga bintana kapag maraming alikabok o pollen sa labas.	ag iba pang sanhi ka allergy · Panatiliwong malinig a baloy · Regular na labhan a mga isapoy ag punda · Iwasan a mga aso sa sigarilyo ag matatapang na paamot · Magsupong sa mask kapag nagliling o nalalantad sa mga talbo · Isarado a mga bintana pag dakol a talbo o pollen sa luwas

NAUSEA AND VOMITING

English	Tagalog	Bikol-Iriga
Nausea is the uncomfortable feeling of wanting to vomit, while vomiting is the forceful release of stomach contents through the mouth. These may be caused by infections, food poisoning, motion sickness, or certain medications. **Signs and Symptoms** · Feeling of wanting to vomit. · Actual vomiting. · Stomach discomfort or pain. · Dizziness. · Excessive sweating. · Loss of appetite. · Weakness and dehydration. **Prevention** · Eat clean and properly prepared food. · Avoid spoiled or contaminated food. · Drink clean and safe water. · Eat small and frequent	Ang pagduduwal ay ang hindi komportableng pakiramdam na parang masusuka, samantalang ang pagsusuka ay ang sapilitang paglabas ng laman ng tiyan sa pamamagitan ng bibig. Maaari itong dulot ng impeksyon, food poisoning, pagkahilo sa biyahe, o ilang uri ng gamot. **Mga senyales at sintomas** · Pakiramdam na gustong sumuka. · Aktuwal na pagsusuka. · Pananakit o hindi komportableng pakiramdam sa tiyan. · Pagkahilo. · Labis na pagpapawis. · Kawalan ng ganang kumain. · Panghihina at dehydration (kakulangan sa tubig sa katawan). **Pag iwas** · Kumain ng malinis at	A pagduwal amo a diri komportableng pagmati na parang nasusuka, samantala a pagsuka amo a sapiritang pagluwas ka laman ka buros sa paagi ka nganga. Pwede ding magdulot sa impeksyon, lason sa pagkaon, pagkalibong sa byahe, o ibang uri sa bulong. **Mga senyales ag sintomas** · Pagmati na parang gustong magsuka · Aktwan na nagsusuka · Pangungulog o diri komportableng pagmati sa buros · Pagkalibong · Matinding pagbabag-ot · Uda ganang magkaon · Pangluluya ag dehydration (kulang sa tubig a awak) **Pag likay** · Magkaon sa malinig ag lutong maray na pagkaon · Iwasan a pan-os o

meals. · Avoid overeating and greasy foods. · Wash hands before eating and preparing food. · Get enough rest. · Avoid strong smells that may trigger nausea.	lutong mabuti na pagkain. · Iwasan ang panis o kontaminadong pagkain. · Uminom ng malinis at ligtas na tubig. · Kumain nang kaunti ngunit madalas. · Iwasan ang sobrang pagkain at mamantikang pagkain. · Maghugas ng kamay bago kumain at maghanda ng pagkain. · Magkaroon ng sapat na pahinga. · Iwasan ang matatapang na amoy na maaaring magdulot ng pagduduwal.	kontaminadong pagkaon · Mag inom sa malinig ag ligtas na tubig · Magkaon sa gatikot pero madalas · Pagtaga iwasan a sobrang pagkaon sa malanang pagkaon · Mag ugas sa kamot bago mag kaon ag maghanda sa pagkaono · Magka agko sapat na paingalo · Iwasan a matatapang na parong na pwedeng magdulot sa pagduduwal

RASHES

English	Tagalog	Bikol-Iriga
A skin rash is a change in the appearance of the skin that may cause redness, itching, or irritation. It can be caused by allergies, infections, insect bites, or skin irritation. **Signs and Symptoms** · Redness or discoloration of the skin. · Itching or irritation. · Small bumps or blisters. · Swelling of the affected area. · Dry or peeling skin. **Prevention** · Keep the skin clean and dry. · Avoid products that cause allergies or irritation. · Use mild soap and skin-friendly products. · Avoid scratching the affected area. · Wear clean and comfortable clothes. · Avoid sharing personal items such as towels	Ang pantal sa balat ay pagbabago sa itsura ng balat na maaaring magdulot ng pamumula, pangangati, o iritasyon. Maaari itong sanhi ng allergy, impeksyon, kagat ng insekto, o paggamit ng mga produktong nakaiirita sa balat. **Mga senyales at sintomas** · Pamumula ng balat. · Pangangati o iritasyon. · Maliliit na butlig. · Pamamaga ng apektadong bahagi. · Pagkatuyo o pagbabalat ng balat. **Pag iwas** · Panatilihing malinis at tuyo ang balat. · Iwasan ang mga produktong nagdudulot ng allergy o iritasyon. · Gumamit ng banayad na sabon at produktong angkop sa balat. · Iwasang kamutin ang apektadong bahagi. · Magsuot ng malinis at	A pantal sa balat ay amo a pagbabago sa itsura ka balat na pwedeng magdulot sa pamumula, panggagatol, o iritasyon. Maari ading sanhi sa allergy, impeksyon, kagat sa insekto, o pag gamit sa produktong nakakairita sa balat **Mga senyales ag sintomas** · Pamumula ka balat · Paggatol o iritasyon · Saday na mga butlig · Pagbaga ka mga apektadong bagahi · Pagkamara ag pagbabakbak ka balat **Pag likay** · Panatiliwong malinig ag mara a balat · Iwasan a mga produktong nagdudulot sa allergy ag iritasyon · Mag gamit sa banayad sanang sabon ag mga produktong angkop sa balat · Iwasan na kaguwon a apektadong bahagi

and clothing.	komportableng damit. · Iwasang maghiraman ng tuwalya at damit.	· Magsupong sa malinig ag komportableng bado · Iwasan mag uraman sa tuwalya ag bado

UTI (Urinary Tract Infection)

English	Tagalog	Bikol-Iriga
A UTI is an infection in any part of the urinary system, including the kidneys, bladder, and urethra. It is commonly caused by bacteria entering the urinary tract. **Signs and Symptoms** · Pain or burning sensation when urinating. · Frequent urge to urinate. · Passing only small amounts of urine. · Cloudy or foul-smelling urine. · Lower abdominal pain. · Sometimes fever and back pain, especially if the infection reaches the kidneys. **Prevention** · Drink plenty of clean water. · Do not hold urine for too long. · Maintain proper genital hygiene. · Wipe from front to back after using the toilet. · Urinate after sexual intercourse. · Avoid using irritating feminine hygiene products.	Ang UTI ay impeksyon sa anumang bahagi ng sistema ng pag-ihi, kabilang ang mga bato, pantog, at daanan ng ihi. Karaniwan itong dulot ng bacteria na pumapasok sa daluyan ng ihi. **Mga senyales at sintomas** · Pananakit o hapdi kapag umiihi. · Madalas na pagnanais na umihi. · Kaunting ihi lamang ang lumalabas. · Malabo o mabahong ihi. · Pananakit ng ibabang bahagi ng tiyan. · Lagnat at pananakit ng likod, lalo na kung kumalat ang impeksyon sa bato. **Pag iwas** · Uminom ng maraming malinis na tubig. · Huwag pigilan ang pag-ihi nang matagal. · Panatilihing malinis ang ari. · Punasan mula harap papunta sa likod pagkatapos gumamit ng palikuran. · Umihi pagkatapos makipagtalik. · Iwasan ang mga produktong maaaring makairita sa ari.	A UTI a impeksyon sa dawa unong parte ka Sistema ka pag tabid, kaiba a mga bato, pantog, ag labusan sa tabid. Kadalasan ading dahil sa bacteria na nagloloog sa labusan ka tabid **Mga senyales ag sintomas** · Pagkulog o apri pag tinatabid · Madalas na bana gustong magtabid · Gatikot na tabid sana a nagluluwas · Malabo o mabatang tabid · Pagkulog ka ibabang bahagi ka buros · Kalintura ag pagkulog ka taludtod, lalo na kin nagkalat a impeksyon sa bato **Pag likay** · Mag inom sa dakol ag malinig na tubig · Diri pag pugulan a pagtabid sa Mauban · Panatiliwong malinig a ari · Punasan puon sa atubangan paiyan sa talikundan pagkatapos mag gamit sa kasilyasan · Magtabid pagkatapos makipagtalik · Iwasan a mga produktong pwedeng makairita ka ari

Obesity

English	Tagalog	Bikol-Iriga
Obesity is a condition where a person has too much body fat, which may affect their health. It is commonly caused by unhealthy eating habits, lack of physical activity, and other factors such as genetics. **Signs and Symptoms:**	Ang obesity ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay may sobrang taba sa katawan na maaaring makaapekto sa kalusugan. Karaniwan itong dulot ng hindi tamang pagkain, kakulangan sa pisikal na aktibidad, at iba pang salik tulad ng namamanang katangian.	A obesity amo usad na kondisyon kin sari a usad na tawo agko sobrang taba sa awak na pwedeng maka apekto sa kalusugan ta. Karaniwan ading dahil sa buko tamang pagkaon, kulang sa pisikal na aktibidades, ag iba pang salik arog ka namamanang bagay

· Excessive body weight. · Increased body fat, especially around the waist. · Easily gets tired. · Shortness of breath during physical activities. · Difficulty moving or performing daily activities. · Joint and back pain. **Prevention:** Maintain a healthy weight by eating nutritious and balanced meals, exercising regularly, drinking enough water, avoiding excessive consumption of sugary and fatty foods, and getting enough sleep.	**Mga Senyales at Sintomas:** · Sobrang timbang. · Pagdami ng taba sa katawan, lalo na sa baywang. · Madaling mapagod. · Hingal kahit sa simpleng pisikal na gawain. · Hirap sa paggalaw o paggawa ng pang-araw-araw na gawain. · Pananakit ng kasukasuan at likod. **Pag-iwas:** Panatilihin ang tamang timbang sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya at balanseng pagkain, regular na pag-eehersisyo, pag-inom ng sapat na tubig, pag-iwas sa sobrang matatamis at mamantikang pagkain, at pagkakaroon ng sapat na tulog.	bagay. **Mga senyales ag sintomas:** · Sobra a timbang · Pagdakol ka taba sa awak, lalo na sa bewang · Madaling mapagal · Nag iingal ingal dawa sa simple sanang pisikal na gigibon · sinasakitan sa pag iwag o pag gibo sa pang uru aldow na gigibon · pagkulog ka kasukasuan ag taludtod **Pag likay** Panatiliwon a tamang timbang sa paagi ka pagkaon sa masustansya ag balanseng pagkaon, regular na pag eehersisyo, pag inom sa sapat na tubig, pag iwas sa matatam-is ag malalanang pagkaon, ag pagkaka agko sa sapat na turog.