种子生产学小测验（2025-12-15）

一、选择题（4选2）

1、以下农作物播种用材料表述正确的是：（1，4）

（1）玉米的果实，（2）马铃薯的块根，（3）棉花的果实，（4）大豆的种子

2、以下对品种的经济类别特性表述正确的是：（1，3）

（1）品种具有地区适应性和时效性，（2）品种必须具有优良的种粒，（3）品种具有可生产性，（4）进入区域试验的才能成为品种

3、植物新品种是指经过人工培育的或者发现的野生植物加以开发，并有适当名称的植物品种，它具有以下表述正确的特性是：（1，3）

（1）新颖性，（2）丰产性，（3）一致性，（4）广适性

4、以下作物可称主要农作物的是：（2，4）

（1）马铃薯，（2）水稻，（3）油菜，（4）大豆

5、以下引起品种混杂退化的原因表述正确的是：（1，3）

（1）自然选择，（2）人工选择，（3）不正确选择，（4）未进行选择，

6、两大种子生产体系是指：（1，3）

（1）纯系品种的种子生产，（2）无性系品种的种子生产，（3）杂交种品种的种子生产，（4）群体品种的种子生产

7、种子生产两条不同的技术路线是：（1，4）

（1）循环选择生产，（2）自交混繁生产，（3）混合选择生产，（4）保纯繁殖生产

8、种子生产与大田生产有以下哪些明显的不同点：（2，3）

（1）需要更多的投入，（2）需要严格隔离，（3）需要采取选择手段，（4）需要高水平的栽培管理

9、无性系品种适合的种子生产方式有：（3，4）

（1）改良混合选择法，（2）自交混繁法，（3）控制授粉株系循环法，（4）茎尖脱毒繁殖

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10、无性繁殖作物的种物生产具有以下哪些优点：（3,4）

（1）不需用种子播种，（2）繁殖的产量高，（3）能较好地保持亲本基因型不变和品种群体的同质性，（4）没有生物学混杂干扰，机械混杂的可能性也较小。

11、无性繁殖作物的种物生产具有以下哪些缺陷：（1,3）

（1）长期的无性繁殖容易产生芽变，（2）受环境影响较大，（3）种物体积较大，不易贮藏，为其营销带来难度，（4）保纯困难。

12、玉米自交系的原种生产主要采用：（3,4）

（1）改良混合选择法，（2）株系循环法，（3）自交混繁法，（4）株穗行半分法

13、杂交水稻的三系亲本原种生产常采用：（1,2）

（1）成对回交测交法，（2）控制授粉株系循环法，（3）改良混合选择法，（4）株系循环法

14、属于杂交制种的共性技术是：（1,2）

（1）严格选择隔离区，（2）严格去雄，（3）增施肥料，（4）人工辅助授粉

15、确保父母本花期相遇，需要做好以下哪几方面工作：（1,3）

（1）及早花期预测和采取调节措施，（2）选择开花期相近的亲本进行制种，（3）栽培上确保父母本正常生长发育，（4）确定适合的行比和栽插密度

16、杂交玉米制种出现父早母迟情况，可以通过以下哪些措施调节父母本花期：（1,2）

（1）母本超前带叶去雄，（2）剪短母本雌穗苞叶，（3）将母本花丝剪短，（4）对父本重施肥

17、杂交水稻制种当父母本花期不遇，对发育迟缓的亲本应采取以下哪些调节措施：（1,3）

（1）喷施磷酸二氢钾、硼肥，（2）发育后期根外叶面喷施尿素，（3）幼穗发育三期前重施尿素，（4）重割叶

18、光敏核不育系的原种繁殖方法有：（1,2）

（1）秋繁，（2）海南冬春繁殖，（3）高海拔繁殖，（4）冷灌繁殖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

19、温敏核不育系的原种繁殖方法有：（ 2,4 ）

（1）夏繁；（2）秋繁，（3）低海拔繁殖，（4）冷灌繁殖。

20、马铃薯茎尖脱毒正确的说法是：（ 1,4 ）

（1）离体茎尖愈大，愈易成活，但病毒愈难去除；（2）离体茎尖愈大，愈难成活，但脱毒率高，（3）茎尖愈小，愈易成活，但病毒愈难去除，（4）茎尖愈小，脱毒率高，成活率低。

二、判断题

1、农作物的播种用材料，包括自花授粉作物的种子、异花授粉作物的种子和常异花授粉作物的种子。（ X ）

2、优良品系只要取得生产资料的资格，就可以予以推广。（ X ）

3、植物新品种是指经过人工培育的或者发现的野生植物加以开发，具有新颖性、特异性、一致性和稳定性，并有适当名称的植物品种。（ √ ）

4、农作物品种区域试验结果是依法进行品种审定的依据。（ √ ）

5、品种审定的目的是为了防止盲目引进和任意推广不适宜本地区种植的品种或劣质品种，给农业生产和农民利益造成损失。（ √ ）

6、品种保护的目的是保护新品种的知识产权，防止育种者知识产权受到侵害，为农业、林业的快速发展提供有力的司法保障。（ √ ）

7、光敏核不育系在长日照条件下，表现不育，可以用作杂交制种。（ √ ）

8、温敏核不育系在较低温条件下，表现不育，可以用作杂交制种。（ X ）

9、基因频率是指在某一群体中，某个等位基因占该位点基因总数的比例。（ √ ）

10、品种群体中，只要基因型频率不发生变化，品种就保持遗传的稳定性。（ √ ）

11、两大种子生产体系是指纯系品种的种子生产和无性系品种的种子生产。（ X ）

12、种子生产两条不同的技术路线是保纯繁殖生产和循环选择生产。（ √ ）

13、自花授粉作物纯系品种的原种生产一般采用自交混繁法。（ X ）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

改良混合选择 株系循环法

14、无性系品种种子生产方式主要采用自交混繁法或控制授粉株系循环法。（X）

15、利用自交不亲和性实现杂种优势利用的原理主要是花期自交不亲和可以用来制种，蕾期授粉可以结实繁殖。（√）

16、玉米自交系的原种生产主要采用异花授粉作物纯系品种所采用的“自交混繁法”。（√）

17、水稻光温敏核不育系繁殖可采用“株系循环法”，但需在不育期对不育系的不育性进行鉴定，及可育期的育性恢复性鉴定。（√）

18、玉米制种花期相遇的标准是母本吐丝盛期和父本散粉初期相遇。（√）

19、玉米制种母本早于父本情况下，剪短母本花柱，有助于受粉结实。（√）

20、玉米制种母本晚于父本情况下，剪短母本雌穗苞叶，可提早吐丝，接受父本花粉。（√）

21、杂交水稻制种如遇父母本花期不遇，应对发育迟缓的亲本在幼穗发育三期前重施氮肥。（X）

22、杂交水稻制种如遇父母本花期不遇，应对发育迟缓的亲本早晨赶露水，提高田间小气候温度。（√）

23、在生产实践中，温敏核不育系比光敏核不育系应用更为安全。（X）

24、不育起点温度高的温敏核不育系，更容出现起点温度漂移现象。（√）

25、马铃薯在低纬度、低海拔地区不容易感染病毒病。双高（X）

26、马铃薯茎尖脱毒，离体茎尖愈大，愈易成活，但病毒愈难去除；茎尖愈小，脱毒率高，成活率低。（√）

27、生产上所称种子是由雌雄配子结合，经过受精过程所形成的种子。（X）

28、良种是经过审定的品种符合一定质量等级标准的种子。（√）

29、保纯繁殖生产的技术路线是每一轮种子生产总是从育种者种子开始，每繁殖一代，种子的级别降低一级。（√）

30、生殖力是亲本产生配子的能力。（√）

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

种子生产学小测验（2025-12-15）

一、选择题（4 选 2）

1、以下农作物播种用材料表述正确的是：（1，4）

（1）玉米的果实，（2）马铃薯的块根，（3）棉花的果实，（4）大豆的种子

2、以下对品种的经济类别特性表述正确的是：（1，3）

（1）品种具有地区适应性和时效性，（2）品种必须具有优良的种粒，（3）品种具有可生产性，（4）进入区域试验的才能成为品种

3、植物新品种是指经过人工培育的或者发现的野生植物加以开发，并有适当名称的植物品种，它具有以下表述正确的特性是：（1，3）

（1）新颖性，（2）丰产性，（3）一致性，（4）广适性

4、以下作物可称主要农作物的是：（2，4）

（1）马铃薯，（2）水稻，（3）油菜，（4）大豆

5、以下引起品种混杂退化的原因表述正确的是：（1，3）

（1）自然选择，（2）人工选择，（3）不正确选择，（4）未进行选择，

6、两大种子生产体系是指：（1，3）

（1）纯系品种的种子生产，（2）无性系品种的种子生产，（3）杂交种品种的种子生产，（4）群体品种的种子生产

7、种子生产两条不同的技术路线是：（1，4）

（1）循环选择生产，（2）自交混繁生产，（3）混合选择生产，（4）保纯繁殖生产

8、种子生产与大田生产有以下哪些明显的不同点：（2，3）

（1）需要更多的投入，（2）需要严格隔离，（3）需要采取选择手段，（4）需要高水平的栽培管理

9、无性系品种适合的种子生产方式有：（3，4）

（1）改良混合选择法，（2）自交混繁法，（3）控制授粉株系循环法，（4）茎尖脱毒繁殖

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App