



Manuel de mathématiques

Première spécialité

Nexus Réussite

Programme 2026 • Parcours de réussite

Un manuel structuré pour apprendre, s'entraîner, se tester et progresser avec une progression claire, des méthodes explicites et des ressources de remédiation.

Mathématiques | Spécialité | Première générale

Conçu pour l'enseignement de spécialité en classe de première

Avant-propos

Ce manuel de mathématiques de première spécialité a été pensé comme un outil cohérent, progressif et autonome. Il accompagne l'élève du repérage des notions à la maîtrise des compétences attendues, en articulant cours, méthodes, exercices, auto-évaluation et remédiation.

Chaque chapitre suit un parcours pédagogique en **9 temps** : une situation d'ouverture, un diagnostic, un cours structuré, des méthodes, des exercices gradués, une auto-évaluation et des ressources de remédiation. Cette progression vise à rendre l'apprentissage visible et à aider chaque élève à avancer à son rythme.

Trois parcours de difficulté permettent à chacun de travailler à son niveau :

- ▶ ♦ — exercices guidés, avec coups de pouce ;
- ▶ ♦♦ — exercices de niveau baccalauréat ;
- ▶ ♦♦♦ — exercices de recherche et d'approfondissement.

Le manuel intègre aussi des outils de suivi : QCM diagnostique, évaluations A et B, grilles de compétences, fiches de remédiation, et renvois explicites vers les méthodes et exercices utiles. Cette structure a pour ambition d'aider l'élève à identifier précisément ce qu'il sait faire et ce qu'il doit encore travailler.

L'objectif final est simple : proposer un manuel clair, robuste et lisible, capable de soutenir à la fois l'apprentissage en classe et la préparation à l'évaluation.

Mode d'emploi

Chaque chapitre du manuel suit un parcours en **9 temps**, conçu pour accompagner l'apprentissage de la découverte jusqu'à l'évaluation.

Astuce de lecture : commencez par l'ouverture, puis le cours, puis les méthodes, avant de passer aux exercices et à l'auto-évaluation.

Les 9 temps du chapitre

T1 — Situation d'ouverture Une situation concrète qui introduit la notion du chapitre. Elle motive la suite du travail et permet d'entrer dans la notion sans besoin de prérequis spécifiques.

T2 — QCM diagnostique Il évalue les prérequis nécessaires au chapitre. Le résultat oriente l'élève vers une remédiation ciblée si besoin.

T3 — Cours Le cours est structuré en trois niveaux :

- ▶ **L'essentiel** — définitions, propriétés et théorèmes à connaître ;
- ▶ **Démonstrations** — preuves au programme, présentées de façon détaillée ;
- ▶ **Approfondissement** * — compléments hors programme strict, pour aller plus loin.

T4 — Méthodes Chaque méthode suit un schéma fixe :

1. **Pas à pas** — démarche générale ;
2. **Exemple résolu** — application complète ;
3. **Pièges à éviter** — erreurs fréquentes à repérer.

T5 — Exercices Les exercices sont répartis en trois parcours :

- ▶ ♦ — parcours guidé ;
- ▶ ♦♦ — parcours de niveau baccalauréat ;
- ▶ ♦♦♦ — parcours de recherche et d'approfondissement.

T6 — Coups de pouce (CDP) Pour chaque exercice du premier parcours, un coup de pouce est proposé en fin de chapitre. Il donne une piste sans révéler la solution complète.

T7 — Auto-évaluation et remédiation Une grille de compétences permet de situer son niveau sur chaque capacité du chapitre. Les renvois vers les méthodes et exercices ciblés aident à réparer les difficultés repérées.

T8 — Évaluation Deux sujets d'évaluation (versions A et B) de difficulté comparable permettent un usage en classe ou en autonomie.

T9 — Fil rouge (TD) Un travail dirigé qui traverse plusieurs notions du chapitre dans un contexte appliqué. Il constitue une tâche complexe mobilisant l'ensemble des compétences.

Les symboles utilisés

Symbole	Signification
♦	Exercice guidé (parcours accompagné)
♦♦	Exercice de niveau baccalauréat
♦♦♦	Exercice de recherche / approfondissement
*	Contenu d'approfondissement (hors programme strict)
CDP	Coup de pouce disponible (voir T6)

Le système CDP (Coups de Pouce)

Les exercices du parcours ♦ portant la mention **CDP** disposent d'un coup de pouce regroupé en fin de chapitre. Le fonctionnement est le suivant :

1. Lire l'énoncé et tenter l'exercice sans aide.
2. En cas de blocage, consulter le coup de pouce correspondant.
3. Le coup de pouce fournit une piste, mais jamais la solution complète.
4. Reprendre l'exercice avec cette indication.

Ce dispositif favorise l'autonomie : l'élève apprend à identifier précisément sa difficulté avant de chercher de l'aide.

Table des matières

Avant-propos	2
Mode d'emploi	3
Plan du manuel	7
1 Suites numériques	8
1.1 Généralités sur les suites	11
1.2 Suites arithmétiques	12
1.3 Suites géométriques	14
2 Fonctions polynômes du second degré	120
2.1 Les trois formes du trinôme	123
2.2 Parabole et variations	125
2.3 Discriminant et équations	127
2.4 Factorisation et signe	128
2.5 Inéquations du second degré	129
2.6 Modélisation et optimisation	131
3 Dérivation : point de vue local	213
3.1 Taux de variation et sécantes	215
3.2 Du taux de variation au nombre dérivé	216
3.3 Lire et construire une tangente	217
3.4 Équation de la tangente	218
3.5 Approximation linéaire	219
4 Dérivation : applications aux variations	266
4.1 Dérivées des fonctions de référence	268
4.2 Règles de dérivation	270
4.3 Fonctions paires et fonctions impaires	271
4.4 Signe de la dérivée et sens de variation	272
4.5 Extremums d'une fonction	274
4.6 Optimisation par la dérivation	276
5 Fonction exponentielle	333
5.1 Définition de la fonction exponentielle	335
5.2 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle	336
5.3 Variations et limites de la fonction exponentielle	338
5.4 Dérivation de $e^{u(x)}$	340
5.5 Équations et inéquations avec l'exponentielle	341
6 Trigonométrie	395
6.1 Cercle trigonométrique et angles	397
6.2 Cosinus, sinus et valeurs	398
7 Produit scalaire	412
7.1 Produit scalaire de deux vecteurs	414
7.2 Propriétés du produit scalaire	415
7.3 Orthogonalité et calcul d'angles	416
7.4 Applications géométriques	417
7.5 Formule d'Al-Kashi	418

8	Géométrie repérée	448
8.1	Équation cartésienne d'une droite	451
8.2	Vecteur normal à une droite	452
8.3	Équation d'un cercle	454
8.4	Positions relatives de droites et de cercles	455
8.4.1	Positions relatives de deux droites	455
8.4.2	Distance d'un point à une droite	456
8.4.3	Positions relatives d'une droite et d'un cercle	456
8.5	Problèmes géométriques dans un repère orthonormé	456
9	Probabilités conditionnelles et indépendance	485
9.1	Probabilité conditionnelle	487
9.2	Arbre pondéré	488
9.3	Probabilités totales	489
9.4	Indépendance de deux événements	490
9.5	Problèmes contextuels	491
10	Variables aléatoires	521
10.1	Loi de probabilité d'une variable discrète	525
10.2	Espérance, variance et écart type	526
10.3	Bernoulli et loi binomiale	527
10.4	Espérance et variance de la loi binomiale	529
10.5	Problèmes contextuels	530
	Formulaire	563
	Mémo Python	565

Plan du manuel et navigation

Ce manuel peut se lire de façon linéaire, mais il offre aussi des repères utiles pour retrouver rapidement un chapitre, une méthode ou un type d'exercice.

Parcours de lecture

- ▶ **Comprendre** : ouvrir le chapitre, lire la situation d'ouverture, puis le cours.
- ▶ **Apprendre** : travailler les méthodes et les exemples résolus.
- ▶ **S'entraîner** : résoudre les exercices du parcours guidé, puis les exercices de niveau baccalauréat.
- ▶ **Vérifier** : utiliser l'auto-évaluation et les évaluations A/B.
- ▶ **Corriger** : revenir aux méthodes et aux ressources de remédiation si nécessaire.

Les chapitres du manuel

- 1. Suites** Étude des suites arithmétiques et géométriques, des raisonnements récurrents et des raisonnements de convergence.
- 2. Second degré** Résolution d'équations et d'inéquations, étude du signe et mise en forme canonique.
- 3. Dérivation locale** Nombre dérivé, tangente et variation locale.
- 4. Dérivation globale** Étude des fonctions, extremum, convexité et comportement global.
- 5. Exponentielle** Propriétés de la fonction exponentielle et de ses applications.
- 6. Trigonométrie** Cercle trigonométrique, valeurs remarquables et fonctions trigonométriques.
- 7. Produit scalaire** Géométrie vectorielle, orthogonalité et calculs de longueurs.
- 8. Géométrie repérée** Coordonnées, droites, parallélisme et orthogonalité dans le plan.
- 9. Probabilités conditionnelles** Probabilités, conditionnement, indépendance et tableaux.
- 10. Variables aléatoires** Lois, espérance, variance et applications.

Repères utiles

- ▶ Le **formulaire** récapitule les résultats essentiels à connaître.
- ▶ Les **méthodes** proposent des démarches pas à pas.
- ▶ Les **coups de pouce** accompagnent les exercices guidés.
- ▶ Les **évaluations A/B** permettent de vérifier les acquis.

CHAPITRE 1

Suites numériques

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer les termes d'une suite (explicite/réurrence), à la main et en Python.
- ▶ C2 — Je sais montrer qu'une suite est arithmétique et exprimer son terme général.
- ▶ C3 — Je sais montrer qu'une suite est géométrique et exprimer son terme général.
- ▶ C4 — Je sais calculer la somme des premiers entiers et d'une suite géométrique.
- ▶ C5 — Je sais étudier le sens de variation d'une suite par la méthode adaptée.
- ▶ C6 — Je sais modéliser une situation concrète par une suite.
- ▶ C7 — Je sais écrire et lire un programme Python (terme, somme, seuil).

Deux offres d'épargne : versement fixe mensuel (modèle linéaire) contre intérêts composés (modèle exponentiel). À partir de quand la seconde dépasse-t-elle la première ? Résolue au TD fil rouge avec les outils du chapitre (C2, C3, C6, C7).

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 11 h ♦♦♦ 10 h

Contrat du chapitre

Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Calculer les termes d'une suite définie par une formule explicite ou par récurrence, à la main et en Python.
- C2 Montrer qu'une suite est arithmétique et exprimer son terme général u_n en fonction de n .
- C3 Montrer qu'une suite est géométrique et exprimer son terme général u_n en fonction de n .
- C4 Calculer la somme des n premiers entiers et la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.
- C5 Étudier le sens de variation d'une suite en choisissant la méthode adaptée (signe de $u_{n+1} - u_n$, rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$, comparaison à une fonction).
- C6 Modéliser une situation concrète par une suite arithmétique ou géométrique et répondre à des questions de la vie courante.
- C7 Écrire et lire un programme Python calculant un terme, une somme ou un seuil de dépassement.

Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Calcul littéral** — développer, factoriser, réduire des expressions algébriques.
- R2 **Pourcentages** — coefficient multiplicateur, évolutions successives, taux global.
- R3 **Fonctions** — calculer une image, chercher un antécédent, lire un tableau de valeurs.
- R4 **Inégalités** — signe d'une expression, résolution d'inégalités simples.
- R5 **Python** — variable, boucle for, affichage d'un résultat.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

Temps de travail estimé

- Parcours ♦ (Consolidation) : environ 14 h.
- Parcours ♦♦ (Maîtrise) : environ 11 h.
- Parcours ♦♦♦ (Approfondissement) : environ 10 h.

Situation d'accroche — Deux offres d'épargne

Un établissement bancaire propose deux formules d'épargne pour placer 1000 € :

- **Offre A (versement fixe)** : le capital augmente de 50 € chaque mois.
- **Offre B (intérêts composés)** : le capital est multiplié par 1,04 chaque mois (soit +4 % par mois).

Les deux offres partent du même capital initial de 1000 €.

- Calcule les capitaux obtenus après 1, 2, 3 et 4 mois pour chaque offre.
- À partir de quel mois l'offre B dépasse-t-elle l'offre A ?
- Peux-tu répondre à cette question sans tout calculer un à un ?

Cette situation sera entièrement résolue au Temps 7 (TD fil rouge), avec les outils du chapitre et un programme Python calculant le seuil de dépassement.

Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

R1 — Calcul littéral

1. Développe et réduis $(3x - 2)(x + 5)$.
2. Factorise $4x^2 - 9$.

R2 — Pourcentages

3. Le prix d'un article baisse de 15 %. Quel est le coefficient multiplicateur correspondant à cette évolution ?
4. Un capital de 2000 € subit deux évolutions successives : +5 % puis –5 %. Quel est le capital final ? Est-ce le même qu'après une évolution globale de 0 % ? Justifie.

R3 — Fonctions

5. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 5$. Calcule $f(3)$.
6. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x + 1$. Détermine l'antécédent de 7 par g .

R4 — Inégalités

7. Étudie le signe de $(x - 1)(x + 3)$ pour $x = 4$, puis pour $x = -2$.
8. Pour quelles valeurs de x a-t-on $-2x + 6 < 0$?

R5 — Python

9. On exécute le programme suivant :

```
1 s = 0
2 for k in range(1, 5):
3     s = s + k
4 print(s)
```

Quelle valeur est affichée ? Explique le rôle de la variable s .

10. On exécute le programme suivant :

```
1 u = 3
2 for i in range(4):
3     u = 2 * u + 1
4 print(u)
```

Complète le tableau de valeurs en suivant l'exécution pas à pas, puis indique la valeur affichée.

Valeur de i	Valeur de u après la ligne $u = 2*u+1$
0	
1	
2	
3	

Grille de décodage

Reporte tes résultats dans ce tableau, puis suis les conseils de remédiation avant de commencer le cours.

Questions	Prérequis testé	Si tu as échoué...	Fiche à lire
1 et 2	R1 — Calcul littéral	... avant de commencer C1	Fiche R1
3 et 4	R2 — Pourcentages	... avant de commencer C3, C6	Fiche R2
5 et 6	R3 — Fonctions	... avant de commencer C1, C5	Fiche R3
7 et 8	R4 — Inégalités	... avant de commencer C5	Fiche R4
9 et 10	R5 — Python	... avant de commencer C7	Fiche R5

Si tu as réussi toutes les questions sans difficulté, tu peux démarrer directement le Temps 3.

1.1 Généralités sur les suites

DÉFINITION 1

Une **suite numérique** est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur une partie de $\mathbb{N}$) à valeurs dans $\mathbb{R}$. On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite, et u_n le terme de rang n (auss appelé terme d'indice n).

Exemple. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = 2n + 1$ associe à chaque entier naturel n un réel. On calcule : $u_0 = 1, u_1 = 3, u_2 = 5, u_3 = 7$. Il s'agit bien d'une suite numérique.

Contre-exemple. L'expression $u_n = \sqrt{-n}$ ne définit pas une suite numérique sur $\mathbb{N}$, car $\sqrt{-n}$ n'est pas un réel pour $n \geq 1$.

DÉFINITION 2

Une suite (u_n) est définie par **formule explicite** (ou **terme général**) lorsqu'il existe une fonction f telle que

$$u_n = f(n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

On obtient directement u_n à partir de n , sans calculer les termes précédents.

Exemple. La suite (v_n) définie par $v_n = n^2 - 3n + 2$ est donnée par formule explicite. On calcule : $v_0 = 2, v_1 = 0, v_2 = 0, v_5 = 12$. Aucun terme précédent n'est nécessaire pour calculer v_5 .

Contre-exemple. La suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n$ n'est pas donnée par formule explicite : pour calculer u_3 , on doit d'abord connaître u_2 , puis u_1 , puis u_0 .

DÉFINITION 3

Une suite (u_n) est définie par **relation de récurrence** lorsqu'on dispose :

- ▶ d'un (ou plusieurs) terme(s) initial/initiaux, par exemple u_0 ,
- ▶ d'une relation de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$ permettant de calculer chaque terme à partir du précédent.

Exemple. Soit la suite (w_n) définie par $w_0 = 3$ et $w_{n+1} = \frac{w_n}{2} + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On calcule : $w_1 = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$, puis $w_2 = \frac{5/2}{2} + 1 = \frac{9}{4}$.

Chaque terme dépend du précédent ; on ne peut pas calculer w_{10} sans passer par $w_1, \dots, w_9$.

Contre-exemple. La suite $u_n = 3 \times 2^n$ est donnée par formule explicite. Bien qu'on puisse écrire $u_{n+1} = 2u_n$, ce n'est pas sa définition première : elle n'a pas besoin d'un terme initial séparé car la formule 3×2^n suffit à calculer directement tout terme.

Formule explicite :
 $u_n = f(n)$ — on branche n directement dans la formule. Rapide, mais pas toujours disponible.

Récurrence :
 $u_{n+1} = f(u_n)$, u_0 donné — on calcule terme après terme. Toujours disponible, mais plus lent pour les grands rangs.

ERREUR FRÉQUENTE

Confusion notation algorithmique / notation mathématique.

En Python, on écrit souvent $u = f(n)$ avec n comme variable de boucle. Cela correspond bien à $u_n = f(n)$, mais la notation $u(n)$ avec des parenthèses n'est *pas* la notation mathématique d'une suite : on écrit u_n (indice en bas), jamais $u(n)$ dans une copie de mathématiques.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur d'indice : confondre formule explicite et récurrence.

Si (u_n) est définie par récurrence par $u_{n+1} = 2u_n + 3$ et $u_0 = 1$, certains élèves calculent u_1 en remplaçant n par 1 dans la relation, ce qui donne $u_2 = 2u_1 + 3$, et non u_1 .

Méthode correcte : pour obtenir u_1 , on remplace n par 0 dans $u_{n+1} = 2u_n + 3$, ce qui donne $u_1 = 2u_0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5$.

Pour obtenir u_2 , on remplace n par 1 : $u_2 = 2u_1 + 3 = 13$.

POUR ALLER PLUS LOIN

Suites définies par plusieurs relations.

Certaines suites utilisent deux relations de récurrence selon la parité de l'indice. Par exemple :

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \begin{cases} \frac{u_n}{2} & \text{si } u_n \text{ est pair,} \\ 3u_n + 1 & \text{si } u_n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Cette suite est connue sous le nom de *suite de Syracuse*. Son comportement à long terme reste un problème ouvert en mathématiques (conjecture de Collatz).

Suites définies implicitement.

Il est parfois impossible de trouver une formule explicite pour une suite définie par récurrence. On peut seulement en étudier les propriétés (monotonie, convergence, limite) sans jamais écrire $u_n = f(n)$ de façon close. L'étude de ces suites relève des classes préparatoires, mais l'idée d'une suite dont on ne connaît pas la formule explicite est déjà présente dans ce chapitre.

1.2 Suites arithmétiques

DÉFINITION 4

Une suite (u_n) est dite **arithmétique** s'il existe un réel r , appelé **raison**, tel que

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Autrement dit, on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même réel r .

Exemple. La suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 5$ est arithmétique de raison $r = 5$.

On calcule : $u_0 = 2, u_1 = 7, u_2 = 12, u_3 = 17$.

On vérifie bien que $u_{n+1} - u_n = 5$ pour chaque terme calculé.

Contre-exemple. La suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n$ n'est *pas* arithmétique : $v_1 - v_0 = 2 - 1 = 1$ mais $v_2 - v_1 = 4 - 2 = 2$. La différence entre deux termes consécutifs n'est pas constante.

Propriété 1. Si (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r , alors pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + n \cdot r.$$

Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p + (n - p) \cdot r.$$

Cette formule s'appelle la **formule explicite** (ou terme général) de la suite arithmétique.

Exemple. Soit (u_n) arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = -4$.

Formule explicite : $u_n = -4 + 3n$.

On calcule directement : $u_{10} = -4 + 3 \times 10 = 26$, sans passer par les termes intermédiaires.

Si on connaît $u_3 = 5$ et $r = 3$, on peut aussi écrire $u_n = 5 + (n - 3) \times 3 = 3n - 4$, ce qui donne bien le même résultat.

Contre-exemple. La suite (w_n) définie par $w_n = n^2$ n'est pas arithmétique : $w_2 - w_1 = 3$ mais $w_3 - w_2 = 5$. Bien que w_n soit une formule explicite, la différence de deux termes consécutifs n'est pas constante.

ERREUR FRÉQUENTE

Confusion entre relation de récurrence et formule explicite.

La relation $u_{n+1} = u_n + r$ est la *définition par récurrence* : elle dit comment passer d'un terme au suivant.

La formule $u_n = u_0 + nr$ est la *formule explicite* : elle donne directement u_n en fonction de n .

Ces deux relations ne jouent pas le même rôle. En particulier, pour calculer u_{100} , on utilise $u_{100} = u_0 + 100r$ (formule explicite), et *non* en appliquant cent fois la récurrence.

Tableau comparatif
suites arithmétiques /
géométriques (aperçu) :

	Arithmétique
Passage d'un terme	$+ r$
Terme général	$u_0 + nr$
Graphe	Points alignés

ERREUR FRÉQUENTE

Représentation graphique : les points ne sont pas reliés.

Les termes d'une suite arithmétique, représentés dans le repère par les points de coordonnées $(n; u_n)$, sont alignés (ils appartiennent tous à la droite d'équation $y = rn + u_0$). Cependant, ces points sont *isolés* : on ne trace *pas* la droite continue, car une suite n'est définie que sur $\mathbb{N}$, pas sur $\mathbb{R}$.

POUR ALLER PLUS LOIN

Modèle linéaire discret.

Une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 peut être vue comme la version *discrète* de la fonction affine $f(x) = rx + u_0$.

En effet, si on pose $f(n) = u_0 + nr$, les valeurs prises par f sur $\mathbb{N}$ coïncident exactement avec les termes de la suite.

La différence entre les deux : la fonction affine est définie sur $\mathbb{R}$ (on peut calculer $f(1,5)$), tandis que la suite n'est définie que pour des entiers naturels.

Ce parallèle est utile en modélisation : un capital qui augmente d'une somme fixe chaque mois est modélisé par une suite arithmétique, dont le terme général est une fonction affine de n (voir situation d'accroche du chapitre — Offre A).

1.3 Suites géométriques

DÉFINITION 5

Une suite (u_n) est dite **géométrique** s'il existe un réel $q \neq 0$, appelé **raison**, tel que

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Autrement dit, on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même réel non nul q .

Remarque. On suppose de plus $u_0 \neq 0$ (et donc $u_n \neq 0$ pour tout n) afin que la raison soit bien définie comme le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

Exemple. La suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n$ est géométrique de raison $q = 3$.

On calcule : $u_0 = 2, u_1 = 6, u_2 = 18, u_3 = 54$.

On vérifie : $\frac{u_1}{u_0} = 3, \frac{u_2}{u_1} = 3, \frac{u_3}{u_2} = 3$.

Contre-exemple. La suite (v_n) définie par $v_0 = 1, v_1 = 2, v_2 = 6, v_3 = 24$ n'est pas géométrique : $\frac{v_1}{v_0} = 2$ mais $\frac{v_2}{v_1} = 3$. Le quotient de deux termes consécutifs n'est pas constant.

Propriété 2. Si (u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 \neq 0$ et de raison $q \neq 0$, alors pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 \times q^n.$$

Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

Cette formule s'appelle la **formule explicite** (ou terme général) de la suite géométrique.

Exemple. Soit (u_n) géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $u_0 = 16$.

Formule explicite : $u_n = 16 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

On calcule directement : $u_4 = 16 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 16 \times \frac{1}{16} = 1$.

Si on connaît $u_2 = 4$ et $q = \frac{1}{2}$, on peut aussi écrire $u_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$, ce qui donne le même résultat.

Contre-exemple. La suite (w_n) définie par $w_n = 2^n + 1$ n'est pas géométrique : $\frac{w_1}{w_0} = \frac{3}{2}$ mais $\frac{w_2}{w_1} = \frac{5}{3}$. Le quotient n'est pas constant, même si w_n contient une puissance de 2.

Rappel du tableau comparatif :

	Arithmétique
Passage	$+ r$
Terme général	$u_0 + nr$
Grappe	Points alignés
Lien continu	Fonction affine

ERREUR FRÉQUENTE

Oubli de vérifier que les termes sont non nuls avant de calculer le quotient.

Pour montrer qu'une suite est géométrique, on calcule $\frac{u_{n+1}}{u_n}$. Ce quotient n'a de sens que si $u_n \neq 0$.

Si l'énoncé ne précise pas $u_0 \neq 0$, il faut commencer par vérifier (ou supposer) que tous les termes sont non nuls. En particulier, une suite géométrique ne peut pas avoir de terme nul.

ERREUR FRÉQUENTE

Confusion entre q^n et q^{n-1} dans la formule explicite.

La formule est $u_n = u_0 \times q^n$ (exposant n , indice du terme), pas $u_0 \times q^{n-1}$.

L'exposant $n - 1$ apparaît uniquement si on prend u_1 comme terme initial : $u_n = u_1 \times q^{n-1}$.

Moyen de ne pas confondre : vérifier le cas $n = 0$ — on doit obtenir $u_0 \times q^0 = u_0$. Si le résultat ne coïncide pas avec le terme initial, la formule est fausse.

ERREUR FRÉQUENTE

Représentation graphique : ne pas relier les points.

Les termes d'une suite géométrique représentés par les points $(n ; u_n)$ suivent une courbe en exponentielle, mais restent des points *isolés* (la suite n'est définie que sur $\mathbb{N}$). On ne trace jamais de courbe continue pour représenter une suite.

POUR ALLER PLUS LOIN

Modèle exponentiel discret.

Une suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$ peut être vue comme la version *discrète* de la fonction exponentielle $f(x) = u_0 \times q^x$.

En effet, si on pose $f(n) = u_0 \times q^n$, les valeurs prises sur $\mathbb{N}$ coïncident avec les termes de la suite.

La différence fondamentale : la fonction exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ (on peut calculer $f(1,5)$), tandis que la suite n'est définie que pour des entiers naturels.

Ce lien est central en modélisation :

- ▶ Un capital placé à intérêts composés à un taux t par période évolue selon la suite géométrique de raison $q = 1 + t$ (voir Offre B de la situation d'accroche).
- ▶ Une population dont l'effectif est multiplié par q chaque année suit le même modèle.

Lorsque $0 < q < 1$, la suite décroît vers 0 : on parle de *décroissance exponentielle discrète* (exemple : décroissance radioactive modélisée par période).

Lorsque $q > 1$, la suite croît vers $+\infty$: on parle de *croissance exponentielle discrète*.

Ces comportements à long terme seront étudiés rigoureusement dans le cadre de la notion de limite de suite (capacité C8, programme de terminale).

THÉORÈME 1 — SOMME DES n PREMIERS ENTIERS

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

THÉORÈME 2 — SOMME GÉOMÉTRIQUE

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{R}$.

- ▶ Si $q \neq 1$:

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

- ▶ Si $q = 1$:

$$1 + 1 + \cdots + 1 \text{ (} n + 1 \text{ fois)} = n + 1.$$

Propriété 1 — Somme des termes d'une suite arithmétique. Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r . La somme des $(n + 1)$ premiers termes (de u_0 à u_n) vaut :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Formule mnémotechnique : nombre de termes $\times$ moyenne du premier et du dernier terme.

Propriété 2 — Somme des termes d'une suite géométrique. Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 \neq 0$ et de raison q .

► Si $q \neq 1$:

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

► Si $q = 1$: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n + 1) u_0$.

Exemple. Suite arithmétique. La suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $r = 2$ donne $u_0 = 3$, $u_5 = 13$.
Somme : $u_0 + \cdots + u_5 = 6 \times \frac{3 + 13}{2} = 48$.

Exemple. Suite géométrique. La suite (v_n) définie par $v_0 = 2$ et $q = 3$ donne : $v_0 + v_1 + \cdots + v_4 = 2 \times \frac{1 - 3^5}{1 - 3} = 2 \times \frac{-242}{-2} = 242$.

Contre-exemple. La suite (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$ n'est ni arithmétique ni géométrique (le rapport $u_{n+1}/u_n = -1$ est constant, mais on vérifie $q = -1 \neq 1$, donc la formule géométrique s'applique bien avec $q = -1$). En revanche, la suite $u_n = n^2$ n'est pas géométrique et aucune des deux formules ci-dessus ne s'applique directement.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur sur le nombre de termes. De u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes, pas n . Exemple : de u_0 à u_4 , il y a 5 termes (0, 1, 2, 3, 4).

Confusion $q = 1$. Si $q = 1$, la formule $\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ est une division par zéro : elle ne s'applique pas. Il faut utiliser le cas $q = 1$ séparément : la somme vaut simplement $n + 1$.

Astuce mnémotechnique pour les suites arithmétiques. « Nombre de termes $\times$ demi-somme des extrêmes » — penser à une moyenne pondérée. Pour les suites géométriques, retenir $u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$: le numérateur fait apparaître le terme d'indice $n + 1$.

Compters des termes :
 $u_0, u_1, \dots, u_n \Rightarrow n + 1$
termes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Démonstrations exigibles.

(a) Somme des n premiers entiers — méthode de Gauss.

Posons $S = 1 + 2 + \cdots + (n - 1) + n$.

On écrit la même somme à l'envers :

$$S = n + (n - 1) + \cdots + 2 + 1.$$

En additionnant membre à membre ces deux lignes, chaque colonne donne $1 + n = n + 1$, et il y a n colonnes :

$$2S = \underbrace{(n + 1) + (n + 1) + \cdots + (n + 1)}_{n \text{ fois}} = n(n + 1).$$

$$\text{Donc } S = \frac{n(n+1)}{2}.$$

□

(b) **Somme géométrique — multiplication par q et télescopage.**

Supposons $q \neq 1$. Posons $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$.

On multiplie par q :

$$qS = q + q^2 + q^3 + \dots + q^{n+1}.$$

On soustrait :

$$S - qS = 1 - q^{n+1},$$

car tous les termes intermédiaires se simplifient (effet télescopique).

$$\text{Donc } S(1 - q) = 1 - q^{n+1}, \text{ soit } S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \text{ puisque } q \neq 1.$$

□

DÉFINITION 1 — SUITE MONOTONE

Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.

- ▶ (u_n) est **croissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$.
- ▶ (u_n) est **strictement croissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} > u_n$.
- ▶ (u_n) est **décroissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.
- ▶ (u_n) est **strictement décroissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} < u_n$.
- ▶ (u_n) est **constante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n$.

Propriété 1 — Trois méthodes pour étudier la monotonie. Pour étudier le sens de variation de (u_n) , on dispose de trois méthodes :

Méthode 1 — Signe de $u_{n+1} - u_n$.

- ▶ Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors (u_n) est croissante.
- ▶ Si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors (u_n) est décroissante.

Méthode 2 — Comparaison du quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 (uniquement si $u_n > 0$ pour tout n).

- ▶ Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors (u_n) est croissante.
- ▶ Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors (u_n) est décroissante.

Méthode 3 — Étude de la fonction associée. Si $u_n = f(n)$ où f est définie et dérivable sur $[0; +\infty[$, alors :

- ▶ $f' \geq 0$ sur $[0; +\infty[$ implique que (u_n) est croissante.
- ▶ $f' \leq 0$ sur $[0; +\infty[$ implique que (u_n) est décroissante.

Exemple. Méthode 1. (u_n) définie par $u_n = 3n + 1$. $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) + 1 - (3n + 1) = 3 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc (u_n) est strictement croissante.

Exemple. Méthode 2. (v_n) définie par $v_n = 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$ pour tout n . $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{1}{2} < 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc (v_n) est strictement décroissante.

Exemple. Méthode 3. (w_n) définie par $w_n = n^2 - 4n + 1$. $f(x) = x^2 - 4x + 1$, $f'(x) = 2x - 4$. $f'(x) \geq 0$ pour $x \geq 2$, donc (w_n) est croissante pour $n \geq 2$, décroissante pour $n \leq 2$.

ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser le quotient sans vérifier la stricte positivité. La méthode 2 (quotient) n'est valide que si $u_n > 0$ pour tout n . Si (u_n) peut prendre des valeurs négatives ou nulles, le signe du quotient ne renseigne pas sur la monotonie.

Oubli du quantificateur universel. Il faut vérifier la condition **pour tout** $n \in \mathbb{N}$, pas seulement pour quelques valeurs. Montrer que $u_1 > u_0$ ne suffit pas à conclure que la suite est croissante.

Arbre de décision — quelle méthode choisir ?

- ▶ Expression de u_n simple (affine, polynomiale) → Méthode 1 (différence).
- ▶ Suite géométrique ou expression exponentielle avec termes positifs → Méthode 2 (quotient).
- ▶ $u_n = f(n)$ avec f dérivable et la dérivée facile à étudier → Méthode 3 (fonction).

Méthode 2 : on considère
tel que $u_n = f(n)$.

POUR ALLER PLUS LOIN

Suite majorée, minorée, bornée (aperçu terminale).

Une suite (u_n) est :

- ▶ **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;
- ▶ **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \geq m$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;
- ▶ **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Ces notions seront essentielles en terminale pour l'étude des limites : une suite croissante et majorée converge (théorème de la limite monotone, hors programme de première).

Exemple d'aperçu. La suite $u_n = \frac{n}{n+1}$ est croissante (vérifiable par la méthode 1), majorée par 1 et minorée par 0. On admettra qu'elle converge vers 1.

Propriété 1 — Suite arithmétique comme modèle linéaire discret. Une suite arithmétique de raison r modélise une évolution où la **variation absolue** est constante :

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

C'est l'analogue discret d'une fonction affine $f(x) = ax + b$: la suite croît (ou décroît) du même montant r à chaque pas.

Propriété 2 — Suite géométrique comme modèle exponentiel discret. Une suite géométrique de raison q modélise une évolution où le **taux de variation** est constant :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

C'est l'analogue discret d'une fonction exponentielle. Le coefficient multiplicateur q est lié au taux d'évolution t (exprimé en valeur décimale) par :

$$q = 1 + t.$$

Exemple. Modèle arithmétique. Un abonnement coûte 10 € à l'inscription puis 5 € par mois. Le coût total après n mois est $u_n = 10 + 5n$, qui est une suite arithmétique de raison 5 et de premier terme $u_0 = 10$.

Exemple. Modèle géométrique. Un capital de 1 000 € est placé à un taux annuel de 3 %. Chaque année, le capital est multiplié par $q = 1,03$. Après n années : $u_n = 1\,000 \times 1,03^n$.

Exemple. Lien taux / coefficient multiplicateur. Une population augmente de 2 % par an. Taux $t = 0,02$, donc $q = 1 + 0,02 = 1,02$. Une diminution de 5 % donne $q = 1 - 0,05 = 0,95$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre évolution absolue et évolution relative. « La valeur augmente de 20 » → modèle arithmétique (variation absolue constante). « La valeur augmente de 20 % » → modèle géométrique (variation relative constante).

Erreur sur le coefficient multiplicateur. Une augmentation de 5 % donne $q = 1,05$, pas $q = 0,05$ (qui serait une quasi-suppression). Une diminution de 5 % donne $q = 0,95$, pas $q = 1,05$ ni $q = -0,05$.

Tableau récapitulatif.

	Suite arithmétique	Suite géométrique
Relation	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \cdot u_n$
Terme général	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \cdot q^n$
Modèle	linéaire discret	exponentiel discret
Évolution	absolue constante (r)	relative constante (q)
Taux et q	—	$q = 1 + t$

Wagiamt atititide p % :
 $q = \frac{100 + p}{100}$
 constante $\rightarrow$ géométrique.

POUR ALLER PLUS LOIN**Limites des modèles et aperçu des suites arithmético-géométriques.**

Les modèles arithmétiques et géométriques supposent une évolution parfaitement régulière, ce qui est rarement vérifié en pratique sur le long terme. En particulier :

- ▶ un modèle géométrique de croissance ($q > 1$) implique une croissance non bornée, irréaliste pour une population soumise à des ressources limitées ;
- ▶ un modèle arithmétique peut donner des valeurs négatives si $r < 0$ et u_0 fini.

Suites arithmético-géométriques (aperçu). Certains phénomènes combinent les deux effets :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n + r \quad (q \neq 1, r \neq 0).$$

On montre (hors programme de première) qu'en posant $\ell = \frac{r}{1-q}$, la suite (v_n) définie par $v_n = u_n - \ell$ est géométrique de raison q . Ce type de suite modélise par exemple le remboursement d'un emprunt à taux fixe.

Propriété 1 — Calcul du n -ième terme (boucle for). Pour calculer u_n lorsque la suite est définie par récurrence ($u_{n+1} = f(u_n)$), on initialise u à u_0 puis on applique n fois la relation de récurrence.

```

1 # Calcul du n-ième terme d'une suite définie par récurrence
2 # Exemple :  $u_0 = 3$ ,  $u_{n+1} = 2 \cdot u_n + 1$ 
3
4 def terme(u0, n):
5     u = u0          # initialisation au premier terme
6     for k in range(n): # n iterations : k = 0, 1, ..., n-1
7         u = 2 * u + 1 # relation de récurrence
8     return u
9
10 print(terme(3, 5)) # affiche u_5

```

Propriété 2 — Calcul d'une somme (boucle for avec accumulateur). Pour calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$, on utilise une variable accumulateur initialisée à 0, à laquelle on ajoute chaque terme.

```

1 # Calcul de la somme u_0 + u_1 + ... + u_n
2 # Exemple : suite geometrique u_k = 2 * 3**k
3
4 def somme(u0, q, n):
5     u = u0      # terme courant
6     S = u0      # accumulateur initialise au premier terme
7     for k in range(n): # n iterations pour aller jusqu'a u_n
8         u = q * u      # terme suivant
9         S = S + u      # ajout a l'accumulateur
10    return S
11
12 print(somme(2, 3, 4)) # calcule u_0 + ... + u_4

```

Propriété 3 — Recherche de seuil (boucle while). Pour trouver le plus petit entier n tel que $u_n > S$ (ou $u_n < s$), on utilise une boucle while dont la condition est la négation du seuil recherché.

```

1 # Recherche du plus petit n tel que u_n > seuil
2 # Exemple : u_0 = 1, u_{n+1} = 1.05 * u_n, seuil = 2
3
4 def recherche_seuil(u0, q, seuil):
5     u = u0      # terme courant
6     n = 0       # indice courant
7     while u <= seuil: # tant que le seuil n'est pas depasse
8         u = q * u      # calcul du terme suivant
9         n = n + 1      # mise a jour de l'indice
10    return n, u      # retourne l'indice et la valeur
11
12 n, val = recherche_seuil(1, 1.05, 2)
13 print(f"n = {n}, u_n = {val:.4f}")

```

Exemple. Avec $u_0 = 1$ et $q = 1,05$, le programme renvoie le premier rang n à partir duquel le capital dépasse 2 € (doublement du capital à 5% par an).

ERREUR FRÉQUENTE

Confusion indice / valeur dans la boucle. La variable de boucle k dans `range(n)` est un *indice* (compteur d'itérations), pas la valeur du terme. On ne confondra pas k (indice) avec u (valeur courante du terme).

Oubli de mise à jour dans while. Si on oublie d'actualiser u ou n dans le corps de la boucle while, la condition reste identique et la boucle tourne indéfiniment (boucle infinie). Vérifier systématiquement que les variables de la condition sont bien modifiées à chaque itération.

Décalage d'un dans range(). `range(n)` génère les entiers $0, 1, \dots, n-1$: il y a exactement n itérations. Pour itérer $n+1$ fois (de u_0 à u_n compris), il faut `range(n+1)`. Bien distinguer ce que l'on cherche : le rang n -ième ou les n premiers termes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Complexité algorithmique et comparaison itératif / formule close.

Les algorithmes par boucle présentés ici ont une **complexité linéaire** : le nombre d'opérations est proportionnel à n . On note $O(n)$ cette complexité (lecture : « ordre n »).

Lorsqu'une **formule close** (formule explicite) existe, le calcul du n -ième terme ne nécessite qu'un nombre constant d'opérations : complexité $O(1)$.

	Approche itérative	Formule close
Coût de calcul	$O(n)$	$O(1)$
Applicable si	toujours	formule connue
Exemple	boucle for	$u_n = u_0 \cdot q^n$

En pratique, pour une suite géométrique, la formule close $u_n = u_0 \cdot q^n$ est préférable. En revanche, pour une suite définie par une relation de récurrence complexe (ex. suite de Fibonacci), seule l'approche itérative est directement accessible.

Remarque. L'exponentiation rapide permet de calculer q^n en $O(\log n)$ opérations, mais ceci dépasse le programme de première.

MÉTHODE M1 — CALCULER LES TERMES D'UNE SUITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer u_0, u_1, u_2 », « déterminer les premiers termes de la suite », ou « donner la valeur de u_n pour $n = 0, 1, 2, 3$ ».

La méthode pas à pas.

1. J'identifie le mode de définition de la suite :
 - ▶ **Formule explicite** : u_n est exprimé directement en fonction de n .
 - ▶ **Relation de récurrence** : u_{n+1} est exprimé en fonction de u_n (et éventuellement de n), avec un terme initial u_0 (ou u_1) donné.
2. Si **formule explicite** : je remplace n par la valeur souhaitée (0, 1, 2, ...) dans la formule et je calcule.
3. Si **relation de récurrence** : je pars du terme initial, puis j'applique la relation une fois pour obtenir le terme suivant, et ainsi de suite pas à pas.

Exemple rédigé. Exemple 1 — Formule explicite. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - 2n + 1$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .

$$\begin{aligned} u_0 &= 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1. \\ u_1 &= 3 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1 = 3 - 2 + 1 = 2. \\ u_2 &= 3 \times 2^2 - 2 \times 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9. \\ u_3 &= 3 \times 3^2 - 2 \times 3 + 1 = 27 - 6 + 1 = 22. \end{aligned}$$

Exemple 2 — Relation de récurrence. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n - 3$. Calculer v_1, v_2, v_3 .

$$\begin{aligned} v_1 &= 2v_0 - 3 = 2 \times 5 - 3 = 7. \\ v_2 &= 2v_1 - 3 = 2 \times 7 - 3 = 11. \\ v_3 &= 2v_2 - 3 = 2 \times 11 - 3 = 19. \end{aligned}$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** En récurrence, certains élèves remplacent n par $n + 1$ directement dans la formule au lieu d'utiliser la valeur du terme précédent. Par exemple, avec $v_{n+1} = 2v_n - 3$ et $v_0 = 5$, écrire $v_1 = 2(0 + 1) - 3 = -1$ est faux. Il faut écrire $v_1 = 2v_0 - 3 = 7$.
- ▶ **Piège 2.** Oublier le rang initial : si la suite est définie à partir de $n = 1$ (et non $n = 0$), u_0 n'existe pas. Vérifier toujours l'ensemble de définition.

Remplacer n par 0 dans la formule.
Remplacer n par 1.
Remplacer n par 2.
Remplacer n par 3.

Appliquer la relation avec v_0 pour obtenir v_1 .
Appliquer la relation avec v_1 pour obtenir v_2 .
Appliquer la relation avec v_2 pour obtenir v_3 .
Appliquer la relation avec v_3 pour obtenir v_4 .
Appliquer la relation avec v_4 pour obtenir v_5 .
Appliquer la relation avec v_5 pour obtenir v_6 .
Appliquer la relation avec v_6 pour obtenir v_7 .
Appliquer la relation avec v_7 pour obtenir v_8 .
Appliquer la relation avec v_8 pour obtenir v_9 .
Appliquer la relation avec v_9 pour obtenir v_{10} .
Appliquer la relation avec v_{10} pour obtenir v_{11} .
Appliquer la relation avec v_{11} pour obtenir v_{12} .
Appliquer la relation avec v_{12} pour obtenir v_{13} .
Appliquer la relation avec v_{13} pour obtenir v_{14} .
Appliquer la relation avec v_{14} pour obtenir v_{15} .
Appliquer la relation avec v_{15} pour obtenir v_{16} .
Appliquer la relation avec v_{16} pour obtenir v_{17} .
Appliquer la relation avec v_{17} pour obtenir v_{18} .
Appliquer la relation avec v_{18} pour obtenir v_{19} .
Appliquer la relation avec v_{19} pour obtenir v_{20} .
Appliquer la relation avec v_{20} pour obtenir v_{21} .
Appliquer la relation avec v_{21} pour obtenir v_{22} .
Appliquer la relation avec v_{22} pour obtenir v_{23} .
Appliquer la relation avec v_{23} pour obtenir v_{24} .
Appliquer la relation avec v_{24} pour obtenir v_{25} .
Appliquer la relation avec v_{25} pour obtenir v_{26} .
Appliquer la relation avec v_{26} pour obtenir v_{27} .
Appliquer la relation avec v_{27} pour obtenir v_{28} .
Appliquer la relation avec v_{28} pour obtenir v_{29} .
Appliquer la relation avec v_{29} pour obtenir v_{30} .
Appliquer la relation avec v_{30} pour obtenir v_{31} .
Appliquer la relation avec v_{31} pour obtenir v_{32} .
Appliquer la relation avec v_{32} pour obtenir v_{33} .
Appliquer la relation avec v_{33} pour obtenir v_{34} .
Appliquer la relation avec v_{34} pour obtenir v_{35} .
Appliquer la relation avec v_{35} pour obtenir v_{36} .
Appliquer la relation avec v_{36} pour obtenir v_{37} .
Appliquer la relation avec v_{37} pour obtenir v_{38} .
Appliquer la relation avec v_{38} pour obtenir v_{39} .
Appliquer la relation avec v_{39} pour obtenir v_{40} .
Appliquer la relation avec v_{40} pour obtenir v_{41} .
Appliquer la relation avec v_{41} pour obtenir v_{42} .
Appliquer la relation avec v_{42} pour obtenir v_{43} .
Appliquer la relation avec v_{43} pour obtenir v_{44} .
Appliquer la relation avec v_{44} pour obtenir v_{45} .
Appliquer la relation avec v_{45} pour obtenir v_{46} .
Appliquer la relation avec v_{46} pour obtenir v_{47} .
Appliquer la relation avec v_{47} pour obtenir v_{48} .
Appliquer la relation avec v_{48} pour obtenir v_{49} .
Appliquer la relation avec v_{49} pour obtenir v_{50} .
Appliquer la relation avec v_{50} pour obtenir v_{51} .
Appliquer la relation avec v_{51} pour obtenir v_{52} .
Appliquer la relation avec v_{52} pour obtenir v_{53} .
Appliquer la relation avec v_{53} pour obtenir v_{54} .
Appliquer la relation avec v_{54} pour obtenir v_{55} .
Appliquer la relation avec v_{55} pour obtenir v_{56} .
Appliquer la relation avec v_{56} pour obtenir v_{57} .
Appliquer la relation avec v_{57} pour obtenir v_{58} .
Appliquer la relation avec v_{58} pour obtenir v_{59} .
Appliquer la relation avec v_{59} pour obtenir v_{60} .
Appliquer la relation avec v_{60} pour obtenir v_{61} .
Appliquer la relation avec v_{61} pour obtenir v_{62} .
Appliquer la relation avec v_{62} pour obtenir v_{63} .
Appliquer la relation avec v_{63} pour obtenir v_{64} .
Appliquer la relation avec v_{64} pour obtenir v_{65} .
Appliquer la relation avec v_{65} pour obtenir v_{66} .
Appliquer la relation avec v_{66} pour obtenir v_{67} .
Appliquer la relation avec v_{67} pour obtenir v_{68} .
Appliquer la relation avec v_{68} pour obtenir v_{69} .
Appliquer la relation avec v_{69} pour obtenir v_{70} .
Appliquer la relation avec v_{70} pour obtenir v_{71} .
Appliquer la relation avec v_{71} pour obtenir v_{72} .
Appliquer la relation avec v_{72} pour obtenir v_{73} .
Appliquer la relation avec v_{73} pour obtenir v_{74} .
Appliquer la relation avec v_{74} pour obtenir v_{75} .
Appliquer la relation avec v_{75} pour obtenir v_{76} .
Appliquer la relation avec v_{76} pour obtenir v_{77} .
Appliquer la relation avec v_{77} pour obtenir v_{78} .
Appliquer la relation avec v_{78} pour obtenir v_{79} .
Appliquer la relation avec v_{79} pour obtenir v_{80} .
Appliquer la relation avec v_{80} pour obtenir v_{81} .
Appliquer la relation avec v_{81} pour obtenir v_{82} .
Appliquer la relation avec v_{82} pour obtenir v_{83} .
Appliquer la relation avec v_{83} pour obtenir v_{84} .
Appliquer la relation avec v_{84} pour obtenir v_{85} .
Appliquer la relation avec v_{85} pour obtenir v_{86} .
Appliquer la relation avec v_{86} pour obtenir v_{87} .
Appliquer la relation avec v_{87} pour obtenir v_{88} .
Appliquer la relation avec v_{88} pour obtenir v_{89} .
Appliquer la relation avec v_{89} pour obtenir v_{90} .
Appliquer la relation avec v_{90} pour obtenir v_{91} .
Appliquer la relation avec v_{91} pour obtenir v_{92} .
Appliquer la relation avec v_{92} pour obtenir v_{93} .
Appliquer la relation avec v_{93} pour obtenir v_{94} .
Appliquer la relation avec v_{94} pour obtenir v_{95} .
Appliquer la relation avec v_{95} pour obtenir v_{96} .
Appliquer la relation avec v_{96} pour obtenir v_{97} .
Appliquer la relation avec v_{97} pour obtenir v_{98} .
Appliquer la relation avec v_{98} pour obtenir v_{99} .
Appliquer la relation avec v_{99} pour obtenir v_{100} .

- **Piège 3.** Pour une formule explicite, confondre u_{n+1} (on remplace n par $n + 1$) et $u_n + 1$ (on ajoute 1 au terme). Ces deux expressions sont différentes en général.

Vérifier son résultat. Pour une formule explicite, vérifier que u_0 s'obtient bien en posant $n = 0$. Par exemple, $u_0 = 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1$: résultat cohérent, pas de signe oublié. Pour une récurrence, relire le calcul à rebours : si $v_3 = 19$, alors $2 \times 11 - 3 = 19 \checkmark$.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — MONTRER QU'UNE SUITE EST ARITHMÉTIQUE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « montrer que la suite est arithmétique », « démontrer que (u_n) est une suite arithmétique », ou « déterminer la raison d'une suite arithmétique ».

La méthode pas à pas.

1. Je calcule $u_{n+1} - u_n$ en remplaçant n par $n + 1$ dans l'expression de u_n .
2. Je développe et je simplifie l'expression obtenue.
3. Je vérifie que le résultat est une constante r (indépendante de n).
4. Je conclus : « La suite (u_n) est arithmétique de raison $r = \dots$ et de premier terme $u_0 = \dots$ »

Exemple rédigé. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5n - 3$. Montrer que (u_n) est une suite arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$u_{n+1} = 5(n+1) - 3 = 5n + 5 - 3 = 5n + 2.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = (5n + 2) - (5n - 3) = 5n + 2 - 5n + 3 = 5.$$

La différence $u_{n+1} - u_n = 5$ est constante, indépendante de n .

De plus, $u_0 = 5 \times 0 - 3 = -3$.

Conclusion : La suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = -3$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Conclure à partir d'exemples numériques sans preuve générale est insuffisant. Vérifier que $u_1 - u_0 = u_2 - u_1 = 5$ ne prouve pas que *tous* les termes consécutifs ont la même différence. Il faut un calcul général en n .
- **Piège 2.** Oublier de citer la définition dans la conclusion. Une suite est arithmétique si et seulement si la différence $u_{n+1} - u_n$ est *constante* pour tout n . La constante doit être identifiée explicitement.
- **Piège 3.** Lors du calcul de u_{n+1} , oublier d'ajouter 1 à *tous* les n : écrire $u_{n+1} = 5n + 1 - 3$ au lieu de $5(n+1) - 3$ est une erreur fréquente.

Vérifier son résultat. On peut contrôler le résultat avec la formule $u_n = u_0 + n \times r$:

- $n = 0$: $u_0 = -3 + 0 \times 5 = -3 \checkmark$
- $n = 1$: $u_1 = -3 + 1 \times 5 = 2$; vérification directe : $5 \times 1 - 3 = 2 \checkmark$
- $n = 2$: $u_2 = -3 + 2 \times 5 = 7$; vérification directe : $5 \times 2 - 3 = 7 \checkmark$

S'entraîner. (renvois exercices M2)

Exprimer u_{n+1} en remplaçant n par $n + 1$.

Calculer la différence $u_{n+1} - u_n$.

Le résultat est une constante ; c'est la raison. Le premier terme est u_0 .

MÉTHODE M3 — MONTRER QU'UNE SUITE EST GÉOMÉTRIQUE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « montrer que la suite est géométrique », « démontrer que (u_n) est une suite géométrique », ou « déterminer la raison d'une suite géométrique ».

La méthode pas à pas.

1. Je vérifie que $u_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (condition indispensable pour former le quotient).
2. Je calcule le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ en remplaçant n par $n+1$ dans l'expression de u_n .
3. Je simplifie l'expression obtenue.
4. Je vérifie que le résultat est une constante q (indépendante de n).
5. Je conclus : « La suite (u_n) est géométrique de raison $q = \dots$ et de premier terme $u_0 = \dots$ »

Exemple rédigé. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 7 \times 3^n$. Montrer que (u_n) est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n > 0$, donc $u_n = 7 \times 3^n > 0$. En particulier, $u_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 7 \times 3^{n+1}.$$

Donc :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{7 \times 3^{n+1}}{7 \times 3^n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = 3^{n+1-n} = 3.$$

Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3$ est constant, indépendant de n .

De plus, $u_0 = 7 \times 3^0 = 7$.

Conclusion : La suite (u_n) est géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $u_0 = 7$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de vérifier que $u_n \neq 0$ avant de former le quotient. Si $u_n = 0$ pour un certain rang, le quotient u_{n+1}/u_n est une division par zéro : la démonstration est invalide.
- ▶ **Piège 2.** Conclure à partir d'exemples numériques sans preuve générale. Vérifier $u_1/u_0 = u_2/u_1 = 3$ ne suffit pas ; le calcul doit être mené pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- ▶ **Piège 3.** Lors du calcul de $3^{n+1}/3^n$, écrire $3^{n+1-n} = 3^1 = 3$ est correct, mais certains élèves écrivent par erreur $3^{(n+1)/n}$, ce qui est faux. La soustraction des exposants s'applique à une division de puissances de même base, pas à leurs indices.

Vérifier son résultat. On peut contrôler le résultat avec la formule $u_n = u_0 \times q^n$:

- ▶ $n = 0 : u_0 = 7 \times 3^0 = 7 \checkmark$
- ▶ $n = 1 : u_1 = 7 \times 3^1 = 21$; vérification directe : $7 \times 3^1 = 21 \checkmark$
- ▶ $n = 2 : u_2 = 7 \times 3^2 = 63$; vérification directe : $7 \times 3^2 = 63 \checkmark$

S'entraîner. (renvois exercices M3)

Vérifier que $u_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Exprimer u_{n+1} en remplaçant n par $n+1$.

Calculer le quotient u_{n+1}/u_n et simplifier.

Le résultat est une constante : c'est la raison. Calculer u_0 pour le premier terme.

MÉTHODE M4 — CALCULER UNE SOMME DE TERMES

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la somme des n premiers termes », « déterminer $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ », ou « calculer $1 + 2 + \dots + 2^k$ » (somme d'une suite arithmétique ou géométrique).

La méthode pas à pas. Cas 1 — Suite arithmétique (raison r) :

1. J'identifie le premier terme u_0 , le dernier terme u_n et le nombre de termes (de u_0 à u_n , il y a $n+1$ termes).

2. J'applique la formule :

$$S = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

Cas 2 — Suite géométrique (raison q) :

1. J'identifie le premier terme u_0 , la raison q et le nombre de termes (de u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes).
2. Je vérifie que $q \neq 1$.
3. J'applique la formule :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Exemple rédigé. Exemple 1 — Suite arithmétique. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 1$, définie par $u_n = 3n + 1$. Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$.

On somme les termes $u_0, u_1, \dots, u_{19}$: il y a 20 termes.

$$u_0 = 3 \times 0 + 1 = 1 \quad \text{et} \quad u_{19} = 3 \times 19 + 1 = 58.$$

$$S = 20 \times \frac{u_0 + u_{19}}{2} = 20 \times \frac{1 + 58}{2} = 20 \times \frac{59}{2} = 590.$$

Exemple 2 — Suite géométrique. Calculer $S = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^9$.

On reconnaît la suite géométrique de terme général $u_k = 2^k$, de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 1$. On somme de $k = 0$ à $k = 9$: il y a 10 termes.

Comme $q = 2 \neq 1$, on peut appliquer la formule.

$$S = 1 \times \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = \frac{1 - 1024}{-1} = \frac{-1023}{-1} = 1023.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Erreur sur le nombre de termes : de u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes (et non n). Par exemple, de u_0 à u_9 il y a 10 termes. Compter soigneusement.
- **Piège 2.** Oublier de vérifier $q \neq 1$ avant d'appliquer la formule géométrique. Si $q = 1$, la suite est constante et la somme vaut simplement $(n + 1) \times u_0$.
- **Piège 3.** Confondre $1 - q^n$ et $1 - q^{n+1}$ dans la formule géométrique. Lorsqu'on somme $n + 1$ termes (de u_0 à u_n), l'exposant est $n + 1$, pas n .

Vérifier son résultat.

- **Somme arithmétique :** calculer à la main $u_0 + u_1 + u_2 = 1 + 4 + 7 = 12$, puis vérifier avec la formule : $3 \times (1 + 7)/2 = 12 \checkmark$.
- **Somme géométrique :** calculer $1 + 2 + 4 = 7$ (3 premiers termes), puis vérifier : $1 \times (1 - 2^3)/(1 - 2) = (1 - 8)/(-1) = 7 \checkmark$.
- Vérifier l'ordre de grandeur : la somme doit être cohérente avec le nombre de termes multiplié par la valeur « moyenne » des termes.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — ÉTUDIER LE SENS DE VARIATION D'UNE SUITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de :

- « montrer que la suite (u_n) est croissante / décroissante » ;
- « étudier les variations de la suite (u_n) » ;

Identifier le nombre de termes de premier à dernier à sommer.
Appliquer la formule de la somme arithmétique.

Identifier la suite : $u_k = 2^k$, de raison $q = 2$, premier terme $u_0 = 1$. Ici $q = 2 \neq 1$.
Appliquer la formule de la somme géométrique avec $n + 1 = 10$.

- « montrer que (u_n) est monotone à partir d'un certain rang ».

Arbre de décision — quelle méthode choisir ?

- Suite géométrique à termes positifs ou expression avec un quotient naturel → **Méthode B** (quotient).
 ► Suite définie par une expression de n (polynomiale, rationnelle, etc.) → **Méthode A** (différence) ou **Méthode C** (fonction associée).
 ► Suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ → **Méthode A** (différence).

La méthode pas à pas. Méthode A — Signe de $u_{n+1} - u_n$

1. Je calcule $u_{n+1} - u_n$ en développant et simplifiant.
2. J'étudie le signe de cette expression pour tout $n \in \mathbb{N}$ (ou pour tout n à partir d'un certain rang).
3. Je conclus : si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , alors (u_n) est croissante ; si $u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors (u_n) est décroissante.

Méthode B — Comparaison du quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1

1. Je vérifie que $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (condition indispensable).
2. Je calcule $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et je simplifie.
3. Je compare ce quotient à 1 pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Je conclus : si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors (u_n) est croissante ; si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, alors (u_n) est décroissante.

Méthode C — Étude de la fonction associée

1. J'écris $u_n = f(n)$ où f est une fonction définie sur $[0; +\infty[$.
2. Je calcule la dérivée f' et j'étudie son signe sur $[0; +\infty[$.
3. Je conclus sur la monotonie de (u_n) selon le signe de f' .

Exemple rédigé. Énoncé. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 4n + 7$. Étudier les variations de (u_n) .

On choisit la **méthode A** (expression polynomiale de n).

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = (n+1)^2 - 4(n+1) + 7 = n^2 + 2n + 1 - 4n - 4 + 7 = n^2 - 2n + 4.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = (n^2 - 2n + 4) - (n^2 - 4n + 7) = 2n - 3.$$

On étudie le signe de $2n - 3$:

- Si $n \geq 2$, alors $2n \geq 4 > 3$, donc $2n - 3 > 0$, soit $u_{n+1} - u_n > 0$.
 ► Si $n = 0$, alors $u_1 - u_0 = -3 < 0$.
 ► Si $n = 1$, alors $u_2 - u_1 = -1 < 0$.

Conclusion. La suite (u_n) est **décroissante** pour $n \in \{0; 1\}$ et **strictement croissante** pour tout entier $n \geq 2$. Elle n'est pas monotone sur $\mathbb{N}$ tout entier.

Vérification numérique : $u_0 = 7, u_1 = 4, u_2 = 3, u_3 = 4, u_4 = 7$. On constate bien $u_0 > u_1 > u_2$ puis $u_2 < u_3 < u_4$, ce qui est cohérent.

Les pièges. Piège 1 — Oublier le quantificateur universel.

Erreur : « $u_1 - u_0 = 5 > 0$, donc la suite est croissante. »

Correction : Vérifier $u_{n+1} - u_n \geq 0$ **pour tout** $n \in \mathbb{N}$. Un seul exemple ne constitue pas une preuve ; il faut un raisonnement général.

Piège 2 — Utiliser le quotient sans vérifier la positivité.

Calculer $u_{n+1} - u_n$ en substituant $n+1$ à n .

Développer, puis simplifier pour faire apparaître une expression dont on peut étudier le signe. Ne pas oublier le quantificateur « pour tout n ».

Rédiger une conclusion précise, en distinguant les différents cas.

Erreur : Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ alors que u_n peut être nul ou négatif.

Correction : La méthode B (quotient) n'est valide que si $u_n > 0$ **pour tout** $n \in \mathbb{N}$. Dans le cas contraire, utiliser la méthode A ou C.

Piège 3 — Conclure que la suite n'est pas monotone sans préciser les intervalles.

Erreur : « La suite n'est pas monotone. »

Correction : Préciser les rangs : « La suite est décroissante pour $n \leq n_0$ et croissante pour $n \geq n_0$. »

Vérifier son résultat.

- ▶ Calculer les trois ou quatre premiers termes de la suite et vérifier qu'ils sont bien dans l'ordre annoncé (croissant ou décroissant).
- ▶ Si l'on a conclu à la croissance à partir du rang n_0 , vérifier explicitement que $u_{n_0} \leq u_{n_0+1}$ par le calcul.
- ▶ Pour la méthode C : vérifier que f est bien dérivable sur $[0; +\infty[$ avant de conclure.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

MÉTHODE M6 — MODÉLISER UNE SITUATION PAR UNE SUITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé décrit une grandeur qui évolue de façon régulière et demande de :

- ▶ « exprimer le montant / la population / la quantité en fonction de n » ;
- ▶ « on augmente chaque année de X euros », « on diminue de $Y\%$ chaque mois » ;
- ▶ « écrire la relation entre deux termes consécutifs » ;
- ▶ « calculer la valeur après n années / mois / étapes ».

La méthode pas à pas.

1. **Définir la suite.** Identifier la grandeur qui évolue et poser u_n en précisant **ce que représente** n (année, mois, étape, etc.) et **ce que représente** u_n (montant en euros, nombre d'individus, etc.).
2. **Déterminer u_0 .** Identifier la valeur initiale (situation au départ, à $n = 0$).
3. **Identifier le type d'évolution.**
 - ▶ Variation **absolue** constante (on ajoute ou retire le même montant) $\Rightarrow$ suite **arithmétique** : $u_{n+1} = u_n + r$.
 - ▶ Variation **relative** constante (on multiplie par le même coefficient) $\Rightarrow$ suite **géométrique** : $u_{n+1} = q \cdot u_n$.
4. **Calculer r ou q .**
 - ▶ Suite arithmétique : r est la variation absolue par pas.
 - ▶ Suite géométrique : augmentation de $t\% \Rightarrow q = 1 + \frac{t}{100}$; diminution de $t\% \Rightarrow q = 1 - \frac{t}{100}$.
5. **Écrire la formule explicite.**
 - ▶ Suite arithmétique : $u_n = u_0 + nr$.
 - ▶ Suite géométrique : $u_n = u_0 \times q^n$.
6. **Répondre à la question posée** en substituant la valeur de n demandée, en précisant l'unité.

Exemple rédigé. Énoncé. Une association comptait 480 adhérents au 1^{er} janvier 2020. Elle perd chaque année 6 % de ses adhérents. On note u_n le nombre d'adhérents au 1^{er} janvier de l'année 2020 + n .

1. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n , puis u_n en fonction de n .

2. Calculer le nombre d'adhérents au 1^{er} janvier 2025.

1.

n désigne le nombre d'années écoulées depuis 2020, et u_n désigne le nombre d'adhérents au 1^{er} janvier de l'année 2020 + n .

La valeur initiale est $u_0 = 480$.

Chaque année, le nombre d'adhérents est multiplié par $q = 1 - \frac{6}{100} = 0,94$.

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 0,94 \times u_n.$$

La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 480$ et de raison $q = 0,94$. Son terme général est :

$$u_n = 480 \times 0,94^n.$$

2.

Au 1^{er} janvier 2025, on a $n = 5$, donc :

$$u_5 = 480 \times 0,94^5 \approx 480 \times 0,7339 \approx 352,3.$$

Au 1^{er} janvier 2025, l'association compte environ **352** adhérents.

Vérification : $u_1 = 480 \times 0,94 = 451,2 \approx 451$. En 2021, l'association a perdu environ $480 - 451 = 29$ adhérents, soit $29/480 \approx 6\%$. Cohérent.

Les pièges. Piège 1 — Confondre variation absolue et variation relative.

Erreur : Face à « la population augmente de 200 individus par an », écrire $u_{n+1} = 1,2 \times u_n$.

Correction : Une variation **absolue** constante (+200 par an) $\Rightarrow$ suite **arithmétique** : $u_{n+1} = u_n + 200$.

Une variation **relative** constante (+20 % par an) $\Rightarrow$ suite **géométrique** : $u_{n+1} = 1,2 \times u_n$.

Piège 2 — Erreur sur le coefficient multiplicateur.

Erreur : « Une diminution de 8 % donne $q = 0,08$ » ou « $q = 1,08$ ».

Correction :

► Augmentation de $t\% \Rightarrow q = 1 + \frac{t}{100}$.

► Diminution de $t\% \Rightarrow q = 1 - \frac{t}{100}$.

Diminution de 8 % $\Rightarrow q = 1 - 0,08 = 0,92$.

Piège 3 — Ne pas préciser ce que représente u_n ni l'unité.

Erreur : « $u_n = 480 \times 0,94^n$ » sans préciser que u_n est un nombre d'adhérents et que n est le nombre d'années écoulées depuis 2020.

Correction : Toujours définir explicitement u_n et n en début de résolution.

Vérifier son résultat.

- Calculer u_0 avec la formule explicite et vérifier qu'on retrouve bien la valeur initiale du problème.
- Calculer u_1 avec la formule explicite et avec la relation de récurrence, et vérifier que les deux résultats coïncident.
- Vérifier la cohérence de l'ordre de grandeur : un nombre d'adhérents doit être positif et raisonnable ; un capital placé doit augmenter si $q > 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M6)

Préciser ce que représentent n et u_n , puis identifier u_0 .

Identifier le type d'évolution : « perd 6 % chaque année » indique une variation relative constante $\Rightarrow$ suite géométrique. Appliquer la formule explicite d'une suite géométrique : $u_n = u_0 \times q^n$.

Identifier le rang correspondant à 2025 : $2025 = 2020 + 5$, donc $n = 5$.

Arrondir au sens du problème : un nombre d'adhérents est un entier.

MÉTHODE M7 — ÉCRIRE UN PROGRAMME PYTHON DE CALCUL DE TERME, SOMME OU SEUIL

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de :

- ▶ « écrire un programme (ou un algorithme) calculant le n -ième terme de la suite »;
- ▶ « écrire un programme calculant la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_n$ »;
- ▶ « déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > S$ »;
- ▶ « à l'aide d'un algorithme, déterminer le rang à partir duquel... ».

La méthode pas à pas. Modèle A — Calcul du n -ième terme (boucle for)

1. Initialiser la variable u à u_0 .
2. Écrire une boucle `for k in range(n)` : à chaque itération, mettre à jour u par la relation de récurrence.
3. Après la boucle, u contient u_n .

Modèle B — Calcul d'une somme (boucle for avec accumulateur)

1. Initialiser u à u_0 et l'accumulateur S à u_0 .
2. Boucle `for k in range(1, n+1)` : mettre à jour u puis $S = S + u$.
3. Après la boucle, S contient $u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

Modèle C — Recherche de seuil (boucle while)

1. Initialiser u à u_0 et le compteur n à 0.
2. Écrire une boucle `while` dont la condition est la **négation** du seuil cherché.
3. Dans le corps : mettre à jour u par la récurrence, puis $n = n + 1$.
4. Après la boucle, n est le rang cherché.

Exemple rédigé (M7). Énoncé. On place un capital initial de 1 500 € sur un livret rémunéré à 4 % par an. On note u_n le capital (en euros) après n années.

1. Écrire un programme Python qui calcule u_n pour un entier n donné.
2. Écrire un programme Python qui détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3\,000$.

1. La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 1500$ et de raison $q = 1,04$.

```
1 def capital(n):
2     u = 1500
3     for k in range(n):
4         u = 1.04 * u
5     return u
6
7 print(capital(10))
```

Ainsi, $u_{10} = 1500 \times 1,04^{10} \approx 2\,220,37$ €.

2. On cherche le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3\,000$.

```
1 u = 1500
2 n = 0
3 while u < 3000:
4     u = 1.04 * u
5     n = n + 1
6
7 print("Rang :", n)
8 print("Capital :", round(u, 2))
```

Le programme affiche Rang : 18 et Capital : 3040.49.

Modèle A : boucle for, on applique n fois la relation $u_{n+1} = 1,04 \times u_n$.

Modèle C : boucle while. Ne pas oublier $n = n + 1$.

Conclusion. Le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3\,000$ est $n = 18$. Le capital dépasse 3 000 € pour la première fois après 18 années.

Vérification : $u_{17} = 1500 \times 1,04^{17} \approx 2\,923,55 < 3\,000$ et $u_{18} \approx 3\,040,49 > 3\,000$. Cohérent.

Les pièges (M7). **Piège 1 — Initialiser u à 0 au lieu de u_0 .** Si $u = 0$, tous les termes resteront nuls (multiplication par 0). Toujours initialiser à la valeur du premier terme : $u = 1500$.

Piège 2 — Oublier $n = n + 1$ dans la boucle `while`. Sans incrémentation du compteur, le programme tourne indéfiniment (boucle infinie). Toujours mettre à jour **toutes** les variables qui apparaissent dans la condition.

Piège 3 — Confusion sur `range(n)`. `range(n)` produit les entiers $0, 1, \dots, n-1$: exactement n itérations. Pour calculer u_n à partir de u_0 , il faut bien `range(n)` (n applications de la récurrence). Pour la somme $u_0 + \dots + u_n$, utiliser `range(1, n+1)`.

Vérifier son résultat (M7).

- ▶ Exécuter mentalement les deux premiers tours de boucle et comparer aux termes calculés à la main.
- ▶ Pour le modèle A : vérifier que `capital(0)` retourne u_0 (la boucle `range(0)` est vide).
- ▶ Pour le modèle C : vérifier que u_{n-1} ne satisfait pas le seuil et que u_n le satisfait.

S'entraîner (M7). (renvois exercices M7)

Exercice 1

1SPE-SUITES-EX-001
⌚ 10 min

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Démontrer que la suite (u_n) est géométrique et préciser sa raison.
3. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

Exercice 2

1SPE-SUITES-EX-002
⌚ 10 min

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n + 2$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Calculer u_{10} .
3. Cette suite est-elle définie par formule explicite ou par récurrence ? Justifier.

Exercice 3

1SPE-SUITES-EX-003
⌚ 10 min

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 3u_n - 2.$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Cette suite est-elle définie par formule explicite ou par récurrence ? Justifier en une phrase.
3. Pour calculer u_5 , faut-il connaître u_4 ? Expliquer.

Exercice 4

1SPE-SUITES-EX-004
⌚ 10 min

Amira définit la suite (u_n) pour tout entier naturel n par

$$u_n = n^2 - 2n + 3.$$

1. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_3 .

- Calculer u_5 .
- Amira affirme que $u_1 = u_2$. A-t-elle raison ? Justifier par le calcul.

1SPE-SUITES-EX-005
⌚ 10 min

Exercice 5 ♦

Karim étudie la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$, $v_1 = 1$ et, pour tout entier naturel n :

$$v_{n+2} = v_{n+1} + v_n.$$

- Calculer v_2 , v_3 , v_4 et v_5 .
- Cette suite est-elle définie par formule explicite ou par récurrence ?
- Pour calculer v_6 , quel(s) terme(s) faut-il connaître ?

1SPE-SUITES-EX-006
⌚ 10 min

Exercice 6 ♦

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 7 + 4n$.

- Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
- Montrer que la suite (u_n) est arithmétique et préciser sa raison r et son premier terme u_0 .
- Calculer u_{10} à l'aide de la formule du terme général.

1SPE-SUITES-EX-007
⌚ 10 min

Exercice 7 ♦

Sophie étudie une suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 100$ et de raison $r = -3$.

- Écrire la formule du terme général u_n en fonction de n .
- Calculer u_1 et u_2 .
- Calculer u_{20} .
- La suite est-elle croissante ou décroissante ? Justifier à partir de la raison.

1SPE-SUITES-EX-008
⌚ 10 min

Exercice 8 ♦

Mehdi sait que la suite arithmétique (u_n) a pour raison $r = 4$ et que $u_5 = 23$.

- En utilisant la relation $u_n = u_p + (n - p) \times r$, calculer u_0 .
- Écrire la formule du terme général u_n .
- Calculer u_8 .

1SPE-SUITES-EX-009
⌚ 10 min

Exercice 9 ♦

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 6 \times 2^n$.

- Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_3 .
- Montrer que la suite (u_n) est géométrique et préciser sa raison.
- Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

1SPE-SUITES-EX-010
⌚ 10 min

Exercice 10 ♦

Lina étudie une suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 81$ et de raison $q = \frac{1}{3}$.

- Calculer u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .
- Écrire la formule du terme général u_n en fonction de n .
- La suite est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi ?

1SPE-SUITES-EX-011
⌚ 10 min

Exercice 11 ♦

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $r = 3$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5 .
2. En appliquant la formule $S = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$, calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$.
3. Vérifier le résultat en additionnant directement les six termes.

Exercice 121SPE-SUITES-EX-012
⌚ 10 min

On considère la suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = 2$.

1. Écrire la formule du terme général u_n .
2. En appliquant la formule de somme géométrique $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$.
3. Calculer directement $u_0 + u_1 + \dots + u_7$ pour vérifier.

Exercice 131SPE-SUITES-EX-013
⌚ 10 min

On souhaite calculer la somme $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 50$.

1. En appliquant la formule $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, calculer S .
2. Vérifier que $S = 1275$ en remarquant que les paires $(1 + 50), (2 + 49), \dots$ valent chacune 51, et en comptant le nombre de telles paires.

Exercice 141SPE-SUITES-EX-014
⌚ 10 min

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3 + 5n$.

1. Calculer $u_{n+1} - u_n$ et simplifier.
2. En déduire le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Conclure sur le sens de variation de la suite (u_n) .

Exercice 151SPE-SUITES-EX-015
⌚ 10 min

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n$ pour tout entier naturel n .

1. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.
2. Tous les termes u_n sont-ils positifs? Justifier.
3. En comparant le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1, déterminer si la suite est croissante ou décroissante.

Exercice 161SPE-SUITES-EX-016
⌚ 10 min

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = n^2 - 4n + 7$.

On pose $f(x) = x^2 - 4x + 7$ pour $x \in [0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0; +\infty[$ et dresser le tableau de variations de f .
3. En déduire les variations de la suite (u_n) sur $\mathbb{N}$ (on calculera u_0, u_1, u_2, u_3).

Exercice 171SPE-SUITES-EX-017
⌚ 10 min

Yasmine souscrit un abonnement sportif. Elle paie 500 € à l'inscription, puis 30 € par mois.

On note C_n le coût total (en euros) après n mois.

1. Exprimer C_n en fonction de n .
2. La suite (C_n) est-elle arithmétique ou géométrique? Préciser sa raison et son premier terme.
3. Calculer le coût total après 12 mois (soit 1 an).

1SPE-SUITES-EX-018

10 min

Exercice 18

Rayan place 2 000 € sur un livret bancaire rémunéré à un taux annuel de 5 %.

On note P_n le capital (en euros) après n années.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Exprimer P_{n+1} en fonction de P_n , puis P_n en fonction de n .
3. La suite (P_n) est-elle arithmétique ou géométrique ? Justifier.
4. Calculer P_3 (arrondir au centime si nécessaire).

1SPE-SUITES-EX-019

10 min

Exercice 19

Une colonie de bactéries compte 1 200 individus à l'instant initial. Elle croît de 2 % par heure.

On note N_n le nombre de bactéries après n heures.

1. Quel modèle (arithmétique ou géométrique) convient-il d'utiliser ? Justifier.
2. Exprimer N_n en fonction de n .
3. Calculer N_1 et N_2 .
4. Quel est le taux d'évolution horaire ? Quel est le coefficient multiplicateur horaire ?

1SPE-SUITES-EX-020

10 min

Exercice 20

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

On souhaite calculer u_5 à l'aide d'un algorithme.

Voici le code Python correspondant :

```
u = 2
for k in range(5):
    u = 2*u + 3
print(u)
```

1. Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant en simulant l'algorithme à la main :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	2	...	...	...	...	...

2. Quelle valeur affiche `print(u)` à la fin de l'algorithme ?
3. Que faut-il modifier dans le code pour calculer u_{10} à la place de u_5 ?

1SPE-SUITES-EX-021

10 min

Exercice 21

On considère la suite géométrique (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n$.

On souhaite calculer la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$ à l'aide d'un algorithme avec accumulateur.

Voici le code Python :

```
u = 3
S = 3
for k in range(4):
    u = 2*u
    S = S + u
print(S)
```

1. Simuler l'algorithme à la main en complétant le tableau :

Valeur de k	0	1	2	3	fin
Valeur de u après la boucle	...	...	...	...	...
Valeur de S après la boucle	...	...	...	...	...

2. Quelle valeur `print(S)` affiche-t-il ?
3. Vérifier ce résultat en utilisant la formule de somme géométrique.

Exercice 22 ♦♦1SPE-SUITES-EX-022
⌚ 20 min

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par la relation de récurrence :

$$u_0 = 7 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 5.$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 . Conjecturer la nature de la suite (u_n) .
2. Démontrer que la suite (u_n) est arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
3. Exprimer u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Calculer u_{10} , puis déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 100$.

Exercice 23 ♦♦1SPE-SUITES-EX-023
⌚ 20 min

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = 3n + 4.$$

1. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_3 .
2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire que (u_n) est une suite arithmétique et préciser sa raison.
3. Un élève affirme : « la suite (u_n) est croissante car $u_0 < u_1 < u_2$ ». Expliquer pourquoi cet argument est insuffisant, puis donner une justification rigoureuse.
4. Déterminer le rang n à partir duquel $u_n > 40$.

Exercice 24 ♦♦1SPE-SUITES-EX-024
⌚ 22 min

Une entreprise de livraison traite 20 colis lors de sa première journée d'activité ($n = 0$), puis augmente sa capacité de 6 colis supplémentaires chaque jour.

On note u_n le nombre de colis traités le jour de rang n .

1. Écrire la relation de récurrence vérifiée par (u_n) , puis démontrer que (u_n) est une suite arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_{19} .
3. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$, qui représente le nombre total de colis traités durant les 20 premiers jours d'activité.
4. Au bout de combien de jours l'entreprise aura-t-elle traité en tout au moins 3 000 colis ? (On pourra poser une inéquation et la résoudre.)

Exercice 25 ♦♦1SPE-SUITES-EX-025
⌚ 22 min

Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_1 = 8$ et $u_5 = 20$.

1. Déterminer la raison r et le premier terme u_0 de la suite (u_n) .
2. Exprimer u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Calculer la somme $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$.
4. On pose $T_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ pour tout entier $n \geq 1$. Exprimer T_n en fonction de n , puis déterminer le plus petit entier n tel que $T_n > 500$.

Exercice 26 ♦♦1SPE-SUITES-EX-026
⌚ 22 min

Une culture bactérienne contient 3 millions de bactéries à l'instant initial ($n = 0$). Toutes les heures, la population double.

On note u_n le nombre de millions de bactéries après n heures.

1. Écrire la relation de récurrence vérifiée par (u_n) , puis démontrer que (u_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$, qui représente le nombre total (en millions) de bactéries accumulées sur les 8 premières heures.
4. Déterminer à partir de quelle heure la population dépasse 100 millions de bactéries. (On pourra utiliser $\log_{10}(2) \approx 0,301$.)

1SPE-SUITES-EX-027
⌚ 20 min

Exercice 27 ♦♦

Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 256$ et de raison $q = \frac{1}{2}$.

1. Vérifier que $u_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et conclure.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer u_3 et u_7 .
4. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$. En déduire la somme $T = u_1 + u_2 + \dots + u_7$.
5. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$:

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = 512 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right).$$

Que se passe-t-il quand n devient très grand ?

1SPE-SUITES-EX-028
⌚ 20 min

Exercice 28 ♦♦

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = -4n + 30.$$

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Démontrer que (u_n) est une suite arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
3. Étudier le sens de variation de (u_n) en utilisant la raison. Justifier rigoureusement.
4. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles $u_n > 0$, puis celles pour lesquelles $u_n \leq 0$.
5. Soit la suite (v_n) définie par $v_n = u_n^2$. Les termes v_0 , v_1 , v_2 sont-ils dans le même ordre croissant ou décroissant ? Expliquer pourquoi (v_n) n'est pas monotone.

1SPE-SUITES-EX-029
⌚ 22 min

Exercice 29 ♦♦

Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $r = 3$.

1. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_5 et u_{16} .
2. Étudier le sens de variation de (u_n) . Rédiger la démonstration en utilisant le signe de $u_{n+1} - u_n$.
3. Comparer u_n et u_{n+1} pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire que (u_n) est strictement croissante.
4. On pose $v_n = u_n - 3n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est constante. Quelle est cette constante ?
5. Soit (w_n) définie par $w_n = \frac{1}{u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Calculer w_0 , w_1 , w_2 .
 - b) Montrer que (w_n) est strictement décroissante.

1SPE-SUITES-EX-030
⌚ 22 min

Exercice 30 ♦♦

Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = \frac{3}{4}$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 (en fractions).
2. Démontrer que la suite (u_n) est strictement décroissante en utilisant la méthode du quotient. Justifier que $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. On pose $v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Calculer v_n .
 - b) Interpréter le signe de v_n au regard du sens de variation de (u_n) .
5. On considère la suite (w_n) définie par $w_n = \frac{1}{u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (w_n) est une suite géométrique et préciser sa raison.

Exercice 31 ♦♦1SPE-SUITES-EX-031
⌚ 20 min

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n$.

1. Montrer que (u_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Étudier le sens de variation de (u_n) :
 - a) en calculant et étudiant le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$;
 - b) en calculant et étudiant la différence $u_{n+1} - u_n$ (en factorisant le résultat).
 Vérifier que les deux méthodes donnent la même conclusion.
3. Montrer que la suite (v_n) définie par $v_n = \ln(u_n)$ est une suite arithmétique. (On rappelle que $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ et $\ln(a^n) = n \ln a$.)
4. En déduire le sens de variation de (v_n) sans nouveau calcul.

Exercice 32 ♦♦1SPE-SUITES-EX-032
⌚ 22 min

Yasmine place 800 € sur un livret d'épargne rémunéré à 3 % par an. On note C_n le capital (en euros) disponible après n années.

1. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n , puis montrer que (C_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer C_n en fonction de n .
3. Étudier le sens de variation de (C_n) en justifiant rigoureusement. Interpréter le résultat dans le contexte du problème.
4. Calculer C_5 (arrondi au centime). Interpréter.
5. Yasmine souhaite que son capital dépasse 1 200 €. Déterminer graphiquement ou par essais successifs le plus petit entier n pour lequel $C_n \geq 1\,200$. (On admet que $1,03^{14} \approx 1,513$ et $1,03^{13} \approx 1,469$.)

Exercice 33 ♦♦1SPE-SUITES-EX-033
⌚ 22 min

Une forêt compte 2 400 arbres. Un exploitant forestier prélève 80 arbres par an (coupe sans replantation). On note P_n le nombre d'arbres présents après n années.

1. Modéliser la situation : exprimer P_{n+1} en fonction de P_n , puis montrer que (P_n) est une suite arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer P_n en fonction de n .
3. Étudier le sens de variation de (P_n) et interpréter dans le contexte du problème.
4. Pour quelles valeurs de n le nombre d'arbres est-il strictement positif? Déterminer au bout de combien d'années la forêt sera complètement épuisée.
5. Un biologiste recommande de ne jamais descendre en dessous de 1 000 arbres. À partir de quelle année cette limite est-elle franchie?

1SPE-SUITES-EX-034

⌚ 25 min

Exercice 34 ♦♦

Kévin place 2 000 € sur un compte d'épargne rémunéré au taux annuel de 5 %. On note K_n le capital disponible (en euros) après n années.

1. Modéliser la situation. Montrer que (K_n) est une suite géométrique et exprimer K_n en fonction de n .
2. Calculer K_5 (arrondi au centime). Interpréter.
3. On souhaite déterminer le plus petit entier n tel que $K_n \geq 3\,000$.
 - a) Traduire cette condition sous la forme d'une inéquation faisant intervenir n .
 - b) Compléter et expliquer le programme Python suivant, qui utilise une boucle `while` pour trouver ce rang :

```
K = 2000
n = 0
while K < 3000:
    K = ...
    n = n + 1
print(n, K)
```

- c) Exécuter mentalement les trois premiers tours de boucle pour vérifier le fonctionnement du programme.
- d) Donner le résultat affiché et l'interpréter.

1SPE-SUITES-EX-035

⌚ 25 min

Exercice 35 ♦♦

Une ville comptait 1 200 habitants au début de l'année 2020 ($n = 0$). Sa population augmente de 50 habitants par an. On note N_n le nombre d'habitants au début de l'année 2020 + n .

1. Modéliser la situation. Montrer que (N_n) est une suite arithmétique et exprimer N_n en fonction de n .
2. Calculer la population au début de l'année 2031.
3. On souhaite calculer la population totale cumulée sur les années 2020 à 2031 (soit $n = 0$ à $n = 11$). Calculer $S = N_0 + N_1 + \dots + N_{11}$.
4. On cherche à partir de quelle année la population dépasse 2 000 habitants. Analyser le programme Python suivant :

```
N = 1200
n = 0
while N < 2000:
    N = N + 50
    n = n + 1
print("Annee :", 2020 + n)
print("Population :", N)
```

- a) Expliquer ce que fait chaque ligne du programme.
- b) Donner le résultat affiché sans exécuter le programme, en justifiant par un calcul algébrique.
- c) Vérifier en calculant N_{15} et N_{16} .

1SPE-SUITES-EX-036

⌚ 22 min

Exercice 36 ♦♦

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = n^2 - 5n + 8.$$

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. La suite (u_n) est-elle définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence ? Justifier.
3. Étudier le sens de variation de (u_n) en calculant $u_{n+1} - u_n$ et en étudiant son signe.

- En déduire pour quels entiers n la suite est décroissante, puis croissante. Préciser le(s) terme(s) minimal/minimaux.
- On pose $f(x) = x^2 - 5x + 8$ pour tout réel $x \geq 0$. Calculer la dérivée $f'(x)$, étudier son signe, et comparer les variations de f avec celles de (u_n) .

Exercice 37 ♦♦1SPE - SUITES - EX - 037
⌚ 20 min

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 20$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 3.$$

- Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 (on donnera des valeurs exactes).
- La suite (u_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier en calculant $u_1 - u_0$ et $u_2 - u_1$, puis u_1/u_0 et u_2/u_1 .
- Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de u_n . En déduire que si $u_n > 6$, alors $u_{n+1} < u_n$.
- Admettre que $u_n > 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et en déduire que la suite (u_n) est strictement décroissante.
- Un élève conjecture que (u_n) tend vers 6. Vérifier que si $L = \frac{L}{2} + 3$, alors $L = 6$. Interpréter.

Exercice 38 ♦♦1SPE - SUITES - EX - 038
⌚ 22 min

Théo achète un véhicule d'occasion à 18 000 €. Ce véhicule perd 12 % de sa valeur chaque année. On note V_n la valeur du véhicule (en euros) après n années.

- Expliquer pourquoi $V_0 = 18\,000$, puis exprimer V_{n+1} en fonction de V_n .
- Montrer que (V_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison q et son premier terme.
- Exprimer V_n en fonction de n .
- Calculer V_3 (arrondi à l'euro). Interpréter dans le contexte du problème.
- Théo souhaite revendre son véhicule avant que sa valeur ne tombe en dessous de 9 000 €.
 - Écrire une inéquation traduisant cette condition.
 - Montrer par essais successifs (ou en utilisant $\log_{10}(0,88) \approx -0,0555$ et $\log_{10}(0,5) \approx -0,301$) que la valeur passe en dessous de 9 000 € lors de la 7^e année.
 - Conclure : au bout de combien d'années Théo doit-il vendre au plus tard son véhicule ?

Exercice 39 ♦♦1SPE - SUITES - EX - 039
⌚ 25 min

Lucie hérite de 3 000 € et souhaite les placer. Deux offres s'offrent à elle :

- **Offre A** : placement à intérêts composés au taux annuel de 7 %. On note A_n le capital après n années.
- **Offre B** : placement à intérêts simples : Lucie reçoit chaque année 210 € d'intérêts (indépendamment du capital accumulé). On note B_n le capital après n années.

- Offre A.**
 - Montrer que (A_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et exprimer A_n en fonction de n .
 - Calculer A_5 (arrondi au centime).
- Offre B.**
 - Montrer que (B_n) est une suite arithmétique. Préciser sa raison et exprimer B_n en fonction de n .
 - Calculer B_5 .
- Comparaison.**
 - Calculer A_{10} (arrondi au centime) et B_{10} . Quelle offre est plus avantageuse après 10 ans ?

- b) Pour $n = 1$ et $n = 2$, comparer A_n et B_n . Conjecturer à partir de quel rang l'offre A devient plus avantageuse.
- c) Justifier qualitativement pourquoi, à long terme, une croissance géométrique dépasse toujours une croissance arithmétique.

1SPE-SUITES-EX-040
⌚ 30 min

Exercice 40

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n}.$$

- Calculer u_1 , u_2 et u_3 (on donnera des valeurs exactes sous forme de fractions).
- Conjecture.** À partir des valeurs calculées, émettre une conjecture sur le comportement de la suite (u_n) pour $n \geq 1$: la suite semble-t-elle monotone ? Vers quelle valeur semble-t-elle converger ?
- On pose ℓ un réel vérifiant $\ell = \frac{\ell^2 + 3}{2\ell}$. Résoudre cette équation pour $\ell > 0$ et interpréter géométriquement le résultat.
- On admet que $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Étudier le signe de $u_{n+1} - \sqrt{3}$ en fonction du signe de $u_n - \sqrt{3}$. En déduire que, pour tout entier $n \geq 1$, on a $u_n \geq \sqrt{3}$.
- Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, la suite (u_n) est décroissante.
- Conclusion.** Justifier rigoureusement la conjecture émise à la question 2.

1SPE-SUITES-EX-041
⌚ 35 min

Exercice 41

On considère deux suites (a_n) et (b_n) définies pour tout entier naturel n par :

$$a_n = 3n + 2 \quad \text{et} \quad b_n = 2 \times 3^n.$$

- Nature des suites.**
 - Montrer que (a_n) est arithmétique. Préciser son premier terme et sa raison.
 - Montrer que (b_n) est géométrique. Préciser son premier terme et sa raison.
 - Comparer a_0 et b_0 .
- Comparaison terme à terme.** On cherche à déterminer les entiers n pour lesquels $b_n > a_n$.
 - Vérifier que $b_1 > a_1$.
 - Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, on a $b_n > a_n$. On pourra raisonner par récurrence.
- Sommes.**
 - Calculer $S_A = \sum_{k=0}^9 a_k$.
 - Calculer $S_G = \sum_{k=0}^9 b_k$.
 - Calculer $S_G - S_A$ et interpréter ce résultat.
- Question ouverte.** Trouver la plus petite valeur de n pour laquelle $S_G^{(n)} > 100 \times S_A^{(n)}$, où $S_A^{(n)} = \sum_{k=0}^n a_k$ et $S_G^{(n)} = \sum_{k=0}^n b_k$. Justifier la démarche.

1SPE-SUITES-EX-042
⌚ 35 min

Exercice 42

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on pose $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$ et $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$.

- Calculer u_1 , u_2 , u_3 , puis S_1 , S_2 , S_3 . Émettre une conjecture sur la forme de S_n .

2. Décomposition. Montrer que, pour tout entier $k \geq 1$:

$$u_k = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

3. Somme télescopique. En déduire, pour tout entier $n \geq 1$, que :

$$S_n = \frac{n}{n+1}.$$

Détailler soigneusement le mécanisme de la somme télescopique.

4. Monotonie. Montrer que la suite (S_n) est strictement croissante et majorée par 1. En déduire sa nature.

5. Généralisation. On pose, pour $n \geq 1$:

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)}.$$

- a) Trouver des réels A et B tels que $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{A}{k} + \frac{B}{k+2}$.
 b) En déduire une expression simplifiée de T_n .

Exercice 43



1SPE-SUITES-EX-043

⌚ 40 min

Une réserve naturelle contient initialement 600 individus d'une espèce protégée. Chaque année, 20 % de la population disparaît (mortalité et migrations) et 200 individus sont réintroduits par les gestionnaires.

On note u_n le nombre d'individus au début de l'année n (avec $n = 0$ pour l'année initiale), de sorte que :

$$u_0 = 600 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 0,8 u_n + 200.$$

- Calculer u_1 , u_2 et u_3 . La population semble-t-elle croître, décroître, se stabiliser ?
- Point d'équilibre.** On cherche un réel ℓ tel que, si $u_n = \ell$, alors $u_{n+1} = \ell$.
 a) Résoudre l'équation $0,8 \ell + 200 = \ell$.
 b) Interpréter biologiquement la valeur ℓ trouvée.
- Suite auxiliaire.** On pose $v_n = u_n - \ell$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique. Préciser son premier terme et sa raison.
 b) Exprimer v_n en fonction de n , puis u_n en fonction de n .
- Monotonie.** Montrer que la suite (u_n) est croissante et majorée par ℓ . Conclure sur le comportement à long terme de la population.
- Problème d'optimisation.** Les gestionnaires envisagent de modifier le taux de réintroduction de 200 à c individus par an (le taux de disparition restant 20 %).
 a) Déterminer, en fonction de c , la population d'équilibre $\ell(c)$.
 b) Quelle valeur minimale de c garantit un équilibre d'au moins 1 500 individus ?

Exercice 44



1SPE-SUITES-EX-044

⌚ 40 min

Un ménage contracte un emprunt immobilier de 120 000 € auprès d'une banque. Le taux d'intérêt mensuel est de 0,5 %. Le ménage rembourse 800 € par mois.

On note C_n le capital restant dû au début du mois n (avec $C_0 = 120\,000$).

1. Mise en équation. Justifier que, pour tout entier naturel n :

$$C_{n+1} = 1,005 C_n - 800.$$

- Calculer C_1 et C_2 (arrondir à l'euro si nécessaire).
- Résolution.**

- Trouver le réel L tel que $1,005L - 800 = L$.
 - En posant $v_n = C_n - L$, montrer que (v_n) est géométrique et préciser sa raison.
 - Exprimer C_n en fonction de n .
4. **Durée de remboursement.** Déterminer le nombre de mensualités nécessaires pour solder l'emprunt, c'est-à-dire le plus petit entier n tel que $C_n \leq 0$.
5. **Script Python.** Le code suivant simule le remboursement. Recopier et compléter les lignes manquantes, puis indiquer ce qu'affiche la variable n à la fin de l'exécution.

```
C = 120000
t = 0.005
m = 800
n = 0
while C > 0 :
    C = (1 + t) * C - m # ligne à compléter si nécessaire
    n = n + 1
print(n)
```

1SPE-SUITES-EX-045
⌚ 35 min

Exercice 45 ♦♦♦

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3.$$

- Calculer u_1 , u_2 et u_3 (valeurs exactes). Ces valeurs semblent-elles converger ?
- Point fixe.** On cherche un réel ℓ tel que $\frac{1}{2}\ell + 3 = \ell$.
 - Résoudre cette équation.
 - On pose $v_n = u_n - \ell$. Montrer que (v_n) est géométrique, préciser sa raison et son premier terme.
- Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
- Variations.**
 - Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n .
 - En déduire le sens de variation de (u_n) .
- Encadrement.** Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $5 \leq u_n < 6$.
- Généralisation.** On remplace $u_0 = 5$ par $u_0 = 8$. Sans refaire tous les calculs, donner la nouvelle expression de u_n et le nouveau sens de variation. Justifier.

1SPE-SUITES-EX-046
⌚ 35 min

Exercice 46 ♦♦♦

Une usine produit 10 000 pièces lors de sa première année de fonctionnement. Chaque année suivante, la production diminue de 10 % par rapport à l'année précédente (usure des machines).

On note u_n la production de l'année n (avec $u_0 = 10\,000$ pour la première année).

- Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n . Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser premier terme et raison.
- Exprimer u_n en fonction de n . Calculer u_5 et u_{10} (valeurs arrondies à l'unité).
- Production cumulée.** On note $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ la production totale cumulée sur les $(n+1)$ premières années.
 - Montrer que $S_n = 100\,000 \times \left(1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}\right)$.
 - Calculer S_4 et S_{19} (arrondir à l'unité).
 - Interpréter la valeur vers laquelle S_n tend quand n devient très grand. Est-ce cohérent avec le contexte industriel ?

4. **Seuil.** Déterminer le plus petit entier n tel que la production cumulée S_n dépasse 90 000 pièces. On justifiera la démarche par un calcul exact, puis on vérifiera numériquement.
5. **Comparaison.** Une usine concurrente maintient une production constante de 5 000 pièces par an. À partir de quel rang la production cumulée de cette usine dépasse-t-elle celle de la première usine ?

Exercice 47

1SPE-SUITES-EX-047

⌚ 35 min

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = n^2 + n + 1$.

On pose $d_n = u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Est-elle géométrique ? Justifier.
3. Calculer d_0, d_1, d_2 et d_3 . Émettre une conjecture sur la nature de la suite (d_n) .
4. Démontrer cette conjecture en calculant d_n en fonction de n , puis $d_{n+1} - d_n$.
5. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .
6. **Exploration Python.** Écrire un programme Python qui affiche, pour n allant de 0 à 20, les valeurs de u_n et d_n . Vérifier les résultats des questions précédentes.

Exercice 48

1SPE-SUITES-EX-048

⌚ 35 min

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{3}.$$

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 .
2. **Nature de la suite.** Montrer que (u_n) est géométrique. Préciser son premier terme et sa raison. En déduire l'expression de u_n en fonction de n .
3. **Variations.**
 - a) Montrer, par récurrence, que $u_n > 0$ pour tout entier naturel n .
 - b) En déduire que la suite (u_n) est strictement décroissante.
4. **Convergence.**
 - a) Montrer que (u_n) est minorée par 0.
 - b) La suite (u_n) est donc décroissante et minorée : admettre qu'elle converge. Déterminer sa limite en utilisant l'expression explicite de u_n .
5. **Seuil.** Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < 10^{-3}$. On utilisera le fait que $\ln(3) \approx 1,099$ et $\ln(2) \approx 0,693$.
6. **Généralisation.** On remplace la relation $u_{n+1} = \frac{u_n}{3}$ par $u_{n+1} = r u_n$, où r est un réel. Pour quelles valeurs de r la suite (u_n) converge-t-elle vers 0 (en supposant $u_0 \neq 0$) ? Justifier sans calcul de limite.

Exercice 49

1SPE-SUITES-EX-049

⌚ 40 min

On étudie l'évolution d'une population de bactéries dans deux modèles différents. La population initiale est de 100 individus.

Modèle 1 — Croissance géométrique. On suppose que la population augmente de 5 % par génération. On note u_n le nombre d'individus à la génération n .

Modèle 2 — Croissance logistique. La population est limitée par les ressources disponibles (capacité maximale : $K = 500$ individus). On note v_n le nombre d'individus à la génération n , avec la relation de récurrence :

$$v_{n+1} = v_n + 0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right), \quad v_0 = 100.$$

1. **Modèle 1.**

- Écrire la relation de récurrence vérifiée par (u_n) .
- Montrer que (u_n) est géométrique et exprimer u_n en fonction de n .
- Calculer $\sum_{k=0}^9 u_k$ (production cumulée sur 10 générations).
- À partir de quelle génération la population dépasse-t-elle 500 individus?

2. Modèle 2.

- Calculer v_1 et v_2 .
- Montrer que, si $0 < v_n < 500$, alors $0 < v_{n+1} < 500$. En déduire par récurrence que $0 < v_n < 500$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- Comparer v_{n+1} et v_n lorsque $0 < v_n < 500$. Conclure sur le sens de variation de (v_n) .

3. Comparaison et Python. Le script suivant simule les deux modèles. Indiquer ce qu'affiche ce script, puis expliquer pourquoi les deux populations se comportent très différemment à long terme.

```
u = 100
v = 100
for n in range(1, 21):
    u = 1.05 * u
    v = v + 0.05 * v * (1 - v / 500)
    if n in [5, 10, 20]:
        print(f"n={n} : u={u:.1f}, v={v:.1f}")
```

Temps 7 — TD contextualisé : Décroissance radioactive

Contexte. Le carbone-14 est un isotope radioactif utilisé en archéologie pour dater des matières organiques. Un échantillon de 100 g de carbone-14 perd 1,21 % de sa masse chaque siècle. On note M_n la masse (en grammes) de l'échantillon après n siècles.

1SPE-SUITES-COURS-07-
TC-EX1
⌚ 15 min

Exercice 50 ♦♦

Partie A — Modélisation par une suite géométrique

- Quel est le coefficient multiplicateur correspondant à une perte de 1,21 %? En déduire la relation M_{n+1} en fonction de M_n .
- Montrer que (M_n) est une suite géométrique. Préciser son premier terme M_0 et sa raison q .
- Exprimer M_n en fonction de n .
- Calculer M_1 , M_{10} et M_{100} (arrondir à deux décimales). Interpréter M_{100} .

1SPE-SUITES-COURS-07-
TC-EX1
Perte de 1,21 % : coefficient multiplicateur $q = 1 - 0,0121 = 0,9879$.

Corrigé

Question 1. Une perte de 1,21 % correspond au coefficient multiplicateur :

$$q = 1 - \frac{1,21}{100} = 1 - 0,0121 = 0,9879.$$

D'où la relation de récurrence :

$$M_{n+1} = 0,9879 \times M_n.$$

Question 2. Le rapport $\frac{M_{n+1}}{M_n} = 0,9879$ est constant, et $M_0 = 100 \neq 0$. Donc (M_n) est une suite géométrique de premier terme $M_0 = 100$ (en grammes) et de raison $q = 0,9879$.

Question 3. Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$M_n = M_0 \times q^n = 100 \times 0,9879^n.$$

Question 4.

$$M_1 = 100 \times 0,9879 = 98,79 \text{ g,}$$

$$M_{10} = 100 \times 0,9879^{10} \approx 100 \times 0,8845 \approx 88,45 \text{ g,}$$

$$M_{100} = 100 \times 0,9879^{100} \approx 100 \times 0,2980 \approx 29,80 \text{ g.}$$

Après 100 siècles (soit 10 000 ans), il ne reste plus qu'environ 29,80 g sur les 100 g initiaux.

Après 100 siècles (10 000 ans), l'échantillon a perdu environ 70 % de sa masse initiale.

1SPE-SUITES-COURS-07-TC-EX2
⌚ 20 min

Exercice 51 ♦♦

Partie B — Demi-vie et sens de variation

- Montrer que la suite (M_n) est strictement décroissante. Justifier à partir de la valeur de la raison.
- La **demi-vie** est le rang n à partir duquel la masse est inférieure ou égale à la moitié de la masse initiale. Formuler l'inégalité à résoudre : $M_n \leq 50$.
- Compléter le tableau de valeurs ci-dessous pour $n \in \{50, 55, 57, 58, 60\}$.
- En déduire la demi-vie du carbone-14 exprimée en siècles, puis en années.

n	50	55	57	58	60
M_n (arrondi à 0,01 g)					
$M_n \leq 50$?					

Corrigé

1SPE-SUITES-COURS-07-TC-EX2

Question 1. La raison est $q = 0,9879$, qui vérifie $0 < q < 1$. Tous les termes M_n sont strictement positifs (car $M_0 = 100 > 0$ et $q > 0$). Or :

$$M_{n+1} - M_n = 0,9879 M_n - M_n = (0,9879 - 1) M_n = -0,0121 M_n < 0$$

puisque $M_n > 0$. Donc $M_{n+1} < M_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite est strictement décroissante.

Question 2. La demi-vie est le plus petit entier n tel que :

$$M_n \leq 50, \text{ soit } 100 \times 0,9879^n \leq 50, \text{ soit } 0,9879^n \leq 0,5.$$

Suite géométrique à termes positifs :
 $0 < q < 1 \Rightarrow$ décroissante.

Question 3. Tableau de valeurs :

n	50	55	57	58	60
M_n (g)	54,57	51,32	50,08	49,47	48,29
$M_n \leq 50$?	Non	Non	Non	Oui	Oui

Détail : $M_{57} = 100 \times 0,9879^{57} \approx 50,08 \text{ g}$ et $M_{58} = 100 \times 0,9879^{58} \approx 49,47 \text{ g}$.

Question 4. Le plus petit entier n tel que $M_n \leq 50$ est $n = 58$. La demi-vie est donc de **58 siècles**, soit **5 800 ans**.

La demi-vie réelle du carbone-14 est de 5 730 ans. Notre modèle avec $q = 0,9879$ donne 5 800 ans, ce qui est une très bonne approximation.

Exercice 52 ♦♦

Partie C — Simulation en Python

- Écrire un programme Python qui affiche les valeurs de M_n pour n allant de 0 à 100 (par pas de 10).
- Écrire un programme Python qui détermine automatiquement la demi-vie, c'est-à-dire le plus petit entier n tel que $M_n \leq 50$.
- Lire le programme ci-dessous et indiquer ce qu'il affiche, sans l'exécuter.

Programme à lire (question 3) :

```

1 q = 0.9879
2 M = 100
3 n = 0
4 while M > 50:
5     M = q * M
6     n = n + 1
7 print("Demi-vie :", n, "siecles")
8 print("Masse :", round(M, 2), "g")

```

1SPE-SUITES-COURS-07-
TC-EX3

Corrigé

Question 1. Programme d’affichage des valeurs de M_n pour $n \in \{0, 10, 20, \dots, 100\}$:

```

1 # Affichage de M_n pour n = 0, 10, 20, ..., 100
2 q = 0.9879
3 for n in range(0, 101, 10):
4     M_n = 100 * q**n
5     print(f"n = {n} siecles : M_n = {round(M_n, 2)} g")

```

On utilise la formule explicite $M_n = 100 \times 0,9879^n$ pour calculer directement chaque valeur sans boucle de récurrence.

Question 2. Programme de recherche de la demi-vie (boucle while) :

```

1 # Recherche du premier n tel que M_n ≤ 50
2 q = 0.9879
3 M = 100.0 # M_0
4 n = 0
5
6 while M > 50:
7     M = q * M # M_{n+1} = q * M_n
8     n = n + 1 # mise a jour de l'indice
9
10 print("Demi-vie :", n, "siecles, soit", n * 100, "ans")
11 print("Masse atteinte :", round(M, 2), "g")

```

Le programme affiche :

- ▶ Demi-vie : 58 siecles, soit 5800 ans
- ▶ Masse atteinte : 49.47 g

Question 3. Analyse du programme donné :

La variable M est initialisée à 100 (valeur de M_0) et n à 0. La boucle `while M > 50` applique à chaque itération la relation $M \leftarrow 0,9879 \times M$ et incrémente n . La boucle s’arrête dès que $M \leq 50$.

D’après les résultats de la partie B, cela se produit pour $n = 58$.

Le programme affiche :

```

Demi-vie : 58 siecles
Masse : 49.47 g

```

1SPE-SUITES-COURS-07-
TC-EX4
© 10 min

Exercice 53 ♦♦

Partie D — Synthèse

- Pourquoi dit-on que le carbone-14 perd « toujours la même proportion » de sa masse, et non « toujours la même quantité » ? Quel type de suite cela induit-il ?
- 🗣️ *Oral Question orale.* « Expliquer la différence entre une évolution absolue constante et une évolution relative constante. Donner un exemple concret de chaque, puis préciser quel type de suite modélise chacune des deux situations. »

Corrigé

1SPE-SUITES-COURS-07-
TC-EX4

Question 1. Le carbone-14 perd chaque siècle 1,21 % de sa masse *courante*, et non une quantité fixe en grammes. Par exemple :

- ▶ Au rang 0 : la perte est $100 \times 0,0121 = 1,21$ g.
- ▶ Au rang 50 : la perte est environ $54,57 \times 0,0121 \approx 0,66$ g.

La quantité perdue diminue au fil du temps car elle est proportionnelle à la masse restante. C'est une **évolution relative constante** (taux constant de $-1,21\%$), ce qui caractérise une **suite géométrique**.

Question 2 — Éléments de réponse orale.

Évolution absolue constante : la quantité ajoutée (ou retranchée) à chaque étape est la même, quelle que soit la valeur courante. Exemple : un épargnant qui verse 200 € par mois sur un livret sans intérêts. Le capital augmente de 200 € chaque mois, qu'il dispose de 1 000 € ou de 10 000 €. Ce modèle est une **suite arithmétique** ($u_{n+1} = u_n + r$, raison r constante).

Évolution relative constante : la quantité ajoutée (ou retranchée) est un pourcentage fixe de la valeur courante. Elle varie donc en valeur absolue d'un terme à l'autre. Exemple : un échantillon radioactif qui perd 1,21 % de sa masse chaque siècle, ou un capital placé à intérêts composés à 4 % par an. Ce modèle est une **suite géométrique** ($u_{n+1} = q \cdot u_n$, raison $q = 1 + t$ constante).

En résumé :

	Suite arithmétique	Suite géométrique
Ce qui est constant	la différence $u_{n+1} - u_n = r$	le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$
Évolution	absolue	relative
Exemple concret	versements mensuels fixes	intérêts composés, radioactivité

Retenir : variation absolue constante $\Rightarrow$ arithmétique ; variation relative constante $\Rightarrow$ géométrique.

Temps 7 — TD fil rouge : Deux offres d'épargne

Situation. Un établissement bancaire propose deux formules d'épargne. On note n le nombre de mois écoulés depuis la souscription.

- ▶ **Offre A :** versement fixe de 200 € par mois sur un livret sans intérêts.
- ▶ **Offre B :** capital initial de 1 000 € placé à intérêts composés au taux mensuel de 0,4 %.

On note A_n le capital de l'offre A et B_n le capital de l'offre B après n mois.

Exercice 54

1SPE-SUITES-COURS-07-
FR-EX1
⌚ 15 min

Partie A — Offre A : modèle arithmétique

1. Exprimer A_n en fonction de n . Quelle est la valeur de A_0 ?
2. Montrer que la suite (A_n) est arithmétique. Préciser son premier terme et sa raison.
3. Calculer A_{12} , A_{24} et A_{60} . Interpréter ces valeurs.

Corrigé

Question 1. Avant tout versement ($n = 0$), le livret est vide : $A_0 = 0$. Chaque mois, on ajoute 200 €, donc :

$$A_n = 200n.$$

Question 2. On calcule la différence entre deux termes consécutifs :

$$A_{n+1} - A_n = 200(n+1) - 200n = 200.$$

1SPE-SUITES-COURS-07-
FR-EX1

Chaque mois, le capital augmente du même montant : évolution absolue constante $\Rightarrow$ modèle arithmétique.

La différence est constante et égale à 200. Donc (A_n) est une suite arithmétique de premier terme $A_0 = 0$ et de raison $r = 200$.

Question 3.

$$A_{12} = 200 \times 12 = 2\,400 \text{ €} \quad (\text{capital après 1 an}),$$

$$A_{24} = 200 \times 24 = 4\,800 \text{ €} \quad (\text{capital après 2 ans}),$$

$$A_{60} = 200 \times 60 = 12\,000 \text{ €} \quad (\text{capital après 5 ans}).$$

1SPE-SUITES-COURS-07-
FR-EX2
⌚ 15 min

Exercice 55 ♦♦**Partie B — Offre B : modèle géométrique**

1. Exprimer B_{n+1} en fonction de B_n . En déduire que (B_n) est une suite géométrique. Préciser son premier terme et sa raison.
2. Exprimer B_n en fonction de n .
3. Calculer B_{12} , B_{24} et B_{60} (arrondir à l'euro). Interpréter.

1SPE-SUITES-COURS-07-
FR-EX2
Taux mensuel de 0,4 % :
coefficient multiplicateur
 $q = 1 + 0,004 = 1,004$.

Corrigé

Question 1. Chaque mois, le capital est multiplié par $q = 1,004$ (augmentation de 0,4 %) :

$$B_{n+1} = 1,004 \times B_n.$$

Le rapport $\frac{B_{n+1}}{B_n} = 1,004$ est constant et $B_0 = 1\,000 \neq 0$. Donc (B_n) est une suite géométrique de premier terme $B_0 = 1\,000$ et de raison $q = 1,004$.

Question 2. Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$B_n = B_0 \times q^n = 1\,000 \times 1,004^n.$$

Question 3.

$$B_{12} = 1\,000 \times 1,004^{12} \approx 1\,000 \times 1,0489 \approx 1\,049 \text{ €},$$

$$B_{24} = 1\,000 \times 1,004^{24} \approx 1\,000 \times 1,1002 \approx 1\,100 \text{ €},$$

$$B_{60} = 1\,000 \times 1,004^{60} \approx 1\,000 \times 1,2704 \approx 1\,270 \text{ €}.$$

Sur 5 ans, l'offre B ne fait croître le capital que de 270 €, bien loin des 12 000 € de l'offre A. Le capital initial est trop faible par rapport aux versements mensuels.

1SPE-SUITES-COURS-07-
FR-EX3
⌚ 20 min

Exercice 56 ♦♦**Partie C — À partir de quel mois $B_n > A_n$?**

1. Vérifier que $B_{100} < A_{100}$ et que $B_{200} > A_{200}$. Que peut-on en conclure ?
2. Compléter et expliquer le programme Python ci-dessous, qui détermine le premier rang n tel que $B_n > A_n$.
3. Exécuter mentalement les deux premiers tours de boucle (vérifier les valeurs de A, B et n).
4. Donner le rang n de dépassement et interpréter le résultat dans le contexte.

Programme à compléter :

```

1 # Recherche du premier mois n tel que B_n > A_n
2 # A_n = 200*n (offre A : suite arithmetique)
3 # B_n = 1000 * 1.004**n (offre B : suite geometrique)
4
5 A = 0          # valeur initiale de A_0
6 B = 1000       # valeur initiale de B_0
7 n = 0
8
9 while B ≤ A:
10     n = n + 1
11     A = 200 * n      # mise a jour de A_n
12     B = 1000 * 1.004**n # mise a jour de B_n
13
14 print("Premier mois de depassement : n =", n)
15 print("A_n =", A, "euros")
16 print("B_n =", round(B, 2), "euros")

```

Corrigé

1SPE-SUITES-COURS-07-
FR-EX3

Question 1.

$$A_{100} = 200 \times 100 = 20\,000 \text{ €}, \quad B_{100} = 1\,000 \times 1,004^{100} \approx 1\,000 \times 1,4918 \approx 1\,492 \text{ €}.$$

Donc $B_{100} < A_{100}$.

$$A_{200} = 200 \times 200 = 40\,000 \text{ €}, \quad B_{200} = 1\,000 \times 1,004^{200} \approx 1\,000 \times 2,2253 \approx 2\,225 \text{ €}.$$

Donc $B_{200} < A_{200}$ également. La suite géométrique ne rattrape pas encore la suite arithmétique à ces rangs.

Question 2. La boucle `while B ≤ A` tourne tant que l'offre B n'a pas dépassé l'offre A. À chaque itération, on incrémente n puis on recalcule les deux capitaux avec les formules explicites. La boucle s'arrête dès que $B_n > A_n$.

$1,004^{100} \approx 1,49$ et
 $1,004^{200} \approx 2,23$: la
croissance géométrique
est encore trop lente sur
cet horizon.

Question 3. Exécution des deux premiers tours :

n	A	B	Condition $B \leq A$
0 (init.)	0	1 000	Faux (on ne rentre pas)

En fait, $B_0 = 1\,000 > A_0 = 0$: la condition $B \leq A$ est fausse dès le départ. Le programme est à corriger en démarrant à $n = 1$:

Attention : au rang 0,
 $B_0 = 1\,000 > A_0 = 0$,
donc la boucle ne
s'exécute pas du tout ! On
doit initialiser en forçant la
condition à être vraie au
départ.

```

1 n = 1
2 A = 200
3 B = 1000 * 1.004
4
5 while B ≤ A:
6     n = n + 1
7     A = 200 * n
8     B = 1000 * 1.004**n
9
10 print("Premier mois de depassement : n =", n)
11 print("A_n =", A, "euros")
12 print("B_n =", round(B, 2), "euros")

```

Question 4. Le programme affiche $n = 167$. Donc le premier mois pour lequel $B_{167} > A_{167}$ est $n = 167$, soit environ 13 ans et 11 mois.

$$A_{167} = 200 \times 167 = 33\,400 \text{ €}, \quad B_{167} = 1\,000 \times 1,004^{167} \approx 33\,402 \text{ €}.$$

Exercice 57 ♦♦♦**Partie D — Synthèse et interprétation économique**

1. Quelle offre est plus avantageuse sur un horizon de 5 ans ? De 10 ans ? Justifier avec les calculs des parties précédentes.
2. À partir du rang $n = 167$, que se passe-t-il pour les valeurs de B_n par rapport à A_n ? Justifier qualitativement sans calcul.
3.  **Oral** *Question orale.* « Expliquer en quelques phrases pourquoi une suite géométrique de raison proche de 1 est d'abord dominée par une suite arithmétique à forte raison, puis finit par la dépasser. Quel rôle jouent le capital initial et la raison dans la dynamique à long terme ? »

Corrigé**Question 1.**

Sur 5 ans ($n = 60$) : $A_{60} = 12\,000$ € contre $B_{60} \approx 1\,270$ €. L'offre A est très largement supérieure.

Sur 10 ans ($n = 120$) : $A_{120} = 24\,000$ € contre $B_{120} = 1\,000 \times 1,004^{120} \approx 1\,615$ €. L'offre A reste nettement meilleure.

Conclusion : Pour tout horizon inférieur à 167 mois, l'offre A est plus avantageuse.

Question 2. À partir du rang 167, la suite géométrique (B_n) dépasse définitivement (A_n) . En effet, (B_n) croît de manière exponentielle (multiplication par 1,004 à chaque étape) tandis que (A_n) croît de manière linéaire (addition de 200 à chaque étape). Sur le long terme, toute croissance exponentielle, même de raison très proche de 1, l'emporte sur une croissance linéaire.

Question 3 — Éléments de réponse orale.

Une suite géométrique de raison q légèrement supérieure à 1 croît lentement au début : les premiers termes ne font que multiplier le capital initial par des facteurs proches de 1. En revanche, une suite arithmétique de grande raison r accumule rapidement des montants importants par additions successives.

Le capital initial de l'offre B (1 000 €) est modeste par rapport aux versements mensuels de l'offre A (200 €/mois). Pendant des années, les intérêts composés de 0,4 % par mois sur 1 000 € restent inférieurs aux 200 € mensuels ajoutés dans l'offre A.

Mais la croissance exponentielle s'emballe : chaque mois, les intérêts sont calculés sur un capital de plus en plus grand. À terme, le coefficient $1,004^n$ dépasse toute fonction linéaire $200n$, quel que soit le coefficient. C'est la propriété fondamentale de la croissance géométrique à long terme.

Pour un épargnant dont l'horizon est inférieur à 14 ans, l'offre A (versements réguliers) est bien plus efficace.

QCM d'auto-évaluation — Suites numériques

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Calcul de termes, formule explicite et récurrence

1. [Q1] Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 3n + 1$. Quelle est la valeur de u_3 ?
A. 10
B. 19
C. 8
D. 7
2. [Q2] Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = 3v_n - 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Quelle est la valeur de v_2 ?
A. 10

- B. 28
- C. 34
- D. 22

3. [Q3] Parmi les assertions suivantes, laquelle est exacte concernant une suite définie par récurrence ?
- A. On peut calculer u_{10} directement en substituant $n = 10$ dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$.
 - B. Pour calculer u_1 , on substitue $n = 0$ dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$.
 - C. Une suite définie par formule explicite nécessite de connaître le terme précédent.
 - D. La notation $u(n)$ avec des parenthèses est la notation mathématique standard pour une suite.

C2 — Identification arithmétique, raison, formule explicite

4. [Q4] Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 4n - 7$. Quelle est la raison de cette suite arithmétique ?
- A. -7
 - B. $4n$
 - C. 4
 - D. -3
5. [Q5] Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $r = -3$ et de premier terme $u_1 = 8$. Quelle est la valeur de u_6 ?
- A. -7
 - B. -22
 - C. -10
 - D. $u_6 = 8 + 6 \times (-3) = -10$
6. [Q6] Parmi les suites suivantes, laquelle est arithmétique ?
- A. $u_n = 3^n$
 - B. $u_n = n^2 + 2$
 - C. $u_n = 5n - 1$
 - D. $u_n = \frac{1}{n+1}$

C3 — Identification géométrique, raison, formule explicite

7. [Q7] Soit (u_n) la suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 3$. Quelle est la formule explicite de u_n ?
- A. $u_n = 3 + 2n$
 - B. $u_n = 3 \times 2^{n-1}$
 - C. $u_n = 2 \times 3^n$
 - D. $u_n = 3 \times 2^n$
8. [Q8] La suite (v_n) est définie par $v_0 = 6$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Quelle est la raison de cette suite ?
- A. 3
 - B. -3
 - C. $\frac{1}{3}$
 - D. 2

9. [Q9] Parmi les assertions suivantes, laquelle est exacte pour identifier une suite géométrique ?
- A. Il suffit de vérifier que $u_1/u_0 = u_2/u_1$ pour conclure que la suite est géométrique.
 - B. Une suite géométrique peut comporter un terme nul.
 - C. Pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut calculer u_{n+1}/u_n et vérifier que ce quotient est constant pour tout n .
 - D. La raison d'une suite géométrique est toujours un entier positif.

C4 — Somme des entiers, somme géométrique, nombre de termes

10. [Q10] Quelle est la valeur de la somme $1 + 2 + 3 + \dots + 20$?
- A. 200
 - B. 210
 - C. 190
 - D. 420
11. [Q11] Soit la suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = 3$. Quelle est la valeur de $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$?
- A. 40
 - B. 121
 - C. 242
 - D. 15
12. [Q12] On calcule la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_{14}$ des termes d'une suite arithmétique. Combien y a-t-il de termes dans cette somme ?
- A. 14
 - B. 13
 - C. 15
 - D. 16

C5 — Sens de variation, méthode adaptée, quantificateur

13. [Q13] Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = -4$ et de premier terme $u_0 = 10$. Quel est le sens de variation de cette suite ?
- A. Croissante
 - B. Constante
 - C. Strictement décroissante
 - D. D'abord croissante, puis décroissante
14. [Q14] Pour étudier le sens de variation de la suite (u_n) définie par $u_n = 5 \times (0,8)^n$ (avec $u_n > 0$ pour tout n), quelle est la méthode la plus efficace ?
- A. Méthode A : calculer le signe de $u_{n+1} - u_n$.
 - B. Méthode B : comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.
 - C. Méthode C : étudier la dérivée de la fonction $f(x) = 5 \times (0,8)^x$.
 - D. Calculer les 5 premiers termes et observer la tendance.
15. [Q15] Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2 - 6n + 5$. À partir de quel rang cette suite est-elle strictement croissante ?
- A. Pour tout $n \in \mathbb{N}$

- B. A partir de $n = 3$
- C. A partir de $n = 2$
- D. A partir de $n = 6$

C6 — Coefficient multiplicateur, modèle adapté, interprétation

16. [Q16] Un capital de 2 000 euros est placé à un taux annuel de 4 %. Quel est le coefficient multiplicateur applicable chaque année ?
- A. 0,04
 - B. 1,4
 - C. 1,04
 - D. 4
17. [Q17] Une ville compte 50 000 habitants et perd 300 habitants par an. Quel modèle est le plus adapté pour représenter l'évolution de sa population ?
- A. Une suite géométrique, car la population diminue.
 - B. Une suite arithmétique, car la variation absolue annuelle est constante (-300).
 - C. Une suite géométrique, car on multiplie chaque année par un coefficient.
 - D. Ni une suite arithmétique ni une suite géométrique.
18. [Q18] Un placement diminue de 5 % par an. Si le capital initial est $u_0 = 10\,000$ euros, quelle est l'expression de u_n (capital après n années) ?
- A. $u_n = 10\,000 - 500n$
 - B. $u_n = 10\,000 \times 1,05^n$
 - C. $u_n = 10\,000 \times 0,95^n$
 - D. $u_n = 10\,000 \times 0,05^n$

C7 — Lecture de code, boucle for/while, erreur dans un script

19. [Q19] On considère le programme Python suivant :

```
def terme(n):
    u = 2
    for k in range(n):
        u = 3 * u + 1
    return u
```

Quelle valeur renvoie l'appel `terme(3)` ?

- A. 7
 - B. 21
 - C. 64
 - D. 22
20. [Q20] On cherche le plus petit entier n tel que $u_n > 100$, où $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n$. Parmi les codes suivants, lequel est correct ?
- A.

```
u = 1
n = 0
while u > 100:
    u = 2 * u
    n = n + 1
```

```

B. u = 1
   n = 0
   while u ≤ 100:
       u = 2 * u
       n = n + 1
C. u = 1
   n = 0
   for k in range(100):
       u = 2 * u
       n = n + 1
D. u = 0
   n = 0
   while u ≤ 100:
       u = 2 * u
       n = n + 1

```

21. [Q21] On veut calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$ ou $u_k = 2^k$. Un élève écrit :

```

S = 0
for k in range(5):
    S = S + 2**k

```

Quelle erreur contient ce code ?

- A. L'accumulateur devrait être initialisé à 1.
- B. `range(5)` produit les indices 0, 1, 2, 3, 4 : le terme $u_5 = 2^5$ est omis. Il faudrait `range(6)`.
- C. Il faut écrire 2^k et non `2**k` en Python.
- D. Il faut une boucle `while` et non `for` pour calculer une somme.

Correction et diagnostics

Question	Capacité	Reponse	Distracteurs — erreur type et renvoi
Q1	C1	C	A : erreur de calcul partiel sur $2n^2$ — renvoi M1, étape 2 B : decalage d'indice ($n = 4$ au lieu de $n = 3$) — renvoi M1, étape 1 D : confusion n^2 et n dans l'évaluation — renvoi M1, étape 2
Q2	C1	B	A : arrêt prémature après 1 itération (v_1 confondu avec v_2) — renvoi M1, étape 3 C : substitution directe de $n = 2$ dans la relation — renvoi M1, étape 3 D : erreur arithmétique lors de la 2e itération — renvoi M1, étape 3
Q3	C1	B	A : confusion formule explicite / récurrence — renvoi M1, étape 1 C : inversion des définitions explicite / récurrence — renvoi M1, étape 1 D : confusion notation algorithmique / math. — renvoi R5
Q4	C2	C	A : terme constant -7 pris pour la raison — renvoi M2, étape 4 B : raison donnée comme expression de n — renvoi M2, étape 3 D : premier terme $u_0 = -3$ confondu avec la raison — renvoi M2, étape 3
Q5	C2	A	B : confusion u_1 et u_0 dans la formule explicite — renvoi M2, étape 4 C : application de $u_n = u_0 + nr$ avec $n = 6$ au lieu de $n - 1 = 5$ — renvoi M2, étape 4 D : même erreur C, présentée explicitement — renvoi M2, étape 4
Q6	C2	C	A : suite géométrique confondue avec suite arithmétique — renvoi M2, étape 1; M3 B : différence $u_{n+1} - u_n = 2n + 1$ non constante non vérifiée — renvoi M2, étapes 1-3 D : différence non constante non vérifiée — renvoi M2, étapes 1-3
Q7	C3	D	A : formule arithmétique utilisée à la place de la géométrique — renvoi M3, étape 5 B : decalage d'indice $u_n = u_1 \times q^{n-1}$ — renvoi M3, étape 5 C : inversion u_0 et q — renvoi M3, étape 5
Q8	C3	C	A : dénominateur lu comme raison (division $\neq$ multiplication) — renvoi M3, étape 2 B : oppose -3 au lieu de $1/3$ — renvoi M3, étape 2 D : valeur de $v_1 = 2$ confondue avec la raison — renvoi M3, étape 4
Q9	C3	C	A : preuve insuffisante (2 exemples $\neq$ démonstration générale) — renvoi M3, étape 4 B : terme nul impossible dans une suite géométrique — renvoi M3, étape 1 D : la raison peut être négative ou fractionnaire — renvoi M3
Q10	C4	B	A : $20 \times 10 = 200$ (moyenne $\times$ dernier terme) — renvoi M4, cas 1 C : $n = 19$ au lieu de $n = 20$ (confusion n et $n + 1$ termes) — renvoi M4, étape 1 D : oubli de diviser par 2 : $20 \times 21 = 420$ — renvoi M4, cas 1
Q11	C4	B	A : 4 termes au lieu de 5 (u_0 à u_3) — renvoi M4, étape 1 C : exposant 3^6 au lieu de 3^5 dans la formule — renvoi M4, étape 3 D : somme des indices $0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ confondue avec somme des termes — renvoi M4, cas 2
Q12	C4	C	A : nombre de termes = indice max (oubli du $+1$) — renvoi M4, étape 1 B : $14 - 1 = 13$ (soustraction au lieu d'addition $+1$) — renvoi M4, étape 1 D : $14 + 2 = 16$ (ajout de 2 au lieu de 1) — renvoi M4, étape 1
Q13	C5	C	A : signe de r mal interprété ($r < 0 \Rightarrow$ décroissante) — renvoi M5, Méthode A B : raison non utilisée pour la monotonie — renvoi M5, Méthode A D : raisonnement valable pour une suite quadratique, pas arithmétique — renvoi M5, Méthode A
Q14	C5	B	A : méthode A valide mais moins directe — renvoi M5, arbre de décision C : dérivée de $(0,8)^x$ hors programme de 1re — renvoi M5, arbre de décision D : observations sans preuve (quantificateur universel) — renvoi M5, Piège 1
Q15	C5	B	A : monotonie non uniforme sur $\mathbb{N}$ (non vérifiée) — renvoi M5, Méthode A C : $n > 2,5$ confondu avec $n \geq 2$; erreur de seuil — renvoi M5, Méthode A D : zéros de u_n confondus avec rang de changement de sens — renvoi M5, Méthode A; R3
Q16	C6	C	A : taux 0,04 confondu avec coefficient multiplicateur — renvoi M6, étape 4 B : taux 4 % lu 40 % (erreur de conversion) — renvoi M6, étape 4; R2 D : taux en % utilisé comme coefficient — renvoi M6, étape 4; R2
Q17	C6	B	A : sens de variation confondu avec type de modèle — renvoi M6, étape 3 C : variation absolue confondue avec variation relative — renvoi M6, étape 3 D : critère absolue/relative non appliqué — renvoi M6, étape 3
Q18	C6	C	A : modèle arithmétique utilisé pour une variation relative — renvoi M6, étape 3 B : coefficient 1,05 (hausse) au lieu de 0,95 (baisse) — renvoi M6, étape 4 D : taux 0,05 confondu avec coefficient multiplicateur — renvoi M6, étape 4; R2
Q19	C7	C	A : une seule itération exécutée ($v_1 = 7$) — renvoi M7, Modèle A B : erreur arithmétique lors de la 2e itération ($3 \times 7 + 1$ donne 21) — renvoi M7, Modèle A D : arrêt après 2 itérations ($\text{range}(3) = 3$ itérations) — renvoi M7, Piège 3
Q20	C7	B	A : condition <code>while</code> inversée (boucle ne s'exécute jamais) — renvoi M7, Modèle C, étape 2 C : boucle <code>for</code> inadaptée à la recherche de seuil — renvoi M7, Modèle C D : initialisation $v = \emptyset$ entraîne boucle infinie ($2 \times 0 = 0$) — renvoi M7, Piège 1
Q21	C7	B	A : initialiser $S = 0$ est correct pour un accumulateur de somme — renvoi M7, Modèle B C : <code>2**k</code> est la syntaxe Python correcte pour 2^k — renvoi R5 D : boucle <code>for</code> parfaitement adaptée pour une somme à n termes — renvoi M7, Modèle B

Reponses correctes

Q1	C	Q2	B	Q3	B	Q4	C
Q5	A	Q6	C	Q7	D	Q8	C
Q9	C	Q10	B	Q11	B	Q12	C
Q13	C	Q14	B	Q15	B	Q16	C
Q17	B	Q18	C	Q19	C	Q20	B
Q21	B						

Score : ... /21 Capacités à retravailler : C1 [☐Q1 ☐Q2 ☐Q3] C2 [☐Q4 ☐Q5 ☐Q6] C3 [☐Q7 ☐Q8 ☐Q9] C4 [☐Q10 ☐Q11 ☐Q12] C5 [☐Q13 ☐Q14 ☐Q15] C6 [☐Q16 ☐Q17 ☐Q18] C7 [☐Q19 ☐Q20 ☐Q21]

1SPE-SUITES-EV-A

Corrigé

Exercice 1

(6 points) — C1, C2, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer); Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

Question 1 — Calcul des premiers termes.

Appliquer la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + 4$ en partant de $u_0 = 3$.

On applique la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + 4$:

$$u_1 = u_0 + 4 = 3 + 4 = 7, \quad u_2 = u_1 + 4 = 7 + 4 = 11, \quad u_3 = u_2 + 4 = 11 + 4 = 15.$$

Question 2 — Démonstration de la nature arithmétique.

Définition : une suite est arithmétique si la différence $u_{n+1} - u_n$ est constante.

Pour tout entier naturel n , on calcule la différence entre deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 4) - u_n = 4.$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante, égale à 4, pour tout $n \in \mathbb{N}$.**Conclusion :** La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 4$ et de premier terme $u_0 = 3$.Question 3 — Expression de u_n en fonction de n .

Formule du terme général : $u_n = u_0 + n \times r$.

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = 3 + 4n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Question 4 — Étude des variations.

Pour étudier les variations, on signe $u_{n+1} - u_n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 4 > 0.$$

La différence est strictement positive pour tout $n \in \mathbb{N}$.**Conclusion :** La suite (u_n) est **strictement croissante**.

Remarque : on peut aussi argumenter que la raison $r = 4 > 0$, ce qui suffit pour conclure qu'une suite arithmétique est strictement croissante.

Exercice 2

(5 points) — C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer); Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer); Q3 : 2 pts (calculer)

Question 1 — Calcul des premiers termes.

Substituer $n = 0$, $n = 1$, $n = 2$ dans la formule $u_n = 2 \times 3^n$.

$$u_0 = 2 \times 3^0 = 2 \times 1 = 2, \quad u_1 = 2 \times 3^1 = 6, \quad u_2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18.$$

Question 2 — Démonstration de la nature géométrique.

Pour tout entier naturel n , $u_n = 2 \times 3^n > 0$, donc le quotient est bien défini. On calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \times 3^{n+1}}{2 \times 3^n} = 3^{n+1-n} = 3.$$

Définition : une suite est géométrique si le quotient u_{n+1}/u_n est constant et non nul.

Le quotient est constant, égal à 3, et non nul.

Conclusion : La suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $u_0 = 2$.

Question 3 — Calcul de la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.

On somme les termes de rang $k = 0$ à $k = 4$, soit 5 termes. En appliquant la formule avec $u_0 = 2$, $q = 3$ et $n = 4$:

$$S = u_0 \times \frac{q^5 - 1}{q - 1} = 2 \times \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = 2 \times \frac{243 - 1}{2} = 243 - 1 = 242.$$

Formule de la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique :
 $S = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$

$$S = 242.$$

Vérification : $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 242$. ✓

Exercice 3**(5 points) — C6, C7**

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser) ; Q2 : 1 pt (calculer) ; Q3 : 1 pt (calculer) ; Q4a : 1 pt (communiquer) ; Q4b : 1 pt (chercher)

Question 1 — Modélisation.

Au bout de n années, le capital vaut u_n . Durant l'année suivante, il produit des intérêts à hauteur de $5\% \times u_n = 0,05 u_n$. Le capital au bout de $(n + 1)$ années est donc :

$$u_{n+1} = u_n + 0,05 u_n = (1 + 0,05) u_n = 1,05 u_n.$$

Chaque année, le capital est multiplié par le coefficient $1 + \text{taux} = 1,05$.

Question 2 — Nature de la suite et expression de u_n .

La relation $u_{n+1} = 1,05 u_n$ montre que (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,05$ et de premier terme $u_0 = 800$.

La relation $u_{n+1} = q \cdot u_n$ définit une suite géométrique de raison q .

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$u_n = 800 \times 1,05^n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Question 3 — Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = 800 \times 1,05 = 840 \text{ €}, \quad u_2 = 800 \times 1,05^2 = 800 \times 1,1025 = 882 \text{ €}.$$

Question 4 — Algorithme Python.**4a. Explication de la boucle.**

- ▶ $u = 800$ et $n = 0$ initialisent le capital et le compteur d'années.
- ▶ La condition `while u < 1200` : tant que le capital n'a pas atteint 1 200 €, on continue.
- ▶ $u = 1,05 * u$: on applique la relation de récurrence (le capital est multiplié par 1,05).
- ▶ $n = n + 1$: on incrémente le compteur d'années.
- ▶ Quand la boucle se termine, n contient le nombre d'années nécessaires.

La boucle `while` répète le corps tant que la condition est vraie.

4b. Valeur affichée et vérification.

Le programme affiche $n = 9$.

Vérification algébrique : On résout $800 \times 1,05^n \geq 1200$, soit $1,05^n \geq \frac{1200}{800} = 1,5$.

On cherche le plus petit n tel que $800 \times 1,05^n \geq 1200$.

n	$800 \times 1,05^n$ (arrondi à l'euro)	$\geq 1\,200$?
7	1 127	non
8	1 183	non
9	1 242	oui

Le capital dépasse 1 200 € pour la première fois après 9 années. ✓

Exercice 4

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (raisonner); Q2 : 2 pts (calculer, raisonner); Q3 : 1 pt (chercher)

Question 1 — Nature de (v_n) .

Pour tout entier naturel n , on calcule :

$$v_{n+1} - v_n = [2(n+1) + 5] - (2n + 5) = 2n + 2 + 5 - 2n - 5 = 2.$$

La différence $v_{n+1} - v_n = 2$ est constante pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $v_0 = 2 \times 0 + 5 = 5$.

Question 2 — Expression de S_n .

S_n est la somme des $(n+1)$ termes $v_0, v_1, \dots, v_n$ de la suite arithmétique (v_n) .

Le premier terme est $v_0 = 5$ et le dernier terme est $v_n = 2n + 5$. En appliquant la formule :

$$S_n = \frac{(n+1)(v_0 + v_n)}{2} = \frac{(n+1)(5 + 2n + 5)}{2} = \frac{(n+1)(2n + 10)}{2} = \frac{(n+1) \times 2(n+5)}{2}.$$

$$\boxed{S_n = (n+1)(n+5)} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Vérification pour $n = 1$: $S_1 = v_0 + v_1 = 5 + 7 = 12$ et $(1+1)(1+5) = 2 \times 6 = 12$. ✓

Question 3 — Plus petit entier n tel que $S_n > 200$.

On cherche le plus petit entier naturel n vérifiant $(n+1)(n+5) > 200$.

La fonction $(n+1)(n+5) = n^2 + 6n + 5$ est croissante pour $n \geq 0$. On cherche par encadrement :

$$n = 11 : S_{11} = 12 \times 16 = 192 \leq 200.$$

$$n = 12 : S_{12} = 13 \times 17 = 221 > 200.$$

Conclusion : Le plus petit entier naturel n tel que $S_n > 200$ est $n = 12$.

Évaluation 1SPE-SUITES-EV-A 55 min

Exercice 1

(6 points)

Capacités C1, C2, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = 3 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 4.$$

- Calculer u_1, u_2 et u_3 . (1 pt — calculer)
- Démontrer que la suite (u_n) est arithmétique. Préciser sa raison r et son premier terme u_0 . (2 pts — raisonner, communiquer)
- Exprimer u_n en fonction de n pour tout entier naturel n . (1 pt — calculer)
- Étudier les variations de la suite (u_n) . Justifier rigoureusement. (2 pts — raisonner, communiquer)

Exercice 2**(5 points)****Capacités C3, C4**

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = 2 \times 3^n.$$

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 . (1 pt — calculer)
2. Démontrer que la suite (u_n) est géométrique. Préciser sa raison q et son premier terme u_0 . (2 pts — raisonner, communiquer)
3. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.
On rappelle que, pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$, on a :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

(2 pts — calculer)

Exercice 3**(5 points)****Capacités C6, C7**

Compétences évaluées : modéliser, chercher, communiquer.

Léa place 800 € sur un livret d'épargne qui rapporte 5 % d'intérêts par an. On note u_n le capital disponible (en euros) au bout de n années entières (avec $u_0 = 800$).

1. Justifier que, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 1,05 \times u_n.$$

(1 pt — modéliser)

2. En déduire que (u_n) est une suite géométrique. Exprimer u_n en fonction de n . (1 pt — calculer)
3. Calculer u_1 et u_2 (valeurs exactes, ou arrondies à l'euro si nécessaire). (1 pt — calculer)
4. Le programme Python suivant a pour objectif de déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 1\,200$.

```

1 u = 800
2 n = 0
3 while u < 1200:
4     u = 1.05 * u
5     n = n + 1
6 print(n)

```

- a) Expliquer, ligne par ligne, le rôle de la boucle while. (1 pt — communiquer)
- b) Indiquer la valeur affichée par print(n) et vérifier par le calcul que cette valeur est cohérente. (1 pt — chercher)

Exercice 4**(4 points)****Capacités C4, C5**

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$v_n = 2n + 5.$$

Pour tout entier naturel n , on pose :

$$S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_n = \sum_{k=0}^n v_k.$$

1. Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme $v_0 = 5$. (1 pt — raisonner)
2. Établir que $S_n = (n + 1)(n + 5)$ pour tout entier naturel n .
On rappelle que la somme de $(n + 1)$ termes d'une suite arithmétique de premier terme a et de dernier terme b vaut $\frac{(n + 1)(a + b)}{2}$. (2 pts — calculer, raisonner)
3. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $S_n > 200$. (1 pt — chercher)

1SPE-SUITES-EV-B

Corrigé

Exercice 1

(6 points) — C1, C2, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer); Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

Question 1 — Calcul des premiers termes.

On applique la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + 3$:

$$u_1 = u_0 + 3 = 5 + 3 = 8, \quad u_2 = u_1 + 3 = 8 + 3 = 11, \quad u_3 = u_2 + 3 = 11 + 3 = 14.$$

Question 2 — Démonstration de la nature arithmétique.

Pour tout entier naturel n , on calcule la différence entre deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 3) - u_n = 3.$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante, égale à 3, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 5$.

Question 3 — Expression de u_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = 5 + 3n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Question 4 — Étude des variations.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 3 > 0.$$

La différence est strictement positive pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : La suite (u_n) est **strictement croissante**.

Remarque : on peut aussi argumenter que la raison $r = 3 > 0$, ce qui suffit pour conclure qu'une suite arithmétique est strictement croissante.

Exercice 2

(5 points) — C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer); Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer); Q3 : 2 pts (calculer)

Question 1 — Calcul des premiers termes.

Substituer $n = 0$, $n = 1$, $n = 2$ dans la formule $u_n = 4 \times 2^n$.

$$u_0 = 4 \times 2^0 = 4 \times 1 = 4, \quad u_1 = 4 \times 2^1 = 8, \quad u_2 = 4 \times 2^2 = 4 \times 4 = 16.$$

Question 2 — Démonstration de la nature géométrique.

Pour tout entier naturel n , $u_n = 4 \times 2^n > 0$, donc le quotient est bien défini. On calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4 \times 2^{n+1}}{4 \times 2^n} = 2^{n+1-n} = 2.$$

Définition : une suite est géométrique si le quotient u_{n+1}/u_n est constant et non nul.

Le quotient est constant, égal à 2, et non nul.

Conclusion : La suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 4$.

Question 3 — Calcul de la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.

On somme les termes de rang $k = 0$ à $k = 4$, soit 5 termes. En appliquant la formule avec $u_0 = 4$, $q = 2$ et $n = 4$:

$$S = u_0 \times \frac{q^5 - 1}{q - 1} = 4 \times \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 4 \times \frac{32 - 1}{1} = 4 \times 31 = 124.$$

Formule de la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique :
 $S = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$.

$$S = 124.$$

Vérification : $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 124$. ✓

Exercice 3

(5 points) — C6, C7

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser) ; Q2 : 1 pt (calculer) ; Q3 : 1 pt (calculer) ; Q4a : 1 pt (communiquer) ; Q4b : 1 pt (chercher)

Question 1 — Modélisation.

Au bout de n années, le capital vaut u_n . Durant l'année suivante, il produit des intérêts à hauteur de $4\% \times u_n = 0,04 u_n$. Le capital au bout de $(n + 1)$ années est donc :

Chaque année, le capital est multiplié par le coefficient $1 + \text{taux} = 1,04$.

$$u_{n+1} = u_n + 0,04 u_n = (1 + 0,04) u_n = 1,04 u_n.$$

Question 2 — Nature de la suite et expression de u_n .

La relation $u_{n+1} = 1,04 u_n$ montre que (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,04$ et de premier terme $u_0 = 1\,000$.

La relation $u_{n+1} = q \cdot u_n$ définit une suite géométrique de raison q .

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$u_n = 1\,000 \times 1,04^n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Question 3 — Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = 1\,000 \times 1,04 = 1\,040 \text{ €}, \quad u_2 = 1\,000 \times 1,04^2 = 1\,000 \times 1,0816 \approx 1\,082 \text{ €}.$$

Question 4 — Algorithme Python.

4a. Explication de la boucle.

La boucle while répète le corps tant que la condition est vraie.

- ▶ $u = 1000$ et $n = 0$ initialisent le capital et le compteur d'années.
- ▶ La condition while $u < 1500$: tant que le capital n'a pas atteint 1 500 €, on continue.
- ▶ $u = 1.04 * u$: on applique la relation de récurrence (le capital est multiplié par 1,04).
- ▶ $n = n + 1$: on incrémente le compteur d'années.
- ▶ Quand la boucle se termine, n contient le nombre d'années nécessaires.

4b. Valeur affichée et vérification.

Le programme affiche $n = 11$.

On cherche le plus petit n tel que $1\,000 \times 1,04^n \geq 1\,500$.

Vérification algébrique : On résout $1\,000 \times 1,04^n \geq 1\,500$, soit $1,04^n \geq \frac{1\,500}{1\,000} = 1,5$.

n	$1\,000 \times 1,04^n$ (arrondi à l'euro)	$\geq 1\,500$?
9	1 423	non
10	1 480	non
11	1 539	oui

Le capital dépasse 1 500 € pour la première fois après 11 années. ✓

Exercice 4

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (raisonner); Q2 : 2 pts (calculer, raisonner); Q3 : 1 pt (chercher)

Question 1 — Nature de (v_n) .

Pour tout entier naturel n , on calcule :

$$v_{n+1} - v_n = [2(n+1) + 5] - (2n + 5) = 2n + 2 + 5 - 2n - 5 = 2.$$

La différence $v_{n+1} - v_n = 2$ est constante pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $v_0 = 2 \times 0 + 5 = 5$.

Question 2 — Expression de S_n .

S_n est la somme des $(n+1)$ termes $v_0, v_1, \dots, v_n$ de la suite arithmétique (v_n) .

Le premier terme est $v_0 = 5$ et le dernier terme est $v_n = 2n + 5$. En appliquant la formule :

$$S_n = \frac{(n+1)(v_0 + v_n)}{2} = \frac{(n+1)(5 + 2n + 5)}{2} = \frac{(n+1)(2n + 10)}{2} = \frac{(n+1) \times 2(n+5)}{2}.$$

$$\boxed{S_n = (n+1)(n+5)} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Vérification pour $n = 1$: $S_1 = v_0 + v_1 = 5 + 7 = 12$ et $(1+1)(1+5) = 2 \times 6 = 12$. ✓

Question 3 — Plus petit entier n tel que $S_n > 200$.

On cherche le plus petit entier naturel n vérifiant $(n+1)(n+5) > 200$.

La fonction $(n+1)(n+5) = n^2 + 6n + 5$ est croissante pour $n \geq 0$. On cherche par encadrement :

$$n = 11 : S_{11} = 12 \times 16 = 192 \leq 200.$$

$$n = 12 : S_{12} = 13 \times 17 = 221 > 200.$$

Conclusion : Le plus petit entier naturel n tel que $S_n > 200$ est $n = 12$.

Évaluation 1SPE-SUITES-EV-B 55 min

Exercice 1

(6 points)

Capacités C1, C2, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = 5 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 3.$$

- Calculer u_1 , u_2 et u_3 . (1 pt — calculer)
- Démontrer que la suite (u_n) est arithmétique. Préciser sa raison r et son premier terme u_0 . (2 pts — raisonner, communiquer)
- Exprimer u_n en fonction de n pour tout entier naturel n . (1 pt — calculer)
- Étudier les variations de la suite (u_n) . Justifier rigoureusement. (2 pts — raisonner, communiquer)

Exercice 2**(5 points)****Capacités C3, C4**

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = 4 \times 2^n.$$

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 . (1 pt — calculer)
2. Démontrer que la suite (u_n) est géométrique. Préciser sa raison q et son premier terme u_0 . (2 pts — raisonner, communiquer)
3. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.
On rappelle que, pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$, on a :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

(2 pts — calculer)

Exercice 3**(5 points)****Capacités C6, C7**

Compétences évaluées : modéliser, chercher, communiquer.

Lucas place 1 000 € sur un livret d'épargne qui rapporte 4 % d'intérêts par an. On note u_n le capital disponible (en euros) au bout de n années entières (avec $u_0 = 1\,000$).

1. Justifier que, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 1,04 \times u_n.$$

(1 pt — modéliser)

2. En déduire que (u_n) est une suite géométrique. Exprimer u_n en fonction de n . (1 pt — calculer)
3. Calculer u_1 et u_2 (valeurs exactes, ou arrondies à l'euro si nécessaire). (1 pt — calculer)
4. Le programme Python suivant a pour objectif de déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 1\,500$.

```

1 u = 1000
2 n = 0
3 while u < 1500:
4     u = 1.04 * u
5     n = n + 1
6 print(n)

```

- a) Expliquer, ligne par ligne, le rôle de la boucle while. (1 pt — communiquer)
- b) Indiquer la valeur affichée par `print(n)` et vérifier par le calcul que cette valeur est cohérente. (1 pt — chercher)

Exercice 4**(4 points)****Capacités C4, C5**

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$v_n = 2n + 5.$$

Pour tout entier naturel n , on pose :

$$S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = \sum_{k=0}^n v_k.$$

1. Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme $v_0 = 5$. (1 pt — raisonner)
2. Établir que $S_n = (n + 1)(n + 5)$ pour tout entier naturel n .
On rappelle que la somme de $(n + 1)$ termes d'une suite arithmétique de premier terme a et de dernier terme b vaut $\frac{(n + 1)(a + b)}{2}$. (2 pts — calculer, raisonner)
3. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $S_n > 200$. (1 pt — chercher)

Rappel — Calcul littéral

Développer : supprimer les parenthèses en distribuant la multiplication.

Règles de base :

$$a(b + c) = ab + ac \quad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Identités remarquables :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Factoriser : mettre en évidence un facteur commun ou reconnaître une identité remarquable.

Réduire : regrouper les termes de même degré (mêmes puissances de la variable).

1SPE-SUITES-FR-R1-EX1

⌚ 5 min

Exercice 58 ♦

Développer et réduire chaque expression.

1. $A = 3(2n + 5)$
2. $B = (n + 1)^2 - n^2$
3. $C = (2n - 1)(n + 3)$
4. $D = n(n + 1) - n(n - 1)$

1SPE-SUITES-FR-R1-EX1

On distribue le facteur 3 sur chaque terme de la parenthèse.

On développe $(n + 1)^2$ avec l'identité $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, puis on simplifie.

On utilise la double distributivité : $(2n - 1)(n + 3)$.

On factorise d'abord le facteur n commun aux deux termes, puis on réduit.

1SPE-SUITES-FR-R1-EX2

⌚ 5 min

Corrigé

Question 1.

$$A = 3(2n + 5) = 3 \times 2n + 3 \times 5 = 6n + 15.$$

Question 2.

$$B = (n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1.$$

Question 3.

$$C = (2n - 1)(n + 3) = 2n \times n + 2n \times 3 + (-1) \times n + (-1) \times 3 = 2n^2 + 6n - n - 3 = 2n^2 + 5n - 3.$$

Question 4.

$$D = n(n + 1) - n(n - 1) = n[(n + 1) - (n - 1)] = n \times 2 = 2n.$$

Exercice 59 ♦

Factoriser chaque expression.

1. $E = 6n^2 + 9n$
2. $F = (n + 2)^2 - 9$
3. $G = n^2 - 4n + 4$
4. $H = 5n(n - 3) + 2(n - 3)$

Corrigé

Question 1.

$$E = 6n^2 + 9n = 3n(2n + 3).$$

Question 2.

$$F = (n + 2)^2 - 9 = (n + 2)^2 - 3^2 = [(n + 2) - 3][(n + 2) + 3] = (n - 1)(n + 5).$$

Question 3.

$$G = n^2 - 4n + 4 = (n - 2)^2.$$

Question 4.

$$H = 5n(n - 3) + 2(n - 3) = (n - 3)(5n + 2).$$

1SPE-SUITES-FR-R1-EX2

Facteur commun $3n$ aux deux termes.On reconnaît la forme $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ avec $a = n + 2$ et $b = 3$.On reconnaît le carré d'un binôme $(a - b)^2$ avec $a = n$, $b = 2$.Le facteur $(n - 3)$ est commun aux deux termes : on le met en évidence.1SPE-SUITES-FR-R1-EX3
⌚ 6 min

Exercice 60

Dans le cadre des suites, on rencontre souvent des expressions du type $u_{n+1} - u_n$. Développer et réduire les expressions suivantes, où n est un entier naturel.

1. $P = (n + 1)^2 + 3(n + 1) - (n^2 + 3n)$

2. $Q = 2(n + 1) + 5 - (2n + 5)$

3. $R = 3(n + 1)^2 - 1 - (3n^2 - 1)$

Corrigé

Question 1.

$$\begin{aligned} P &= (n^2 + 2n + 1) + (3n + 3) - n^2 - 3n \\ &= n^2 + 2n + 1 + 3n + 3 - n^2 - 3n \\ &= 2n + 4. \end{aligned}$$

Question 2.

$$Q = 2n + 2 + 5 - 2n - 5 = 2.$$

La différence est constante, égale à 2, indépendante de n : c'est la raison d'une suite arithmétique !

Question 3.

$$\begin{aligned} R &= 3n^2 + 6n + 3 - 1 - 3n^2 + 1 \\ &= 6n + 3. \end{aligned}$$

1SPE-SUITES-FR-R1-EX3

On développe $(n + 1)^2 = n^2 + 2n + 1$ et $3(n + 1) = 3n + 3$, puis on simplifie.

On distribue et on simplifie terme à terme.

On développe $3(n + 1)^2 = 3(n^2 + 2n + 1) = 3n^2 + 6n + 3$.

Exercice 61

Simplifier les expressions suivantes (fractions algébriques), en supposant que les dénominateurs sont non nuls.

1. $\frac{6n^2 + 4n}{2n}$

2. $\frac{(n + 1)(n + 2)}{n + 2}$

3. $\frac{n^2 - 1}{n - 1}$

4. Montrer que $\frac{(n + 1)^2 - n^2}{2n + 1} = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Corrigé

1SPE-SUITES-FR-R1-EX4
⌚ 6 minOn factorise le numérateur : $6n^2 + 4n = 2n(3n + 2)$, puis on simplifie par $2n$.

Question 1.

$$\frac{6n^2 + 4n}{2n} = \frac{2n(3n + 2)}{2n} = 3n + 2.$$

Question 2.

$$\frac{(n+1)(n+2)}{n+2} = n+1.$$

Question 3.

$$\frac{n^2 - 1}{n - 1} = \frac{(n-1)(n+1)}{n-1} = n+1.$$

Question 4. On a vu en exercice 1, question 2, que $(n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$. Donc :

$$\frac{(n+1)^2 - n^2}{2n+1} = \frac{2n+1}{2n+1} = 1.$$

Ce résultat est valable pour tout $n \in \mathbb{N}$ (avec $2n+1 \neq 0$, ce qui est toujours vrai). □

Le facteur $(n+2)$ est commun au numérateur et au dénominateur.

On factorise $n^2 - 1 = (n-1)(n+1)$, puis on simplifie par $(n-1)$.

On développe le numérateur, on factorise, puis on simplifie.

Rappel — Pourcentages et coefficient multiplicateur

Coefficient multiplicateur (CM) :

Appliquer une évolution de $t\%$ revient à multiplier par le coefficient multiplicateur :

$$CM = 1 + \frac{t}{100} \quad (\text{hausse}) \quad CM = 1 - \frac{t}{100} \quad (\text{baisse}).$$

Évolutions successives : les coefficients multiplicateurs se *multiplient*.

Si on applique successivement des évolutions de CM $q_1, q_2, \dots, q_k$, le coefficient global est $q_1 \times q_2 \times \dots \times q_k$.

Lien avec les suites géométriques : si une grandeur évolue de $t\%$ à chaque étape, elle suit une suite géométrique de raison $CM = 1 + \frac{t}{100}$.

1SPE-SUITES-FR-R2-EX1
⌚ 5 min

Exercice 62 ♦

Pour chaque situation, donner le coefficient multiplicateur correspondant.

1. Une augmentation de 8 %.
2. Une réduction de 15 %.
3. Une augmentation de 0,5 %.
4. Une réduction de 100 %.

1SPE-SUITES-FR-R2-EX1

Corrigé

Une hausse de $t\%$ donne $CM = 1 + t/100$.

Une baisse de $t\%$ donne $CM = 1 - t/100$.

Question 1. Augmentation de 8 % : $CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$.

Question 2. Réduction de 15 % : $CM = 1 - \frac{15}{100} = 0,85$.

Question 3. Augmentation de 0,5 % : $CM = 1 + \frac{0,5}{100} = 1,005$.

Question 4. Réduction de 100 % : $CM = 1 - \frac{100}{100} = 0$. La grandeur est annulée.

1SPE-SUITES-FR-R2-EX2
⌚ 6 min

Exercice 63 ♦

Un capital de 2 000 € est placé sur un livret qui rapporte 3 % d'intérêts par an.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Quel est le capital après 1 an ? Après 2 ans ?

- Exprimer le capital C_n après n années en fonction de n .
- Calculer le capital après 10 ans (arrondir à l'euro).

Corrigé

Question 1. $CM = 1 + \frac{3}{100} = 1,03$.

Question 2.

$$C_1 = 2000 \times 1,03 = 2060 \text{ €}.$$

$$C_2 = C_1 \times 1,03 = 2060 \times 1,03 = 2121,80 \text{ €}.$$

Question 3. À chaque année, le capital est multiplié par 1,03. Donc :

$$C_n = 2000 \times 1,03^n.$$

1SPE-SUITES-FR-R2-EX2

+3 % par an correspond à multiplier par 1,03 chaque année.

On applique n fois le CM à partir de C_0 : formule d'une suite géométrique.

La suite (C_n) est une suite géométrique de premier terme $C_0 = 2000$ et de raison $q = 1,03$.

Question 4.

$$C_{10} = 2000 \times 1,03^{10} \approx 2000 \times 1,3439 \approx 2688 \text{ €}.$$

Exercice 64

1SPE-SUITES-FR-R2-EX3

⌚ 6 min

Un article vaut 500 €. Son prix augmente de 10 % la première année, puis diminue de 10 % la deuxième année.

- Calculer le prix après la première année.
- Calculer le prix après la deuxième année.
- Le prix est-il revenu à 500 € ? Justifier à l'aide des coefficients multiplicateurs.
- Quel taux global d'évolution (en %) cela représente-t-il sur les deux ans ?

Corrigé

1SPE-SUITES-FR-R2-EX3

Question 1.

$$P_1 = 500 \times 1,10 = 550 \text{ €}.$$

Question 2.

$$P_2 = 550 \times 0,90 = 495 \text{ €}.$$

Question 3. Non. Le coefficient multiplicateur global est $1,10 \times 0,90 = 0,99 \neq 1$. Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % ne se compensent pas exactement.

Question 4. $CM_{global} = 0,99$, donc le taux global est :

$$t = (0,99 - 1) \times 100 = -1 \text{ %}.$$

Les évolutions successives se composent en multipliant les CM, pas en additionnant les taux.

Sur deux ans, le prix a diminué de 1 %.

Exercice 65

1SPE-SUITES-FR-R2-EX4

⌚ 7 min

Un bactérie se multiplie : la population double toutes les heures. Au départ, on compte 500 bactéries.

- Quel est le taux d'augmentation horaire ? Le coefficient multiplicateur ?
- Donner l'expression de la population P_n après n heures.
- Après combien d'heures la population dépasse-t-elle 10 000 bactéries ? (On pourra essayer les valeurs $n = 1, 2, 3, 4, 5$.)
- Quel serait le coefficient multiplicateur si la population triplait chaque heure ?

Corrigé

1SPE-SUITES-FR-R2-EX4

Question 1. La population double : le taux est +100 % et le coefficient multiplicateur est $CM = 2$.

Doubler signifie multiplier par 2, soit une augmentation de 100 %.

Question 2.

$$P_n = 500 \times 2^n.$$

Question 3. On calcule les premières valeurs :

n	P_n
0	500
1	1 000
2	2 000
3	4 000
4	8 000
5	16 000

La population dépasse 10 000 à partir de $n = 5$, c'est-à-dire après 5 heures.

Question 4. Si la population triplait, $CM = 3$ (augmentation de 200 %).

Rappel — Fonctions : image, antécédent, variations

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

Image : $f(a)$ est l'image de a par f (on calcule en substituant $x = a$).

Antécédent : a est un antécédent de b par f si $f(a) = b$ (on résout l'équation $f(x) = b$).

Sens de variation :

- ▶ f est **croissante** sur I si, pour tous $x_1 < x_2$ dans I , $f(x_1) \leq f(x_2)$.
- ▶ f est **décroissante** sur I si, pour tous $x_1 < x_2$ dans I , $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Lien avec les suites : une suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$ hérite des variations de f sur $\mathbb{N}$.

1SPE-SUITES-FR-R3-EX1
⌚ 5 min

Exercice 66 ♦

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$.
2. Vérifier que 1 est un antécédent de 0 par f .
3. Trouver tous les antécédents de 0 par f .
4. La suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$ pour $n \geq 2$ est-elle croissante ?

1SPE-SUITES-FR-R3-EX1

On substitue les valeurs de n dans la formule de f .

Vérifier qu'un nombre est un antécédent revient à trouver tous les antécédents. Calculer son image et vérifier qu'elle vaut la valeur cible.

f est un trinôme de coefficient dominant positif, croissant à droite de son sommet $x_s = 3/4 < 2$.

1SPE-SUITES-FR-R3-EX2
⌚ 5 min

Corrigé

Question 1.

$$f(0) = 2 \times 0 - 3 \times 0 + 1 = 1.$$

$$f(1) = 2 \times 1 - 3 \times 1 + 1 = 2 - 3 + 1 = 0.$$

$$f(2) = 2 \times 4 - 3 \times 2 + 1 = 8 - 6 + 1 = 3.$$

$$f(3) = 2 \times 9 - 3 \times 3 + 1 = 18 - 9 + 1 = 10.$$

Question 2. On calcule $f(1) = 0$ (voir question 1). Donc $f(1) = 0$: 1 est bien un antécédent de 0.

Question 3. On résout $2x^2 - 3x + 1 = 0$. On factorise :

$$2x^2 - 3x + 1 = (2x - 1)(x - 1) = 0.$$

Donc $x = \frac{1}{2}$ ou $x = 1$. Les antécédents de 0 sont $\frac{1}{2}$ et 1.

Question 4. Le sommet de la parabole est en $x_s = \frac{3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}$. Pour $n \geq 2 > \frac{3}{4}$, la fonction f est croissante, donc la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ est croissante.

Exercice 67 ♦

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^+$ par $g(x) = \frac{x+4}{x+1}$.

1. Calculer $g(0)$, $g(1)$, $g(3)$ et $g(9)$.
2. Montrer que, pour tout $x \geq 0$, $g(x) - 1 = \frac{3}{x+1}$.
3. En déduire le sens de variation de g sur $[0; +\infty[$.

Corrigé

1SPE-SUITES-FR-R3-EX2

Question 1.

$$g(0) = \frac{0+4}{0+1} = 4. \quad g(1) = \frac{1+4}{1+1} = \frac{5}{2} = 2,5.$$

$$g(3) = \frac{3+4}{3+1} = \frac{7}{4} = 1,75. \quad g(9) = \frac{9+4}{9+1} = \frac{13}{10} = 1,3.$$

Question 2.

$$g(x) - 1 = \frac{x+4}{x+1} - 1 = \frac{x+4}{x+1} - \frac{x+1}{x+1} = \frac{(x+4) - (x+1)}{x+1} = \frac{3}{x+1}.$$

On met au même dénominateur en écrivant $1 = \frac{x+1}{x+1}$.

Sur $[0; +\infty[$, quand x augmente, $x+1$ augmente, donc $\frac{3}{x+1}$ diminue, donc $g(x) = 1 + \frac{3}{x+1}$ diminue.

1SPE-SUITES-FR-R3-EX3
⌚ 5 min

Exercice 68

On considère la suite (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = 3n - 7$.

1. Calculer v_0 , v_1 , v_2 , v_5 .
2. À quel rang n a-t-on $v_n = 0$?
3. À partir de quel rang n a-t-on $v_n > 0$?
4. La suite (v_n) est-elle croissante? Justifier brièvement.

Corrigé

1SPE-SUITES-FR-R3-EX3

Question 1.

$$v_0 = 3 \times 0 - 7 = -7. \quad v_1 = 3 \times 1 - 7 = -4. \quad v_2 = 3 \times 2 - 7 = -1. \quad v_5 = 3 \times 5 - 7 = 8.$$

Question 2. On résout $v_n = 0$:

$$3n - 7 = 0 \implies n = \frac{7}{3} \approx 2,33.$$

Mais n doit être un entier naturel : $\frac{7}{3}$ n'est pas entier, donc il n'existe pas de rang $n \in \mathbb{N}$ tel que $v_n = 0$.

Question 3. $v_n > 0 \iff 3n - 7 > 0 \iff n > \frac{7}{3}$. Le plus petit entier vérifiant cette condition est $n = 3$. Pour tout $n \geq 3$, $v_n > 0$.

$n > 7/3$ et n entier signifie $n \geq 3$.

Question 4. $v_{n+1} - v_n = [3(n+1) - 7] - [3n - 7] = 3 > 0$. La suite est croissante.

Exercice 69

1SPE-SUITES-FR-R3-EX4
⌚ 6 min

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 2^x$.

1. Calculer $h(0)$, $h(1)$, $h(2)$, $h(-1)$.
2. La suite (w_n) définie par $w_n = 2^n$ est-elle croissante? Décroissante? Justifier.
3. Résoudre $h(x) = 8$.
4. Pour quelle valeur de n entier a-t-on $w_n = 32$?

Corrigé

Question 1.

$$h(0) = 2^0 = 1. \quad h(1) = 2^1 = 2. \quad h(2) = 2^2 = 4. \quad h(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

On calcule le quotient $w_{n+1}/w_n = 2^{n+1}/2^n = 2 > 1$: tous les termes sont positifs et le rapport est > 1 , donc la suite est croissante.

Question 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_{n+1} = 2^{n+1} = 2 \times 2^n = 2w_n$. Comme $w_n = 2^n > 0$ et $w_{n+1} = 2w_n > w_n$, la suite est strictement croissante.

Question 3. $h(x) = 8 \iff 2^x = 8 = 2^3 \iff x = 3$.

Question 4. $w_n = 32 = 2^5$. Donc $2^n = 2^5$, soit $n = 5$.

Rappel — Inégalités et signe d'une expression

Résoudre une inégalité : isoler l'inconnue, en pensant à *changer le sens de l'inégalité* si l'on multiplie ou divise par un nombre négatif.

Signe d'un produit / quotient :

$$(+)\times(+)=(+), \quad (+)\times(-)=(-), \quad (-)\times(-)=(+).$$

Règle des signes : même signe $\Rightarrow$ résultat positif; signes différents $\Rightarrow$ résultat négatif.

Tableau de signes : pour étudier le signe d'un produit de facteurs, on dresse un tableau donnant le signe de chaque facteur, puis on applique la règle des signes.

Utilisation dans les suites : pour montrer qu'une suite est croissante, on montre que $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout n .

Exercice 70 ♦

Résoudre les inégalités suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $3x + 5 > 11$
2. $-2x + 4 \leq 10$
3. $\frac{x-3}{4} \geq 1$
4. $2x - 1 > 5x + 8$

Corrigé

Question 1.

$$3x + 5 > 11 \iff 3x > 6 \iff x > 2.$$

Solution : $x \in]2; +\infty[$.

Question 2.

$$-2x + 4 \leq 10 \iff -2x \leq 6 \iff x \geq -3.$$

Solution : $x \in [-3; +\infty[$.

Question 3.

$$\frac{x-3}{4} \geq 1 \iff x-3 \geq 4 \iff x \geq 7.$$

Solution : $x \in [7; +\infty[$.

Question 4.

$$2x - 1 > 5x + 8 \iff -3x > 9 \iff x < -3.$$

Solution : $x \in]-\infty; -3[$.

On soustrait 5 des deux membres, puis on divise par 3 (positif : le sens ne change pas).

On divise par -2 : le sens de l'inégalité s'inverse !

On regroupe les termes en x à gauche. On divise par -3 : le sens change.

Exercice 71 ♦

Étudier le signe de chaque expression à l'aide d'un tableau de signes.

1. $A(x) = (x-2)(x+3)$
2. $B(x) = (2x-6)(x+1)$
3. $C(x) = \frac{x-1}{x+2}$ (pour $x \neq -2$)

Corrigé

Question 1. Tableau de signes de $A(x) = (x-2)(x+3)$:

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$		
$x-2$		-	-	0	+	
$x+3$		-	0	+	+	
$A(x)$		+	0	-	0	+

$A(x) > 0$ sur $] -\infty; -3[\cup]2; +\infty[$.

Question 2. $B(x) = (2x-6)(x+1) = 2(x-3)(x+1)$.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$		
$x-3$		-	-	0	+	
$x+1$		-	0	+	+	+
$B(x)$		+	0	-	0	+

$B(x) > 0$ sur $] -\infty; -1[\cup]3; +\infty[$.

Question 3. Valeurs critiques : $x = 1$ (numérateur nul) et $x = -2$ (dénominateur nul).

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$		
$x-1$		$-$	$-$	0	$+$	
$x+2$		$-$	$\parallel$	$+$	$+$	$+$
$C(x)$		$+$	$\parallel$	$-$	0	$+$

$C(x) > 0$ sur $] -\infty; -2[\cup]1; +\infty[$, $C(x) < 0$ sur $] -2; 1[$.

Exercice 72

Pour chacune des suites suivantes, étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation.

1. (u_n) définie par $u_n = 4n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. (v_n) définie par $v_n = -2n + 10$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. (w_n) définie par $w_n = n^2 - n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. (Indication : factoriser $w_{n+1} - w_n$.)

Corrigé

Question 1.

$$u_{n+1} - u_n = [4(n+1) - 3] - [4n - 3] = 4n + 4 - 3 - 4n + 3 = 4.$$

$u_{n+1} - u_n = 4 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite (u_n) est strictement croissante.

Question 2.

$$v_{n+1} - v_n = [-2(n+1) + 10] - [-2n + 10] = -2n - 2 + 10 + 2n - 10 = -2.$$

$v_{n+1} - v_n = -2 < 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite (v_n) est strictement décroissante.

Question 3.

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= [(n+1)^2 - (n+1)] - [n^2 - n] \\ &= n^2 + 2n + 1 - n - 1 - n^2 + n = 2n. \end{aligned}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2n \geq 0$. Donc $w_{n+1} - w_n \geq 0$, et la suite (w_n) est croissante (au sens large).

Exercice 73

On considère la suite (a_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $a_n = \frac{2n+3}{n+1}$.

1SPE-SUITES-FR-R4-EX2

Les racines de A sont $x = 2$ et $x = -3$.

On factorise
 $2x - 6 = 2(x - 3)$. Les racines sont $x = -1$ et $x = 3$.

1SPE-SUITES-FR-R4-EX3
 ⌚ 6 min

1SPE-SUITES-FR-R4-EX3

On calcule la différence $u_{n+1} - u_n$ et on étudie son signe.

On factorise la différence pour analyser son signe.

1SPE-SUITES-FR-R4-EX4
 ⌚ 7 min

1. Calculer a_0, a_1, a_2, a_3 .
2. Calculer $a_{n+1} - a_n$ et simplifier.
3. En déduire le sens de variation de (a_n) .
4. Vérifier que votre réponse est cohérente avec les valeurs calculées en question 1.

1SPE-SUITES-FR-R4-EX4

Corrigé

Question 1.

$$a_0 = \frac{3}{1} = 3. \quad a_1 = \frac{5}{2} = 2,5. \quad a_2 = \frac{7}{3} \approx 2,33. \quad a_3 = \frac{9}{4} = 2,25.$$

Question 2.

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{2(n+1)+3}{(n+1)+1} - \frac{2n+3}{n+1} = \frac{2n+5}{n+2} - \frac{2n+3}{n+1} \\ &= \frac{(2n+5)(n+1) - (2n+3)(n+2)}{(n+2)(n+1)}. \end{aligned}$$

Développons le numérateur :

$$\begin{aligned} (2n+5)(n+1) &= 2n^2 + 2n + 5n + 5 = 2n^2 + 7n + 5, \\ (2n+3)(n+2) &= 2n^2 + 4n + 3n + 6 = 2n^2 + 7n + 6. \end{aligned}$$

Donc :

$$a_{n+1} - a_n = \frac{(2n^2 + 7n + 5) - (2n^2 + 7n + 6)}{(n+2)(n+1)} = \frac{-1}{(n+1)(n+2)}.$$

Question 3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)(n+2) > 0$, donc :

$$a_{n+1} - a_n = \frac{-1}{(n+1)(n+2)} < 0.$$

La suite (a_n) est strictement décroissante.

Question 4. Les valeurs $3 > 2,5 > 2,33 > 2,25$ sont bien décroissantes. Cela confirme le résultat.

Rappel — Python : variables, boucles

Variable : une case mémoire nommée qui stocke une valeur. `x = 5` affecte la valeur 5 à la variable `x`.

Boucle for : répète un bloc un nombre *connu* de fois.

`for k in range(n):` exécute le bloc pour $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ (n itérations).

Boucle while : répète un bloc tant qu'une *condition* est vraie.

`while condition:` — attention à toujours modifier les variables de la condition pour éviter une boucle infinie.

Affichage : `print(valeur)` affiche la valeur dans la console.

Opérations courantes : `+`, `-`, `*`, `/` (division), `//` (quotient entier), `**` (puissance).

1SPE-SUITES-FR-R5-EX1
⌚ 6 min

Exercice 74

Lire et compléter.

On considère le programme suivant (ne pas chercher à l'exécuter, lire ligne par ligne) :

```
u = 3
for k in range(4):
    u = u + 2
    print(u)
```

- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle ? Quelles sont les valeurs de k ?
- Recopier et compléter le tableau de trace d'exécution :

Tour	k	u (après $u = u + 2$)
1	0	...
2	1	...
3	2	...
4	3	...

- Quelle suite mathématique ce programme calcule-t-il ?
- Que faudrait-il modifier pour calculer les 10 premiers termes ?

Corrigé

Question 1. La boucle s'exécute 4 fois. Les valeurs de k sont 0, 1, 2, 3.

Question 2. Tableau de trace :

Tour	k	u
1	0	$3 + 2 = 5$
2	1	$5 + 2 = 7$
3	2	$7 + 2 = 9$
4	3	$9 + 2 = 11$

Question 3. Ce programme calcule les termes de la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$. La formule explicite est $u_n = 3 + 2n$.

Question 4. Il suffit de remplacer `range(4)` par `range(10)` pour obtenir 10 valeurs (u_1 à u_{10}).

1SPE-SUITES-FR-R5-EX1

`range(4)` génère
0, 1, 2, 3 : 4 valeurs,
donc 4 itérations.

La valeur initiale est
 $u_0 = 3$ et on ajoute 2 à
chaque étape : c'est une
suite arithmétique de
raison 2.

Exercice 75

Écrire et analyser des programmes Python (en pseudo-code ou en décrivant les instructions).

1SPE-SUITES-FR-R5-EX2

⌚ 7 min

- Décrire ce que fait le programme suivant :

```
u = 1
for k in range(5):
    u = 3 * u
print(u)
```

- Quelle valeur affiche-t-il ? Justifier sans calculer terme à terme.
- Écrire un programme similaire qui calcule et affiche le terme u_8 de la suite géométrique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $q = 5$.
- Qu'afficherait ce programme si on remplaçait `range(5)` par `range(0)` ?

Corrigé

1SPE-SUITES-FR-R5-EX2

On part de $u = 1$ (qui est
 u_0) et on multiplie par 3 à
chaque tour.

Question 1. Le programme calcule les termes successifs d'une suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison 3. Après 5 itérations, il affiche u_5 .

Question 2. La formule explicite est $u_n = 1 \times 3^n = 3^n$. Donc $u_5 = 3^5 = 243$. Le programme affiche 243.

Question 3. Programme pour u_8 avec $u_0 = 2$ et $q = 5$:

```
u = 2
for k in range(8):
    u = 5 * u
print(u)
```

On vérifie : $u_8 = 2 \times 5^8 = 2 \times 390625 = 781250$.

`range(0)` est vide : la boucle ne s'exécute pas du tout.

1SPE-SUITES-FR-R5-EX3
7 min

Question 4. Avec `range(0)`, la boucle ne s'exécute pas. On affiche la valeur initiale $u = 1$, ce qui correspond à u_0 .

Exercice 76

On souhaite trouver le plus petit entier n tel que $2^n > 1000$.

1. Lire le programme suivant et expliquer le rôle de chaque ligne :

```
u = 1
n = 0
while u ≤ 1000:
    u = 2 * u
    n = n + 1
print(n, u)
```

2. Donner un tableau de trace des 4 premiers tours de boucle.
3. Quelle valeur de n le programme affiche-t-il ? Vérifier que $2^9 \leq 1000$ et $2^{10} > 1000$.
4. Que se passerait-il si on oubliait la ligne `n = n + 1` ?

1SPE-SUITES-FR-R5-EX3

On initialise les variables avant la boucle, puis on met à jour les deux à chaque tour.

Corrigé

Question 1.

- `u = 1` : initialise u à $u_0 = 1 = 2^0$.
- `n = 0` : initialise le compteur d'indice.
- `while u ≤ 1000` : la boucle tourne tant que u ne dépasse pas 1000.
- `u = 2 * u` : calcule le terme suivant ($u_{n+1} = 2u_n$).
- `n = n + 1` : avance l'indice.
- `print(n, u)` : affiche le premier rang n et la valeur u dépassant 1000.

Question 2. Tableau des 4 premiers tours :

Tour	n	u
1	1	2
2	2	4
3	3	8
4	4	16

Question 3. Le programme affiche $n = 10$ et $u = 1024$. Vérification : $2^9 = 512 \leq 1000$ et $2^{10} = 1024 > 1000$. ✓

Question 4. Si on oublie `n = n + 1`, la variable u continue d'être mise à jour (la boucle se termine), mais n reste à 0 à la fin : on afficherait le mauvais rang.

Exercice 77

On considère la suite (s_n) définie par $s_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n$ (somme des n premiers entiers).

1. Calculer à la main s_1, s_2, s_3, s_4 .
2. Expliquer pourquoi le programme ci-dessous calcule s_n pour n donné :

```
n = 10
S = 0
for k in range(1, n+1):
    S = S + k
print(S)
```

3. Que vaut `range(1, n+1)` pour $n = 4$? Dérouler la boucle manuellement pour $n = 4$.
4. Modifier le programme pour calculer la somme $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ (somme des carrés).

Sans mise à jour de n , la variable de condition u est bien modifiée, mais on ne saurait pas quel rang a été atteint. Si on oubliait `u = 2 * u`, la boucle serait infinie.

Corrigé

Question 1.

$$s_1 = 1. \quad s_2 = 1 + 2 = 3. \quad s_3 = 1 + 2 + 3 = 6. \quad s_4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.$$

Question 2. $S = 0$ initialise la somme à 0. La boucle `for k in range(1, n+1):` fait parcourir k les valeurs $1, 2, \dots, n$. À chaque étape, on ajoute k à l'accumulateur S . En fin de boucle, S vaut $1 + 2 + \dots + n = s_n$.

S joue le rôle d'un accumulateur : on lui ajoute chaque entier successif.

Question 3. `range(1, 5)` génère 1, 2, 3, 4 pour $n = 4$. Trace pour $n = 4$:

Tour	k	S
1	1	$0 + 1 = 1$
2	2	$1 + 2 = 3$
3	3	$3 + 3 = 6$
4	4	$6 + 4 = 10$

`print(S)` affiche 10, ce qui correspond bien à $s_4 = 10$. ✓

Question 4. Programme pour la somme des carrés :

```
n = 10
S = 0
for k in range(1, n+1):
    S = S + k**2
print(S)
```

Il suffit de remplacer k par $k**2$ dans l'accumulateur.

Exercice 78

1SPE-SUITES-RE-C1-EX1
⌚ 8 min

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 2n + 3$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 .
2. Calculer u_{10} .
3. Calculer u_{n+1} (on développera et simplifiera).

Corrigé

1SPE-SUITES-RE-C1-EX1

Question 1. On remplace n par 0, 1, 2, 3 :

$$\begin{aligned} u_0 &= 0^2 - 2 \times 0 + 3 = 3. \\ u_1 &= 1^2 - 2 \times 1 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2. \\ u_2 &= 2^2 - 2 \times 2 + 3 = 4 - 4 + 3 = 3. \\ u_3 &= 3^2 - 2 \times 3 + 3 = 9 - 6 + 3 = 6. \end{aligned}$$

Question 2.

$$u_{10} = 10^2 - 2 \times 10 + 3 = 100 - 20 + 3 = 83.$$

Question 3.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= (n+1)^2 - 2(n+1) + 3 \\ &= n^2 + 2n + 1 - 2n - 2 + 3 \\ &= n^2 + 2. \end{aligned}$$

Pour une formule explicite, on substitue directement la valeur de n .

Pour $n = 10$, on substitue directement : pas besoin de calculer u_9 .
Pour calculer u_{n+1} , on remplace n par $n+1$ partout dans la formule.

Exercice 79

1SPE-SUITES-RE-C1-EX2
⌚ 8 min

Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 3v_n - 4$.

1. Calculer v_1, v_2 et v_3 .
2. Calculer v_4 .
3. Sans calculer tous les termes intermédiaires : si on vous dit que $v_{10} = 5$, que vaut v_{11} ?

Coup de pouce 1. Pour calculer v_1 , remplacer n par 0 dans la relation $v_{n+1} = 3v_n - 4$: on obtient $v_1 = 3v_0 - 4$. Utiliser $v_0 = 5$.

1SPE-SUITES-RE-C1-EX2

Pour une suite par récurrence, on calcule terme après terme en appliquant la relation.

Corrigé

Question 1. On applique $v_{n+1} = 3v_n - 4$ avec les valeurs successives :

$$v_1 = 3v_0 - 4 = 3 \times 5 - 4 = 15 - 4 = 11.$$

$$v_2 = 3v_1 - 4 = 3 \times 11 - 4 = 33 - 4 = 29.$$

$$v_3 = 3v_2 - 4 = 3 \times 29 - 4 = 87 - 4 = 83.$$

Question 2.

$$v_4 = 3v_3 - 4 = 3 \times 83 - 4 = 249 - 4 = 245.$$

Question 3. La relation est $v_{n+1} = 3v_n - 4$. Avec $v_{10} = 5$:

$$v_{11} = 3 \times 5 - 4 = 11.$$

On retrouve la valeur de v_1 : la suite a un comportement particulier !

La relation de récurrence s'applique pour tout n , quelle que soit la valeur de v_n .

1SPE-SUITES-RE-C1-EX3

⌚ 10 min

Exercice 80 ♦

Soit la suite (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = \frac{2n+1}{n+2}$.

1. Calculer w_0, w_1, w_2 et w_5 .
2. Calculer w_{n+1} et simplifier.
3. Vérifier numériquement que votre formule pour w_{n+1} donne bien w_1 pour $n = 0$.

1SPE-SUITES-RE-C1-EX3

Corrigé

Question 1.

$$w_0 = \frac{2 \times 0 + 1}{0 + 2} = \frac{1}{2}. \quad w_1 = \frac{2 \times 1 + 1}{1 + 2} = \frac{3}{3} = 1. \quad w_2 = \frac{2 \times 2 + 1}{2 + 2} = \frac{5}{4}. \quad w_5 = \frac{2 \times 5 + 1}{5 + 2} = \frac{11}{7}.$$

Question 2. On remplace n par $n + 1$:

$$w_{n+1} = \frac{2(n+1) + 1}{(n+1) + 2} = \frac{2n+3}{n+3}.$$

Question 3. Pour $n = 0$: $w_{0+1} = w_1 = \frac{2 \times 0 + 3}{0 + 3} = \frac{3}{3} = 1$. On retrouve bien $w_1 = 1$. ✓

1SPE-SUITES-RE-C2-EX1

⌚ 10 min

Exercice 81 ♦

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5n - 3$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .
2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ et simplifier.
3. En déduire que la suite (u_n) est arithmétique et préciser sa raison r et son premier terme u_0 .
4. Retrouver u_0 et r directement depuis la formule $u_n = 5n - 3$.

Corrigé

1SPE-SUITES-RE-C2-EX1

Question 1.

$$u_0 = 5 \times 0 - 3 = -3. \quad u_1 = 5 - 3 = 2. \quad u_2 = 10 - 3 = 7. \quad u_3 = 15 - 3 = 12.$$

Question 2.

$$u_{n+1} - u_n = [5(n+1) - 3] - [5n - 3] = 5n + 5 - 3 - 5n + 3 = 5.$$

On calcule $u_{n+1} - u_n$ en remplaçant n par $n+1$ dans la formule.

Question 3. La différence $u_{n+1} - u_n = 5$ est constante (indépendante de n). Donc la suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = -3$.

Question 4. La formule $u_n = 5n - 3$ est de la forme $u_0 + rn$. On lit directement : $u_0 = -3$ et $r = 5$. Cela confirme le résultat précédent.

Une suite est arithmétique si et seulement si la différence $u_{n+1} - u_n$ est constante. Pour une suite arithmétique, $u_n = u_0 + rn$. On identifie : coefficient de n = raison, terme constant = premier terme.

Exercice 82

On donne les premiers termes d'une suite : $v_0 = 7, v_1 = 4, v_2 = 1, v_3 = -2$.

1. Calculer $v_1 - v_0, v_2 - v_1, v_3 - v_2$.
2. La suite (v_n) est-elle arithmétique ? Si oui, préciser sa raison.
3. Exprimer le terme général v_n en fonction de n .
4. Calculer v_{20} et v_{100} .

Coup de pouce 1. Pour vérifier qu'une suite est arithmétique, il suffit de vérifier que toutes les différences consécutives $v_{n+1} - v_n$ sont égales à la même constante r . Ici, calculer les trois différences demandées.

Corrigé

1SPE-SUITES-RE-C2-EX2

Question 1.

$$v_1 - v_0 = 4 - 7 = -3. \quad v_2 - v_1 = 1 - 4 = -3. \quad v_3 - v_2 = -2 - 1 = -3.$$

Question 2. Les différences consécutives sont toutes égales à -3 . La suite (v_n) est arithmétique de raison $r = -3$.

Question 3. $v_n = v_0 + rn = 7 + (-3)n = 7 - 3n$.

Question 4.

$$v_{20} = 7 - 3 \times 20 = 7 - 60 = -53.$$

$$v_{100} = 7 - 3 \times 100 = 7 - 300 = -293.$$

Les trois différences sont toutes égales à -3 : c'est la caractérisation d'une suite arithmétique. Formule du terme général d'une suite arithmétique : $v_n = v_0 + r \times n$.

Exercice 83

Une suite arithmétique (w_n) vérifie $w_3 = 11$ et $w_7 = 23$.

1. Montrer que la raison r vérifie $w_7 = w_3 + 4r$, puis calculer r .
2. Calculer w_0 .
3. Exprimer w_n en fonction de n .
4. À quel rang n a-t-on $w_n = 50$?

1SPE-SUITES-RE-C2-EX3
⌚ 12 min

Corrigé

1SPE-SUITES-RE-C2-EX3

Question 1. $w_7 = w_3 + 4r$ car on passe de w_3 à w_7 en ajoutant 4 fois la raison.

$$23 = 11 + 4r \Rightarrow 4r = 12 \Rightarrow r = 3.$$

Question 2. $w_3 = w_0 + 3r$, donc $w_0 = w_3 - 3r = 11 - 9 = 2$.

Question 3. $w_n = w_0 + rn = 2 + 3n$.

Pour une suite arithmétique, $w_7 = w_3 + (7 - 3) \times r$.

Question 4. $w_n = 50 \Leftrightarrow 2 + 3n = 50 \Leftrightarrow 3n = 48 \Leftrightarrow n = 16$.

1SPE-SUITES-RE-C3-EX1
⌚ 10 min

Exercice 84 ◆

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3 \times 2^n$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .
2. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. En déduire que (u_n) est géométrique. Préciser la raison q et le premier terme u_0 .
4. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

1SPE-SUITES-RE-C3-EX1

Corrigé

Question 1.

$$u_0 = 3 \times 2^0 = 3. \quad u_1 = 3 \times 2^1 = 6. \quad u_2 = 3 \times 2^2 = 12. \quad u_3 = 3 \times 2^3 = 24.$$

Question 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3 \times 2^n \neq 0$. Le quotient est :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \times 2^{n+1}}{3 \times 2^n} = 2^{n+1-n} = 2.$$

Question 3. Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2$ est constant. La suite (u_n) est donc géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 3$.

Question 4. $u_{n+1} = q \times u_n = 2u_n$.

1SPE-SUITES-RE-C3-EX2
⌚ 10 min

Exercice 85 ◆

On donne les premiers termes : $v_0 = 2, v_1 = 6, v_2 = 18, v_3 = 54$.

1. Calculer $\frac{v_1}{v_0}, \frac{v_2}{v_1}, \frac{v_3}{v_2}$.
2. La suite est-elle géométrique ? Si oui, donner la raison q .
3. Exprimer le terme général v_n en fonction de n .
4. Calculer v_6 .

Coup de pouce 1. Une suite (v_n) est géométrique si le quotient $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ est le même pour tous les termes (et si les termes sont tous non nuls). Calculer les trois quotients demandés et les comparer.

1SPE-SUITES-RE-C3-EX2

Corrigé

Question 1.

$$\frac{v_1}{v_0} = \frac{6}{2} = 3. \quad \frac{v_2}{v_1} = \frac{18}{6} = 3. \quad \frac{v_3}{v_2} = \frac{54}{18} = 3.$$

Question 2. Les quotients consécutifs sont tous égaux à 3. La suite (v_n) est géométrique de raison $q = 3$.

Question 3. $v_n = v_0 \times q^n = 2 \times 3^n$.

Question 4.

$$v_6 = 2 \times 3^6 = 2 \times 729 = 1\,458.$$

Les quotients sont tous égaux à 3 : la suite est géométrique de raison 3.
Formule : $v_n = v_0 \times q^n$.

1SPE-SUITES-RE-C3-EX3
⌚ 12 min

Exercice 86 ◆

Une suite géométrique (w_n) vérifie $w_0 = 5$ et $w_3 = 40$.

1. Montrer que $w_3 = w_0 \times q^3$, puis calculer q .
2. Exprimer w_n en fonction de n .

3. Calculer w_5 .

4. Montrer que (w_n) est une suite géométrique en vérifiant que le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n}$ est bien constant.

Corrigé

Question 1. Pour une suite géométrique de raison q : $w_n = w_0 \times q^n$. Donc $w_3 = 5q^3$.

$$5q^3 = 40 \Rightarrow q^3 = 8 \Rightarrow q = 2.$$

Question 2. $w_n = 5 \times 2^n$.

Question 3.

$$w_5 = 5 \times 2^5 = 5 \times 32 = 160.$$

Question 4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = 5 \times 2^n \neq 0$. Le quotient :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{5 \times 2^{n+1}}{5 \times 2^n} = 2.$$

Le quotient est constant égal à 2 : la suite (w_n) est bien géométrique de raison 2.

Exercice 87

1SPE-SUITES-RE-C4-EX1

⌚ 10 min

On rappelle que $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ pour tout $n \geq 1$.

- Vérifier cette formule pour $n = 5$ en calculant la somme directement et en appliquant la formule.
- Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 20$.
- Calculer $6 + 7 + 8 + \dots + 15$. (Indication : exprimer cette somme comme différence de deux sommes.)
- Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 3$ et raison $r = 2$. Calculer $u_0 + u_1 + \dots + u_9$.

Corrigé

1SPE-SUITES-RE-C4-EX1

Question 1. Somme directe : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$. Formule : $\frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2} = 15$. ✓

Question 2.

$$1 + 2 + \dots + 20 = \frac{20 \times 21}{2} = \frac{420}{2} = 210.$$

Question 3.

$$6 + 7 + \dots + 15 = \frac{15 \times 16}{2} - \frac{5 \times 6}{2} = 120 - 15 = 105.$$

Question 4. Les termes sont $u_k = 3 + 2k$ pour $k = 0, 1, \dots, 9$. Il y a 10 termes, $u_0 = 3$ et $u_9 = 3 + 18 = 21$.

$$u_0 + u_1 + \dots + u_9 = \frac{(u_0 + u_9) \times 10}{2} = \frac{(3 + 21) \times 10}{2} = \frac{240}{2} = 120.$$

$$6 + 7 + \dots + 15 = (1 + \dots + 15) - (1 + \dots + 5).$$

On peut utiliser la formule somme d'une suite arithmétique : $S = \frac{(\text{premier} + \text{dernier}) \times \text{nombre de termes}}{2}$.

Exercice 88

1SPE-SUITES-RE-C4-EX2

⌚ 10 min

On rappelle que pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$ et de premier terme u_0 :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Soit la suite (v_n) définie par $v_n = 3^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Vérifier que (v_n) est géométrique. Donner v_0 et la raison q .
- Calculer $v_0 + v_1 + v_2 + v_3$ directement.
- Appliquer la formule pour $n = 3$ et vérifier que l'on obtient le même résultat.
- Calculer $v_0 + v_1 + \dots + v_9$.

Coup de pouce 1. Pour la question 3, on a $u_0 = v_0 = 1$, $q = 3$, $n = 3$. La formule donne $1 \times \frac{1 - 3^{3+1}}{1 - 3} = \frac{1 - 81}{-2}$. Calculer cette expression.

1SPE-SUITES-RE-C4-EX2

Corrigé

$v_{n+1}/v_n = 3^{n+1}/3^n = 3$: quotient constant.

Question 1. $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = 3$. Le quotient est constant : (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 3^0 = 1$ et de raison $q = 3$.

Question 2.

$$v_0 + v_1 + v_2 + v_3 = 1 + 3 + 9 + 27 = 40.$$

Question 3.

$$1 \times \frac{1 - 3^4}{1 - 3} = \frac{1 - 81}{-2} = \frac{-80}{-2} = 40.$$

On retrouve le même résultat. ✓

Question 4.

$$v_0 + v_1 + \dots + v_9 = 1 \times \frac{1 - 3^{10}}{1 - 3} = \frac{1 - 59049}{-2} = \frac{-59048}{-2} = 29\,524.$$

On applique la formule avec $u_0 = 1$, $q = 3$, $n = 3$.

1SPE-SUITES-RE-C4-EX3

⌚ 12 min

Exercice 89 ♦

Un épargnant place 100 € par mois sur un livret. Au bout du 1^{er} mois, le livret contient 100 €. Au bout du 2^e mois : 200 €. Etc. On note $S_n = 100n$ la somme après n mois.

En réalité, le livret offre 0,5 % d'intérêts par mois. Ainsi le 1^{er} versement de 100 € vaut au bout de n mois : $100 \times 1,005^{n-1}$. Le k^e versement (effectué au début du mois k) vaut au bout du n^e mois : $100 \times 1,005^{n-k}$.

1. Exprimer la somme totale T_n après n mois comme une somme géométrique.
2. La raison de cette suite géométrique est $q = 1,005$. Combien de termes y a-t-il dans T_n ?
3. Calculer T_{12} (arrondir à l'euro près).
4. Comparer T_{12} à 1 200 € (versements sans intérêts).

1SPE-SUITES-RE-C4-EX3

Corrigé

Question 1. $T_n = 100 \times 1,005^{n-1} + 100 \times 1,005^{n-2} + \dots + 100 \times 1,005^0 = 100(1 + 1,005 + \dots + 1,005^{n-1})$.

Question 2. Il y a n termes (du rang 0 au rang $n - 1$).

Question 3.

$$T_{12} = 100 \times \frac{1 - 1,005^{12}}{1 - 1,005} \approx 100 \times \frac{1 - 1,0617}{-0,005} \approx 100 \times \frac{-0,0617}{-0,005} \approx 100 \times 12,336 \approx 1\,234 \text{ €}.$$

Question 4. $T_{12} \approx 1\,234 \text{ €} > 1\,200 \text{ €}$. Les intérêts composés rapportent environ 34 € de plus sur 12 mois.

1SPE-SUITES-RE-C5-EX1

⌚ 10 min

Exercice 90 ♦

Étudier le sens de variation de la suite (u_n) définie par $u_n = -3n + 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, par la méthode de la différence.

1. Calculer $u_{n+1} - u_n$ et simplifier.
2. Quel est le signe de $u_{n+1} - u_n$?
3. Conclure sur le sens de variation de (u_n) .
4. Calculer u_0, u_1, u_2 et vérifier la cohérence.

1SPE-SUITES-RE-C5-EX1

Corrigé

Méthode de la différence : on calcule $u_{n+1} - u_n$ et on étudie son signe.

Question 1.

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} - u_n &= [-3(n+1) + 8] - [-3n + 8] \\
 &= -3n - 3 + 8 + 3n - 8 \\
 &= -3.
 \end{aligned}$$

Question 2. $u_{n+1} - u_n = -3 < 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 3. La différence est strictement négative pour tout n . Donc la suite (u_n) est strictement décroissante.

Si $u_{n+1} - u_n < 0$ pour tout n , la suite est strictement décroissante.

Question 4.

$$u_0 = 8. \quad u_1 = 5. \quad u_2 = 2.$$

On a bien $8 > 5 > 2$: la suite est décroissante. ✓

Exercice 91

1SPE-SUITES-RE-C5-EX2
⌚ 12 min

Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{2} + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer v_1, v_2, v_3 .
2. Calculer $v_{n+1} - v_n$ en fonction de v_n , et simplifier.
3. On admet que $v_n > 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire le signe de $v_{n+1} - v_n$, puis le sens de variation de (v_n) .

Coup de pouce 1. Pour la question 2, écrire $v_{n+1} - v_n = \frac{v_n}{2} + 3 - v_n$ et regrouper les termes en v_n .

Corrigé

1SPE-SUITES-RE-C5-EX2

Question 1.

$$\begin{aligned}
 v_1 &= \frac{10}{2} + 3 = 5 + 3 = 8. \\
 v_2 &= \frac{8}{2} + 3 = 4 + 3 = 7. \\
 v_3 &= \frac{7}{2} + 3 = 3,5 + 3 = 6,5.
 \end{aligned}$$

Question 2.

$$v_{n+1} - v_n = \left(\frac{v_n}{2} + 3 \right) - v_n = 3 - \frac{v_n}{2} = \frac{6 - v_n}{2}.$$

On exprime v_{n+1} grâce à la relation de récurrence, puis on soustrait v_n .

Question 3. On admet $v_n > 6$ pour tout n . Alors $6 - v_n < 0$, donc :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{6 - v_n}{2} < 0.$$

Si $v_n > 6$, alors $6 - v_n < 0$, donc $\frac{6 - v_n}{2} < 0$.

La suite (v_n) est strictement décroissante. (Cela est cohérent : $10 > 8 > 7 > 6,5 > \dots$)

Exercice 92

1SPE-SUITES-RE-C5-EX3
⌚ 12 min

Soit la suite (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4} \right)^n$.

1. Calculer w_0, w_1, w_2 .
2. Calculer le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n}$ pour tout n .
3. En déduire le sens de variation de (w_n) , en justifiant à partir du quotient.
4. La suite est-elle minorée ? Majorée ? Par quelle(s) valeur(s) ?

Corrigé

Question 1.

$$w_0 = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}. \quad w_1 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}. \quad w_2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{1}{2} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{32}.$$

Question 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0$. Le quotient :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^n} = \frac{3}{4}.$$

Question 3. Le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{3}{4}$ satisfait $0 < \frac{3}{4} < 1$. Comme les termes sont positifs et le quotient est compris entre 0 et 1, chaque terme est plus petit que le précédent : la suite est strictement décroissante.

Question 4. Tous les termes sont strictement positifs ($w_n > 0$) : la suite est minorée par 0. Le terme maximum est $w_0 = \frac{1}{2}$: la suite est majorée par $\frac{1}{2}$.

Exercice 93

Un particulier dépose 500 € sur un livret d'épargne qui rapporte 2 % d'intérêts par an. On note C_n le capital (en euros) après n années.

1. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n .
2. Montrer que (C_n) est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme.
3. Exprimer C_n en fonction de n .
4. Calculer le capital après 5 ans et après 10 ans (arrondir à l'euro).

Corrigé

Chaque année, le capital est multiplié par le coefficient multiplicateur associé à +2 %.

Le quotient $C_{n+1}/C_n = 1,02$ est constant : suite géométrique.

Question 1. Chaque année, le capital est augmenté de 2 % :

$$C_{n+1} = C_n + 0,02 \times C_n = C_n(1 + 0,02) = 1,02 \times C_n.$$

Question 2. Le rapport $\frac{C_{n+1}}{C_n} = 1,02$ est constant et les termes sont positifs. Donc (C_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,02$ et de premier terme $C_0 = 500$.

Question 3. $C_n = C_0 \times q^n = 500 \times 1,02^n$.

Question 4.

$$C_5 = 500 \times 1,02^5 \approx 500 \times 1,1041 \approx 552 \text{ €}.$$

$$C_{10} = 500 \times 1,02^{10} \approx 500 \times 1,2190 \approx 610 \text{ €}.$$

Exercice 94

Une ville comptait 20 000 habitants en 2020. Sa population diminue de 1,5 % chaque année. On note P_n la population n années après 2020.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Exprimer P_n en fonction de n .
3. Calculer P_5 (arrondir à l'entier).
4. À partir de quel rang n la population passe-t-elle sous 18 000 habitants ? (Essayer les valeurs $n = 5, 6, 7, 8$.)

Coup de pouce 1. Une diminution de 1,5 % correspond à un coefficient multiplicateur $CM = 1 - \frac{1,5}{100} = 0,985$. Donc $P_{n+1} = 0,985 \times P_n$.

Corrigé

Question 1. $CM = 1 - \frac{1,5}{100} = 0,985$.

Question 2. (P_n) est géométrique : $P_n = 20\,000 \times 0,985^n$.

Question 3.

$$P_5 = 20\,000 \times 0,985^5 \approx 20\,000 \times 0,9264 \approx 18\,528 \text{ habitants.}$$

Question 4.

n	P_n (arrondi)
5	18 528
6	18 250
7	17 976

$$P_7 \approx 17\,976 < 18\,000 \text{ et } P_6 \approx 18\,250 > 18\,000.$$

La population passe sous 18 000 à partir de $n = 7$, c'est-à-dire en 2027.

On calcule les valeurs successives jusqu'à passer sous le seuil de 18 000.

Exercice 95

1SPE-SUITES-RE-C6-EX3
⌚ 12 min

Une entreprise verse à un employé un salaire mensuel de 1 500 € la première année. Chaque année, le salaire augmente de 3 %.

Par ailleurs, un concurrent propose 1 600 € par mois la première année, avec une augmentation fixe de 30 € par an.

On note A_n le salaire annuel (mensuel) chez l'entreprise A après n années ($n = 0$: première année), et B_n le salaire chez l'entreprise B.

1. Exprimer A_n et B_n en fonction de n .
2. Calculer A_0, A_1, A_5 et B_0, B_1, B_5 .
3. À partir de quelle année n l'entreprise A devient-elle plus avantageuse que B? (Essayer $n = 3, 4, 5, 6, 7$.)

Corrigé

1SPE-SUITES-RE-C6-EX3

Question 1. (A_n) est géométrique (augmentation de 3 %) : $A_n = 1\,500 \times 1,03^n$.

(B_n) est arithmétique (augmentation fixe de 30 €) : $B_n = 1\,600 + 30n$.

Question 2.

$$A_0 = 1\,500. \quad A_1 \approx 1\,545. \quad A_5 \approx 1\,739.$$

$$B_0 = 1\,600. \quad B_1 = 1\,630. \quad B_5 = 1\,750.$$

Question 3.

n	A_n (arrondi)	B_n	Meilleure offre
3	1 637	1 690	B
4	1 686	1 720	B
5	1 739	1 750	B
6	1 791	1 780	A
7	1 845	1 810	A

À partir de $n = 6$ (la 7^e année), l'entreprise A devient plus avantageuse.

Exercice 96

1SPE-SUITES-RE-C7-EX1
⌚ 10 min

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On veut écrire un programme Python calculant u_n pour un rang n donné.

1. Dérouler à la main : calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Lire et analyser le programme suivant, ligne par ligne :

```
def terme(n):
    u = 1
    for k in range(n):
        u = 2 * u + 3
    return u
```

3. Vérifier que `terme(3)` renvoie bien la valeur de u_3 calculée en question 1.
4. Que renvoie `terme(0)` ? Est-ce cohérent ?

1SPE-SUITES-RE-C7-EX1

On applique la relation de récurrence $u_{n+1} = 2u_n + 3$ à partir de $u_0 = 1$.

La variable u joue le rôle du terme courant. La boucle `for` effectue exactement n mises à jour.

`range(0)` est vide : la boucle ne s'exécute pas. On renvoie directement u_0 .

1SPE-SUITES-RE-C7-EX2
⌚ 10 min

Corrigé

Question 1.

$$u_1 = 2 \times 1 + 3 = 5. \quad u_2 = 2 \times 5 + 3 = 13. \quad u_3 = 2 \times 13 + 3 = 29.$$

Question 2. Analyse ligne par ligne :

- `u = 1` : initialise u à $u_0 = 1$.
- `for k in range(n)` : répète n fois (pour $k = 0, 1, \dots, n-1$).
- `u = 2 * u + 3` : applique la relation $u_{n+1} = 2u_n + 3$.
- `return u` : renvoie le terme u_n après n mises à jour.

Question 3. Pour `terme(3)` : on applique 3 fois la relation en partant de $u_0 = 1$. Après 3 étapes, u vaut $29 = u_3$. ✓

Question 4. `terme(0)` : la boucle ne s'exécute pas (`range(0)` est vide). On renvoie $u = 1$. C'est bien $u_0 = 1$. Cohérent. ✓

Exercice 97 ♦

On considère la suite géométrique (v_n) de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = 3$.

On veut calculer la somme $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

1. Calculer S_3 directement (sans programme).
2. Lire le programme suivant :

```
def somme(n):
    v = 2
    S = 2
    for k in range(n):
        v = 3 * v
        S = S + v
    return S
```

3. Dérouler le programme pour $n = 3$ (tableau de trace) et vérifier que `somme(3)` renvoie S_3 .
4. Modifier ce programme pour calculer la somme $v_0 + v_1 + \dots + v_n$ si $v_0 = 5$ et $q = 4$.

Coup de pouce 1. Pour la question 3, faire un tableau avec les colonnes k, v et S . La valeur initiale est $v = 2$ et $S = 2$. À chaque tour, v devient $3 \times v$ et S s'augmente de la nouvelle valeur de v .

1SPE-SUITES-RE-C7-EX2

Corrigé

Question 1.

$$S_3 = v_0 + v_1 + v_2 + v_3 = 2 + 6 + 18 + 54 = 80.$$

Question 2. Analyse :

- `v = 2` : terme courant, initialisé à $v_0 = 2$.

- $S = 2$: accumulateur, initialisé à $S = v_0 = 2$ (le premier terme est déjà compté).
- **for** k **in** $\text{range}(n)$: n itérations pour ajouter $v_1, v_2, \dots, v_n$.
- $v = 3 * v$: calcule le terme suivant.
- $S = S + v$: ajoute ce terme à l'accumulateur.

Question 3.Tableau de trace pour $n = 3$:

Tour	k	v	S
init.	-	2	2
1	0	6	8
2	1	18	26
3	2	54	80

somme(3) renvoie $80 = S_3$. ✓**Question 4.** Pour $v_0 = 5$ et $q = 4$, on remplace les initialisations et le facteur de récurrence :

```
def somme(n):
    v = 5
    S = 5
    for k in range(n):
        v = 4 * v
        S = S + v
    return S
```

Exercice 98 ◆1SPE-SUITES-RE-C7-EX3
⌚ 12 min

Un capital de 1 000 € est placé avec un taux d'intérêt de 5 % par an. On cherche le plus petit rang n tel que le capital dépasse 1 500 €.

1. Écrire la relation de récurrence donnant le capital C_{n+1} en fonction de C_n .
2. Analyser le programme suivant et expliquer ce qu'il calcule :

```
C = 1000
n = 0
while C ≤ 1500:
    C = 1.05 * C
    n = n + 1
print(n, C)
```

3. Dérouler les 3 premiers tours de boucle (tableau de trace).
4. Déterminer la valeur de n affichée. Vérifier que $C_{n-1} \leq 1500$ et $C_n > 1500$.

Corrigé

1SPE-SUITES-RE-C7-EX3

Question 1. $C_{n+1} = 1,05 \times C_n$.

Question 2. Le programme initialise $C = C_0 = 1\,000$ et $n = 0$, puis fait évoluer le capital à chaque itération. La boucle **while** continue tant que le capital ne dépasse pas 1 500 €. À la fin, il affiche le premier rang n et la première valeur C dépassant 1 500 €.

Question 3. Tableau de trace (valeurs arrondies) :

Tour	n	C
init.	0	1 000
1	1	1 050
2	2	1 102,50
3	3	1 157,63

Question 4. $C_8 = 1\,000 \times 1,05^8 \approx 1\,477 \leq 1\,500$ et $C_9 = 1\,000 \times 1,05^9 \approx 1\,551 > 1\,500$.

Le programme affiche $n = 9$ et $C \approx 1\,551$ €. Le capital dépasse 1 500 € pour la première fois à l'issue de la 9^e année.

1SPE-SUITES-EX-001

Calcul direct des premiers termes par substitution.

Corrigé

Question 1. On calcule les trois premiers termes en substituant $n = 0$, $n = 1$ et $n = 2$ dans la formule $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n$.

$$u_0 = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^0 = 4 \times 1 = 4.$$

$$u_1 = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^1 = 4 \times \frac{3}{2} = \frac{12}{2} = 6.$$

$$u_2 = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 4 \times \frac{9}{4} = \frac{36}{4} = 9.$$

Donc $u_0 = 4$, $u_1 = 6$ et $u_2 = 9$.

Question 2. Pour tout entier naturel n , calculons le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

On a :

$$u_{n+1} = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} \quad \text{et} \quad u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n.$$

Puisque $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, le quotient est bien défini et vaut :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}}{4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n} = \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1-n} = \frac{3}{2}.$$

Ce quotient est constant, égal à $\frac{3}{2}$, indépendant de n .

Donc la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{3}{2}$.

Question 3. D'après la définition d'une suite géométrique, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{3}{2} \times u_n.$$

Pour montrer qu'une suite est géométrique, on calcule le quotient de deux termes consécutifs et on vérifie qu'il est constant.

La relation de récurrence s'obtient directement à partir de la définition de suite géométrique.

1SPE-SUITES-EX-002

Calcul direct par substitution de la valeur de n dans la formule explicite.

Corrigé

Question 1. On substitue $n = 0$, $n = 1$ et $n = 2$ dans $u_n = 3n + 2$.

$$u_0 = 3 \times 0 + 2 = 0 + 2 = 2.$$

$$u_1 = 3 \times 1 + 2 = 3 + 2 = 5.$$

$$u_2 = 3 \times 2 + 2 = 6 + 2 = 8.$$

Donc $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et $u_2 = 8$.

Question 2. On substitue $n = 10$ dans la formule :

$$u_{10} = 3 \times 10 + 2 = 30 + 2 = 32.$$

Donc $u_{10} = 32$.

Question 3. La suite (u_n) est définie par **formule explicite**, car chaque terme $u_n = 3n + 2$ s'exprime directement en fonction de l'indice n , sans avoir besoin de connaître les termes précédents de la suite.

L'avantage d'une formule explicite est de pouvoir calculer n'importe quel terme directement.

Une suite est définie par formule explicite si u_n s'exprime directement en fonction de n , sans faire intervenir les termes précédents.

Corrigé

Question 1. On applique la relation $u_{n+1} = 3u_n - 2$ de proche en proche, en partant de $u_0 = 5$.

$$\begin{aligned}u_1 &= 3u_0 - 2 = 3 \times 5 - 2 = 15 - 2 = 13. \\u_2 &= 3u_1 - 2 = 3 \times 13 - 2 = 39 - 2 = 37. \\u_3 &= 3u_2 - 2 = 3 \times 37 - 2 = 111 - 2 = 109.\end{aligned}$$

Donc $u_1 = 13$, $u_2 = 37$ et $u_3 = 109$.

Question 2. Cette suite est définie par **récurrence**, car chaque terme u_{n+1} est calculé à partir du terme précédent u_n via la relation $u_{n+1} = 3u_n - 2$: on ne dispose pas d'une formule exprimant u_n directement en fonction de n .

Question 3. Oui, pour calculer u_5 , il faut impérativement connaître u_4 , car la relation de récurrence donne $u_5 = 3u_4 - 2$: on ne peut pas calculer u_5 directement à partir de $n = 5$ sans connaître u_4 au préalable.

Corrigé

Question 1. On substitue les valeurs de n dans $u_n = n^2 - 2n + 3$.

$$\begin{aligned}u_0 &= 0^2 - 2 \times 0 + 3 = 0 - 0 + 3 = 3. \\u_1 &= 1^2 - 2 \times 1 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2. \\u_2 &= 2^2 - 2 \times 2 + 3 = 4 - 4 + 3 = 3. \\u_3 &= 3^2 - 2 \times 3 + 3 = 9 - 6 + 3 = 6.\end{aligned}$$

Donc $u_0 = 3$, $u_1 = 2$, $u_2 = 3$ et $u_3 = 6$.

Question 2. Pour $n = 5$:

$$u_5 = 5^2 - 2 \times 5 + 3 = 25 - 10 + 3 = 18.$$

Donc $u_5 = 18$.

Question 3. D'après les calculs de la question 1, on a $u_1 = 2$ et $u_2 = 3$.

Comme $2 \neq 3$, on a $u_1 \neq u_2$.

Donc Amira a **tort** : les termes u_1 et u_2 ne sont pas égaux.

Corrigé

Question 1. On applique la relation $v_{n+2} = v_{n+1} + v_n$ en partant de $v_0 = 1$ et $v_1 = 1$.

$$\begin{aligned}v_2 &= v_1 + v_0 = 1 + 1 = 2. \\v_3 &= v_2 + v_1 = 2 + 1 = 3. \\v_4 &= v_3 + v_2 = 3 + 2 = 5. \\v_5 &= v_4 + v_3 = 5 + 3 = 8.\end{aligned}$$

Donc $v_2 = 2$, $v_3 = 3$, $v_4 = 5$ et $v_5 = 8$.

Question 2. Cette suite est définie par **récurrence**, car chaque terme v_{n+2} est exprimé en fonction des deux termes précédents v_{n+1} et v_n : aucune formule ne permet de calculer v_n directement à partir de n .

Question 3. Pour calculer v_6 , on applique la relation avec $n = 4$:

$$v_6 = v_5 + v_4.$$

1SPE-SUITES-EX-003

Pour une suite définie par récurrence, on calcule chaque terme à partir du précédent, en appliquant la relation de proche en proche.

Une suite est définie par récurrence si chaque terme est exprimé en fonction du (ou des) terme(s) précédent(s), et le calcul d'un terme d'une suite récurrente ne se fait pas directement en fonction de l'indice n , mais nécessite impérativement la connaissance du terme précédent.

1SPE-SUITES-EX-004

Calcul direct par substitution dans la formule explicite $u_n = n^2 - 2n + 3$.

On vérifie l'affirmation d'Amira par le calcul direct.

1SPE-SUITES-EX-005

Chaque terme est la somme des deux termes précédents ; on applique la relation de proche en proche.

Une suite est définie par récurrence si chaque terme s'exprime en fonction de termes précédents, et non en fonction de l'indice n . La relation fait intervenir les deux termes précédents, donc les deux sont nécessaires.

Il faut donc connaître v_5 et v_4 (soit $v_5 = 8$ et $v_4 = 5$), ce qui donne $v_6 = 8 + 5 = 13$.

1SPE-SUITES-EX-006

Calcul direct par substitution dans la formule $u_n = 7 + 4n$.

Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule $u_{n+1} - u_n$ et on vérifie que cette différence est constante.

La formule du terme général d'une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r est $u_n = u_0 + nr$.

1SPE-SUITES-EX-007

La formule du terme général d'une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r est $u_n = u_0 + nr$.

On substitue les valeurs de n dans la formule.

Le signe de la raison détermine le sens de variation d'une suite arithmétique.

1SPE-SUITES-EX-008

La relation générale $u_n = u_p + (n - p) \times r$ permet de relier n'importe quel terme au terme de rang p .

Une fois u_0 et r connus, la formule du terme général est immédiate.

Corrigé

Question 1. On substitue $n = 0$, $n = 1$ et $n = 2$ dans $u_n = 7 + 4n$.

$$u_0 = 7 + 4 \times 0 = 7 + 0 = 7.$$

$$u_1 = 7 + 4 \times 1 = 7 + 4 = 11.$$

$$u_2 = 7 + 4 \times 2 = 7 + 8 = 15.$$

Donc $u_0 = 7$, $u_1 = 11$ et $u_2 = 15$.

Question 2. Pour tout entier naturel n , calculons la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = (7 + 4(n + 1)) - (7 + 4n) = 7 + 4n + 4 - 7 - 4n = 4.$$

Cette différence est constante, égale à 4, indépendante de n .

Donc la suite (u_n) est une suite **arithmétique** de raison $r = 4$ et de premier terme $u_0 = 7$.

Question 3. On applique la formule du terme général $u_n = u_0 + nr = 7 + 4n$ pour $n = 10$:

$$u_{10} = 7 + 4 \times 10 = 7 + 40 = 47.$$

Donc $u_{10} = 47$.

Corrigé

Question 1. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 100$ et de raison $r = -3$. Sa formule du terme général est :

$$u_n = u_0 + n \times r = 100 + n \times (-3) = 100 - 3n.$$

Question 2. On calcule u_1 et u_2 :

$$u_1 = 100 - 3 \times 1 = 100 - 3 = 97.$$

$$u_2 = 100 - 3 \times 2 = 100 - 6 = 94.$$

Donc $u_1 = 97$ et $u_2 = 94$.

Question 3. On applique la formule pour $n = 20$:

$$u_{20} = 100 - 3 \times 20 = 100 - 60 = 40.$$

Donc $u_{20} = 40$.

Question 4. La raison de la suite est $r = -3 < 0$.

Pour toute suite arithmétique, la différence $u_{n+1} - u_n = r$ est constante. Ici, $r = -3 < 0$, donc $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La suite (u_n) est donc **strictement décroissante**.

Corrigé

Question 1. On applique la relation $u_n = u_p + (n - p) \times r$ avec $p = 5$, $n = 0$, $u_5 = 23$ et $r = 4$:

$$u_0 = u_5 + (0 - 5) \times r = 23 + (-5) \times 4 = 23 - 20 = 3.$$

Donc $u_0 = 3$.

Question 2. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 4$. Sa formule du terme général est :

$$u_n = u_0 + n \times r = 3 + 4n.$$

Vérification : $u_5 = 3 + 4 \times 5 = 3 + 20 = 23$. ✓

Question 3. On applique la formule pour $n = 8$:

$$u_8 = 3 + 4 \times 8 = 3 + 32 = 35.$$

Donc $u_8 = 35$.

Corrigé

Question 1. On substitue $n = 0, 1, 2, 3$ dans $u_n = 6 \times 2^n$:

$$u_0 = 6 \times 2^0 = 6 \times 1 = 6.$$

$$u_1 = 6 \times 2^1 = 6 \times 2 = 12.$$

$$u_2 = 6 \times 2^2 = 6 \times 4 = 24.$$

$$u_3 = 6 \times 2^3 = 6 \times 8 = 48.$$

Donc $u_0 = 6$, $u_1 = 12$, $u_2 = 24$ et $u_3 = 48$.

Question 2. Puisque $u_n = 6 \times 2^n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est bien défini. On calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{6 \times 2^{n+1}}{6 \times 2^n} = 2^{n+1-n} = 2.$$

Ce quotient est constant, égal à 2, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Donc la suite (u_n) est une suite **géométrique** de raison $q = 2$.

Question 3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 2 \times u_n.$$

1SPE-SUITES-EX-009

Calcul direct des premiers termes par substitution dans $u_n = 6 \times 2^n$.

Pour montrer qu'une suite est géométrique, on calcule le quotient de deux termes consécutifs et on vérifie qu'il est constant.

La relation de récurrence d'une suite géométrique est $u_{n+1} = q \cdot u_n$.

Corrigé

Question 1. La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 81$ et de raison $q = \frac{1}{3}$. On calcule :

$$u_1 = u_0 \times q = 81 \times \frac{1}{3} = 27.$$

$$u_2 = u_1 \times q = 27 \times \frac{1}{3} = 9.$$

$$u_3 = u_2 \times q = 9 \times \frac{1}{3} = 3.$$

$$u_4 = u_3 \times q = 3 \times \frac{1}{3} = 1.$$

Donc $u_1 = 27$, $u_2 = 9$, $u_3 = 3$ et $u_4 = 1$.

Question 2. La formule du terme général est :

$$u_n = u_0 \times q^n = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

On peut aussi l'écrire $u_n = 3^4 \times 3^{-n} = 3^{4-n}$.

Question 3. Tous les termes sont positifs ($u_0 = 81 > 0$ et $q = \frac{1}{3} > 0$, donc $u_n = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n > 0$ pour tout n).

1SPE-SUITES-EX-010

Pour une suite géométrique, on applique la relation $u_{n+1} = q \times u_n$ de proche en proche.

La formule du terme général d'une suite géométrique est $u_n = u_0 \times q^n$.

Le sens de variation d'une suite géométrique à termes positifs dépend de la comparaison de la raison q à 1.

De plus, $0 < q = \frac{1}{3} < 1$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{1}{3} \times u_n < u_n.$$

La suite (u_n) est donc **strictement décroissante**.

1SPE-SUITES-EX-011

On calcule les termes par la formule $u_k = u_0 + kr$.

Corrigé

Question 1. La formule du terme général est $u_k = 2 + 3k$. On calcule :

k	0	1	2	3	4	5
u_k	2	5	8	11	14	17

En détail :

$$u_0 = 2, \quad u_1 = 2 + 3 = 5, \quad u_2 = 2 + 6 = 8, \quad u_3 = 2 + 9 = 11, \quad u_4 = 2 + 12 = 14, \quad u_5 = 2 + 15 = 17.$$

Question 2. La somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$ contient $n + 1 = 5 + 1 = 6$ termes. On applique la formule :

$$S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2} = 6 \times \frac{u_0 + u_5}{2} = 6 \times \frac{2 + 17}{2} = 6 \times \frac{19}{2} = 6 \times 9,5 = 57.$$

Donc $S = 57$.

Question 3. On additionne directement les six termes :

$$S = 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 = (2 + 5) + (8 + 11) + (14 + 17) = 7 + 19 + 31 = 57.$$

On retrouve bien $S = 57$. ✓

Vérification par addition directe des six termes.

La formule de somme d'une suite arithmétique : $S = \frac{(\text{nombre de termes}) \times (\text{premier terme} + \text{dernier terme})}{2}$.

1SPE-SUITES-EX-012

La formule du terme général d'une suite géométrique est $u_n = u_0 \times q^n$.

On applique la formule de somme géométrique avec $u_0 = 1$, $q = 2$ et $n = 7$ (8 termes de u_0 à u_7).

Corrigé

Question 1. La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = 2$. La formule du terme général est :

$$u_n = u_0 \times q^n = 1 \times 2^n = 2^n.$$

Question 2. On calcule $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$ avec la formule $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, où $n = 7$, $u_0 = 1$ et $q = 2$.

Puisque $q = 2 \neq 1$, la formule s'applique :

$$S = 1 \times \frac{1 - 2^{7+1}}{1 - 2} = \frac{1 - 2^8}{1 - 2} = \frac{1 - 256}{-1} = \frac{-255}{-1} = 255.$$

Donc $S = 255$.

Question 3. On liste les termes $u_k = 2^k$ pour k de 0 à 7 :

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 2, \quad u_2 = 4, \quad u_3 = 8, \quad u_4 = 16, \quad u_5 = 32, \quad u_6 = 64, \quad u_7 = 128.$$

On additionne :

$$S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 255.$$

On retrouve bien $S = 255$. ✓

Vérification par calcul direct des huit termes.

1SPE-SUITES-EX-013

La formule $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ est la formule de la somme des n premiers entiers.

Corrigé

Question 1. On applique la formule avec $n = 50$:

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + 50 = \frac{50 \times (50 + 1)}{2} = \frac{50 \times 51}{2} = \frac{2550}{2} = 1275.$$

Donc $S = 1275$.

Question 2. On regroupe les termes en paires :

$$(1 + 50), (2 + 49), (3 + 48), \dots, (25 + 26).$$

Chaque paire vaut 51. Il y a $\frac{50}{2} = 25$ paires. Donc :

$$S = 25 \times 51 = 1275.$$

On retrouve bien $S = 1275$. ✓

Corrigé

Question 1. On calcule $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = (3 + 5(n+1)) - (3 + 5n) = 3 + 5n + 5 - 3 - 5n = 5.$$

Donc $u_{n+1} - u_n = 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 2. Puisque $u_{n+1} - u_n = 5 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, la différence est strictement positive.

Question 3. Comme $u_{n+1} - u_n = 5 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on conclut que la suite (u_n) est **strictement croissante**.

Remarque. On peut aussi le voir directement : $u_n = 3 + 5n$ est une fonction affine croissante de n (coefficient directeur $5 > 0$). La suite est d'ailleurs arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 5 > 0$.

Corrigé

Question 1. On calcule le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

La suite est définie par $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n \neq 0$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{3}{4}u_n}{u_n} = \frac{3}{4}.$$

Question 2. On vérifie que tous les termes u_n sont positifs.

Par récurrence : $u_0 = 5 > 0$, et si $u_n > 0$ alors $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n > 0$ (produit de deux nombres positifs).
Donc $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 3. Puisque tous les termes sont strictement positifs et que :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{4} < 1,$$

on a $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La suite (u_n) est donc **strictement décroissante**.

Corrigé

Question 1. On calcule la dérivée de $f(x) = x^2 - 4x + 7$:

$$f'(x) = 2x - 4.$$

Question 2. On étudie le signe de $f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$ sur $[0; +\infty[$:

- ▶ $f'(x) < 0$ si $x < 2$, donc f est **strictement décroissante** sur $[0; 2]$;
- ▶ $f'(x) = 0$ si $x = 2$ (minimum de f) ;

La méthode des paires consiste à regrouper le premier terme avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier, etc. Chaque paire a la même somme.

1SPE-SUITES-EX-014

Pour étudier les variations d'une suite définie par une expression explicite, on calcule $u_{n+1} - u_n$ et on étudie son signe.

Si $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout n , alors $u_{n+1} > u_n$ pour tout n , ce qui signifie que la suite est **strictement croissante**.

1SPE-SUITES-EX-015

Pour une suite géométrique à termes positifs, le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant et égal à la raison q . On le compare à 1 pour déterminer le sens de variation.

Théorème : si (u_n) est une suite géométrique à termes strictement positifs, alors : $q > 1 \Rightarrow$ suite croissante ; $0 < q < 1 \Rightarrow$ suite décroissante.

1SPE-SUITES-EX-016

Méthode : étudier les variations d'une suite $u_n = f(n)$ via les variations de la fonction associée f sur $[0; +\infty[$.

► $f'(x) > 0$ si $x > 2$, donc f est **strictement croissante** sur $[2; +\infty[$.

Tableau de variations de f sur $[0; +\infty[$:

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	7	$\searrow$ 3 $\nearrow$	$+\infty$

Les variations de $u_n = f(n)$ suivent celles de f , à condition de restreindre aux entiers naturels.

Question 3. On calcule les premiers termes de (u_n) :

$$u_0 = 0^2 - 4 \times 0 + 7 = 7, \quad u_1 = 1 - 4 + 7 = 4, \quad u_2 = 4 - 8 + 7 = 3, \quad u_3 = 9 - 12 + 7 = 4.$$

D'après les variations de f :

- Pour $n \in \{0, 1, 2\}$, on a $n \leq 2$, donc f est décroissante : la suite (u_n) est **strictement décroissante** sur $\{0, 1, 2\}$ (on vérifie : $u_0 = 7 > u_1 = 4 > u_2 = 3$).
- Pour $n \geq 2$, on a $n \geq 2$, donc f est croissante : la suite (u_n) est **strictement croissante** pour $n \geq 2$ (on vérifie : $u_2 = 3 < u_3 = 4$).

La suite (u_n) est donc décroissante puis croissante, avec un minimum en $n = 2$: $u_2 = 3$.

1SPE-SUITES-EX-017

On modélise la situation : le coût total est la somme du versement initial et des mensualités accumulées.

Une suite est arithmétique si et seulement si la différence de deux termes consécutifs est constante.

Corrigé

Question 1. Après n mois, Yasmine a payé 500 € à l'inscription et $30 \times n$ € de mensualités. Donc :

$$C_n = 500 + 30n \quad (\text{en euros}).$$

Question 2. On calcule $C_{n+1} - C_n$:

$$C_{n+1} - C_n = (500 + 30(n+1)) - (500 + 30n) = 30.$$

La différence $C_{n+1} - C_n = 30$ est constante pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc la suite (C_n) est **arithmétique** de :

- premier terme $C_0 = 500 + 30 \times 0 = 500$ €;
- raison $r = 30$.

Question 3. On calcule le coût total après 12 mois :

$$C_{12} = 500 + 30 \times 12 = 500 + 360 = 860.$$

Après 1 an (12 mois), le coût total est de **860 €**.

On applique la formule du terme général de la suite arithmétique $C_n = C_0 + nr$ avec $n = 12$.

1SPE-SUITES-EX-018

Un taux d'intérêt annuel de 5 % signifie que le capital est multiplié par 1,05 chaque année : c'est le coefficient multiplicateur.

La relation de récurrence $P_{n+1} = q \times P_n$ caractérise une suite géométrique de raison q .

Corrigé

Question 1. Un taux annuel de 5 % correspond au coefficient multiplicateur :

$$1 + \frac{5}{100} = 1,05.$$

Question 2. Chaque année, le capital est multiplié par 1,05, donc :

$$P_{n+1} = 1,05 \times P_n.$$

Par application répétée à partir de $P_0 = 2000$:

$$P_n = P_0 \times (1,05)^n = 2000 \times (1,05)^n.$$

Question 3. La suite (P_n) est **géométrique** car $\frac{P_{n+1}}{P_n} = 1,05$ est constant pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Elle a pour :

- ▶ premier terme $P_0 = 2000$ €;
- ▶ raison $q = 1,05$.

Question 4. On calcule P_3 :

$$P_3 = 2000 \times (1,05)^3 = 2000 \times 1,157625 = 2315,25.$$

Après 3 ans, le capital est de **2 315,25 €**.

Corrigé

On applique la formule $P_n = P_0 \times q^n$ avec $n = 3$.
On arrondit au centime.

1SPE-SUITES-EX-019

Une croissance de $t\%$ par période correspond à un coefficient multiplicateur $1 + \frac{t}{100}$ appliqué à chaque période. Cela produit une suite géométrique de premier terme N_0 et de raison q est $N_n = N_0 \times q^n$.

Question 1. La population croît de 2 % par heure, ce qui signifie que d'une heure à l'autre, le nombre de bactéries est multiplié par un coefficient constant 1,02. Le quotient $\frac{N_{n+1}}{N_n}$ est donc constant. Il convient d'utiliser un **modèle géométrique**.

Question 2. La suite (N_n) est géométrique de premier terme $N_0 = 1200$ et de raison $q = 1,02$. Sa formule générale est :

$$N_n = 1200 \times (1,02)^n.$$

Question 3. On calcule N_1 et N_2 :

$$N_1 = 1200 \times 1,02 = 1224.$$

$$N_2 = 1200 \times (1,02)^2 = 1200 \times 1,0404 = 1248,48.$$

Après 1 heure, la colonie compte 1224 bactéries ; après 2 heures, elle en compte 1248,48 (soit environ 1248).

Question 4.

- ▶ Le **taux d'évolution horaire** est $t = 2\% = 0,02$.
- ▶ Le **coefficient multiplicateur horaire** est $q = 1 + 0,02 = 1,02$.

Le taux d'évolution et le coefficient multiplicateur se lisent directement dans la définition de la suite géométrique.

Corrigé

1SPE-SUITES-EX-020

On simule l'algorithme à la main : à chaque itération k , on applique la relation $u \leftarrow 2u + 3$. La variable u contient successivement $u_1, u_2, \dots, u_5$.

Question 1. On simule l'algorithme étape par étape à partir de $u = u_0 = 2$:

Itération k	Valeur de u après l'instruction $u = 2*u + 3$
$k = 0$	$u = 2 \times 2 + 3 = 7$ (c'est u_1)
$k = 1$	$u = 2 \times 7 + 3 = 17$ (c'est u_2)
$k = 2$	$u = 2 \times 17 + 3 = 37$ (c'est u_3)
$k = 3$	$u = 2 \times 37 + 3 = 77$ (c'est u_4)
$k = 4$	$u = 2 \times 77 + 3 = 157$ (c'est u_5)

Tableau de valeurs :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	2	7	17	37	77	157

Question 2. À la fin de l'algorithme, la variable u contient $u_5 = 157$. L'instruction `print(u)` affiche donc **157**.

Question 3. Pour calculer u_{10} à la place de u_5 , il faut remplacer `range(5)` par `range(10)` dans le code :

```
u = 2
for k in range(10):
    u = 2*u + 3
    print(u)
```

L'instruction `print(u)` affiche la valeur finale de u après la boucle, soit u_5 . Pour calculer u_{10} , il suffit d'effectuer 10 itérations au lieu de 5 : on remplace `range(5)` par `range(10)`.

1SPE-SUITES-EX-021

On simule l'algorithme à la main : la variable u stocke le terme courant u_k , et S accumule la somme au fur et à mesure.

Corrigé

Question 1. On simule l'algorithme étape par étape. Avant la boucle : $u = 3$ (c'est u_0) et $S = 3$. À chaque itération, on calcule le terme suivant puis on l'ajoute à S :

Valeur de k	Valeur de u après la boucle	Valeur de S après la boucle
0	$2 \times 3 = 6 (= u_1)$	$3 + 6 = 9$
1	$2 \times 6 = 12 (= u_2)$	$9 + 12 = 21$
2	$2 \times 12 = 24 (= u_3)$	$21 + 24 = 45$
3	$2 \times 24 = 48 (= u_4)$	$45 + 48 = 93$
fin	48	93

Question 2. À la fin de l'algorithme, S contient 93. L'instruction `print(S)` affiche donc 93.

Question 3. La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$. On calcule $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$ (cinq termes, de u_0 à u_4 , donc $n = 4$) :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 3 \times \frac{1 - 2^{4+1}}{1 - 2} = 3 \times \frac{1 - 32}{-1} = 3 \times \frac{-31}{-1} = 3 \times 31 = 93.$$

On retrouve bien $S = 93$. ✓

Vérification par calcul direct : $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 3 + 6 + 12 + 24 + 48 = 93$. ✓

L'instruction `print(S)` affiche la valeur finale de la somme des termes d'une suite géométrique est $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$, où $n + 1$ est le nombre de termes.

1SPE-SUITES-EX-022

Corrigé

Question 1 — Calcul des premiers termes et conjecture.

On utilise la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + 5$.

$$u_1 = u_0 + 5 = 7 + 5 = 12.$$

$$u_2 = u_1 + 5 = 12 + 5 = 17.$$

$$u_3 = u_2 + 5 = 17 + 5 = 22.$$

La différence entre deux termes consécutifs est constante et égale à 5. On conjecture que (u_n) est une suite arithmétique de raison 5.

Question 2 — Démonstration de la nature arithmétique.

Pour tout entier naturel n , on calcule :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 5) - u_n = 5.$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante et égale à 5 pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = 7$.

Question 3 — Expression de u_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = u_0 + n \times r = 7 + 5n.$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = 5n + 7$.

Question 4 — Calcul de u_{10} et détermination du premier rang tel que $u_n > 100$.

Calcul de u_{10} :

$$u_{10} = 5 \times 10 + 7 = 50 + 7 = 57.$$

Plus petit entier n tel que $u_n > 100$:

Différence constante entre termes consécutifs : +5 à chaque étape.

Définition d'une suite arithmétique : différence $u_{n+1} - u_n$ constante.

Formule : $u_n = u_0 + nr$ pour une suite arithmétique.

On résout l'inéquation $u_n > 100$:

$$5n + 7 > 100 \iff 5n > 93 \iff n > \frac{93}{5} = 18,6.$$

Le plus petit entier vérifiant $n > 18,6$ est $n = 19$.

Vérification :

$$u_{18} = 5 \times 18 + 7 = 97 \leq 100, \quad u_{19} = 5 \times 19 + 7 = 102 > 100. \checkmark$$

Le plus petit entier n tel que $u_n > 100$ est $n = 19$.

n est un entier, donc on prend le plus petit entier strictement supérieur à 18,6.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer u_1, u_2, u_3 et conjecturer); Q2 : 3 pts (raisonner, communiquer : démonstration complète avec la définition); Q3 : 2 pts (calculer : formule du terme général); Q4 : 2 pts (calculer u_{10} : 1 pt; résoudre l'inéquation et conclure : 1 pt)

Corrigé

1SPE-SUITES-EX-023

Question 1 — Calcul des premiers termes.

On substitue les valeurs de n dans la formule $u_n = 3n + 4$:

$$u_0 = 3 \times 0 + 4 = 4, \quad u_1 = 3 \times 1 + 4 = 7, \quad u_2 = 3 \times 2 + 4 = 10, \quad u_3 = 3 \times 3 + 4 = 13.$$

Question 2 — Calcul de $u_{n+1} - u_n$ et nature de la suite.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = (3(n+1) + 4) - (3n + 4) = 3n + 3 + 4 - 3n - 4 = 3.$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante et égale à 3 pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 3$.

La différence $u_{n+1} - u_n = 3$ est constante, ce qui caractérise une suite arithmétique.

Question 3 — Critique de l'argument de l'élève et justification rigoureuse.

Insuffisance de l'argument : vérifier que $u_0 < u_1 < u_2$ ne prouve la croissance que pour les trois premiers termes; cela ne dit rien sur les termes suivants. Une suite peut être croissante sur ses premiers termes puis décroissante.

Justification rigoureuse : On a montré à la question 2 que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 3 > 0.$$

Donc $u_{n+1} > u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, ce qui prouve que (u_n) est **strictement croissante**.

Une suite est strictement croissante si et seulement si $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout n .

Question 4 — Rang à partir duquel $u_n > 40$.

On résout l'inéquation $u_n > 40$:

$$3n + 4 > 40 \iff 3n > 36 \iff n > 12.$$

Le plus petit entier n tel que $u_n > 40$ est $n = 13$.

Vérification :

$$u_{12} = 3 \times 12 + 4 = 40 \not> 40, \quad u_{13} = 3 \times 13 + 4 = 43 > 40. \checkmark$$

Le plus petit entier strictement supérieur à 12 est 13.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer les quatre termes); Q2 : 3 pts (raisonner, communiquer : calcul de la différence et conclusion); Q3 : 3 pts (raisonner, communiquer : critique fondée et démonstration rigoureuse); Q4 : 1 pt (calculer : résolution de l'inéquation)

Corrigé

1SPE-SUITES-EX-024

Question 1 — Relation de récurrence et nature arithmétique.

L'entreprise traite 6 colis de plus chaque jour, donc :

$$u_{n+1} = u_n + 6, \quad u_0 = 20.$$

Démonstration : Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 6) - u_n = 6.$$

La différence entre deux termes consécutifs est constante : c'est la définition d'une suite arithmétique.

La différence $u_{n+1} - u_n = 6$ est constante. Donc (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 6$ et de premier terme $u_0 = 20$.

Question 2 — Terme général et calcul de u_{19} .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = u_0 + n \times r = 20 + 6n.$$

$$u_{19} = 20 + 6 \times 19 = 20 + 114 = 134.$$

L'entreprise traite 134 colis lors du 20^e jour.

Question 3 — Somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$.

Formule de la somme des termes d'une suite arithmétique : $S = \frac{\text{nb de termes} \times (\text{1er terme} + \text{dernier terme})}{2}$.

La somme porte sur 20 termes (de $n = 0$ à $n = 19$), de premier terme $u_0 = 20$ et de dernier terme $u_{19} = 134$:

$$S = \frac{20 \times (u_0 + u_{19})}{2} = \frac{20 \times (20 + 134)}{2} = \frac{20 \times 154}{2} = 10 \times 154 = 1540.$$

L'entreprise traite 1 540 colis au total durant les 20 premiers jours.

Question 4 — Nombre de jours pour atteindre 3 000 colis au total.

La somme cumulée des $n + 1$ premiers termes (de u_0 à u_n) vaut :

$$S_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2} = \frac{(n+1)(20 + 20 + 6n)}{2} = \frac{(n+1)(40 + 6n)}{2} = (n+1)(20 + 3n).$$

On cherche le plus petit entier n tel que $S_n \geq 3000$:

$$(n+1)(3n+20) \geq 3000 \iff 3n^2 + 23n + 20 \geq 3000 \iff 3n^2 + 23n - 2980 \geq 0.$$

On résout l'inéquation du second degré : discriminant $\Delta = 23^2 + 4 \times 3 \times 2980 = 529 + 35760 = 36289 = 190,5^2$.

Le discriminant est $\Delta = 529 + 35760 = 36289$, donc $\sqrt{\Delta} \approx 190,5$.

La racine positive est :

$$n = \frac{-23 + \sqrt{36289}}{6} \approx \frac{-23 + 190,5}{6} \approx \frac{167,5}{6} \approx 27,9.$$

L'inéquation est vérifiée pour $n \geq 28$ (entier).

Vérification :

$$S_{27} = 28 \times (20 + 3 \times 27) = 28 \times 101 = 2828 < 3000.$$

$$S_{28} = 29 \times (20 + 3 \times 28) = 29 \times 104 = 3016 \geq 3000. \checkmark$$

L'entreprise aura traité au moins 3 000 colis au total après 29 jours (à partir du rang $n = 28$, c'est-à-dire à la fin du 29^e jour).

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : relation de récurrence 1 pt + démonstration arithmétique 1 pt) ; Q2 : 2 pts (calculer : formule 1 pt + u_{19} 1 pt) ; Q3 : 2 pts (calculer : application formule somme) ; Q4 : 2 pts (raisonner : mise en équation et résolution)

Question 1 — Détermination de la raison et du premier terme.

(u_n) est une suite arithmétique de raison r . On a donc $u_n = u_1 + (n-1)r$ pour tout $n \geq 1$.

En particulier :

$$u_5 = u_1 + 4r \implies 20 = 8 + 4r \implies 4r = 12 \implies r = 3.$$

Le premier terme :

$$u_0 = u_1 - r = 8 - 3 = 5.$$

La raison est $r = 3$ et le premier terme est $u_0 = 5$.

Question 2 — Expression de u_n en fonction de n .

Par la formule du terme général :

$$u_n = u_0 + n \times r = 5 + 3n.$$

Vérification : $u_1 = 5 + 3 = 8 \checkmark$ $u_5 = 5 + 15 = 20 \checkmark$.

Question 3 — Calcul de $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$.

La somme porte sur 10 termes, de premier terme $u_1 = 8$ et de dernier terme $u_{10} = 5 + 30 = 35$.

$$S = \frac{10 \times (u_1 + u_{10})}{2} = \frac{10 \times (8 + 35)}{2} = \frac{10 \times 43}{2} = 5 \times 43 = 215.$$

Formule : somme de n termes en progression arithmétique
 $= \frac{n \times (\text{1er} + \text{dernier})}{2}$.

Question 4 — Expression de T_n et détermination du premier rang tel que $T_n > 500$.

Expression de T_n : $T_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ est la somme de n termes de la suite arithmétique, de premier terme $u_1 = 8$ et de dernier terme $u_n = 3n + 5$.

$$T_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n(8 + 3n + 5)}{2} = \frac{n(3n + 13)}{2}.$$

Résolution de $T_n > 500$:

$$\frac{n(3n + 13)}{2} > 500 \iff 3n^2 + 13n - 1000 > 0.$$

Le discriminant est $\Delta = 13^2 + 4 \times 3 \times 1000 = 169 + 12000 = 12169$.

On calcule $\sqrt{12169} \approx 110,3$.

$$n > \frac{-13 + 110,3}{6} \approx \frac{97,3}{6} \approx 16,2.$$

On ne retient que la racine positive car $n \geq 1$.

Le plus petit entier n satisfaisant l'inéquation est donc $n = 17$.

Vérification :

$$T_{16} = \frac{16 \times (3 \times 16 + 13)}{2} = \frac{16 \times 61}{2} = 8 \times 61 = 488 \leq 500.$$

$$T_{17} = \frac{17 \times (3 \times 17 + 13)}{2} = \frac{17 \times 64}{2} = 17 \times 32 = 544 > 500. \checkmark$$

Le plus petit entier n tel que $T_n > 500$ est $n = 17$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : relation entre u_1 , u_5 et r ; calcul de u_0); Q2 : 1 pt (calculer : formule terme général); Q3 : 2 pts (calculer : application formule somme); Q4 : 3 pts (raisonner, calculer : expression de T_n 1 pt + résolution inéquation 1 pt + vérification 1 pt)

Corrigé

1SPE-SUITES-EX-026

Question 1 — Relation de récurrence et nature géométrique.

La population double toutes les heures, donc :

$$u_{n+1} = 2u_n, \quad u_0 = 3.$$

Démonstration : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3 \times 2^n > 0$, donc $u_n \neq 0$ et on peut calculer le quotient :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2u_n}{u_n} = 2.$$

Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant et égal à 2 : c'est la définition d'une suite géométrique.

Ce quotient est constant. Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 3$.

Question 2 — Expression de u_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$u_n = u_0 \times q^n = 3 \times 2^n.$$

Question 3 — Calcul de $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$.

La somme porte sur 8 termes (de rang 0 à 7) d'une suite géométrique de raison $q = 2 \neq 1$:

$$S = u_0 \frac{q^8 - 1}{q - 1} = 3 \times \frac{2^8 - 1}{2 - 1} = 3 \times \frac{256 - 1}{1} = 3 \times 255 = 765.$$

La somme totale est 765 millions de bactéries accumulées sur les 8 premières heures.

Question 4 — Heure à partir de laquelle la population dépasse 100 millions.

On cherche le plus petit entier n tel que $u_n > 100$:

$$3 \times 2^n > 100 \iff 2^n > \frac{100}{3} \approx 33,33.$$

On applique $\log_{10}$ aux deux membres (fonction croissante) :

$$n \log_{10}(2) > \log_{10}\left(\frac{100}{3}\right) = \log_{10}(100) - \log_{10}(3) = 2 - \log_{10}(3).$$

Avec $\log_{10}(2) \approx 0,301$:

$$n > \frac{\log_{10}(100/3)}{\log_{10}(2)} \approx \frac{1,523}{0,301} \approx 5,06.$$

Le plus petit entier satisfaisant cette condition est $n = 6$.

Vérification :

$$u_5 = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96 \leq 100, \quad u_6 = 3 \times 2^6 = 3 \times 64 = 192 > 100. \checkmark$$

À partir de la $\boxed{6^e}$ heure, la population dépasse 100 millions de bactéries.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : relation de récurrence 1 pt + démonstration géométrique 1 pt) ; Q2 : 1 pt (calculer : terme général) ; Q3 : 2 pts (calculer : application formule somme géométrique) ; Q4 : 3 pts (raisonner, calculer : mise en inéquation 1 pt + passage au log 1 pt + conclusion et vérification 1 pt)

Corrigé

Question 1 — Vérification que $u_n \neq 0$ et calcul du quotient.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 256 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Or $256 > 0$ et $\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$, donc $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, en particulier $u_n \neq 0$.

On peut donc calculer :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{256 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{256 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1-n} = \frac{1}{2}.$$

Ce quotient est constant, ce qui confirme que (u_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$.

Le quotient est constant et égal à $\frac{1}{2}$: (u_n) est bien géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$.

Question 2 — Expression de u_n en fonction de n .

$$u_n = u_0 \times q^n = 256 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{256}{2^n}.$$

Question 3 — Calcul de u_3 et u_7 .

$$u_3 = \frac{256}{2^3} = \frac{256}{8} = 32.$$

$$u_7 = \frac{256}{2^7} = \frac{256}{128} = 2.$$

Question 4 — Calcul de S et de T .

La somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$ porte sur 8 termes d'une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2} \neq 1$:

$$S = u_0 \frac{1 - q^8}{1 - q} = 256 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^8}{1 - \frac{1}{2}} = 256 \times \frac{1 - \frac{1}{256}}{\frac{1}{2}} = 256 \times 2 \times \frac{255}{256} = 2 \times 255 = 510.$$

$$T = u_1 + u_2 + \dots + u_7 = S - u_0 = 510 - 256 = 254.$$

Formule :

$S_N = u_0 \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}$ (avec $N + 1$ termes, de rang 0 à N).

Question 5 — Formule de la somme et comportement pour n grand.

Pour tout entier $n \geq 1$, la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_n$ porte sur $n + 1$ termes :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 256 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}} = 512 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right).$$

C'est bien la formule annoncée.

Comportement quand $n \rightarrow +\infty$: Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Donc $u_0 + u_1 + \dots + u_n \rightarrow 512$ quand $n \rightarrow +\infty$.

La somme de tous les termes de la suite converge vers 512 (la suite des sommes partielles est croissante et majorée par 512).

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : $u_n > 0$ 1 pt + calcul du quotient 1 pt) ; Q2 : 1 pt (calculer : terme général) ; Q3 : 1 pt (calculer : u_3 et u_7) ; Q4 : 2 pts (calculer : S et T) ; Q5 : 2 pts (raisonner, communiquer : démonstration de la formule 1 pt + comportement asymptotique 1 pt)

On retrouve exactement la formule annoncée, ce qui achève la démonstration.

Corrigé

1SPE - SUITES - EX - 028

Question 1 — Calcul de u_0 , u_1 et u_2 .

$$u_0 = -4 \times 0 + 30 = 30, \quad u_1 = -4 \times 1 + 30 = 26, \quad u_2 = -4 \times 2 + 30 = 22.$$

Question 2 — Démonstration que (u_n) est arithmétique.

Pour tout entier naturel n , on calcule la différence :

$$u_{n+1} - u_n = (-4(n+1) + 30) - (-4n + 30) = -4n - 4 + 30 + 4n - 30 = -4.$$

La différence $u_{n+1} - u_n = -4$ est constante pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Donc (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = -4$ et de premier terme $u_0 = 30$.

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante : c'est la définition d'une suite arithmétique.

Question 3 — Sens de variation.

La raison de (u_n) est $r = -4 < 0$.

Puisque $r < 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_{n+1} - u_n = -4 < 0$, donc $u_{n+1} < u_n$.

La suite (u_n) est **strictement décroissante**.

Question 4 — Valeurs de n telles que $u_n > 0$ et $u_n \leq 0$.

On résout $u_n > 0$:

$$-4n + 30 > 0 \iff -4n > -30 \iff n < \frac{30}{4} = 7,5.$$

Comme n est un entier naturel, $u_n > 0 \iff n \leq 7$.

Vérification : $u_7 = -28 + 30 = 2 > 0$ et $u_8 = -32 + 30 = -2 < 0$. ✓

De même, $u_n \leq 0 \iff n \geq 8$.

Question 5 — Étude de (v_n) avec $v_n = u_n^2$.

On calcule les premiers termes :

$$v_0 = 30^2 = 900, \quad v_1 = 26^2 = 676, \quad v_2 = 22^2 = 484.$$

Ces trois valeurs sont dans l'ordre décroissant ($v_0 > v_1 > v_2$).

Cependant, (v_n) **n'est pas monotone** : en effet, u_n devient négatif à partir de $n = 8$, et $|u_n|$ commence à croître. Par exemple :

$$v_7 = 2^2 = 4, \quad v_8 = (-2)^2 = 4, \quad v_9 = (-6)^2 = 36.$$

La suite (v_n) est décroissante tant que u_n est positive (pour $n \leq 7$), puis elle reprend une croissance lorsque $|u_n|$ augmente (pour $n \geq 8$). Elle n'est donc pas monotone.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer : trois termes); Q2 : 2 pts (raisonner : calcul de la différence 1 pt + conclusion 1 pt); Q3 : 1 pt (raisonner : signe de r); Q4 : 2 pts (calculer, raisonner : résolution de l'inéquation 1 pt + vérification 1 pt); Q5 : 2 pts (raisonner, communiquer : calculs de v_0, v_1, v_2 1 pt + explication de la non-monotonie 1 pt)

Corrigé

Question 1 — Expression de u_n , calcul de u_5 et u_{16} .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $r = 3$:

$$u_n = u_0 + n \times r = 2 + 3n.$$

$$u_5 = 2 + 3 \times 5 = 2 + 15 = 17. \quad u_{16} = 2 + 3 \times 16 = 2 + 48 = 50.$$

Question 2 — Sens de variation par l'étude de $u_{n+1} - u_n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = (2 + 3(n+1)) - (2 + 3n) = 3n + 5 - 3n - 2 = 3.$$

Comme $u_{n+1} - u_n = 3 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, la suite (u_n) est **strictement croissante**.

Question 3 — Comparaison de u_n et u_{n+1} .

D'après la question précédente, $u_{n+1} - u_n = 3 > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Cela signifie que chaque terme est strictement supérieur au précédent : (u_n) est donc **strictement croissante**.

Question 4 — Étude de (v_n) avec $v_n = u_n - 3n$.

Une suite arithmétique est strictement décroissante si et seulement si sa raison est strictement négative.

$u_n > 0$ pour $n \in \{0, 1, \dots, 7\}$ et $u_n \leq 0$ pour tout entier $n \geq 8$.

On observe que $v_7 = v_8 = 4$ puis $v_9 = 36 > v_8$: la suite cesse d'être décroissante. Le carré d'une fonction décroissante n'est pas monotone en général.

$u_{n+1} - u_n = 3 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite est strictement croissante.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = u_n - 3n = (2 + 3n) - 3n = 2.$$

La suite (v_n) est **constante**, de valeur 2.

$v_n = 2$ est indépendant de n : la suite (v_n) est constante, de valeur 2.

Question 5 — Étude de (w_n) avec $w_n = \frac{1}{u_n}$.

a) Calcul de w_0, w_1, w_2 .

$$w_0 = \frac{1}{u_0} = \frac{1}{2}, \quad w_1 = \frac{1}{u_1} = \frac{1}{5}, \quad w_2 = \frac{1}{u_2} = \frac{1}{8}.$$

b) Démonstration que (w_n) est strictement décroissante.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = 2 + 3n \geq 2 > 0$, donc w_n est bien défini. On calcule :

$$w_{n+1} - w_n = \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{3n+5} - \frac{1}{3n+2} = \frac{(3n+2) - (3n+5)}{(3n+5)(3n+2)} = \frac{-3}{(3n+5)(3n+2)}.$$

Comme $(3n+5)(3n+2) > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $w_{n+1} - w_n < 0$, donc $w_{n+1} < w_n$.

La suite (w_n) est **strictement décroissante**.

Le numérateur est $-3 < 0$ et le dénominateur est strictement positif : la différence est négative.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer : formule terme général 1 pt + u_5 et u_{16} 1 pt); Q2 : 2 pts (raisonner : calcul de la différence 1 pt + conclusion 1 pt); Q3 : 1 pt (raisonner : reformulation équivalente); Q4 : 1 pt (calculer : simplification algébrique); Q5 : 2 pts (calculer : w_0, w_1, w_2 1 pt + démonstration de la décroissance 1 pt)

Corrigé

1SPE-SUITES-EX-030

Question 1 — Calcul de u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = 5 \times \frac{3}{4} = \frac{15}{4}, \quad u_2 = \frac{15}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{45}{16}, \quad u_3 = \frac{45}{16} \times \frac{3}{4} = \frac{135}{64}.$$

Question 2 — Démonstration de la décroissance stricte (méthode du quotient).

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = 5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0$ car $5 > 0$ et $\left(\frac{3}{4}\right)^n > 0$.

En particulier, $u_n \neq 0$, ce qui autorise le calcul du quotient :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n} = \frac{3}{4}.$$

Comme $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{4} < 1$ et $u_n > 0$, on a $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La suite (u_n) est **strictement décroissante**.

Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{4} < 1$ pour tout n : la suite est strictement décroissante.

Question 3 — Expression de u_n en fonction de n .

Il s'agit d'une suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = \frac{3}{4}$, donc :

$$u_n = u_0 \times q^n = 5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

Question 4 — Étude de $v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1$.

a) Calcul de v_n .

$$v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4}.$$

La suite (v_n) est constante, de valeur $-\frac{1}{4}$.

b) *Interprétation du signe.*

$$v_n = -\frac{1}{4} < 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Comme $v_n < 0$, on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, ce qui, combiné à $u_n > 0$, donne $u_{n+1} < u_n$. Cela confirme que (u_n) est strictement décroissante.

Question 5 — Nature de (w_n) avec $w_n = \frac{1}{u_n}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ donc w_n est bien défini. Calculons le quotient :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{1/u_{n+1}}{1/u_n} = \frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{1}{q} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}.$$

Ce quotient est constant. Donc (w_n) est une suite géométrique de raison $\frac{4}{3}$ et de premier terme $w_0 = \frac{1}{5}$.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer : trois termes en fractions); Q2 : 2 pts (raisonner : $u_n > 0$ justifié 1 pt + calcul du quotient et conclusion 1 pt); Q3 : 1 pt (calculer : formule terme général); Q4 : 2 pts (calculer : valeur de v_n 1 pt + interprétation du signe 1 pt); Q5 : 2 pts (raisonner : calcul du quotient de (w_n) 1 pt + identification et raison 1 pt)

Corrigé

Question 1 — Nature géométrique de (u_n) .

On a $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n$. Vérifions que c'est une suite géométrique en calculant le quotient de deux termes consécutifs.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n > 0$, donc $u_n \neq 0$ et le quotient est calculable :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^{n+1}}{2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n} = \frac{5}{3}.$$

Ce quotient est constant. Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{5}{3}$ et de premier terme $u_0 = 2$.

Question 2 — Sens de variation.

a) *Par le quotient.*

$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5}{3} > 1$ et $u_n > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite est strictement croissante.

b) *Par la différence.*

$$u_{n+1} - u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^{n+1} - 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n \times \left(\frac{5}{3} - 1\right) = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n \times \frac{2}{3}.$$

Comme $2 > 0$, $\left(\frac{5}{3}\right)^n > 0$ et $\frac{2}{3} > 0$, on a $u_{n+1} - u_n > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$.

Les deux méthodes donnent la même conclusion : (u_n) est **strictement croissante**.

Question 3 — Démonstration que (v_n) est arithmétique.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n > 0$, donc $v_n = \ln(u_n)$ est bien défini.

$v_n < 0 \Leftrightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ (avec $u_n > 0$) $\Leftrightarrow u_{n+1} < u_n$: cela confirme la décroissance stricte.

Le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{4}{3}$ est constant : (w_n) est géométrique de raison $\frac{4}{3}$.

Le quotient est constant et égal à $\frac{5}{3}$: (u_n) est géométrique de raison $q = \frac{5}{3}$ et de premier terme $u_0 = 2$.

On factorise par $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n$ pour faire apparaître $q - 1 = \frac{2}{3} > 0$.

En utilisant les propriétés du logarithme :

$$v_n = \ln(u_n) = \ln\left(2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n\right) = \ln(2) + \ln\left(\left(\frac{5}{3}\right)^n\right) = \ln(2) + n \ln\left(\frac{5}{3}\right).$$

On calcule la différence :

$$v_{n+1} - v_n = (\ln(2) + (n+1) \ln\left(\frac{5}{3}\right)) - (\ln(2) + n \ln\left(\frac{5}{3}\right)) = \ln\left(\frac{5}{3}\right).$$

Cette différence est constante, donc (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = \ln\left(\frac{5}{3}\right)$ et de premier terme $v_0 = \ln(2)$.

Question 4 — Sens de variation de (v_n) sans calcul supplémentaire.

La raison de (v_n) est $r = \ln\left(\frac{5}{3}\right)$.

Comme $\frac{5}{3} > 1$, on a $\ln\left(\frac{5}{3}\right) > 0$, donc $r > 0$.

En déduisant directement du résultat de la question 3 : (v_n) est **strictement croissante**.

La différence

$v_{n+1} - v_n = \ln\left(\frac{5}{3}\right)$ est constante : (v_n) est arithmétique de raison $\ln\left(\frac{5}{3}\right)$.

Une suite arithmétique de raison strictement positive est strictement croissante.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : $u_n > 0$ 1 pt + calcul du quotient et identification 1 pt) ; Q2 : 2 pts (calculer, raisonner : méthode quotient 1 pt + méthode différence avec factorisation 1 pt) ; Q3 : 3 pts (raisonner, communiquer : utilisation des propriétés du $\ln$ 1 pt + calcul de v_n 1 pt + calcul de la différence et conclusion 1 pt) ; Q4 : 1 pt (raisonner : signe de la raison sans calcul)

Corrigé

1SPE-SUITES-EX-032

Question 1 — Relation de récurrence et nature géométrique.

Chaque année, le capital est multiplié par $(1 + 0,03) = 1,03$. Donc :

$$C_{n+1} = 1,03 \times C_n, \quad C_0 = 800.$$

Démonstration : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_n = 800 \times 1,03^n > 0$, donc $C_n \neq 0$ et on peut calculer le quotient :

$$\frac{C_{n+1}}{C_n} = \frac{1,03 \times C_n}{C_n} = 1,03.$$

Ce quotient est constant, donc (C_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,03$ et de premier terme $C_0 = 800$.

Le quotient $\frac{C_{n+1}}{C_n} = 1,03$ est constant : (C_n) est géométrique de raison $q = 1,03$ et de premier terme $C_0 = 800$.

Question 2 — Expression de C_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$C_n = C_0 \times q^n = 800 \times 1,03^n.$$

Question 3 — Sens de variation.

La raison est $q = 1,03 > 1$ et $C_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc $C_{n+1} = 1,03 \times C_n > C_n$.

La suite (C_n) est **strictement croissante** : le capital augmente chaque année. C'est cohérent avec le fait que les intérêts s'ajoutent au capital (intérêts composés).

$q > 1$ et termes positifs $\Rightarrow$ suite strictement croissante : le capital augmente chaque année.

Question 4 — Calcul de C_5 .

$$C_5 = 800 \times 1,03^5 \approx 800 \times 1,15927 \approx 927,42 \text{ €}.$$

Après 5 ans, Yasmine dispose d'environ 927,42 €, soit un gain de 127,42 € par rapport au capital initial.

Question 5 — Détermination du plus petit n tel que $C_n \geq 1200$.

On cherche le plus petit entier n tel que :

$$800 \times 1,03^n \geq 1\,200 \iff 1,03^n \geq \frac{1\,200}{800} = 1,5.$$

On utilise les valeurs approchées données : $1,03^{13} \approx 1,469$ et $1,03^{14} \approx 1,513$.

Par essais successifs, en utilisant les valeurs données :

$$1,03^{13} \approx 1,469 < 1,5 \implies C_{13} \approx 800 \times 1,469 = 1\,175,20 < 1\,200.$$

$$1,03^{14} \approx 1,513 > 1,5 \implies C_{14} \approx 800 \times 1,513 = 1\,210,40 \geq 1\,200. \checkmark$$

Le plus petit entier n tel que $C_n \geq 1\,200$ est $\boxed{n = 14}$.

Yasmine doit attendre 14 ans pour que son capital dépasse 1 200 €.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, raisonner : relation de récurrence 1 pt + démonstration géométrique 1 pt) ; Q2 : 1 pt (calculer : terme général) ; Q3 : 2 pts (raisonner, communiquer : conclusion sur q 1 pt + interprétation 1 pt) ; Q4 : 1 pt (calculer : C_5 arrondi) ; Q5 : 2 pts (raisonner, calculer : inéquation 1 pt + résolution par essais et conclusion 1 pt)

1SPE-SUITES-EX-033

Corrigé

Question 1 — Modélisation et nature arithmétique.

Chaque année, l'exploitant prélève 80 arbres. Donc :

$$P_{n+1} = P_n - 80, \quad P_0 = 2\,400.$$

Démonstration : Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$P_{n+1} - P_n = (P_n - 80) - P_n = -80.$$

La différence $P_{n+1} - P_n = -80$ est constante : (P_n) est arithmétique de raison $r = -80$ et de premier terme $P_0 = 2\,400$.

Cette différence est constante, donc (P_n) est une suite arithmétique de raison $r = -80$ et de premier terme $P_0 = 2\,400$.

Question 2 — Expression de P_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$P_n = P_0 + n \times r = 2\,400 - 80n.$$

Vérification : $P_1 = 2\,400 - 80 = 2\,320 \checkmark$.

Question 3 — Sens de variation.

La raison est $r = -80 < 0$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_{n+1} - P_n = -80 < 0$, ce qui signifie $P_{n+1} < P_n$.

La suite (P_n) est **strictement décroissante** : la forêt perd des arbres chaque année, ce qui est cohérent avec l'exploitation sans replantation.

La forêt perd 80 arbres par an : le nombre d'arbres diminue strictement chaque année.

Question 4 — Valeurs de n pour lesquelles $P_n > 0$; épuisement de la forêt.

On résout $P_n > 0$:

$$2\,400 - 80n > 0 \iff 80n < 2\,400 \iff n < 30.$$

Donc $P_n > 0$ pour $n \in \{0, 1, \dots, 29\}$.

Vérification : $P_{29} = 2\,400 - 80 \times 29 = 2\,400 - 2\,320 = 80 > 0$ et $P_{30} = 2\,400 - 2\,400 = 0. \checkmark$

La forêt est complètement épuisée à l'année $n = 30$, soit 30 ans après le début de l'exploitation.

$P_{30} = 0$: la forêt est complètement épuisée au bout de 30 ans.

Question 5 — Année à partir de laquelle la limite de 1 000 arbres est franchie.

On cherche le plus petit entier n tel que $P_n < 1\,000$:

$$2\,400 - 80n < 1\,000 \iff -80n < -1\,400 \iff n > \frac{1\,400}{80} = 17,5.$$

Le plus petit entier satisfaisant cette condition est $n = 18$.

Vérification : $P_{17} = 2400 - 80 \times 17 = 2400 - 1360 = 1040 \geq 1000$ et $P_{18} = 2400 - 80 \times 18 = 2400 - 1440 = 960 < 1000$. ✓

À partir de l'année $n = 18$, le nombre d'arbres est inférieur à 1 000. Le biologiste recommanderait d'arrêter l'exploitation avant cette date.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, raisonner : relation de récurrence 1 pt + démonstration arithmétique 1 pt) ; Q2 : 1 pt (calculer : terme général) ; Q3 : 2 pts (raisonner, communiquer : signe de r 1 pt + interprétation 1 pt) ; Q4 : 2 pts (calculer, raisonner : résolution de l'inéquation 1 pt + vérification et conclusion 1 pt) ; Q5 : 1 pt (calculer : résolution et vérification)

La limite de 1 000 arbres est franchie à la 18^e année (à partir de 2020, cela correspond à l'année 2038).

Corrigé

1SPE-SUITES-EX-034

Question 1 — Modélisation, nature géométrique et terme général.

Chaque année, le capital est multiplié par $(1 + 0,05) = 1,05$. Donc :

$$K_{n+1} = 1,05 \times K_n, \quad K_0 = 2000.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $K_n > 0$, ce qui autorise le calcul du quotient :

$$\frac{K_{n+1}}{K_n} = 1,05.$$

(K_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,05$ et de premier terme $K_0 = 2000$, d'où :

$$K_n = 2000 \times 1,05^n.$$

Le quotient est constant : (K_n) est géométrique de raison $q = 1,05$ et de premier terme $K_0 = 2000$.

Question 2 — Calcul de K_5 .

$$K_5 = 2000 \times 1,05^5 \approx 2000 \times 1,27628 \approx 2552,56 \text{ €}.$$

Après 5 ans, Kévin dispose d'environ 2552,56 €, soit un gain de 552,56 €.

Question 3 — Détermination du plus petit n tel que $K_n \geq 3000$.

a) Inéquation.

$$K_n \geq 3000 \iff 2000 \times 1,05^n \geq 3000 \iff 1,05^n \geq 1,5.$$

b) Programme Python.

```
K = 2000
n = 0
while K < 3000:
    K = K * 1.05 # On multiplie le capital par 1,05 (gain de 5%)
    n = n + 1 # On incrémente le compteur d'années
print(n, K) # On affiche l'année et le capital atteint
```

La boucle simule l'évolution du capital année par année. Elle s'arrête dès que K atteint ou dépasse 3 000.

c) Trois premiers tours de boucle.

- Tour 1 : $K = 2000 \times 1,05 = 2100$, $n = 1$. Condition : $2100 < 3000$ ✓, on continue.
- Tour 2 : $K = 2100 \times 1,05 = 2205$, $n = 2$. Condition : $2205 < 3000$ ✓, on continue.
- Tour 3 : $K = 2205 \times 1,05 = 2315,25$, $n = 3$. Condition : $2315,25 < 3000$ ✓, on continue.

d) Résultat affiché.

Par essais successifs : $1,05^8 \approx 1,4775$ ($K_8 \approx 2955,00 < 3000$) et $1,05^9 \approx 1,5513$ ($K_9 \approx 3102,66 \geq 3000$).

Le programme affiche 9 3102.66...

La boucle while répète les instructions tant que $K < 3000$: elle s'arrête au premier rang où $K \geq 3000$.

$n = 9$ est le plus petit rang pour lequel $K_n \geq 3000$.

Il faut donc **9 ans** pour que le capital de Kévin dépasse 3 000 €.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, raisonner : relation de récurrence 1 pt + terme général 1 pt) ; Q2 : 1 pt (calculer : K_5 arrondi) ; Q3a : 1 pt (raisonner : mise en inéquation) ; Q3b : 2 pts (programmer, communiquer : complétion et explication du programme) ; Q3c : 1 pt (calculer : trois tours de boucle) ; Q3d : 1 pt (calculer : résultat et interprétation)

1SPE-SUITES-EX-035

Corrigé

Question 1 — Modélisation et nature arithmétique.

La population augmente de 50 habitants par an, donc :

$$N_{n+1} = N_n + 50, \quad N_0 = 1\,200.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $N_{n+1} - N_n = 50$.

(N_n) est une suite arithmétique de raison $r = 50$ et de premier terme $N_0 = 1\,200$, d'où :

$$N_n = 1\,200 + 50n.$$

Question 2 — Population au début de l'année 2031.

L'année 2031 correspond à $n = 2031 - 2020 = 11$.

$$N_{11} = 1\,200 + 50 \times 11 = 1\,200 + 550 = 1\,750 \text{ habitants.}$$

Question 3 — Calcul de $S = N_0 + N_1 + \dots + N_{11}$.

La somme porte sur 12 termes (de rang 0 à 11), de premier terme $N_0 = 1\,200$ et de dernier terme $N_{11} = 1\,750$.

$$S = \frac{12 \times (N_0 + N_{11})}{2} = \frac{12 \times (1\,200 + 1\,750)}{2} = \frac{12 \times 2\,950}{2} = 6 \times 2\,950 = 17\,700.$$

La population cumulée sur les années 2020 à 2031 est de 17 700 habitants.

Question 4 — Analyse du programme Python.

a) Explication ligne par ligne.

- ▶ $N = 1200$: initialisation de la population à 1 200 (valeur de N_0).
- ▶ $n = 0$: initialisation du compteur d'années à 0.
- ▶ **while** $N < 2000$: on répète la boucle tant que la population est strictement inférieure à 2 000.
- ▶ $N = N + 50$: on augmente la population de 50 (passage à l'année suivante).
- ▶ $n = n + 1$: on incrémente le compteur d'années.
- ▶ `print("Annee :", 2020 + n)` : on affiche l'année calendaire.
- ▶ `print("Population :", N)` : on affiche la population atteinte.

b) Résultat sans exécution.

On cherche le plus petit entier n tel que $N_n \geq 2\,000$:

$$1\,200 + 50n \geq 2\,000 \iff 50n \geq 800 \iff n \geq 16.$$

Le plus petit entier n vérifiant cette condition est $n = 16$.

Le programme affiche : Année : 2036 et Population : 2000.

c) Vérification.

$$N_{15} = 1\,200 + 50 \times 15 = 1\,200 + 750 = 1\,950 < 2\,000 \quad (\text{boucle continue}).$$

$$N_{16} = 1\,200 + 50 \times 16 = 1\,200 + 800 = 2\,000 \geq 2\,000 \quad (\text{boucle s'arrête}). \checkmark$$

La ville atteindra 2 000 habitants au début de l'année 2036.

La différence est constante : (N_n) est arithmétique de raison $r = 50$ et de premier terme $N_0 = 1\,200$.

Formule : somme de p termes en progression arithmétique = $\frac{p \times (\text{premier} + \text{dernier})}{2}$.

Le plus petit entier n est $n = 16$: le programme s'arrête à $n = 16$ et affiche l'année $2020 + 16 = 2036$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, raisonner : relation de récurrence 1 pt + terme général 1 pt); Q2 : 1 pt (calculer : N_{11} avec identification du rang); Q3 : 2 pts (calculer : application formule somme arithmétique); Q4a : 2 pts (programmer, communiquer : explication ligne par ligne); Q4b : 2 pts (raisonner, calculer : résolution algébrique et résultat); Q4c : 1 pt (calculer : vérification N_{15} et N_{16})

Corrigé

1SPE-SUITES-EX-036

Question 1 — Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .

$$\begin{aligned}u_0 &= 0^2 - 5 \times 0 + 8 = 8, \\u_1 &= 1^2 - 5 \times 1 + 8 = 1 - 5 + 8 = 4, \\u_2 &= 2^2 - 5 \times 2 + 8 = 4 - 10 + 8 = 2, \\u_3 &= 3^2 - 5 \times 3 + 8 = 9 - 15 + 8 = 2, \\u_4 &= 4^2 - 5 \times 4 + 8 = 16 - 20 + 8 = 4.\end{aligned}$$

Question 2 — Formule explicite ou récurrence?

La suite est définie par une **formule explicite** : $u_n = n^2 - 5n + 8$ exprime directement u_n en fonction de n , sans faire intervenir les termes précédents. Il n'est pas nécessaire de calculer u_{n-1} pour obtenir u_n .

Question 3 — Étude de $u_{n+1} - u_n$.

$$u_{n+1} - u_n = ((n+1)^2 - 5(n+1) + 8) - (n^2 - 5n + 8).$$

En développant :

$$u_{n+1} - u_n = n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 + 8 - n^2 + 5n - 8 = 2n - 4.$$

Donc $u_{n+1} - u_n = 2n - 4 = 2(n - 2)$.

Étude du signe :

- Si $n < 2$ (c'est-à-dire $n \in \{0, 1\}$) : $2(n - 2) < 0$, donc $u_{n+1} < u_n$: la suite est **décroissante**.
- Si $n = 2$: $2(n - 2) = 0$, donc $u_3 = u_2 = 2$.
- Si $n > 2$ (c'est-à-dire $n \geq 3$) : $2(n - 2) > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$: la suite est **croissante**.

On obtient

$u_{n+1} - u_n = 2n - 4$,
dont le signe dépend de n .

Question 4 — Conclusion sur les variations et terme(s) minimal/minimaux.

La suite (u_n) est :

- **strictement décroissante** pour $n \in \{0, 1\}$: $u_0 = 8 > u_1 = 4 > u_2 = 2$;
- les termes $u_2 = u_3 = 2$ sont égaux : la suite est « stationnaire » entre $n = 2$ et $n = 3$;
- **strictement croissante** pour $n \geq 3$: $u_3 = 2 < u_4 = 4 < \dots$

Le **minimum** est atteint pour $n = 2$ et $n = 3$: $u_2 = u_3 = 2$.

Question 5 — Comparaison avec la fonction $f(x) = x^2 - 5x + 8$.

La dérivée est $f'(x) = 2x - 5$.

$$f'(x) = 0 \iff x = \frac{5}{2} = 2,5.$$

f est décroissante sur $[0; 2,5]$ et croissante sur $[2,5; +\infty[$, avec un minimum en $x = 2,5$.

La suite (u_n) , qui correspond à f restreinte aux entiers, suit la même tendance : décroissante pour $n \leq 2$, croissante pour $n \geq 3$. Le minimum continu de f est en $x = 2,5$, et les deux entiers encadrant ce point ($n = 2$ et $n = 3$) donnent la même valeur minimale $u_2 = u_3 = 2$.

$f'(x) < 0$ pour $x < 2,5$
(décroissance) et
 $f'(x) > 0$ pour $x > 2,5$
(croissance) : minimum
en $x = 2,5$.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer : cinq termes); Q2 : 1 pt (raisonner, communiquer : identification formule explicite); Q3 : 3 pts (calculer, raisonner : développement 1 pt + simplification 1 pt + étude du signe 1 pt); Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer : tableau de variations 1 pt + identification des minimums 1 pt); Q5 : 1 pt (calculer, communiquer : calcul de f' et comparaison)

Corrigé

Question 1 — Calcul de u_1, u_2, u_3 et u_4 .

$$\begin{aligned}u_1 &= \frac{u_0}{2} + 3 = \frac{20}{2} + 3 = 10 + 3 = 13. \\u_2 &= \frac{u_1}{2} + 3 = \frac{13}{2} + 3 = \frac{13}{2} + \frac{6}{2} = \frac{19}{2}. \\u_3 &= \frac{u_2}{2} + 3 = \frac{19}{4} + 3 = \frac{19}{4} + \frac{12}{4} = \frac{31}{4}. \\u_4 &= \frac{u_3}{2} + 3 = \frac{31}{8} + 3 = \frac{31}{8} + \frac{24}{8} = \frac{55}{8}.\end{aligned}$$

Question 2 — La suite est-elle arithmétique ? Géométrique ?

Différences :

$$u_1 - u_0 = 13 - 20 = -7, \quad u_2 - u_1 = \frac{19}{2} - 13 = \frac{19 - 26}{2} = -\frac{7}{2}.$$

Les deux différences sont différentes ($-7 \neq -\frac{7}{2}$) : (u_n) n'est pas arithmétique.

Quotients :

$$\frac{u_1}{u_0} = \frac{13}{20}, \quad \frac{u_2}{u_1} = \frac{19/2}{13} = \frac{19}{26}.$$

Les deux quotients sont différents ($\frac{13}{20} \neq \frac{19}{26}$) : (u_n) n'est pas géométrique.

Question 3 — Expression de $u_{n+1} - u_n$; déduction.

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{u_n}{2} + 3 \right) - u_n = 3 - \frac{u_n}{2} = \frac{6 - u_n}{2}.$$

Si $u_n > 6$, alors $6 - u_n < 0$, donc $u_{n+1} - u_n = \frac{6 - u_n}{2} < 0$, ce qui signifie $u_{n+1} < u_n$.

Question 4 — Décroissance stricte de (u_n) .

On admet que $u_n > 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

D'après la question précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 6 \Rightarrow u_{n+1} - u_n < 0 \Rightarrow u_{n+1} < u_n$.

Donc la suite (u_n) est strictement décroissante.

Question 5 — Vérification de la limite conjecturée $L = 6$.

On résout l'équation du point fixe $L = \frac{L}{2} + 3$:

$$L - \frac{L}{2} = 3 \Leftrightarrow \frac{L}{2} = 3 \Leftrightarrow L = 6.$$

La valeur $L = 6$ est l'unique solution. **Interprétation** : si la suite (u_n) converge vers une limite L , alors en passant à la limite dans la relation $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 3$, on obtient $L = \frac{L}{2} + 3$, soit $L = 6$. La conjecture $u_n \rightarrow 6$ est donc cohérente avec cette équation.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer : quatre termes exacts en fractions) ; Q2 : 2 pts (raisonner : calcul des différences 1 pt + calcul des quotients 1 pt) ; Q3 : 2 pts (calculer, raisonner : calcul de $u_{n+1} - u_n$ 1 pt + déduction avec $u_n > 6$ 1 pt) ; Q4 : 1 pt (raisonner : conclusion par hypothèse admise) ; Q5 : 1 pt (calculer, communiquer : résolution et interprétation)

La relation $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 3$ mélange une dilatation ($\times \frac{1}{2}$) et une translation (+3) : ce n'est pas une suite standard.

Tant que $u_n > 6$, chaque terme est strictement inférieur au précédent : la suite descend vers 6.

Un point fixe L de la relation de récurrence satisfait $L = f(L)$. Si la suite converge, sa limite est nécessairement un point fixe.

Corrigé

Question 1 — Valeur initiale et relation de récurrence.

À l'achat ($n = 0$), la valeur du véhicule est son prix d'achat : $V_0 = 18\,000$ €.

Chaque année, le véhicule perd 12 % de sa valeur, donc il conserve $100\% - 12\% = 88\%$ de sa valeur :

$$V_{n+1} = 0,88 \times V_n.$$

Question 2 — Nature géométrique.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_n = 18\,000 \times 0,88^n > 0$, donc $V_n \neq 0$ et le quotient est calculable :

$$\frac{V_{n+1}}{V_n} = \frac{0,88 \times V_n}{V_n} = 0,88.$$

Ce quotient est constant, donc (V_n) est une suite géométrique de raison $q = 0,88$ et de premier terme $V_0 = 18\,000$.

Le quotient $\frac{V_{n+1}}{V_n} = 0,88$ est constant : (V_n) est géométrique de raison $q = 0,88$ et de premier terme $V_0 = 18\,000$.

Question 3 — Expression de V_n en fonction de n .

$$V_n = V_0 \times q^n = 18\,000 \times 0,88^n.$$

Question 4 — Calcul de V_3 .

$$V_3 = 18\,000 \times 0,88^3 = 18\,000 \times 0,681\,472 \approx 12\,266 \text{ €}.$$

Après 3 ans, le véhicule de Théo vaut environ 12 266 €, soit une perte de 5 734 € par rapport au prix d'achat.

Question 5 — Seuil de revente à 9 000 €.

a) Inéquation.

On cherche n tel que $V_n < 9\,000$:

$$18\,000 \times 0,88^n < 9\,000 \iff 0,88^n < \frac{9\,000}{18\,000} = 0,5.$$

b) Résolution.

On applique $\log_{10}$ aux deux membres. Comme $\log_{10}(0,88) < 0$, le sens de l'inégalité s'inverse :

$$n \times \log_{10}(0,88) < \log_{10}(0,5) \iff n > \frac{\log_{10}(0,5)}{\log_{10}(0,88)} \approx \frac{-0,301}{-0,0555} \approx 5,42.$$

Le plus petit entier satisfaisant $n > 5,42$ est $n = 6$.

Vérification par essais successifs :

$$V_5 = 18\,000 \times 0,88^5 \approx 18\,000 \times 0,5277 \approx 9\,498 > 9\,000.$$

$$V_6 = 18\,000 \times 0,88^6 \approx 18\,000 \times 0,4644 \approx 8\,358 < 9\,000. \checkmark$$

La valeur passe en dessous de 9 000 € lors de la 7^e année ($n = 6$ correspond à la 7^e année écoulée).

c) Conclusion.

Théo doit revendre son véhicule **au plus tard au bout de 6 ans** (avant l'entrée en 7^e année), c'est-à-dire au plus tard à la fin de la 6^e année, alors que $V_5 \approx 9\,498$ € est encore supérieure à 9 000 €.

Division par un nombre négatif : le sens de l'inégalité s'inverse.

Pour $n = 5$ (6^e année), $V_5 > 9\,000$: Théo peut encore attendre. Pour $n = 6$ (7^e année), $V_6 < 9\,000$: il est trop tard.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser : relation de récurrence) ; Q2 : 2 pts (raisonner : $V_n > 0$ justifié 1 pt + calcul du quotient et identification 1 pt) ; Q3 : 1 pt (calculer : terme général) ; Q4 : 1 pt (calculer : V_3 arrondi et interprétation) ; Q5a : 1 pt (raisonner : mise en inéquation) ; Q5b : 2 pts (calculer, raisonner : passage au log avec signe 1 pt + essais successifs 1 pt) ; Q5c : 1 pt (communiquer : conclusion dans le contexte)

Corrigé

1SPE-SUITES-EX-039

Question 1 — Offre A.

a) Nature géométrique et terme général.

Chaque année, le capital est multiplié par $(1 + 0,07) = 1,07$, donc $A_{n+1} = 1,07 \times A_n$ avec $A_0 = 3\,000$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n > 0$, donc :

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = 1,07.$$

(A_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,07$ et de premier terme $A_0 = 3\,000$, d'où :

$$A_n = 3\,000 \times 1,07^n.$$

b) Calcul de A_5 .

$$A_5 = 3\,000 \times 1,07^5 \approx 3\,000 \times 1,40255 \approx 4\,207,66 \text{ €}.$$

Question 2 — Offre B.

a) Nature arithmétique et terme général.

Chaque année, le capital augmente de 210 € (intérêts fixes), donc $B_{n+1} = B_n + 210$ avec $B_0 = 3\,000$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$B_{n+1} - B_n = 210.$$

(B_n) est une suite arithmétique de raison $r = 210$ et de premier terme $B_0 = 3\,000$, d'où :

$$B_n = 3\,000 + 210n.$$

b) Calcul de B_5 .

$$B_5 = 3\,000 + 210 \times 5 = 3\,000 + 1\,050 = 4\,050 \text{ €}.$$

Question 3 — Comparaison.

a) À $n = 10$.

$$A_{10} = 3\,000 \times 1,07^{10} \approx 3\,000 \times 1,96715 \approx 5\,901,45 \text{ €}.$$

$$B_{10} = 3\,000 + 210 \times 10 = 3\,000 + 2\,100 = 5\,100 \text{ €}.$$

Comme $5\,901,45 > 5\,100$, l'offre A est plus avantageuse après 10 ans.

b) Pour $n = 1$ et $n = 2$.

$$A_1 = 3\,000 \times 1,07 = 3\,210 \text{ €, } B_1 = 3\,000 + 210 = 3\,210 \text{ €}.$$

Pour $n = 1$, $A_1 = B_1 = 3\,210 \text{ €}$: les deux offres sont **équivalentes**.

$$A_2 = 3\,000 \times 1,07^2 \approx 3\,434,70 \text{ €, } B_2 = 3\,000 + 420 = 3\,420 \text{ €}.$$

Pour $n = 2$, $A_2 > B_2$: l'offre A devient plus avantageuse. On conjecture que l'offre A est plus avantageuse pour tout $n \geq 2$.

c) Justification qualitative.

Une croissance **géométrique** (intérêts composés) est exponentielle : les intérêts sont recalculés chaque année sur un capital de plus en plus élevé. Une croissance **arithmétique** (intérêts simples) est linéaire : les intérêts sont toujours calculés sur le même capital initial.

À long terme, la croissance exponentielle de l'offre A dépasse inévitablement la croissance linéaire de l'offre B, même si les premières années peuvent être comparables. C'est la propriété fondamentale qui distingue les intérêts composés des intérêts simples.

Le quotient est constant : (A_n) est géométrique de raison $q = 1,07$ et de premier terme $A_0 = 3\,000$.

La différence est constante : (B_n) est arithmétique de raison $r = 210$ et de premier terme $B_0 = 3\,000$.

Pour $n = 2$, $A_2 \approx 3\,434,70 > B_2 = 3\,420$: l'offre A prend l'avantage dès la 2^e année.

À long terme, toute suite géométrique de raison $q > 1$ croît plus vite que toute suite arithmétique de raison $r > 0$: l'exponentielle domine le linéaire.

Barème indicatif : Q1a : 2 pts (raisonner, calculer : démonstration géométrique 1 pt + terme général 1 pt); Q1b : 1 pt (calculer : A_5); Q2a : 2 pts (raisonner, calculer : démonstration arithmétique 1 pt + terme général 1 pt); Q2b : 1 pt (calculer : B_5); Q3a : 2 pts (calculer, communiquer : A_{10} et B_{10} 1 pt + comparaison et conclusion 1 pt); Q3b : 2 pts (calculer : A_1, B_1, A_2, B_2 1 pt + conjecture 1 pt); Q3c : 1 pt (communiquer : justification qualitative)

Corrigé

1SPE - SUITES - EX - 040

1. Calcul des premiers termes.

On applique la relation $u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n}$:

$$u_1 = \frac{1^2 + 3}{2 \times 1} = \frac{4}{2} = 2 \quad ; \quad u_2 = \frac{2^2 + 3}{2 \times 2} = \frac{7}{4} \quad ; \quad u_3 = \frac{\left(\frac{7}{4}\right)^2 + 3}{2 \times \frac{7}{4}} = \frac{\frac{49}{16} + 3}{\frac{7}{2}} = \frac{\frac{97}{16}}{\frac{7}{2}} = \frac{97}{56}.$$

Appliquer la relation de récurrence en partant de $u_0 = 1$.

2. Conjecture.

On observe : $u_1 = 2 \approx 2,000$, $u_2 = 1,750$, $u_3 \approx 1,732$. La suite semble **décroissante** pour $n \geq 1$ et paraît converger vers $\sqrt{3} \approx 1,732$.

3. Point fixe et interprétation géométrique.

L'équation $\ell = \frac{\ell^2 + 3}{2\ell}$ (avec $\ell > 0$) donne $2\ell^2 = \ell^2 + 3$, soit $\ell^2 = 3$, donc $\ell = \sqrt{3}$.

Le point fixe est la solution de $f(x) = x$ où $f(x) = \frac{x^2 + 3}{2x}$.

Interprétation. La fonction $f(x) = \frac{x^2 + 3}{2x}$ est la moyenne arithmétique de x et $\frac{3}{x}$, qui est la méthode de Héron pour approcher $\sqrt{3}$. La suite converge vers le point fixe $\sqrt{3}$ de f .

4. Signe de $u_{n+1} - \sqrt{3}$.

Pour $u_n > 0$:

$$u_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n} - \sqrt{3} = \frac{u_n^2 + 3 - 2\sqrt{3}u_n}{2u_n} = \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2u_n}.$$

Factoriser $u_{n+1} - \sqrt{3}$ comme un carré sur $2u_n$.

Ce quotient est un carré divisé par $2u_n > 0$, donc $u_{n+1} - \sqrt{3} \geq 0$, avec égalité ssi $u_n = \sqrt{3}$.

Initialisation pour $n = 1$: $u_1 = 2 > \sqrt{3}$ donc $u_1 \geq \sqrt{3}$.

Pour $n \geq 1$, par récurrence immédiate : $u_n > 0$ et le calcul ci-dessus montre $u_{n+1} \geq \sqrt{3}$.

Donc **pour tout entier** $n \geq 1$, $u_n \geq \sqrt{3}$.

5. Décroissance pour $n \geq 1$.

Pour $n \geq 1$, on a $u_n \geq \sqrt{3} > 0$ d'après la question 4, donc $u_n^2 \geq 3$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n} - u_n = \frac{u_n^2 + 3 - 2u_n^2}{2u_n} = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0.$$

Donc $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.

6. Conclusion.

La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante et minorée par $\sqrt{3}$ (question 4). D'après le théorème de convergence des suites monotones bornées, elle converge vers une limite $\ell \geq \sqrt{3}$.

Utiliser le théorème des suites monotones bornées.

Si (u_n) converge vers ℓ , alors par passage à la limite dans la relation de récurrence :

$$\ell = \frac{\ell^2 + 3}{2\ell} \implies \ell = \sqrt{3} \quad (\ell > 0).$$

La conjecture est donc justifiée : (u_n) converge vers $\sqrt{3}$.

Corrigé

1SPE - SUITES - EX - 041

1. Nature des suites.

a) Pour tout $n \in \mathbb{N} : a_{n+1} - a_n = [3(n+1) + 2] - [3n + 2] = 3$. La différence est constante, donc (a_n) est **arithmétique** de premier terme $a_0 = 2$ et de raison $r = 3$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N} : \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2 \times 3^{n+1}}{2 \times 3^n} = 3$. Le rapport est constant (non nul), donc (b_n) est **géométrique** de premier terme $b_0 = 2$ et de raison $q = 3$.

c) $a_0 = 3 \times 0 + 2 = 2$ et $b_0 = 2 \times 3^0 = 2$. On a $a_0 = b_0 = 2$.

2. Comparaison terme à terme.

a) $b_1 = 2 \times 3 = 6$ et $a_1 = 3 + 2 = 5$. Donc $b_1 = 6 > 5 = a_1$. ✓

b) Montrons par récurrence que $\mathcal{P}(n) : « b_n > a_n »$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

Initialisation : $\mathcal{P}(1)$ vérifiée ci-dessus.

Hérédité : Supposons $b_n > a_n$ pour un certain $n \geq 1$.

$$b_{n+1} - a_{n+1} = 3b_n - (3n + 5) = 3b_n - a_n - 3 > 3a_n - a_n - 3 = 2a_n - 3 = 2(3n + 2) - 3 = 6n + 1 > 0$$

car $n \geq 1 \geq 0$. Donc $b_{n+1} > a_{n+1}$.

Conclusion : Pour tout entier $n \geq 1$, $b_n > a_n$.

3. Sommes.

a) (a_n) est arithmétique à 10 termes ($k = 0$ à 9), de premier terme $a_0 = 2$ et de dernier terme $a_9 = 3 \times 9 + 2 = 29$:

$$S_A = \sum_{k=0}^9 a_k = \frac{10 \times (a_0 + a_9)}{2} = \frac{10 \times (2 + 29)}{2} = 5 \times 31 = 155.$$

b) (b_k) est géométrique de raison 3, premier terme 2, 10 termes :

$$S_G = \sum_{k=0}^9 b_k = 2 \times \frac{3^{10} - 1}{3 - 1} = 3^{10} - 1 = 59\,049 - 1 = 59\,048.$$

c) $S_G - S_A = 59\,048 - 155 = 58\,893$.

La somme cumulée de la suite géométrique dépasse de loin celle de la suite arithmétique, illustrant la croissance bien plus rapide des progressions géométriques.

4. Question ouverte.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$S_A^{(n)} = \sum_{k=0}^n (3k + 2) = \frac{(n+1)(3n+4)}{2} \quad \text{et} \quad S_G^{(n)} = \sum_{k=0}^n 2 \times 3^k = 3^{n+1} - 1.$$

On cherche le plus petit n tel que $3^{n+1} - 1 > 100 \times \frac{(n+1)(3n+4)}{2}$.

Vérification numérique (obtenue par la relation algébrique ou un algorithme) :

n	$S_G^{(n)}$	$100 \times S_A^{(n)}$	$S_G^{(n)} > 100 \times S_A^{(n)}$
7	6 560	10 000	non
8	19 682	12 600	oui

La plus petite valeur est $n = 8$.

Pour la récurrence, écrire $b_{n+1} - a_{n+1}$ en fonction de $b_n - a_n$.

Exprimer $S_A^{(n)}$ et $S_G^{(n)}$ en formules closes, puis résoudre l'inégalité.

1. Premiers termes et conjecture.

$$u_1 = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2} \quad ; \quad u_2 = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6} \quad ; \quad u_3 = \frac{1}{3 \times 4} = \frac{1}{12}.$$

$$S_1 = \frac{1}{2} \quad ; \quad S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \quad ; \quad S_3 = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}.$$

Conjecture : $S_n = \frac{n}{n+1}$.

2. Décomposition.

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)} = u_k. \quad \checkmark$$

3. Somme télescopique.

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

En développant et en groupant (chaque $\frac{1}{k+1}$ s'annule avec le $\frac{1}{k}$ du terme suivant) :

$$S_n = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

4. Monotonie et convergence.

$S_{n+1} - S_n = u_{n+1} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$ pour tout $n \geq 1$: la suite (S_n) est **strictement croissante**.

De plus, $S_n = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$ pour tout $n \geq 1$: (S_n) est **majorée par 1**.

La suite (S_n) est croissante et majorée, donc elle converge. Sa limite est $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$.

5. Généralisation.

a) On cherche A et B tels que $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{A}{k} + \frac{B}{k+2}$, soit $A(k+2) + Bk = 1$ pour tout k .

► $k = 0 : 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}.$

► $k = -2 : -2B = 1 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}.$

Donc $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right).$

b) Somme télescopique avec un décalage de 2 :

$$T_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) \right].$$

$$T_n = \frac{3}{4} - \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2(n+2)}.$$

Les termes $\frac{1}{k}$ survivent pour $k = 1, 2$; les termes $\frac{1}{k+2}$ survivent pour $k = n-1, n$.

Corrigé

1SPE - SUITES - EX - 043

1. Calcul des premiers termes.

$$u_1 = 0,8 \times 600 + 200 = 480 + 200 = 680 \quad ; \quad u_2 = 0,8 \times 680 + 200 = 744 \quad ; \quad u_3 = 0,8 \times 744 + 200 = 795,2.$$

La population **croît** et semble se stabiliser autour de 1 000 individus.

2. Point d'équilibre.

a) $0,8\ell + 200 = \ell \Rightarrow 200 = 0,2\ell \Rightarrow \ell = 1\,000.$

b) Si la population atteint 1 000 individus, les 200 réintroductions compensent exactement les 20 % de disparitions ($0,2 \times 1\,000 = 200$). La population est alors stable.

Le point fixe ℓ est la population qui se reproduit à l'identique d'une année sur l'autre.

3. Suite auxiliaire.

a) On pose $v_n = u_n - 1\,000$. Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1\,000 = (0,8u_n + 200) - 1\,000 = 0,8u_n - 800 = 0,8(u_n - 1\,000) = 0,8v_n.$$

(v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = u_0 - 1\,000 = 600 - 1\,000 = -400$ et de raison $q = 0,8 = \frac{4}{5}$.

b)

$$v_n = -400 \times \left(\frac{4}{5}\right)^n \quad \text{d'où} \quad \boxed{u_n = 1\,000 - 400 \times \left(\frac{4}{5}\right)^n}.$$

4. Monotonie et comportement à long terme.

$$u_{n+1} - u_n = 0,8u_n + 200 - u_n = 200 - 0,2u_n.$$

Montrons par récurrence que $u_n < 1\,000$ pour tout $n \in \mathbb{N}$:

► $u_0 = 600 < 1\,000$. ✓

► Si $u_n < 1\,000$, alors $u_{n+1} = 0,8u_n + 200 < 0,8 \times 1\,000 + 200 = 1\,000$. ✓

Donc $u_n < 1\,000$ pour tout n , ce qui entraîne $u_{n+1} - u_n = 200 - 0,2u_n > 200 - 0,2 \times 1\,000 = 0$.

La suite (u_n) est donc **strictement croissante** et **majorée par 1 000**.

Comportement à long terme : $\left(\frac{4}{5}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, donc $u_n \rightarrow 1\,000$. La population se stabilise à long terme autour de **1 000** individus.

5. Problème d'optimisation.

a) Avec un apport de c individus par an, le point fixe vérifie $0,8\ell(c) + c = \ell(c)$, soit $0,2\ell(c) = c$, d'où $\ell(c) = 5c$.

b) On veut $\ell(c) \geq 1\,500$, soit $5c \geq 1\,500$, donc $c \geq 300$.

La valeur minimale de réintroduction est $\boxed{c = 300}$ individus par an.

1SPE-SUITES-EX-044

Corrigé

1. Mise en équation.

Au début du mois n , le capital dû est C_n . Les intérêts du mois s'élèvent à $0,5\% \times C_n = 0,005C_n$. Après paiement de la mensualité de 800 € :

$$C_{n+1} = C_n + 0,005C_n - 800 = 1,005C_n - 800.$$

2. Calcul de C_1 et C_2 .

$$C_1 = 1,005 \times 120\,000 - 800 = 120\,600 - 800 = 119\,800 \text{ €}.$$

$$C_2 = 1,005 \times 119\,800 - 800 = 120\,399 - 800 = 119\,599 \text{ €}.$$

3. Résolution.

a) $1,005L - 800 = L \Rightarrow 0,005L = 800 \Rightarrow L = 160\,000$.

b) On pose $v_n = C_n - 160\,000$. Alors :

$$v_{n+1} = C_{n+1} - 160\,000 = (1,005C_n - 800) - 160\,000 = 1,005(C_n - 160\,000) = 1,005v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison $q = 1,005$ et de premier terme $v_0 = 120\,000 - 160\,000 = -40\,000$.

c) $v_n = -40\,000 \times 1,005^n$, donc :

$$\boxed{C_n = 160\,000 - 40\,000 \times 1,005^n}.$$

4. Durée de remboursement.

$$C_n \leq 0 \Leftrightarrow 160\,000 - 40\,000 \times 1,005^n \leq 0 \Leftrightarrow 1,005^n \geq 4.$$

La monotonie découle directement du signe de $u_{n+1} - u_n$.

La méthode du point fixe permet de ramener la suite affine à une suite géométrique.

Résoudre $C_n \leq 0$ revient à résoudre une inégalité sur une exponentielle.

En passant au logarithme (fonction croissante) :

$$n \geq \frac{\ln 4}{\ln 1,005}.$$

Calcul numérique : $\frac{\ln 4}{\ln 1,005} = \frac{2 \ln 2}{\ln 1,005} \approx \frac{2 \times 0,6931}{0,004988} \approx 277,9.$

Le plus petit entier vérifiant cette inégalité est $n = 278$.

Le ménage rembourse l'emprunt en **278 mensualités**, soit environ 23 ans et 2 mois.

Vérification : $1,005^{278} \approx 4,001 > 4$ et $1,005^{277} \approx 3,981 < 4$. ✓

5. Script Python.

Le code est déjà complet. Il simule le remboursement mois par mois, en appliquant $C \leftarrow 1,005 \times C - 800$ et en incrémentant n tant que $C > 0$.

À la fin de l'exécution, la variable n affiche **278**, confirmant le calcul algébrique.

Corrigé

1SPE-SUITES-EX-045

1. Calcul des premiers termes.

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{2} \times 5 + 3 = \frac{5}{2} + 3 = \frac{11}{2} = 5,5. \\ u_2 &= \frac{1}{2} \times \frac{11}{2} + 3 = \frac{11}{4} + 3 = \frac{23}{4} = 5,75. \\ u_3 &= \frac{1}{2} \times \frac{23}{4} + 3 = \frac{23}{8} + 3 = \frac{47}{8} = 5,875. \end{aligned}$$

Les valeurs 5;5,5;5,75;5,875 semblent croître et se rapprocher de 6. La suite paraît converger vers 6.

2. Point fixe.

a) On résout $\frac{1}{2} \ell + 3 = \ell$:

$$3 = \ell - \frac{1}{2} \ell = \frac{1}{2} \ell \Rightarrow \ell = 6.$$

b) On pose $v_n = u_n - 6$. Calculons v_{n+1} :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \left(\frac{1}{2} u_n + 3 \right) - 6 = \frac{1}{2} u_n - 3 = \frac{1}{2} (u_n - 6) = \frac{1}{2} v_n.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n$.

La suite (v_n) est donc **géométrique** de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 6 = 5 - 6 = -1$.

3. Expression explicite.

$$v_n = v_0 \times q^n = -1 \times \left(\frac{1}{2} \right)^n = - \left(\frac{1}{2} \right)^n.$$

Donc :

$$u_n = 6 - \left(\frac{1}{2} \right)^n.$$

Vérification : $u_0 = 6 - 1 = 5$ ✓ $u_1 = 6 - \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$ ✓

4. Variations.

a) On calcule $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \left[6 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right] - \left[6 - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right] = \left(\frac{1}{2} \right)^n - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} = \left(\frac{1}{2} \right)^n \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}.$$

La méthode du point fixe : on cherche ℓ tel que $f(\ell) = \ell$, ce qui permet de transformer la suite affine en suite géométrique.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} > 0$, donc $u_{n+1} - u_n > 0$.

La suite (u_n) est **strictement croissante**.

5. Encadrement par récurrence.

On montre que $5 \leq u_n < 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : $u_0 = 5$, donc $5 \leq u_0 = 5 < 6$. ✓

Hérédité : Supposons $5 \leq u_n < 6$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

- Minoration : $u_n \geq 5 \Rightarrow \frac{1}{2}u_n \geq \frac{5}{2} \Rightarrow u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 \geq \frac{5}{2} + 3 = \frac{11}{2} > 5$. Donc $u_{n+1} \geq 5$. ✓
- Majoration : $u_n < 6 \Rightarrow \frac{1}{2}u_n < 3 \Rightarrow u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 < 3 + 3 = 6$. ✓

Conclusion : Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $5 \leq u_n < 6$.

6. Généralisation avec $u_0 = 8$.

Le point fixe reste $\ell = 6$. En posant $w_n = u_n - 6$, on obtient de même $w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n$, donc (w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $w_0 = 8 - 6 = 2$.

Ainsi :

$$u_n = 6 + 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 6 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

Variations : $u_{n+1} - u_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} < 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La suite est **strictement décroissante** (car $w_0 = 2 > 0$, donc $u_n > 6$ et la suite décroît vers 6).

La récurrence démontre rigoureusement ce que les calculs numériques laissent pressentir.

Le point fixe $\ell = 6$ ne dépend pas de u_0 : seul le premier terme de la suite auxiliaire change.

1SPE-SUITES-EX-046

Corrigé

1. Nature de la suite (u_n) .

Chaque année, la production est réduite de 10 % : $u_{n+1} = u_n - 0,1 u_n = 0,9 u_n$.

La suite (u_n) est **géométrique** de premier terme $u_0 = 10\,000$ et de raison $q = \frac{9}{10} = 0,9$.

2. Expression de u_n , calcul de u_5 et u_{10} .

$$u_n = 10\,000 \times \left(\frac{9}{10}\right)^n.$$

$$u_5 = 10\,000 \times (0,9)^5 = 10\,000 \times 0,59049 \approx 5\,905 \text{ pièces.}$$

$$u_{10} = 10\,000 \times (0,9)^{10} = 10\,000 \times 0,34868 \approx 3\,487 \text{ pièces.}$$

La production est réduite de près de la moitié après 5 ans, et aux deux tiers après 10 ans.

3. Production cumulée S_n .

a) La suite (u_k) est géométrique de premier terme $u_0 = 10\,000$ et de raison $q = \frac{9}{10} \neq 1$. On applique la formule de somme d'une suite géométrique :

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 10\,000 \times \frac{1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}}{1 - \frac{9}{10}} = 10\,000 \times \frac{1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}}{\frac{1}{10}}.$$

$$S_n = 100\,000 \times \left[1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}\right].$$

Une diminution de 10 % revient à multiplier par $0,9 = \frac{9}{10}$.

b) Calcul de S_4 et S_{19} :

$$S_4 = 100\,000 \times [1 - (0,9)^5] = 100\,000 \times (1 - 0,59049) = 100\,000 \times 0,40951 \approx 40\,951 \text{ pièces.}$$

$$S_{19} = 100\,000 \times [1 - (0,9)^{20}] = 100\,000 \times (1 - 0,12158) \approx 87\,842 \text{ pièces.}$$

c) Quand $n \rightarrow +\infty$, $\left(\frac{9}{10}\right)^{n+1} \rightarrow 0$ (car $0 < \frac{9}{10} < 1$), donc $S_n \rightarrow 100\,000$.

La production cumulée totale de l'usine, sur toute sa durée de vie, ne dépasserait jamais 100 000 pièces. C'est cohérent : chaque année la production décroît et tend vers 0, de sorte que la somme converge.

4. Seuil : $S_n > 90\,000$.

$$\begin{aligned} S_n > 90\,000 &\Leftrightarrow 100\,000 \times \left[1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}\right] > 90\,000 \Leftrightarrow 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1} > 0,9 \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1} < 0,1. \end{aligned}$$

La résolution d'une inégalité avec logarithme est la méthode exacte pour les seuils sur des suites géométriques.

En passant au logarithme (fonction croissante, et $\ln\left(\frac{9}{10}\right) < 0$, donc l'inégalité change de sens) :

$$(n+1) \ln\left(\frac{9}{10}\right) < \ln(0,1) \Leftrightarrow n+1 > \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,9)} = \frac{-\ln 10}{\ln 9 - \ln 10}.$$

Numériquement : $\frac{\ln(0,1)}{\ln(0,9)} \approx \frac{-2,3026}{-0,10536} \approx 21,85$.

Donc $n+1 > 21,85$, soit $n > 20,85$, d'où $n \geq 21$.

Vérification :

- Pour $n = 21$: $(0,9)^{22} \approx 0,0985 < 0,1$ ✓
- Pour $n = 20$: $(0,9)^{21} \approx 0,1094 > 0,1$ ✗

Le plus petit entier n tel que $S_n > 90\,000$ est $\boxed{n = 21}$ (à partir de la 22^e année).

5. Comparaison avec l'usine concurrente.

L'usine concurrente produit 5 000 pièces par an. Sa production cumulée sur $(n+1)$ années est :

$$T_n = 5\,000 \times (n+1).$$

On cherche le plus petit n tel que $T_n > S_n$, c'est-à-dire :

$$5\,000(n+1) > 100\,000 [1 - (0,9)^{n+1}].$$

Cette inégalité n'admet pas de solution explicite simple. On procède numériquement :

n	S_n	T_n
0	10 000	5 000
10	65 132	55 000
20	87 842	105 000

Entre $n = 10$ et $n = 20$, T_n dépasse S_n . En affinant :

- $n = 14$: $S_{14} \approx 79\,411$ et $T_{14} = 75\,000$ ($T < S$).
- $n = 15$: $S_{15} \approx 81\,470$ et $T_{15} = 80\,000$ ($T < S$).
- $n = 16$: $S_{16} \approx 83\,323$ et $T_{16} = 85\,000$ ($T > S$). ✓

L'usine concurrente produit une suite arithmétique (production constante), dont la somme croît sans borne, contrairement à la suite géométrique dont la somme converge.

À partir du rang $n = 16$ (soit la 17^e année), la production cumulée de l'usine concurrente dépasse celle de la première usine.

1SPE-SUITES-EX-047

Corrigé**1. Calcul des premiers termes.**

$$u_0 = 0^2 + 0 + 1 = 1, \quad u_1 = 1 + 1 + 1 = 3, \quad u_2 = 4 + 2 + 1 = 7, \quad u_3 = 9 + 3 + 1 = 13, \quad u_4 = 16 + 4 + 1 = 21.$$

2. Nature de la suite (u_n) .

Arithmétique ? On calcule $u_1 - u_0 = 3 - 1 = 2$ et $u_2 - u_1 = 7 - 3 = 4$. Ces différences sont inégales, donc (u_n) **n'est pas arithmétique**.

Géométrique ? On calcule $\frac{u_1}{u_0} = \frac{3}{1} = 3$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{7}{3}$. Ces rapports sont inégaux, donc (u_n) **n'est pas géométrique**.

3. Calcul des d_n et conjecture.

$$d_0 = u_1 - u_0 = 3 - 1 = 2, \quad d_1 = u_2 - u_1 = 7 - 3 = 4, \quad d_2 = u_3 - u_2 = 13 - 7 = 6, \quad d_3 = u_4 - u_3 = 21 - 13 = 8.$$

On observe que $d_0 = 2, d_1 = 4, d_2 = 6, d_3 = 8$: les d_n augmentent de 2 à chaque fois.

Conjecture : (d_n) est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme $d_0 = 2$.

4. Démonstration.

Calcul de d_n en fonction de n :

$$\begin{aligned} d_n &= u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 + (n+1) + 1] - [n^2 + n + 1] \\ &= n^2 + 2n + 1 + n + 1 + 1 - n^2 - n - 1 \\ &= 2n + 2. \end{aligned}$$

Calcul de $d_{n+1} - d_n$:

$$d_{n+1} - d_n = [2(n+1) + 2] - [2n + 2] = 2n + 2 + 2 - 2n - 2 = 2.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $d_{n+1} - d_n = 2$ (constante). La suite (d_n) est donc **arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $d_0 = 2$** .

On retrouve bien : $d_n = d_0 + n \times 2 = 2 + 2n = 2(n+1)$, ce qui est cohérent avec le calcul direct.

5. Sens de variation de (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $d_n = u_{n+1} - u_n = 2n + 2 = 2(n+1)$.

Comme $n \geq 0$, on a $n+1 \geq 1 > 0$, donc $d_n = 2(n+1) > 0$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} > u_n$: la suite (u_n) est **strictement croissante**.

6. Programme Python.

```
for n in range(21):
    u_n = n**2 + n + 1
    d_n = 2*n + 2
    print(f"n={n:2d} : u_n={u_n:4d}, d_n={d_n:2d}")
```

Ce programme affiche pour chaque entier n de 0 à 20 les valeurs de u_n et d_n . On observe que les valeurs de d_n sont 2, 4, 6, ..., 42 (progression arithmétique de raison 2) et que les u_n sont strictement croissants.

Extrait des premières lignes attendues :

Pour montrer qu'une suite n'est ni arithmétique ni géométrique, il suffit d'exhiber deux différences (ou deux ratios) successives non égales.

On calcule d_n comme expression en n , puis on vérifie que $d_{n+1} - d_n$ est constant.

n	u_n	d_n
0	1	2
1	3	4
2	7	6
3	13	8
4	21	10
5	31	12

Ces valeurs confirment les résultats des questions précédentes : différences successives d_n forment une progression arithmétique, et u_n est strictement croissant.

Corrigé

1SPE-SUITES-EX-048

1. Calcul des premiers termes.

$$u_1 = \frac{u_0}{3} = \frac{2}{3}, \quad u_2 = \frac{u_1}{3} = \frac{2}{9}, \quad u_3 = \frac{u_2}{3} = \frac{2}{27}.$$

2. Nature de la suite.

Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{u_n}{3}$, donc :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{3} \quad (\text{constant, indépendant de } n).$$

Pour montrer qu'une suite est géométrique, on vérifie que le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant.

La suite (u_n) est donc **géométrique** de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $q = \frac{1}{3}$.

$$u_n = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

Vérification : $u_0 = 2 \times 1 = 2 \checkmark$ $u_1 = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \checkmark$

3. Variations.

a) Positivité par récurrence.

Initialisation : $u_0 = 2 > 0$. $\checkmark$

Hérédité : Supposons $u_n > 0$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{3} > 0 \quad (\text{quotient de deux réels positifs}).$$

$\checkmark$

Conclusion : Par le principe de récurrence, $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b) Décroissance.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'après la question précédente, $u_n > 0$. On a :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{3} < u_n \quad \text{car } \frac{1}{3} < 1 \text{ et } u_n > 0.$$

Donc $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite (u_n) est **strictement décroissante**.

4. Convergence.

a) Minoration.

D'après la question 3a, $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite (u_n) est donc minorée par 0.

b) Limite.

(u_n) est décroissante et minorée, donc elle converge. Or $u_n = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Comme $0 < \frac{1}{3} < 1$, on sait que $\left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Donc $u_n = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 2 \times 0 = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

5. Seuil : $u_n < 10^{-3}$.

On résout $u_n < 10^{-3}$ en passant au logarithme, en veillant au signe de $\ln(1/3) < 0$.

$$u_n < 10^{-3} \Leftrightarrow 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n < \frac{1}{1000} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^n < \frac{1}{2000}.$$

En passant au logarithme (fonction croissante) :

$$n \ln\left(\frac{1}{3}\right) < \ln\left(\frac{1}{2000}\right) \Leftrightarrow -n \ln 3 < -\ln 2000.$$

Comme $\ln 3 > 0$, on divise par $-\ln 3$ en changeant le sens de l'inégalité :

$$n > \frac{\ln 2000}{\ln 3} = \frac{\ln 2 + 3 \ln 10}{\ln 3}.$$

Calcul numérique avec $\ln 2 \approx 0,693$ et $\ln 3 \approx 1,099$ (et $\ln 10 \approx 2,303$) :

$$\frac{\ln 2000}{\ln 3} \approx \frac{0,693 + 3 \times 2,303}{1,099} = \frac{0,693 + 6,909}{1,099} \approx \frac{7,602}{1,099} \approx 6,92.$$

Donc $n > 6,92$, d'où $n \geq 7$.

Vérification :

► $u_7 = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^7 = \frac{2}{2187} \approx 9,15 \times 10^{-4} < 10^{-3}$. ✓

► $u_6 = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{2}{729} \approx 2,74 \times 10^{-3} > 10^{-3}$. ✗

Le plus petit entier n tel que $u_n < 10^{-3}$ est $\boxed{n = 7}$.

6. Généralisation.

Si $u_{n+1} = r u_n$ avec $u_0 \neq 0$, alors $u_n = u_0 \times r^n$.

- Si $|r| < 1$ (c'est-à-dire $-1 < r < 1$), alors $r^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, donc $u_n \rightarrow 0$.
- Si $|r| \geq 1$, la suite (u_n) ne tend pas vers 0 (elle diverge ou reste constante).

La suite (u_n) converge vers 0 si et seulement si $-1 < r < 1$.

La condition de convergence vers 0 repose sur le fait que $|r|^n \rightarrow 0$ si et seulement si $|r| < 1$.

1SPE-SUITES-EX-049

Corrigé

1. Modèle 1 — Croissance géométrique.

a) Relation de récurrence.

La population augmente de 5 % par génération :

$$u_{n+1} = u_n + 0,05 u_n = 1,05 u_n.$$

b) Nature de (u_n) et expression explicite.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1,05$ (constant). La suite (u_n) est **géométrique** de premier terme $u_0 = 100$ et de raison $q = 1,05$.

$$\boxed{u_n = 100 \times (1,05)^n.}$$

c) Somme $\sum_{k=0}^9 u_k$.

Une augmentation de 5 % revient à multiplier par $1,05 = \frac{21}{20}$.

La suite géométrique a 10 termes (de $k = 0$ à $k = 9$), de premier terme $u_0 = 100$ et de raison $q = 1,05 \neq 1$:

$$\sum_{k=0}^9 u_k = u_0 \times \frac{q^{10} - 1}{q - 1} = 100 \times \frac{(1,05)^{10} - 1}{0,05}.$$

Numériquement : $(1,05)^{10} \approx 1,6289$, donc :

$$\sum_{k=0}^9 u_k \approx 100 \times \frac{0,6289}{0,05} \approx 100 \times 12,578 \approx 1\,257,8 \text{ individus.}$$

La population cumulée sur 10 générations est d'environ **1 258** individus.

d) Seuil : $u_n > 500$.

$$u_n > 500 \iff 100 \times (1,05)^n > 500 \iff (1,05)^n > 5.$$

En passant au logarithme (fonction croissante, $\ln(1,05) > 0$) :

$$n > \frac{\ln 5}{\ln 1,05} \approx \frac{1,6094}{0,04879} \approx 32,99.$$

Le plus petit entier vérifiant cette inégalité est $n = 33$.

Vérification : $(1,05)^{33} \approx 5,003 > 5 \checkmark$ et $(1,05)^{32} \approx 4,765 < 5$.

La population dépasse 500 individus à partir de la **génération** $n = 33$.

2. Modèle 2 — Croissance logistique.

a) Calcul de v_1 et v_2 .

$$v_1 = v_0 + 0,05 \times v_0 \times \left(1 - \frac{v_0}{500}\right) = 100 + 0,05 \times 100 \times \left(1 - \frac{100}{500}\right) = 100 + 5 \times \frac{4}{5} = 100 + 4 = 104.$$

$$v_2 = 104 + 0,05 \times 104 \times \left(1 - \frac{104}{500}\right) = 104 + 5,2 \times \frac{396}{500} = 104 + 5,2 \times 0,792 = 104 + 4,118 \approx 108,1.$$

b) Invariance de l'encadrement $0 < v_n < 500$ par récurrence.

Initialisation : $v_0 = 100$, donc $0 < v_0 = 100 < 500$. $\checkmark$

Hérédité : Supposons $0 < v_n < 500$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

On a $v_{n+1} = v_n + 0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right)$.

Minoration : Comme $0 < v_n < 500$, on a $1 - \frac{v_n}{500} > 0$, donc $0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right) > 0$, d'où $v_{n+1} > v_n > 0$.

Majoration : On calcule :

$$\begin{aligned} v_{n+1} - 500 &= v_n - 500 + 0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right) \\ &= (v_n - 500) + \frac{0,05 v_n (500 - v_n)}{500} \\ &= (v_n - 500) \left[1 - \frac{0,05 v_n}{500}\right] \\ &= (v_n - 500) \left(1 - \frac{v_n}{10\,000}\right). \end{aligned}$$

Comme $0 < v_n < 500$, on a :

► $v_n - 500 < 0$,

On passe au logarithme pour résoudre une inégalité sur une exponentielle.

La structure de la fonction logistique garantit que la population reste toujours entre 0 et 500.

► $1 - \frac{v_n}{10\,000} > 1 - \frac{500}{10\,000} = \frac{19}{20} > 0.$

Donc $v_{n+1} - 500 = (v_n - 500) \left(1 - \frac{v_n}{10\,000}\right) < 0$, ce qui donne $v_{n+1} < 500$. ✓

Conclusion : Par le principe de récurrence, $0 < v_n < 500$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

c) Sens de variation de (v_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} - v_n = 0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right).$$

D'après la question b), $v_n > 0$ et $1 - \frac{v_n}{500} > 0$ (car $v_n < 500$).

Donc $v_{n+1} - v_n > 0$: la suite (v_n) est **strictement croissante**.

3. Comparaison et analyse du script Python.

Le script simule les deux modèles sur 20 générations. Les valeurs affichées sont :

n	u_n (géométrique)	v_n (logistique)
5	127,6	122,0
10	162,9	144,5
20	265,3	196,4

(Valeurs approximatives, calculées par le script.)

Comportements à long terme :

- **Modèle 1** (u_n) : la suite est géométrique de raison $1,05 > 1$, donc $u_n \rightarrow +\infty$. La population croît indéfiniment, sans limite. Ce modèle est irréaliste car il ignore les contraintes de ressources.
- **Modèle 2** (v_n) : la suite est croissante et majorée par 500, donc elle converge. On peut montrer que la limite est 500 (la capacité d'accueil K). La population croît mais se stabilise en dessous de la capacité maximale. Ce modèle est plus réaliste biologiquement.

Le modèle logistique est fondamental en biologie des populations : il intègre la compétition pour les ressources via le terme $(1 - v_n/K)$.

Les deux populations se comportent de façon similaire au début (faibles effectifs, le terme logistique est proche de 1), mais divergent à moyen et long terme : le modèle géométrique explose tandis que le modèle logistique sature autour de $K = 500$.

CHAPITRE 2

Fonctions polynômes du second degré

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais reconnaître un polynôme du second degré et passer d'une forme à une autre.
- ▶ C2 — Je sais déterminer le sommet, l'axe de symétrie et dresser le tableau de variations.
- ▶ C3 — Je sais calculer le discriminant et résoudre une équation du second degré.
- ▶ C4 — Je sais factoriser un trinôme et étudier son signe.
- ▶ C5 — Je sais résoudre une inéquation du second degré.
- ▶ C6 — Je sais modéliser un problème concret par un polynôme du second degré et trouver un optimum.

Un artisan fabrique des boîtes en carton en découpant des carres aux coins d'une feuille rectangulaire. Quel côté de carre maximise le volume de la boîte ? Un problème d'optimisation qui se ramène à l'étude d'un polynôme du second degré.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

Contrat du chapitre

Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Reconnaître un polynôme du second degré et passer d'une forme à l'autre (développée, canonique, factorisée).
- C2 Représenter une parabole, identifier son sommet et son axe de symétrie, et dresser le tableau de variations.
- C3 Calculer le discriminant et résoudre une équation du second degré en distinguant les trois cas selon le signe de Δ .
- C4 Factoriser un trinôme et étudier le signe d'une expression du second degré à l'aide d'un tableau de signes.
- C5 Résoudre une inéquation du second degré en ramenant à l'étude du signe d'un trinôme.
- C6 Modéliser une situation concrète par un polynôme du second degré et déterminer un extremum (optimisation).

Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Identités remarquables** — développer et factoriser $(a + b)^2$, $(a - b)^2$, $(a + b)(a - b)$.
- R2 **Équations du premier degré** — résoudre $ax + b = 0$, mettre en évidence un facteur commun.
- R3 **Produit nul** — utiliser la règle « un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul ».
- R4 **Fonctions** — calculer une image, chercher un antécédent, lire un tableau de valeurs ; connaître la fonction carré $x \mapsto x^2$.
- R5 **Tableaux de signes** — dresser le tableau de signes d'une expression affine, d'un produit ou d'un quotient.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

Temps de travail estimé

- ▶ Parcours ♦ (Consolidation) : environ 12 h.
- ▶ Parcours ♦♦ (Maîtrise) : environ 10 h.
- ▶ Parcours ♦♦♦ (Approfondissement) : environ 8 h.

Situation d'accroche — La boîte en carton

On découpe quatre carrés identiques de côté x (en cm) aux coins d'une feuille de carton rectangulaire de dimensions $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$, puis on relève les bords pour former une boîte ouverte.

- ▶ Exprime le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
- ▶ Quelles valeurs de x sont admissibles ?
- ▶ Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ?

On obtient $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$, qui se développe en un polynôme de degré 3. En pratique, on étudie souvent la version simplifiée $V(x) \approx 4x^3 - 100x^2 + 600x$ sur $]0 ; 10[$, et on cherche le maximum. Les outils de ce chapitre — forme canonique, discriminant, tableau de variations — permettent de résoudre ce type de problème d'optimisation.

Cette situation sera entièrement traitée au Temps 7 (TD fil rouge), une fois les capacités C1 à C6 acquises.

Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

R1 — Identités remarquables

1. Développe et réduis $(x + 3)^2$.
2. Développe et réduis $(2x - 1)^2$.
3. Factorise $x^2 - 25$.

R2 — Équations du premier degré

4. Résous l'équation $3x - 6 = 0$.

R3 — Produit nul

5. Résous l'équation $(x - 1)(x + 4) = 0$.

R4 — Images, antécédents et fonction carré

6. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$. Calcule $f(-2)$.
7. La fonction carré g est définie par $g(x) = x^2$ pour $x \geq 0$. Quel est l'antécédent de 9 par g ?

R5 — Tableaux de signes

8. Étudie le signe de $(x - 2)(x + 3)$ pour $x = 0$, $x = -4$ et $x = 3$.
9. Pour quelles valeurs de x a-t-on $-x + 5 < 0$?
10. Dresse le tableau de signes complet de $(x - 1)(x - 4)$ sur $\mathbb{R}$.

Grille de décodage

Reporte tes résultats dans ce tableau, puis suis les conseils de remédiation avant de commencer le cours.

Questions	Prérequis testé	Si tu as échoué...	Fiche à lire
1, 2 et 3	R1 — Identités remarquables	...avant de commencer C1, C3	Fiche R1
4	R2 — Équations du premier degré	...avant de commencer C3, C5	Fiche R2
5	R3 — Produit nul	...avant de commencer C3, C4	Fiche R3
6 et 7	R4 — Fonctions et fonction carré	...avant de commencer C1, C2	Fiche R4
8, 9 et 10	R5 — Tableaux de signes	...avant de commencer C4, C5	Fiche R5

Si tu as réussi toutes les questions sans difficulté, tu peux démarrer directement le Temps 3.

2.1 Les trois formes du trinôme

DÉFINITION 1

Un **polynôme du second degré** (ou **trinôme du second degré**) est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

où a, b, c sont des réels avec $a \neq 0$.

Cette écriture s'appelle la **forme développée** (ou **forme standard**).

Exemple. $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$ est un polynôme du second degré avec $a = 2$, $b = -5$, $c = 3$.

On calcule : $f(0) = 3$, $f(1) = 2 - 5 + 3 = 0$, $f(2) = 8 - 10 + 3 = 1$.

Contre-exemple. $g(x) = 3x + 7$ n'est pas un polynôme du second degré : le coefficient de x^2 est nul ($a = 0$).

$h(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ n'est pas du second degré : le degré est 3.

DÉFINITION 2

La **forme canonique** d'un polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$ est

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta,$$

où

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a},$$

avec $\Delta = b^2 - 4ac$.

Le point $S(\alpha; \beta)$ est le **sommet** de la parabole représentant f .

Exemple. Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$.

On a $a = 2$, $b = -8$, $c = 5$, donc $\alpha = -\frac{-8}{2 \times 2} = 2$.

$\beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 5 = 8 - 16 + 5 = -3$.

Forme canonique : $f(x) = 2(x - 2)^2 - 3$.

Le sommet est $S(2; -3)$.

DÉFINITION 3

Lorsque $\Delta > 0$, le polynôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ admet deux racines réelles distinctes x_1 et x_2 (voir C3) et peut s'écrire sous **forme factorisée** :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Lorsque $\Delta = 0$, il admet une racine double x_0 et $f(x) = a(x - x_0)^2$.

Lorsque $\Delta < 0$, il n'existe pas de forme factorisée dans $\mathbb{R}$.

Exemple. Soit $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$.

On calcule $\Delta = 36 - 32 = 4 > 0$, donc $x_1 = \frac{6-2}{4} = 1$ et $x_2 = \frac{6+2}{4} = 2$.

Forme factorisée : $f(x) = 2(x - 1)(x - 2)$.

Vérification : $2(x - 1)(x - 2) = 2(x^2 - 3x + 2) = 2x^2 - 6x + 4$. ✓

Contre-exemple. $f(x) = x^2 + x + 1$: on calcule $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Ce trinôme n'admet pas de forme factorisée réelle.

| **Résumé des trois formes :**

Développée : $ax^2 + bx + c$
— lecture directe de a , b , c .

Canonique : $a(x - \alpha)^2 + \beta$
— lecture du sommet $S(\alpha; \beta)$.

Factorisée :
 $a(x - x_1)(x - x_2)$
— lecture des racines (si $\Delta > 0$).

ERREUR FRÉQUENTE

Oubli du coefficient directeur a dans la forme canonique ou factorisée.

On écrit souvent $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$ en oubliant le facteur a devant. La forme correcte est $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$. De même, la forme factorisée est $a(x - x_1)(x - x_2)$, pas $(x - x_1)(x - x_2)$.

Vérification rapide : développer la forme canonique ou factorisée et vérifier qu'on retrouve $ax^2 + bx + c$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confusion entre α (coordonnée du sommet) et les racines x_1, x_2 .

$\alpha = -\frac{b}{2a}$ est l'abscisse du sommet. Les racines x_1 et x_2 sont les solutions de $f(x) = 0$. Ces trois valeurs sont en général différentes. Seule coïncidence possible : si $\Delta = 0$, alors $x_0 = \alpha$ (la racine double est l'abscisse du sommet).

Passage développée → développée :

$$\begin{aligned} \text{Développée : } \alpha &= -b/(2a). \\ \text{Calculer } \beta &= f(\alpha). \\ \text{Écrire } a(x-\alpha)^2 + \beta &= ax^2 - 2a\alpha x + a\alpha^2 + \beta. \end{aligned}$$

POUR ALLER PLUS LOIN

Obtenir la forme canonique par complétion du carré.

On part de $f(x) = ax^2 + bx + c$. On met a en facteur sur les deux premiers termes :

$$f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c.$$

On complète le carré à l'intérieur de la parenthèse en ajoutant et soustrayant $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$:

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c.$$

Comme $\alpha = -\frac{b}{2a}$, on a $x + \frac{b}{2a} = x - \alpha$, et

$$\beta = c - \frac{b^2}{4a} = \frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}.$$

On retrouve bien $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.

Application numérique. $f(x) = 3x^2 + 6x - 1$.

$$f(x) = 3(x^2 + 2x) - 1 = 3[(x + 1)^2 - 1] - 1 = 3(x + 1)^2 - 3 - 1 = 3(x + 1)^2 - 4.$$

Sommet : $S(-1; -4)$.

2.2 Parabole et variations

Propriété 1. Soit $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ ($a \neq 0$) un polynôme du second degré écrit sous forme canonique.

La courbe représentative de f est une **parabole** d'axe de symétrie la droite d'équation $x = \alpha$ et de **sommet** $S(\alpha; \beta)$.

- Si $a > 0$, la parabole est **tournée vers le haut** (« sourit »); f admet un **minimum** en α , égal à β .
- Si $a < 0$, la parabole est **tournée vers le bas** (« pleure »); f admet un **maximum** en α , égal à β .

Propriété 2 — Tableau de variations. Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) de sommet $S(\alpha; \beta)$ avec

$$\alpha = -\frac{b}{2a}.$$

Si $a > 0$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$		$\searrow \beta \nearrow$	

f est décroissante sur $] -\infty ; \alpha]$ puis croissante sur $[\alpha ; +\infty[$.

Si $a < 0$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$		$\nearrow \beta \searrow$	

f est croissante sur $] -\infty ; \alpha]$ puis décroissante sur $[\alpha ; +\infty[$.

Exemple. Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$.

$$a = 2 > 0, \alpha = -\frac{-8}{4} = 2, \beta = f(2) = 8 - 16 + 3 = -5.$$

La parabole est tournée vers le haut, de sommet $S(2; -5)$. f admet un minimum de -5 en $x = 2$.

Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$		$\searrow -5 \nearrow$	

Exemple. Soit $g(x) = -x^2 + 4x + 1$.

$$a = -1 < 0, \alpha = -\frac{4}{-2} = 2, \beta = g(2) = -4 + 8 + 1 = 5.$$

La parabole est tournée vers le bas, de sommet $S(2; 5)$. g admet un maximum de 5 en $x = 2$.

Moyen mnémotechnique :

$a > 0$: parabole en U $\Rightarrow$ minimum au sommet.

$a < 0$: parabole en $\cap$ $\Rightarrow$ maximum au sommet.

L'axe de symétrie a pour équation $x = \alpha$.

ERREUR FRÉQUENTE

Inverser le sens de variation quand $a < 0$.

Lorsque $a < 0$, f est croissante avant le sommet et décroissante après. De nombreux élèves recopient le tableau de variations du cas $a > 0$ sans tenir compte du signe de a .

Méthode de contrôle : calculer f en un point à gauche et à droite du sommet et vérifier l'ordre des valeurs. Par exemple, pour $g(x) = -x^2 + 4x + 1$: $g(0) = 1 < g(2) = 5$ (croissant avant le sommet), $g(2) = 5 > g(3) = -9 + 12 + 1 = 4$ (décroissant après le sommet). Les flèches du tableau doivent le refléter.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre abscisse du sommet et valeur du minimum/maximum.

Le minimum (ou maximum) est $\beta = f(\alpha)$, c'est une valeur de f . L'abscisse du sommet est α . On dit « f admet un minimum égal à β atteint en $x = \alpha$ », pas « le minimum est α ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Position relative de deux paraboles.

Étudier la position relative des paraboles représentant f et g revient à étudier le signe de $h = f - g$.

Si $f(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$ et $g(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$, alors

$$h(x) = f(x) - g(x) = (a_1 - a_2)x^2 + (b_1 - b_2)x + (c_1 - c_2).$$

On distingue plusieurs cas selon le degré de h (si $a_1 = a_2$, h est de degré 1 ou constant) et selon le signe de Δ_h .

Exemple. $f(x) = x^2 - 2x + 3$ et $g(x) = -x^2 + 4$.

$$h(x) = 2x^2 - 2x - 1. \Delta_h = 4 + 8 = 12 > 0.$$

Les racines sont $x_1 = \frac{2-2\sqrt{3}}{4} = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$ et $x_2 = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$.

Sur $]x_1; x_2[$, $h(x) < 0$ donc $f(x) < g(x)$: la parabole de f est en dessous de celle de g .

2.3 Discriminant et équations

DÉFINITION 4

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un polynôme du second degré ($a \neq 0$). On appelle **discriminant** de f le réel

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

THÉORÈME 1

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

► Si $\Delta > 0$: l'équation $f(x) = 0$ admet **deux racines réelles distinctes**

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

► Si $\Delta = 0$: l'équation $f(x) = 0$ admet **une racine double**

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \alpha.$$

► Si $\Delta < 0$: l'équation $f(x) = 0$ n'admet **aucune racine réelle**.

Exemple. Résoudre $2x^2 - 5x + 2 = 0$.

$a = 2, b = -5, c = 2$; $\Delta = 25 - 16 = 9 > 0$, donc $\sqrt{\Delta} = 3$.

$$x_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5+3}{4} = 2.$$

L'ensemble des solutions est $\left\{\frac{1}{2}; 2\right\}$.

Exemple. Résoudre $x^2 - 4x + 4 = 0$.

$\Delta = 16 - 16 = 0$, donc racine double : $x_0 = \frac{4}{2} = 2$.

L'ensemble des solutions est $\{2\}$.

Exemple. Résoudre $x^2 + x + 1 = 0$.

$\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: l'équation n'a pas de solution réelle.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le signe $-b$ dans la formule des racines.

La formule est $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Si $b = -5$, alors $-b = +5$. Ne pas écrire $\frac{b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$: cela donne des racines fausses.

Vérification : remplacer x_1 et x_2 dans $f(x)$ pour s'assurer qu'on obtient bien 0.

Calculer les racines :

étapes : $b \pm \sqrt{\Delta}$

1. Identifier a, b, c .

2. Calculer Δ , puis $\sqrt{\Delta}$.

3. $\Delta \geq 0$: $b^2 - 4ac$.

ERREUR FRÉQUENTE

Diviser uniquement le numérateur partiel par $2a$.

On écrit parfois $\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2} \times a$ ou $\frac{-b}{2a} + \sqrt{\Delta}$, ce qui est incorrect. Toute l'expression $-b \pm \sqrt{\Delta}$ doit être divisée par $2a$.

POUR ALLER PLUS LOIN

Démonstration exigible : déduction des formules des racines par mise sous forme canonique.

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$. On met f sous forme canonique (voir C1) :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

Résoudre $f(x) = 0$ revient à résoudre :

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a}.$$

Cas 1 : $\Delta < 0$. Le membre gauche est ≥ 0 (carré), le membre droit $\frac{\Delta}{4a}$ et a ont signes opposés si $a > 0$ (car $\Delta < 0$). Plus précisément, $\frac{\Delta}{4a} < 0$ si $a > 0$. L'équation est impossible : pas de solution réelle.

Cas 2 : $\Delta = 0$. On obtient $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, soit $x = -\frac{b}{2a} = \alpha$. Racine double.

Cas 3 : $\Delta > 0$. On divise par a :

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

En prenant la racine carrée (en tenant compte des deux signes) :

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

D'où $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, ce qui donne les deux racines x_1 et x_2 . □

2.4 Factorisation et signe

Propriété 3 — Factorisation selon le signe de Δ . Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

► Si $\Delta > 0$, alors f possède deux racines réelles $x_1 < x_2$ et

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

► Si $\Delta = 0$, alors f possède une racine double x_0 et

$$f(x) = a(x - x_0)^2.$$

► Si $\Delta < 0$, alors f ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

THÉORÈME 2 — SIGNE DU TRINÔME

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) de discriminant Δ .

- Si $\Delta < 0$: $f(x)$ est du **signe de a** pour tout $x \in \mathbb{R}$ (toujours positif si $a > 0$, toujours négatif si $a < 0$).
- Si $\Delta = 0$, de racine double x_0 : $f(x_0) = 0$ et $f(x)$ est du **signe de a** pour tout $x \neq x_0$.
- Si $\Delta > 0$, de racines $x_1 < x_2$:
 - $f(x)$ est du **signe de a** pour $x \in]-\infty; x_1[\cup]x_2; +\infty[$.
 - $f(x)$ est du **signe opposé à a** pour $x \in]x_1; x_2[$.
 - $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

En résumé : $f(x)$ est du **signe de a** , sauf entre les racines où il est de **signe opposé à a** .

Exemple. Étudier le signe de $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$.

$$a = 2, \Delta = 36 - 32 = 4 > 0, x_1 = 1, x_2 = 2.$$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$		
$f(x)$		+	0	-	0	+

$$f(x) > 0 \text{ sur }]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[; f(x) < 0 \text{ sur }]1; 2[.$$

Exemple. Étudier le signe de $g(x) = -x^2 + 2x - 5$.

$$a = -1, \Delta = 4 - 20 = -16 < 0.$$

$g(x)$ est du signe de $a = -1$ pour tout x : $g(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exemple. Étudier le signe de $h(x) = x^2 - 6x + 9$.

$$a = 1, \Delta = 36 - 36 = 0, x_0 = 3.$$

$$h(x) = (x - 3)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x; h(x) = 0 \text{ seulement en } x = 3.$$

Règle clé :
 Signe de $f(x)$ = signe de a
sauf entre x_1 et x_2
 où c'est le signe opposé à a .

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur a dans la forme factorisée.

On écrit parfois $(x - x_1)(x - x_2)$ en oubliant le coefficient a devant. Or $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$. Pour s'en souvenir, on peut vérifier que le coefficient de x^2 dans la forme développée redonne bien a .

ERREUR FRÉQUENTE

Se tromper de signe entre les racines.

Entre x_1 et x_2 , le signe de $f(x)$ est *opposé* au signe de a . C'est là que beaucoup d'élèves se trompent en écrivant le signe de a partout.

Test rapide : calculer $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$ (valeur entre les racines) et vérifier son signe. Si $a > 0$ et que ce test donne un résultat négatif, c'est cohérent.

2.5 Inéquations du second degré

Propriété 4 — Méthode de résolution d'une inéquation du second degré. Pour résoudre une inéquation du type $ax^2 + bx + c > 0$ (ou $\geq 0, < 0, \leq 0$) :

1. **Ramener à zéro** : si l'inéquation n'est pas de la forme $[\dots] \neq 0$, transposer tous les termes du même côté.
2. **Calculer le discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$ et les racines éventuelles $x_1 \leq x_2$.
3. **Dresser le tableau de signes** du trinôme (voir C4).
4. **Lire la solution** sur le tableau de signes.

Exemple. Résoudre $x^2 - x - 6 > 0$.

Étape 1. L'inéquation est déjà ramenée à 0.

Étape 2. $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$; $x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$; $x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$.

Étape 3. $a = 1 > 0$:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$		
$x^2 - x - 6$		$+$	0	$-$	0	$+$

Étape 4. $x^2 - x - 6 > 0$ sur $] -\infty ; -2[\cup] 3 ; +\infty [$.

Exemple. Résoudre $2x^2 + 3x - 2 \leq 0$.

$\Delta = 9 + 16 = 25$; $x_1 = \frac{-3-5}{4} = -2$; $x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2}$.

$a = 2 > 0$: le trinôme est négatif ou nul entre les racines.

Solution : $\left[-2 ; \frac{1}{2} \right]$.

Exemple. Résoudre $3x + 5 \leq x^2 + 1$.

Étape 1 (ramener à zéro) : $0 \leq x^2 - 3x - 4$, soit $x^2 - 3x - 4 \geq 0$.

$\Delta = 9 + 16 = 25$; $x_1 = -1$; $x_2 = 4$.

$a = 1 > 0$: positif ou nul hors de $] -1 ; 4[$.

Solution : $] -\infty ; -1] \cup [4 ; +\infty [$.

Remarque : Si $\Delta < 0$, le trinôme est toujours du même signe que a et on n'a pas de racines réelles. Si $\Delta = 0$, le trinôme est nul en une seule racine et on a l'égalité de la solution.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de ramener à zéro avant d'étudier le signe.

Face à $x^2 - 3 > 2x$, certains élèves étudient le signe de $x^2 - 3$ d'un côté et celui de $2x$ de l'autre, puis comparent. Cette démarche est fautive. Il faut d'abord écrire $x^2 - 2x - 3 > 0$ pour disposer d'un seul trinôme dont on étudie le signe.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur sur les bornes : inclure ou exclure les racines.

Si l'inéquation est stricte ($>$ ou $<$), les racines ne font pas partie de l'ensemble-solution : on utilise des crochets ouverts $] et [$. Si l'inéquation est large ($\geq$ ou $\leq$), les racines sont incluses : on utilise des crochets fermés $[et]$.

POUR ALLER PLUS LOIN

Équations bicarrées.

Une **équation bicarrée** est de la forme $ax^4 + bx^2 + c = 0$ ($a \neq 0$). Le changement de variable $u = x^2$ ($u \geq 0$) la transforme en équation du second degré en u :

$$au^2 + bu + c = 0.$$

On résout cette équation en u , puis on revient à x en résolvant $x^2 = u$ (valable seulement si $u \geq 0$).

Exemple. Résoudre $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

On pose $u = x^2$: $u^2 - 5u + 4 = 0$.

$\Delta = 25 - 16 = 9$; $u_1 = 1$; $u_2 = 4$.

► $u_1 = 1$: $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$.

► $u_2 = 4$: $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$.

L'ensemble des solutions est $\{-2; -1; 1; 2\}$.

Piège fréquent. Si l'équation en u donne une solution $u < 0$, on la rejette car $x^2 \geq 0$.

2.6 Modélisation et optimisation

Propriété 5 — Extremum d'un polynôme du second degré. Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) un polynôme du second degré de sommet $S(\alpha; \beta)$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

- Si $a > 0$, f admet un **minimum global** égal à β , atteint en $x = \alpha$.
- Si $a < 0$, f admet un **maximum global** égal à β , atteint en $x = \alpha$.

Si le problème impose un **domaine de validité** $[x_{\min}; x_{\max}]$, on doit vérifier si α appartient à ce domaine.

- Si $\alpha \in [x_{\min}; x_{\max}]$: l'extremum global est β .
- Sinon : l'extremum sur le domaine est atteint à l'une des bornes ; on compare $f(x_{\min})$ et $f(x_{\max})$.

Propriété 6 — Méthode de résolution d'un problème d'optimisation.

1. Définir la **variable** et préciser son domaine de validité.
2. Exprimer la **quantité à optimiser** en fonction de cette variable : obtenir $f(x) = ax^2 + bx + c$.
3. Calculer $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et vérifier que α appartient au domaine.
4. Calculer $\beta = f(\alpha)$: c'est la valeur optimale.
5. Conclure en précisant la valeur de x et la valeur optimale atteinte.

Exemple. Un agriculteur dispose de 120 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire le long d'un mur (qui sert de quatrième côté). On note x la longueur du côté perpendiculaire au mur (en m).

Étape 1. Les deux côtés perpendiculaires mesurent x et le côté parallèle mesure $120 - 2x$. Domaine : $x > 0$ et $120 - 2x > 0$, soit $x \in]0; 60[$.

Étape 2. Aire : $A(x) = x(120 - 2x) = -2x^2 + 120x$.

Étape 3. $a = -2 < 0$ (maximum), $\alpha = -\frac{120}{-4} = 30 \in]0; 60[$. ✓

Étape 4. $\beta = A(30) = -2 \times 900 + 120 \times 30 = -1800 + 3600 = 1800$.

Étape 5. L'aire maximale est **1 800 m²**, obtenue pour $x = 30$ m (côtés perpendiculaires de 30 m et côté parallèle de 60 m).

Exemple. Une entreprise vend q articles au prix unitaire de $p(q) = -0,5q + 100$ (en euros), pour $q \in [0; 200]$.

$$\text{Recette : } R(q) = q \times p(q) = -0,5q^2 + 100q.$$

$$a = -0,5 < 0 \text{ (maximum)}, \alpha = -\frac{100}{-1} = 100 \in [0; 200].$$

$$R(100) = -0,5 \times 10\,000 + 100 \times 100 = -5\,000 + 10\,000 = 5\,000 \text{ €}.$$

La recette maximale est 5 000 €, atteinte pour $q = 100$ articles.

Résumé de la méthode :

1. Variable + domaine.
2. Exprimer $f(x) = ax^2 + bx + c$.
3. $\alpha = -b/(2a)$: α dans le domaine ?
4. $\beta = f(\alpha)$: valeur optimale.
5. Conclusion claire.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier le domaine de validité.

Si α n'appartient pas au domaine admissible $[x_{\min}; x_{\max}]$, l'extremum global de f sur $\mathbb{R}$ n'est pas atteint sur le domaine. Il faut alors comparer $f(x_{\min})$ et $f(x_{\max})$ pour trouver le maximum ou le minimum sur le domaine restreint.

Exemple. Si $a < 0$ et $\alpha > x_{\max}$, alors f est croissante sur $[x_{\min}; x_{\max}]$ et le maximum est $f(x_{\max})$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « la valeur de x qui optimise » et « la valeur optimale de f ».

La question « Pour quelle valeur de x le bénéfice est-il maximal ? » attend $x = \alpha$.

La question « Quel est le bénéfice maximal ? » attend $\beta = f(\alpha)$.

Ces deux réponses sont distinctes et doivent toutes les deux figurer dans la conclusion.

MÉTHODE M1 — PASSER D'UNE FORME À UNE AUTRE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « mettre sous forme canonique », « développer », « factoriser » un trinôme du second degré, ou lorsqu'on a besoin de la forme canonique pour lire le sommet d'une parabole ou trouver un extremum.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les coefficients a, b, c de $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$).
2. Je calcule l'abscisse du sommet : $\alpha = -\frac{b}{2a}$.
3. Je calcule l'ordonnée du sommet par l'une des deux méthodes au choix :
 - **Méthode directe** : $\beta = f(\alpha)$ (je remplace x par α dans f).
 - **Méthode par le discriminant** : $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$ où $\Delta = b^2 - 4ac$.
4. J'écris la forme canonique : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
5. **Pour développer** : je développe $(x - \alpha)^2 = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2$ puis je multiplie par a et j'ajoute β .
6. **Pour factoriser** : je calcule Δ , et si $\Delta > 0$, je pose x_1 et x_2 les deux racines, puis $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Exemple rédigé. Soit $f(x) = 2x^2 - 12x + 22$. Mettre f sous forme canonique.

On a $a = 2, b = -12, c = 22$.

$$\alpha = -\frac{-12}{2 \times 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

$$\beta = f(3) = 2 \times 3^2 - 12 \times 3 + 22 = 18 - 36 + 22 = 4.$$

$$f(x) = 2(x - 3)^2 + 4.$$

Identifier a, b, c .

$$\text{Calculer } \alpha = -\frac{b}{2a}.$$

$$\text{Calculer } \beta = f(\alpha) = f(3).$$

Écrire la forme canonique.

Vérification par développement : $2(x-3)^2 + 4 = 2(x^2 - 6x + 9) + 4 = 2x^2 - 12x + 18 + 4 = 2x^2 - 12x + 22 \checkmark$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier le facteur a dans la forme canonique. On écrit parfois $(x - \alpha)^2 + \beta$ sans le a devant : c'est faux dès que $a \neq 1$.
- ▶ **Piège 2.** Se tromper de signe sur α . La formule est $\alpha = -\frac{b}{2a}$: si $b = -12$, alors $\alpha = -\frac{-12}{4} = +3$ et non -3 .
- ▶ **Piège 3.** Lors du calcul de β par $f(\alpha)$, oublier d'appliquer la valeur à *tous* les termes de f , notamment le terme constant c .

Vérifier son résultat. Développer la forme canonique obtenue et vérifier qu'on retrouve la forme développée initiale. Si $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, alors le développement doit donner $ax^2 + bx + c$ avec les mêmes coefficients que ceux de départ. De plus, vérifier que $f(\alpha) = \beta$ est bien satisfait.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — ÉTUDIER UNE PARABOLE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « dresser le tableau de variations », « tracer la courbe représentative », « déterminer le maximum ou le minimum », ou « préciser le sommet de la parabole ».

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les coefficients a, b, c de $f(x) = ax^2 + bx + c$.
2. Je calcule les coordonnées du sommet :

$$\alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = f(\alpha).$$

3. Je détermine le sens de la parabole selon le signe de a :
 - ▶ Si $a > 0$: parabole tournée vers le haut, f est décroissante sur $]-\infty; \alpha]$ puis croissante sur $[\alpha; +\infty[$, et β est le **minimum** de f .
 - ▶ Si $a < 0$: parabole tournée vers le bas, f est croissante sur $]-\infty; \alpha]$ puis décroissante sur $[\alpha; +\infty[$, et β est le **maximum** de f .
4. Je dresse le tableau de variations en indiquant α, β et les flèches.
5. Pour le tracé, je place le sommet $S(\alpha; \beta)$, l'axe de symétrie $x = \alpha$, quelques points supplémentaires et les intersections avec les axes si elles existent.

Exemple rédigé. Soit $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$. Dresser le tableau de variations de f et préciser son extremum.

On a $a = -3, b = 6, c = 1$.

$$\alpha = -\frac{6}{2 \times (-3)} = -\frac{6}{-6} = 1.$$

$$\beta = f(1) = -3 \times 1^2 + 6 \times 1 + 1 = -3 + 6 + 1 = 4.$$

Puisque $a = -3 < 0$, la fonction f admet un **maximum** égal à 4, atteint en $x = 1$.

Tableau de variations :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$		↗ 4 ↘	
	$-\infty$		$-\infty$

Le sommet de la parabole est $S(1; 4)$ et l'axe de symétrie est la droite $x = 1$.

Identifier $a = -3 < 0$,
calculer l'abscisse du
sommet.

Calculer l'ordonnée du
sommet.

$a < 0$: maximum au
sommet.

Les pièges.

- **Piège 1.** Inverser le sens de variation : quand $a < 0$, la fonction est d'abord *croissante* (les valeurs montent vers le sommet), puis *décroissante*. Ne pas appliquer mécaniquement le schéma d'une parabole en $a > 0$.
- **Piège 2.** Confondre le sommet et les racines. α est l'abscisse du sommet, pas une racine. Avoir $f(\alpha) = 0$ serait une coïncidence particulière.
- **Piège 3.** Oublier que les flèches du tableau de variations indiquent $f \rightarrow -\infty$ aux deux extrémités quand $a < 0$ (et $f \rightarrow +\infty$ quand $a > 0$).

Vérifier son résultat. Calculer $f(\alpha - 1)$ et $f(\alpha + 1)$: ces deux valeurs doivent être égales (symétrie de la parabole par rapport à l'axe $x = \alpha$) et inférieures à β si $a > 0$ (ou supérieures à β si $a < 0$, ce qui est impossible pour un maximum). Ici, $f(0) = 1$ et $f(2) = -3 \times 4 + 12 + 1 = 1$ ✓ : symétrie vérifiée, et $1 < 4$ ✓.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « résoudre » une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$, de « déterminer les racines » d'un trinôme, ou de « trouver les antécédents d'une valeur » par une fonction polynôme du second degré.

La méthode pas à pas.

1. Je mets l'équation sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a \neq 0$) en développant et en ramenant tout d'un même côté si nécessaire.
2. J'identifie les coefficients a, b, c .
3. Je calcule le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.
4. Je conclus selon le signe de Δ :
 - Si $\Delta < 0$: l'équation n'a **pas de solution réelle**.
 - Si $\Delta = 0$: l'équation a **une solution (double)** : $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
 - Si $\Delta > 0$: l'équation a **deux solutions distinctes** : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Exemple rédigé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2 - 5x + 2 = 0$.

On a $a = 3, b = -5, c = 2$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 25 - 24 = 1.$$

Comme $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \times 3} = \frac{5 - 1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3},$$

$$x_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \times 3} = \frac{5 + 1}{6} = \frac{6}{6} = 1.$$

L'ensemble des solutions est $S = \left\{ \frac{2}{3}; 1 \right\}$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Se tromper de signe dans $-b$: si $b = -5$, alors $-b = +5$. Écrire $-b = -5$ dans la formule est une erreur fréquente.
- **Piège 2.** Diviser par $2a$ au lieu de $2 \times a$: ne pas oublier que le dénominateur est $2a$ (et non $2 + a$ ni a seul).

Identifier a, b, c .

Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.

$\Delta = 1 > 0$: deux solutions distinctes.

Conclure.

- **Piège 3.** Conclure à l'absence de solution dès que le discriminant est négatif, mais oublier de préciser « dans $\mathbb{R}$ ». Si le contexte porte sur les réels, écrire $S = \emptyset$ et ne pas calculer de racines imaginaires.

Vérifier son résultat. Substituer chaque solution trouvée dans l'équation de départ et vérifier que l'égalité est bien satisfaite. Ici :

$$\begin{aligned} \text{► } x_1 &= \frac{2}{3} : 3 \times \frac{4}{9} - 5 \times \frac{2}{3} + 2 = \frac{4}{3} - \frac{10}{3} + \frac{6}{3} = 0 \checkmark \\ \text{► } x_2 &= 1 : 3 \times 1 - 5 \times 1 + 2 = 0 \checkmark \end{aligned}$$

On peut aussi vérifier les relations de Viète : $x_1 + x_2 = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3} = -\frac{b}{a} \checkmark$ et $x_1 \times x_2 = \frac{2}{3} = \frac{c}{a} \checkmark$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — FACTORISER ET ÉTUDIER LE SIGNE D'UN TRINÔME

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « factoriser un trinôme », d'« étudier le signe de $f(x)$ », de « dresser un tableau de signes », ou de déterminer pour quelles valeurs de x une expression polynôme du second degré est positive ou négative.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie a, b, c et je calcule $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. Selon le signe de Δ :
 - Si $\Delta > 0$: il existe deux racines $x_1 < x_2$ et $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.
 - Si $\Delta = 0$: il existe une racine double x_0 et $f(x) = a(x - x_0)^2$.
 - Si $\Delta < 0$: pas de factorisation sur $\mathbb{R}$; $f(x)$ est du signe de a pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. Je dresse le tableau de signes en utilisant la règle : **$f(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines, et du signe opposé entre les racines.**
4. Je conclus sur l'ensemble où $f(x) > 0$ (ou < 0) selon la question.

Exemple rédigé. Soit $f(x) = -2x^2 + 6x - 4$. Factoriser f et dresser son tableau de signes.

On a $a = -2, b = 6, c = -4$.

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-2) \times (-4) = 36 - 32 = 4 > 0.$$

$$x_1 = \frac{-6 - \sqrt{4}}{2 \times (-2)} = \frac{-6 - 2}{-4} = \frac{-8}{-4} = 2,$$

$$x_2 = \frac{-6 + \sqrt{4}}{2 \times (-2)} = \frac{-6 + 2}{-4} = \frac{-4}{-4} = 1.$$

On a $x'_1 = 1$ et $x'_2 = 2$, donc $f(x) = -2(x - 1)(x - 2)$.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$(x - 1)$	—	0	+	+
$(x - 2)$	—	—	0	+
$f(x) = -2(x - 1)(x - 2)$	—	0	+	—

$f(x) > 0$ sur $]1; 2[$ et $f(x) < 0$ sur $]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier le facteur a dans la factorisation : écrire $f(x) = (x - 1)(x - 2)$ au lieu de $f(x) = -2(x - 1)(x - 2)$. Le signe de a est essentiel pour le tableau de signes.

Identifier $a = -2, b = 6$,
Calculer Δ .

Calculer les deux racines.

Ordonner les racines :
Tableau de signes :
 $a = -2 < 0$, signe positif
entre les racines.

- **Piège 2.** Se tromper sur le signe entre les racines : quand $a < 0$, f est positive *entre* les racines (et non à l'extérieur). Retenir la règle : « du signe de a sauf entre les racines ».
- **Piège 3.** Dans les calculs de x_1 et x_2 , faire attention aux doubles changements de signe quand $a < 0$: le dénominateur $2a$ est négatif, ce qui modifie le sens des inégalités lors d'une éventuelle simplification.

Vérifier son résultat. Développer la forme factorisée et vérifier qu'on retrouve $f(x) = -2x^2 + 6x - 4$:

$$-2(x-1)(x-2) = -2(x^2 - 3x + 2) = -2x^2 + 6x - 4 \checkmark.$$

Vérifier aussi le signe en un point : $f(1,5) = -2 \times (0,5) \times (-0,5) = +0,5 > 0$, ce qui correspond bien à « f positive entre 1 et 2 » $\checkmark$.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — RÉSOUDRE UNE INÉQUATION DU SECOND DEGRÉ

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « résoudre l'inéquation » $ax^2 + bx + c \leq 0$ (ou ≥ 0 , < 0 , > 0), de « déterminer l'ensemble des solutions », ou de « trouver les valeurs de x pour lesquelles $f(x) \geq k$ ».

La méthode pas à pas.

1. Je ramène l'inéquation à la forme $ax^2 + bx + c \leq 0$ (ou ≥ 0) en développant et en passant tous les termes d'un même côté.
2. Je calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ et les racines éventuelles $x_1 \leq x_2$.
3. Je dresse le tableau de signes du trinôme (méthode M4).
4. Je lis l'ensemble solution dans le tableau en tenant compte de l'inégalité demandée :
 - Les valeurs aux racines sont incluses si l'inégalité est large ($\leq$ ou $\geq$).
 - Les valeurs aux racines sont exclues si l'inégalité est stricte ($<$ ou $>$).
5. J'écris l'ensemble solution S en utilisant la notation d'intervalle.

Exemple rédigé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 - 4x + 3 \geq 0$.

On a $a = 1 > 0$, $b = -4$, $c = 3$.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0.$$

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{4}}{2} = \frac{4 - 2}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{4 + \sqrt{4}}{2} = \frac{4 + 2}{2} = 3.$$

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$x^2 - 4x + 3$	$+$	0	$-$	0	$+$

Le trinôme est positif ou nul sur $]-\infty; 1]$ et sur $[3; +\infty[$.

Conclusion :

$$S =]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier de ramener l'inéquation à zéro avant d'appliquer le tableau de signes. Par exemple, $x^2 - 4x \geq -3$ doit d'abord s'écrire $x^2 - 4x + 3 \geq 0$.
- **Piège 2.** Confondre bornes ouvertes et fermées. Si l'inégalité est large ($\geq$ ou $\leq$), les racines sont *incluses* dans l'ensemble solution (crochets fermés). Si elle est stricte ($>$ ou $<$), elles sont *exclues* (crochets ouverts).

L'expression est déjà ramené à 0; identifier $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$.

Calculer les deux racines.

Tableau de signes : $a > 0$, le trinôme est positif hors des racines.

Lire les solutions de $x^2 - 4x + 3 \geq 0$.

- **Piège 3.** Lire le tableau « à l'envers » : pour $ax^2 + bx + c \geq 0$ avec $a > 0$, la solution est l'extérieur de l'intervalle formé par les racines, et non l'intérieur.

Vérifier son résultat. Tester un point de chaque intervalle dans l'inégalité de départ :

- $x = 0 \in S : 0 - 0 + 3 = 3 \geq 0 \checkmark$
- $x = 2 \notin S : 4 - 8 + 3 = -1 < 0 \checkmark$ (pas solution, comme attendu)
- $x = 4 \in S : 16 - 16 + 3 = 3 \geq 0 \checkmark$
- Aux bornes : $x = 1$ et $x = 3$ donnent $0 \geq 0 \checkmark$ (bornes incluses).

S'entraîner. (renvois exercices M5)

MÉTHODE M6 — RÉSOUDRE UN PROBLÈME D'OPTIMISATION

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « maximiser » ou « minimiser » une quantité (aire, volume, bénéfice, périmètre...), de « trouver les dimensions qui optimisent », ou de « déterminer la valeur de x pour laquelle la quantité est maximale (ou minimale) ».

La méthode pas à pas.

1. **Définir la variable :** je choisis une variable x représentant la quantité qui varie et je précise son domaine de définition (les valeurs physiquement admissibles).
2. **Exprimer la quantité à optimiser** en fonction de x : j'obtiens une fonction $f(x)$.
3. **Identifier le trinôme :** je vérifie que f est un polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$ et je note le signe de a .
4. **Trouver le sommet :** je calcule $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.
5. **Vérifier le domaine :** je contrôle que α appartient bien au domaine de définition établi à l'étape 1. Sinon, l'extremum est atteint à la borne la plus proche.
6. **Conclure** en distinguant :
 - ce qu'est la **valeur optimale** : $\beta = f(\alpha)$ (l'aire maximale, le bénéfice maximal...),
 - ce qu'est la **variable optimale** : α (la longueur, le prix...qui réalise l'optimum).

Exemple rédigé. Un rectangle a son côté inférieur sur l'axe des abscisses et ses deux sommets supérieurs sur la droite d'équation $y = -2x + 8$ (pour $0 \leq x \leq 4$). Déterminer les dimensions du rectangle d'aire maximale.

Soit x la demi-largeur du rectangle ($0 < x < 4$). La largeur est $2x$ et la hauteur est $y = -2x + 8$.

$$A(x) = 2x \times (-2x + 8) = -4x^2 + 16x.$$

A est un trinôme avec $a = -4 < 0$, $b = 16$, $c = 0$.

$$\alpha = -\frac{16}{2 \times (-4)} = -\frac{16}{-8} = 2.$$

$$\beta = A(2) = -4 \times 4 + 16 \times 2 = -16 + 32 = 16.$$

$\alpha = 2 \in]0; 4[$: le sommet est bien dans le domaine.

L'aire est maximale pour $x = 2$, c'est-à-dire une largeur de $2 \times 2 = 4$ et une hauteur de $-2 \times 2 + 8 = 4$.

Conclusion : Le rectangle d'aire maximale a pour dimensions 4×4 , et son aire maximale est $A(2) = 16$ unités d'aire.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier de vérifier le domaine de validité. Si α est hors du domaine, l'extremum de la fonction sur le domaine est atteint en une borne, pas au sommet de la parabole.

Définir la variable et le exprimer l'aire en fonction de x .

Identifier le trinôme : Calculer les données du trinôme et le sommet.

Vérifier que le α est dans le domaine et conclure en distinguant variable et valeur optimale.

- **Piège 2.** Confondre la valeur optimale $\beta = f(\alpha)$ et la variable optimale α . La question « pour quelle longueur ? » demande α ; la question « quelle aire maximale ? » demande β .
- **Piège 3.** Ne pas définir clairement la variable x avec son domaine dès le début : on risque d'obtenir des solutions négatives ou incohérentes avec la situation physique.

Vérifier son résultat.

- Calculer $A(\alpha - 0,5)$ et $A(\alpha + 0,5)$ et vérifier qu'ils sont inférieurs à β (pour un maximum). Ici : $A(1,5) = -4 \times 2,25 + 24 = 15 < 16$ ✓ et $A(2,5) = -4 \times 6,25 + 40 = 15 < 16$ ✓.
- Contrôler que les dimensions trouvées correspondent bien au contexte géométrique (largeur et hauteur positives, dans le domaine).
- Vérifier les unités de la valeur optimale (aire en unités d'aire, longueur en unités de longueur, etc.).

S'entraîner. (renvois exercices M6)

1SPE-SECDEG-EX-001
⌚ 10 min

Exercice 1 ◆

On considère le trinôme $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$.

1. Identifier les coefficients a , b et c de ce trinôme.
2. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de f .
3. Écrire f sous forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
4. Vérifier que $f(x) = 2(x + 1)\left(x - \frac{5}{2}\right)$ en développant le membre de droite.

1SPE-SECDEG-EX-002
⌚ 10 min

Exercice 2 ◆

Pour chacune des expressions suivantes, passer à la forme demandée.

1. $f(x) = 3(x - 2)^2 - 1 \rightarrow$ forme développée.
2. $g(x) = -2(x - 1)(x + 4) \rightarrow$ forme développée.
3. $h(x) = x^2 + 6x + 5 \rightarrow$ forme canonique $h(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$.
On rappelle que $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = h(\alpha)$.

1SPE-SECDEG-EX-003
⌚ 10 min

Exercice 3 ◆

1. Parmi les expressions suivantes, identifier celles qui sont des trinômes du second degré en x . Préciser alors les valeurs de a , b et c .

$$p(x) = 4x^2 - x + 7$$

$$q(x) = 3x - 2$$

$$r(x) = -x^2 + 5$$

2. On considère $f(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 3)$.
 - a) Développer $f(x)$ pour obtenir sa forme développée.
 - b) En déduire les coordonnées du sommet $S(\alpha; \beta)$ de la parabole.
 - c) Écrire f sous forme canonique.

1SPE-SECDEG-EX-004
⌚ 10 min

Exercice 4 ◆

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 4x + 1$.

1. Préciser le coefficient a et en déduire le sens d'ouverture de la parabole représentative de f .
2. Calculer les coordonnées du sommet S de cette parabole.
3. Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.
4. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
5. Calculer $f(0)$ et $f(4)$. Que remarque-t-on? Expliquer.

Exercice 5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x - 1)^2 - 8$.

1SPE-SECDEG-EX-005
⌚ 10 min

1. Identifier la forme canonique et en lire directement les coordonnées du sommet S .
2. La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas? Justifier.
3. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ et préciser le minimum de f .
4. Développer $f(x)$ pour obtenir la forme développée $f(x) = ax^2 + bx + c$.
5. Vérifier par le calcul que $f(3) = 0$ et $f(-1) = 0$.

Exercice 6

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -3x^2 + 12x - 5$.

1SPE-SECDEG-EX-006
⌚ 12 min

1. Calculer les coordonnées du sommet S de la parabole représentative de g .
2. Écrire g sous forme canonique.
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. Préciser la valeur maximale de g et l'abscisse en laquelle elle est atteinte.
4. Calculer $g(0)$. Quelle est la signification géométrique de ce résultat?
5. Sans calcul, donner le signe de $g(4)$ en utilisant la symétrie de la parabole.

Exercice 7

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en calculant le discriminant Δ .

1SPE-SECDEG-EX-007
⌚ 10 min

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $2x^2 + 3x - 2 = 0$
3. $x^2 - 2x + 5 = 0$

Exercice 8

Pour chacune des équations suivantes, calculer Δ et discuter le nombre de solutions dans $\mathbb{R}$.

1SPE-SECDEG-EX-008
⌚ 10 min

1. $4x^2 - 12x + 9 = 0$
2. $x^2 - 7 = 0$
3. $3x^2 + x + 1 = 0$

Donner les solutions exactes (sous forme de radicaux si nécessaire).

Exercice 9

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. On ramènera chacune à la forme $ax^2 + bx + c = 0$ avant de calculer Δ .

1SPE-SECDEG-EX-009
⌚ 12 min

1. $(x + 1)(x - 3) = -3$
2. $2x^2 - 5x = 3$

1SPE-SECDEG-EX-010

⌚ 10 min

Exercice 10 ◆

Factoriser chacune des expressions suivantes.

1. $x^2 - 9$
2. $2x^2 - 8x$
3. $x^2 - x - 6$
4. $3x^2 - 12x + 12$

On précisera à chaque fois la méthode utilisée : identité remarquable, facteur commun, ou utilisation du discriminant.

1SPE-SECDEG-EX-011

⌚ 12 min

Exercice 11 ◆

On considère le trinôme $f(x) = (x - 2)(x + 5)$.

1. Identifier les racines de f (les valeurs de x pour lesquelles $f(x) = 0$).
2. Dresser le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire les ensembles de solutions des inéquations suivantes :
 - a) $f(x) \geq 0$
 - b) $f(x) < 0$
4. Développer $f(x)$ et vérifier que $\Delta = 49$.

1SPE-SECDEG-EX-012

⌚ 12 min

Exercice 12 ◆

On considère le trinôme $g(x) = -2x^2 + 2x + 12$.

1. Calculer Δ et déterminer les racines de g .
2. Factoriser $g(x)$.
3. Dresser le tableau de signes de g sur $\mathbb{R}$. (On rappelle que le signe de g est celui de a à l'extérieur des racines.)
4. Résoudre $g(x) \leq 0$.

1SPE-SECDEG-EX-013

⌚ 10 min

Exercice 13 ◆

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $x^2 - x - 6 > 0$
2. $-x^2 + 4 \geq 0$

Pour chacune : calculer Δ , trouver les racines si elles existent, dresser le tableau de signes, puis conclure.

1SPE-SECDEG-EX-014

⌚ 12 min

Exercice 14 ◆

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $2x^2 - 5x + 2 \leq 0$
2. $x^2 + 1 < 0$

Pour l'inéquation **b**), calculer Δ et conclure sans chercher de racines.

1SPE-SECDEG-EX-015

⌚ 12 min

Exercice 15 ◆

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-3x^2 + 6x + 9 \geq 0$.

1. Calculer Δ et déterminer les racines du trinôme $f(x) = -3x^2 + 6x + 9$.
2. Dresser le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$. (*Attention au signe de a .*)
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation.
4. Vérifier le résultat en substituant $x = 0$ et $x = 4$ dans $f(x)$.

Exercice 161SPE-SECDEG-EX-016
⌚ 12 min

Un éleveur dispose de 20 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire.

On note x la largeur (en mètres) de l'enclos, avec $0 < x < 10$.

1. Exprimer la longueur de l'enclos en fonction de x .
2. Montrer que l'aire $A(x)$ (en m^2) de l'enclos est donnée par $A(x) = -x^2 + 10x$.
3. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de A .
4. En déduire la valeur de x qui maximise l'aire et la valeur de cette aire maximale.
5. Quelle est la forme de l'enclos d'aire maximale?

Exercice 171SPE-SECDEG-EX-017
⌚ 12 min

Un commerçant vend des articles. Des études montrent que si le prix unitaire est p euros, il vend $x = \frac{50-p}{2}$ articles, avec $0 \leq p \leq 50$.

1. Exprimer p en fonction de x .
2. Montrer que la recette $R(x)$ (en euros) s'écrit $R(x) = -2x^2 + 50x$.
3. Déterminer le nombre d'articles x à vendre pour maximiser la recette.
4. En déduire le prix unitaire optimal et la recette maximale correspondante.

Exercice 181SPE-SECDEG-EX-018
⌚ 15 min

Un ballon est lancé verticalement. Sa hauteur h (en mètres) au bout de t secondes est modélisée par :

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1 \quad (t \geq 0).$$

1. Quelle est la hauteur initiale du ballon (à $t = 0$) ?
2. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole. En déduire la hauteur maximale atteinte et l'instant auquel elle est atteinte.
3. Résoudre $h(t) = 0$ dans $\mathbb{R}$. En retenant la solution positive, donner (valeur arrondie au centième) l'instant auquel le ballon touche le sol.

Exercice 191SPE-SECDEG-EX-019
⌚ 20 min

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 6x - 24$.

1. (C1) Identifier les coefficients a , b , c et écrire f sous forme canonique.
2. (C2) En déduire les coordonnées du sommet S de la parabole représentative de f et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
3. (C1) Calculer Δ et factoriser $f(x)$.
4. (C2) Déterminer graphiquement (puis algébriquement) les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses.
5. L'équation $f(x) = -27$ admet-elle des solutions? Justifier à l'aide du tableau de variations.

Exercice 201SPE-SECDEG-EX-020
⌚ 20 min

On donne $f(x) = -2(x+3)^2 + 8$.

1. (C1) Développer $f(x)$ pour obtenir la forme développée $f(x) = ax^2 + bx + c$.
2. (C2) Lire directement les coordonnées du sommet S de la parabole à partir de la forme canonique. Préciser si la parabole admet un maximum ou un minimum.
3. (C2) Dresser le tableau de variations de f .
4. (C1) Résoudre $f(x) = 0$ en utilisant la forme canonique. Interpréter géométriquement.
5. Comparer les formes canonique et développée : laquelle est la plus pratique pour chaque question ? Justifier.

1SPE-SECDEG-EX-021
⌚ 20 min

Exercice 21

On considère le trinôme $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

1. (C1) Écrire f sous forme canonique $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$.
2. (C3) Calculer Δ et résoudre $f(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$. Donner les solutions sous forme exacte (avec $\sqrt{3}$).
3. (C3) Résoudre $f(x) = -2$ dans $\mathbb{R}$.
On ramènera à la forme $ax^2 + bx + c = 0$.
4. (C1) La valeur β est-elle bien le minimum de f ? Justifier à l'aide de la forme canonique.

1SPE-SECDEG-EX-022
⌚ 20 min

Exercice 22

On pose $p(x) = 2x^2 - 4x - 6$.

1. (C1) Écrire $p(x)$ sous forme canonique, puis sous forme factorisée. Détailler les calculs.
2. (C3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $p(x) = 10$.
Simplifier l'équation avant de calculer Δ .
3. (C3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $p(x) = -8$.
Utiliser la forme canonique pour conclure directement.
4. (C1) Vérifier que les trois formes de $p(x)$ donnent le même résultat pour $p(2)$.

1SPE-SECDEG-EX-023
⌚ 20 min

Exercice 23

On considère le trinôme $f(x) = 6x^2 - x - 2$.

1. (C3) Calculer Δ et déterminer les racines de f .
2. (C4) Factoriser $f(x)$. On vérifiera que $f(x) = (2x + 1)(3x - 2)$.
3. (C4) Dresser le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$.
4. (C3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $6x^2 - x = 2$.
5. (C4) En déduire, sans nouveau calcul, le signe de $6x^2 - x - 2$ sur $\left[-\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right]$.

1SPE-SECDEG-EX-024
⌚ 20 min

Exercice 24

1. (C3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x^2 - 4)(x - 3) = 0$.
Utiliser la règle du produit nul après avoir factorisé $x^2 - 4$.
2. (C4) Dresser le tableau de signes de $g(x) = x^2 - 4$ sur $\mathbb{R}$.
3. (C3) Pour $h(x) = 2x^2 + 3x - 5$:
a) Calculer Δ et déterminer les racines de h .
b) Factoriser $h(x)$.
c) Dresser le tableau de signes de h .
4. (C4) En déduire les solutions de l'inéquation $2x^2 + 3x - 5 \geq 0$.

1SPE-SECDEG-EX-025
⌚ 20 min

Exercice 25

1. (C4) Factoriser $f(x) = x^2 - 3x - 10$ et dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$.
2. (C5) Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 - a) $x^2 - 3x - 10 < 0$
 - b) $x^2 - 3x - 10 \geq 0$
3. (C4) Factoriser $g(x) = -x^2 + 2x + 8$ et dresser son tableau de signes.
4. (C5) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-x^2 + 2x + 8 > 0$.

Exercice 26

1SPE-SECDEG-EX-026
⌚ 20 min

1. (C4) Factoriser et étudier le signe de $g(x) = 3x^2 - 5x - 2$.
2. (C5) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 - 5x - 2 < 0$.
3. Un jardinier dispose de deux parcelles :
 - un carré de côté x mètres ($x > 1$);
 - un rectangle de dimensions $(x + 3)$ m et $(x - 1)$ m.
 (C5) Pour quelles valeurs de x le rectangle a-t-il une aire strictement supérieure à celle du carré ?
Montrer que l'inéquation se simplifie et n'est pas du second degré.

Exercice 27

1SPE-SECDEG-EX-027
⌚ 20 min

On découpe des carrés de côté x cm aux quatre coins d'une feuille rectangulaire de 16 cm sur 10 cm, puis on relève les bords pour former une boîte ouverte.

On note $V(x)$ le volume (en cm^3) de la boîte, avec $0 < x < 5$.

1. (C6) Exprimer les dimensions de la base de la boîte en fonction de x .
2. (C6) Montrer que $V(x) = 4x^3 - 52x^2 + 160x$.
*On admet ici que V n'est pas un polynôme du second degré. On s'intéresse à la **base** de la boîte.*
3. (C2) Soit $A(x) = (16 - 2x)(10 - 2x)$ l'aire de la base.
 - a) Développer $A(x)$ et identifier la forme obtenue.
 - b) Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant A .
 - c) Dresser le tableau de variations de A sur $]0; 5[$ et interpréter.
4. (C6) Calculer $V(2)$ et $V(3)$. Quel découpage donne le plus grand volume ?

Exercice 28

1SPE-SECDEG-EX-028
⌚ 20 min

Une entreprise produit x unités d'un article par semaine ($0 \leq x \leq 40$). Le bénéfice hebdomadaire (en euros) est modélisé par :

$$B(x) = -2x^2 + 80x - 600.$$

1. (C2) Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant B .
2. (C2) Dresser le tableau de variations de B sur $[0; 40]$.
3. (C6) Quel nombre d'unités faut-il produire pour maximiser le bénéfice ? Quel est ce bénéfice maximal ?
4. (C6) L'entreprise est rentable quand $B(x) > 0$. Résoudre $B(x) = 0$ et en déduire l'intervalle de rentabilité.

Exercice 29

1SPE-SECDEG-EX-029
⌚ 20 min

1. (C3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 5x + 3 = 0$. Donner les solutions sous forme exacte.
2. (C5) En déduire la solution de l'inéquation $x^2 - 5x + 3 \leq 0$.

On pourra noter $x_1 = \frac{5 - \sqrt{13}}{2}$ et $x_2 = \frac{5 + \sqrt{13}}{2}$.

3. (C3) Calculer le discriminant de $g(x) = x^2 + 4x + 5$.
4. (C5) En déduire, sans résoudre d'équation, le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$ et la solution de $g(x) > 0$.

1SPE-SECDEG-EX-030
⌚ 20 min

Exercice 30

Un objet est lancé depuis le sol. Sa hauteur h (en mètres) au bout de t secondes est :

$$h(t) = -t^2 + 6t + 7 \quad (t \geq 0).$$

1. (C3) Résoudre $h(t) = 0$ dans $\mathbb{R}$. En déduire l'instant auquel l'objet retouche le sol.
2. Calculer $h(0)$. Interpréter.
3. (C5) Résoudre l'inéquation $h(t) > 3$, c'est-à-dire déterminer les instants pour lesquels l'objet se trouve à plus de 3 m du sol.
On ramènera à $-t^2 + 6t + 4 > 0$ et on donnera les bornes sous forme exacte.
4. (C5) En tenant compte du domaine physique ($0 \leq t \leq 7$), écrire l'ensemble de solutions.

1SPE-SECDEG-EX-031
⌚ 20 min

Exercice 31

1. (C1) On donne $f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$.
 - a) Développer $f(x)$ pour obtenir la forme $ax^2 + bx + c$.
 - b) (C4) Factoriser $f(x)$ en utilisant les racines lues sur la forme canonique.
La forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$ permet de lire $x_{1,2} = \alpha \pm \sqrt{-\beta/a}$ quand $\beta < 0$.
 - c) Dresser le tableau de signes de f .
2. (C1) On donne $g(x) = 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 9$.
 - a) Développer $g(x)$.
 - b) (C4) Factoriser $g(x)$ et dresser son tableau de signes.

1SPE-SECDEG-EX-032
⌚ 20 min

Exercice 32

La représentation graphique d'une fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$ passe par les points $A(0; -3)$, $B(1; 0)$ et $C(-3; 0)$.

1. (C1) En utilisant les coordonnées de chaque point, écrire un système d'équations en a, b, c .
2. Résoudre ce système et en déduire l'expression de $f(x)$.
3. (C1) Écrire f sous forme canonique.
4. (C4) Factoriser $f(x)$ et vérifier que B et C sont bien les points d'intersection avec l'axe des abscisses.
5. (C4) Dresser le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$.

1SPE-SECDEG-EX-033
⌚ 20 min

Exercice 33

Une société modélise son profit mensuel $P(x)$ (en milliers d'euros) par :

$$P(x) = -x^2 + 14x - 40 \quad (0 \leq x \leq 14),$$

où x est la quantité produite (en centaines d'unités).

1. (C6) Calculer le sommet de la parabole et en déduire la quantité optimale et le profit maximal.
2. (C5) Déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'entreprise est rentable ($P(x) > 0$).
3. (C6) La direction souhaite un profit d'au moins 5 000 € par mois, soit $P(x) \geq 5$.
 - a) Montrer que cela revient à résoudre $-x^2 + 14x - 45 \geq 0$.

b) (C5) Résoudre cette inéquation et interpréter le résultat.

Exercice 34

1SPE-SECDEG-EX-034
⌚ 25 min

On considère un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit ont pour longueurs $(x+4)$ cm et $(6-x)$ cm, avec $0 < x < 6$.

1. (C6) Exprimer l'aire $A(x)$ du triangle en fonction de x et montrer que :

$$A(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 12.$$

2. (C6) Déterminer la valeur de x qui maximise l'aire du triangle et calculer cette aire maximale.

3. (C5) On souhaite que l'aire du triangle soit strictement supérieure à 10 cm^2 .

a) Montrer que cela revient à résoudre $-x^2 + 2x + 4 > 0$.

b) Résoudre cette inéquation et donner les solutions exactes.

c) En tenant compte du domaine $0 < x < 6$, écrire l'ensemble des valeurs de x acceptables.

4. (C5) Résoudre dans $]0; 6[$ l'inéquation $A(x) \geq 8$.

Exercice 35

1SPE-SECDEG-EX-035
⌚ 35 min

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

1. **Formes du trinôme.**

a) Identifier les coefficients a, b, c de f .

b) Mettre f sous forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$. Préciser les coordonnées du sommet S de la parabole.

c) Calculer le discriminant Δ de f , puis déterminer les racines x_1 et x_2 de f .

d) Écrire la forme factorisée de f .

2. **Représentation graphique.**

a) La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifier à partir de la valeur de a .

b) Tracer l'allure de la parabole représentant f en plaçant le sommet, les racines et l'ordonnée à l'origine.

c) Déterminer l'axe de symétrie de la parabole et vérifier que x_1 et x_2 sont symétriques par rapport à cet axe.

3. **Tableau de signes et position relative.**

a) Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

b) Résoudre l'inéquation $f(x) < 0$.

c) Déterminer les valeurs de x pour lesquelles la courbe représentative de f est au-dessous de l'axe des abscisses.

4. **Question ouverte.** On considère la droite d d'équation $y = x - 1$.

a) Montrer que les points d'intersection de la parabole et de la droite d peuvent être obtenus en résolvant $x^2 - 5x + 4 = 0$.

b) Résoudre cette équation et en déduire les coordonnées des points d'intersection.

c) La droite d est-elle sécante, tangente ou sans intersection avec la parabole ? Justifier.

Exercice 36

1SPE-SECDEG-EX-036
⌚ 35 min

On considère les deux polynômes du second degré :

$$f(x) = x^2 - 5x + 4 \quad \text{et} \quad g(x) = -x^2 + 3x + 4.$$

1. Étude de f .

- Calculer le discriminant Δ_f et déterminer les racines de f .
- Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

2. Étude de g .

- Calculer le discriminant Δ_g et déterminer les racines de g .
- Dresser le tableau de signes de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- Remarquer qu'une des racines de g est commune avec une racine de f : que peut-on en déduire sur les paraboles représentant f et g ?

3. Système d'inéquations. Résoudre le système :

$$\begin{cases} f(x) < 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

en combinant les tableaux de signes établis. Exprimer la solution sous forme d'un intervalle.

4. Inéquation produit. On souhaite résoudre $f(x) \times g(x) \leq 0$.

- Dresser le tableau de signes du produit $f(x) \times g(x)$.
- En déduire l'ensemble des solutions de $f(x) \times g(x) \leq 0$.

5. Question ouverte. On considère l'inéquation $f(x) + g(x) \leq 0$.

- Calculer $h(x) = f(x) + g(x)$ et simplifier.
- Résoudre l'inéquation $h(x) \leq 0$ en détaillant la méthode choisie.
- Comparer les solutions obtenues avec celles de la question 3. Que remarque-t-on ?

1SPE-SECDEG-EX-037
⌚ 35 min

Exercice 37 ◆◆◆

On dispose de 20 mètres de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire. On note x la longueur (en mètres) de l'un des côtés de l'enclos, avec $0 < x < 10$.

1. Modélisation.

- Exprimer la largeur y de l'enclos en fonction de x , à partir de la contrainte de périmètre.
- Montrer que l'aire $A(x)$ (en m^2) de l'enclos s'écrit $A(x) = -x^2 + 10x$.

2. Étude de la fonction aire.

- Mettre $A(x)$ sous forme canonique.
- En déduire la valeur de x qui maximise l'aire. Quelle est cette aire maximale ?
- Quelle est la nature géométrique de l'enclos qui maximise l'aire ? Justifier.

3. Contrainte supplémentaire. On exige maintenant que la longueur x soit comprise entre 3 m et 8 m.

- La valeur optimale trouvée à la question 2 est-elle compatible avec cette contrainte ?
- Déterminer l'aire maximale réalisable sous cette contrainte.

4. Inéquation. On souhaite que l'aire soit supérieure ou égale à 21 m^2 .

- Montrer que cela revient à résoudre $x^2 - 10x + 21 \leq 0$.
- Résoudre cette inéquation et en déduire les valeurs de x compatibles.

5. Question ouverte. Si on pouvait utiliser un mur existant comme l'un des côtés de l'enclos (ce côté n'utilise donc pas de clôture), proposer une nouvelle modélisation et déterminer la longueur maximale réalisable pour ce côté afin de maximiser l'aire. Comparer avec le résultat de la question 2.

1SPE-SECDEG-EX-038
⌚ 40 min

Exercice 38 ◆◆◆

Pour tout réel m , on considère le trinôme :

$$f_m(x) = x^2 - 2mx + (m^2 - m - 2).$$

1. Discriminant en fonction de m .

- a) Calculer le discriminant $\Delta(m)$ de f_m en fonction de m . Simplifier l'expression obtenue.
- b) Discuter le signe de $\Delta(m)$ selon les valeurs de m et en déduire le nombre de racines réelles de f_m .

2. Cas particuliers.

- a) Pour $m = 0$: calculer les racines de f_0 (on acceptera des réponses sous forme de radicaux).
- b) Pour $m = -2$: montrer que f_{-2} admet une racine double et la calculer.
- c) Pour $m = 2$: calculer les deux racines de f_2 . L'une d'elles est-elle remarquable ?

3. Forme canonique.

- a) Écrire la forme canonique de f_m en fonction de m .
- b) Les coordonnées du sommet de la parabole dépendent-elles de m ? Commenter.

4. Valeurs particulières de m .

- a) Déterminer la (ou les) valeur(s) de m pour lesquelles 0 est racine de f_m .
- b) Pour ces valeurs, factoriser complètement $f_m(x)$.

5. Question ouverte.

On cherche les valeurs de m pour lesquelles f_m a deux racines strictement positives. Formuler des conditions sur les racines (à l'aide des relations entre coefficients et racines d'un trinôme) et résoudre le problème. Justifier chaque étape.

Exercice 39



1SPE-SECDEG-EX-039
⌚ 35 min

Une entreprise fabrique et vend x unités d'un produit par semaine, avec $0 \leq x \leq 100$.

Le prix de vente unitaire (en euros) est $p(x) = 15 - \frac{x}{10}$ (tarif dégressif en fonction de la quantité produite).

Les charges hebdomadaires totales sont $C(x) = 200 + 5x$ euros.

1. Recettes et bénéfice.

- a) Exprimer la recette $R(x)$ (en euros) en fonction de x .
- b) Montrer que le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$ s'écrit :

$$B(x) = -\frac{x^2}{10} + 10x - 200.$$

2. Optimum de production.

- a) Mettre $B(x)$ sous forme canonique.
- b) Déterminer le nombre d'unités à produire pour maximiser le bénéfice. Quel est ce bénéfice maximum ?
- c) Ce résultat est-il compatible avec la contrainte $0 \leq x \leq 100$?

3. Seuil de rentabilité.

On cherche les valeurs de x pour lesquelles l'entreprise est bénéficiaire, c'est-à-dire $B(x) > 0$.

- a) Montrer que $B(x) > 0$ équivaut à résoudre $x^2 - 100x + 2000 < 0$.
- b) Calculer le discriminant de ce trinôme et exprimer les racines sous la forme $a \pm b\sqrt{5}$.
- c) En déduire l'intervalle de rentabilité (on donnera des valeurs approchées à l'unité près).

4. Équation de seuil.

On souhaite que le bénéfice soit exactement $B(x) = 32$ euros.

- a) Écrire l'équation à résoudre.
- b) Résoudre cette équation. Combien y a-t-il de solutions ? Les interpréter.

5. Question ouverte.

Un concurrent propose un tarif $p'(x) = 20 - \frac{x}{5}$ avec les mêmes charges. Déterminer le nouveau bénéfice $B'(x)$, son maximum et comparer les deux stratégies de prix. Quelle stratégie est préférable selon le volume de production envisagé ?

Exercice 40



1SPE-SECDEG-EX-040
⌚ 35 min

Un ballon est lancé depuis le sol (hauteur initiale $h_0 = 2$ m) avec une vitesse initiale $v_0 = 20$ m/s à un angle de 45° par rapport à l'horizontale. On prend $g = 10$ m/s².

On rappelle que $\cos(45^\circ) = \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Les équations du mouvement sont :

$$x(t) = v_0 \cos(45^\circ) \cdot t \quad \text{et} \quad y(t) = h_0 + v_0 \sin(45^\circ) \cdot t - \frac{g}{2} t^2,$$

où x est la distance horizontale (en m) et y la hauteur (en m), t le temps en secondes.

1. Mise en équation.

- Calculer $v_0 \cos(45^\circ)$ et $v_0 \sin(45^\circ)$.
- Écrire explicitement $x(t)$ et $y(t)$ en simplifiant les expressions.

2. Hauteur maximale.

- Reconnaître que $y(t)$ est un trinôme du second degré en t . Identifier les coefficients a, b, c .
- Mettre $y(t)$ sous forme canonique et en déduire la hauteur maximale atteinte par le ballon.
- À quel instant t^* cette hauteur est-elle atteinte ? Quelle est alors la position horizontale du ballon ?

3. Équation de la trajectoire. On cherche à exprimer y en fonction de x (et non de t).

- Exprimer t en fonction de x à partir de l'équation de $x(t)$.
- Substituer dans $y(t)$ pour obtenir $y(x) = -\frac{x^2}{40} + x + 2$.
- Interpréter : pourquoi la trajectoire est-elle une parabole ?

4. Portée. La portée est la valeur de x pour laquelle le ballon touche le sol (i.e. $y = 0$).

- Écrire l'équation $y(x) = 0$ et calculer son discriminant.
- Déterminer la portée (valeur positive de x). Donner une valeur approchée à 0,1 m près.

5. Question ouverte. Un obstacle vertical de hauteur 3 m se trouve à 30 m du point de lancer. Le ballon passe-t-il au-dessus de l'obstacle ? Justifier par le calcul, puis proposer un angle de lancer différent qui permettrait de passer au-dessus en maintenant la même vitesse initiale (raisonnement qualitatif accepté).

1SPE-SECDEG-EX-041
⌚ 40 min

Exercice 41 ◆◆◆

On s'intéresse à l'équation **bicarrée** :

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0.$$

1. Substitution. On pose $X = x^2$, avec $X \geq 0$.

- Réécrire l'équation bicarrée comme une équation du second degré en X .
- Calculer le discriminant de ce trinôme en X et résoudre l'équation en X .
- Les valeurs obtenues pour X sont-elles compatibles avec la condition $X \geq 0$?

2. Solutions de l'équation initiale.

- Pour chaque valeur de X trouvée, résoudre $x^2 = X$ et lister toutes les solutions réelles de $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.
- Vérifier que les solutions trouvées vérifient bien l'équation initiale.

3. Factorisation.

- Écrire $x^4 - 5x^2 + 4$ comme un produit de deux trinômes du second degré en x .
- Puis factoriser complètement en un produit de quatre facteurs du premier degré.

4. Tableau de signes.

- En utilisant la forme factorisée, dresser le tableau de signes de $x^4 - 5x^2 + 4$ sur $\mathbb{R}$.
- Résoudre l'inéquation $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$.
- Résoudre l'inéquation $x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0$.

5. Question ouverte. On considère maintenant l'équation $x^4 - 5x^2 + k = 0$, où k est un paramètre réel. En posant $X = x^2$, discuter le nombre de solutions réelles de l'équation selon les valeurs de k . On distinguera soigneusement les différents cas.

Exercice 42



1SPE-SECDEG-EX-042

40 min

Problème ouvert : enclos optimal avec mur existant.

Un agriculteur souhaite clôturer un enclos rectangulaire en utilisant un mur existant de longueur 30 m comme l'un des côtés. Il dispose de 60 m de clôture pour les trois autres côtés.

On note x la longueur (en mètres) du côté parallèle au mur, avec $0 < x \leq 30$, et y la longueur des deux côtés perpendiculaires au mur.

1. Modélisation.

- Écrire la relation entre x , y et la longueur totale de clôture disponible.
- Exprimer y en fonction de x . Vérifier que la contrainte $0 < x \leq 30$ implique $y > 0$.
- Montrer que l'aire de l'enclos est $A(x) = 30x - \frac{x^2}{2}$.

2. Optimisation.

- Mettre $A(x)$ sous forme canonique $A(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
- La valeur α est-elle dans l'intervalle $]0; 30]$?
- En déduire l'aire maximale et les dimensions de l'enclos optimal.

3. Comparaison sans mur. Si l'agriculteur n'avait pas de mur et utilisait les 60 m de clôture pour un enclos rectangulaire complet (quatre côtés), montrer que l'aire maximale serait de 225 m². Comparer avec le résultat précédent et commenter l'apport du mur.**4. Contrainte d'aire minimale.** On exige que l'enclos ait une aire d'au moins 400 m².

- Montrer que cela revient à résoudre $x^2 - 60x + 800 \leq 0$.
- Calculer le discriminant et résoudre cette inéquation.
- En tenant compte de la contrainte $0 < x \leq 30$, déterminer les valeurs de x réalisables.

5. Question ouverte. L'agriculteur envisage d'agrandir l'enclos en achetant un supplément de clôture. Il dispose d'un budget permettant d'acheter L mètres supplémentaires (longueur totale disponible : $60 + L$, avec $L > 0$). Exprimer la nouvelle aire maximale en fonction de L et déterminer la valeur minimale de L permettant d'atteindre une aire de 600 m². Justifier chaque étape de la démarche.**TD contextualise — Trajectoire d'un ballon de basket****Mise en situation**

Un joueur de basket tire un ballon depuis le sol. On modélise la trajectoire du ballon dans un plan vertical par la courbe d'équation :

$$h(x) = -0,05x^2 + x + 2,$$

où x est la distance horizontale parcourue (en mètres) et $h(x)$ la hauteur du ballon (en mètres). On suppose que le sol correspond à $h = 0$.

Partie A — Lecture et premiers calculs

Exercice 43



1SPE-SECDEG-TD-CTX-A

10 min

- Quel est le coefficient a de $h(x)$? La parabole est-elle en U ou en $\cap$? Que cela signifie-t-il physiquement?
- Calculer $h(0)$. Quelle est la hauteur initiale du ballon?
- Calculer $h(10)$ et $h(15)$. Le ballon monte-t-il encore en $x = 10$?
- A quelle distance horizontale le ballon est-il à 3 m de hauteur? Résoudre $h(x) = 3$.

1SPE-SECDEG-TD-CTX-A

$a = -0,05 < 0$: parabole en $\cap$, le ballon monte puis redescend.

Corrigé

Question 1. $a = -0,05 < 0$. La parabole est en $\cap$: le ballon suit une trajectoire en arc de cercle, il monte puis redescend. Physiquement cohérent avec un lancer parabolique.

Question 2. $h(0) = -0,05 \times 0 + 0 + 2 = 2$ m. Le ballon est lancé depuis une hauteur de 2 m (par exemple, au niveau de la poignée du joueur).

Question 3.

$$h(10) = -0,05 \times 100 + 10 + 2 = -5 + 10 + 2 = 7 \text{ m.}$$

$$h(15) = -0,05 \times 225 + 15 + 2 = -11,25 + 17 = 5,75 \text{ m.}$$

Le ballon est encore à 5,75 m en $x = 15$ (supérieur à 2 m), donc il n'a pas encore atteint son maximum.

Question 4. $h(x) = 3 \Leftrightarrow -0,05x^2 + x + 2 = 3 \Leftrightarrow -0,05x^2 + x - 1 = 0$.

On multiplie par -20 : $x^2 - 20x + 20 = 0$. $\Delta = 400 - 80 = 320$. $\sqrt{320} = 8\sqrt{5} \approx 17,9$.

$$x_1 = \frac{20 - 17,9}{2} \approx 1,05 \text{ m,} \quad x_2 = \frac{20 + 17,9}{2} \approx 18,95 \text{ m.}$$

Le ballon est à 3 m de hauteur pour $x \approx 1,05$ m (à la montée) et $x \approx 18,95$ m (à la descente).

Partie B — Hauteur maximale et portée

1SPE-SECDEG-TD-CTX-B
12 min

Exercice 44 ♦♦

1. Calculer l'abscisse α du sommet de la parabole. À quelle distance horizontale le ballon est-il au point le plus haut ?
2. Calculer la hauteur maximale $h(\alpha)$.
3. Calculer la portée du tir : trouver les valeurs de $x > 0$ pour lesquelles $h(x) = 0$ (le ballon touche le sol). On arrondira à 10^{-1} m.
4. La hauteur du panier de basket est 3,05 m. Le ballon peut-il entrer dans le panier ? Justifier sans calcul supplémentaire, en utilisant les résultats précédents.

Corrigé

Question 1. $a = -0,05$, $b = 1$.

$$\alpha = \frac{-1}{2 \times (-0,05)} = \frac{-1}{-0,1} = 10 \text{ m.}$$

Le ballon est au point le plus haut après avoir parcouru 10 m horizontalement.

Question 2.

$$h_{\max} = h(10) = -0,05 \times 100 + 10 + 2 = 7 \text{ m.}$$

La hauteur maximale est 7 m.

Question 3. $h(x) = 0$:

$$-0,05x^2 + x + 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 20x - 40 = 0 \quad (\text{multiplication par } -20).$$

$$\Delta = 400 + 160 = 560 = 4 \times 140.$$

$$x = \frac{20 \pm \sqrt{560}}{2} = 10 \pm \sqrt{140}.$$

$$\sqrt{140} \approx 11,8.$$

- $x_1 = 10 - 11,8 \approx -1,8$ m (avant le lancer : à ignorer).
- $x_2 = 10 + 11,8 \approx 21,8$ m.

La portée du tir est d'environ 21,8 m.

Question 4. La hauteur du panier est 3,05 m. D'après la question 4 de la Partie A, le ballon est à 3 m de hauteur pour $x \approx 1,05$ m et $x \approx 18,95$ m. Comme $3,05 < h_{\max} = 7$ m, il existe bien des valeurs de x pour lesquelles $h(x) = 3,05$ m. En particulier, si le panier se situe à la bonne distance horizontale, le ballon peut théoriquement y entrer.

Le maximum de h est 7 m > 3,05 m. Le ballon passe donc bien au-dessus de la hauteur du panier.

Partie C — Comparaison de trajectoires et question orale

Exercice 45

1SPE-SECDEG-TD-CTX-C
15 min

Un second joueur tire avec la trajectoire $k(x) = -0,08x^2 + x + 2$.

1. Calculer le sommet de k et la hauteur maximale.
2. Comparer les deux trajectoires : laquelle monte le plus haut ? Laquelle a la plus grande portée ?
3. Résoudre $h(x) = k(x)$ pour trouver l'abscisse où les deux trajectoires se croisent (autre que $x = 0$).
4. **Question orale** : sans calcul, comment le coefficient a influence-t-il la forme de la parabole et la portée du tir ? Expliquer en termes physiques.

Corrigé

1SPE-SECDEG-TD-CTX-C

Question 1. $k(x) = -0,08x^2 + x + 2$, $a = -0,08$, $b = 1$.

$$\alpha_k = \frac{-1}{2 \times (-0,08)} = \frac{1}{0,16} = 6,25 \text{ m.}$$

$$k_{\max} = k(6,25) = -0,08 \times 39,0625 + 6,25 + 2 = -3,125 + 8,25 = 5,125 \text{ m.}$$

Question 2.

- Hauteur maximale : h atteint 7 m contre 5,125 m pour k . Le premier joueur tire plus haut.
- Portée : pour h , portée $\approx 21,8$ m. Pour k : $k(x) = 0 \Rightarrow 0,08x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow \Delta = 1 + 0,64 = 1,64$, portée $\approx (1 + \sqrt{1,64})/0,16 \approx 14,3$ m. La trajectoire h a une plus grande portée.

Question 3. $h(x) = k(x)$:

$$-0,05x^2 + x + 2 = -0,08x^2 + x + 2 \Leftrightarrow (-0,05 + 0,08)x^2 = 0 \Leftrightarrow 0,03x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Les deux trajectoires ne se croisent qu'en $x = 0$: elles partent du même point mais s'écartent immédiatement.

Question 4 (orale). Plus $|a|$ est grand (en valeur absolue), plus la parabole est «étroite» : le ballon monte moins haut, sa portée est plus courte. Physiquement, cela correspond à un tir plus «vertical» (comme un panier en cloche) plutôt qu'un tir rasant (longue portée). Le coefficient a pilote la «courbure» de la trajectoire, c'est-à-dire la décélération verticale due à la gravité, qui est ici modélisée de manière simplifiée par le terme ax^2 .

Plus $|a|$ est grand, plus la parabole est «étroite» et le tir plus court et moins haut.

TD fil rouge — La boîte en carton

Mise en situation

Un artisan fabrique des boîtes en carton pour les cadeaux. Il part d'une feuille rectangulaire de 30 cm sur 20 cm, découpe un carré de côté x (en cm) aux quatre coins, puis replie les bords pour former une boîte ouverte. Quelle valeur de x maximise le volume de la boîte ?

Ce problème d'optimisation réunit toutes les capacités du chapitre.

Partie A — Mise en equation

1SPE-SECDEG-TD-FIL-A
⌚ 10 min

Exercice 46 ♦♦

1. Exprimer en fonction de x la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte.
2. Justifier que x doit vérifier $0 < x < 10$ (domaine de validité).
3. Montrer que le volume de la boîte est :

$$V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x).$$

4. Développer $V(x)$ et identifier les coefficients du polynôme obtenu.
5. Calculer $V(0)$, $V(5)$ et $V(10)$. Commenter.

1SPE-SECDEG-TD-FIL-A

Corrigé

Question 1. Après découpe des carres de cote x et pliage :

- ▶ Hauteur : x cm.
- ▶ Longueur : $30 - 2x$ cm.
- ▶ Largeur : $20 - 2x$ cm.

Question 2. Pour que les dimensions soient strictement positives : $x > 0$, $30 - 2x > 0 \Rightarrow x < 15$, $20 - 2x > 0 \Rightarrow x < 10$. La contrainte la plus restrictive est $x < 10$, d'où $x \in]0 ; 10[$.

Question 3. Volume = longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur : $V(x) = x \times (30 - 2x) \times (20 - 2x)$.

Question 4.

$$\begin{aligned} V(x) &= x(30 - 2x)(20 - 2x) \\ &= x[30 \times 20 - 30 \times 2x - 2x \times 20 + 4x^2] \\ &= x[600 - 60x - 40x + 4x^2] \\ &= x(4x^2 - 100x + 600) \\ &= 4x^3 - 100x^2 + 600x. \end{aligned}$$

C'est un polynôme de degré 3 (pas du second degré directement).

Question 5.

$$V(0) = 0 \text{ cm}^3 \quad (\text{pas de hauteur}),$$

$$V(5) = 5 \times 20 \times 10 = 1\,000 \text{ cm}^3,$$

$$V(10) = 10 \times 10 \times 0 = 0 \text{ cm}^3 \quad (\text{pas de largeur}).$$

Le volume est nul aux extrémités du domaine et positif à l'intérieur.

Partie B — Etude sur un sous-domaine (approche second degré)

1SPE-SECDEG-TD-FIL-B
⌚ 12 min

Exercice 47 ♦♦

On note $W(x) = \frac{V(x)}{x} = (30 - 2x)(20 - 2x)$ pour $x \in]0 ; 10[$.

1. Montrer que $W(x) = 4x^2 - 100x + 600$.
2. Calculer l'abscisse α et l'ordonnée β du sommet de la parabole représentant W .
3. La valeur α appartient-elle au domaine $]0 ; 10[$? Que représente $W(\alpha)$ en termes de volume ?
4. Dresser le tableau de variations de W sur $]0 ; 10[$.
5. En déduire les valeurs de x pour lesquelles $W(x)$ est croissante ou décroissante. Interpréter géométriquement.

Corrigé

Question 1.

$$W(x) = (30 - 2x)(20 - 2x) = 600 - 60x - 40x + 4x^2 = 4x^2 - 100x + 600.$$

Question 2. $a = 4, b = -100$.

$$\alpha = \frac{-(-100)}{2 \times 4} = \frac{100}{8} = \frac{25}{2} = 12,5.$$

$$\beta = W(12,5) = 4 \times 156,25 - 100 \times 12,5 + 600 = 625 - 1250 + 600 = -25.$$

Question 3. $\alpha = 12,5 \notin]0; 10[$: le sommet de W est hors du domaine. Sur $]0; 10[$, on est toujours à gauche du sommet (puisque $\alpha = 12,5 > 10$). Comme $a = 4 > 0$, W est **décroissante** sur tout $]0; 10[$.

$W(\alpha) = -25 < 0$ n'a pas de sens physique (surface négative) : le sommet est hors du domaine de validité.

Question 4. Tableau de variations de W sur $]0; 10[$:

x	0	10
$W(x)$	600	0

Question 5. W est strictement décroissante sur $]0; 10[$: plus on découpe un grand carré (grande hauteur x), plus la base de la boîte est petite. Le volume $V(x) = x \cdot W(x)$ résulte d'un compromis entre hauteur et surface de la base.

Partie C — Optimisation numérique et conclusion

Exercice 48 ♦♦♦

1SPE-SECDEG-TD-FIL-C
⌚ 15 min

- Calculer $V(1), V(2), V(3), V(4), V(5), V(6), V(7)$. (On utilisera la formule $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$.)
- D'après ce tableau, entre quelles valeurs entières consécutives le maximum semble-t-il se situer ?
- Affiner : calculer $V(3,5)$ et $V(4)$. Lequel est le plus grand ?
- Bilan** : résumer les trois formes utilisées dans ce TD et les outils du chapitre mobilisés.
- Question ouverte (oral)** : pourquoi le problème d'optimisation du volume ne se réduit-il pas directement à un polynôme du second degré ?

Corrigé

1SPE-SECDEG-TD-FIL-C

Question 1. Tableau de valeurs :

x	1	2	3	4	5	6	7
$V(x)$	504	832	1 008	1 056	1 000	864	672

Question 2. Le maximum semble se situer entre $x = 3$ et $x = 5$, avec le plus grand volume observé en $x = 4$ ($V(4) = 1 056$).

Question 3. $V(3,5) = 3,5 \times 23 \times 13 = 3,5 \times 299 = 1 046,5 \text{ cm}^3$. $V(4) = 1 056 > 1 046,5 = V(3,5)$: pour $x = 4$, le volume est plus grand.

Question 4. Bilan :

- **Forme développée** : $V(x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x$ (polynôme de degré 3).
- **Forme factorisée** : $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ — permet de lire le domaine.
- **Polynôme du second degré** : $W(x) = (30 - 2x)(20 - 2x)$ — étude de la base.
- Outils mobilisés : formes d'un polynôme, sommet, tableau de variations, domaine de validité, étude numérique.

La valeur exacte du maximum (par dérivation en Terminale) est $x = \frac{50 - \sqrt{700}}{6} \approx 3,92 \text{ cm}$.

Question 5. Le volume $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ est un produit de trois facteurs lineaires, donc un polynome de **degre 3**. Pour l'optimiser directement, il faudrait utiliser la derivation (programme de Terminale). Dans ce chapitre, on se contente d'une approche numerique ou d'une etude de la fonction auxiliaire $W(x) = V(x)/x$ (polynome du second degre).

QCM d'auto-evaluation — Fonctions polynomes du second degre

Pour chaque question, une seule reponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Reconnaître un polynome du second degre et passer d'une forme a une autre

1. [Q1] Parmi les expressions suivantes, laquelle est un polynome du second degre ?
 - A. $f(x) = 3x + 7$
 - B. $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$
 - C. $f(x) = x^3 - 2x + 4$
 - D. $f(x) = \frac{1}{x^2} + 3$
2. [Q2] Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$. Quelle est la forme canonique de f ?
 - A. $f(x) = 2(x - 2)^2 - 2$
 - B. $f(x) = 2(x - 4)^2 - 10$
 - C. $f(x) = 2(x - 2)^2 + 2$
 - D. $f(x) = (x - 2)^2 - 2$
3. [Q3] On developpe $3(x - 1)^2 + 5$. Quel resultat obtient-on ?
 - A. $3x^2 - 6x + 8$
 - B. $3x^2 - 6x + 3$
 - C. $3x^2 - 3x + 8$
 - D. $3x^2 + 8$

C2 — Determiner le sommet, l'axe de symetrie et dresser le tableau de variations

4. [Q4] Soit $f(x) = -x^2 + 4x - 3$. Quelle est l'abscisse du sommet de la parabole representant f ?
 - A. $x = -2$
 - B. $x = 2$
 - C. $x = -4$
 - D. $x = 4$
5. [Q5] Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Sur quel intervalle f est-elle decroissante ?
 - A. $[3; +\infty[$
 - B. $] -\infty; 3]$
 - C. $] -\infty; 5]$
 - D. $[5; +\infty[$
6. [Q6] Parmi les assertions suivantes concernant $f(x) = 2x^2 - 4x + 7$, laquelle est vraie ?
 - A. Le minimum de f vaut 7.
 - B. La parabole est tournee vers le bas (coefficient directeur negatif).
 - C. Le minimum de f vaut 5.
 - D. La fonction f n'admet pas de minimum.

C3 — Calculer le discriminant et résoudre une équation du second degré

7. [Q7] On considère $f(x) = x^2 - 5x + 6$. Quelle est la valeur du discriminant Δ ?

- A. $\Delta = 1$
- B. $\Delta = 49$
- C. $\Delta = -11$
- D. $\Delta = 25$

8. [Q8] L'équation $2x^2 - 4x + 2 = 0$ admet :

- A. Deux racines réelles distinctes.
- B. Une racine double, égale à 1.
- C. Aucune racine réelle.
- D. Une racine double, égale à 2.

9. [Q9] Les solutions de $x^2 - 3x - 4 = 0$ sont :

- A. $x_1 = -1$ et $x_2 = 4$
- B. $x_1 = 1$ et $x_2 = -4$
- C. $x_1 = -1$ et $x_2 = -4$
- D. $x_1 = 1$ et $x_2 = 4$

C4 — Factoriser un trinôme et étudier son signe

10. [Q10] Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$, dont les racines sont $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$. Quelle est la forme factorisée de $f(x)$?

- A. $f(x) = (x - 1)(x - 3)$
- B. $f(x) = 2(x - 1)(x - 3)$
- C. $f(x) = 2(x + 1)(x + 3)$
- D. $f(x) = (2x - 1)(2x - 3)$

11. [Q11] On sait que $f(x) = (x - 2)(x - 5)$. Sur quel intervalle $f(x)$ est-il négatif ou nul ?

- A. $] -\infty ; 2] \cup [5 ; +\infty[$
- B. $[2 ; 5]$
- C. $] -\infty ; 2]$
- D. $[5 ; +\infty[$

12. [Q12] Le trinôme $f(x) = x^2 + 2x + 5$ a pour discriminant $\Delta = -16 < 0$. Quel est son signe sur $\mathbb{R}$?

- A. Il est positif pour $x > 0$ et négatif pour $x < 0$.
- B. Il est négatif pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- C. Il est positif pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- D. Il change de signe en $x = -1$.

C5 — Résoudre une inéquation du second degré

13. [Q13] Résoudre $x^2 - x - 6 \leq 0$ (les racines de $x^2 - x - 6$ sont -2 et 3).

- A. $x \in [-2 ; 3]$
- B. $x \in] -\infty ; -2] \cup [3 ; +\infty[$
- C. $x \in [-2 ; 0]$
- D. $x \in [0 ; 3]$

14. [Q14] L'ensemble de solutions de $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$ est :
- A. $] -\infty ; 1] \cup [3 ; +\infty[$
 - B. $[1 ; 3]$
 - C. $] -\infty ; -1] \cup [3 ; +\infty[$
 - D. $[-1 ; 3]$
15. [Q15] Pour quelle valeur de k l'équation $x^2 - 2x + k = 0$ admet-elle exactement une solution réelle ?
- A. $k = 0$
 - B. $k = 2$
 - C. $k = 1$
 - D. $k = -1$

C6 — Modéliser un problème concret par un polynôme du second degré et trouver un optimum

16. [Q16] On découpe des carrés de cote x aux coins d'une feuille 30×20 pour former une boîte ouverte. Le volume est $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Quelle est la valeur de $V(4)$?
- A. $V(4) = 1\,344$
 - B. $V(4) = 1\,280$
 - C. $V(4) = 2\,640$
 - D. $V(4) = 1\,056$
17. [Q17] On cherche à maximiser $f(x) = -2x^2 + 8x + 3$ sur $\mathbb{R}$. Quelle est la valeur du maximum ?
- A. $f_{\max} = 3$
 - B. $f_{\max} = 11$
 - C. $f_{\max} = 8$
 - D. $f_{\max} = 2$
18. [Q18] Une balle est lancée verticalement. Sa hauteur est $h(t) = -5t^2 + 20t$ (en mètres, t en secondes). À quel instant atteint-elle sa hauteur maximale ?
- A. $t = 4$ s
 - B. $t = 1$ s
 - C. $t = 2$ s
 - D. $t = 20$ s

Correction et diagnostics

Question	Capacite	Reponse	Distracteurs — erreur type et renvoi
Q1	C1	B	A : polynome de degre 1 ($a = 0$) confondu avec second degre — renvoi C1, definition C : polynome de degre 3 confondu avec second degre — renvoi C1, definition D : puissance negative x^{-2} confondue avec x^2 — renvoi C1, definition
Q2	C1	A	B : $\alpha = 8/2 = 4$ (oubli du $2a$ au denominateur) — renvoi C1, forme canonique C : erreur de signe sur $\beta = -2$ écrit $+2$ — renvoi C1, forme canonique D : oubli du facteur $a = 2$ devant la forme canonique — renvoi C1, forme canonique
Q3	C1	A	B : oubli d'ajouter $+5$ au terme constant 3 — renvoi R1, identites C : $(x - 1)^2 = x^2 - x + 1$ au lieu de $x^2 - 2x + 1$ — renvoi R1, identites D : confusion $(x - 1)^2$ et $x^2 - 1$ — renvoi R1, identites
Q4	C2	B	A : $a = -1$ non pris en compte (signe oublie dans $2a$) — renvoi C2, sommet C : $b/(2a)$ au lieu de $-b/(2a)$ (oubli du signe moins) — renvoi C2, sommet D : $b = 4$ utilise directement sans la formule — renvoi C2, sommet
Q5	C2	B	A : inversion decroissance / croissance (confusion $a > 0$) — renvoi C2, tableau de variations C : $c = 5$ pris pour l'abscisse du sommet — renvoi C2, sommet D : $c = 5$ pris pour l'abscisse de changement de monotonie — renvoi C2, sommet
Q6	C2	C	A : $f(0) = c = 7$ confondu avec le minimum — renvoi C2, sommet B : $a = 2 > 0$ confondu avec $a < 0$ — renvoi C2, orientation de la parabole D : $a > 0$ implique minimum (non reconnu) — renvoi C2, tableau de variations
Q7	C3	A	B : $\Delta = b^2 + 4ac$ (signe erreur dans la formule) — renvoi C3, discriminant C : permutation des coefficients a, b, c — renvoi C3, discriminant D : oubli du terme $-4ac$ dans la formule — renvoi C3, discriminant
Q8	C3	B	A : $\Delta = 0$ confondu avec $\Delta > 0$ (deux racines) — renvoi C3, cas du discriminant C : $\Delta = 0$ confondu avec $\Delta < 0$ (pas de solution) — renvoi C3, cas du discriminant D : erreur arithmetique $x_0 = 4/4 = 2$ au lieu de 1 — renvoi C3, racine double
Q9	C3	A	B : $b = -3$ lu comme $b = 3$ (erreur de signe sur b) — renvoi C3, formule des racines C : bonnes valeurs absolues mais mauvais signes — renvoi C3, formule des racines D : confusion sur le signe des racines — renvoi C3, formule des racines
Q10	C4	B	A : oubli du facteur $a = 2$ dans $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ — renvoi C4, factorisation C : $-x_1, -x_2$ remplace par $+x_1, +x_2$ — renvoi C4, factorisation D : $a = 2$ reparti sur les deux facteurs (erreur de degre) — renvoi C4, factorisation
Q11	C4	B	A : intervalle de signe positif confondu avec negatif — renvoi C4, tableau de signes C : une seule racine prise en compte — renvoi C4, tableau de signes D : intervalle de signe positif retenu — renvoi C4, tableau de signes
Q12	C4	C	A : signe de c confondu avec signe global — renvoi C4, signe quand $\Delta < 0$ B : $\Delta < 0$ confondu avec trinome negatif — renvoi C4, signe quand $\Delta < 0$ D : sommet $\alpha = -1$ confondu avec une racine — renvoi C4, signe quand $\Delta < 0$
Q13	C5	A	B : ensemble solution de ≥ 0 donne au lieu de ≤ 0 — renvoi C5, resolution inequation C : moitie seulement de l'intervalle solution — renvoi C5, resolution inequation D : racine $x_1 = -2$ omise — renvoi C5, resolution inequation
Q14	C5	B	A : inversion signe positif / negatif pour $a < 0$ — renvoi C5, cas $a < 0$ C : $-x_1 = -1$ utilise au lieu de $x_1 = 1$ — renvoi C5, calcul des racines D : borne inferieure -1 au lieu de 1 — renvoi C5, calcul des racines
Q15	C5	C	A : terme constant nul ($k = 0$) confondu avec racine double — renvoi C5, discriminant nul B : confusion $\Delta = b - 4k = 0$ au lieu de $b^2 - 4k = 0$ — renvoi C5, discriminant nul D : erreur de signe dans la resolution de $4 - 4k = 0$ — renvoi C5, discriminant nul
Q16	C6	A	B : confusion $30 - x$ et $30 - 2x$ (oubli du facteur 2) — renvoi C6, mise en equation C : decoupees non prises en compte ($V = 4 \times 30 \times 20$) — renvoi C6, mise en equation D : idem B ($4 \times 22 \times 12 = 1\ 056$) — renvoi C6, evaluation
Q17	C6	B	A : $f(0) = c = 3$ confondu avec le maximum — renvoi C6, optimisation C : $b = 8$ confondu avec la valeur du maximum — renvoi C6, sommet et maximum D : abscisse $\alpha = 2$ confondue avec la valeur du maximum — renvoi C6, sommet et maximum
Q18	C6	C	A : instant de retombee ($h = 0, t = 4$) confondu avec instant du maximum — renvoi C6, distinction sommet / racines B : signe manquant dans $-b/(2a)$ donnant $t = 1$ — renvoi C6, abscisse du sommet D : $b = 20$ lu directement comme instant du maximum — renvoi C6, abscisse du sommet

Reponses correctes

Q1	B	Q2	A	Q3	A	Q4	B
Q5	B	Q6	C	Q7	A	Q8	B
Q9	A	Q10	B	Q11	B	Q12	C
Q13	A	Q14	B	Q15	C	Q16	A
Q17	B	Q18	C				

Score : ... / 18 Capacités à retravailler : C1 [Q1 Q2 Q3] C2 [Q4 Q5 Q6] C3 [Q7 Q8 Q9] C4 [Q10 Q11 Q12] C5 [Q13 Q14 Q15] C6 [Q16 Q17 Q18]

1SPE-SECDEG-EV-A

Corrigé

Exercice 1

(7 points) — C1, C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer); Q2 : 2 pts (calculer, communiquer); Q3 : 2 pts (calculer); Q4 : 2 pts (calculer, communiquer)

Question 1 — Identification des coefficients.

Pour $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$: $a = 2$, $b = -8$, $c = 6$.

Question 2 — Forme canonique.

On calcule :

$$\alpha = \frac{-(-8)}{2 \times 2} = \frac{8}{4} = 2, \quad \beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 6 = 8 - 16 + 6 = -2.$$

$$f(x) = 2(x - 2)^2 - 2.$$

Question 3 — Discriminant et racines.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4 \times 2 \times 6 = 64 - 48 = 16 > 0. \quad \sqrt{\Delta} = 4.$$

Deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{8 - 4}{4} = 1, \quad x_2 = \frac{8 + 4}{4} = 3.$$

Question 4 — Forme factorisée.

$$f(x) = 2(x - 1)(x - 3).$$

Vérification : $2(x - 1)(x - 3) = 2(x^2 - 4x + 3) = 2x^2 - 8x + 6 = f(x)$. ✓

Exercice 2

(5 points) — C2

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, communiquer); Q2 : 1 pt (raisonner); Q3 : 1 pt (représenter); Q4 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Forme canonique de g .

On développe $-(x - 2)^2 + 1$:

$$-(x - 2)^2 + 1 = -(x^2 - 4x + 4) + 1 = -x^2 + 4x - 4 + 1 = -x^2 + 4x - 3 = g(x). \quad \checkmark$$

Donc $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$ est bien la forme canonique de g .

Question 2 — Sommet et extremum.

Le sommet est $S(2; 1)$. Comme $a = -1 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : g admet un **maximum** de valeur $g(2) = 1$, atteint en $x = 2$.

Question 3 — Tableau de variations.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	↗ 1 ↘	$-\infty$

Question 4 — Axe de symétrie.

L'axe de symétrie de la parabole a pour équation $x = \alpha = 2$.

Dans $ax^2 + bx + c$: a est le coefficient de x^2 , b le coefficient de x , c le terme constant.
Formule du sommet : $\alpha = -b/(2a)$, $\beta = f(\alpha)$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4 \times 2 \times 6.$$

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \text{ avec } a = 2, x_1 = 1, x_2 = 3.$$

On développe la forme canonique et on vérifie l'égalité.

$a = -1 < 0$: parabole en $\cap$, le sommet est un maximum.

Exercice 3

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, représenter); Q2 : 1 pt (calculer); Q3 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Tableau de signes.

$$f(x) = 2(x-1)(x-3).$$

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$x-1$	—	0	+	+
$x-3$	—	—	0	+
2	+	+	+	+
$f(x)$	+	0	—	+

On utilise la forme factorisée $f(x) = 2(x-1)(x-3)$ pour dresser le tableau de signes.

Question 2 — Resolution de $f(x) \leq 0$.D'après le tableau de signes, $f(x) \leq 0$ sur $[1; 3]$.

$$\mathcal{S} = [1; 3].$$

Question 3 — Resolution de $f(x) > 0$. $f(x) > 0$ sur $] -\infty; 1[\cup]3; +\infty[$.

$$\mathcal{S} =] -\infty; 1[\cup]3; +\infty[.$$

Exercice 4

(4 points) — C6

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser); Q2 : 1 pt (modéliser); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 1 pt (chercher)

Question 1 — Dimensions de la boîte.

Après découpe et pliage :

- Hauteur : x cm.
- Longueur : $30 - 2x$ cm.
- Largeur : $20 - 2x$ cm.

Les découpes de cote x réduisent chaque dimension de $2x$.

Question 2 — Volume et domaine.

$$V(x) = x \times (30 - 2x) \times (20 - 2x).$$

Domaine : $x > 0$, $30 - 2x > 0$ et $20 - 2x > 0$, soit $x \in]0; 10[$.Question 3 — Calcul de $V(3)$ et $V(5)$.

$$\begin{aligned} V(3) &= 3 \times (30 - 6) \times (20 - 6) = 3 \times 24 \times 14 = 1\,008 \text{ cm}^3. \\ V(5) &= 5 \times (30 - 10) \times (20 - 10) = 5 \times 20 \times 10 = 1\,000 \text{ cm}^3. \end{aligned}$$

On substitue directement les valeurs dans la formule.

Question 4 — Comparaison et limites de la conclusion.

 $V(3) = 1\,008 > 1\,000 = V(5)$: pour $x = 3$, le volume est plus grand.

Cependant, on ne peut pas conclure que $x = 3$ est le maximum global : ces deux points ne suffisent pas à prouver qu'il n'existe pas une valeur $x^* \in]0; 10[$ donnant un volume encore plus grand. Une étude complète de V (dérivée ou tableau de variations) est nécessaire pour trouver le maximum absolu.

Exercice 1

(7 points)

Capacités C1, C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère le polynôme du second degré :

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6.$$

1. Identifier les coefficients a , b et c . (1 pt — calculer)
2. Calculer l'abscisse α et l'ordonnée β du sommet de la parabole représentant f . Écrire la forme canonique de f . (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer le discriminant Δ de f . En déduire les racines x_1 et x_2 de f (avec $x_1 < x_2$). (2 pts — calculer)
4. Écrire la forme factorisée de $f(x)$. Vérifier en développant. (2 pts — calculer, communiquer)

Exercice 2

(5 points)

Capacités C2

Compétences évaluées : représenter, calculer, raisonner.

On considère $g(x) = -x^2 + 4x - 3$.

1. Montrer que la forme canonique de g est $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$. (2 pts — calculer, communiquer)
2. En déduire les coordonnées du sommet S de la parabole. Préciser si g admet un maximum ou un minimum, et donner sa valeur. (1 pt — raisonner)
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. (1 pt — représenter)
4. Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. (1 pt — calculer)

Exercice 3

(4 points)

Capacités C4, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On rappelle que les racines de $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$ sont $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$.

1. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$. (2 pts — calculer, représenter)
2. Résoudre $f(x) \leq 0$. (1 pt — calculer)
3. Résoudre $2x^2 - 8x + 6 > 0$. (1 pt — calculer)

Exercice 4

(4 points)

Capacités C6

Compétences évaluées : modéliser, chercher, calculer.

Un artisan découpe des carrés de côté x cm aux quatre coins d'une feuille de carton rectangulaire mesurant 30 cm sur 20 cm, puis plie les bords pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer, en fonction de x , la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte. (1 pt — modéliser)
2. Montrer que le volume de la boîte est $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Donner le domaine de validité de x . (1 pt — modéliser)
3. Calculer $V(3)$ et $V(5)$. (1 pt — calculer)
4. En observant les valeurs calculées, quelle valeur de x (parmi 3 et 5) donne le plus grand volume ? Justifier par le calcul pourquoi on ne peut pas conclure définitivement sans étude complète. (1 pt — chercher)

Exercice 1

(7 points) — C1, C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer) ; Q2 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q3 : 2 pts (calculer) ; Q4 : 2 pts (calculer, communiquer)

Question 1 — Identification des coefficients.

Pour $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$: $a = 3$, $b = -12$, $c = 9$.

Dans $ax^2 + bx + c$: a est le coefficient de x^2 , b le coefficient de x , c le terme constant.
Formule du sommet :
 $\alpha = -b/(2a)$, $\beta = f(\alpha)$.

Question 2 — Forme canonique.

$$\alpha = \frac{-(-12)}{2 \times 3} = \frac{12}{6} = 2, \quad \beta = f(2) = 3 \times 4 - 12 \times 2 + 9 = 12 - 24 + 9 = -3.$$

$$f(x) = 3(x - 2)^2 - 3.$$

Question 3 — Discriminant et racines.

$$\Delta = 144 - 108 = 36 > 0. \quad \sqrt{\Delta} = 6.$$

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \times 3 \times 9 = 144 - 108.$$

$$x_1 = \frac{12 - 6}{6} = 1, \quad x_2 = \frac{12 + 6}{6} = 3.$$

Question 4 — Forme factorisée.

$$f(x) = 3(x - 1)(x - 3).$$

$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$
avec $a = 3$, $x_1 = 1$,
 $x_2 = 3$.

Vérification : $3(x - 1)(x - 3) = 3(x^2 - 4x + 3) = 3x^2 - 12x + 9 = f(x)$. ✓

Exercice 2

(5 points) — C2

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q2 : 1 pt (raisonner) ; Q3 : 1 pt (représenter) ; Q4 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Forme canonique de g .On développe $-2(x - 2)^2 + 2$:

$$-2(x - 2)^2 + 2 = -2(x^2 - 4x + 4) + 2 = -2x^2 + 8x - 8 + 2 = -2x^2 + 8x - 6 = g(x). \quad \checkmark$$

On développe la forme canonique proposée et on vérifie.

Donc $g(x) = -2(x - 2)^2 + 2$ est bien la forme canonique de g .

Question 2 — Sommet et extremum.

Le sommet est $S(2; 2)$. Comme $a = -2 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : g admet un **maximum** de valeur $g(2) = 2$, atteint en $x = 2$.

$a = -2 < 0$: parabole en $\cap$, le sommet est un maximum.

Question 3 — Tableau de variations.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	↗ 2 ↘	$-\infty$

Question 4 — Axe de symétrie.

L'axe de symétrie de la parabole a pour équation $x = \alpha = 2$.

Exercice 3

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, représenter); Q2 : 1 pt (calculer); Q3 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Tableau de signes.

$$f(x) = 3(x - 1)(x - 3).$$

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$x - 1$	—	0	+	+
$x - 3$	—	—	0	+
3	+	+	+	+
$f(x)$	+	0	—	+

Question 2 — Résolution de $f(x) \leq 0$.

D'après le tableau de signes : $\mathcal{S} = [1; 3]$.

Question 3 — Résolution de $f(x) > 0$.

$\mathcal{S} =]-\infty; 1[\cup]3; +\infty[$.

Exercice 4

(4 points) — C6

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser); Q2 : 1 pt (modéliser); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 1 pt (chercher)

Question 1 — Dimensions.

Après découpe et pliage : hauteur x cm, longueur $30 - 2x$ cm, largeur $20 - 2x$ cm.

Question 2 — Volume et domaine.

$V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Domaine : $x > 0$, $30 - 2x > 0$ et $20 - 2x > 0$, d'où $x \in]0; 10[$.

Question 3 — Calcul de $V(4)$ et $V(6)$.

$$V(4) = 4 \times (30 - 8) \times (20 - 8) = 4 \times 22 \times 12 = 1\,056 \text{ cm}^3.$$

$$V(6) = 6 \times (30 - 12) \times (20 - 12) = 6 \times 18 \times 8 = 864 \text{ cm}^3.$$

Question 4 — Comparaison.

$V(4) = 1\,056 > 864 = V(6)$: pour $x = 4$, le volume est plus grand.

Cependant, ces deux valeurs ne permettent pas de conclure que $x = 4$ est le maximum global. Il existe peut-être un $x^* \in]0; 10[$ donnant un volume supérieur. Une étude complète de V est nécessaire.

Évaluation 1SPE-SECDEG-EV-B 55 min

Exercice 1

(7 points)

Capacités C1, C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère le polynôme du second degré :

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 9.$$

1. Identifier les coefficients a , b et c . (1 pt — calculer)
2. Calculer l'abscisse α et l'ordonnée β du sommet de la parabole représentant f . Écrire la forme canonique de f . (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer le discriminant Δ de f . En déduire les racines x_1 et x_2 de f (avec $x_1 < x_2$). (2 pts — calculer)
4. Écrire la forme factorisée de $f(x)$. Vérifier en développant. (2 pts — calculer, communiquer)

Exercice 2**(5 points)****Capacités C2**

Compétences évaluées : représenter, calculer, raisonner.

On considère $g(x) = -2x^2 + 8x - 6$.

1. Montrer que la forme canonique de g est $g(x) = -2(x - 2)^2 + 2$. (2 pts — calculer, communiquer)
2. En déduire les coordonnées du sommet S de la parabole. Préciser si g admet un maximum ou un minimum, et donner sa valeur. (1 pt — raisonner)
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. (1 pt — représenter)
4. Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. (1 pt — calculer)

Exercice 3**(4 points)****Capacités C4, C5**

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On rappelle que les racines de $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$ sont $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$.

1. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$. (2 pts — calculer, représenter)
2. Résoudre $f(x) \leq 0$. (1 pt — calculer)
3. Résoudre $3x^2 - 12x + 9 > 0$. (1 pt — calculer)

Exercice 4**(4 points)****Capacités C6**

Compétences évaluées : modéliser, chercher, calculer.

Un artisan découpe des carrés de côté x cm aux quatre coins d'une feuille de carton rectangulaire mesurant 30 cm sur 20 cm, puis plie les bords pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer, en fonction de x , la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte. (1 pt — modéliser)
2. Montrer que le volume de la boîte est $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Donner le domaine de validité de x . (1 pt — modéliser)
3. Calculer $V(4)$ et $V(6)$. (1 pt — calculer)
4. En observant les valeurs calculées, quelle valeur de x (parmi 4 et 6) donne le plus grand volume ? Justifier par le calcul pourquoi on ne peut pas conclure définitivement sans étude complète. (1 pt — chercher)

Rappel — Calcul littéral et identités remarquables

Developper : supprimer les parenthèses en distribuant la multiplication.

Identités remarquables :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Factoriser : mettre en évidence un facteur commun ou reconnaître une identité remarquable.

Ces formules apparaissent constamment dans l'étude des polynômes du second degré (passage en forme canonique, factorisation).

Exercice 49

Developper et reduire chaque expression.

1. $A = (x + 3)^2$

2. $B = (x - 5)^2$
3. $C = (2x + 1)^2$
4. $D = (x + 4)(x - 4)$

1SPE-SECDEG-FR-R1-EX1

On applique $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = x$ et $b = 3$.

On applique $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = x$ et $b = 5$.

On applique $(a + b)^2$ avec $a = 2x$ et $b = 1$: attention $(2x)^2 = 4x^2$.

On applique $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ avec $a = x$ et $b = 4$.

Corrigé

Question 1.

$$A = (x + 3)^2 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9.$$

Question 2.

$$B = (x - 5)^2 = x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 - 10x + 25.$$

Question 3.

$$C = (2x + 1)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 1 + 1^2 = 4x^2 + 4x + 1.$$

Question 4.

$$D = (x + 4)(x - 4) = x^2 - 4^2 = x^2 - 16.$$

1SPE-SECDEG-FR-R1-EX2

5 min

Exercice 50

Developper et reduire les expressions suivantes (double distributivite).

1. $E = (x + 2)(x + 7)$
2. $F = (3x - 1)(x + 4)$
3. $G = (x - 3)(2x + 5)$
4. $H = (x + 1)^2 - (x - 1)^2$

Corrigé

Question 1.

$$E = x^2 + 7x + 2x + 14 = x^2 + 9x + 14.$$

Question 2.

$$F = 3x \times x + 3x \times 4 + (-1) \times x + (-1) \times 4 = 3x^2 + 12x - x - 4 = 3x^2 + 11x - 4.$$

Question 3.

$$G = x \times 2x + x \times 5 + (-3) \times 2x + (-3) \times 5 = 2x^2 + 5x - 6x - 15 = 2x^2 - x - 15.$$

Question 4.

$$H = (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) = 4x.$$

$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$. Ici $a = x$, $b = 2$, $c = x$, $d = 7$.

On peut utiliser $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$ avec $a = x$, $b = 1$.

1SPE-SECDEG-FR-R1-EX3

6 min

Exercice 51

Factoriser les expressions suivantes.

1. $P = x^2 - 9$
2. $Q = x^2 + 8x + 16$
3. $R = x^2 - 4x + 4$
4. $S = 2x^2 + 6x$

Corrigé

Question 1.

$$P = x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3).$$

1SPE-SECDEG-FR-R1-EX3

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ avec $a = x$, $b = 3$.

On reconnait $(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ avec $2a = 8$, donc $a = 4$.

Question 2.

$$Q = x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2.$$

Question 3.

$$R = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2.$$

Question 4.

$$S = 2x^2 + 6x = 2x(x + 3).$$

On reconnaît
 $(x - a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$
 avec $2a = 4$, donc $a = 2$.
 Facteur commun $2x$ aux
 deux termes.

Exercice 52

En développant et en réduisant, montrer que les deux expressions suivantes sont égales.

- $2(x - 3)^2 + 5 = 2x^2 - 12x + 23$
- $(x + 1)^2 - (x + 1) - 2 = x^2 + x - 2$
- Factoriser $x^2 + x - 2$ (aide : chercher deux entiers de somme 1 et de produit -2).
- Deduire les solutions de $x^2 + x - 2 = 0$.

1SPE-SECDEG-FR-R1-EX4
 ⌚ 6 min

Corrigé

1SPE-SECDEG-FR-R1-EX4

Question 1.

$$2(x - 3)^2 + 5 = 2(x^2 - 6x + 9) + 5 = 2x^2 - 12x + 18 + 5 = 2x^2 - 12x + 23. \quad \checkmark$$

Question 2.

$$(x + 1)^2 - (x + 1) - 2 = x^2 + 2x + 1 - x - 1 - 2 = x^2 + x - 2. \quad \checkmark$$

Question 3. On cherche deux entiers p et q tels que $p + q = 1$ et $p \times q = -2$: on trouve $p = -1$ et $q = 2$... ou $p = 2$ et $q = -1$. Donc :

$$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2).$$

Question 4. $x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -2$.

L'ensemble des solutions est $\{-2; 1\}$.

Rappel — Equations du premier degre et produit nul

Equation du premier degre : $ax + b = 0$ (avec $a \neq 0$) a pour unique solution $x = -b/a$.

Regle du produit nul : pour tous reels A et B ,

$$A \times B = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0.$$

Cette regle est fondamentale pour resoudre les equations factorisees du second degre.

Exercice 53

Resoudre les equations du premier degre suivantes.

- $3x - 6 = 0$
- $2x + 8 = 0$
- $-x + 4 = 0$
- $5x - 15 = 0$

1SPE-SECDEG-FR-R2-EX1
 ⌚ 5 min

Corrigé

1SPE-SECDEG-FR-R2-EX1

Question 1. $3x - 6 = 0 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2$.

Question 2. $2x + 8 = 0 \Leftrightarrow 2x = -8 \Leftrightarrow x = -4$.

On isole x : $ax = -b$,
 donc $x = -b/a$.

Question 3. $-x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 4$.

Question 4. $5x - 15 = 0 \Leftrightarrow 5x = 15 \Leftrightarrow x = 3$.

1SPE-SECDEG-FR-R2-EX2
⌚ 5 min

Exercice 54 ◆

Resoudre les equations suivantes en appliquant la regle du produit nul.

1. $(x - 3)(x + 5) = 0$
2. $2x(x - 7) = 0$
3. $(3x - 1)(x + 2) = 0$
4. $(x - 4)^2 = 0$

1SPE-SECDEG-FR-R2-EX2

$AB = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$. On resout chaque facteur separement.

Corrigé

Question 1.

$$(x - 3)(x + 5) = 0 \Leftrightarrow x - 3 = 0 \text{ ou } x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = 3 \text{ ou } x = -5.$$

Question 2.

$$2x(x - 7) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 7.$$

Question 3.

$$(3x - 1)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow 3x - 1 = 0 \text{ ou } x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \text{ ou } x = -2.$$

Question 4.

$$(x - 4)^2 = 0 \Leftrightarrow x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 4 \quad (\text{racine double}).$$

Un carre est nul ssi sa base est nulle : $(x - 4)^2 = 0 \Leftrightarrow x - 4 = 0$.

1SPE-SECDEG-FR-R2-EX3
⌚ 6 min

Exercice 55 ◆

Resoudre les equations en se ramenant a un produit nul.

1. $x^2 - 9 = 0$
2. $x^2 - 5x = 0$
3. $x^2 - 5x + 6 = 0$ (aide : $(x - 2)(x - 3)$)
4. $2x^2 - 8 = 0$

1SPE-SECDEG-FR-R2-EX3

Corrigé

Question 1. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 3 \text{ ou } x = -3$.

Question 2. $x^2 - 5x = x(x - 5) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 5$.

Question 3. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = 3$.

Question 4. $2x^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2$.

(Ou : $2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x - 2)(x + 2) = 0$.)

1SPE-SECDEG-FR-R2-EX4
⌚ 6 min

Exercice 56 ◆

Pour chacune des situations, ecrire une equation, puis la resoudre.

1. Le double d'un nombre augmente de 3 est egal a 11. Trouver ce nombre.
2. La surface d'un carre de cote x est 25. Trouver x (avec $x > 0$).
3. Le produit de deux entiers consecutifs n et $n + 1$ est nul. Quelles sont les valeurs de n ?
4. On cherche $x > 0$ tel que $(x - 1)(x + 3) = 5$. Montrer que cela revient a $x^2 + 2x - 8 = 0$, puis resoudre.

Corrigé

Question 1. Equation : $2x + 3 = 11 \Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow x = 4$.

Question 2. $x^2 = 25 \Leftrightarrow x = 5$ (car $x > 0$).

Question 3. $n(n+1) = 0 \Leftrightarrow n = 0$ ou $n+1 = 0 \Leftrightarrow n = 0$ ou $n = -1$.

Question 4. On développe : $(x-1)(x+3) = x^2 + 2x - 3$. L'équation donne $x^2 + 2x - 3 = 5$, soit $x^2 + 2x - 8 = 0$.

On cherche p, q tels que $p + q = 2$ et $pq = -8$: $p = -2, q = 4$... non ($pq = -8$ et $p + q = 2$) : $p = 4, q = -2$ convient. Donc $(x+4)(x-2) = 0$, d'où $x = -4$ ou $x = 2$.

Comme $x > 0$, la solution est $x = 2$.

Rappel — Fonctions : image, antécédent, courbe représentative

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

- **Image** : $f(a)$ est l'image de a par f . Calculer $f(a)$ revient à substituer $x = a$ dans la formule.
- **Antécédent** : a est un antécédent de b par f si $f(a) = b$ (on résout l'équation $f(x) = b$).
- **Courbe** : le graphe de f est l'ensemble des points $(x; f(x))$. Un point $A(x_0; y_0)$ appartient à la courbe si et seulement si $y_0 = f(x_0)$.

Exercice 57

1SPE-SECDEG-FR-R3-EX1
⌚ 5 min

Soit $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

1. Calculer $f(0), f(1), f(2), f(-1)$.
2. Vérifier que le point $A(3; 2)$ appartient à la courbe de f .
3. Le point $B(0; 3)$ appartient-il à la courbe de f ?

Corrigé

1SPE-SECDEG-FR-R3-EX1

Question 1.

$$f(0) = 0 - 0 + 2 = 2, \quad f(1) = 1 - 3 + 2 = 0, \quad f(2) = 4 - 6 + 2 = 0, \quad f(-1) = 1 + 3 + 2 = 6.$$

Question 2. $f(3) = 9 - 9 + 2 = 2$. Donc $A(3; 2)$ appartient bien à la courbe. ✓

Question 3. $f(0) = 2 \neq 3$. Donc $B(0; 3)$ n'appartient pas à la courbe.

Pour calculer une image, on substitue la valeur dans la formule de f .

$A(3; 2)$ est sur la courbe si $f(3) = 2$.

Exercice 58

1SPE-SECDEG-FR-R3-EX2
⌚ 5 min

Soit $g(x) = 2x^2 - x - 3$.

1. Calculer $g(-1), g(0), g(1)$ et $g(2)$.
2. Résoudre $g(x) = 0$ (aide : trouver les racines par inspection ou discriminant).
3. Résoudre $g(x) = -3$.

Corrigé

1SPE-SECDEG-FR-R3-EX2

Question 1.

$$g(-1) = 2 + 1 - 3 = 0, \quad g(0) = -3, \quad g(1) = 2 - 1 - 3 = -2, \quad g(2) = 8 - 2 - 3 = 3.$$

Question 2. $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 1 + 24 = 25 > 0$.

$$x_1 = \frac{1-5}{4} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{1+5}{4} = \frac{3}{2}.$$

$g(-1) = 0$: -1 est une racine. On effectue la division ou on utilise Δ .

Question 3. $g(x) = -3 \Leftrightarrow 2x^2 - x - 3 = -3 \Leftrightarrow 2x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(2x - 1) = 0$.

Donc $x = 0$ ou $x = \frac{1}{2}$.

1SPE-SECDEG-FR-R3-EX3
⌚ 6 min

Exercice 59 ◆

Soit $h(x) = x^2 - 4$.

1. Dresser un tableau de valeurs pour $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.
2. Déterminer les antécédents de 0 par h .
3. Déterminer les antécédents de 5 par h .
4. La courbe de h passe-t-elle par $C(1; -3)$?

1SPE-SECDEG-FR-R3-EX3

Corrigé

Question 1.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$h(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

Question 2. $h(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2$ ou $x = 2$. Les antécédents de 0 sont -2 et 2.

Question 3. $h(x) = 5 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = -3$ ou $x = 3$. Les antécédents de 5 sont -3 et 3.

Question 4. $h(1) = 1 - 4 = -3$. Oui, $C(1; -3)$ est sur la courbe. ✓

1SPE-SECDEG-FR-R3-EX4
⌚ 6 min

Exercice 60 ◆

Soit $p(x) = -x^2 + 6x - 5$.

1. Calculer $p(0), p(1), p(3), p(5)$.
2. Trouver les antécédents de 0 (on se contentera de vérifier $p(1)$ et $p(5)$).
3. Sur quel intervalle la courbe de p est-elle au-dessus de l'axe des abscisses (i.e. $p(x) > 0$)? *Indication : utiliser les valeurs calculées.*

1SPE-SECDEG-FR-R3-EX4

Corrigé

Question 1.

$$p(0) = -5, \quad p(1) = -1 + 6 - 5 = 0, \quad p(3) = -9 + 18 - 5 = 4, \quad p(5) = -25 + 30 - 5 = 0.$$

Question 2. $p(1) = 0$ et $p(5) = 0$: les antécédents de 0 sont 1 et 5.

Question 3. Comme $a = -1 < 0$, la parabole est en $\cap$: $p(x) > 0$ entre les deux racines, soit pour $x \in]1; 5[$. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses sur $]1; 5[$.

Rappel — Fonctions de référence

Fonction carre : $f(x) = x^2$, définie sur $\mathbb{R}$.

- ▶ Décroissante sur $] -\infty; 0]$, croissante sur $[0; +\infty[$.
- ▶ Minimum en $x = 0$: $f(0) = 0$.
- ▶ Parabole symétrique par rapport à l'axe Oy .

Translations : la courbe de $f(x - \alpha) + \beta$ est obtenue en translatant celle de f de vecteur $(\alpha; \beta)$.

Donc $y = (x - \alpha)^2 + \beta$ est une parabole de sommet $(\alpha; \beta)$.

1SPE-SECDEG-FR-R4-EX1
⌚ 5 min

Exercice 61 ◆

Pour $f(x) = x^2$:

1. Compléter le tableau : $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, calculer $f(x)$.
2. Vérifier que $f(-x) = f(x)$ pour tout x (symétrie).
3. Montrer que f est décroissante sur $] -\infty ; 0]$ en calculant $f(a) - f(b)$ pour $a < b \leq 0$.
4. Tracer l'allure de la courbe (parabole en U de sommet O).

Corrigé

1SPE-SECDEG-FR-R4-EX1

Question 1.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2	9	4	1	0	1	4	9

Question 2. $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: la courbe est symétrique par rapport à l'axe Oy .

Question 3. Soient $a < b \leq 0$. Alors :

$$f(b) - f(a) = b^2 - a^2 = (b - a)(b + a).$$

On a $b - a > 0$ (car $b > a$) et $b + a \leq 0$ (car $a < b \leq 0$, donc $a + b < 0$). Donc $(b - a)(b + a) \leq 0$, i.e. $f(b) \leq f(a)$: f est décroissante sur $] -\infty ; 0]$.

Question 4. (Trace libre — parabole en U, sommet $O(0; 0)$, passant par $(\pm 1; 1)$, $(\pm 2; 4)$.)

Exercice 62

1SPE-SECDEG-FR-R4-EX2
⌚ 5 min

Decrire les transformations et identifier le sommet des courbes suivantes.

1. $g(x) = x^2 + 3$
2. $h(x) = (x - 2)^2$
3. $k(x) = (x + 1)^2 - 4$
4. $m(x) = -(x - 3)^2 + 5$

Corrigé

1SPE-SECDEG-FR-R4-EX2

Question 1. $g(x) = x^2 + 3$: translation verticale de +3; sommet $S(0; 3)$.

Question 2. $h(x) = (x - 2)^2$: translation horizontale de +2; sommet $S(2; 0)$.

Question 3. $k(x) = (x + 1)^2 - 4 = (x - (-1))^2 + (-4)$; sommet $S(-1; -4)$.

Question 4. $m(x) = -(x - 3)^2 + 5$: $a = -1 < 0$ (parabole en $\cap$); sommet $S(3; 5)$ (maximum).

La forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$ donne directement le sommet $(\alpha; \beta)$.

Exercice 63

1SPE-SECDEG-FR-R4-EX3
⌚ 6 min

Passer de la forme développée à la forme canonique.

1. $f(x) = x^2 - 4x + 7$. Calculer $\alpha = -b/(2a)$, puis $\beta = f(\alpha)$.
2. $g(x) = x^2 + 6x + 11$. Même méthode.
3. $h(x) = 2x^2 - 12x + 20$. Factoriser d'abord par $a = 2$.

Corrigé

1SPE-SECDEG-FR-R4-EX3

Question 1. $a = 1, b = -4, c = 7$. $\alpha = -(-4)/(2 \times 1) = 2$. $\beta = f(2) = 4 - 8 + 7 = 3$. Forme canonique : $f(x) = (x - 2)^2 + 3$.

Question 2. $a = 1, b = 6, c = 11$. $\alpha = -6/2 = -3$. $\beta = g(-3) = 9 - 18 + 11 = 2$. Forme canonique : $g(x) = (x + 3)^2 + 2$.

Question 3. $h(x) = 2(x^2 - 6x + 10)$. Dans $x^2 - 6x + 10$: $\alpha = 3, \beta = 9 - 18 + 20 = 11$... Retour : $\alpha = -(-6)/(2 \times 1) = 3, f_{\text{int}}(3) = 9 - 18 + 10 = 1$, donc $x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1$. Ainsi : $h(x) = 2[(x - 3)^2 + 1] = 2(x - 3)^2 + 2$.

On factorise par $a = 2$ avant de compléter le carré.

1SPE-SECDEG-FR-R4-EX4

6 min

Exercice 64

Utiliser la forme canonique pour répondre aux questions suivantes.

1. Montrer que $f(x) = x^2 - 6x + 10 \geq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Trouver la valeur de x qui minimise $g(x) = (x - 1)^2 + 4$, et préciser la valeur minimale.
3. Montrer que $h(x) = -3(x + 2)^2 + 1 \leq 1$ pour tout x , et préciser quand l'égalité a lieu.

1SPE-SECDEG-FR-R4-EX4

Corrigé

Question 1. $f(x) = x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1$. Comme $(x - 3)^2 \geq 0$, on a $f(x) \geq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. L'égalité a lieu pour $x = 3 : f(3) = 1$.

Question 2. $g(x) = (x - 1)^2 + 4 \geq 4$ pour tout x (car $(x - 1)^2 \geq 0$). Le minimum est $g(1) = 4$, atteint en $x = 1$.

Question 3. $h(x) = -3(x + 2)^2 + 1$. Comme $(x + 2)^2 \geq 0$, on a $-3(x + 2)^2 \leq 0$, donc $h(x) \leq 1$ pour tout x . L'égalité $h(x) = 1$ a lieu quand $(x + 2)^2 = 0$, c'est-à-dire pour $x = -2$.

Rappel — Inegalites et tableau de signes

Regles de calcul sur les inegalites :

- ▶ On peut additionner/soustraire le meme reel des deux membres sans changer le sens.
- ▶ On peut multiplier/diviser par un reel **strictement positif** sans changer le sens.
- ▶ On **inverse le sens** si on multiplie/divise par un reel **strictement negatif**.

Tableau de signes d'un produit : le signe du produit $A \times B$ se determine colonne par colonne.

	$A < 0$	$A = 0$	$A > 0$
$B > 0$	−	0	+
$B = 0$	0	0	0
$B < 0$	+	0	−

1SPE-SECDEG-FR-R5-EX1

5 min

Exercice 65

Resoudre les inegalites du premier degre suivantes.

1. $3x - 6 > 0$
2. $-2x + 4 \geq 0$
3. $5x + 10 \leq 0$
4. $-x + 3 > 1$

1SPE-SECDEG-FR-R5-EX1

Corrigé

Question 1. $3x > 6 \Leftrightarrow x > 2$. Solution : $x \in]2; +\infty[$.

Question 2. $-2x \geq -4 \Leftrightarrow x \leq 2$ (on divise par -2 , on inverse). Solution : $x \in]-\infty; 2]$.

Question 3. $5x \leq -10 \Leftrightarrow x \leq -2$. Solution : $x \in]-\infty; -2]$.

Question 4. $-x > 1 - 3 = -2 \Leftrightarrow x < 2$ (on divise par -1 , on inverse). Solution : $x \in]-\infty; 2[$.

1SPE-SECDEG-FR-R5-EX2

5 min

Exercice 66

Dresser le tableau de signes de chaque expression et determiner l'ensemble de solutions.

1. $(x - 2)(x + 3) \geq 0$
2. $(x + 1)(x - 4) < 0$
3. $-3(x - 1)(x + 2) \leq 0$

On isole x en appliquant les memes operations aux deux membres.
Diviser par -2 : sens inverse !

Corrigé

Question 1. Racines : $x = -3$ et $x = 2$.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$		
$x - 2$		$-$	$-$	0	$+$	
$x + 3$		$-$	0	$+$	$+$	
$(x - 2)(x + 3)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Solution de ≥ 0 : $x \in] - \infty ; -3] \cup [2 ; +\infty[$.

Question 2. Racines : $x = -1$ et $x = 4$. Le produit est négatif strictement entre les racines.

Solution de < 0 : $x \in] -1 ; 4[$.

Question 3. Racines de $(x - 1)(x + 2)$: $x = -2$ et $x = 1$. Le facteur $-3 < 0$ inverse le signe.

$(x - 1)(x + 2) \geq 0$ sur $] - \infty ; -2] \cup [1 ; +\infty[$, donc $-3(x - 1)(x + 2) \leq 0$ sur le même ensemble.

Solution : $x \in] - \infty ; -2] \cup [1 ; +\infty[$.

Tableau de signes : on étudie le signe de chaque facteur puis on compose.

Exercice 67

Étudier le signe des expressions suivantes à l'aide d'un tableau.

- $A(x) = (2x - 4)(x + 1)$
- $B(x) = \frac{x - 3}{x + 2}$ (avec $x \neq -2$)
- $C(x) = (x^2 - 1)(x - 2)$ (aide : factoriser $x^2 - 1$)

1SPE-SECDEG-FR-R5-EX3
⌚ 6 min

Corrigé

Question 1. Racines : $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$; $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
$2x - 4$		$-$	$-$	0	$+$	
$x + 1$		$-$	0	$+$	$+$	
$A(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Question 2. Changement de signe en $x = 3$ (numérateur) et $x = -2$ (dénominateur, exclu).

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$		
$x-3$		-	-	0	+	
$x+2$		-		+	+	+
$B(x)$		+		-	0	+

Question 3. $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, donc $C(x) = (x + 1)(x - 1)(x - 2)$. Racines : $-1, 1, 2$.

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$	
$x+1$		$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x-1$		$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x-2$		$-$	$-$	$-$	0	$+$
$C(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$

Exercice 68

Résoudre les inéquations suivantes.

- $(x - 1)(x + 5) \leq 0$
- $x^2 - 4 > 0$
- $x^2 - 3x \geq 0$
- $(x - 2)^2 > 0$

1SPE-SECDEG-FR-R5-EX4
⌚ 6 min

1SPE-SECDEG-FR-R5-EX4

Corrigé

Question 1. Racines de $(x-1)(x+5)$: $x = -5$ et $x = 1$. Le produit est négatif entre les racines. Solution : $x \in [-5; 1]$.

Question 2. $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) > 0$: le produit est positif à l'extérieur des racines. Solution : $x \in]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$.

Question 3. $x^2 - 3x = x(x-3) \geq 0$: racines 0 et 3. Le produit est positif à l'extérieur. Solution : $x \in]-\infty; 0] \cup [3; +\infty[$.

Question 4. $(x-2)^2 > 0$ est vrai pour tout $x \neq 2$ (le carré est toujours ≥ 0 , et nul seulement en $x = 2$). Solution : $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$.

$(x-2)^2 \geq 0$ pour tout x , avec égalité uniquement en $x = 2$.

1SPE-SECDEG-RE-C1-EX1

8 min

Exercice 69

Soit $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$.

1. Identifier a, b, c .
2. Calculer $\alpha = -b/(2a)$ et $\beta = f(\alpha)$.
3. Écrire la forme canonique de f .
4. Développer pour vérifier que la forme canonique est bien équivalente à la forme développée.

1SPE-SECDEG-RE-C1-EX1

Corrigé

Question 1. On a $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$, donc $a = 3, b = -12, c = 9$.

Question 2.

$$\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-12)}{2 \times 3} = \frac{12}{6} = 2.$$

$$\beta = f(2) = 3 \times 4 - 12 \times 2 + 9 = 12 - 24 + 9 = -3.$$

Question 3.

$$f(x) = 3(x-2)^2 - 3.$$

Question 4. Vérification :

$$3(x-2)^2 - 3 = 3(x^2 - 4x + 4) - 3 = 3x^2 - 12x + 12 - 3 = 3x^2 - 12x + 9. \quad \checkmark$$

1SPE-SECDEG-RE-C1-EX2

8 min

Exercice 70

Soit $g(x) = -2x^2 + 8x - 5$.

1. Donner la forme canonique de g .
2. Écrire sous forme développée l'expression $-2(x-2)^2 + 3$, et vérifier que c'est bien $g(x)$.
3. La parabole représentée par g est-elle en U ou en $\cap$? Justifier.

Coup de pouce 1. Pour calculer α avec $a = -2$: $\alpha = -b/(2a) = -8/(2 \times (-2)) = -8/(-4) = 2$. Attention au signe de a .

1SPE-SECDEG-RE-C1-EX2

Corrigé

Question 1. $a = -2, b = 8, c = -5$.

$$\alpha = \frac{-b}{2 \times (-2)} = \frac{-8}{-4} = 2. \quad \beta = g(2) = -8 + 16 - 5 = 3.$$

Forme canonique : $g(x) = -2(x-2)^2 + 3$.

Question 2.

$$-2(x-2)^2 + 3 = -2(x^2 - 4x + 4) + 3 = -2x^2 + 8x - 8 + 3 = -2x^2 + 8x - 5. \quad \checkmark$$

Signe de a : $a < 0$ donne une parabole en $\cap$ (maximum).

Question 3. Comme $a = -2 < 0$, la parabole est en $\cap$ (ouverte vers le bas). Le sommet $S(2; 3)$ est un maximum.

Exercice 711SPE-SECDEG-RE-C1-EX3
⌚ 10 min

Parmi les expressions suivantes, identifier celles qui sont des polynômes du second degré. Pour chacun, donner les coefficients a, b, c , puis la forme canonique.

1. $f(x) = (x + 3)(x - 1)$
2. $g(x) = x^2 - x + \frac{1}{4}$
3. $h(x) = (x + 2)^2 - (x - 1)^2$
4. $k(x) = x^3 - 4x^2$

Corrigé

1SPE-SECDEG-RE-C1-EX3

Question 1. $f(x) = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 2x - 3$: polynôme du second degré, $a = 1, b = 2, c = -3$.
 $\alpha = -2/(2) = -1, \beta = f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$. Forme canonique : $f(x) = (x + 1)^2 - 4$.

Question 2. $g(x) = x^2 - x + \frac{1}{4}$: polynôme du second degré, $a = 1, b = -1, c = \frac{1}{4}$. $\alpha = \frac{1}{2}$,
 $\beta = g(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0$. Forme canonique : $g(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$.

Question 3. $h(x) = (x + 2)^2 - (x - 1)^2 = (x^2 + 4x + 4) - (x^2 - 2x + 1) = 6x + 3$. C'est un polynôme du **premier degré** ($a = 0$) : pas un second degré.

Question 4. $k(x) = x^3 - 4x^2$ est un polynôme de **degré 3** : pas un second degré.

Developper pour verifier le degre :
 $(x + 2)^2 - (x - 1)^2$ peut se simplifier.

Exercice 721SPE-SECDEG-RE-C2-EX1
⌚ 8 min

Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$.

1. Calculer les coordonnées du sommet $S(\alpha; \beta)$.
2. Ecrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.
3. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. Préciser si f admet un minimum ou un maximum, et donner sa valeur.

Corrigé

1SPE-SECDEG-RE-C2-EX1

Question 1. $a = 2, b = -8$.

$$\alpha = \frac{-(-8)}{2 \times 2} = \frac{8}{4} = 2. \quad \beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 6 = 8 - 16 + 6 = -2.$$

Sommet : $S(2; -2)$.

Question 2. L'axe de symétrie est la droite d'équation $x = \alpha = 2$.

Question 3. Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow -2 \nearrow$	$+\infty$

Question 4. Comme $a = 2 > 0$, f admet un **minimum** en $x = 2$. Ce minimum vaut $f(2) = -2$.

Exercice 731SPE-SECDEG-RE-C2-EX2
⌚ 8 min

Soit $g(x) = -x^2 + 4x - 3$.

1. Montrer que la forme canonique est $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$.
2. En déduire les coordonnées du sommet.
3. Dresser le tableau de variations de g .

4. Sur quel intervalle g est-elle positive ? (Repondre par observation du tableau et des racines $x = 1$ et $x = 3$.)

Coup de pouce 1. Pour la forme canonique avec $a = -1$: $\alpha = -4/(2 \times (-1)) = 2$ et $\beta = g(2) = -4 + 8 - 3 = 1$.

1SPE-SECDEG-RE-C2-EX2

Corrigé

Question 1. $\alpha = 2$, $\beta = g(2) = -4 + 8 - 3 = 1$. On vérifie : $-(x-2)^2 + 1 = -(x^2 - 4x + 4) + 1 = -x^2 + 4x - 3 = g(x)$. ✓

Question 2. Sommet : $S(2; 1)$.

Question 3. Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	↗ 1 ↘	$-\infty$

Question 4. Les racines de g sont $x = 1$ et $x = 3$. Comme $a < 0$, $g(x) \geq 0$ entre les racines : sur $[1; 3]$.

1SPE-SECDEG-RE-C2-EX3

10 min

Exercice 74

Pour chacune des fonctions suivantes, donner le sommet, l'axe de symétrie, le tableau de variations, et préciser si la fonction admet un minimum ou un maximum.

- $p(x) = x^2 + 4x + 1$
- $q(x) = -3x^2 + 6x + 2$
- $r(x) = (x-1)^2 + 3$ (forme canonique directement lisible)

1SPE-SECDEG-RE-C2-EX3

Corrigé

Question 1. $p(x) = x^2 + 4x + 1$: $a = 1 > 0$. $\alpha = -4/2 = -2$, $\beta = p(-2) = 4 - 8 + 1 = -3$. Sommet $S(-2; -3)$, axe $x = -2$. Minimum -3 en $x = -2$.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$p(x)$	$+\infty$	↘ -3 ↗	$+\infty$

Question 2. $q(x) = -3x^2 + 6x + 2$: $a = -3 < 0$. $\alpha = -6/(2 \times (-3)) = 1$, $\beta = q(1) = -3 + 6 + 2 = 5$. Sommet $S(1; 5)$, axe $x = 1$. Maximum 5 en $x = 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$q(x)$	$-\infty$	↗ 5 ↘	$-\infty$

Forme canonique directement : sommet = $(\alpha; \beta)$ du terme $(x - \alpha)^2 + \beta$.

1SPE-SECDEG-RE-C3-EX1

8 min

Question 3. $r(x) = (x-1)^2 + 3$: $a = 1 > 0$, sommet $S(1; 3)$, axe $x = 1$. Minimum 3 en $x = 1$.

Exercice 75

Resoudre l'équation $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

- Identifier a, b, c .
- Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
- Déterminer le nombre de solutions et les calculer si elles existent.
- Vérifier en substituant les solutions dans l'équation.

Corrigé

Question 1. $a = 2$, $b = -7$, $c = 3$.

Question 2.

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 49 - 24 = 25.$$

1SPE-SECDEG-RE-C3-EX1

Identifier a, b, c dans $ax^2 + bx + c$.
Formule : $\Delta = b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3$.

Question 3. $\Delta = 25 > 0$, donc deux racines :

$$x_1 = \frac{7-5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{7+5}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

$\Delta = 25 > 0$: deux racines réelles distinctes.
 $\sqrt{25} = 5$.

Question 4. Vérification :

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{4} - 7 \times \frac{1}{2} + 3 = \frac{1}{2} - \frac{7}{2} + 3 = -3 + 3 = 0. \checkmark$$

$$f(3) = 2 \times 9 - 7 \times 3 + 3 = 18 - 21 + 3 = 0. \checkmark$$

Exercice 76

Pour chacune des équations suivantes, calculer Δ et résoudre.

1. $x^2 - 6x + 9 = 0$
2. $x^2 + x + 1 = 0$
3. $3x^2 - 5x - 2 = 0$

1SPE-SECDEG-RE-C3-EX2
 ⌚ 8 min

Coup de pouce 1. Pour l'équation (1) : $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0$. Qu'est-ce que $\Delta = 0$ implique pour le nombre de solutions ?

Corrigé

1SPE-SECDEG-RE-C3-EX2

Question 1. $a = 1, b = -6, c = 9$. $\Delta = 36 - 36 = 0$. Racine double : $x_0 = \frac{6}{2} = 3$. L'ensemble des solutions est $\{3\}$.

Question 2. $a = 1, b = 1, c = 1$. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Aucune racine réelle. L'ensemble des solutions est $\emptyset$.

Question 3. $a = 3, b = -5, c = -2$. $\Delta = 25 + 24 = 49 > 0$. $\sqrt{49} = 7$.

$$x_1 = \frac{5-7}{6} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}, \quad x_2 = \frac{5+7}{6} = \frac{12}{6} = 2.$$

Trois cas : $\Delta > 0$ (deux racines), $\Delta = 0$ (une racine double), $\Delta < 0$ (pas de racine réelle).

Exercice 77

1. Résoudre $x^2 - 5x + 4 = 0$.
2. Résoudre $2x^2 + 4x + 2 = 0$.
3. Déterminer les valeurs de k pour lesquelles $x^2 - 4x + k = 0$ admet deux racines distinctes.
4. Application : un rectangle a un périmètre de 14 cm. Si on note x la longueur, l'équation de l'aire $A = 21$ s'écrit $x(7-x) = 21$. Montrer que cela conduit à $x^2 - 7x + 21 = 0$ et conclure sur l'existence de solutions.

1SPE-SECDEG-RE-C3-EX3
 ⌚ 10 min

Corrigé

1SPE-SECDEG-RE-C3-EX3

Question 1. $\Delta = 25 - 16 = 9 > 0$. $x_1 = (5-3)/2 = 1$, $x_2 = (5+3)/2 = 4$.

Question 2. $2x^2 + 4x + 2 = 2(x^2 + 2x + 1) = 2(x+1)^2$. On peut aussi calculer $\Delta = 16 - 16 = 0$, racine double $x_0 = -4/4 = -1$.

Question 3. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times k = 16 - 4k$. Deux racines distinctes $\Leftrightarrow \Delta > 0 \Leftrightarrow 16 - 4k > 0 \Leftrightarrow k < 4$.

Question 4. $x(7-x) = 21 \Leftrightarrow 7x - x^2 = 21 \Leftrightarrow x^2 - 7x + 21 = 0$. $\Delta = 49 - 84 = -35 < 0$: pas de solution réelle. Un tel rectangle n'existe pas.

Exercice 78

Soit $f(x) = 2x^2 - 2x - 12$.

1. Calculer Δ et les racines x_1, x_2 .

1SPE-SECDEG-RE-C4-EX1
 ⌚ 8 min

2. Ecrire la forme factorisée $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.
3. Dresser le tableau de signes de f .
4. Résoudre $f(x) \leq 0$.

1SPE-SECDEG-RE-C4-EX1

Corrigé

Question 1. $a = 2, b = -2, c = -12$.

$$\Delta = 4 + 96 = 100. \quad \sqrt{\Delta} = 10.$$

$$x_1 = \frac{2 - 10}{4} = -2, \quad x_2 = \frac{2 + 10}{4} = 3.$$

Forme factorisée : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$. Ne pas oublier $a = 2$.

Question 2.

$$f(x) = 2(x - (-2))(x - 3) = 2(x + 2)(x - 3).$$

Vérification : $2(x + 2)(x - 3) = 2(x^2 - x - 6) = 2x^2 - 2x - 12$. ✓

Question 3. Tableau de signes :

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$x + 2$		-	0	+
$x - 3$		-	-	0
2		+	+	+
$f(x)$		+	0	-

Question 4. $f(x) \leq 0$ sur $[-2; 3]$.

1SPE-SECDEG-RE-C4-EX2
⌚ 8 min

Exercice 79 ♦

Soit $g(x) = x^2 + 2x + 5$.

1. Calculer Δ .
2. Que conclure sur le signe de $g(x)$?
3. Résoudre $g(x) > 0$.
4. Justifier que $g(x) + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Coup de pouce 1. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ et $a = 1 > 0$. Rappel : si $\Delta < 0$ et $a > 0$, le trinôme est du même signe que a partout.

1SPE-SECDEG-RE-C4-EX2

Corrigé

Question 1. $a = 1, b = 2, c = 5. \Delta = 4 - 20 = -16 < 0$.

Question 2. Comme $\Delta < 0$ et $a = 1 > 0$, le trinôme $g(x)$ est strictement positif pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Question 3. $g(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc l'ensemble solution est $\mathbb{R}$.

Question 4. Comme $g(x) > 0$ pour tout x , on a $g(x) + 1 > 0 + 1 = 1 > 0$ pour tout x .

1SPE-SECDEG-RE-C4-EX3
⌚ 10 min

Exercice 80 ♦

1. Factoriser $h(x) = x^2 - 7x + 10$ et dresser son tableau de signes.
2. Résoudre $h(x) \geq 0$ et $h(x) < 0$.
3. Factoriser $k(x) = -2x^2 + 6x - 4$ et dresser son tableau de signes.
4. Résoudre $k(x) \geq 0$.

1SPE-SECDEG-RE-C4-EX3

Corrigé

Question 1. $\Delta = 49 - 40 = 9. x_1 = (7 - 3)/2 = 2, x_2 = (7 + 3)/2 = 5. h(x) = (x - 2)(x - 5)$.

x	$-\infty$	2	5	$+\infty$
$x-2$	-	0	+	+
$x-5$	-	-	0	+
$h(x)$	+	0	-	0

Question 2. $h(x) \geq 0$ sur $] -\infty ; 2] \cup [5 ; +\infty[$. $h(x) < 0$ sur $]2 ; 5[$.

Question 3. $k(x) = -2x^2 + 6x - 4$: $a = -2$, $\Delta = 36 - 32 = 4$. $x_1 = (6-2)/(2 \times 2) = 1$, $x_2 = (6+2)/4 = 2$.
 $k(x) = -2(x-1)(x-2)$.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
-2	-	-	-	-
$x-1$	-	0	+	+
$x-2$	-	-	0	+
$k(x)$	-	0	+	0

Question 4. $k(x) \geq 0$ sur $[1 ; 2]$.

Exercice 81

Resoudre $x^2 - 5x + 6 \leq 0$.

1. Identifier a et calculer Δ .
2. Trouver les racines x_1 et x_2 .
3. Dresser le tableau de signes de $f(x) = x^2 - 5x + 6$.
4. Lire la solution de $f(x) \leq 0$ dans le tableau.

Corrigé

Question 1. $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$.

Question 2. $\sqrt{\Delta} = 1$.

$$x_1 = \frac{5-1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

Question 3. Tableau de signes :

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$
$x-2$	-	0	+	+
$x-3$	-	-	0	+
$f(x)$	+	0	-	0

Question 4. $f(x) \leq 0$ sur $[2 ; 3]$.

Exercice 82

Resoudre les inequations suivantes.

1. $-x^2 + 3x - 2 \geq 0$
2. $x^2 + 4x + 4 > 0$
3. $x^2 + 1 \leq 0$

Coup de pouce 1. Pour (1), les racines de $-x^2 + 3x - 2 = 0$ sont $x = 1$ et $x = 2$. Comme $a = -1 < 0$, le trinome est positif entre les racines.

Corrigé

Question 1. $f(x) = -x^2 + 3x - 2$, $a = -1$. $\Delta = 9 - 8 = 1$. Racines : $x_1 = 1$, $x_2 = 2$.

Comme $a < 0$: le trinome est positif entre les racines. Solution : $x \in [1 ; 2]$.

Question 2. $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$. Ce carre est nul en $x = -2$ et strictement positif partout ailleurs.

Donc $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \neq -2$. Solution : $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\} =]-\infty ; -2[\cup]-2 ; +\infty[$.

1SPE-SECDEG-RE-C5-EX1
⌚ 8 min

1SPE-SECDEG-RE-C5-EX1

$a = 1 > 0$: le trinome est positif a l'exterieur des racines et negatif entre elles.

La solution de $f(x) \leq 0$ correspond aux colonnes ou $f(x) \leq 0$ dans le tableau.

1SPE-SECDEG-RE-C5-EX2
⌚ 8 min

1SPE-SECDEG-RE-C5-EX2

$f(x) = (x+2)^2 \geq 0$, egalite seulement en $x = -2$.

$\Delta = -4 < 0$ et $a = 1 > 0$: le trinôme est toujours positif, jamais ≤ 0 .

Question 3. $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout x (somme d'un carré et de 1). L'inéquation $x^2 + 1 \leq 0$ n'a aucune solution.

1SPE-SECDEG-RE-C5-EX3
10 min

Exercice 83

1. Résoudre $2x^2 - x - 3 > 0$ (aide : racines $x = -1$ et $x = \frac{3}{2}$).
2. Résoudre $3x^2 - 12 \leq 0$.
3. Un commerçant réalise un bénéfice $B(p) = -p^2 + 10p - 16$ (en centaines d'euros) en fonction de son prix p (en euros). Pour quelles valeurs de p le bénéfice est-il positif? (Racines de B : $p = 2$ et $p = 8$.)

1SPE-SECDEG-RE-C5-EX3

Corrigé

Question 1. $f(x) = 2x^2 - x - 3$, $a = 2 > 0$. Racines $x_1 = -1$ et $x_2 = \frac{3}{2}$.

Comme $a > 0$: $f(x) > 0$ à l'extérieur des racines. Solution : $x \in]-\infty; -1[\cup]\frac{3}{2}; +\infty[$.

Question 2. $3x^2 - 12 \leq 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 4) \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 \leq 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x + 2) \leq 0$.

Racines : $x = -2$ et $x = 2$. Avec $a = 1 > 0$: Solution $x \in [-2; 2]$.

Question 3. $B(p) = -p^2 + 10p - 16$, $a = -1 < 0$. Racines $p = 2$ et $p = 8$.

Comme $a < 0$: $B(p) \geq 0$ entre les racines. Le bénéfice est positif pour $p \in [2; 8]$.

1SPE-SECDEG-RE-C6-EX1
8 min

Exercice 84

Un agriculteur dispose de 60 m de clôture pour fermer un enclos rectangulaire (un côté est un mur, il n'a donc besoin de clôture que pour 3 côtés). On note x la longueur des côtés perpendiculaires au mur.

1. Exprimer la longueur du côté parallèle au mur en fonction de x .
2. Exprimer l'aire $A(x)$ en fonction de x .
3. Déterminer la valeur de x qui maximise $A(x)$.
4. Calculer l'aire maximale.

1SPE-SECDEG-RE-C6-EX1

Corrigé

Question 1. Le côté parallèle au mur mesure $60 - 2x$ mètres.

Question 2. $A(x) = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$.

Question 3. $a = -2$, $b = 60$. Abscisse du sommet :

$$\alpha = \frac{-60}{2 \times (-2)} = \frac{-60}{-4} = 15.$$

L'aire est maximale pour $x = 15$ m.

Question 4.

$$A(15) = -2 \times 225 + 60 \times 15 = -450 + 900 = 450 \text{ m}^2.$$

1SPE-SECDEG-RE-C6-EX2
8 min

Exercice 85

Un projectile est lancé. Sa hauteur (en mètres) au bout de t secondes est $h(t) = -5t^2 + 30t + 2$.

1. Quelle est la hauteur initiale (à $t = 0$) ?
2. À quel instant le projectile atteint-il sa hauteur maximale ?
3. Quelle est cette hauteur maximale ?
4. À quel instant (approximativement) le projectile touche-t-il le sol ($h = 0$) ? Calculer Δ et donner les racines.

Coup de pouce 1. Pour trouver l'instant du maximum : $\alpha = -b/(2a) = -30/(2 \times (-5))$. Calculer soigneusement.

Corrigé

1SPE-SECDEG-RE-C6-EX2

Question 1. $h(0) = 2$ m. Le projectile est lancé depuis une hauteur de 2 m.

Question 2. $a = -5$, $b = 30$.

$$\alpha = \frac{-30}{2 \times (-5)} = \frac{-30}{-10} = 3 \text{ s.}$$

$a = -5 < 0$: maximum au sommet.

Question 3.

$$h(3) = -5 \times 9 + 30 \times 3 + 2 = -45 + 90 + 2 = 47 \text{ m.}$$

Question 4. $h(t) = 0$: $\Delta = 900 + 40 = 940 > 0$.

$$t = \frac{-30 \pm \sqrt{940}}{-10}.$$

$\sqrt{940} \approx 30,66$. La racine positive est $t \approx \frac{-30 - 30,66}{-10} \approx 6,07$ s.

Le projectile touche le sol après environ 6,1 secondes.

Exercice 86

1SPE-SECDEG-RE-C6-EX3
⌚ 10 min

Un artisan fabrique des objets et les vend p euros l'unité. Ses études montrent que la demande est $q(p) = 100 - 2p$ unités et son chiffre d'affaires est $CA(p) = p \times q(p)$.

1. Montrer que $CA(p) = -2p^2 + 100p$.
2. Pour quelles valeurs de p la demande est-elle positive ?
3. Déterminer le prix p^* qui maximise le chiffre d'affaires.
4. Calculer le chiffre d'affaires maximal.
5. Le coût de production est $C = 500$ euros. Pour quelles valeurs de p le bénéfice $B(p) = CA(p) - 500$ est-il positif ? (On calculera Δ de $CA(p) = 500$.)

Corrigé

1SPE-SECDEG-RE-C6-EX3

Question 1. $CA(p) = p(100 - 2p) = 100p - 2p^2 = -2p^2 + 100p$.

Question 2. $q(p) = 100 - 2p > 0 \Leftrightarrow p < 50$. La demande est positive pour $p \in]0 ; 50[$.

Question 3. $CA(p) = -2p^2 + 100p$, $a = -2 < 0$ (maximum).

$$p^* = \frac{-100}{2 \times (-2)} = \frac{-100}{-4} = 25 \text{ euros.}$$

Question 4. $CA(25) = -2 \times 625 + 100 \times 25 = -1250 + 2500 = 1250$ euros.

Question 5. $B(p) \geq 0 \Leftrightarrow -2p^2 + 100p - 500 \geq 0$. $\Delta = 10000 - 4000 = 6000$. $\sqrt{6000} = 10\sqrt{60} \approx 77,5$.

$$p_{1,2} = \frac{-100 \pm 77,5}{-4}.$$

$$p_1 \approx \frac{-100+77,5}{-4} \approx 5,6 \text{ et } p_2 \approx \frac{-100-77,5}{-4} \approx 44,4.$$

Comme $a = -2 < 0$, le bénéfice est positif entre les racines : $B(p) \geq 0$ pour $p \in [5,6 ; 44,4]$ environ.

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-001

1. Identification des coefficients.

Le trinôme $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec :

$$a = 2, \quad b = -3, \quad c = -5.$$

Lire a, b, c dans $ax^2 + bx + c$.

2. Coordonnées du sommet.

Formule du sommet : $\alpha = -\frac{b}{2a}$.

L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}.$$

L'ordonnée du sommet est :

$$\beta = f\left(\frac{3}{4}\right) = 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 3 \times \frac{3}{4} - 5 = 2 \times \frac{9}{16} - \frac{9}{4} - 5 = \frac{9}{8} - \frac{18}{8} - \frac{40}{8} = -\frac{49}{8}.$$

Le sommet est $S\left(\frac{3}{4}; -\frac{49}{8}\right)$.

3. Forme canonique.

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta.$$

On a $a = 2$, $\alpha = \frac{3}{4}$, $\beta = -\frac{49}{8}$, donc :

$$f(x) = 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{49}{8}.$$

4. Vérification de la forme factorisée.

Développer et simplifier pour vérifier.

On développe $2(x + 1)\left(x - \frac{5}{2}\right)$:

$$2(x + 1)\left(x - \frac{5}{2}\right) = 2\left(x^2 - \frac{5}{2}x + x - \frac{5}{2}\right) = 2\left(x^2 - \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}\right) = 2x^2 - 3x - 5.$$

On retrouve bien $f(x)$. □

1SPE-SECDEG-EX-002

Corrigé

1. Passage de la forme canonique à la forme développée : $f(x) = 3(x - 2)^2 - 1$.

Développer $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$.

$$f(x) = 3(x - 2)^2 - 1 = 3(x^2 - 4x + 4) - 1 = 3x^2 - 12x + 12 - 1.$$

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 11.$$

2. Passage de la forme factorisée à la forme développée : $g(x) = -2(x - 1)(x + 4)$.

Développer le produit, puis multiplier par -2 .

$$(x - 1)(x + 4) = x^2 + 4x - x - 4 = x^2 + 3x - 4.$$

$$g(x) = -2(x^2 + 3x - 4) = -2x^2 - 6x + 8.$$

$$g(x) = -2x^2 - 6x + 8.$$

3. Passage de la forme développée à la forme canonique : $h(x) = x^2 + 6x + 5$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a}, \beta = h(\alpha).$$

Ici $a = 1$, $b = 6$, $c = 5$.

Abscisse du sommet :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2} = -3.$$

Ordonnée du sommet :

$$\beta = h(-3) = (-3)^2 + 6 \times (-3) + 5 = 9 - 18 + 5 = -4.$$

Donc :

$$h(x) = (x + 3)^2 - 4.$$

Vérification : $(x+3)^2 - 4 = x^2 + 6x + 9 - 4 = x^2 + 6x + 5$. □

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-003

1. Identification des trinômes du second degré.

Un trinôme du 2nd degré vérifie $a \neq 0$.

- ▶ $p(x) = 4x^2 - x + 7$: **oui**, c'est un trinôme du second degré. On a $a = 4$, $b = -1$, $c = 7$.
- ▶ $q(x) = 3x - 2$: **non**, c'est un polynôme de degré 1 (pas de terme en x^2).
- ▶ $r(x) = -x^2 + 5$: **oui**, c'est un trinôme du second degré. On a $a = -1$, $b = 0$, $c = 5$.

2a. Développement de $f(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 3)$.

Distribuer le produit, puis multiplier par 2.

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 3) = x^2 - 3x - \frac{x}{2} + \frac{3}{2} = x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{3}{2}.$$

$$f(x) = 2\left(x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{3}{2}\right) = 2x^2 - 7x + 3.$$

$$f(x) = 2x^2 - 7x + 3.$$

2b. Coordonnées du sommet.

On lit $a = 2$, $b = -7$. L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-7}{4} = \frac{7}{4}.$$

L'ordonnée du sommet est :

$$\beta = f\left(\frac{7}{4}\right) = 2 \times \frac{49}{16} - 7 \times \frac{7}{4} + 3 = \frac{49}{8} - \frac{49}{4} + 3 = \frac{49}{8} - \frac{98}{8} + \frac{24}{8} = -\frac{25}{8}.$$

Le sommet est $S\left(\frac{7}{4}; -\frac{25}{8}\right)$.

2c. Forme canonique.

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta.$$

$$f(x) = 2\left(x - \frac{7}{4}\right)^2 - \frac{25}{8}.$$

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-004

1. Signe de a et sens d'ouverture.

On a $a = -1 < 0$, donc la parabole est tournée vers le **bas** (concavité vers le bas). La fonction admet un **maximum**.

$a < 0 \Rightarrow$ parabole tournée vers le bas.

2. Coordonnées du sommet S .

$$\alpha = -\frac{b}{2a}.$$

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \times (-1)} = -\frac{4}{-2} = 2.$$

$$\beta = f(2) = -(2)^2 + 4 \times 2 + 1 = -4 + 8 + 1 = 5.$$

Le sommet est $S(2; 5)$.

L'axe de symétrie passe par le sommet.

3. Axe de symétrie.

L'axe de symétrie de la parabole a pour équation :

$$x = 2.$$

4. Tableau de variations.

Puisque $a = -1 < 0$, f est **croissante** sur $] -\infty ; 2]$ puis **décroissante** sur $[2 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$		↗ 5 ↘	
	$-\infty$		$-\infty$

5. Calcul de $f(0)$ et $f(4)$.

$$f(0) = -(0)^2 + 4 \times 0 + 1 = 1.$$

$$f(4) = -(4)^2 + 4 \times 4 + 1 = -16 + 16 + 1 = 1.$$

On remarque que $f(0) = f(4) = 1$. Cela s'explique par la symétrie de la parabole par rapport à l'axe $x = 2$: les points d'abscisse 0 et 4 sont symétriques par rapport à cet axe (0 et 4 sont à égale distance de 2), donc ils ont la même image.

Symétrie par rapport à l'axe $x = 2$.

1SPE-SECDEG-EX-005

Corrigé

1. Lecture des coordonnées du sommet.

$f(x) = 2(x - 1)^2 - 8$ est déjà sous forme canonique avec $\alpha = 1$ et $\beta = -8$.

Le sommet est $S(1 ; -8)$.

La forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$ donne directement $S(\alpha ; \beta)$.

2. Sens d'ouverture.

On a $a = 2 > 0$, donc la parabole est tournée vers le **haut**. La fonction admet un **minimum**.

$a > 0 \Rightarrow$ parabole tournée vers le haut.

3. Tableau de variations et minimum.

Puisque $a = 2 > 0$, f est **décroissante** sur $] -\infty ; 1]$ puis **croissante** sur $[1 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$		↘ -8 ↗	
	$+\infty$		$+\infty$

Le minimum de f est -8 , atteint en $x = 1$.

4. Forme développée.

$$(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1.$$

$$f(x) = 2(x - 1)^2 - 8 = 2(x^2 - 2x + 1) - 8 = 2x^2 - 4x + 2 - 8.$$

$$f(x) = 2x^2 - 4x - 6.$$

5. Vérification de $f(3) = 0$ et $f(-1) = 0$.

$$f(3) = 2(3 - 1)^2 - 8 = 2 \times 4 - 8 = 8 - 8 = 0. \quad \checkmark$$

$$f(-1) = 2(-1 - 1)^2 - 8 = 2 \times 4 - 8 = 8 - 8 = 0. \quad \checkmark$$

Substitution directe dans la forme canonique.

Corrigé

1. Coordonnées du sommet.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{12}{2 \times (-3)} = -\frac{12}{-6} = 2.$$

$$\alpha = -\frac{b}{2a}, \text{ ici } a = -3, \\ b = 12.$$

$$\beta = g(2) = -3 \times 4 + 12 \times 2 - 5 = -12 + 24 - 5 = 7.$$

Le sommet est $S(2; 7)$.

2. Forme canonique.

$$g(x) = -3(x - 2)^2 + 7.$$

$$g(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta.$$

$$\text{Vérification : } -3(x - 2)^2 + 7 = -3(x^2 - 4x + 4) + 7 = -3x^2 + 12x - 12 + 7 = -3x^2 + 12x - 5. \quad \square$$

3. Tableau de variations, maximum.

Puisque $a = -3 < 0$, g est **croissante** sur $] -\infty; 2]$ puis **décroissante** sur $[2; +\infty[$.

$a = -3 < 0$: maximum
en $\alpha = 2$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow 7 \searrow$	$-\infty$

La valeur maximale de g est 7, atteinte en $x = 2$.

4. Calcul et interprétation de $g(0)$.

$$g(0) = -3 \times 0 + 12 \times 0 - 5 = -5.$$

$g(0) = -5$ est l'ordonnée à l'origine de la parabole (c'est-à-dire la valeur en laquelle la parabole coupe l'axe des ordonnées).

$g(0)$ est l'ordonnée à
l'origine de la parabole.

5. Signe de $g(4)$ par symétrie.

L'axe de symétrie de la parabole est $x = 2$. Les abscisses 0 et 4 sont symétriques par rapport à cet axe (car $\frac{0+4}{2} = 2$), donc $g(4) = g(0) = -5 < 0$.

0 et 4 sont symétriques
par rapport à l'axe $x = 2$.

Ainsi, $g(4) < 0$.

Corrigé

Rappel de la méthode : pour résoudre $ax^2 + bx + c = 0$, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$.

► Si $\Delta > 0$: deux racines réelles $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

► Si $\Delta = 0$: une racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.

► Si $\Delta < 0$: aucune racine réelle.

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0.$$

$$a = 1, b = -5, c = 6.$$

$$\sqrt{\Delta} = 1.$$

$$x_1 = \frac{5-1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

$$\mathcal{S} = \{2; 3\}.$$

b) $2x^2 + 3x - 2 = 0.$

$a = 2, b = 3, c = -2.$

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 9 + 16 = 25 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 5.$$

$$x_1 = \frac{-3-5}{4} = \frac{-8}{4} = -2, \quad x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$\mathcal{S} = \left\{-2; \frac{1}{2}\right\}.$$

c) $x^2 - 2x + 5 = 0.$

$\Delta < 0$: pas de solution dans $\mathbb{R}$.

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0.$$

Puisque $\Delta < 0$, l'équation n'admet **aucune solution réelle**.

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

1SPE-SECDEG-EX-008

Corrigé

a) $4x^2 - 12x + 9 = 0.$

$a = 4, b = -12, c = 9.$

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \times 4 \times 9 = 144 - 144 = 0.$$

Puisque $\Delta = 0$, l'équation admet une **racine double** :

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}.$$

$$\mathcal{S} = \left\{\frac{3}{2}\right\}.$$

Remarque : on reconnaît l'identité remarquable $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$, ce qui confirme la racine double $x = \frac{3}{2}$.

b) $x^2 - 7 = 0.$

$a = 1, b = 0, c = -7.$

$$\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (-7) = 28 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}.$$

$$x_1 = \frac{0-2\sqrt{7}}{2} = -\sqrt{7}, \quad x_2 = \frac{0+2\sqrt{7}}{2} = \sqrt{7}.$$

$$\mathcal{S} = \{-\sqrt{7}; \sqrt{7}\}.$$

c) $3x^2 + x + 1 = 0.$

$a = 3, b = 1, c = 1.$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times 1 = 1 - 12 = -11 < 0.$$

Puisque $\Delta < 0$, l'équation n'admet **aucune solution réelle**.

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-009

a) $(x+1)(x-3) = -3.$

On développe le membre de gauche :

$$(x+1)(x-3) = x^2 - 3x + x - 3 = x^2 - 2x - 3.$$

L'équation devient :

$$x^2 - 2x - 3 = -3 \iff x^2 - 2x - 3 + 3 = 0 \iff x^2 - 2x = 0.$$

On factorise par x :

$$x(x-2) = 0.$$

$x = 0$ ou $x - 2 = 0$, soit $x = 2$.

$$\mathcal{S} = \{0; 2\}.$$

Vérification : $(0+1)(0-3) = -3 \checkmark$; $(2+1)(2-3) = 3 \times (-1) = -3 \checkmark$.

b) $2x^2 - 5x = 3.$

On réécrit :

$$2x^2 - 5x - 3 = 0.$$

$a = 2, b = -5, c = -3.$

$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49 > 0.$

$$\sqrt{\Delta} = 7.$$

$$x_1 = \frac{5-7}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5+7}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

$$\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{2}; 3\right\}.$$

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-010

a) $x^2 - 9.$

On reconnaît une différence de deux carrés : $x^2 - 9 = x^2 - 3^2.$

$$x^2 - 9 = (x-3)(x+3).$$

b) $2x^2 - 8x.$

On met $2x$ en facteur :

$$2x^2 - 8x = 2x \cdot x - 2x \cdot 4.$$

$$2x^2 - 8x = 2x(x-4).$$

c) $x^2 - x - 6.$

Développer puis ramener
à $ax^2 + bx + c = 0$.

Produit nul :
 $A \times B = 0 \iff A = 0$
ou $B = 0$.

Passer tous les termes à
gauche.

Identité remarquable :
 $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b).$

Mettre $2x$ en facteur
commun.

Utiliser le discriminant pour trouver les racines.

Méthode par le discriminant : $a = 1, b = -1, c = -6$.

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 > 0, \sqrt{\Delta} = 5.$$

$$x_1 = \frac{1-5}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{1+5}{2} = 3.$$

D'après le théorème de factorisation : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

$$x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3).$$

Mettre 3 en facteur, puis identifier un carré parfait.

d) $3x^2 - 12x + 12$.

On factorise d'abord par 3 :

$$3x^2 - 12x + 12 = 3(x^2 - 4x + 4).$$

On reconnaît ensuite $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$ (carré parfait).

$$3x^2 - 12x + 12 = 3(x - 2)^2.$$

1SPE-SECDEG-EX-011

Corrigé

1. Racines de f .

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x + 5) = 0.$$

f est déjà sous forme factorisée. Par la règle du produit nul :

$$(x - 2)(x + 5) = 0 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \text{ ou } x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -5.$$

Les racines de f sont $x_1 = -5$ et $x_2 = 2$.

2. Tableau de signes.

$a = 1 > 0 : f > 0$ à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$	-5	2	$+\infty$
$x + 5$		$-$	0	$+$
$x - 2$		$-$	$-$	0
$f(x)$		$+$	0	$-$

3. Solutions des inéquations.

a) $f(x) \geq 0$: d'après le tableau, $f(x) \geq 0$ sur $]-\infty; -5] \cup [2; +\infty[$.

$$S_a =]-\infty; -5] \cup [2; +\infty[.$$

b) $f(x) < 0$: d'après le tableau, $f(x) < 0$ sur $] -5; 2[$.

$$S_b =] -5; 2[.$$

4. Développement et calcul de Δ .

$$(x - 2)(x + 5) = x^2 + 3x - 10.$$

$$f(x) = (x - 2)(x + 5) = x^2 + 5x - 2x - 10 = x^2 + 3x - 10.$$

On a $a = 1, b = 3, c = -10$.

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-10) = 9 + 40 = 49.$$

□

1SPE-SECDEG-EX-012

Corrigé

1. Calcul de Δ et racines de g .

$$\Delta = 2^2 - 4 \times (-2) \times 12 = 4 + 96 = 100 > 0.$$

$$a = -2, b = 2, c = 12.$$

$$\sqrt{\Delta} = 10.$$

$$x_1 = \frac{-2 - 10}{2 \times (-2)} = \frac{-12}{-4} = 3, \quad x_2 = \frac{-2 + 10}{2 \times (-2)} = \frac{8}{-4} = -2.$$

Les racines sont $x_1 = -2$ et $x_2 = 3$ (rangées dans l'ordre croissant).

2. Factorisation de $g(x)$.

$$g(x) = -2(x+2)(x-3).$$

$$g(x) = a(x-x_1)(x-x_2) \\ \text{avec } a = -2.$$

$$\text{Vérification : } -2(x+2)(x-3) = -2(x^2 - x - 6) = -2x^2 + 2x + 12 = g(x).$$

✓

3. Tableau de signes.

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
-2		-	-	-
$x+2$		-	0	+
$x-3$		-	-	0
$g(x)$		-	0	+

$$a = -2 < 0 : g > 0 \text{ entre} \\ \text{les racines.}$$

(Le facteur -2 est négatif, il inverse le signe du produit $(x+2)(x-3)$.)

4. Résolution de $g(x) \leq 0$.

D'après le tableau de signes, $g(x) \leq 0$ pour $x \leq -2$ ou $x \geq 3$.

$$\mathcal{S} =]-\infty; -2] \cup [3; +\infty[.$$

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-013

a) $x^2 - x - 6 > 0$.

Étape 1 : calcul de Δ .

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 > 0.$$

$$a = 1, b = -1, c = -6.$$

$$\sqrt{\Delta} = 5.$$

$$x_1 = \frac{1-5}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{1+5}{2} = 3.$$

Étape 2 : tableau de signes.

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$f(x)$		+	0	-

$$a = 1 > 0 : f > 0 \text{ à} \\ \text{l'extérieur des racines.}$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} =]-\infty; -2[\cup]3; +\infty[.$$

b) $-x^2 + 4 \geq 0$.

Étape 1 : calcul de Δ .

$$\Delta = 0^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 16 > 0.$$

$$a = -1, b = 0, c = 4.$$

$$\sqrt{\Delta} = 4.$$

$$x_1 = \frac{0-4}{-2} = 2, \quad x_2 = \frac{0+4}{-2} = -2.$$

Donc les racines (ordre croissant) sont -2 et 2 .

Étape 2 : tableau de signes.

$a = -1 < 0 : g \geq 0$ entre les racines.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = [-2; 2].$$

1SPE-SECDEG-EX-014

Corrigé

a) $2x^2 - 5x + 2 \leq 0$.

$a = 2, b = -5, c = 2$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 2 = 25 - 16 = 9 > 0, \sqrt{\Delta} = 3.$$

$$x_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5+3}{4} = 2.$$

Tableau de signes :

$a = 2 > 0 : f \leq 0$ entre les racines.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	2	$+\infty$		
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

$$\mathcal{S} = \left[\frac{1}{2}; 2 \right].$$

b) $x^2 + 1 < 0$.

$a = 1 > 0, \Delta < 0 : f$ est toujours positive.

$$a = 1, b = 0, c = 1.$$

$$\Delta = 0 - 4 \times 1 \times 1 = -4 < 0.$$

Puisque $\Delta < 0$ et $a = 1 > 0$, le trinôme $x^2 + 1$ n'a **aucune racine réelle** et est **strictement positif** pour tout $x \in \mathbb{R}$ (il vaut au minimum 1 en $x = 0$).

La condition $x^2 + 1 < 0$ n'est donc jamais satisfaite.

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

1SPE-SECDEG-EX-015

Corrigé

1. Calcul de Δ et racines de $f(x) = -3x^2 + 6x + 9$.

$a = -3, b = 6, c = 9$.

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-3) \times 9 = 36 + 108 = 144 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 12.$$

$$x_1 = \frac{-6-12}{2 \times (-3)} = \frac{-18}{-6} = 3, \quad x_2 = \frac{-6+12}{-6} = \frac{6}{-6} = -1.$$

Les racines, dans l'ordre croissant, sont $x_1 = -1$ et $x_2 = 3$.

2. Tableau de signes.

Attention : $a = -3 < 0$.
 $f \geq 0$ entre les racines.

Puisque $a = -3 < 0$, le trinôme est **positif entre les racines** et négatif à l'extérieur.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$		
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

3. Ensemble solution de $f(x) \geq 0$.

$$\mathcal{S} = [-1; 3].$$

4. Vérification.

$$f(0) = -3 \times 0 + 6 \times 0 + 9 = 9 > 0 : 0 \in [-1; 3], \text{ cohérent.}$$

✓

$$f(4) = -3 \times 16 + 6 \times 4 + 9 = -48 + 24 + 9 = -15 < 0 : 4 \notin [-1; 3], \text{ cohérent.}$$

✓

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-016

1. Longueur de l'enclos en fonction de x .

Le périmètre vaut 20 m, donc $2(x + L) = 20$, soit $x + L = 10$.

La longueur est $L = 10 - x$.

Périmètre :

$$2(\text{largeur} + \text{longueur}) = 20.$$

2. Expression de l'aire. $A = \text{largeur} \times \text{longueur}.$

$$A(x) = x \times (10 - x) = 10x - x^2.$$

$$A(x) = -x^2 + 10x.$$

3. Coordonnées du sommet.

On a $a = -1$, $b = 10$.

 $a = -1 < 0$: maximum.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{10}{-2} = 5.$$

$$A(5) = -(5)^2 + 10 \times 5 = -25 + 50 = 25.$$

Le sommet est $S(5; 25)$.

4. Valeur maximale de l'aire.

L'aire est maximale pour $x = 5$ m. L'aire maximale est $A(5) = 25 \text{ m}^2$.

Le maximum de A est atteint en $\alpha = 5$.

5. Forme de l'enclos d'aire maximale.

Pour $x = 5$: largeur = 5 m et longueur = $10 - 5 = 5$ m.

L'enclos d'aire maximale est un **carré** de côté 5 m.

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-017

1. Expression de p en fonction de x .

On a $x = \frac{50 - p}{2}$, donc $2x = 50 - p$, soit :

$$p = 50 - 2x.$$

Inverser la relation

$$x = \frac{50 - p}{2}.$$

2. Expression de la recette.

Recette = prix unitaire $\times$ quantité.

$$R(x) = p \times x = (50 - 2x) \times x = 50x - 2x^2.$$

$$R(x) = -2x^2 + 50x.$$

3. Nombre d'articles pour maximiser la recette.

On a $a = -2$, $b = 50$.

$a = -2 < 0$: maximum au sommet.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{50}{-4} = \frac{25}{2} = 12,5.$$

La recette est maximale pour $x = \frac{25}{2}$ articles.

4. Prix optimal et recette maximale.

Prix unitaire optimal :

$$p = 50 - 2 \times \frac{25}{2} = 50 - 25 = 25 \text{ euros.}$$

Recette maximale :

$$R\left(\frac{25}{2}\right) = -2 \times \left(\frac{25}{2}\right)^2 + 50 \times \frac{25}{2} = -2 \times \frac{625}{4} + 625 = -\frac{625}{2} + \frac{1250}{2} = \frac{625}{2} = 312,5 \text{ euros.}$$

Le prix unitaire optimal est **25 euros** et la recette maximale est **312,5 euros**.

Substituer $x = \frac{25}{2}$ dans p et R .

1SPE-SECDEG-EX-018

Corrigé

1. Hauteur initiale.

$$h(0) = -5 \times 0 + 20 \times 0 + 1 = 1 \text{ mètre.}$$

Le ballon est lancé depuis une hauteur de **1 m**.

2. Hauteur maximale et instant correspondant.

On a $a = -5$, $b = 20$.

$$t_{\max} = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{-10} = 2 \text{ secondes.}$$

$$h(2) = -5 \times 4 + 20 \times 2 + 1 = -20 + 40 + 1 = 21 \text{ mètres.}$$

Le ballon atteint sa hauteur maximale de **21 m** au bout de **2 s**.

3. Instant où le ballon touche le sol.

$$h(t) = 0 \iff -5t^2 + 20t + 1 = 0.$$

$$a = -5, b = 20, c = 1.$$

$$\Delta = 20^2 - 4 \times (-5) \times 1 = 400 + 20 = 420 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{420} = 2\sqrt{105}.$$

$$t = \frac{-20 \pm 2\sqrt{105}}{-10} = \frac{20 \mp 2\sqrt{105}}{10} = 2 \mp \frac{\sqrt{105}}{5}.$$

$$t_1 = 2 - \frac{\sqrt{105}}{5} \approx 2 - 2,049 \approx -0,05 < 0 \quad (\text{rejeté, hors contexte}).$$

$$t_2 = 2 + \frac{\sqrt{105}}{5} \approx 2 + 2,049 \approx 4,05 > 0.$$

Le ballon touche le sol après environ **4,05 secondes**.

À $t = 0$, le ballon est à la hauteur de départ.

$a = -5 < 0$: maximum au sommet.

Résoudre $h(t) = 0$ et retenir $t > 0$.

1SPE-SECDEG-EX-019

Corrigé

Barème indicatif : Q1 : 3 pts — Q2 : 4 pts — Q3 : 4 pts — Q4 : 4 pts — Q5 : 5 pts

1. (C1) Coefficients et forme canonique.

On a $f(x) = 3x^2 - 6x - 24$, donc $a = 3$, $b = -6$, $c = -24$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a}, \beta = f(\alpha).$$

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{6} = 1.$$

$$\beta = f(1) = 3 - 6 - 24 = -27.$$

$$f(x) = 3(x-1)^2 - 27.$$

$$\text{Vérification : } 3(x-1)^2 - 27 = 3(x^2 - 2x + 1) - 27 = 3x^2 - 6x + 3 - 27 = 3x^2 - 6x - 24. \quad \checkmark$$

2. (C2) Sommet et tableau de variations.

Le sommet est $S(1; -27)$. Puisque $a > 0$, f est décroissante sur $]-\infty; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$.

$a = 3 > 0$: minimum en $\alpha = 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-27	$+\infty$

3. (C1) Calcul de Δ et factorisation.

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times (-24) = 36 + 288 = 324, \sqrt{\Delta} = 18.$$

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

$$x_1 = \frac{6-18}{6} = -2, \quad x_2 = \frac{6+18}{6} = 4.$$

$$f(x) = 3(x+2)(x-4).$$

4. (C2) Abscisses des intersections avec l'axe des abscisses.

La parabole coupe l'axe des abscisses en $x = -2$ et $x = 4$ (les racines de f).

Intersections avec (Ox)
 $\Leftrightarrow f(x) = 0$.

Vérification algébrique : $f(-2) = 3 \times 4 - 6 \times (-2) - 24 = 12 + 12 - 24 = 0 \checkmark$; $f(4) = 48 - 24 - 24 = 0 \checkmark$.

5. L'équation $f(x) = -27$.

D'après le tableau de variations, le minimum de f est -27 , atteint uniquement en $x = 1$.

Le minimum de f vaut -27 : atteint une seule fois.

L'équation $f(x) = -27$ admet donc **une unique solution** : $x = 1$.

$$\text{Justification : } 3(x-1)^2 - 27 = -27 \Leftrightarrow 3(x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-020

Barème indicatif : Q1 : 3 pts — Q2 : 3 pts — Q3 : 4 pts — Q4 : 5 pts — Q5 : 5 pts

1. (C1) Forme développée.

$$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9.$$

$$f(x) = -2(x+3)^2 + 8 = -2(x^2 + 6x + 9) + 8 = -2x^2 - 12x - 18 + 8.$$

$$f(x) = -2x^2 - 12x - 10.$$

On lit $a = -2$, $b = -12$, $c = -10$.

2. (C2) Sommet — maximum ou minimum.

$$f(x) = -2(x - (-3))^2 + 8, \text{ donc le sommet est } S(-3; 8).$$

Lire α et β dans $a(x-\alpha)^2 + \beta$.

Puisque $a = -2 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : f admet un **maximum** égal à 8, atteint en $x = -3$.

3. (C2) Tableau de variations.

$a < 0$: croissant jusqu'au sommet, puis décroissant.

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 8 \searrow$	$-\infty$

4. (C1) Résolution de $f(x) = 0$.

Utiliser la forme canonique : $(x + 3)^2 = 4$.

$$-2(x + 3)^2 + 8 = 0 \iff (x + 3)^2 = 4 \iff x + 3 = \pm 2.$$

$$x + 3 = 2 \Rightarrow x = -1, \quad x + 3 = -2 \Rightarrow x = -5.$$

$$\mathcal{S} = \{-5; -1\}.$$

Interprétation géométrique : les points d'abscisses -5 et -1 sont les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses.

5. Comparaison des deux formes.

La **forme canonique** $-2(x + 3)^2 + 8$ est plus pratique pour :

- lire directement le sommet $S(-3; 8)$ (questions 2 et 3),
- résoudre $f(x) = k$ en isolant le carré (question 4).

La **forme développée** $-2x^2 - 12x - 10$ est plus pratique pour :

- identifier les coefficients a, b, c en vue d'appliquer la formule de Δ .

1SPE-SECDEG-EX-021

Corrigé

Barème indicatif : Q1 : 4 pts — Q2 : 6 pts — Q3 : 5 pts — Q4 : 5 pts

1. (C1) Forme canonique.

Compléter le carré : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$.

$$a = 1, b = -4, c = 1.$$

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{2} = 2.$$

$$\beta = f(2) = 4 - 8 + 1 = -3.$$

$$f(x) = (x - 2)^2 - 3.$$

$$\text{Vérification : } (x - 2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1. \quad \checkmark$$

2. (C3) Résolution de $f(x) = 0$.

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 16 - 4 = 12 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

$$x_1 = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}, \quad x_2 = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}.$$

$$\mathcal{S} = \{2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3}\}.$$

3. (C3) Résolution de $f(x) = -2$.

Ramener à $ax^2 + bx + c = 0$.

$$f(x) = -2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 = -2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0.$$

$$a = 1, b = -4, c = 3.$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0, \sqrt{\Delta} = 2.$$

$$x_1 = \frac{4-2}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{4+2}{2} = 3.$$

$$\mathcal{S} = \{1; 3\}.$$

4. (C1) La valeur $\beta = -3$ est-elle bien le minimum ?

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x-2)^2 \geq 0$, donc :

$$f(x) = (x-2)^2 - 3 \geq 0 - 3 = -3.$$

L'égalité est atteinte uniquement pour $x = 2$.

Ainsi, $f(x) \geq -3$ pour tout réel x , et $f(2) = -3$: $\beta = -3$ est bien le **minimum** de f . $\square$

$(x-2)^2 \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-022

1. Forme canonique de $p(x)$.

On a $p(x) = 2x^2 - 4x - 6$, avec $a = 2, b = -4, c = -6$.

L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \times 2} = 1.$$

L'ordonnée du sommet est :

$$\beta = p(1) = 2(1)^2 - 4(1) - 6 = 2 - 4 - 6 = -8.$$

Donc :

$$p(x) = 2(x-1)^2 - 8.$$

1. Forme factorisée de $p(x)$.

On calcule le discriminant :

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 16 + 48 = 64 > 0.$$

Les deux racines sont :

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{64}}{4} = \frac{4-8}{4} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{4+8}{4} = 3.$$

D'où :

$$p(x) = 2(x+1)(x-3).$$

2. Résolution de $p(x) = 10$.

$$p(x) = 10 \Leftrightarrow 2x^2 - 4x - 6 = 10 \Leftrightarrow 2x^2 - 4x - 16 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 0.$$

Discriminant : $\Delta' = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 4 + 32 = 36$.

$$x_1 = \frac{2-6}{2} = -2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{2+6}{2} = 4.$$

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{-2; 4\}$.

3. Résolution de $p(x) = -8$.

Mettre en facteur a , puis compléter le carré.

$\Delta = b^2 - 4ac$; racines

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Ramener à $p(x) - 10 = 0$.

Utiliser la forme canonique : le minimum de p vaut -8 .

D'après la forme canonique : $p(x) = 2(x - 1)^2 - 8$.

$$p(x) = -8 \Leftrightarrow 2(x - 1)^2 - 8 = -8 \Leftrightarrow 2(x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{1\}$.

4. Vérification pour $x = 2$.

Les trois formes doivent donner la même valeur.

- ▶ Forme développée : $p(2) = 2(4) - 4(2) - 6 = 8 - 8 - 6 = -6$.
- ▶ Forme canonique : $p(2) = 2(2 - 1)^2 - 8 = 2 \times 1 - 8 = -6$.
- ▶ Forme factorisée : $p(2) = 2(2 + 1)(2 - 3) = 2 \times 3 \times (-1) = -6$.

Les trois formes donnent bien $p(2) = -6$. □

Barème indicatif : Q1 forme canonique : 2 pts (calculer); Q1 forme factorisée : 2 pts (calculer); Q2 : 2 pts (calculer); Q3 : 1 pt (raisonner); Q4 : 1 pt (communiquer)

1SPE-SECDEG-EX-023

Corrigé

1. Calcul du discriminant et racines de f .

On identifie $a = 6$, $b = -1$, $c = -2$.

$$\Delta = b^2 - 4ac \text{ avec } a = 6, \\ b = -1, c = -2.$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 6 \times (-2) = 1 + 48 = 49.$$

Comme $\Delta = 49 > 0$, l'équation $f(x) = 0$ admet deux racines distinctes :

$$x_1 = \frac{1 - \sqrt{49}}{12} = \frac{1 - 7}{12} = \frac{-6}{12} = -\frac{1}{2}$$

$$x_2 = \frac{1 + 7}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}.$$

2. Factorisation de $f(x)$.

D'après la formule de factorisation :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \\ \text{avec } a = 6.$$

$$f(x) = 6 \left(x + \frac{1}{2} \right) \left(x - \frac{2}{3} \right) = (2x + 1)(3x - 2).$$

$$\text{Vérification : } (2x + 1)(3x - 2) = 6x^2 - 4x + 3x - 2 = 6x^2 - x - 2 = f(x). \quad \square$$

3. Tableau de signes de f .

Les racines $x_1 = -\frac{1}{2}$ et $x_2 = \frac{2}{3}$ délimitent trois intervalles.

$a = 6 > 0$: la parabole est tournée vers le haut.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$	
$f(x)$	+	0	-	0	+

4. Résolution de $6x^2 - x = 2$.

$$6x^2 - x = 2 \Leftrightarrow 6x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0.$$

D'après la question 1 : $\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{2}; \frac{2}{3} \right\}$.

5. Signe de f sur $\left[-\frac{1}{2}; \frac{2}{3} \right]$.

D'après le tableau de signes établi à la question 3, $f(x) \leq 0$ pour tout $x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{2}{3} \right]$ (nul aux bornes, strictement négatif à l'intérieur).

Ramener à $f(x) = 0$.

Lire directement dans le tableau de signes.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer); Q2 : 2 pts (calculer, communiquer); Q3 : 2 pts (raisonner); Q4 : 1 pt (calculer); Q5 : 1 pt (raisonner)

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-024

1. Résolution de $(x^2 - 4)(x - 3) = 0$.

On factorise $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, donc :

$$(x - 2)(x + 2)(x - 3) = 0.$$

Par la règle du produit nul :

$$x - 2 = 0 \text{ ou } x + 2 = 0 \text{ ou } x - 3 = 0,$$

ce qui donne $x = 2$, $x = -2$ ou $x = 3$.

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{-2; 2; 3\}$.

2. Tableau de signes de $g(x) = x^2 - 4$.

$g(x) = x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Les racines sont -2 et 2 .

Règle du produit nul :
 $AB = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou
 $B = 0$.

$g(x) = (x - 2)(x + 2)$,
 racines -2 et 2 ,
 $a = 1 > 0$.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

3. Étude de $h(x) = 2x^2 + 3x - 5$.

a) Discriminant et racines.

$a = 2$, $b = 3$, $c = -5$.

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-5) = 9 + 40 = 49.$$

$$x_1 = \frac{-3 - 7}{4} = \frac{-10}{4} = -\frac{5}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-3 + 7}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

b) Factorisation.

$$h(x) = 2\left(x + \frac{5}{2}\right)(x - 1) = (2x + 5)(x - 1).$$

Vérification : $(2x + 5)(x - 1) = 2x^2 - 2x + 5x - 5 = 2x^2 + 3x - 5$.

□

c) Tableau de signes de h .

$a = 2 > 0$: signe $+$ à
 l'extérieur des racines.

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	1	$+\infty$	
$h(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

4. Solutions de $2x^2 + 3x - 5 \geq 0$.

D'après le tableau de signes, $h(x) \geq 0$ sur $\left]-\infty; -\frac{5}{2}\right] \cup [1; +\infty[$.

Lire les intervalles où
 $h \geq 0$ dans le tableau.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner); Q2 : 2 pts (raisonner); Q3a-b : 2 pts (calculer); Q3c : 1 pt (raisonner); Q4 : 1 pt (raisonner)

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-025

1. Factorisation et tableau de signes de $f(x) = x^2 - 3x - 10$.

On a $a = 1$, $b = -3$, $c = -10$.

Calculer Δ , trouver les
 racines, puis factoriser.

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-10) = 9 + 40 = 49.$$

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{3-7}{2} = -2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3+7}{2} = 5.$$

Donc $f(x) = (x+2)(x-5)$.

Tableau de signes ($a = 1 > 0$, parabole vers le haut) :

x	$-\infty$	-2	5	$+\infty$		
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

2. Résolution des inéquations.

a) $x^2 - 3x - 10 < 0$: d'après le tableau, $f(x) < 0$ sur $\mathcal{S} =]-2; 5[$.

b) $x^2 - 3x - 10 \geq 0$: d'après le tableau, $f(x) \geq 0$ sur $\mathcal{S} =]-\infty; -2] \cup [5; +\infty[$.

3. Factorisation et tableau de signes de $g(x) = -x^2 + 2x + 8$.

$a = -1, b = 2, c = 8$.

$$\Delta = 4 - 4 \times (-1) \times 8 = 4 + 32 = 36.$$

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{-2-6}{-2} = -2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2+6}{-2} = -2.$$

On calcule directement :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{36}}{2 \times (-1)} = \frac{-2-6}{-2} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2+6}{-2} = -2.$$

Donc $x_1 = -2$ et $x_2 = 4$, et $g(x) = -(x+2)(x-4)$.

Tableau de signes ($a = -1 < 0$) :

x	$-\infty$	-2	4	$+\infty$		
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

4. Résolution de $-x^2 + 2x + 8 > 0$.

D'après le tableau, $g(x) > 0$ sur $\mathcal{S} =]-2; 4[$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner); Q2a : 1 pt (raisonner); Q2b : 1 pt (raisonner); Q3 : 2 pts (calculer, raisonner); Q4 : 1 pt (raisonner)

Corrigé

1. Factorisation et signe de $g(x) = 3x^2 - 5x - 2$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 25 + 24 = 49.$$

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{5-7}{6} = -\frac{1}{3} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5+7}{6} = 2.$$

Donc $g(x) = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)(x-2) = (3x+1)(x-2)$.

Tableau de signes ($a = 3 > 0$) :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	2	$+\infty$	
$g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Lire les intervalles de signe dans le tableau.

$a = -1 < 0$: parabole vers le bas, positif entre les racines.

Lire dans le tableau : $g > 0$ entre les racines.

1SPE-SECDEG-EX-026

$a = 3, b = -5, c = -2$; calculer Δ .

2. Résolution de $3x^2 - 5x - 2 < 0$.

D'après le tableau, $g(x) < 0$ sur $\mathcal{D} = \left] -\frac{1}{3}; 2 \right[$.

Lire les intervalles où $g < 0$.

3. Comparaison des aires.

On cherche pour quelles valeurs de x (avec $x > 1$) l'aire du rectangle dépasse celle du carré :

Écrire l'inéquation, développer, simplifier.

$$(x+3)(x-1) > x^2.$$

On développe le membre de gauche :

$$(x+3)(x-1) = x^2 + 2x - 3.$$

L'inéquation devient :

$$x^2 + 2x - 3 > x^2 \iff 2x - 3 > 0 \iff x > \frac{3}{2}.$$

En tenant compte de la contrainte $x > 1$, la condition $x > \frac{3}{2}$ est plus restrictive.

L'inéquation se réduit au premier degré.

Conclusion : le rectangle a une aire strictement supérieure à celle du carré si et seulement si $x > \frac{3}{2}$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q2 : 1 pt (raisonner) ; Q3 : 3 pts (modéliser, calculer, raisonner)

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-027

1. Dimensions de la base en fonction de x .

Lorsqu'on découpe des carrés de côté x aux quatre coins d'une feuille $16 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$:

On retire x de chaque côté aux deux extrémités.

- longueur de la base : $16 - 2x \text{ cm}$,
- largeur de la base : $10 - 2x \text{ cm}$.

2. Expression de $V(x)$.

La hauteur de la boîte est x . Donc :

Volume = base $\times$ hauteur,
hauteur = x .

$$V(x) = x(16 - 2x)(10 - 2x).$$

On développe :

$$(16 - 2x)(10 - 2x) = 160 - 32x - 20x + 4x^2 = 4x^2 - 52x + 160.$$

$$\text{Donc } V(x) = x(4x^2 - 52x + 160) = 4x^3 - 52x^2 + 160x.$$

□

3. Étude de l'aire de la base $A(x) = (16 - 2x)(10 - 2x)$.

a) Développement.

$$A(x) = 4x^2 - 52x + 160.$$

$A(x) = 4x^2 - 52x + 160$ est un trinôme du second degré.

C'est un trinôme du second degré avec $a = 4 > 0$.

b) Sommet.

L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{-52}{2 \times 4} = \frac{52}{8} = \frac{13}{2} = 6,5.$$

Or $6,5 \notin]0; 5[$, donc le sommet est en dehors du domaine d'étude.

c) Tableau de variations de A sur $]0; 5[$.

Sur $]0; 5[$, A est strictement décroissante : plus on découpe un grand carré, plus la base devient petite.

Comme $a > 0$ et le sommet est en $x = 6,5 > 5$, A est décroissante sur $]0; 5[$.

x	0	$\rightarrow$	5
$A(x)$	160	$\searrow$	40

Interprétation : l'aire de la base diminue lorsqu'on augmente la taille des carrés découpés.

4. Comparaison de $V(2)$ et $V(3)$.

Substituer $x = 2$ et $x = 3$ dans $V(x)$.

$$V(2) = 2 \times (16 - 4)(10 - 4) = 2 \times 12 \times 6 = 144 \text{ cm}^3.$$

$$V(3) = 3 \times (16 - 6)(10 - 6) = 3 \times 10 \times 4 = 120 \text{ cm}^3.$$

On a $V(2) = 144 > 120 = V(3)$, donc le découpage avec $x = 2$ cm donne le plus grand volume.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser) ; Q2 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q3 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q4 : 2 pts (calculer, raisonner)

1SPE-SECDEG-EX-028

Corrigé

1. Coordonnées du sommet.

$\alpha = -\frac{b}{2a}$ avec $a = -2$,
 $b = 80$.

$B(x) = -2x^2 + 80x - 600$: on a $a = -2$, $b = 80$, $c = -600$.

$$\alpha = -\frac{80}{2 \times (-2)} = \frac{80}{4} = 20.$$

$$\beta = B(20) = -2(400) + 80(20) - 600 = -800 + 1600 - 600 = 200.$$

Le sommet est $S(20; 200)$.

2. Tableau de variations de B sur $[0; 40]$.

$a = -2 < 0$: parabole
vers le bas, maximum en
 $\alpha = 20$.

La fonction B est croissante sur $[0; 20]$ puis décroissante sur $[20; 40]$.

x	0	20	40
$B(x)$	-600	↗ 200	↘ -600

3. Maximisation du bénéfice.

Le maximum est atteint au
sommet de la parabole.

Le bénéfice est maximal pour $x = 20$ unités produits par semaine.

Le bénéfice maximal est $B(20) = 200$ €.

4. Intervalle de rentabilité.

Résoudre $B(x) = 0$, puis
lire le signe.

$$B(x) = 0 \Leftrightarrow -2x^2 + 80x - 600 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 40x + 300 = 0.$$

$$\Delta = 1600 - 1200 = 400.$$

$$x_1 = \frac{40 - 20}{2} = 10 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{40 + 20}{2} = 30.$$

Comme $a = -2 < 0$, $B(x) > 0$ entre les racines : l'entreprise est rentable pour $x \in]10; 30[$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer) ; Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer) ; Q3 : 1 pt (raisonner) ; Q4 : 3 pts (calculer, raisonner)

1SPE-SECDEG-EX-029

Corrigé

1. Résolution de $x^2 - 5x + 3 = 0$.

$a = 1$, $b = -5$, $c = 3$; so-
lutions exactes avec $\sqrt{\Delta}$.

$$a = 1, b = -5, c = 3.$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 25 - 12 = 13.$$

$\Delta = 13 > 0$: l'équation admet deux solutions réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{13}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{13}}{2}.$$

2. Résolution de $x^2 - 5x + 3 \leq 0$.

Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est négatif ou nul entre ses racines.

$a = 1 > 0 : f \leq 0$ entre les racines.

L'ensemble des solutions est :

$$\mathcal{S} = \left[\frac{5 - \sqrt{13}}{2}; \frac{5 + \sqrt{13}}{2} \right].$$

3. Discriminant de $g(x) = x^2 + 4x + 5$.

$a = 1, b = 4, c = 5$.

Calculer $\Delta_g = b^2 - 4ac$.

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4.$$

$$\Delta = -4 < 0.$$

4. Signe de $g(x)$ et résolution de $g(x) > 0$.

Comme $\Delta < 0$ et $a = 1 > 0$, le trinôme g n'a pas de racine réelle et son coefficient dominant est positif.

$\Delta < 0$ et $a > 0 : g$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

Donc $g(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

L'ensemble des solutions de $g(x) > 0$ est $\mathcal{S} = \mathbb{R}$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer); Q2 : 2 pts (raisonner); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-030

1. Résolution de $h(t) = 0$.

$h(t) = -t^2 + 6t + 7$: on a $a = -1, b = 6, c = 7$.

$a = -1, b = 6, c = 7$;
calculer Δ .

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-1) \times 7 = 36 + 28 = 64.$$

$$t_1 = \frac{-6 - 8}{-2} = \frac{-14}{-2} = 7 \quad \text{et} \quad t_2 = \frac{-6 + 8}{-2} = \frac{2}{-2} = -1.$$

Les deux solutions sont $t = -1$ et $t = 7$. Comme $t \geq 0$, seule la solution $t = 7$ est physiquement valide : l'objet retouche le sol après 7 secondes.

2. Calcul de $h(0)$ et interprétation.

$h(0)$ est la hauteur initiale.

$$h(0) = -(0)^2 + 6(0) + 7 = 7.$$

À $t = 0$, l'objet se trouve à 7 m de hauteur. C'est la hauteur de lancement.

3. Résolution de $h(t) > 3$.

$$h(t) > 3 \Leftrightarrow -t^2 + 6t + 7 > 3 \Leftrightarrow -t^2 + 6t + 4 > 0.$$

Ramener à
 $-t^2 + 6t + 4 > 0$.

On pose $g(t) = -t^2 + 6t + 4$, avec $a = -1, b = 6, c = 4$.

$$\Delta = 36 - 4 \times (-1) \times 4 = 36 + 16 = 52.$$

$$t_1 = \frac{-6 - \sqrt{52}}{-2} = 3 - \sqrt{13} \quad \text{et} \quad t_2 = \frac{-6 + \sqrt{52}}{-2} = 3 + \sqrt{13}.$$

(On utilise $\sqrt{52} = 2\sqrt{13}$.)

Comme $a = -1 < 0$, $g(t) > 0$ entre ses racines : $t \in]3 - \sqrt{13}; 3 + \sqrt{13}[$.

Intersection de l'intervalle solution avec le domaine physique.

4. Ensemble de solutions sur $[0; 7]$.

On calcule les valeurs approchées : $3 - \sqrt{13} \approx -0,61$ et $3 + \sqrt{13} \approx 6,61$.

En intersectant avec $[0; 7]$:

$3 - \sqrt{13} < 0$ donc la borne inférieure devient 0.

$3 + \sqrt{13} \approx 6,61 < 7$ donc la borne supérieure reste $3 + \sqrt{13}$.

L'objet se trouve à plus de 3 m du sol pour $t \in [0; 3 + \sqrt{13}[$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q2 : 1 pt (calculer, modéliser) ; Q3 : 3 pts (calculer) ; Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

1SPE-SECDEG-EX-031

Corrigé

1. Étude de $f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$.

a) Développement.

$$f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} = x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{25}{4} = x^2 - 3x - \frac{16}{4} = x^2 - 3x - 4.$$

b) Factorisation.

La forme canonique est $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = \frac{3}{2}$ et $\beta = -\frac{25}{4}$.

Comme $a = 1$ et $\beta = -\frac{25}{4} < 0$, les racines sont :

$$x_{1,2} = \alpha \pm \sqrt{-\frac{\beta}{a}} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{3}{2} \pm \frac{5}{2}.$$

$$x_1 = \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3}{2} + \frac{5}{2} = 4.$$

Donc $f(x) = (x + 1)(x - 4)$.

c) Tableau de signes.

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$		
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

2. Étude de $g(x) = 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 9$.

a) Développement.

$$g(x) = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) - 9 = 4x^2 + 4x + 1 - 9 = 4x^2 + 4x - 8.$$

b) Factorisation et tableau de signes.

$$g(x) = 4(x^2 + x - 2).$$

On cherche les racines de $x^2 + x - 2 = 0$:

$$\Delta = 1 + 8 = 9, \quad x_1 = \frac{-1 - 3}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{-1 + 3}{2} = 1.$$

Donc $g(x) = 4(x + 2)(x - 1)$.

Tableau de signes ($a = 4 > 0$) :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$		
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Développer le carré, puis regrouper.

Depuis la forme canonique : $x_{1,2} = \alpha \pm \sqrt{-\beta/a}$.

$a = 1 > 0$: positif à l'extérieur des racines.

Développer le carré $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = x^2 + x + \frac{1}{4}$.

Mettre 4 en facteur, puis trouver les racines.

Barème indicatif : Q1a : 1 pt (calculer); Q1b : 2 pts (raisonner); Q1c : 1 pt (raisonner); Q2a : 1 pt (calculer); Q2b : 2 pts (calculer, raisonner)

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-032

1. Système d'équations.

- $A(0; -3) : f(0) = c = -3.$
- $B(1; 0) : f(1) = a + b + c = 0.$
- $C(-3; 0) : f(-3) = 9a - 3b + c = 0.$

Substituer les coordonnées de chaque point dans $f(x) = ax^2 + bx + c.$

Le système est :

$$\begin{cases} c = -3 \\ a + b + c = 0 \\ 9a - 3b + c = 0 \end{cases}$$

2. Résolution du système.

De $c = -3$ et $a + b + c = 0 : a + b = 3.$

De $c = -3$ et $9a - 3b + c = 0 : 9a - 3b = 3$, soit $3a - b = 1.$

En ajoutant $a + b = 3$ et $3a - b = 1 :$

$$4a = 4 \Rightarrow a = 1.$$

Puis $b = 3 - a = 2.$

Donc $f(x) = x^2 + 2x - 3.$

Substituer $c = -3$ dans les deux autres équations.

3. Forme canonique.

$$\alpha = -\frac{2}{2} = -1, \quad \beta = f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4.$$

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2} = -1.$$

$$f(x) = (x + 1)^2 - 4.$$

4. Factorisation et vérification des racines.

Depuis la forme canonique : $\alpha = -1, \beta = -4 < 0$, racines :

$$x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{4} = -1 \pm 2.$$

$x_1 = -3$ et $x_2 = 1$, donc $f(x) = (x + 3)(x - 1).$

Vérification : $B(1; 0)$ car $f(1) = (1 + 3)(1 - 1) = 0$; $C(-3; 0)$ car $f(-3) = 0.$

□

Les racines sont les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses.

5. Tableau de signes de f .

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$
		$+$	0	$+$

$a = 1 > 0$: positif à l'extérieur des racines -3 et $1.$

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (raisonner); Q2 : 2 pts (calculer); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 2 pts (calculer, communiquer); Q5 : 1 pt (raisonner)

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-033

1. Quantité optimale et profit maximal.

$P(x) = -x^2 + 14x - 40$: on a $a = -1, b = 14, c = -40.$

$$\alpha = -\frac{14}{2 \times (-1)} = 7.$$

Sommet de la parabole : $\alpha = -\frac{b}{2a}.$

$$\beta = P(7) = -49 + 98 - 40 = 9.$$

La quantité optimale est $x = 7$ (centaines d'unités), et le profit maximal est 9 000 €.

2. Intervalle de rentabilité ($P(x) > 0$).

$$P(x) = 0 \iff x^2 - 14x + 40 = 0.$$

$$\Delta = 196 - 160 = 36.$$

$$x_1 = \frac{14 - 6}{2} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{14 + 6}{2} = 10.$$

Comme $a = -1 < 0$, $P(x) > 0$ entre les racines : l'entreprise est rentable pour $x \in]4; 10[$.

3. Condition $P(x) \geq 5$.

a) Reformulation.

$$P(x) \geq 5 \iff -x^2 + 14x - 40 \geq 5 \iff -x^2 + 14x - 45 \geq 0.$$

b) Résolution de $-x^2 + 14x - 45 \geq 0$.

On pose $Q(x) = -x^2 + 14x - 45$, avec $a = -1$, $b = 14$, $c = -45$.

$$\Delta = 196 - 4 \times (-1) \times (-45) = 196 - 180 = 16.$$

$$x_1 = \frac{-14 + 4}{-2} = 5 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-14 - 4}{-2} = 9.$$

Comme $a = -1 < 0$, $Q(x) \geq 0$ pour $x \in [5; 9]$.

Interprétation : pour obtenir un profit d'au moins 5 000 €, l'entreprise doit produire entre 500 et 900 unités par mois.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner); Q2 : 3 pts (calculer, raisonner, communiquer); Q3a : 1 pt (raisonner); Q3b : 2 pts (calculer, communiquer)

1SPE-SECDEG-EX-034

Corrigé

1. Expression de l'aire $A(x)$.

Les deux côtés de l'angle droit ont pour longueurs $(x + 4)$ et $(6 - x)$.

$$A(x) = \frac{1}{2}(x + 4)(6 - x) = \frac{1}{2}(6x - x^2 + 24 - 4x) = \frac{1}{2}(-x^2 + 2x + 24).$$

$$\text{Donc } A(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 12.$$

2. Valeur de x maximisant l'aire.

On étudie $A(x) = \frac{1}{2}(-x^2 + 2x + 24)$. Le sommet de $-x^2 + 2x + 24$ est en :

$$\alpha = -\frac{2}{2 \times (-1)} = 1.$$

Comme $\alpha = 1 \in]0; 6[$, le maximum de A est atteint en $x = 1$:

$$A(1) = \frac{1}{2}(-1 + 2 + 24) = \frac{25}{2} = 12,5 \text{ cm}^2.$$

3. Inéquation $A(x) > 10$.

a) Reformulation.

Résoudre $P(x) = 0$, puis lire le signe avec $a < 0$.

Ramener à une inéquation du second degré.

$a = -1 < 0$: positif entre les racines.

Aire = $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$.

Sommet du trinôme $-x^2 + 2x + 24$:
 $\alpha = -\frac{2}{2 \times (-1)} = 1.$

$$A(x) > 10 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(-x^2 + 2x + 24) > 10 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 24 > 20 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 4 > 0. \quad \square \quad A(x) > 10 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 4 > 0.$$

b) Résolution de $-x^2 + 2x + 4 > 0$.

$$a = -1, b = 2, c = 4.$$

$$\Delta = 4 - 4 \times (-1) \times 4 = 4 + 16 = 20.$$

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{-2} = 1 \mp \sqrt{5}.$$

Donc $x_1 = 1 - \sqrt{5}$ et $x_2 = 1 + \sqrt{5}$.

Comme $a = -1 < 0$, l'inéquation est satisfaite pour $x \in]1 - \sqrt{5}; 1 + \sqrt{5}[$.

c) Intersection avec $]0; 6[$.

$$1 - \sqrt{5} \approx -1,24 < 0 \text{ et } 1 + \sqrt{5} \approx 3,24 < 6.$$

L'ensemble des valeurs acceptables est $x \in]0; 1 + \sqrt{5}[$.

4. Résolution de $A(x) \geq 8$ dans $]0; 6[$.

$$A(x) \geq 8 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 24 \geq 16 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 8 \geq 0.$$

On résout $-x^2 + 2x + 8 = 0$: $a = -1, b = 2, c = 8$.

$$\Delta = 4 + 32 = 36.$$

$$x_1 = \frac{-2 - 6}{-2} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2 + 6}{-2} = -2.$$

Comme $a = -1 < 0$, $-x^2 + 2x + 8 \geq 0$ pour $x \in [-2; 4]$.

En intersectant avec $]0; 6[$, l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} =]0; 4]$.

Ramener à
 $-x^2 + 2x + 8 \geq 0$.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser, calculer); Q2 : 2 pts (calculer); Q3a : 1 pt (calculer); Q3b : 2 pts (calculer); Q3c : 1 pt (raisonner); Q4 : 2 pts (calculer, raisonner)

Corrigé

1SPE-SECDE6-EX-035

1. Formes du trinôme.

a) Coefficients.

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 : a = 1, b = -4, c = 3.$$

b) Forme canonique et sommet.

$$\alpha = -\frac{-4}{2} = 2, \quad \beta = f(2) = 4 - 8 + 3 = -1.$$

Forme canonique : $f(x) = (x - 2)^2 - 1$.

Le sommet est $S(2; -1)$.

c) Discriminant et racines.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4.$$

$$x_1 = \frac{4 - 2}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{4 + 2}{2} = 3.$$

d) Forme factorisée.

$$f(x) = (x - 1)(x - 3).$$

Identifier a, b, c dans
 $ax^2 + bx + c$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a}, \beta = f(\alpha).$$

2. Représentation graphique.

$a = 1 > 0$: parabole tournée vers le haut.

a) Orientation.

Comme $a = 1 > 0$, la parabole est tournée vers le haut (concave vers le bas).

b) Allure. On place le sommet $S(2; -1)$, les racines $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$, et l'ordonnée à l'origine $f(0) = 3$.

c) Axe de symétrie.

L'axe de symétrie est la droite verticale $x = \alpha = 2$.

On vérifie : $\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{1 + 3}{2} = 2$. Les racines sont symétriques par rapport à $x = 2$. $\square$

3. Tableau de signes et position relative.

a) Tableau de signes.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$f(x)$		+	0 - 0	+

b) Inéquation $f(x) < 0$.

$S =]1; 3[$.

c) Courbe sous l'axe des abscisses.

La courbe est au-dessous de l'axe pour $x \in]1; 3[$.

4. Intersection avec la droite $d : y = x - 1$.

a) Équation d'intersection.

$$f(x) = x - 1 \iff x^2 - 4x + 3 = x - 1 \iff x^2 - 5x + 4 = 0.$$

b) Résolution.

$$\Delta = 25 - 16 = 9, \text{ donc } x_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \text{ et } x_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

Les points d'intersection ont pour abscisses $x = 1$ et $x = 4$.

Pour $x = 1 : y = 1 - 1 = 0$, point $I_1(1; 0)$.

Pour $x = 4 : y = 4 - 1 = 3$, point $I_2(4; 3)$.

c) Conclusion.

La droite d est **sécante** à la parabole (deux points d'intersection distincts, car $\Delta = 9 > 0$).

Barème indicatif : Q1 : 4 pts (calculer, communiquer); Q2 : 3 pts (raisonner, communiquer); Q3 : 3 pts (raisonner); Q4 : 4 pts (chercher, calculer, communiquer)

1SPE-SECDEG-EX-036

Corrigé

1. Étude de $f(x) = x^2 - 5x + 4$.

a) Discriminant et racines.

$a = 1, b = -5, c = 4$.

$$\Delta_f = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 25 - 16 = 9.$$

$$x_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

b) Tableau de signes de f .

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$
$f(x)$		+	0 - 0	+

$a = 1 > 0$: positif à l'extérieur des racines.

2. Étude de $g(x) = -x^2 + 3x + 4$.

a) Discriminant et racines.

$$a = -1, b = 3, c = 4.$$

$$\Delta_g = 3^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 9 + 16 = 25.$$

$$x_1 = \frac{-3-5}{-2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-3+5}{-2} = -1.$$

On calcule directement : $x_1 = \frac{-3-5}{2 \times (-1)} = 4$ et $x_2 = \frac{-3+5}{2 \times (-1)} = -1$.

Donc les racines sont -1 et 4 .

b) *Tableau de signes de g.*

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$		
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

$a = -1 < 0$: positif entre les racines.

c) *Racine commune.*

f et g ont toutes deux 4 comme racine : les deux paraboles se coupent sur l'axe des abscisses au point $(4; 0)$.

3. Système $f(x) < 0$ et $g(x) > 0$.

D'après les tableaux :

- $f(x) < 0$ sur $]1; 4[$,
- $g(x) > 0$ sur $] -1; 4[$.

L'intersection est $]1; 4[\cap] -1; 4[=]1; 4[$.

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} =]1; 4[$.

Croiser les deux tableaux de signes.

4. Inéquation produit $f(x) \times g(x) \leq 0$.

a) *Tableau de signes du produit.*

x	$-\infty$	-1	1	4	$+\infty$		
$f(x)$	$+$	$+$	0	$-$	0	$+$	$+$
$g(x)$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$
$f \times g$	$-$	0	$+$	$-$	0	0	$-$

Les racines du produit sont $-1, 1, 4$ (racine double).

b) *Solutions.*

$$f(x) \times g(x) \leq 0 \text{ sur }]-\infty; -1] \cup [1; 4] \cup [4; +\infty[.$$

En simplifiant : $\mathcal{S} =]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$.

5. Inéquation $f(x) + g(x) \leq 0$.

a) *Calcul de* $h(x) = f(x) + g(x)$.

$$h(x) = (x^2 - 5x + 4) + (-x^2 + 3x + 4) = -2x + 8.$$

h est une fonction affine, non un trinôme.

b) *Résolution de* $h(x) \leq 0$.

$$-2x + 8 \leq 0 \Leftrightarrow x \geq 4. \text{ Donc } \mathcal{S} = [4; +\infty[.$$

c) *Remarque.*

La solution de la question 3 était $]1; 4[$ et celle de $h \leq 0$ est $[4; +\infty[$. Ce sont des ensembles différents : la condition $f + g \leq 0$ est plus restrictive que la condition $f < 0$ et $g > 0$ simultanément.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q2 : 3 pts (calculer, raisonner, communiquer) ; Q3 : 2 pts (raisonner) ; Q4 : 3 pts (raisonner, calculer) ; Q5 : 3 pts (chercher, calculer, communiquer)

La somme des deux trinômes peut être plus simple.

Corrigé

1. Modélisation.

Périmètre = $2(x+y) = 20$ m.

a) Expression de y .

$$2(x+y) = 20 \Rightarrow y = 10 - x.$$

b) Aire $A(x)$.

$$A(x) = x \cdot y = x(10 - x) = -x^2 + 10x.$$

2. Étude de la fonction aire.

a) Forme canonique.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = \frac{10}{2} = 5.$$

$$A(x) = -(x^2 - 10x) = -(x^2 - 10x + 25) + 25 = -(x - 5)^2 + 25.$$

b) Maximum.

Comme $a = -1 < 0$, la parabole est tournée vers le bas et le maximum est atteint en $x = \alpha = 5$.

$$A_{\max} = A(5) = -(5 - 5)^2 + 25 = 25 \text{ m}^2.$$

L'aire maximale est 25 m^2 , atteinte pour $x = 5$ m.

c) Nature géométrique.

Si $x = 5$ m, alors $y = 10 - 5 = 5$ m. L'enclos est un **carré** de côté 5 m. Le carré maximise l'aire à périmètre fixé.

3. Contrainte $3 \leq x \leq 8$.

a) Compatibilité.

Vérifier si $\alpha = 5 \in [3; 8]$.

$3 \leq 5 \leq 8$: oui, la valeur optimale $x = 5$ est compatible avec la contrainte.

b) Aire maximale.

L'aire maximale réalisable sous cette contrainte est donc $A(5) = 25 \text{ m}^2$, inchangée.

4. Inéquation $A(x) \geq 21$.

a) Reformulation.

$$A(x) \geq 21 \Leftrightarrow -x^2 + 10x \geq 21.$$

$$-x^2 + 10x \geq 21 \Leftrightarrow 0 \geq x^2 - 10x + 21 \Leftrightarrow x^2 - 10x + 21 \leq 0.$$

□

b) Résolution.

$$a = 1, b = -10, c = 21 : \Delta = 100 - 84 = 16.$$

$$x_1 = \frac{10 - 4}{2} = 3 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{10 + 4}{2} = 7.$$

Comme $a = 1 > 0$, $x^2 - 10x + 21 \leq 0$ pour $x \in [3; 7]$.

Les valeurs de x compatibles avec $A(x) \geq 21$ sont $x \in [3; 7]$.

5. Question ouverte : avec un mur existant.

Un côté (contre le mur) n'utilise pas de clôture.

Avec un mur comme l'un des côtés de longueur x , la clôture ne couvre que trois côtés :

$$x + 2y = 20 \Rightarrow y = \frac{20 - x}{2} = 10 - \frac{x}{2}.$$

L'aire devient :

$$B(x) = x \cdot y = x \left(10 - \frac{x}{2} \right) = 10x - \frac{x^2}{2}.$$

Le sommet est en $\alpha = -\frac{10}{2 \times (-\frac{1}{2})} = 10$, avec $B(10) = 100 - 50 = 50 \text{ m}^2$.

La longueur optimale du côté parallèle au mur est $x = 10$ m, donnant une aire maximale de 50 m^2 , soit le double de 25 m^2 .

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser) ; Q2 : 3 pts (calculer, raisonner, communiquer) ; Q3 : 2 pts (raisonner) ; Q4 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q5 : 3 pts (chercher, modéliser, communiquer)

Corrigé

1SPE - SECDEG - EX - 038

1. Discriminant en fonction de m .a) Calcul de $\Delta(m)$.

$$\Delta(m) = (-2m)^2 - 4 \times 1 \times (m^2 - m - 2) = 4m^2 - 4m^2 + 4m + 8 = 4m + 8.$$

b) Signe de $\Delta(m)$ et nombre de racines.

$$\Delta(m) = 4(m + 2).$$

- ▶ Si $m < -2$: $\Delta < 0$, pas de racine réelle.
- ▶ Si $m = -2$: $\Delta = 0$, une racine double.
- ▶ Si $m > -2$: $\Delta > 0$, deux racines réelles distinctes.

$$\Delta = b^2 - 4ac \text{ avec } b = -2m, \\ c = m^2 - m - 2.$$

Étudier le signe de $4m + 8 = 4(m + 2)$.

2. Cas particuliers.

a) Pour $m = 0$.

$$f_0(x) = x^2 - 2 : \Delta = 8, \text{ donc } x_{1,2} = \pm\sqrt{2}.$$

b) Pour $m = -2$.

$$f_{-2}(x) = x^2 + 4x + (4 + 2 - 2) = x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2.$$

Racine double : $x_0 = -2$. On vérifie : $f_{-2}(-2) = 0$.c) Pour $m = 2$.

$$f_2(x) = x^2 - 4x + (4 - 2 - 2) = x^2 - 4x. \Delta = 16, \text{ racines :}$$

$$x_1 = \frac{4 - 4}{2} = 0 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{4 + 4}{2} = 4.$$

La racine $x_1 = 0$ est remarquable.

3. Forme canonique.

a) Forme canonique de f_m .

$$\alpha = m, \quad \beta = f_m(m) = m^2 - 2m^2 + m^2 - m - 2 = -m - 2.$$

$$f_m(x) = (x - m)^2 - (m + 2).$$

b) Sommet en fonction de m .

Le sommet est $S(m; -m - 2)$: ses coordonnées dépendent toutes deux de m . Lorsque m varie, le sommet se déplace le long de la droite d'équation $\beta = -\alpha - 2$.

4. Valeurs de m pour lesquelles 0 est racine.

a) Condition.

$$f_m(0) = m^2 - m - 2 = 0.$$

$$\Delta_m = 1 + 8 = 9, \text{ donc } m = \frac{1 \pm 3}{2}, \text{ c'est-à-dire } m = -1 \text{ ou } m = 2.$$

b) Factorisation pour ces valeurs.

$$\text{Pour } m = -1 : f_{-1}(x) = x^2 + 2x + 0 = x(x + 2).$$

$$\text{Pour } m = 2 : f_2(x) = x^2 - 4x + 0 = x(x - 4).$$

5. Question ouverte : deux racines strictement positives.

$$f_m(0) = 0 \iff m^2 - m - 2 = 0.$$

Conditions : $\Delta > 0$,
somme des racines > 0
et produit des racines > 0 .

Pour $f_m(x) = x^2 - 2mx + (m^2 - m - 2)$, les relations coefficients-racines donnent :

$$x_1 + x_2 = 2m \quad \text{et} \quad x_1 \cdot x_2 = m^2 - m - 2.$$

Conditions pour deux racines strictement positives :

1. $\Delta(m) > 0 \iff m > -2$.
2. $x_1 + x_2 > 0 \iff 2m > 0 \iff m > 0$.
3. $x_1 \cdot x_2 > 0 \iff m^2 - m - 2 > 0 \iff (m - 2)(m + 1) > 0 \iff m < -1 \text{ ou } m > 2$.

L'intersection des trois conditions : $m > -2$ et $m > 0$ et $(m < -1 \text{ ou } m > 2)$.

La condition $m > 0$ exclut $m < -1$, donc : $m > 0$ et $m > 2$, soit $m > 2$.

f_m admet deux racines strictement positives si et seulement si $m > 2$.

Barème indicatif : Q1 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q2 : 3 pts (calculer) ; Q3 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q4 : 2 pts (calculer) ; Q5 : 4 pts (chercher, raisonner, communiquer)

1SPE-SECDEG-EX-039

Corrigé

1. Recettes et bénéfice.

a) Recette $R(x)$.

Recette = prix unitaire $\times$ quantité.

$$R(x) = x \cdot p(x) = x \left(15 - \frac{x}{10} \right) = 15x - \frac{x^2}{10}.$$

b) Bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$.

$$B(x) = 15x - \frac{x^2}{10} - (200 + 5x) = -\frac{x^2}{10} + 10x - 200.$$

□

2. Optimum de production.

a) Forme canonique.

$$a = -\frac{1}{10}, b = 10 : \alpha = -\frac{10}{2 \times (-\frac{1}{10})} = 50.$$

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{10}{2 \times (-\frac{1}{10})} = -\frac{10}{-\frac{1}{5}} = 50.$$

$$\beta = B(50) = -\frac{2500}{10} + 500 - 200 = -250 + 500 - 200 = 50.$$

$$B(x) = -\frac{1}{10}(x - 50)^2 + 50.$$

b) Maximum.

Pour $x = 50$ unités, le bénéfice est maximal : $B_{\max} = 50$ €.

c) Compatibilité.

$0 \leq 50 \leq 100$: la contrainte est satisfaite.

3. Seuil de rentabilité.

a) Reformulation.

Multiplier par -10 (et inverser le sens de l'inégalité).

$$B(x) > 0 \iff -\frac{x^2}{10} + 10x - 200 > 0 \iff x^2 - 100x + 2000 < 0.$$

□

b) Discriminant et racines.

$$\Delta = 100^2 - 4 \times 2000 = 10000 - 8000 = 2000.$$

$$\sqrt{2000} = \sqrt{400 \times 5} = 20\sqrt{5}.$$

$$x_{1,2} = \frac{100 \pm 20\sqrt{5}}{2} = 50 \pm 10\sqrt{5}.$$

c) Intervalle de rentabilité.

$10\sqrt{5} \approx 22,4$, donc $x_1 \approx 27,6$ et $x_2 \approx 72,4$.

L'entreprise est bénéficiaire pour $x \in]28; 72[$ (valeurs arrondies à l'unité).

4. Équation de seuil $B(x) = 32$.

a) Équation à résoudre.

$$-\frac{x^2}{10} + 10x - 232 = 0 \iff x^2 - 100x + 2320 = 0.$$

$$B(x) = 32 \iff -\frac{x^2}{10} + 10x - 200 = 32.$$

b) Résolution.

$$\Delta = 10000 - 9280 = 720 = 144 \times 5, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 12\sqrt{5}.$$

$$x_{1,2} = \frac{100 \pm 12\sqrt{5}}{2} = 50 \pm 6\sqrt{5}.$$

Il y a deux solutions : $x_1 = 50 - 6\sqrt{5} \approx 36,6$ et $x_2 = 50 + 6\sqrt{5} \approx 63,4$.

Interprétation : un bénéfice de 32 € est atteint pour deux niveaux de production différents, l'un inférieur à l'optimal (50 unités) et l'autre supérieur.

5. Question ouverte : nouveau tarif $p'(x) = 20 - \frac{x}{5}$.

$$R'(x) = x\left(20 - \frac{x}{5}\right) = 20x - \frac{x^2}{5}.$$

$$\text{Nouveau bénéfice : } B'(x) = R'(x) - C(x).$$

$$B'(x) = 20x - \frac{x^2}{5} - 200 - 5x = -\frac{x^2}{5} + 15x - 200.$$

$$\text{Sommet : } \alpha' = -\frac{15}{2 \times (-\frac{1}{5})} = \frac{15}{\frac{2}{5}} = \frac{15 \times 5}{2} = \frac{75}{2} = 37,5.$$

$$\text{Mais } 37,5 \leq 100, \text{ donc } B'_{\max} = B'(37,5) = -\frac{37,5^2}{5} + 15 \times 37,5 - 200 = -281,25 + 562,5 - 200 = 81,25 \text{ €}.$$

Comparaison : $B'_{\max} = 81,25 > 50 = B_{\max}$. Le tarif dégressif plus élevé p' est préférable pour les faibles volumes ($x \leq 37,5$), mais impose un prix de vente plus élevé qui limite la demande. Il faut choisir p' si on peut vendre 38 unités ou moins, car le bénéfice par unité y est plus favorable.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, calculer); Q2 : 3 pts (calculer, raisonner); Q3 : 3 pts (calculer, raisonner, communiquer); Q4 : 2 pts (calculer, communiquer); Q5 : 4 pts (chercher, modéliser, communiquer)

Corrigé

1SPE-SECDEG-EX-040

1. Mise en équation.

a) Calcul des composantes de la vitesse initiale.

$$v_0 \cos(45^\circ) = 20 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 10\sqrt{2} \text{ m/s}.$$

$$\cos(45^\circ) = \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$v_0 \sin(45^\circ) = 10\sqrt{2} \text{ m/s}.$$

b) Expressions de $x(t)$ et $y(t)$.

$$x(t) = 10\sqrt{2}t \quad \text{et} \quad y(t) = 2 + 10\sqrt{2}t - 5t^2.$$

2. Hauteur maximale.

$y(t) = -5t^2 + 10\sqrt{2}t + 2$: trinôme du second degré en t .

a) Identification des coefficients.

$$y(t) = -5t^2 + 10\sqrt{2}t + 2 : a = -5, b = 10\sqrt{2}, c = 2.$$

b) Forme canonique.

$$\alpha = -\frac{10\sqrt{2}}{2 \times (-5)} = \frac{10\sqrt{2}}{10} = \sqrt{2}.$$

$$\beta = y(\sqrt{2}) = 2 + 10\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} - 5 \times 2 = 2 + 20 - 10 = 12.$$

$$y(t) = -5(t - \sqrt{2})^2 + 12.$$

La hauteur maximale est $\beta = 12$ m.

c) Instant et position horizontale.

Le maximum est atteint à $t^* = \sqrt{2}$ s.

Position horizontale : $x(t^*) = 10\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 20$ m.

3. Équation de la trajectoire.

a) Exprimer t en fonction de x .

$$\text{De } x(t) = 10\sqrt{2}t : t = \frac{x}{10\sqrt{2}}.$$

b) Substitution dans $y(t)$.

$$y = 2 + 10\sqrt{2} \cdot \frac{x}{10\sqrt{2}} - 5 \times \left(\frac{x}{10\sqrt{2}} \right)^2 = 2 + x - 5 \times \frac{x^2}{200} = 2 + x - \frac{x^2}{40}.$$

$$\text{Donc } y(x) = -\frac{x^2}{40} + x + 2.$$

□

c) Interprétation.

La trajectoire est une parabole car y est une fonction polynomiale de degré 2 en x (coefficient de x^2 non nul).

4. Portée.

a) Équation $y(x) = 0$.

$$-\frac{x^2}{40} + x + 2 = 0 \iff x^2 - 40x - 80 = 0.$$

$$\Delta = 1600 + 320 = 1920 = 64 \times 30, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 8\sqrt{30}.$$

b) Portée (valeur positive).

$$x = \frac{40 + 8\sqrt{30}}{2} = 20 + 4\sqrt{30}.$$

$$4\sqrt{30} \approx 4 \times 5,477 \approx 21,9, \text{ donc la portée est } \approx 41,9 \text{ m.}$$

5. Question ouverte : obstacle à $x = 30$ m.

$$y(30) = -\frac{900}{40} + 30 + 2 = -22,5 + 32 = 9,5 \text{ m.}$$

Comme $9,5 > 3$, le ballon passe **bien au-dessus** de l'obstacle.

Avec un angle plus faible (ex. 30°), la trajectoire serait moins haute mais plus longue, ce qui pourrait permettre ou non de passer l'obstacle selon les valeurs — un raisonnement qualitatif indique qu'un angle plus faible réduirait la hauteur à $x = 30$ m et risquerait de faire percuter l'obstacle.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer) ; Q2 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 3 pts (chercher, calculer, communiquer) ; Q4 : 3 pts (calculer) ; Q5 : 3 pts (chercher, raisonner, communiquer)

Corrigé

1. Substitution $X = x^2$.a) Équation en X .En posant $X = x^2$, l'équation $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ devient :

$$X^2 - 5X + 4 = 0.$$

$$x^4 = (x^2)^2 = X^2.$$

b) Résolution de l'équation en X .

$$\Delta = 25 - 16 = 9.$$

$$X_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

c) Compatibilité avec $X \geq 0$. $X_1 = 1 \geq 0$ et $X_2 = 4 \geq 0$: les deux valeurs sont compatibles.

2. Solutions de l'équation initiale.

a) Résolution de $x^2 = X$.Pour $X_1 = 1$: $x^2 = 1 \Rightarrow x = -1$ ou $x = 1$.Pour $X_2 = 4$: $x^2 = 4 \Rightarrow x = -2$ ou $x = 2$.L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{-2; -1; 1; 2\}$.

b) Vérification.

Pour $x = \pm 1$: $(\pm 1)^4 - 5(\pm 1)^2 + 4 = 1 - 5 + 4 = 0$. □Pour $x = \pm 2$: $(\pm 2)^4 - 5(\pm 2)^2 + 4 = 16 - 20 + 4 = 0$. □

$$x^2 = k \geq 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{k}.$$

3. Factorisation.

a) Produit de deux trinômes du second degré.

$$x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4).$$

$$x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - X_1)(x^2 - X_2).$$

b) Factorisation complète.

$$(x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2).$$

4. Tableau de signes.

a) Tableau de signes de $(x - 2)(x - 1)(x + 1)(x + 2)$.

x	$-\infty$	-2	-1	1	2	$+\infty$
$P(x)$		+	0	-	0	+

Quatre racines : $-2, -1, 1, 2$. Le polynôme est de degré 4 à coefficients positifs : positif pour $|x|$ grand.

b) Inéquation $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$.D'après le tableau, $P(x) \leq 0$ sur $\mathcal{S} = [-2; -1] \cup [1; 2]$.c) Inéquation $x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0$. $P(x) \geq 0$ sur $\mathcal{S} =]-\infty; -2] \cup [-1; 1] \cup [2; +\infty[$.5. Question ouverte : $x^4 - 5x^2 + k = 0$.En posant $X = x^2$, on obtient $X^2 - 5X + k = 0$, de discriminant $\Delta_k = 25 - 4k$.Cas 1 : $k > \frac{25}{4}$ ($\Delta_k < 0$). Aucune solution réelle en X , donc aucune solution réelle en x .Cas 2 : $k = \frac{25}{4}$ ($\Delta_k = 0$). Une racine double $X_0 = \frac{5}{2} > 0$, donnant $x = \pm \sqrt{\frac{5}{2}}$: deux solutions réelles.

On pose $X = x^2 \geq 0$:
équation
 $X^2 - 5X + k = 0$.

Cas 3 : $0 < k < \frac{25}{4}$ ($\Delta_k > 0$). Deux racines $X_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4k}}{2}$, toutes deux positives (car $X_1 X_2 = k > 0$ et $X_1 + X_2 = 5 > 0$). Chacune donne deux racines en x : quatre solutions réelles.

Cas 4 : $k = 0$. $X_1 = 0$ et $X_2 = 5$: $X_1 = 0$ donne $x = 0$, $X_2 = 5$ donne $x = \pm\sqrt{5}$. Trois solutions réelles (0 est de multiplicité 2 mais compté une fois).

Cas 5 : $k < 0$. $X_1 < 0$ et $X_2 > 0$ (car $X_1 X_2 = k < 0$). Seul $X_2 > 0$ convient, donnant deux solutions réelles $x = \pm\sqrt{X_2}$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer) ; Q2 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 2 pts (calculer) ; Q4 : 4 pts (raisonner) ; Q5 : 4 pts (chercher, raisonner, communiquer)

1SPE-SECDE6-EX-042

Corrigé

1. Modélisation.

a) Relation entre x , y et la longueur de clôture.

La clôture couvre les trois côtés non occupés par le mur :

$$x + 2y = 60.$$

b) Expression de y en fonction de x .

$$y = \frac{60 - x}{2} = 30 - \frac{x}{2}.$$

Vérification : si $0 < x \leq 30$, alors $y = 30 - \frac{x}{2} \geq 30 - 15 = 15 > 0$. □

c) Aire $A(x)$.

$$A(x) = x \cdot y = x \left(30 - \frac{x}{2} \right) = 30x - \frac{x^2}{2}.$$

□

2. Optimisation.

a) Forme canonique.

$$\alpha = 30, \quad \beta = A(30) = 900 - \frac{900}{2} = 450.$$

$$A(x) = -\frac{1}{2}(x - 30)^2 + 450.$$

b) Compatibilité.

$\alpha = 30 \in]0 ; 30]$: la valeur optimale est exactement à la borne supérieure du domaine.

c) Aire maximale et dimensions.

L'aire maximale est $\beta = 450 \text{ m}^2$, atteinte pour $x = 30 \text{ m}$.

Pour $x = 30$: $y = 30 - 15 = 15 \text{ m}$. L'enclos optimal mesure $30 \text{ m} \times 15 \text{ m}$.

3. Comparaison sans mur.

Sans mur, le périmètre est $2(x + y) = 60$, soit $x + y = 30$. L'aire est $A'(x) = x(30 - x)$.

Maximum en $x = 15$: $A'_{\max} = 15 \times 15 = 225 \text{ m}^2$.

Apport du mur : $\frac{450}{225} = 2$. Le mur permet de **doubler** l'aire maximale, car il économise une longueur de clôture, permettant d'agrandir les autres côtés.

4. Contrainte d'aire minimale $A(x) \geq 400$.

a) Reformulation.

Trois côtés : un de longueur x et deux de longueur y .

$$a = -\frac{1}{2}, b = 30 : \alpha = -\frac{30}{2 \times (-\frac{1}{2})} = 30.$$

$$\text{Quatre côtés : } 2(x + y) = 60 \Rightarrow x + y = 30.$$

$$30x - \frac{x^2}{2} \geq 400 \iff -\frac{x^2}{2} + 30x - 400 \geq 0 \iff x^2 - 60x + 800 \leq 0.$$

□ Multiplier par -2 et inverser le sens de l'inégalité.

b) *Résolution.*

$$\Delta = 3600 - 3200 = 400.$$

$$x_1 = \frac{60 - 20}{2} = 20 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{60 + 20}{2} = 40.$$

Comme $a = 1 > 0$, $x^2 - 60x + 800 \leq 0$ pour $x \in [20; 40]$.

c) *Valeurs de x réalisables.*

On intersecte avec $]0; 30] : [20; 40] \cap]0; 30] = [20; 30]$.

Les valeurs de x réalisables avec une aire d'au moins 400 m^2 sont $x \in [20; 30]$.

5. Question ouverte : supplément de clôture.

Avec $60 + L$ mètres de clôture ($L > 0$) :

Longueur totale disponible : $60 + L \text{ m}$.

$$x + 2y = 60 + L \implies y = \frac{60 + L - x}{2}.$$

$$A(x) = x \cdot \frac{60 + L - x}{2} = \frac{1}{2} [(60 + L)x - x^2].$$

Le maximum est atteint en $\alpha = \frac{60 + L}{2}$ (si $\alpha \leq 30$, sinon en $x = 30$).

Si $\frac{60 + L}{2} \leq 30$, c'est-à-dire $L \leq 0$, hors domaine. Donc pour $L > 0$, le sommet est en $\alpha = \frac{60 + L}{2} > 30$, et la fonction est croissante sur $]0; 30]$.

Le maximum sur $]0; 30]$ est alors atteint en $x = 30$:

$$A_{\max}(L) = 30 \cdot \frac{60 + L - 30}{2} = 30 \cdot \frac{30 + L}{2} = 15(30 + L) = 450 + 15L.$$

On cherche $A_{\max}(L) \geq 600$:

$$450 + 15L \geq 600 \implies 15L \geq 150 \implies L \geq 10.$$

L'agriculteur doit acheter au minimum **10 m** de clôture supplémentaire pour atteindre une aire de 600 m^2 .

Barème indicatif : Q1 : 3 pts (modéliser, calculer) ; Q2 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q4 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q5 : 4 pts (chercher, modéliser, calculer, communiquer)

CHAPITRE 3

Dérivation : point de vue local

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer et interpréter un taux de variation et la pente d'une sécante.
- ▶ C2 — Je sais interpréter un nombre dérivé comme une pente ou une vitesse instantanée.
- ▶ C3 — Je sais lire un nombre dérivé sur un graphique et construire la tangente correspondante.
- ▶ C4 — Je sais écrire l'équation d'une tangente à partir de l'abscisse, de l'image et du nombre dérivé.
- ▶ C5 — Je sais approcher $f(a+h)$ avec l'approximation linéaire au voisinage de a .

Un vélo équipé d'un capteur fournit la distance parcourue en fonction du temps. Comment déterminer sa vitesse exacte à l'instant $t = 12$ s, alors que les mesures disponibles donnent seulement des vitesses moyennes sur de courts intervalles ?

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 7 h

3.1 Taux de variation et sécantes

DÉFINITION TAUX DE VARIATION

Soit f une fonction définie en deux réels distincts a et b . Le **taux de variation** de f entre a et b est le nombre

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Il mesure la variation moyenne de f lorsque la variable passe de a à b .

Exemple. Pour $f(x) = x^2$, entre 1 et 3, le taux de variation vaut


$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4.$$

En moyenne, l'image augmente de 4 lorsque x augmente de 1 sur cet intervalle.

Contre-exemple. L'expression $\frac{f(a) - f(a)}{a - a}$ n'est pas un taux de variation : le dénominateur est nul. Il faut deux abscisses distinctes.

Propriété Pente de la sécante. Dans un repère, la droite passant par les points $A(a; f(a))$ et $B(b; f(b))$ de la courbe de f est une **sécante**. Son coefficient directeur est le taux de variation de f entre a et b .

Exemple. Les points $A(1; 1)$ et $B(3; 9)$ de la courbe de la fonction carré déterminent une sécante de coefficient directeur 4.



a pour pente le taux de variation $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = 4$.

Figure 1 — La sécante (AB)

Contre-exemple. La droite verticale passant par A n'est pas la sécante AB : elle ne passe pas en général par B et n'a pas de coefficient directeur.

ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $\frac{f(b) - f(a)}{b}$ oublie la distance horizontale entre les deux abscisses. Il faut diviser par $b - a$, et non par b .

Toujours conserver le même ordre : « arrivée moins départ » au numérateur et au dénominateur. Les deux signes se correspondent.

ERREUR FRÉQUENTE

Inverser une seule différence, par exemple $\frac{f(b) - f(a)}{a - b}$, change le signe du résultat. On fixe l'ordre a puis b dans les deux lignes.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre le taux de variation avec $f(b) - f(a)$. Cette dernière quantité est une variation d'image ; le taux de variation compare aussi cette variation à celle de x .

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour une position $d(t)$ exprimée en mètres, le taux de variation entre deux instants est $\frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$, une vitesse moyenne en mètres par seconde. Lorsque l'intervalle de temps se resserre autour d'un instant, ces vitesses moyennes préparent la notion de vitesse instantanée étudiée dans la section suivante.

3.2 Du taux de variation au nombre dérivé

DÉFINITION NOMBRE DÉRIVÉ

Soit f une fonction et a un réel. Lorsque les taux de variation de f entre a et $a + h$ se rapprochent d'un même nombre lorsque h est très proche de 0, ce nombre est le **nombre dérivé** de f en a . On le note $f'(a)$.

Exemple. Pour la fonction carré, au voisinage de 2, les taux de variation $\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ sont proches de 4 lorsque h est proche de 0. On retient $f'(2) = 4$.

Contre-exemple. Le nombre $f'(2)$ ne se calcule pas en remplaçant h par 0 dans le quotient : ce quotient n'est alors pas défini.

Propriété Interprétation géométrique. Si $f'(a)$ existe, il est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

Exemple. Si $f'(3) = -2$, la tangente descend de 2 unités quand on avance d'une unité : sa pente est négative.

Contre-exemple. Une pente négative ne signifie pas que toutes les images de f sont négatives ; elle indique seulement un comportement local de la courbe.




Figure 2 — Les sécantes (pointillées) convergent vers la tangente (trait plein or) lorsque $h \rightarrow 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : « $f'(a) = f(a)$. » **Correction :** $f(a)$ est l'ordonnée du point de la courbe ; $f'(a)$ est la pente de la tangente en ce point.

ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : « La vitesse instantanée est la distance parcourue. » **Correction :** si d est une distance, $d'(t)$ est une vitesse ; l'unité est par exemple m/s.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour $f(x) = x^2$, $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = 2a + h$ pour $h \neq 0$. Ces nombres sont aussi proches que l'on veut de $2a$ lorsque h se rapproche de 0. Ainsi $f'(a) = 2a$; ce calcul éclaire l'intuition sans imposer une définition formelle de limite.

On classe les sécantes à la tangente en les sécantes sur lesquelles on a des points de la courbe et la tangente est la limite de la courbe en ce point.

3.3 Lire et construire une tangente

DÉFINITION TANGENTE

Lorsque f admet un nombre dérivé en a , la **tangente** à sa courbe au point $A(a; f(a))$ est la droite qui passe par A et dont le coefficient directeur est $f'(a)$.

Exemple. Si $A(2; 5)$ appartient à la courbe et si $f'(2) = -3$, la tangente passe par A et descend de 3 unités lorsque l'on avance d'une unité.

Contre-exemple. Une droite coupant la courbe en deux points distincts est une sécante ; elle n'est pas nécessairement la tangente au premier point.

Propriété Lecture sur un quadrillage. Pour déterminer graphiquement $f'(a)$, on choisit deux points lisibles sur la droite tangente, puis on calcule « déplacement vertical / déplacement horizontal ».

Exemple. Une tangente passe par les intersections $(1; 2)$ et $(3; 3)$. Sa pente vaut $\frac{3-2}{3-1} = \frac{1}{2}$.

Contre-exemple. Prendre deux points de la courbe au lieu de deux points de la tangente donne la pente d'une sécante, pas le nombre dérivé demandé.




Figure 3 — On lit la pente de la tangente en choisissant deux points sur la droite, pas sur la courbe.

Pour éviter une lecture imprécise, appliquez le procédé de la tangente et choisissez deux intersections du quadrillage éloignées l'une de l'autre.

ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : lecture de l'ordonnée de A comme nombre dérivé. **Correction :** l'ordonnée est $f(a)$; le nombre dérivé est la pente de la droite tangente.

ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : droite « à peu près parallèle » ne passant pas par A. **Correction :** une tangente doit passer exactement par son point de contact.

POUR ALLER PLUS LOIN

Procédé graphique complet : 1. repérer le point de contact ; 2. tracer ou identifier la tangente ; 3. choisir deux intersections nettes de cette droite avec le quadrillage ; 4. calculer le rapport des déplacements en conservant leur signe ; 5. pour la construction, placer depuis A un second point par le même déplacement, puis relier les deux points.

3.4 Équation de la tangente

THÉORÈME ÉQUATION DE LA TANGENTE

Si f admet un nombre dérivé en a , la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

L'hypothèse de dérivabilité en a est nécessaire : elle garantit que la pente $f'(a)$ existe.

Exemple. Si $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$, la tangente a pour équation $y = 3 + 2(x - 1)$, soit $y = 2x + 1$.

Contre-exemple. L'équation $y = f'(a)x$ oublie en général l'ordonnée $f(a)$: avec les données précédentes, $y = 2x$ ne passe pas par $(1; 3)$.

Propriété Vérification. Dans l'équation de la tangente, remplacer x par a donne $y = f(a)$. La droite passe donc par le point de contact.

Exemple. Pour $y = 3 + 2(x - 1)$, remplacer x par 1 donne $y = 3$.

Contre-exemple. Une droite de pente 2 passant par $(0;3)$, d'équation $y = 2x + 3$, n'est pas la tangente précédente : elle ne passe pas par $(1;3)$.




Figure 4 — La tangente passe par A avec la pente $f'(a)$.

ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : $y = f(a) + f'(a)(x + a)$. **Correction :** l'écart horizontal se mesure par $x - a$, donc le signe est négatif.

Enfin, les trois informations séparées a , $f(a)$ et $f'(a)$ peuvent être regroupées en une seule : $f(a)$ et $f'(a)$ peuvent ensuite développer si nécessaire.

ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : $y = f(a) + f'(x)(x - a)$. **Correction :** on cherche une droite : sa pente est le nombre fixe $f'(a)$, non une quantité dépendant de x .

POUR ALLER PLUS LOIN

Démonstration exigible. Toute droite de coefficient directeur m passant par $A(a; f(a))$ vérifie $y - f(a) = m(x - a)$. En effet, pour tout point $M(x; y)$ de la droite distinct de A , son coefficient directeur est $\frac{y - f(a)}{x - a} = m$, d'où l'égalité; elle reste vraie pour $x = a$. La tangente possède le coefficient directeur $m = f'(a)$. On obtient donc $y = f(a) + f'(a)(x - a)$. Réciproquement, la droite ainsi définie passe par A et possède la pente $f'(a)$: elle est bien la tangente.

3.5 Approximation linéaire

DÉFINITION APPROXIMATION LINÉAIRE

Si f admet un nombre dérivé en a et si h est proche de 0, la valeur $f(a + h)$ peut être approchée par

$$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h.$$

Cette approximation utilise l'ordonnée de la tangente au voisinage de a .

Exemple. Pour $f(x) = x^2$, au voisinage de 3, $f(3,02) \approx 9 + 6 \times 0,02 = 9,12$.

Contre-exemple. Ce n'est pas une égalité : $3,02^2 = 9,1204$, différent de 9,12.

Propriété Choix de h . L'approximation est conçue pour un incrément h petit. Elle est d'autant plus pertinente que $a + h$ est proche de a .

Exemple. Pour approcher $f(4,03)$ au voisinage de 4, on choisit $h = 0,03$.

Contre-exemple. Approcher $f(10)$ au voisinage de 4 avec $h = 6$ ne relève plus d'une approximation locale fiable.




Figure 5 — Au voisinage de a , la tangente approxime la courbe : l'écart est petit quand h est petit.

À partir de la suite de l'équation de la tangente, on évalue $f(a+h)$ en évitant d'oublier le facteur h . $a+h$ donne immédiatement $f(a) + f'(a)h$.

ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : $f(a+h) = f(a) + f'(a)h$. **Correction :** écrire $\approx$; l'écart exact n'est pas étudié dans ce chapitre.

ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)$. **Correction :** la variation dépend de h ; il faut multiplier la pente par l'écart horizontal.

POUR ALLER PLUS LOIN

Sur la courbe de f , le point d'abscisse $a+h$ est proche du point de la tangente d'abscisse $a+h$. Cette lecture géométrique explique le signe : si $f'(a) < 0$ et $h > 0$, l'estimation est inférieure à $f(a)$.

MÉTHODE M1 — CALCULER UN TAUX DE VARIATION

Quand l'utiliser. Je l'utilise lorsque l'énoncé demande un taux de variation, une variation moyenne, une pente de sécante ou une vitesse moyenne entre deux instants.

La méthode pas à pas.

1. Je repère les deux abscisses distinctes a et b .
2. Je calcule séparément $f(a)$ et $f(b)$.

3. J'écris $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ sans changer l'ordre.
 4. Je simplifie et j'indique l'unité si le contexte en fournit une.

Exemple rédigé. Pour $g(x) = 2x^2 - 1$, calculons le taux de variation entre 1 et 4. $g(1) = 1$ et $g(4) = 31$. Ainsi

$$\frac{g(4) - g(1)}{4 - 1} = \frac{31 - 1}{3} = 10.$$

Le taux de variation de g entre 1 et 4 est 10.

Les pièges.

- ▶ Écrire $\frac{31-1}{4}$: il manque -1 au dénominateur.
- ▶ Écrire $\frac{1-31}{4-1}$: les deux différences ne suivent plus le même ordre.
- ▶ Écrire seulement $31 - 1 = 30$: c'est la variation d'image, pas le taux de variation.

Vérifier son résultat. Je vérifie que le signe est cohérent avec le sens de variation observé. Ici g augmente sur $[1; 4]$ et le résultat 10 est positif.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Je calcule les deux
 différences, j'écris
 l'expression, j'observe l'ordre 1 puis
 4.

MÉTHODE M2 — INTERPRÉTER UN NOMBRE DÉRIVÉ

Quand l'utiliser. Mots-clés : vitesse instantanée, pente au point, coût marginal, nombre dérivé.

La méthode pas à pas.

1. Je repère le point ou l'instant a .
2. Je lis ou utilise $f'(a)$.
3. Je donne son sens : pente de tangente ou variation instantanée.
4. J'ajoute l'unité adaptée.

Exemple rédigé. Une distance d est en mètres et $d'(5) = 7$. À 5 s, la vitesse instantanée est 7 m/s.

Les pièges. Ne pas donner $d(5)$ à la place de $d'(5)$; ne pas répondre « 7 mètres » ; ne pas parler de vitesse moyenne sans intervalle.

Vérifier son résultat. Une vitesse positive correspond à une position qui augmente localement.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

Je ne confonds pas cette
 vitesse avec $d(5)$.

MÉTHODE M3 — LIRE OU CONSTRUIRE UNE TANGENTE

Quand l'utiliser. Mots-clés : lire graphiquement $f'(a)$, pente de la tangente, tracer la tangente.

La méthode pas à pas.

1. Je place $A(a; f(a))$.
2. Je prends deux points de la tangente pour lire sa pente.
3. Pour construire, j'utilise un déplacement horizontal simple puis le déplacement vertical imposé par la pente.

Exemple rédigé. La tangente en $A(2; 1)$ a une pente $\frac{1}{2}$. Je place $(4; 2)$ puis je trace la droite passant par ces deux points.

J'avance de 2 et je monte
 de 1.

Les pièges. Lire deux points de la courbe au lieu de la droite ; oublier que la tangente passe par A ; inverser montée et déplacement horizontal.

Vérifier son résultat. Je contrôle que la droite tracée contient le point de contact.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Quand l'utiliser. Mots-clés : équation de la tangente en a , droite tangente à C_f .

La méthode pas à pas.

1. Je calcule ou lis $f(a)$.
2. Je repère $f'(a)$.
3. J'écris $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.
4. Je développe seulement si une forme réduite est demandée.

Exemple rédigé. Pour $f(2) = -1$ et $f'(2) = 3$, la tangente est $y = -1 + 3(x - 2) = 3x - 7$.

Les pièges. Oublier $f(a)$; écrire $x + a$; utiliser $f'(x)$ au lieu de $f'(a)$.

Vérifier son résultat. Je remplace x par a : l'ordonnée doit redevenir $f(a)$.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — APPROCHER UNE IMAGE AVEC LA TANGENTE

Quand l'utiliser. Mots-clés : valeur approchée, voisinage de a , $a + h$, approximation linéaire.

La méthode pas à pas.

1. J'écris le nombre cherché sous la forme $a + h$ avec h petit.
2. Je calcule $f(a)$ et $f'(a)$.
3. Je calcule $f(a) + f'(a)h$.
4. Je conclus avec $\approx$.

Exemple rédigé. Sachant $f(4) = 5$ et $f'(4) = -2$, approchons $f(4,03)$. Ici $h = 0,03$, donc $f(4,03) \approx 5 - 2 \times 0,03 = 4,94$.

Les pièges. Employer $=$; oublier h ; choisir un h non proche de zéro sans avertissement.

Vérifier son résultat. Si $f'(a) < 0$ et $h > 0$, l'approximation doit être inférieure à $f(a)$.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

1SPE-DERLOCAL-EX-001
⌚ 5 min

Exercice 1

Soit $f(x) = x^2 + 1$. Calculer le taux de variation de f entre 1 et 4.

1SPE-DERLOCAL-EX-002
⌚ 6 min

Exercice 2

Pour $g(x) = 2x + 1$, calculer le taux de variation entre 0 et 4.

Exercice 3 ♦♦

1SPE-DERLOCAL-EX-003

⌚ 12 min

Un véhicule part à l'arrêt. On note $d(t)$ la distance parcourue, en kilomètres, après t heures de trajet. On relève $d(0) = 0$, $d(2) = 80$ et $d(5) = 275$.

1. Calculer le taux de variation de d entre 0 et 2. Interpréter le résultat en précisant son unité.
2. Calculer le taux de variation de d entre 2 et 5. Interpréter.
3. Le véhicule a-t-il roulé plus vite en moyenne sur les deux premières heures ou sur les trois suivantes ? Justifier.

Exercice 4 ♦♦

1SPE-DERLOCAL-EX-004

⌚ 15 min

Une entreprise fabrique des pièces mécaniques. Le coût total de production, en euros, pour q pièces fabriquées est modélisé par la fonction C définie sur $[0; 500]$. On sait que $C(100) = 850$ et $C(200) = 1500$.

1. Calculer le taux de variation de C entre 100 et 200.
2. Ce taux de variation s'appelle le **coût moyen par pièce supplémentaire** sur cet intervalle. Interpréter la valeur obtenue par une phrase.
3. La sécante à la courbe de C passant par les points d'abscisses 100 et 200 a-t-elle un coefficient directeur positif ou négatif ? Justifier sans tracer la courbe.

Exercice 5 ♦♦♦

1SPE-DERLOCAL-EX-005

⌚ 15 min

On considère la fonction carré $f(x) = x^2$.

1. Calculer le taux de variation de f entre 1 et 3, entre 2 et 4, entre 0 et 5.
2. Conjecturer une formule donnant le taux de variation de f entre deux réels distincts a et b en fonction de a et b .
3. Démontrer cette conjecture en factorisant $b^2 - a^2$.
4. En déduire que la sécante à la parabole passant par les points d'abscisses a et b a pour coefficient directeur $a + b$.

Exercice 6 ♦♦♦

1SPE-DERLOCAL-EX-006

⌚ 20 min

On pose $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x$. On fixe $a = 1$.

1. Pour $h = 1$, $h = 0,5$ et $h = 0,1$, calculer le taux de variation de f entre a et $a + h$, puis celui de g entre a et $a + h$.
2. Que semble-t-il se passer lorsque h se rapproche de 0 ? Formuler une conjecture.
3. Exprimer, pour tout $h \neq 0$, le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$ en fonction de h .
4. Justifier que ces taux se rapprochent de 2 lorsque h se rapproche de 0. Comparer avec le résultat obtenu pour g .
5. Interpréter géométriquement : que peut-on dire de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 et de la droite représentant g ?

Exercice 7 ♦

1SPE-DERLOCAL-EX-007

⌚ 8 min

Soit $f(x) = x^2 + 2x$.

1. Calculer le taux de variation de f entre 3 et $3 + h$ pour $h = 1$, $h = 0,1$ et $h = 0,01$.
2. Vers quelle valeur semblent tendre ces taux lorsque h se rapproche de 0 ?
3. En déduire $f'(3)$.

1SPE-DERLOCAL-EX-008

8 min

Exercice 8

On considère $f(x) = 3x^2$.

1. Exprimer $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ en fonction de h (pour $h \neq 0$).
2. En déduire la valeur de $f'(2)$.

1SPE-DERLOCAL-EX-009

15 min

Exercice 9

Un objet en chute libre a parcouru une distance $d(t) = 5t^2$ mètres après t secondes.

1. Calculer $d(3)$ et $d(3,1)$. En déduire le taux de variation de d entre 3 et 3,1.
2. Exprimer $\frac{d(3+h) - d(3)}{h}$ en fonction de h pour $h \neq 0$.
3. En déduire $d'(3)$.
4. Interpréter $d'(3)$ dans le contexte de la chute libre. Préciser l'unité.

1SPE-DERLOCAL-EX-010

12 min

Exercice 10

Soit $f(x) = x^3$.

1. Développer $(1+h)^3$.
2. En déduire l'expression de $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ en fonction de h pour $h \neq 0$.
3. Déterminer $f'(1)$.
4. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.

1SPE-DERLOCAL-EX-011

20 min

Exercice 11

On veut déterminer $f'(a)$ pour la fonction carré $f(x) = x^2$, où a est un réel quelconque.

1. Développer $(a+h)^2$ et en déduire $f(a+h) - f(a)$.
2. Exprimer $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour $h \neq 0$ et simplifier.
3. En déduire $f'(a)$ pour tout réel a .
4. Que vaut $f'(0)$? $f'(-1)$? $f'(5)$?
5. Pour quelle valeur de a a-t-on $f'(a) = 0$? Interpréter géométriquement.

1SPE-DERLOCAL-EX-012

20 min

Exercice 12

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Vérifier que, pour $h \neq 0$ et $1+h > 0$:

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{-1}{1+h}.$$

2. En déduire $f'(1)$.
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.
4. Cette tangente coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Si oui, en quel point ?

1SPE-DERLOCAL-EX-013

8 min

Exercice 13

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(2) = 5$ et $f'(2) = 3$.

1. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 2.
2. On souhaite tracer cette tangente sur un quadrillage. La tangente passe par le point $A(2; 5)$ avec une pente de 3 : lorsque l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée augmente de 3. Donner les coordonnées d'un deuxième point B de la tangente.

3. Lire l'ordonnée du point de la tangente d'abscisse 4.

Exercice 14 ♦

1SPE-DERLOCAL-EX-014
⌚ 8 min

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On sait que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 passe par les points $A(1; 3)$ et $B(4; 0)$.

1. Déterminer la valeur de $f(1)$.
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente.
3. En déduire la valeur de $f'(1)$.

Exercice 15 ♦♦

1SPE-DERLOCAL-EX-015
⌚ 12 min

La température T (en °C) dans un local technique est modélisée par une fonction du temps t (en heures), pour $t \in [0; 24]$. On dispose de la courbe de la fonction T sur cet intervalle.

On a tracé la tangente à la courbe au point d'abscisse $t = 6$. Cette tangente passe par les points de coordonnées $(6; 18)$ et $(10; 14)$.

1. Déterminer la valeur de $T(6)$. Interpréter ce résultat dans le contexte.
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 6.
3. En déduire la valeur de $T'(6)$.
4. Interpréter le signe de $T'(6)$ dans le contexte de l'exercice. Rédiger une phrase utilisant les unités appropriées.

Exercice 16 ♦♦

1SPE-DERLOCAL-EX-016
⌚ 15 min

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On donne :

$$f(1) = 2, \quad f'(1) = -1, \quad f(3) = 4, \quad f'(3) = 2.$$

1. Déterminer l'équation de la tangente T_1 à la courbe de f au point d'abscisse 1.
2. Déterminer l'équation de la tangente T_2 à la courbe de f au point d'abscisse 3.
3. Les droites T_1 et T_2 sont-elles sécantes ? Si oui, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

Exercice 17 ♦♦♦

1SPE-DERLOCAL-EX-017
⌚ 20 min

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et sa courbe représentative $\mathcal{D}$ (la parabole).

Soit P le point de coordonnées $(0; -1)$.

1. Vérifier que le point P n'appartient pas à la courbe $\mathcal{D}$.
2. Soit a un réel. Écrire l'équation de la tangente T_a à $\mathcal{D}$ au point d'abscisse a .
3. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles la tangente T_a passe par le point P .
4. En déduire les coordonnées des points de $\mathcal{D}$ où la tangente passe par P .

Exercice 18 ♦♦♦

1SPE-DERLOCAL-EX-018
⌚ 20 min

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 6x - 1$.

1. Soit a un réel. Écrire l'équation de la tangente T_a à la courbe de f au point d'abscisse a , puis préciser son coefficient directeur.
2. Existe-t-il un point de la courbe de f en lequel la tangente est parallèle à $\mathcal{D}$? Justifier.
3. Si oui, déterminer les coordonnées de ce point et écrire l'équation de la tangente correspondante.

1SPE-DERLOCAL-EX-019
⌚ 8 min

Exercice 19 ◆

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$.

1. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 1.
2. Vérifier que la tangente passe bien par le point $(1 ; 3)$.

1SPE-DERLOCAL-EX-020
⌚ 8 min

Exercice 20 ◆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$. On admet que $f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

1. Calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.
2. En déduire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse -1 .

1SPE-DERLOCAL-EX-021
⌚ 12 min

Exercice 21 ◆◆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 5$. On admet que $f'(x) = 2x - 4$.

1. Calculer $f(3)$ et $f'(3)$.
2. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 3.
3. La tangente T coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Si oui, déterminer les coordonnées du point d'intersection.

1SPE-DERLOCAL-EX-022
⌚ 15 min

Exercice 22 ◆◆

Une entreprise fabrique et vend q articles par jour ($q \geq 0$). Son bénéfice, en euros, est modélisé par la fonction B définie par :

$$B(q) = -2q^2 + 120q - 1000.$$

On admet que $B'(q) = -4q + 120$.

1. Calculer $B(20)$ et $B'(20)$.
2. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de B au point d'abscisse $q = 20$.
3. Interpréter le signe de la pente de cette tangente dans le contexte économique (bénéfice marginal).

1SPE-DERLOCAL-EX-023
⌚ 20 min

Exercice 23 ◆◆◆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. On admet que $f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

1. Écrire l'équation de la tangente T_a à la courbe de f au point d'abscisse a .
2. Déterminer la ou les valeurs de a pour lesquelles la tangente T_a passe par l'origine $O(0 ; 0)$.
3. Écrire l'équation de la ou des tangentes trouvées.

1SPE-DERLOCAL-EX-024
⌚ 20 min

Exercice 24 ◆◆◆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x + 3$. On admet que $f'(x) = 2x - 2$.

1. Pour quelle valeur de a la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est-elle horizontale ? Écrire l'équation de cette tangente.
2. Pour quelle valeur de a la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est-elle parallèle à la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 4x$? Écrire l'équation de cette tangente.

1SPE-DERLOCAL-EX-025
⌚ 8 min

Exercice 25 ◆

Soit $f(x) = -x^2 + 6x - 3$. On admet que $f'(x) = -2x + 6$.

1. Calculer $f(4)$ et $f'(4)$.
2. En utilisant l'approximation linéaire, donner une valeur approchée de $f(4,03)$.
3. Calculer la valeur exacte de $f(4,03)$ et comparer.

Exercice 26 ◆

1SPE-DERLOCAL-EX-026
⌚ 8 min

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. On admet que $f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

1. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de $a = 3$, donner une valeur approchée de $f(3,02)$.
2. De la même manière, approcher $f(2,98)$.
3. Calculer les valeurs exactes de $3,02^2$ et $2,98^2$, puis comparer avec les approximations.

Exercice 27 ◆◆

1SPE-DERLOCAL-EX-027
⌚ 12 min

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$. On admet que $f'(9) = \frac{1}{6}$.

1. Rappeler la valeur de $f(9)$.
2. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de 9, donner une valeur approchée de $\sqrt{9,1}$ sous forme de fraction.
3. À l'aide de la calculatrice, donner la valeur de $\sqrt{9,1}$ arrondie au dix-millième, puis calculer l'erreur commise par l'approximation.

Exercice 28 ◆◆

1SPE-DERLOCAL-EX-028
⌚ 15 min

La population $P(t)$ d'une ville est modélisée par une fonction dérivable du temps t (en années). On sait que $P(10) = 25\,000$ habitants et $P'(10) = 800$ habitants par an.

1. Interpréter la valeur de $P'(10)$ dans le contexte de l'exercice.
2. En utilisant l'approximation linéaire, estimer $P(10,5)$.
3. De la même manière, estimer $P(12)$.
4. Laquelle de ces deux estimations est la plus fiable ? Justifier.

Exercice 29 ◆◆◆

1SPE-DERLOCAL-EX-029
⌚ 20 min

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. On admet que $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$ pour tout $a > 0$.

1. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de $a = 2$, donner une valeur approchée de $\frac{1}{2,01}$.
2. Calculer la valeur exacte de $\frac{1}{2,01}$ sous forme de fraction.
3. On pose $h = x - a$. Montrer que l'erreur commise par l'approximation linéaire est :

$$E(h) = f(a+h) - [f(a) + f'(a) \cdot h] = \frac{h^2}{a^2(a+h)}.$$

4. Vérifier cette formule avec les valeurs de la question 1.

Exercice 30 ◆◆◆

1SPE-DERLOCAL-EX-030
⌚ 20 min

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. On admet que $f'(a) = 3a^2$ pour tout réel a .

1. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de $a = 1$, donner une valeur approchée de $1,02^3$. Calculer la valeur exacte et l'erreur commise.
2. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de $a = 2$, donner une valeur approchée de $2,01^3$. Calculer la valeur exacte et l'erreur commise.
3. Comparer les erreurs des deux questions précédentes. Expliquer le rôle de la taille de h dans cette comparaison.

1SPE-DERLOCAL-EX-031
⌚ 5 min

Exercice 31 ♦

Soit $f(x) = 3x - x^2$. Calculer le taux de variation de f entre 0 et 2.

1SPE-DERLOCAL-EX-032
⌚ 8 min

Exercice 32 ♦

On considère une fonction f dont on connaît les valeurs suivantes :

x	1	3	5	7
$f(x)$	2	10	26	50

1. Calculer le taux de variation de f entre $x = 1$ et $x = 5$.
2. Calculer le taux de variation de f entre $x = 3$ et $x = 7$.

1SPE-DERLOCAL-EX-033
⌚ 8 min

Exercice 33 ♦

Soit $f(x) = x^3$. Calculer $f'(1)$ en calculant le taux de variation $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$, puis en faisant tendre h vers 0.

1SPE-DERLOCAL-EX-034
⌚ 5 min

Exercice 34 ♦

On considère une fonction f dérivable en a . On a calculé le taux de variation $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour plusieurs valeurs de h :

h	0,1	0,01	0,001
$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$	6,1	6,01	6,001

Vers quelle valeur semble tendre le taux de variation lorsque h tend vers 0 ? En déduire la valeur de $f'(a)$.

1SPE-DERLOCAL-EX-035
⌚ 8 min

Exercice 35 ♦

On sait que $f(2) = 3$ et $f'(2) = -1$. Tracer, sur un repère, la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2.

On précisera les coordonnées d'au moins deux points de cette tangente.

1SPE-DERLOCAL-EX-036
⌚ 5 min

Exercice 36 ♦

Sur un graphique, la tangente à la courbe d'une fonction f au point $A(1; 2)$ passe par le point $B(3; 6)$.

Déterminer $f'(1)$.

1SPE-DERLOCAL-EX-037
⌚ 5 min

Exercice 37 ♦

Soit $f(x) = x^2$. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3.

Exercice 38 ◆

1SPE-DERLOCAL-EX-038

⌚ 5 min

En utilisant l'approximation affine de $f(x) = \sqrt{x}$ au voisinage de $a = 4$, donner une valeur approchée de $\sqrt{4,02}$.

Exercice 39 ◆◆

1SPE-DERLOCAL-EX-039

⌚ 12 min

Une entreprise fabrique q pièces par jour. Le coût de production, en euros, est modélisé par la fonction :

$$C(q) = 0,5q^2 + 3q + 100$$

1. Calculer $C(10)$ et $C(12)$.
2. Calculer le taux de variation de C entre $q = 10$ et $q = 12$.
3. Interpréter ce résultat en termes de coût marginal moyen.

Exercice 40 ◆◆

1SPE-DERLOCAL-EX-040

⌚ 12 min

On modélise la température d'un four, en degrés Celsius, après extinction par la fonction :

$$T(t) = 100 - 2t^2$$

où t est le temps écoulé en minutes, avec $0 \leq t \leq 7$.

1. Calculer $T(0)$ et $T(5)$.
2. Calculer le taux de variation de T entre $t = 0$ et $t = 5$.
3. Interpréter le signe de ce taux de variation dans le contexte du problème.

Exercice 41 ◆◆

1SPE-DERLOCAL-EX-041

⌚ 15 min

La population d'une ville est modélisée par la fonction :

$$P(t) = 500 + 100t + 5t^2$$

où t est le nombre d'années écoulées depuis 2010 et $P(t)$ est exprimé en milliers d'habitants.

1. Calculer $P(4)$ et exprimer $P(4 + h)$ en fonction de h .
2. En déduire le taux de variation $\frac{P(4 + h) - P(4)}{h}$ et le simplifier.
3. Calculer la limite de ce taux lorsque h tend vers 0. Que représente ce nombre ?
4. Interpréter le résultat dans le contexte démographique.

Exercice 42 ◆◆

1SPE-DERLOCAL-EX-042

⌚ 12 min

Un réservoir se vide progressivement. La hauteur d'eau, en mètres, est modélisée par :

$$h(t) = 12 - \frac{t^2}{3}$$

où t est le temps en heures, avec $0 \leq t \leq 6$.

1. Calculer $h(0)$, $h(3)$ et $h(6)$.
2. Calculer le taux de variation de h entre $t = 0$ et $t = 3$. Interpréter.
3. Calculer $h'(3)$ en utilisant la définition du nombre dérivé (limite du taux de variation).
4. Le niveau d'eau monte-t-il ou descend-il à l'instant $t = 3$? Justifier.

Exercice 43 ◆◆

1SPE-DERLOCAL-EX-043

⌚ 15 min

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -(x - 2)^2 + 5$.

On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = -2x + 4$.

La courbe C_f passe par les points $A(0; 1)$, $B(2; 5)$ et $C(4; 1)$.

1. Calculer $f'(0)$, $f'(2)$ et $f'(4)$.
2. Que représente géométriquement le nombre $f'(2) = 0$ pour la courbe C_f ?
3. En déduire l'équation de la tangente à C_f au point B .
4. Le point B est-il un maximum local de f ? Justifier à l'aide du signe de f' .

1SPE-DERLOCAL-EX-044
⌚ 15 min

Exercice 44 ◆◆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = 3x^2 - 3$.

1. Vérifier que $f(1) = -1$ et calculer $f'(1)$.
2. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 1.
3. Calculer $f(x) - T(x)$ et factoriser l'expression obtenue.
4. En déduire la position de la courbe par rapport à sa tangente au voisinage de $x = 1$.

1SPE-DERLOCAL-EX-045
⌚ 12 min

Exercice 45 ◆◆

On souhaite obtenir une valeur approchée de $(1,02)^5$ sans calculatrice, en utilisant l'approximation affine.

On pose $f(x) = (1 + x)^5$.

1. Calculer $f(0)$ et $f'(0)$. On admet que $f'(x) = 5(1 + x)^4$.
2. Écrire l'approximation affine de f au voisinage de $x = 0$: $f(x) \approx f(0) + f'(0) \cdot x$.
3. En déduire une valeur approchée de $(1,02)^5$ en prenant $x = 0,02$.
4. Comparer avec la valeur exacte $(1,02)^5 = 1,104\,080\,8 \dots$. Commenter la précision.

1SPE-DERLOCAL-EX-046
⌚ 15 min

Exercice 46 ◆◆

L'aire d'un disque de rayon r (en cm) est $A(r) = \pi r^2$ (en cm^2).

On admet que $A'(r) = 2\pi r$.

1. Calculer $A(10)$ et $A'(10)$.
2. En utilisant l'approximation affine, donner une valeur approchée de $A(10,1)$.
3. Calculer la valeur exacte de $A(10,1)$ et en déduire l'erreur commise.
4. Un technicien mesure le rayon d'un disque avec une erreur de 1%. Quelle est l'erreur relative approximative sur l'aire? Interpréter.

1SPE-DERLOCAL-EX-047
⌚ 20 min

Exercice 47 ◆◆◆

Étude complète de la tangente.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 5$.

1. Calculer le taux de variation de f entre a et $a + h$ (avec $h \neq 0$). Simplifier le résultat.
2. En déduire $f'(a)$ pour tout réel a .
3. Pour quelle valeur de a la tangente à la courbe de f est-elle horizontale? Calculer $f(a)$ pour cette valeur.
4. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
5. La tangente au point d'abscisse 0 coupe-t-elle l'axe des abscisses? Si oui, déterminer les coordonnées du point d'intersection.

1SPE-DERLOCAL-EX-048
⌚ 20 min

Exercice 48 ◆◆◆

Approximation et erreur graphique.

Soit f la fonction définie sur $[-1; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x+1}$. On note A le point de la courbe de f d'abscisse 3.

1. Calculer $f(3)$ et montrer que $f'(3) = \frac{1}{4}$.

Indication : calculer $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$ en multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué.

2. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point A .
3. En utilisant cette tangente, donner une valeur approchée de $\sqrt{3,96}$ et de $\sqrt{4,04}$.
4. Comparer avec les valeurs exactes (calculatrice autorisée). L'approximation est-elle meilleure lorsque $h > 0$ ou lorsque $h < 0$?

Exercice 49

Tangentes passant par l'origine.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$. On admet que $f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

1. Écrire l'équation de la tangente T_a à la courbe de f au point d'abscisse a .
2. À quelle condition sur a la tangente T_a passe-t-elle par l'origine $O(0; 0)$?
3. Écrire les équations des deux tangentes à la courbe de f passant par O .
4. Vérifier par le calcul que les points de tangence sont $(1; 2)$ et $(-1; 2)$.
5. Interpréter géométriquement : la parabole est-elle au-dessus ou en dessous de chacune de ces tangentes au voisinage du point de tangence ? Justifier.

Exercice 50

Analyse d'erreur.

Karim affirme : « Si $f(x) = \frac{1}{x}$, alors $f'(2) = -\frac{1}{2}$ ».

1. Calculer le taux de variation $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ pour $h \neq 0$ et simplifier.
2. Karim s'est-il trompé ? Déterminer la valeur correcte de $f'(2)$.
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2.
4. Tracer la courbe de f et la tangente sur un même repère pour $x \in [0,5; 5]$.
5. Conjecturer graphiquement si la courbe est au-dessus ou en dessous de la tangente au voisinage de $x = 2$. Justifier.

Coup de pouce 1. Le taux de variation de f entre a et b est $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Commence par calculer $f(1)$ et $f(4)$.

Coups de pouce

Coup de pouce 1. Calculer d'abord les deux images.

Coup de pouce 2. Écrire $\frac{g(4) - g(0)}{4 - 0}$.

Coup de pouce 3. Remplacer $g(4)$ et $g(0)$ puis simplifier le quotient.

Coup de pouce 1. Développe $(a+h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$ pour calculer $f(a+h)$, puis forme le quotient $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Coup de pouce 1. Calcule $f(a+h) = 3(a+h)^2$, développe, puis soustrais $f(a) = 3a^2$ avant de diviser par h .

Coup de pouce 1. Le nombre dérivé $f'(2)$ est la pente de la tangente au point $(2; f(2))$. Place le point, puis trace la droite de pente 3 passant par ce point.

Coup de pouce 1. Calcule la pente de la tangente en utilisant $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ avec $A(1; 3)$ et $B(4; 0)$. C'est $f'(1)$.

Coup de pouce 1. La formule de la tangente est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Remplace $a = 1$, $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$.

Coup de pouce 1. Calcule d'abord $f(a)$ et $f'(a)$ pour la valeur de a demandée, puis applique la formule $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

1SPE-DERLOCAL-EX-049
25 min

1SPE-DERLOCAL-EX-050
20 min

Coup de pouce 1. L'approximation linéaire donne $f(a+h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$. Identifie a et h dans chaque cas.

Coup de pouce 1. Choisis a tel que $f(a)$ soit un carré parfait facile à calculer, puis h le petit écart. Par exemple, pour $\sqrt{4,1}$: $a = 4$, $h = 0,1$.

Coup de pouce 1. Calcule $f(0)$ et $f(2)$, puis forme le quotient $\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}$.

Coup de pouce 1. Lis les valeurs $f(a)$ et $f(b)$ dans le tableau, puis applique la formule du taux de variation.

Coup de pouce 1. Développe $(1+h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$, puis forme le quotient et simplifie par h avant de faire tendre h vers 0.

Coup de pouce 1. Observe vers quelle valeur le taux de variation semble tendre quand h se rapproche de 0.

Coup de pouce 1. Place le point $A(2; 3)$. La pente est -1 : pour 1 unité vers la droite, on descend de 1. Utilise un second point pour tracer la droite.

Coup de pouce 1. $f'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente en A . Calcule la pente de la droite (AB) .

Coup de pouce 1. Calcule $f(3) = 9$ et $f'(3) = 6$, puis applique $y = f'(3)(x - 3) + f(3)$.

Coup de pouce 1. Prends $a = 4$ (car $\sqrt{4} = 2$) et $h = 0,02$. Utilise $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$.

TD — Le freinage d'un véhicule

Durée estimée : 50 minutes.

Un véhicule roule à 90 km/h (soit 25 m/s) et freine à partir de l'instant $t = 0$. Sa distance de freinage (en mètres) est modélisée par :

$$d(t) = 25t - 2,5t^2 \quad \text{pour } t \in [0; 5].$$

Partie A — Analyse de la distance (C1)

1. Calculer $d(0)$, $d(1)$, $d(3)$ et $d(5)$.
2. Calculer la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 2$, puis la vitesse moyenne sur cet intervalle.
3. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 3$ et $t = 5$. Comparer avec la précédente. Que constatez-vous ?

Partie B — Vitesse instantanée (C2)

4. Calculer $\frac{d(1+h) - d(1)}{h}$ pour $h \neq 0$ et simplifier.
5. En déduire la vitesse instantanée $d'(1)$. Exprimer-la en m/s puis en km/h.
6. Calculer de même $d'(3)$. Le véhicule a-t-il beaucoup ralenti entre $t = 1$ et $t = 3$?

Partie C — Tangente et approximation (C4, C5)

7. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de d au point d'abscisse $t = 1$.
8. Approcher $d(1,1)$ à l'aide de cette tangente. Comparer avec la valeur exacte.
9. À quel instant le véhicule s'arrête-t-il ? (On cherche t tel que $d'(t) = 0$.)

Partie D — Synthèse (question ouverte / oral)

10. Le modèle $d(t) = 25t - 2,5t^2$ est-il réaliste pour $t > 5$? Justifier.
11. Expliquer en quelques phrases la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée dans le contexte du freinage.

TD fil rouge — Du capteur de vitesse au nombre dérivé

Durée estimée : 50 minutes. Ce TD résout la situation d'accroche du chapitre.

Un vélo est équipé d'un capteur qui enregistre la distance parcourue $d(t)$ (en mètres) en fonction du temps t (en secondes). Sur un tronçon de 30 secondes, le modèle est :

$$d(t) = 0,05t^3 - 0,5t^2 + 6t \quad \text{pour } t \in [0; 30].$$

Partie A — Vitesses moyennes (C1)

1. Calculer $d(10)$, $d(12)$ et $d(14)$.
2. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 10$ et $t = 14$.
3. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 10$ et $t = 12$, puis entre $t = 12$ et $t = 14$.
4. Peut-on connaître la vitesse exacte à $t = 12$ s avec ces seules informations ?

Partie B — Vers la vitesse instantanée (C2)

5. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 12$ et $t = 12,1$.
6. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 12$ et $t = 12,01$.
7. Conjecturer la valeur de la vitesse instantanée à $t = 12$.
8. Calculer $\frac{d(12+h) - d(12)}{h}$ en développant, puis faire tendre h vers 0 pour confirmer.

Partie C — Tangente et prédiction (C3, C4, C5)

9. Tracer la courbe de d sur $[0; 30]$ à la calculatrice ou sur un grapheur.
10. Tracer la tangente au point d'abscisse 12. Retrouver graphiquement que sa pente est cohérente avec la valeur de $d'(12)$.
11. Écrire l'équation de cette tangente.
12. Utiliser l'approximation linéaire pour prédire $d(12,5)$. Comparer avec la valeur exacte.

Partie D — Synthèse

13. Répondre à la question d'accroche : comment déterminer la vitesse exacte à $t = 12$ s à partir du modèle $d(t)$?
14. Expliquer pourquoi le taux de variation entre deux instants proches est une bonne approximation de la vitesse instantanée.

QCM d'auto-évaluation — Dérivation : point de vue local

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Taux de variation et pente de sécante

1. [Q1] Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2$. Quel est le taux de variation de f entre 1 et 3 ?

- A. $\frac{f(3)}{3} = 3$
- B. $\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = 4$
- C. $f(3) - f(1) = 8$
- D. $\frac{3 - 1}{f(3) - f(1)} = \frac{1}{4}$

2. [Q2] Le taux de variation de f entre a et $a + h$ ($h \neq 0$) est :

- A. $f(a + h) - f(a)$
- B. $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$

C. $\frac{h}{f(a+h) - f(a)}$
 D. $f(a+h) \times h$

3. [Q3] Un cycliste parcourt $f(t)$ mètres en t secondes. Le taux de variation de f entre $t = 10$ et $t = 20$ représente :
- A. La distance parcourue entre $t = 10$ et $t = 20$.
 - B. La vitesse à l'instant $t = 15$.
 - C. La vitesse moyenne entre $t = 10$ et $t = 20$.
 - D. L'accélération entre $t = 10$ et $t = 20$.

C2 — Nombre dérivé, pente et vitesse instantanée

4. [Q4] Le nombre dérivé $f'(a)$ est :
- A. La pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .
 - B. La pente de la sécante entre a et b .
 - C. L'ordonnée du point d'abscisse a sur la courbe.
 - D. La valeur de f au point le plus proche de a .
5. [Q5] Soit $f(x) = x^2$. On pose $t(h) = \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$. Quelle est la forme simplifiée de $t(h)$ pour $h \neq 0$?
- A. $4 + h$
 - B. $2h$
 - C. $h + 2$
 - D. $4h$
6. [Q6] Un mobile a pour position $d(t) = 3t^2 + t$ (en mètres, t en secondes). Le nombre $d'(2)$ représente :
- A. La distance parcourue à $t = 2$.
 - B. La vitesse instantanée à $t = 2$.
 - C. La vitesse moyenne entre $t = 0$ et $t = 2$.
 - D. L'accélération à $t = 2$.

C3 — Lecture graphique et construction de la tangente

7. [Q7] Sur un graphique, la tangente à la courbe de f au point $A(2;5)$ passe aussi par le point $B(4;9)$. Alors $f'(2)$ vaut :
- A. $\frac{9}{4} = 2,25$
 - B. $\frac{9-5}{4-2} = 2$
 - C. $9-5 = 4$
 - D. $\frac{4-2}{9-5} = 0,5$
8. [Q8] La tangente en un point de la courbe est horizontale. Cela signifie que :
- A. $f(a) = 0$
 - B. $f'(a) = 0$
 - C. $f'(a) = 1$
 - D. $f(a) = f'(a)$

9. [Q9] Pour construire la tangente en $A(a; f(a))$, il faut connaître :

- A. Uniquement $f(a)$.
- B. Uniquement $f'(a)$.
- C. Le point A et la pente $f'(a)$.
- D. Deux points quelconques de la courbe.

C4 — Équation de la tangente

10. [Q10] L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est :

- A. $y = f'(a) \cdot x + f(a)$
- B. $y = f'(a)(x - a) + f(a)$
- C. $y = f(a)(x - a) + f'(a)$
- D. $y = f'(x)(x - a) + f(a)$

11. [Q11] Soit $f(3) = 7$ et $f'(3) = -2$. L'équation de la tangente en $x = 3$ est :

- A. $y = -2x + 7$
- B. $y = -2(x - 3) + 7$
- C. $y = 7(x - 3) - 2$
- D. $y = -2x + 3$

12. [Q12] Pour vérifier que la tangente en a est correcte, on peut notamment :

- A. Vérifier que $y(0) = f(0)$.
- B. Vérifier que $y(a) = f(a)$ et que le coefficient directeur est $f'(a)$.
- C. Vérifier que $y(a) = 0$.
- D. Vérifier que $y(a) = f'(a)$.

C5 — Approximation linéaire

13. [Q13] Si $f(a) = 4$ et $f'(a) = 3$, alors $f(a + h) \approx$:

- A. $3h$
- B. $4 + 3h$
- C. $3 + 4h$
- D. $7h$

14. [Q14] L'approximation $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$ est d'autant plus fiable que :

- A. h est grand.
- B. h est proche de 0.
- C. $f'(a)$ est nul.
- D. $a = 0$.

15. [Q15] On sait que $\sqrt{4} = 2$ et que la dérivée de $\sqrt{x}$ en $x = 4$ vaut $\frac{1}{4}$. Alors $\sqrt{4,06} \approx$:

- A. 2,06
- B. 2,015
- C. $2,06 \times \frac{1}{4}$
- D. 2,6

Correction et diagnostics

Question	Capacité	Réponse	Distracteurs — erreur type et renvoi
Q1	C1	B	A : quotient $f(b)/b$ au lieu de $(f(b) - f(a))/(b - a)$ — renvoi M1 C : numérateur seul, dénominateur oublié — renvoi M1 D : quotient inversé — renvoi M1
Q2	C1	B	A : accroissement de f seul, sans diviser par h — renvoi M1 C : quotient inversé — renvoi M1 D : produit au lieu d'un quotient — renvoi M1
Q3	C1	C	A : distance $\neq$ vitesse moyenne (pas de division) — renvoi M1; R5 B : vitesse en un instant $\neq$ vitesse moyenne — renvoi M1; M2 D : accélération = dérivée de la vitesse, pas de la position — renvoi M2
Q4	C2	A	B : pente de sécante $\neq$ pente de tangente — renvoi M2, passage à la limite C : $f(a)$ est l'ordonnée, pas la pente — renvoi M2 D : le nombre dérivé n'est pas une valeur de f — renvoi M2
Q5	C2	A	B : développement incorrect de $(2 + h)^2$ — renvoi R2 C : erreur d'identification du terme 4 — renvoi R2 D : produit $4h$ au lieu de somme $4 + h$ — renvoi R2
Q6	C2	B	A : $d(2)$ est la position, pas la vitesse — renvoi M2 C : vitesse moyenne $\neq$ vitesse instantanée — renvoi M1; M2 D : accélération = dérivée de la vitesse — renvoi M2
Q7	C3	B	A : quotient y_B/x_B au lieu de pente — renvoi R3 C : différence d'ordonnées sans diviser par Δx — renvoi R3 D : quotient inversé — renvoi R3
Q8	C3	B	A : $f(a) = 0$ signifie que le point est sur l'axe, pas tangente horizontale — renvoi M3 C : pente 1 = droite à 45° , pas horizontale — renvoi R3 D : aucune raison d'égalité $f(a) = f'(a)$ — renvoi M3
Q9	C3	C	A : sans la pente, la tangente n'est pas déterminée — renvoi M3 B : sans le point de contact, la tangente n'est pas positionnée — renvoi M3; M4 D : la tangente n'est pas une sécante — renvoi M3
Q10	C4	B	A : ordonnée à l'origine $\neq f(a)$ sauf si $a = 0$ — renvoi M4 C : rôles de $f(a)$ et $f'(a)$ inversés — renvoi M4 D : $f'(x)$ varie avec x , la pente est $f'(a)$ — renvoi M4
Q11	C4	B	A : $f'(a)x + f(a)$ au lieu de $f'(a)(x - a) + f(a)$ — renvoi M4 C : rôles de $f(a)$ et $f'(a)$ inversés — renvoi M4 D : ordonnée à l'origine mal calculée — renvoi M4
Q12	C4	B	A : $y(0) = f(0)$ n'est vrai que si $a = 0$ — renvoi M4 C : la tangente passe par $(a; f(a))$, pas par $(a; 0)$ — renvoi M4 D : $y(a)$ doit valoir $f(a)$, pas $f'(a)$ — renvoi M4
Q13	C5	B	A : terme $f(a)$ oublié — renvoi M5 C : rôles de $f(a)$ et $f'(a)$ inversés — renvoi M5 D : somme $f(a) + f'(a)$ multipliée par h — renvoi M5
Q14	C5	B	A : plus h est grand, plus l'approximation est mauvaise — renvoi M5 C : $f'(a) = 0$ donne $f(a + h) \approx f(a)$, pas « meilleur » — renvoi M5 D : la qualité ne dépend pas de $a = 0$ mais de $ h $ — renvoi M5
Q15	C5	B	A : $h = 0,06$ ajouté à $\sqrt{4}$ sans multiplier par $f'(4)$ — renvoi M5 C : produit $h \times f'(a)$ sans ajouter $f(a)$ — renvoi M5 D : erreur de placement de la virgule — renvoi M5

Réponses correctes

Q1	B	Q2	B	Q3	C	Q4	A	Q5	A
Q6	B	Q7	B	Q8	B	Q9	C	Q10	B
Q11	B	Q12	B	Q13	B	Q14	B	Q15	B

Score : /15 Capacités à retravailler : C1 [☐Q1 ☐Q2 ☐Q3] C2 [☐Q4 ☐Q5 ☐Q6] C3 [☐Q7 ☐Q8 ☐Q9] C4 [☐Q10 ☐Q11 ☐Q12] C5 [☐Q13 ☐Q14 ☐Q15]

Corrigé — Évaluation A — Dérivation locale

Exercice 1 — 6 points

Question 1. $f(1) = 1 - 4 + 5 = 2$ et $f(4) = 16 - 16 + 5 = 5$.

$$\tau = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{5 - 2}{3} = 1.$$

Question 2. $f(3) = 9 - 12 + 5 = 2$.

$$\begin{aligned} f(3+h) &= (3+h)^2 - 4(3+h) + 5 \\ &= 9 + 6h + h^2 - 12 - 4h + 5 = h^2 + 2h + 2. \end{aligned}$$

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{h^2 + 2h + 2 - 2}{h} = \frac{h^2 + 2h}{h} = h + 2.$$

Question 3. $f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2) = 2$.

Question 4. $f'(3) = 2$ signifie que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3 a pour pente 2 : la courbe monte localement avec un coefficient directeur de 2.

Exercice 2 — 5 points

Question 1. $g'(1) = 3 \times 1^2 = 3$.

Question 2. $g(1) = 1$. La tangente T_1 en $x = 1$:

$$T_1 : y = g'(1)(x - 1) + g(1) = 3(x - 1) + 1 = 3x - 2.$$

Question 3. $T_1(0) = 3 \times 0 - 2 = -2$. Le point $(0; -2)$ est bien sur T_1 . ✓

Question 4. Tangente horizontale $\Leftrightarrow g'(a) = 0 \Leftrightarrow 3a^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$. La tangente est horizontale au point d'abscisse 0.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $f(2) = 7$ (ordonnée du point A) et $f'(2) = -3$ (pente de la tangente en A).

Question 2. $T : y = f'(2)(x - 2) + f(2) = -3(x - 2) + 7 = -3x + 13$.

Question 3. $f(2,04) \approx f(2) + f'(2) \times 0,04 = 7 + (-3) \times 0,04 = 7 - 0,12 = 6,88$.

Question 4. C' est une valeur approchée (symbole $\approx$). L'approximation linéaire remplace la courbe par sa tangente au voisinage du point ; l'écart avec la valeur exacte est d'autant plus petit que $|h|$ est petit.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $h(2) = \frac{1}{2}$ et $h(3) = \frac{1}{3}$.

$$\tau = \frac{h(3) - h(2)}{3 - 2} = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{2}}{1} = \frac{-\frac{1}{6}}{1} = -\frac{1}{6} \approx -0,167.$$

Question 2. $h'(2) = -\frac{1}{4}$.

$$h(2,05) \approx h(2) + h'(2) \times 0,05 = \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) \times 0,05 = 0,5 - 0,0125 = 0,4875.$$

Question 3. Valeur exacte : $\frac{1}{2,05} = \frac{100}{205} = \frac{20}{41} \approx 0,48780 \dots$

Approximation : 0,4875. L'erreur est de l'ordre de 0,0003, soit environ 0,06 %.

Évaluation A — Dérivation locale

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

6 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 5$.

1. Calculer le taux de variation de f entre $x = 1$ et $x = 4$. (1,5 pt)
2. Calculer $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$ pour $h \neq 0$. Simplifier. (2 pt)
3. En déduire le nombre dérivé $f'(3)$. (1 pt)
4. Interpréter $f'(3)$ graphiquement. (1,5 pt)

Exercice 2

5 points — C2, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3$. On admet que $g'(a) = 3a^2$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(1)$. (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente T_1 à la courbe de g au point d'abscisse 1. (2 pt)
3. Vérifier que T_1 passe par le point $(0; -2)$. (1 pt)
4. Déterminer l'abscisse du point de la courbe où la tangente est horizontale. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C3, C4, C5

On lit sur un graphique que la courbe de f passe par le point $A(2; 7)$ et que la tangente en A a pour pente -3 .

1. Donner les valeurs de $f(2)$ et $f'(2)$. (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente en A . (1,5 pt)
3. Approcher $f(2,04)$ à l'aide de l'approximation linéaire. (1,5 pt)
4. Ce résultat est-il une valeur exacte ou approchée? Justifier. (1 pt)

Exercice 4

4 points — C1, C5

Soit h la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = \frac{1}{x}$. On admet que $h'(a) = -\frac{1}{a^2}$ pour tout $a > 0$.

1. Calculer le taux de variation de h entre $x = 2$ et $x = 3$. (1,5 pt)
2. Approcher $h(2,05) = \frac{1}{2,05}$ à l'aide de l'approximation linéaire en $a = 2$. (1,5 pt)
3. Comparer avec la valeur exacte $\frac{1}{2,05}$ (arrondir au millièm). (1 pt)

Corrigé — Évaluation B — Dérivation locale

Exercice 1 — 6 points

Question 1. $f(2) = 4 - 12 + 10 = 2$ et $f(5) = 25 - 30 + 10 = 5$.

$$\tau = \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{5 - 2}{3} = 1.$$

Question 2. $f(5) = 5$.

$$\begin{aligned} f(5+h) &= (5+h)^2 - 6(5+h) + 10 \\ &= 25 + 10h + h^2 - 30 - 6h + 10 = h^2 + 4h + 5. \end{aligned}$$

$$\frac{f(5+h) - f(5)}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4.$$

Question 3. $f'(5) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4.$

Question 4. $f'(5) = 4$ signifie que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 5 a pour pente 4 : la courbe monte localement avec un coefficient directeur de 4.

Exercice 2 — 5 points

Question 1. $g'(2) = 3 \times 2^2 = 12.$

Question 2. $g(2) = 8$. La tangente T_2 en $x = 2$:

$$T_2 : y = 12(x - 2) + 8 = 12x - 16.$$

Question 3. $T_2(0) = 12 \times 0 - 16 = -16$. Le point $(0; -16)$ est bien sur T_2 . ✓

Question 4. Tangente horizontale $\Leftrightarrow g'(a) = 0 \Leftrightarrow 3a^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $f(3) = 4$ et $f'(3) = 2$.

Question 2. $T : y = 2(x - 3) + 4 = 2x - 2$.

Question 3. $f(3,02) \approx f(3) + f'(3) \times 0,02 = 4 + 2 \times 0,02 = 4,04$.

Question 4. C'est une valeur approchée ($\approx$). L'approximation linéaire remplace la courbe par sa tangente au voisinage du point.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $h(4) = \frac{1}{4}$ et $h(5) = \frac{1}{5}$.

$$\tau = \frac{h(5) - h(4)}{5 - 4} = \frac{\frac{1}{5} - \frac{1}{4}}{1} = \frac{-\frac{1}{20}}{1} = -\frac{1}{20} = -0,05.$$

Question 2. $h'(5) = -\frac{1}{25}$.

$$h(5,02) \approx h(5) + h'(5) \times 0,02 = \frac{1}{5} + \left(-\frac{1}{25}\right) \times 0,02 = 0,2 - 0,0008 = 0,1992.$$

Question 3. Valeur exacte : $\frac{1}{5,02} = \frac{50}{251} \approx 0,19920 \dots$

Approximation : 0,1992. L'erreur est négligeable.

Évaluation B — Dérivation locale

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

6 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x + 10$.

1. Calculer le taux de variation de f entre $x = 2$ et $x = 5$. (1,5 pt)
2. Calculer $\frac{f(5+h) - f(5)}{h}$ pour $h \neq 0$. Simplifier. (2 pt)
3. En déduire le nombre dérivé $f'(5)$. (1 pt)
4. Interpréter $f'(5)$ graphiquement. (1,5 pt)

Exercice 2

5 points — C2, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3$. On admet que $g'(a) = 3a^2$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(2)$. (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente T_2 à la courbe de g au point d'abscisse 2. (2 pt)
3. Vérifier que T_2 passe par le point $(0; -16)$. (1 pt)
4. Déterminer l'abscisse du point de la courbe où la tangente est horizontale. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C3, C4, C5

On lit sur un graphique que la courbe de f passe par le point $A(3; 4)$ et que la tangente en A a pour pente 2.

1. Donner les valeurs de $f(3)$ et $f'(3)$. (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente en A . (1,5 pt)
3. Approcher $f(3,02)$ à l'aide de l'approximation linéaire. (1,5 pt)
4. Ce résultat est-il une valeur exacte ou approchée? Justifier. (1 pt)

Exercice 4

4 points — C1, C5

Soit h la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = \frac{1}{x}$. On admet que $h'(a) = -\frac{1}{a^2}$ pour tout $a > 0$.

1. Calculer le taux de variation de h entre $x = 4$ et $x = 5$. (1,5 pt)
2. Approcher $h(5,02) = \frac{1}{5,02}$ à l'aide de l'approximation linéaire en $a = 5$. (1,5 pt)
3. Comparer avec la valeur exacte $\frac{1}{5,02}$ (arrondir au millième). (1 pt)

Rappel — Images et courbe représentative

Calculer une image : si $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, alors l'image de 4 par f est

$$f(4) = 2 \times 4^2 - 3 \times 4 + 1 = 32 - 12 + 1 = 21.$$

Lire une image sur une courbe : sur la courbe C_f , le point d'abscisse a a pour ordonnée $f(a)$. On lit $f(a)$ en projetant horizontalement sur l'axe des ordonnées.

Exercice 51 ◆

Soit $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Calculer les images suivantes.

1. $f(0)$
2. $f(2)$
3. $f(-1)$
4. $f(a)$ pour $a = 5$.

Corrigé

Question 1.

$$f(0) = 0^2 + 2 \times 0 - 3 = -3.$$

Question 2.

$$f(2) = 2^2 + 2 \times 2 - 3 = 4 + 4 - 3 = 5.$$

Question 3.

$$f(-1) = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 3 = 1 - 2 - 3 = -4.$$

Question 4.

$$f(5) = 5^2 + 2 \times 5 - 3 = 25 + 10 - 3 = 32.$$

Exercice 52

Soit $g(x) = \frac{1}{x+1}$ définie pour $x \neq -1$.

1. Calculer $g(0)$, $g(1)$ et $g(3)$.
2. Calculer $g(a)$ puis $g(a+h)$ pour des valeurs génériques a et h .
3. Pourquoi $g(-1)$ n'existe-t-elle pas ?

Corrigé

Question 1.

$$g(0) = \frac{1}{0+1} = 1, \quad g(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}, \quad g(3) = \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4}.$$

Question 2.

$$g(a) = \frac{1}{a+1}, \quad g(a+h) = \frac{1}{(a+h)+1} = \frac{1}{a+h+1}.$$

Pour $g(a+h)$, on remplace x par $a+h$ dans la formule.

Question 3. Si $x = -1$, le dénominateur vaut $-1 + 1 = 0$. La division par zéro est interdite, donc $g(-1)$ n'existe pas.

Exercice 53

Soit $f(x) = -x^2 + 4x$.

1. Calculer $f(1)$ et $f(3)$.
2. Calculer $f(1+h)$ en fonction de h (développer et réduire).
3. En déduire $f(1+h) - f(1)$.

Corrigé

Question 1.

$$f(1) = -1^2 + 4 \times 1 = -1 + 4 = 3, \quad f(3) = -3^2 + 4 \times 3 = -9 + 12 = 3.$$

Question 2.

$$\begin{aligned} f(1+h) &= -(1+h)^2 + 4(1+h) \\ &= -(1+2h+h^2) + 4+4h \\ &= -1-2h-h^2+4+4h \\ &= -h^2+2h+3. \end{aligned}$$

On remplace x par $1+h$ puis on développe $(1+h)^2 = 1+2h+h^2$.

Question 3.

$$f(1+h) - f(1) = (-h^2 + 2h + 3) - 3 = -h^2 + 2h = h(-h + 2).$$

Rappel — Développer, factoriser, simplifier

Développer : $a(b+c) = ab+ac$ et $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$.

Simplifier une fraction : factoriser numérateur et dénominateur, puis simplifier le facteur commun.

Exercice 54

Développer et réduire chaque expression.

1SPE-DERLOCAL-FR-R2-EX1
5 min

1. $A = (a + h)^2 - a^2$
2. $B = 3(a + h)^2 - 3a^2$
3. $C = (a + h)^3 - a^3$ (on développera $(a + h)^3$)

1SPE-DERLOCAL-FR-R2-EX1

On développe $(a + h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$.

Corrigé

Question 1.

$$A = a^2 + 2ah + h^2 - a^2 = 2ah + h^2.$$

Question 2.

$$B = 3(a^2 + 2ah + h^2) - 3a^2 = 3a^2 + 6ah + 3h^2 - 3a^2 = 6ah + 3h^2.$$

Question 3.

$$C = a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3 = 3a^2h + 3ah^2 + h^3.$$

$(a + h)^3 = a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3$ (formule du binôme).

1SPE-DERLOCAL-FR-R2-EX2

5 min

Exercice 55

Simplifier les fractions suivantes ($h \neq 0$).

1. $\frac{2ah + h^2}{h}$
2. $\frac{6ah + 3h^2}{h}$
3. $\frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h}$

Corrigé

Question 1.

$$\frac{2ah + h^2}{h} = \frac{h(2a + h)}{h} = 2a + h.$$

Question 2.

$$\frac{6ah + 3h^2}{h} = \frac{h(6a + 3h)}{h} = 6a + 3h.$$

Question 3.

$$\frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h} = \frac{h(3a^2 + 3ah + h^2)}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2.$$

1SPE-DERLOCAL-FR-R2-EX2

On factorise h au numérateur, puis on simplifie par h .

Exercice 56

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$. Simplifier $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ pour $a \neq 0$ et $h \neq 0$.

Corrigé

$$\begin{aligned} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} &= \frac{\frac{1}{a + h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a - (a + h)}{a(a + h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a + h)}}{h} \\ &= \frac{-h}{a(a + h)} \times \frac{1}{h} = \frac{-1}{a(a + h)}. \end{aligned}$$

1SPE-DERLOCAL-FR-R2-EX3

6 min

1SPE-DERLOCAL-FR-R2-EX3

On réduit $f(a + h) - f(a)$ au même dénominateur, puis on divise par h .

Rappel — Droites dans le plan

Le **coefficient directeur** (ou pente) de la droite passant par $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (x_A \neq x_B).$$

L'équation de la droite de pente m passant par $A(x_A; y_A)$ est :

$$y = m(x - x_A) + y_A.$$

Exercice 57

Calculer le coefficient directeur de la droite passant par les points suivants.

1. $A(1; 3)$ et $B(4; 9)$
2. $C(2; 5)$ et $D(6; 5)$
3. $E(0; -1)$ et $F(3; 8)$

1SPE-DERLOCAL-FR-R3-EX1
⌚ 5 min

Corrigé

Question 1. $m = \frac{9 - 3}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2.$

Question 2. $m = \frac{5 - 5}{6 - 2} = \frac{0}{4} = 0.$ La droite est horizontale.

Question 3. $m = \frac{8 - (-1)}{3 - 0} = \frac{9}{3} = 3.$

1SPE-DERLOCAL-FR-R3-EX1

Exercice 58

Écrire l'équation de la droite de pente m passant par le point P indiqué. Mettre sous la forme $y = mx + p$.

1. $m = 2, P(1; 3).$
2. $m = -3, P(2; 7).$
3. $m = \frac{1}{2}, P(4; 5).$

1SPE-DERLOCAL-FR-R3-EX2
⌚ 6 min

Corrigé

Question 1. $y = 2(x - 1) + 3 = 2x - 2 + 3 = 2x + 1.$

Question 2. $y = -3(x - 2) + 7 = -3x + 6 + 7 = -3x + 13.$

Question 3. $y = \frac{1}{2}(x - 4) + 5 = \frac{x}{2} - 2 + 5 = \frac{x}{2} + 3.$

1SPE-DERLOCAL-FR-R3-EX2
On utilise
 $y = m(x - x_P) + y_P$
puis on développe.

Exercice 59

La droite $\mathcal{D}$ passe par $A(2; 4)$ et $B(5; 10)$.

1. Calculer le coefficient directeur de $\mathcal{D}$.
2. Écrire l'équation de $\mathcal{D}$.
3. Vérifier que le point $C(3; 6)$ appartient à $\mathcal{D}$.

1SPE-DERLOCAL-FR-R3-EX3
⌚ 6 min

Corrigé

Question 1. $m = \frac{10 - 4}{5 - 2} = \frac{6}{3} = 2.$

Question 2. $y = 2(x - 2) + 4 = 2x - 4 + 4 = 2x.$

Question 3. $y(3) = 2 \times 3 = 6.$ L'ordonnée de C est bien 6, donc $C \in \mathcal{D}$. ✓

1SPE-DERLOCAL-FR-R3-EX3

On vérifie en remplaçant
 x par 3 dans l'équation.

Rappel — Fonctions de référence

Fonction carré : $f(x) = x^2$, définie sur $\mathbb{R}$, décroissante sur $] -\infty; 0]$, croissante sur $[0; +\infty[$.

Fonction inverse : $g(x) = \frac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$, strictement décroissante sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

1SPE-DERLOCAL-FR-R4-EX1
⌚ 5 min

Exercice 60

Soit $f(x) = x^2$.

1. Calculer $f(3)$, $f(-3)$, $f(0,5)$.
2. Calculer $f(a+h) - f(a)$ en développant.
3. Que vaut $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour $h \neq 0$?

1SPE-DERLOCAL-FR-R4-EX1

On développe $(a+h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$ puis on simplifie.

Corrigé

Question 1. $f(3) = 9$, $f(-3) = 9$, $f(0,5) = 0,25$.

Question 2. $f(a+h) - f(a) = (a+h)^2 - a^2 = a^2 + 2ah + h^2 - a^2 = 2ah + h^2$.

Question 3. $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$.

1SPE-DERLOCAL-FR-R4-EX2
⌚ 5 min

Exercice 61

Soit $g(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$.

1. Calculer $g(2)$, $g(4)$, $g(-1)$.
2. Montrer que $g(a+h) - g(a) = \frac{-h}{a(a+h)}$ pour $a \neq 0$, $a+h \neq 0$.
3. En déduire $\frac{g(a+h) - g(a)}{h}$.

1SPE-DERLOCAL-FR-R4-EX2

On réduit au même dénominateur $a(a+h)$.

Corrigé

Question 1. $g(2) = \frac{1}{2}$, $g(4) = \frac{1}{4}$, $g(-1) = -1$.

Question 2.

$$g(a+h) - g(a) = \frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} = \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} = \frac{-h}{a(a+h)}.$$

Question 3.

$$\frac{g(a+h) - g(a)}{h} = \frac{-h}{a(a+h)} \times \frac{1}{h} = \frac{-1}{a(a+h)}.$$

1SPE-DERLOCAL-FR-R4-EX3
⌚ 6 min

Exercice 62

Soit $f(x) = x^2 + 3x$.

1. Calculer $f(1)$ et $f(1+h)$ en développant.
2. Calculer le taux de variation $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$.
3. Que se passe-t-il quand h se rapproche de 0?

1SPE-DERLOCAL-FR-R4-EX3

Corrigé

Question 1. $f(1) = 1 + 3 = 4$.

$$f(1+h) = (1+h)^2 + 3(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 3 + 3h = h^2 + 5h + 4.$$

Question 2.

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{h^2 + 5h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 5h}{h} = h + 5.$$

Question 3. Quand h se rapproche de 0, $h + 5$ se rapproche de 5. On obtient $f'(1) = 5$.

Quand $h \rightarrow 0$, le taux de variation tend vers 5 : c'est le nombre dérivé $f'(1)$.

Rappel — Vitesse moyenne

La **vitesse moyenne** entre les instants t_1 et t_2 est :

$$v_{\text{moy}} = \frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$$

où $d(t)$ est la distance parcourue à l'instant t .

Unités : si d est en mètres et t en secondes, la vitesse est en m/s.

Exercice 63

Un marcheur parcourt $d(t) = 80t$ mètres en t minutes.

1. Calculer la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 5$.
2. Calculer sa vitesse moyenne sur cet intervalle, en m/min.
3. Calculer sa vitesse moyenne entre $t = 3$ et $t = 7$, en m/min.

1SPE-DERLOCAL-FR-R5-EX1
⌚ 5 min

Corrigé

Question 1. $d(5) - d(0) = 400 - 0 = 400$ m.

Question 2. $v = \frac{400}{5} = 80$ m/min.

Question 3. $v = \frac{d(7) - d(3)}{7 - 3} = \frac{560 - 240}{4} = \frac{320}{4} = 80$ m/min.

1SPE-DERLOCAL-FR-R5-EX1

Exercice 64

Un cycliste a pour position $d(t) = 5t^2$ mètres, t en secondes.

1. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 4$.
2. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 2,1$.
3. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 2,01$.
4. Que conjecturez-vous pour la vitesse instantanée à $t = 2$?

1SPE-DERLOCAL-FR-R5-EX2
⌚ 6 min

Corrigé

Question 1. $v = \frac{d(4) - d(2)}{4 - 2} = \frac{80 - 20}{2} = 30$ m/s.

Question 2. $v = \frac{d(2,1) - d(2)}{0,1} = \frac{22,05 - 20}{0,1} = \frac{2,05}{0,1} = 20,5$ m/s.

Question 3. $v = \frac{d(2,01) - d(2)}{0,01} = \frac{20,2005 - 20}{0,01} = \frac{0,2005}{0,01} = 20,05$ m/s.

Question 4. Les vitesses moyennes se rapprochent de 20 m/s. On conjecture que la vitesse instantanée à $t = 2$ est 20 m/s (c'est le nombre dérivé $d'(2)$).

Plus l'intervalle est petit, plus la vitesse moyenne se rapproche de 20 m/s.

Exercice 65

Un objet chute librement : sa hauteur est $h(t) = 100 - 5t^2$ (en mètres, t en secondes).

1. Quelle est la hauteur initiale ?
2. Calculer la vitesse moyenne de chute entre $t = 0$ et $t = 2$.

1SPE-DERLOCAL-FR-R5-EX3
⌚ 6 min

3. Le signe de cette vitesse moyenne est-il cohérent ? Justifier.

1SPE-DERLOCAL-FR-R5-EX3

Corrigé

Question 1. $h(0) = 100 - 0 = 100$ m.

Question 2. $v = \frac{h(2) - h(0)}{2 - 0} = \frac{80 - 100}{2} = \frac{-20}{2} = -10$ m/s.

Question 3. La vitesse moyenne est négative : la hauteur diminue (l'objet descend), ce qui est cohérent avec une chute. Le taux de variation négatif traduit la décroissance de la fonction h .

1SPE-DERLOCAL-RE-C1-EX1
⌚ 8 min

Exercice 66 ♦

Soit $f(x) = x^2 - 2x$. Calculer le taux de variation de f :

- entre $x = 1$ et $x = 4$;
- entre $x = 2$ et $x = 2 + h$ (pour $h \neq 0$), puis simplifier.

Coup de pouce 1. Le taux de variation entre a et b est $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Calcule d'abord $f(1)$ et $f(4)$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C1-EX1
On calcule les images, puis on forme le quotient.

Corrigé

Question 1. $f(1) = 1 - 2 = -1$ et $f(4) = 16 - 8 = 8$.

$$\tau = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{8 - (-1)}{3} = \frac{9}{3} = 3.$$

Question 2. $f(2) = 4 - 4 = 0$ et $f(2 + h) = (2 + h)^2 - 2(2 + h) = 4 + 4h + h^2 - 4 - 2h = h^2 + 2h$.

$$\tau = \frac{f(2 + h) - f(2)}{h} = \frac{h^2 + 2h}{h} = h + 2.$$

1SPE-DERLOCAL-RE-C1-EX2
⌚ 8 min

Exercice 67 ♦

Un véhicule a pour position $d(t) = 3t^2$ mètres à l'instant t (en secondes).

- Quelle est la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 5$?
- Calculer le taux de variation de d entre $t = 2$ et $t = 5$. Que représente-t-il ?
- Calculer le taux de variation entre $t = 2$ et $t = 2,1$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C1-EX2

Le taux de variation de la position par rapport au temps est une vitesse moyenne.

Corrigé

Question 1. $d(5) - d(0) = 75 - 0 = 75$ m.

Question 2. $\tau = \frac{d(5) - d(2)}{5 - 2} = \frac{75 - 12}{3} = \frac{63}{3} = 21$ m/s. C'est la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 5$.

Question 3. $\tau = \frac{d(2,1) - d(2)}{0,1} = \frac{13,23 - 12}{0,1} = \frac{1,23}{0,1} = 12,3$ m/s.

1SPE-DERLOCAL-RE-C1-EX3
⌚ 8 min

Exercice 68 ♦

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ pour $x > 0$. Calculer le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$ (pour $h \neq 0$ et $1 + h > 0$), puis simplifier.

1SPE-DERLOCAL-RE-C1-EX3

Corrigé

$$f(1) = 1 \text{ et } f(1 + h) = \frac{1}{1 + h}.$$

$$\tau = \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{\frac{1}{1+h} - 1}{h} = \frac{\frac{1 - (1+h)}{1+h}}{h} = \frac{\frac{-h}{1+h}}{h} = \frac{-1}{1+h}.$$

Exercice 69

Soit $f(x) = x^2 + x$. On calcule le taux de variation entre a et $a + h$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C2-EX1
⌚ 8 min

1. Développer $f(a + h)$.
2. Calculer $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ et simplifier.
3. En déduire $f'(a)$ en faisant tendre h vers 0.
4. Calculer $f'(1)$ et $f'(-2)$.

Coup de pouce 1. $f(a + h) = (a + h)^2 + (a + h)$. Développe puis soustrais $f(a)$.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-RE-C2-EX1

Question 1. $f(a + h) = (a + h)^2 + (a + h) = a^2 + 2ah + h^2 + a + h$.

Question 2.

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h} = \frac{2ah + h^2 + h}{h} = 2a + h + 1.$$

Question 3. Quand $h \rightarrow 0$: $2a + h + 1 \rightarrow 2a + 1$. Donc $f'(a) = 2a + 1$.

Question 4. $f'(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$ et $f'(-2) = 2 \times (-2) + 1 = -3$.

On soustrait
 $f(a) = a^2 + a$ puis on
divise par h .

Exercice 70

On donne $f'(2) = 5$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C2-EX2
⌚ 7 min

1. Interpréter $f'(2)$ en termes de pente.
2. Si f représente la distance (en km) parcourue par un véhicule en t heures, interpréter $f'(2)$ comme vitesse.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-RE-C2-EX2

Question 1. $f'(2) = 5$ signifie que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 a pour pente 5 : la courbe « monte » localement avec un coefficient directeur de 5.

Question 2. Dans ce contexte, $f'(2) = 5$ signifie que la vitesse instantanée du véhicule à l'instant $t = 2$ h est 5 km/h.

Exercice 71

Soit $f(x) = 3x^2$. Calculer $f'(a)$ par la méthode du taux de variation, puis vérifier pour $a = 1$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C2-EX3
⌚ 8 min

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-RE-C2-EX3

$$f(a) = 3a^2 \text{ et } f(a + h) = 3(a + h)^2 = 3a^2 + 6ah + 3h^2.$$

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h} = \frac{6ah + 3h^2}{h} = 6a + 3h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 6a.$$

Donc $f'(a) = 6a$.

Vérification : $f'(1) = 6$. Le taux de variation entre 1 et 1,01 : $\frac{f(1,01) - f(1)}{0,01} = \frac{3,0603 - 3}{0,01} = 6,03 \approx 6$.
✓

Exercice 72

Sur un graphique, la tangente à la courbe de f au point $A(3;2)$ passe par le point $B(5;6)$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C3-EX1
⌚ 7 min

1. Déterminer $f'(3)$.
2. La tangente au point $C(1;4)$ est horizontale. Que vaut $f'(1)$?

Coup de pouce 1. Le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente. Utilise la formule de la pente avec les deux points.

1SPE-DERLOCAL-RE-C3-EX1

$f'(a)$ = pente de la tangente en a .

Corrigé

Question 1. $f'(3) = \frac{6-2}{5-3} = \frac{4}{2} = 2$.

Question 2. Une tangente horizontale a une pente nulle, donc $f'(1) = 0$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C3-EX2

⌚ 8 min

Exercice 73 ◆

On sait que $f(2) = 5$ et $f'(2) = -1$.

1. Tracer la tangente au point $A(2;5)$ de pente -1 (sur un repère).
2. Lire graphiquement l'ordonnée de la tangente pour $x = 4$.
3. Vérifier par le calcul : $y(4) = f'(2)(4-2) + f(2)$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C3-EX2

Corrigé

Question 1. On place $A(2;5)$. La pente est -1 : pour 1 unité vers la droite, on descend de 1. On obtient le point $(3;4)$. On trace la droite passant par A et $(3;4)$.

Question 2. Sur le graphique, en $x = 4$, la tangente donne $y \approx 3$.

Question 3. $y(4) = -1 \times (4-2) + 5 = -2 + 5 = 3$. ✓

1SPE-DERLOCAL-RE-C3-EX3

⌚ 8 min

Exercice 74 ◆

Sur un graphique, on lit les informations suivantes pour la courbe de f :

- ▶ En $A(0;1)$, la tangente passe par $(1;3)$.
- ▶ En $B(2;4)$, la tangente passe par $(4;4)$.
- ▶ En $C(4;0)$, la tangente passe par $(6;-4)$.

Déterminer $f'(0)$, $f'(2)$ et $f'(4)$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C3-EX3

Corrigé

$$f'(0) = \frac{3-1}{1-0} = 2.$$

$$f'(2) = \frac{4-4}{4-2} = 0. \text{ La tangente en } B \text{ est horizontale.}$$

$$f'(4) = \frac{-4-0}{6-4} = \frac{-4}{2} = -2.$$

1SPE-DERLOCAL-RE-C4-EX1

⌚ 7 min

Exercice 75 ◆

Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a dans chaque cas.

1. $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$.
2. $f(0) = -1$ et $f'(0) = 4$.
3. $f(5) = 10$ et $f'(5) = 0$.

Coup de pouce 1. La formule est $y = f'(a)(x-a) + f(a)$. Remplace a , $f(a)$ et $f'(a)$ par les valeurs données.

Corrigé

Question 1. $y = 2(x-1) + 3 = 2x - 2 + 3 = 2x + 1$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C4-EX1

Formule : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

Question 2. $y = 4(x - 0) + (-1) = 4x - 1$.

Question 3. $y = 0 \times (x - 5) + 10 = 10$. La tangente est horizontale.

Exercice 76

Soit $f(x) = x^2$. On admet que $f'(a) = 2a$.

1. Écrire l'équation de la tangente en $a = 3$.
2. Écrire l'équation de la tangente en $a = -1$.
3. Vérifier que chaque tangente passe bien par son point de contact.

Corrigé

Question 1. $f(3) = 9, f'(3) = 6$. Tangente : $y = 6(x - 3) + 9 = 6x - 18 + 9 = 6x - 9$.

Question 2. $f(-1) = 1, f'(-1) = -2$. Tangente : $y = -2(x + 1) + 1 = -2x - 2 + 1 = -2x - 1$.

Question 3. Pour $x = 3 : y = 6 \times 3 - 9 = 9 = f(3)$. ✓

Pour $x = -1 : y = -2 \times (-1) - 1 = 1 = f(-1)$. ✓

1SPE-DERLOCAL-RE-C4-EX2
8 min

Exercice 77

On donne $f(2) = 7$ et $f'(2) = -3$.

1. Écrire l'équation de la tangente T en $a = 2$.
2. Calculer $T(0)$, $T(1)$ et $T(4)$.
3. La tangente passe-t-elle par le point $(4; 1)$?

Corrigé

Question 1. $T : y = -3(x - 2) + 7 = -3x + 6 + 7 = -3x + 13$.

Question 2. $T(0) = 13$, $T(1) = 10$, $T(4) = -12 + 13 = 1$.

Question 3. $T(4) = 1$: oui, le point $(4; 1)$ est sur la tangente. ✓

1SPE-DERLOCAL-RE-C4-EX2

On vérifie en substituant $x = a$ dans l'équation de la tangente.

1SPE-DERLOCAL-RE-C4-EX3
8 min

Exercice 78

On donne $f(3) = 10$ et $f'(3) = 4$.

1. Approcher $f(3,02)$ à l'aide de l'approximation linéaire.
2. Approcher $f(2,95)$.
3. Le symbole utilisé est-il $=$ ou $\approx$? Pourquoi?

Coup de pouce 1. $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$. Identifie a et h dans chaque cas.

Corrigé

Question 1. $a = 3, h = 0,02$. $f(3,02) \approx 10 + 4 \times 0,02 = 10,08$.

Question 2. $a = 3, h = -0,05$. $f(2,95) \approx 10 + 4 \times (-0,05) = 10 - 0,2 = 9,8$.

Question 3. On utilise $\approx$ car c'est une approximation, pas une valeur exacte. Elle est d'autant meilleure que $|h|$ est petit.

1SPE-DERLOCAL-RE-C5-EX1
Formule :
 $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$.

Exercice 79

On admet que la dérivée de $f(x) = \sqrt{x}$ en $x = a > 0$ est $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$.

1. Calculer $f(9)$ et $f'(9)$.
2. En déduire une approximation de $\sqrt{9,03}$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C5-EX2
8 min

3. Comparer avec la valeur exacte à la calculatrice.

1SPE-DERLOCAL-RE-C5-EX2

Corrigé

Question 1. $f(9) = \sqrt{9} = 3$ et $f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$.

$h = 0,03$,
donc $f(9,03) \approx$
 $f(9) + f'(9) \times 0,03$.

Question 2. $\sqrt{9,03} \approx 3 + \frac{1}{6} \times 0,03 = 3 + 0,005 = 3,005$.

Question 3. Calculatrice : $\sqrt{9,03} \approx 3,00500 \dots$ L'approximation est excellente car $h = 0,03$ est très petit devant $a = 9$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C5-EX3
⌚ 8 min

Exercice 80 ♦

Soit $f(x) = x^3$. On admet $f'(a) = 3a^2$.

1. Calculer $f(2)$ et $f'(2)$.
2. Approcher $f(2,01) = (2,01)^3$ par l'approximation linéaire.
3. Calculer l'erreur relative : $\frac{|f(2,01) - \text{approximation}|}{f(2,01)} \times 100$.

1SPE-DERLOCAL-RE-C5-EX3

Corrigé

Question 1. $f(2) = 8$ et $f'(2) = 3 \times 4 = 12$.

Question 2. $f(2,01) \approx 8 + 12 \times 0,01 = 8,12$.

Question 3. Valeur exacte : $(2,01)^3 = 8,120\,601$. Erreur relative :

$$\frac{|8,120\,601 - 8,12|}{8,120\,601} \times 100 \approx 0,007\%.$$

L'approximation est très précise.

1SPE-DERLOCAL-EX-001

Corrigé

On calcule $f(1) = 2$ et $f(4) = 17$. Le taux de variation est donc $\frac{17-2}{4-1} = 5$.

1SPE-DERLOCAL-EX-002

Corrigé

On a $g(0) = 1$ et $g(4) = 9$. Comme les abscisses sont distinctes, le taux de variation vaut $\frac{9-1}{4-0} = 2$. Le résultat est cohérent : la fonction affine g a pour coefficient directeur 2.

1SPE-DERLOCAL-EX-003

Corrigé

1. On calcule le taux de variation de d entre 0 et 2 :

$$\frac{d(2) - d(0)}{2 - 0} = \frac{80 - 0}{2} = 40.$$

Ce résultat signifie que le véhicule a parcouru en moyenne 40 km par heure sur les deux premières heures. L'unité est le kilomètre par heure (km/h).

2. Entre 2 et 5 :

$$\frac{d(5) - d(2)}{5 - 2} = \frac{275 - 80}{3} = 65.$$

Sur les trois heures suivantes, la vitesse moyenne est de 65 km/h.

3. On compare les deux taux de variation : $65 > 40$. Le véhicule a roulé plus vite en moyenne sur l'intervalle $[2; 5]$ que sur $[0; 2]$.

Vérification : les deux taux sont positifs, ce qui est cohérent car la distance ne peut que croître.

Corrigé

1. Le taux de variation de C entre 100 et 200 vaut

$$\frac{C(200) - C(100)}{200 - 100} = \frac{1500 - 850}{100} = \frac{650}{100} = 6,5.$$

2. Ce taux de variation est le coût moyen par pièce supplémentaire : entre la 100^e et la 200^e pièce, chaque pièce supplémentaire coûte en moyenne 6,50 euros à produire.

3. La sécante passe par $A(100 ; 850)$ et $B(200 ; 1500)$. Son coefficient directeur est le taux de variation calculé à la question 1, soit 6,5. Comme $6,5 > 0$, le coefficient directeur est positif.

On pouvait aussi observer que $C(200) > C(100)$: le coût total augmente quand la production augmente, ce qui est cohérent avec un coefficient directeur positif.

Corrigé

1. On calcule :

► Entre 1 et 3 : $\frac{3^2 - 1^2}{3 - 1} = \frac{8}{2} = 4.$

► Entre 2 et 4 : $\frac{4^2 - 2^2}{4 - 2} = \frac{12}{2} = 6.$

► Entre 0 et 5 : $\frac{5^2 - 0^2}{5 - 0} = \frac{25}{5} = 5.$

2. On observe : $4 = 1 + 3$, $6 = 2 + 4$, $5 = 0 + 5$. Conjecture : le taux de variation de f entre a et b vaut $a + b$.

3. Pour $a \neq b$, on écrit

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{b^2 - a^2}{b - a}.$$

On factorise le numérateur par l'identité remarquable $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$. Comme $b \neq a$, on simplifie :

$$\frac{(b - a)(b + a)}{b - a} = b + a = a + b.$$

La conjecture est démontrée.

4. La sécante à la parabole passant par les points d'abscisses a et b a pour coefficient directeur le taux de variation de f entre a et b , soit $a + b$.

Corrigé

1. Pour $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x$, avec $a = 1$:

h	1	0,5	0,1
$\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$	$\frac{4-1}{1} = 3$	$\frac{2,25-1}{0,5} = 2,5$	$\frac{1,21-1}{0,1} = 2,1$
$\frac{g(1+h)-g(1)}{h}$	$\frac{4-2}{1} = 2$	$\frac{3-2}{0,5} = 2$	$\frac{2,2-2}{0,1} = 2$

2. Le taux de variation de g vaut toujours 2, quel que soit h . Celui de f semble se rapprocher de 2 lorsque h se rapproche de 0. Conjecture : les deux taux tendent vers la même valeur 2.

3. Pour tout $h \neq 0$:

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h.$$

4. Lorsque h se rapproche de 0, $2 + h$ se rapproche de 2. Le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$ tend vers 2, qui est aussi le taux de variation constant de g . Les deux fonctions ont le même comportement local en $a = 1$.

5. La tangente à la courbe de f en $a = 1$ a pour coefficient directeur 2. La droite représentant g a aussi pour coefficient directeur 2 et passe par le point $(1 ; 2) = (1 ; f(1))$. La tangente à la parabole au point d'abscisse 1 est donc la droite $y = 2x$, qui est la droite représentant g .

1SPE-DERLOCAL-EX-007

Corrigé

1. On a $f(3) = 9 + 6 = 15$.

► $h = 1 : \frac{f(4)-f(3)}{1} = \frac{24-15}{1} = 9.$

► $h = 0,1 : \frac{f(3,1)-f(3)}{0,1} = \frac{15,81-15}{0,1} = 8,1.$

► $h = 0,01 : \frac{f(3,01)-f(3)}{0,01} = \frac{15,0801-15}{0,01} = 8,01.$

2. Les taux de variation 9, 8,1, 8,01 semblent tendre vers 8 lorsque h se rapproche de 0.

3. Par définition, $f'(3)$ est la valeur vers laquelle tendent les taux de variation. Donc $f'(3) = 8$.

Vérification : $\frac{f(3+h)-f(3)}{h} = \frac{(3+h)^2+2(3+h)-15}{h} = \frac{h^2+8h}{h} = h + 8$. Lorsque $h \rightarrow 0$, on obtient bien 8.

1SPE-DERLOCAL-EX-008

Corrigé

1. On a $f(2) = 3 \times 4 = 12$ et $f(2+h) = 3(2+h)^2 = 3(4+4h+h^2) = 12+12h+3h^2$.

Donc $\frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \frac{12+12h+3h^2-12}{h} = \frac{12h+3h^2}{h} = 12+3h$.

2. Lorsque h se rapproche de 0, $12+3h$ se rapproche de 12. Donc $f'(2) = 12$.

1SPE-DERLOCAL-EX-009

Corrigé

1. $d(3) = 5 \times 9 = 45$ m et $d(3,1) = 5 \times 3,1^2 = 5 \times 9,61 = 48,05$ m.

Taux de variation : $\frac{48,05-45}{0,1} = 30,5$ m/s.

2. $d(3+h) = 5(3+h)^2 = 5(9+6h+h^2) = 45+30h+5h^2$.

$\frac{d(3+h)-d(3)}{h} = \frac{30h+5h^2}{h} = 30+5h$.

3. Lorsque h se rapproche de 0, $30+5h$ se rapproche de 30. Donc $d'(3) = 30$.

4. Le nombre $d'(3) = 30$ est la vitesse instantanée de l'objet à $t = 3$ s. L'objet se déplace à 30 mètres par seconde (m/s) à cet instant.

1SPE-DERLOCAL-EX-010

Corrigé

1. $(1+h)^3 = 1+3h+3h^2+h^3$.

2. $f(1+h)-f(1) = (1+3h+3h^2+h^3)-1 = 3h+3h^2+h^3$.

$\frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \frac{3h+3h^2+h^3}{h} = 3+3h+h^2$.

3. Lorsque h se rapproche de 0, $3+3h+h^2$ se rapproche de 3. Donc $f'(1) = 3$.

4. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 a pour coefficient directeur $f'(1) = 3 > 0$. La tangente est donc croissante (elle monte de gauche à droite).

1SPE-DERLOCAL-EX-011

Corrigé

1. $(a+h)^2 = a^2+2ah+h^2$. Donc $f(a+h)-f(a) = a^2+2ah+h^2-a^2 = 2ah+h^2$.

2. $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{2ah+h^2}{h} = 2a+h$.

3. Lorsque h se rapproche de 0, $2a+h$ se rapproche de $2a$. Donc $f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

4.

► $f'(0) = 0$: la tangente au sommet de la parabole est horizontale.

► $f'(-1) = -2$: la tangente descend.

► $f'(5) = 10$: la tangente monte.

5. $f'(a) = 0$ équivaut à $2a = 0$, soit $a = 0$. La tangente à la parabole au point d'abscisse 0 est horizontale : c'est le sommet de la parabole, où la courbe change de sens de variation.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-012

$$1. f(1+h) - f(1) = \frac{1}{1+h} - 1 = \frac{1 - (1+h)}{1+h} = \frac{-h}{1+h}.$$

$$\text{Donc } \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{-h}{h(1+h)} = \frac{-1}{1+h}.$$

L'égalité est bien vérifiée pour $h \neq 0$ et $1+h > 0$.

2. Lorsque h se rapproche de 0, $\frac{-1}{1+h}$ se rapproche de $\frac{-1}{1} = -1$. Donc $f'(1) = -1$.

3. La tangente au point d'abscisse 1 a pour équation

$$y = f(1) + f'(1)(x-1) = 1 + (-1)(x-1) = 1 - x + 1 = 2 - x.$$

4. La tangente coupe l'axe des abscisses lorsque $y = 0$, soit $2 - x = 0$, c'est-à-dire $x = 2$. La tangente coupe l'axe des abscisses au point $(2; 0)$.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-013

Question 1. L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x-a) + f(a).$$

Ici $a = 2$, $f(2) = 5$ et $f'(2) = 3$. On obtient :

$$y = 3(x-2) + 5 = 3x - 6 + 5 = 3x - 1.$$

L'équation de la tangente T est donc $y = 3x - 1$.

Question 2. La tangente passe par $A(2; 5)$. Puisque la pente vaut 3, en augmentant l'abscisse de 1, l'ordonnée augmente de 3. On obtient le point $B(3; 8)$.

Vérification : $y = 3 \times 3 - 1 = 8$. Le point $B(3; 8)$ est bien sur la tangente.

Question 3. Pour $x = 4$:

$$y = 3 \times 4 - 1 = 12 - 1 = 11.$$

L'ordonnée du point de la tangente d'abscisse 4 est 11 .

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-014

Question 1. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 passe par le point $A(1; 3)$. Or le point de tangence a pour abscisse 1, donc son ordonnée est $f(1)$.

Puisque le point de tangence est sur la tangente, on a $f(1) = 3$.

Question 2. La tangente passe par $A(1; 3)$ et $B(4; 0)$. Son coefficient directeur est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - 3}{4 - 1} = \frac{-3}{3} = -1.$$

Le coefficient directeur de la tangente vaut -1 .

Question 3. Par définition, le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est égal à $f'(a)$.

Ici $a = 1$, donc $f'(1)$ est égal au coefficient directeur de la tangente, soit $f'(1) = -1$.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-015

Question 1. Le point de tangence a pour abscisse $t = 6$. Il se situe à la fois sur la courbe et sur la tangente, donc son ordonnée est $T(6)$.

La tangente passe par le point $(6; 18)$, donc $T(6) = 18$.

Interprétation : à 6 heures du matin, la température dans le local technique est de 18°C .

Question 2. La tangente passe par les points $(6; 18)$ et $(10; 14)$. Son coefficient directeur est :

$$m = \frac{14 - 18}{10 - 6} = \frac{-4}{4} = -1.$$

Question 3. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe de T au point d'abscisse $t = 6$ est égal à $T'(6)$. Donc $T'(6) = -1$.

Question 4. On a $T'(6) = -1 < 0$. Le nombre dérivé est négatif, ce qui signifie que la fonction T est localement décroissante au voisinage de $t = 6$.

Interprétation : à 6 heures du matin, la température dans le local diminue au rythme instantané de 1°C par heure.

1SPE-DERLOCAL-EX-016

Corrigé

Question 1. L'équation de la tangente au point d'abscisse 1 est $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$.

Avec $f(1) = 2$ et $f'(1) = -1$:

$$y = -1 \times (x - 1) + 2 = -x + 1 + 2 = -x + 3.$$

L'équation de T_1 est $y = -x + 3$.

Question 2. L'équation de la tangente au point d'abscisse 3 est $y = f'(3)(x - 3) + f(3)$.

Avec $f(3) = 4$ et $f'(3) = 2$:

$$y = 2(x - 3) + 4 = 2x - 6 + 4 = 2x - 2.$$

L'équation de T_2 est $y = 2x - 2$.

Question 3. Les droites T_1 et T_2 ont pour coefficients directeurs respectifs -1 et 2 . Ces coefficients sont distincts, donc les droites ne sont pas parallèles : elles sont sécantes.

Pour trouver leur point d'intersection, on résout $-x + 3 = 2x - 2$:

$$-x + 3 = 2x - 2 \iff 3 + 2 = 2x + x \iff 5 = 3x \iff x = \frac{5}{3}.$$

On calcule l'ordonnée : $y = -\frac{5}{3} + 3 = -\frac{5}{3} + \frac{9}{3} = \frac{4}{3}$.

Vérification : $y = 2 \times \frac{5}{3} - 2 = \frac{10}{3} - \frac{6}{3} = \frac{4}{3}$. ✓

Les tangentes T_1 et T_2 se coupent au point de coordonnées $\left(\frac{5}{3}; \frac{4}{3}\right)$.

1SPE-DERLOCAL-EX-017

Corrigé

Question 1. On a $f(0) = 0^2 = 0 \neq -1$, donc le point $P(0; -1)$ n'appartient pas à la courbe $\mathcal{D}$.

Question 2. On a $f(a) = a^2$ et $f'(a) = 2a$. L'équation de la tangente T_a au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - 2a^2 + a^2.$$

D'où $T_a : y = 2ax - a^2$.

Question 3. La tangente T_a passe par $P(0; -1)$ si et seulement si les coordonnées de P vérifient l'équation de T_a :

$$-1 = 2a \times 0 - a^2 \iff -1 = -a^2 \iff a^2 = 1.$$

On obtient $a = 1$ ou $a = -1$.

Question 4. Les deux points de la parabole où la tangente passe par P sont :

- ▶ pour $a = 1$: le point de coordonnées $(1; f(1)) = (1; 1)$, avec la tangente $y = 2x - 1$;
- ▶ pour $a = -1$: le point de coordonnées $(-1; f(-1)) = (-1; 1)$, avec la tangente $y = -2x - 1$.

Vérification : $2 \times 0 - 1 = -1$ et $-2 \times 0 - 1 = -1$. Les deux tangentes passent bien par $P(0; -1)$. ✓

Les points cherchés sont $\boxed{(1; 1)}$ et $\boxed{(-1; 1)}$.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-018

Question 1. On a $f(a) = a^2$ et $f'(a) = 2a$. L'équation de la tangente T_a au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - 2a^2 + a^2.$$

D'où $T_a : y = 2ax - a^2$. Le coefficient directeur de T_a est $\boxed{2a}$.

Question 2. La droite $\mathcal{D}$ a pour équation $y = 6x - 1$, donc son coefficient directeur est 6.

Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. On cherche a tel que :

$$2a = 6 \iff a = 3.$$

Il existe une unique valeur $a = 3$ pour laquelle la tangente est parallèle à $\mathcal{D}$. La réponse est donc **oui**.

Question 3. Pour $a = 3$: $f(3) = 3^2 = 9$. Le point de la courbe est $\boxed{(3; 9)}$.

L'équation de la tangente en ce point est :

$$y = 2 \times 3 \times x - 3^2 = 6x - 9.$$

Soit $\boxed{y = 6x - 9}$.

Vérification : le coefficient directeur de cette tangente est bien 6, identique à celui de $\mathcal{D}$. De plus, $\mathcal{D} : y = 6x - 1$ et $T_3 : y = 6x - 9$ ont des ordonnées à l'origine distinctes ($-1 \neq -9$), donc ces droites sont bien parallèles et non confondues. ✓

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-019

Question 1. L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Ici $a = 1$, $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$. On obtient :

$$y = 2(x - 1) + 3 = 2x - 2 + 3 = 2x + 1.$$

L'équation de la tangente T est donc $\boxed{y = 2x + 1}$.

Question 2. On vérifie que le point $(1; 3)$ appartient à la tangente en remplaçant x par 1 :

$$y = 2 \times 1 + 1 = 3.$$

On retrouve bien l'ordonnée 3. Le point $(1; 3)$ est donc sur la tangente. ✓

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-020

Question 1. On calcule :

$$f(-1) = (-1)^2 + 1 = 1 + 1 = 2 \quad \text{et} \quad f'(-1) = 2 \times (-1) = -2.$$

Donc $\boxed{f(-1) = 2}$ et $\boxed{f'(-1) = -2}$.

Question 2. L'équation de la tangente au point d'abscisse $a = -1$ est :

$$y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) = -2(x + 1) + 2.$$

On développe :

$$y = -2x - 2 + 2 = -2x.$$

L'équation de la tangente est donc $y = -2x$.

1SPE-DERLOCAL-EX-021

Corrigé

Question 1. On calcule :

$$f(3) = 3^2 - 4 \times 3 + 5 = 9 - 12 + 5 = 2 \quad \text{et} \quad f'(3) = 2 \times 3 - 4 = 2.$$

Donc $f(3) = 2$ et $f'(3) = 2$.

Question 2. L'équation de la tangente au point d'abscisse $a = 3$ est :

$$y = f'(3)(x - 3) + f(3) = 2(x - 3) + 2 = 2x - 6 + 2 = 2x - 4.$$

L'équation de la tangente T est $y = 2x - 4$.

Question 3. L'axe des abscisses a pour équation $y = 0$. On résout :

$$2x - 4 = 0 \iff 2x = 4 \iff x = 2.$$

La tangente T coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $(2; 0)$.

Vérification : $y = 2 \times 2 - 4 = 0$. ✓

1SPE-DERLOCAL-EX-022

Corrigé

Question 1. On calcule :

$$B(20) = -2 \times 20^2 + 120 \times 20 - 1000 = -800 + 2400 - 1000 = 600.$$

$$B'(20) = -4 \times 20 + 120 = -80 + 120 = 40.$$

Donc $B(20) = 600$ euros et $B'(20) = 40$.

Question 2. L'équation de la tangente au point d'abscisse $q = 20$ est :

$$y = B'(20)(q - 20) + B(20) = 40(q - 20) + 600 = 40q - 800 + 600 = 40q - 200.$$

L'équation de la tangente T est $y = 40q - 200$.

Question 3. La pente de la tangente vaut $B'(20) = 40 > 0$. Cela signifie que, au voisinage de $q = 20$ articles, le bénéfice est croissant : produire et vendre un article supplémentaire augmente le bénéfice d'environ 40 euros. Le bénéfice marginal est positif, il est donc encore avantageux pour l'entreprise d'augmenter sa production.

1SPE-DERLOCAL-EX-023

Corrigé

Question 1. On a $f(a) = a^2$ et $f'(a) = 2a$. L'équation de la tangente T_a au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - 2a^2 + a^2.$$

D'où $T_a : y = 2ax - a^2$.

Question 2. La tangente T_a passe par $O(0; 0)$ si et seulement si, en remplaçant x par 0 et y par 0 dans l'équation de T_a :

$$0 = 2a \times 0 - a^2 \iff 0 = -a^2 \iff a^2 = 0 \iff a = 0.$$

La seule valeur est $a = 0$.

Question 3. Pour $a = 0$: $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$. L'équation de la tangente T_0 est :

$$y = 2 \times 0 \times x - 0^2 = 0.$$

La tangente est la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses.

Remarque : ce résultat est cohérent car la courbe de $f(x) = x^2$ admet un minimum en $x = 0$ et la tangente en ce point est horizontale.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-024

Question 1. Une tangente est horizontale lorsque sa pente est nulle, c'est-à-dire $f'(a) = 0$.

On résout :

$$2a - 2 = 0 \iff 2a = 2 \iff a = 1.$$

La tangente est horizontale pour $a = 1$.

On calcule $f(1) = 1^2 - 2 \times 1 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2$.

L'équation de la tangente horizontale est :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0 \times (x - 1) + 2 = 2.$$

Soit $y = 2$.

Question 2. La droite $\mathcal{D}$ a pour coefficient directeur 4. La tangente est parallèle à $\mathcal{D}$ lorsque $f'(a) = 4$.

On résout :

$$2a - 2 = 4 \iff 2a = 6 \iff a = 3.$$

La tangente est parallèle à $\mathcal{D}$ pour $a = 3$.

On calcule $f(3) = 3^2 - 2 \times 3 + 3 = 9 - 6 + 3 = 6$.

L'équation de la tangente est :

$$y = f'(3)(x - 3) + f(3) = 4(x - 3) + 6 = 4x - 12 + 6 = 4x - 6.$$

Soit $y = 4x - 6$.

Vérification : le coefficient directeur de cette tangente est 4, identique à celui de $\mathcal{D}$. Les ordonnées à l'origine sont distinctes ($-6 \neq 0$), donc les droites sont bien parallèles. ✓

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-025

1. $f(4) = -16 + 24 - 3 = 5$ et $f'(4) = -2 \times 4 + 6 = -2$.

2. L'approximation linéaire au voisinage de $a = 4$ avec $h = 0,03$ donne :

$$f(4,03) \approx f(4) + f'(4) \times 0,03 = 5 + (-2) \times 0,03 = 5 - 0,06 = 4,94.$$

3. La valeur exacte est $f(4,03) = -(4,03)^2 + 6 \times 4,03 - 3 = -16,2409 + 24,18 - 3 = 4,9391$.

L'approximation 4,94 est proche de la valeur exacte 4,9391 : l'écart est de 0,0009, ce qui confirme que l'approximation linéaire est pertinente pour un petit incrément $h = 0,03$.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-026

Question 1. On a $f(3) = 9$ et $f'(3) = 2 \times 3 = 6$. L'approximation linéaire donne :

$$f(3,02) \approx f(3) + f'(3) \times (3,02 - 3) = 9 + 6 \times 0,02 = 9,12.$$

Question 2. De même, avec $h = 2,98 - 3 = -0,02$:

$$f(2,98) \approx f(3) + f'(3) \times (-0,02) = 9 - 0,12 = 8,88.$$

Question 3. Valeurs exactes : $3,02^2 = 9,1204$ et $2,98^2 = 8,8804$.

L'erreur est de 0,0004 dans les deux cas. L'approximation linéaire est donc très précise lorsque h est petit.

1SPE-DERLOCAL-EX-027

Corrigé

Question 1. On a $f(9) = \sqrt{9} = 3$.

Question 2. L'approximation linéaire au voisinage de $a = 9$ donne :

$$\sqrt{9,1} \approx f(9) + f'(9) \times (9,1 - 9) = 3 + \frac{1}{6} \times 0,1 = 3 + \frac{1}{60} = \boxed{\frac{181}{60}}.$$

En écriture décimale : $\frac{181}{60} \approx 3,0167$.

Question 3. La calculatrice donne $\sqrt{9,1} \approx 3,0166$.

L'erreur est d'environ 0,0001, soit un dix-millième. L'approximation linéaire est donc très précise au voisinage de 9.

1SPE-DERLOCAL-EX-028

Corrigé

Question 1. La valeur $P'(10) = 800$ signifie qu'à l'instant $t = 10$ ans, la population de la ville croît à un rythme instantané de 800 habitants par an.

Question 2. L'approximation linéaire au voisinage de $t = 10$ donne :

$$P(10,5) \approx P(10) + P'(10) \times (10,5 - 10) = 25\,000 + 800 \times 0,5 = \boxed{25\,400 \text{ habitants}}.$$

Question 3. De même :

$$P(12) \approx P(10) + P'(10) \times (12 - 10) = 25\,000 + 800 \times 2 = \boxed{26\,600 \text{ habitants}}.$$

Question 4. L'estimation de $P(10,5)$ est plus fiable que celle de $P(12)$. En effet, l'approximation linéaire $f(a+h) \approx f(a) + f'(a) \times h$ n'est valable que lorsque h est proche de 0. Ici, $h = 0,5$ pour la première estimation et $h = 2$ pour la seconde. Plus h est grand, plus on s'éloigne du point de tangence et plus l'écart entre la courbe et sa tangente risque de se creuser. L'estimation de $P(12)$ est donc moins fiable.

1SPE-DERLOCAL-EX-029

Corrigé

Question 1. On a $f(2) = \frac{1}{2}$ et $f'(2) = -\frac{1}{4}$. L'approximation linéaire donne :

$$\frac{1}{2,01} \approx f(2) + f'(2) \times 0,01 = \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) \times 0,01 = 0,5 - 0,0025 = \boxed{0,4975}.$$

Question 2. La valeur exacte est $\frac{1}{2,01} = \frac{100}{201} \approx 0,49751$.

Question 3. On calcule l'erreur :

$$E(h) = f(a+h) - f(a) - f'(a) \cdot h = \frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} - \left(-\frac{1}{a^2}\right)h = \frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} + \frac{h}{a^2}.$$

On réduit au même dénominateur $a^2(a+h)$:

$$E(h) = \frac{a^2}{a^2(a+h)} - \frac{a(a+h)}{a^2(a+h)} + \frac{h(a+h)}{a^2(a+h)}.$$

Le numérateur est :

$$a^2 - a(a+h) + h(a+h) = a^2 - a^2 - ah + ah + h^2 = h^2.$$

D'où $E(h) = \boxed{\frac{h^2}{a^2(a+h)}}.$

Question 4. Avec $a = 2$ et $h = 0,01$:

$$E(0,01) = \frac{(0,01)^2}{4 \times 2,01} = \frac{0,0001}{8,04} \approx 0,0000124.$$

Vérifions : $\frac{100}{201} - 0,4975 = 0,49751 \dots - 0,4975 = 0,00001 \dots \checkmark$

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-030

Question 1. Au voisinage de $a = 1$: $f(1) = 1$ et $f'(1) = 3$.

Avec $h = 0,02$:

$$1,02^3 \approx 1 + 3 \times 0,02 = \boxed{1,06}.$$

Valeur exacte : $1,02^3 = 1,061208$. L'erreur est $|1,061208 - 1,06| = 0,001208$.

Question 2. Au voisinage de $a = 2$: $f(2) = 8$ et $f'(2) = 12$.

Avec $h = 0,01$:

$$2,01^3 \approx 8 + 12 \times 0,01 = \boxed{8,12}.$$

Valeur exacte : $2,01^3 = 8,120601$. L'erreur est $|8,120601 - 8,12| = 0,000601$.

Question 3. L'erreur au voisinage de $a = 1$ avec $h = 0,02$ est $\approx 0,0012$, tandis que l'erreur au voisinage de $a = 2$ avec $h = 0,01$ est $\approx 0,0006$.

En valeur absolue, l'erreur au voisinage de 1 est ici plus grande car $h = 0,02 > 0,01$. Cependant, en erreur *relative* (rapportée à la valeur de $f(a)$) :

- ▶ au voisinage de 1 : $\frac{0,0012}{1} = 0,12\%$;
- ▶ au voisinage de 2 : $\frac{0,0006}{8} = 0,0075\%$.

Dans cet exemple, le pas au voisinage de 2 est deux fois plus petit. Il conduit donc ici à une erreur absolue plus petite. L'approximation linéaire est d'autant plus fiable que h est proche de 0 ; ce calcul ne permet pas, à lui seul, de comparer deux voisinages avec des pas différents.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-031

On calcule les images de 0 et de 2 par f :

$$f(0) = 3 \times 0 - 0^2 = 0$$

$$f(2) = 3 \times 2 - 2^2 = 6 - 4 = 2$$

Le taux de variation de f entre 0 et 2 est :

$$\tau = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{2 - 0}{2} = 1$$

Le taux de variation de f entre 0 et 2 vaut $\boxed{1}$.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-032

1. Le taux de variation de f entre $x = 1$ et $x = 5$ est :

$$\tau = \frac{f(5) - f(1)}{5 - 1} = \frac{26 - 2}{4} = \frac{24}{4} = \boxed{6}$$

2. Le taux de variation de f entre $x = 3$ et $x = 7$ est :

$$\tau = \frac{f(7) - f(3)}{7 - 3} = \frac{50 - 10}{4} = \frac{40}{4} = \boxed{10}$$

1SPE-DERLOCAL-EX-033

Corrigé

On calcule $f(1+h)$:

$$f(1+h) = (1+h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$$

On calcule $f(1)$:

$$f(1) = 1^3 = 1$$

Le taux de variation est :

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{1 + 3h + 3h^2 + h^3 - 1}{h} = \frac{3h + 3h^2 + h^3}{h}$$

On factorise par h au numérateur :

$$\frac{h(3 + 3h + h^2)}{h} = 3 + 3h + h^2$$

Lorsque h tend vers 0, l'expression $3 + 3h + h^2$ tend vers 3.

Donc $\boxed{f'(1) = 3}$.

1SPE-DERLOCAL-EX-034

Corrigé

D'après le tableau, lorsque h prend les valeurs 0,1, 0,01 et 0,001, le taux de variation prend respectivement les valeurs 6,1, 6,01 et 6,001.

On observe que plus h se rapproche de 0, plus le taux de variation se rapproche de 6.

Le taux de variation semble tendre vers 6 lorsque h tend vers 0.

Or, par définition, $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

On en déduit que $\boxed{f'(a) = 6}$.

1SPE-DERLOCAL-EX-035

Corrigé

La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 a pour équation :

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2)$$

On remplace par les valeurs connues :

$$y = -1 \times (x - 2) + 3 = -x + 2 + 3 = -x + 5$$

L'équation de la tangente est $y = -x + 5$.

On détermine deux points de cette droite :

- Pour $x = 2$: $y = -2 + 5 = 3$, donc le point $A(2; 3)$.
- Pour $x = 3$: $y = -3 + 5 = 2$, donc le point $B(3; 2)$.

On trace la droite passant par $A(2; 3)$ et $B(3; 2)$: c'est une droite de pente -1 qui passe par le point de tangence.

1SPE-DERLOCAL-EX-036

Corrigé

La tangente à la courbe de f au point $A(1; 2)$ passe par le point $B(3; 6)$.

Le nombre dérivé $f'(1)$ est égal au coefficient directeur de cette tangente.

On calcule le coefficient directeur de la droite (AB) :

$$f'(1) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6 - 2}{3 - 1} = \frac{4}{2} = \boxed{2}$$

Donc $f'(1) = 2$.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-037

On rappelle que l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

On calcule $f(3)$:

$$f(3) = 3^2 = 9$$

On admet que $f'(x) = 2x$ (dérivée de x^2), donc :

$$f'(3) = 2 \times 3 = 6$$

L'équation de la tangente au point d'abscisse 3 est :

$$y = 6(x - 3) + 9 = 6x - 18 + 9$$

$$y = 6x - 9$$

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-038

L'approximation affine de f au voisinage de a est :

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

On a $f(x) = \sqrt{x}$, donc $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

On calcule en $a = 4$:

$$f(4) = \sqrt{4} = 2 \quad \text{et} \quad f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$$

L'approximation affine donne, pour $x = 4,02$:

$$\sqrt{4,02} \approx 2 + \frac{1}{4} \times (4,02 - 4) = 2 + \frac{1}{4} \times 0,02 = 2 + 0,005$$

Donc $\sqrt{4,02} \approx 2,005$.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-039

1. On calcule les coûts de production pour $q = 10$ et $q = 12$:

$$C(10) = 0,5 \times 10^2 + 3 \times 10 + 100 = 50 + 30 + 100 = 180$$

$$C(12) = 0,5 \times 12^2 + 3 \times 12 + 100 = 72 + 36 + 100 = 208$$

2. Le taux de variation de C entre $q = 10$ et $q = 12$ est :

$$\tau = \frac{C(12) - C(10)}{12 - 10} = \frac{208 - 180}{2} = \frac{28}{2} = 14$$

3. Ce taux de variation représente le coût marginal moyen entre la 10^e et la 12^e pièce produite. En moyenne, chaque pièce supplémentaire coûte 14 euros lorsque la production passe de 10 à 12 pièces par jour.

1SPE-DERLOCAL-EX-040

Corrigé

1. On calcule les températures aux instants $t = 0$ et $t = 5$:

$$T(0) = 100 - 2 \times 0^2 = 100$$

$$T(5) = 100 - 2 \times 5^2 = 100 - 50 = 50$$

2. Le taux de variation de T entre $t = 0$ et $t = 5$ est :

$$\tau = \frac{T(5) - T(0)}{5 - 0} = \frac{50 - 100}{5} = \frac{-50}{5} = -10$$

3. Le taux de variation est négatif ($\tau = -10$), ce qui signifie que la température du four diminue après extinction. En moyenne, la température baisse de $\boxed{10}$ degrés Celsius par minute entre les instants $t = 0$ et $t = 5$. Le signe négatif traduit le refroidissement du four.

1SPE-DERLOCAL-EX-041

Corrigé

1. On calcule $P(4)$:

$$P(4) = 500 + 100 \times 4 + 5 \times 4^2 = 500 + 400 + 80 = 980$$

On exprime $P(4 + h)$:

$$P(4 + h) = 500 + 100(4 + h) + 5(4 + h)^2 = 500 + 400 + 100h + 5(16 + 8h + h^2)$$

$$P(4 + h) = 980 + 100h + 40h + 5h^2 = 980 + 140h + 5h^2$$

2. Le taux de variation est :

$$\frac{P(4 + h) - P(4)}{h} = \frac{980 + 140h + 5h^2 - 980}{h} = \frac{140h + 5h^2}{h} = \frac{h(140 + 5h)}{h} = 140 + 5h$$

3. Lorsque h tend vers 0 :

$$\lim_{h \rightarrow 0} (140 + 5h) = 140$$

Ce nombre est le nombre dérivé de P en $t = 4$, c'est-à-dire $P'(4) = 140$.

4. En 2014 ($t = 4$), la population de la ville croît à un rythme instantané de $\boxed{140}$ milliers d'habitants par an, soit 140 000 habitants par an. Ce nombre dérivé mesure la vitesse de croissance de la population à cet instant précis.

1SPE-DERLOCAL-EX-042

Corrigé

1. On calcule les hauteurs d'eau :

$$h(0) = 12 - \frac{0^2}{3} = 12 \quad h(3) = 12 - \frac{9}{3} = 12 - 3 = 9 \quad h(6) = 12 - \frac{36}{3} = 12 - 12 = 0$$

2. Le taux de variation de h entre $t = 0$ et $t = 3$:

$$\tau = \frac{h(3) - h(0)}{3 - 0} = \frac{9 - 12}{3} = \frac{-3}{3} = -1$$

En moyenne, le niveau d'eau baisse de 1 mètre par heure entre $t = 0$ et $t = 3$.

3. On calcule $h(3 + s)$:

$$h(3 + s) = 12 - \frac{(3 + s)^2}{3} = 12 - \frac{9 + 6s + s^2}{3} = 12 - 3 - 2s - \frac{s^2}{3} = 9 - 2s - \frac{s^2}{3}$$

Le taux de variation est :

$$\frac{h(3 + s) - h(3)}{s} = \frac{9 - 2s - \frac{s^2}{3} - 9}{s} = \frac{-2s - \frac{s^2}{3}}{s} = -2 - \frac{s}{3}$$

En faisant tendre s vers 0 :

$$h'(3) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(-2 - \frac{s}{3} \right) = -2$$

4. Comme $h'(3) = \boxed{-2} < 0$, le niveau d'eau descend à l'instant $t = 3$, à un rythme instantané de 2 mètres par heure.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-043

1. On calcule les nombres dérivés :

$$f'(0) = -2 \times 0 + 4 = 4 \quad f'(2) = -2 \times 2 + 4 = 0 \quad f'(4) = -2 \times 4 + 4 = -4$$

2. Le nombre $f'(2) = 0$ signifie que la tangente à la courbe C_f au point $B(2; 5)$ est horizontale. Le coefficient directeur de cette tangente est nul.

3. L'équation de la tangente à C_f au point $B(2; 5)$ est :

$$T : y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 0 \times (x - 2) + 5$$

$$\boxed{T : y = 5}$$

4. On observe que $f'(x) = -2x + 4$ est positive pour $x < 2$ (par exemple $f'(0) = 4 > 0$) et négative pour $x > 2$ (par exemple $f'(4) = -4 < 0$). La fonction f est donc croissante avant $x = 2$ et décroissante après $x = 2$. Le point $B(2; 5)$ correspond bien à un maximum local de f , de valeur $f(2) = 5$.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-044

1. On calcule $f(1)$:

$$f(1) = 1^3 - 3 \times 1 + 1 = 1 - 3 + 1 = -1$$

On calcule $f'(1)$:

$$f'(1) = 3 \times 1^2 - 3 = 3 - 3 = 0$$

2. La tangente T au point d'abscisse 1 a pour équation :

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0 \times (x - 1) + (-1)$$

$$\boxed{T : y = -1}$$

3. On calcule $f(x) - T(x)$ où $T(x) = -1$:

$$f(x) - (-1) = x^3 - 3x + 1 + 1 = x^3 - 3x + 2$$

On remarque que $x = 1$ est racine : $1 - 3 + 2 = 0$. On factorise par $(x - 1)$:

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)(x - 1)(x + 2) = (x - 1)^2(x + 2)$$

4. Au voisinage de $x = 1$, le facteur $(x - 1)^2$ est toujours positif ou nul, et le facteur $(x + 2)$ est strictement positif (car x est proche de 1, donc $x + 2 > 0$).

Ainsi $f(x) - T(x) = (x - 1)^2(x + 2) \geq 0$ au voisinage de $x = 1$, ce qui signifie que la courbe est **au-dessus** de sa tangente au voisinage de $x = 1$.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-045

1. On calcule :

$$f(0) = (1 + 0)^5 = 1$$

On admet $f'(x) = 5(1 + x)^4$, donc :

$$f'(0) = 5 \times (1 + 0)^4 = 5$$

2. L'approximation affine de f au voisinage de $x = 0$ s'écrit :

$$f(x) \approx f(0) + f'(0) \cdot x = 1 + 5x$$

3. On remarque que $(1,02)^5 = f(0,02)$. En appliquant l'approximation affine avec $x = 0,02$:

$$f(0,02) \approx 1 + 5 \times 0,02 = 1 + 0,1 = \boxed{1,1}$$

4. La valeur exacte est $(1,02)^5 \approx 1,1041$. L'approximation affine donne 1,1, soit une erreur d'environ 0,004, c'est-à-dire moins de 0,4 % en erreur relative. L'approximation est très précise car $x = 0,02$ est proche de 0.

1SPE-DERLOCAL-EX-046

Corrigé

1. On calcule :

$$A(10) = \pi \times 10^2 = 100\pi \text{ cm}^2$$

$$A'(10) = 2\pi \times 10 = 20\pi \text{ cm}^2/\text{cm}$$

2. L'approximation affine de A au voisinage de $r = 10$ donne :

$$A(10,1) \approx A(10) + A'(10) \times (10,1 - 10) = 100\pi + 20\pi \times 0,1 = 100\pi + 2\pi = 102\pi$$

3. La valeur exacte est :

$$A(10,1) = \pi \times (10,1)^2 = 102,01 \pi$$

L'erreur commise est :

$$102,01 \pi - 102\pi = 0,01 \pi \approx 0,031 \text{ cm}^2$$

4. Si le rayon est mesuré avec une erreur relative de 1 %, on a $\Delta r = 0,01 \times r$. L'erreur sur l'aire est approximativement :

$$\Delta A \approx A'(r) \times \Delta r = 2\pi r \times 0,01 r = 0,02 \pi r^2$$

L'erreur relative sur l'aire est donc :

$$\frac{\Delta A}{A} \approx \frac{0,02 \pi r^2}{\pi r^2} = 0,02 = \boxed{2 \%}$$

Une erreur de 1 % sur le rayon entraîne une erreur d'environ 2 % sur l'aire : l'erreur relative est doublée.

1SPE-DERLOCAL-EX-047

Corrigé

Question 1. On calcule $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour $h \neq 0$:

$$f(a+h) = (a+h)^2 - 4(a+h) + 5 = a^2 + 2ah + h^2 - 4a - 4h + 5.$$

Donc :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{2ah + h^2 - 4h}{h} = \boxed{2a + h - 4}.$$

Question 2. Lorsque $h \rightarrow 0$, le taux de variation tend vers $2a - 4$. On en déduit :

$$\boxed{f'(a) = 2a - 4}.$$

Question 3. La tangente est horizontale lorsque $f'(a) = 0$, soit $2a - 4 = 0$, d'où $a = 2$.

On a $f(2) = 4 - 8 + 5 = 1$. La tangente est horizontale au point $\boxed{(2; 1)}$.

Question 4. Au point d'abscisse 0 : $f(0) = 5$ et $f'(0) = -4$.

L'équation de la tangente est :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -4x + 5, \text{ soit } \boxed{y = -4x + 5}.$$

Question 5. La tangente coupe l'axe des abscisses lorsque $y = 0$:

$$-4x + 5 = 0 \iff x = \frac{5}{4}.$$

La tangente coupe l'axe des abscisses au point $\left(\frac{5}{4}; 0\right)$.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-048

Question 1. $f(3) = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$.

On calcule le taux de variation :

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h} = \frac{(\sqrt{4+h} - 2)(\sqrt{4+h} + 2)}{h(\sqrt{4+h} + 2)} = \frac{4+h-4}{h(\sqrt{4+h} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{4+h} + 2}.$$

Lorsque $h \rightarrow 0$: $\frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$. Donc $f'(3) = \frac{1}{4}$.

Question 2. L'équation de la tangente en $A(3; 2)$ est :

$$y = f'(3)(x-3) + f(3) = \frac{1}{4}(x-3) + 2 = \frac{x-3+8}{4} = \frac{x+5}{4}.$$

Question 3. On utilise l'approximation $f(3+h) \approx f(3) + h \cdot f'(3)$.

- $\sqrt{3,96} = f(2,96)$: ici $h = -0,04$, donc $\sqrt{3,96} \approx \frac{2,96+5}{4} = \frac{7,96}{4} = 1,99$.
- $\sqrt{4,04} = f(3,04)$: ici $h = 0,04$, donc $\sqrt{4,04} \approx \frac{3,04+5}{4} = \frac{8,04}{4} = 2,01$.

Question 4. Valeurs exactes à la calculatrice :

- ▶ $\sqrt{3,96} \approx 1,98997$; erreur $\approx 0,00003$;
- ▶ $\sqrt{4,04} \approx 2,00998$; erreur $\approx 0,00002$.

Les deux erreurs sont très faibles (de l'ordre de 10^{-5}). L'approximation est légèrement meilleure lorsque $h > 0$ dans cet exemple, car la courbe de f est concave et la tangente est au-dessus de la courbe : l'écart est un peu plus petit du côté $h > 0$. Les deux approximations restent néanmoins excellentes pour $|h|$ aussi petit.

Corrigé

1SPE-DERLOCAL-EX-049

Question 1. L'équation de la tangente au point d'abscisse a est :

$$T_a : y = f'(a)(x-a) + f(a) = 2a(x-a) + a^2 + 1.$$

En développant : $y = 2ax - 2a^2 + a^2 + 1$, soit $T_a : y = 2ax - a^2 + 1$.

Question 2. La tangente T_a passe par $O(0; 0)$ si et seulement si :

$$0 = 2a \times 0 - a^2 + 1 = -a^2 + 1.$$

On résout $a^2 = 1$, d'où $a = 1$ ou $a = -1$.

Question 3.

- ▶ Pour $a = 1$: $T_1 : y = 2 \times 1 \times x - 1 + 1$, soit $T_1 : y = 2x$.
- ▶ Pour $a = -1$: $T_{-1} : y = 2 \times (-1) \times x - 1 + 1$, soit $T_{-1} : y = -2x$.

Question 4. Les points de tangence sont les points de la courbe d'abscisse $a = 1$ et $a = -1$:

- ▶ $f(1) = 1 + 1 = 2$: le point de tangence est bien $(1; 2)$;

► $f(-1) = 1 + 1 = 2$: le point de tangence est bien $(-1 ; 2)$.

Question 5. Étudions la position relative de la courbe et de la tangente T_1 . On calcule :

$$f(x) - (2x) = x^2 + 1 - 2x = (x - 1)^2 \geq 0.$$

Ce carré est toujours positif ou nul, donc la courbe est *au-dessus* de T_1 pour tout x , avec égalité uniquement en $x = 1$.

De même : $f(x) - (-2x) = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 \geq 0$.

La parabole est au-dessus de chacune des deux tangentes. Cela traduit la convexité de la fonction f .

Corrigé

Question 1. On calcule pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h} = \frac{2 - (2+h)}{2(2+h) \cdot h} = \frac{-h}{2(2+h)h} = \boxed{\frac{-1}{2(2+h)}}.$$

Question 2. Lorsque $h \rightarrow 0$:

$$\frac{-1}{2(2+h)} \rightarrow \frac{-1}{2 \times 2} = -\frac{1}{4}.$$

Karim s'est trompé : $f'(2) = \boxed{-\frac{1}{4}}$, et non $-\frac{1}{2}$. Il a vraisemblablement confondu avec $-\frac{1}{2}$ en oubliant de mettre 2 au carré au dénominateur (la formule est $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$).

Question 3. L'équation de la tangente au point d'abscisse 2 est :

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = -\frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{2} = -\frac{x}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, \text{ soit } \boxed{y = -\frac{x}{4} + 1}.$$

Question 4. Le graphique est à réaliser par l'élève. On trace l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$ et la droite $y = -\frac{x}{4} + 1$ sur $]0,5 ; 5]$. La droite est tangente à la courbe en $(2 ; 0,5)$.

Question 5. On observe graphiquement que la courbe est *au-dessus* de la tangente au voisinage de $x = 2$.

Pour le justifier, on calcule :

$$f(x) - \left(-\frac{x}{4} + 1\right) = \frac{1}{x} + \frac{x}{4} - 1 = \frac{4 + x^2 - 4x}{4x} = \frac{(x-2)^2}{4x}.$$

Pour $x > 0$, $(x-2)^2 \geq 0$ et $4x > 0$, donc $f(x) \geq -\frac{x}{4} + 1$ avec égalité en $x = 2$ uniquement. La courbe de $\frac{1}{x}$ est bien au-dessus de sa tangente : la fonction est convexe sur $]0 ; +\infty[$.

CHAPITRE 4

Dérivation : applications aux variations

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais dériver les fonctions de référence (puissances, inverse, racine carrée).
- ▶ C2 — Je sais utiliser les règles de dérivation (somme, produit, quotient).
- ▶ C3 — Je sais utiliser le signe de la dérivée pour dresser le tableau de variations.
- ▶ C4 — Je sais trouver les extremums d'une fonction en annulant sa dérivée.
- ▶ C5 — Je sais modéliser et résoudre un problème d'optimisation à l'aide de la dérivation.

Un fabricant de boîtes de conserve veut minimiser la quantité de métal utilisée pour un volume donné de 500 mL. Quelles dimensions de la boîte cylindrique choisir ? La dérivation permet de répondre à ce problème d'optimisation.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

4.1 Dérivées des fonctions de référence

Ce tableau est à connaître par cœur : il constitue la « boîte à outils » de toute la dérivation.

DÉFINITION FONCTION DÉRIVÉE

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . La **fonction dérivée** de f , notée f' , est la fonction qui, à tout x de I , associe le nombre dérivé $f'(x)$.

Propriété Tableau des dérivées de référence. Les fonctions suivantes sont dérivables sur leur domaine de définition et leur dérivée est :

Fonction f	Domaine	Dérivée f'
$f(x) = k \quad (k \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 1$
$f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{Z}, n \leq -1)$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (x > 0)$

Exemple. Pour $f(x) = x^5$, on identifie $n = 5$. La formule $f'(x) = nx^{n-1}$ donne :

$$f'(x) = 5x^4.$$

Exemple. Pour $g(x) = x^3$, on a $n = 3$, donc :

$$g'(x) = 3x^2.$$

Par exemple, $g'(2) = 3 \times 4 = 12$. La tangente à la courbe de g au point d'abscisse 2 a pour pente 12.

Exemple. Pour $h(x) = \frac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$h'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

La dérivée est toujours *strictement négative*, ce qui s'interprétera comme une décroissance de h sur chacun de ses intervalles de définition.

Exemple. Pour $\varphi(x) = \sqrt{x}$, définie sur $[0; +\infty[$ et dérivable sur $]0; +\infty[$:

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$\text{En } x = 4 : \varphi'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}.$$

Contre-exemple. La fonction $\sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0 : $\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$.

La tangente à la courbe en $(0; 0)$ est verticale, ce qui correspond à une pente infinie — donc un nombre dérivé qui n'existe pas.

Contre-exemple. La fonction valeur absolue $f(x) = |x|$ n'est pas dérivable en 0.

En effet, le taux de variation à gauche et à droite de 0 donne :

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0 + h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1 \quad (\text{dérivée à gauche})$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0 + h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \quad (\text{dérivée à droite})$$

Les limites à gauche et à droite sont différentes ($-1 \neq 1$) : le nombre dérivé n'existe pas en 0.

Interprétation graphique : la courbe de $|x|$ présente un « angle pointu » (un point anguleux) en $x = 0$. Il n'y a pas de tangente unique en ce point.

ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $(x^n)' = nx^n$ en oubliant de diminuer l'exposant d'une unité. La bonne formule est $(x^n)' = nx^{n-1}$: on multiplie par l'exposant et on soustrait 1.

ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$ en oubliant le signe moins. La dérivée de $\frac{1}{x}$ est $-\frac{1}{x^2}$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $\sqrt{x}$ et $x^{1/2}$ dans le calcul : $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. On ne dérive pas $\sqrt{x}$ comme si c'était $\frac{1}{2}x$.

La non-dérivabilité en un point peut se manifester de deux façons : une tangente verticale (comme $\sqrt{x}$ en 0) ou un point anguleux (comme $|x|$ en 0). Dans les deux cas, la fonction est continue en ce point mais pas dérivable.

Propriété Extension aux exposants entiers négatifs. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ (y compris les entiers négatifs), la fonction $f(x) = x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et :

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$

La formule est la même que pour $n \in \mathbb{N}$; seul le domaine change.

La formule $x^n \mapsto nx^{n-1}$ fonctionne aussi pour $n = 1$: $(x)' = 1 \cdot x^0 = 1$. Et pour $n = 0$: $(1)' = 0 \cdot x^{-1} = 0$. Tout est cohérent.

Exemple. Pour $f(x) = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$, on applique la formule avec $n = -2$:

$$f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}.$$

Exemple. Pour $g(x) = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$, on a $n = -3$:

$$g'(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}.$$

POUR ALLER PLUS LOIN

On peut retrouver la formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ à partir de la définition du nombre dérivé. Le taux de variation de $f(x) = x^n$ entre a et $a + h$ est :

$$\frac{(a+h)^n - a^n}{h}.$$

En développant $(a+h)^n$ par le binôme de Newton, le seul terme en h^0 après simplification est na^{n-1} . Ainsi $f'(a) = na^{n-1}$, ce qui donne bien $f'(x) = nx^{n-1}$.

La ligne $\frac{1}{x}$ du tableau des dérivées de référence est un cas particulier : $\frac{1}{x} = x^{-1}$, et la formule $(-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$ redonne bien le résultat connu.

4.2 Règles de dérivation

Ces trois règles permettent de dériver toute combinaison de fonctions de référence. Les connaître réduit toute dérivation à un enchaînement mécanique.

Propriété Règle de la somme et de la multiplication par un scalaire. Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $u + v$ et λu sont dérivables sur I et :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (\lambda u)' = \lambda u'.$$

Exemple. Soit $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7x - 2$. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 3 \times 4x^3 - 5 \times 2x + 7 \times 1 - 0 = 12x^3 - 10x + 7.$$

Exemple. Soit $g(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} + 4$ pour $x > 0$.

On réécrit $\frac{2}{\sqrt{x}} = 2\varphi(x)$ avec $\varphi(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, et $\frac{1}{x} = h(x)$ avec $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$. Ainsi :

$$g'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - \left(-\frac{1}{x^2}\right) + 0 = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}.$$

POUR ALLER PLUS LOIN

Esquisse de preuve de la règle de la somme. On calcule le taux de variation de $u + v$:

$$\frac{(u + v)(x + h) - (u + v)(x)}{h} = \frac{u(x + h) - u(x)}{h} + \frac{v(x + h) - v(x)}{h}.$$

Lorsque $h \rightarrow 0$, chaque fraction tend respectivement vers $u'(x)$ et $v'(x)$. On en déduit $(u + v)'(x) = u'(x) + v'(x)$.

Propriété Règle du produit. Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I . Alors $u \times v$ est dérivable sur I et :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Exemple. Soit $f(x) = (2x + 1)(x^3 - 3)$. On pose $u = 2x + 1$ et $v = x^3 - 3$, d'où $u' = 2$ et $v' = 3x^2$. Alors :

$$f'(x) = u'v + uv' = 2(x^3 - 3) + (2x + 1)(3x^2).$$

On développe pour simplifier :

$$f'(x) = 2x^3 - 6 + 6x^3 + 3x^2 = 8x^3 + 3x^2 - 6.$$

Exemple. Soit $g(x) = x^2\sqrt{x}$ pour $x > 0$. On pose $u = x^2$ et $v = \sqrt{x}$, d'où $u' = 2x$ et $v' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Alors :

$$g'(x) = 2x \cdot \sqrt{x} + x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x\sqrt{x}}{2} = \frac{5x\sqrt{x}}{2}.$$

Contre-exemple. $(uv)' \neq u' \times v'$. Par exemple, pour $u = x$ et $v = x^2$, le produit est x^3 de dérivée $3x^2$, mais $u' \times v' = 1 \times 2x = 2x \neq 3x^2$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier l'un des deux termes de la règle du produit : $(uv)' = u'v + uv'$ contient *deux* termes. Ne pas écrire seulement $u'v'$.

Propriété Règle du quotient. Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , avec $v(x) \neq 0$ sur I . Alors $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Exemple. Soit $f(x) = \frac{3x-1}{x^2+1}$. On pose $u = 3x-1$ et $v = x^2+1$, d'où $u' = 3$ et $v' = 2x$. Le dénominateur $v = x^2+1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Alors :

$$f'(x) = \frac{3(x^2+1) - (3x-1)(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{3x^2+3-6x^2+2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-3x^2+2x+3}{(x^2+1)^2}.$$

Exemple. Soit $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$ pour $x > 0$. On pose $u = \sqrt{x}$ et $v = x+1$, d'où $u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ et $v' = 1$. Alors :

$$g'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x+1) - \sqrt{x} \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{\frac{x+1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x}}{(x+1)^2}.$$

En réduisant au même dénominateur $2\sqrt{x}$ au numérateur :

$$g'(x) = \frac{x+1-2x}{2\sqrt{x}(x+1)^2} = \frac{1-x}{2\sqrt{x}(x+1)^2}.$$

Contre-exemple. $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$. Pour $\frac{x^2}{x} = x$, la dérivée est 1, mais $\frac{(x^2)'}{(x)'} = \frac{2x}{1} = 2x \neq 1$.

ERREUR FRÉQUENTE

Inverser l'ordre au numérateur de la règle du quotient : c'est $u'v - uv'$ (avec le signe moins), et non $uv' - u'v$. Une inversion de signe change tous les résultats.

Mémo de la règle du quotient : « dérivée du haut fois le bas, moins le haut fois la dérivée du bas, le tout sur le bas au carré ».

4.3 Fonctions paires et fonctions impaires

DÉFINITION FONCTION PAIRE

Une fonction f définie sur un domaine D symétrique par rapport à 0 est dite **paire** si, pour tout $x \in D$:

$$f(-x) = f(x).$$

Interprétation graphique : la courbe représentative de f est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

DÉFINITION FONCTION IMPAIRE

Une fonction f définie sur un domaine D symétrique par rapport à 0 est dite **impaire** si, pour tout $x \in D$:

$$f(-x) = -f(x).$$

Interprétation graphique : la courbe représentative de f est **symétrique par rapport à l'origine O**.

Pré-requis : le domaine de f doit être symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire $x \in D \Rightarrow -x \in D$). Sinon, la question de la parité ne se pose pas.

Propriété Exemples fondamentaux.

- **Fonctions paires** : $x \mapsto x^2, x \mapsto x^4, x \mapsto |x|$.
- **Fonctions impaires** : $x \mapsto x^3, x \mapsto x, x \mapsto \frac{1}{x}$.

Plus généralement, $x \mapsto x^n$ est paire si n est pair, et impaire si n est impair.

Exemple. Montrons que $f(x) = x^2 + 1$ est paire.

Le domaine de f est $\mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x).$$

Donc f est paire. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Exemple. Montrons que $g(x) = x^3 - x$ est impaire.

Le domaine de g est $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -g(x).$$

Donc g est impaire. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

ERREUR FRÉQUENTE

Conclure qu'une fonction est impaire parce qu'elle n'est pas paire (ou inversement). De nombreuses fonctions ne sont *ni paires ni impaires* : par exemple $f(x) = x^2 + x$ vérifie $f(-1) = 0$ et $f(1) = 2$, donc $f(-1) \neq f(1)$ et $f(-1) \neq -f(1)$.

Propriété Conséquence pour l'étude de variations. Pour une fonction paire ou impaire, il suffit d'étudier la fonction sur $[0; +\infty[$ (ou $]0; +\infty[$), puis de compléter par symétrie. Cela divise le travail par deux.

4.4 Signe de la dérivée et sens de variation

THÉORÈME LIEN ENTRE SIGNE DE f' ET VARIATIONS DE f

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **strictement croissante** sur I .
- Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **strictement décroissante** sur I .
- Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **constante** sur I .

| Ce théorème est le pont entre le calcul (signe de f') et la géométrie (sens de la courbe). Il centralise toute l'étude de variations.

DÉFINITION EXTREMUM LOCAL

On dit que f admet un **maximum local** en x_0 si $f(x_0) \geq f(x)$ pour tout x au voisinage de x_0 . De même, f admet un **minimum local** en x_0 si $f(x_0) \leq f(x)$ au voisinage de x_0 .

Propriété Condition nécessaire d'extremum. Si f est dérivable en x_0 et admet un extremum local en x_0 , alors $f'(x_0) = 0$.

Conséquence pratique : les extremums d'une fonction dérivable sont à chercher parmi les solutions de $f'(x) = 0$.

Contre-exemple. La réciproque est fautive : $f'(x_0) = 0$ n'implique pas nécessairement un extremum. Pour $f(x) = x^3$, on a $f'(0) = 3 \times 0^2 = 0$, mais f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: il n'y a pas d'extremum en 0.

Quatre étapes à suivre systématiquement pour dresser un tableau de variations. Les appliquer dans l'ordre évite les oublis.

Propriété Méthode en quatre étapes. Pour étudier les variations d'une fonction f dérivable :

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant les règles de dérivation.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ pour trouver les éventuels points critiques.
3. Dresser le tableau de signes de f' en testant le signe de f' sur chaque intervalle séparé par les racines.
4. Conclure sur les variations de f : là où $f' > 0$, f croît ; là où $f' < 0$, f décroît.

Exemple. Étude complète de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Étape 1 — Calcul de f' .

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9.$$

Étape 2 — Résolution de $f'(x) = 0$.

$$3x^2 - 6x - 9 = 0 \iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x - 3)(x + 1) = 0.$$

Les racines sont $x = -1$ et $x = 3$.

Étape 3 — Tableau de signes de f' .

On factorise : $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$. On dresse le tableau de signes :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$x + 1$		$-$	0	$+$
$x - 3$		$-$	$-$	0
$f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$		$+$	0	$-$

Étape 4 — Tableau de variations de f .

On calcule les images aux points critiques :

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) + 2 = -1 - 3 + 9 + 2 = 7.$$

$$f(3) = 27 - 27 - 27 + 2 = -25.$$

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0
$f(x)$		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
		7	-25	

Conclusion : f est croissante sur $] -\infty ; -1]$, décroissante sur $[-1 ; 3]$, croissante sur $[3 ; +\infty[$. Elle admet un maximum local de 7 en $x = -1$ et un minimum local de -25 en $x = 3$.

ERREUR FRÉQUENTE

Conclure les variations uniquement d'après le signe de f' en un seul point, sans vérifier l'ensemble de l'intervalle. Il faut s'assurer que le signe ne change pas entre deux points critiques consécutifs.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de calculer les images $f(x_0)$ aux points critiques et laisser le tableau de variations sans valeurs remarquables. Ces valeurs sont indispensables pour conclure sur les extremums.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « $f'(x_0) = 0$ » et « $f(x_0) = 0$ ». La première condition porte sur la dérivée (extremum potentiel) ; la seconde sur la fonction (racine de f). Ce sont deux objets différents.

Contre-exemple. Pour $f(x) = x^2$, l'équation $f'(x) = 2x = 0$ donne $x = 0$. Mais $f(0) = 0$ est ici aussi une racine de f . Ce n'est pas toujours le cas : pour $g(x) = x^2 + 1$, on a $g'(x) = 2x$ donc $x = 0$ est un point critique, mais $g(0) = 1 \neq 0$: le point critique n'est pas une racine de g .

POUR ALLER PLUS LOIN

Preuve (sens direct). Supposons $f'(x) > 0$ sur I et soient $a < b$ deux réels de I . D'après le théorème des accroissements finis (hors programme), il existe $c \in]a; b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. Comme $f'(c) > 0$ et $b - a > 0$, on obtient $f(b) - f(a) > 0$, soit $f(b) > f(a)$: f est bien strictement croissante.

4.5 Extremums d'une fonction

Je sais... Je sais trouver les extremums d'une fonction en annulant sa dérivée.

DÉFINITION EXTREMUM LOCAL

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- f admet un **maximum local** en a si $f(x) \leq f(a)$ pour tout x au voisinage de a .
- f admet un **minimum local** en a si $f(x) \geq f(a)$ pour tout x au voisinage de a .

On dit que $f(a)$ est un **extremum local** de f .

DÉFINITION EXTREMUM GLOBAL

f admet un **maximum global** en a sur I si $f(x) \leq f(a)$ pour tout $x \in I$ (et de même pour le minimum global). Un extremum global est aussi un extremum local, mais la réciproque est fautive en général.

On distingue : extremum *local* (autour d'un point) et extremum *global* (sur tout le domaine). En optimisation, c'est l'extremum global qui répond au problème.

THÉORÈME CONDITION NÉCESSAIRE D'EXTREMUM

Si f est dérivable en a et admet un extremum local en a , alors

$$f'(a) = 0.$$

ERREUR FRÉQUENTE

La réciproque est **fautive** : $f'(a) = 0$ ne garantit pas l'existence d'un extremum en a . Il faut vérifier le changement de signe de f' autour de a .

Propriété Critère du changement de signe. Soit f dérivable sur un intervalle I et $a \in I$ tel que $f'(a) = 0$.

- ▶ Si f' change de signe de $+$ à $-$ en a , alors f admet un **maximum local** en a .
- ▶ Si f' change de signe de $-$ à $+$ en a , alors f admet un **minimum local** en a .
- ▶ Si f' ne change pas de signe en a , alors f **n'admet pas d'extremum** en a .

Exemple. Soit $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 2$, définie sur $\mathbb{R}$.

Étape 1 — Calcul de f' .

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2).$$

Étape 2 — Résoudre $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = 2.$$

Étape 3 — Tableau de signes de f' et tableau de variations.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
f	$\nearrow$	3	2	$\nearrow$

Conclusions :

- ▶ En $x = 1$: f' passe de $+$ à $-$, donc $f(1) = 3$ est un **maximum local**.
- ▶ En $x = 2$: f' passe de $-$ à $+$, donc $f(2) = 2$ est un **minimum local**.

Ces extremums sont locaux : f tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, il n'y a donc pas d'extremum global sur $\mathbb{R}$.




Figure 6 — La dérivée

s'annule en $x = 1$ et $x = 2$ avec changements de signe.

Contre-exemple. Pour $f(x) = x^3$, on a $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(0) = 0$.

Pourtant, $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ pour tout x , et f' **ne change pas de signe** en 0 : f' est positive avant et après 0.

Donc f est croissante sur $\mathbb{R}$ et **n'admet pas d'extremum** en 0. L'annulation de la dérivée est nécessaire mais pas suffisante.

ERREUR FRÉQUENTE

Conclure « $f'(1) = 0$ donc f a un extremum en 1 » sans dresser le tableau de signes. Il faut toujours vérifier le changement de signe de f' .

Méthode en trois étapes : (1) résoudre $f'(x) = 0$; (2) dresser le tableau de signes de f' ; (3) conclure sur la nature de chaque point critique.

Le point $(0; 0)$ de la courbe de x^3 est un **point d'inflexion** : la tangente (horizontale) traverse la courbe. Ce concept est hors programme en première ; on retient uniquement que $f'(a) = 0$ seul ne suffit pas.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour les fonctions deux fois dérivables, le signe de $f''(a)$ donne l'information manquante : si $f'(a) = 0$ et $f''(a) > 0$, alors $f(a)$ est un minimum local ; si $f''(a) < 0$, c'est un maximum local. Si $f''(a) = 0$, on ne peut pas conclure directement (cas de x^3 en 0). Ce critère de la dérivée seconde est étudié en terminale.

4.6 Optimisation par la dérivation

Je sais... Je sais modéliser et résoudre un problème d'optimisation à l'aide de la dérivation.

Propriété Méthode d'optimisation en six étapes. Pour trouver le maximum ou le minimum d'une quantité dans un problème concret :

1. **Modéliser.** Identifier la quantité à optimiser et introduire une variable x représentant le paramètre ajustable.
2. **Établir le domaine.** Déterminer l'intervalle I des valeurs admissibles de x (contraintes géométriques, physiques, etc.).
3. **Exprimer la quantité.** Écrire la fonction $f(x)$ à optimiser en fonction de x uniquement (éliminer les autres variables).
4. **Dériver.** Calculer $f'(x)$.
5. **Trouver les points critiques.** Résoudre $f'(x) = 0$ sur I et dresser le tableau de variations.
6. **Conclure dans le contexte.** Exprimer la réponse avec les unités adaptées et vérifier qu'elle correspond bien à un maximum ou à un minimum global sur I .

L'étape 3 est souvent la plus délicate : s'il reste deux variables, utiliser la contrainte (périmètre, volume, budget...) pour en éliminer une.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier que le point critique appartient au domaine I . Une valeur de x négative ou supérieure à la contrainte n'a pas de sens dans le contexte.

Exemple. Maximiser l'aire d'un rectangle de périmètre 20 cm.

Étape 1 — Modéliser. On note x (en cm) la longueur du rectangle. La quantité à maximiser est l'aire A .

Étape 2 — Domaine. Le périmètre impose $2x + 2\ell = 20$, donc $\ell = 10 - x$. Pour que le rectangle soit non dégénéré : $x > 0$ et $\ell > 0$, soit $10 - x > 0$, donc $x \in]0; 10[$.

Étape 3 — Exprimer A .

$$A(x) = x \cdot \ell = x(10 - x) = 10x - x^2.$$

Étape 4 — Dériver.

$$A'(x) = 10 - 2x.$$

Étape 5 — Points critiques.

$$A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5.$$

Tableau de variations sur $]0; 10[$:

x	0	5	10		
$A'(x)$		+	0	-	
$A(x)$	0	↗	25	↘	0

Étape 6 — Conclusion. A' change de signe de + à - en $x = 5$: $A(5) = 25$ est le maximum global sur $]0; 10[$.

La largeur est alors $\ell = 10 - 5 = 5$ cm. **Le rectangle d'aire maximale est le carré de côté 5 cm, d'aire 25 cm².**



Figure 7 — La parabole atteint son sommet en $x = 5$: l'aire maximale est 25 cm^2 .

Résultat classique : parmi tous les rectangles de périmètre fixé, le carré maximise l'aire. Ce résultat se généralise (inégalité arithmético-géométrique), mais la dérivation permet de le retrouver facilement.

Exemple. Situation d'accroche — Boîte cylindrique de volume 500 mL.

Un fabricant souhaite construire une boîte cylindrique fermée de volume 500 cm^3 en utilisant le moins de métal possible. Quelles dimensions (rayon r et hauteur h) choisir ?

Étape 1 — Modéliser. On note r (en cm) le rayon de la base. La surface totale de métal (deux disques + enveloppe latérale) est

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

C'est la quantité à **minimiser**.

Étape 2 — Domaine. $r > 0$ (le rayon est strictement positif).

Étape 3 — Exprimer S en fonction de r seul.

La contrainte de volume donne :

$$\pi r^2 h = 500 \Rightarrow h = \frac{500}{\pi r^2}.$$

On substitue :

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}.$$

Étape 4 — Dériver.

$$S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2}.$$

Étape 5 — Points critiques.

$$S'(r) = 0 \Leftrightarrow 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \Leftrightarrow r^3 = \frac{1000}{4\pi} = \frac{250}{\pi} \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \approx 4,30 \text{ cm}.$$

Tableau de variations sur $]0; +\infty[$:

r	0	$r_0 \approx 4,30$	$+\infty$
$S'(r)$	—	0	+
$S(r)$	$+\infty$	$\searrow$ $S_{\min}$ $\nearrow$	$+\infty$

Étape 6 — Conclusion. S' change de signe de $-$ à $+$ en r_0 : $S(r_0)$ est le **minimum global** de S sur $]0; +\infty[$.

La hauteur optimale est :

$$h = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{500}{\pi \left(\frac{250}{\pi}\right)^{2/3}} = 2r_0 \approx 8,60 \text{ cm}.$$

La boîte optimale a $r \approx 4,30 \text{ cm}$ et $h \approx 8,60 \text{ cm}$. La hauteur est égale au diamètre : la boîte est un cylindre équilatéral.

La relation $h = 2r$ (hauteur = diamètre) est le résultat optimal pour un cylindre fermé à volume fixé. On peut le vérifier en substituant $r_0 = \sqrt[3]{250/\pi}$ dans l'expression de h .

ERREUR FRÉQUENTE

Négliger l'un des deux disques dans l'expression de S et écrire $S = \pi r^2 + 2\pi rh$ (un seul disque). La surface totale d'un cylindre *fermé* comporte deux disques.

ERREUR FRÉQUENTE

Conserver deux variables (r et h) dans la fonction à dériver. La contrainte (ici le volume) doit être utilisée pour exprimer h en fonction de r avant de dériver.

POUR ALLER PLUS LOIN

La condition $h = 2r$ peut aussi se retrouver par une inégalité classique. En posant $u = r^3$ et en appliquant l'inégalité arithmético-géométrique à $r^2 + r^2 + h$ (volume fixé), on obtient le même résultat sans dérivation. Les deux approches sont complémentaires : la dérivation donne la valeur exacte du minimum et prouve son unicité.

MÉTHODE M1 — DÉRIVER UNE FONCTION DE RÉFÉRENCE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer la dérivée d'une fonction de base : puissance x^n , inverse $\frac{1}{x}$, racine $\sqrt{x}$.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie le type de la fonction : puissance, inverse ou racine carrée.
2. J'applique la formule de dérivation correspondante :
 - ▶ $(x^n)' = nx^{n-1}$ pour tout entier $n \geq 1$;
 - ▶ $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ pour $x \neq 0$;
 - ▶ $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$.
3. Je simplifie l'expression obtenue si possible.

Exemple rédigé. Calculons la dérivée de $f(x) = x^4$. On applique $(x^n)' = nx^{n-1}$ avec $n = 4$:

$$f'(x) = 4x^3.$$

La dérivée de f est donc $f'(x) = 4x^3$.

Les pièges.

- ▶ Écrire $(x^4)' = 4x^4$: oublier de diminuer l'exposant de 1.
- ▶ Écrire $(\sqrt{x})' = \frac{1}{\sqrt{x}}$: oublier le facteur $\frac{1}{2}$.
- ▶ Confondre $\left(\frac{1}{x}\right)'$ avec $\frac{1}{x}$: le signe moins est indispensable.

Vérifier son résultat. Je vérifie la cohérence de l'exposant : $(x^n)'$ est de degré $n - 1$, donc strictement inférieur à celui de la fonction de départ.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Fonction puissance : $n = 4$.

MÉTHODE M2 — CALCULER LA DÉRIVÉE D'UNE EXPRESSION

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque la fonction est une combinaison de fonctions de base : somme, produit ou quotient. L'énoncé peut demander de « dériver f » ou « calculer f' ».

La méthode pas à pas.

1. J'identifie la structure globale : somme, produit ou quotient.
2. J'applique la règle adaptée :
 - Somme : $(u + v)' = u' + v'$;
 - Produit : $(uv)' = u'v + uv'$;
 - Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.
3. Je développe et je réduis l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Calculons la dérivée de $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$. On a $u' = 2$ et $v' = 2x$. Par la règle du produit :

$$f'(x) = u'v + uv' = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x).$$

$$f'(x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6.$$

Structure produit :

$$u = 2x + 1 \text{ et}$$

$$v = x^2 - 3.$$

Je développe chaque terme.

Les pièges.

- Écrire $(uv)' = u'v'$: la règle du produit n'est pas la multiplication des dérivées.
- Oublier un des deux termes $u'v$ ou uv' dans la règle du produit.
- Inverser l'ordre au numérateur du quotient : écrire $uv' - u'v$ au lieu de $u'v - uv'$.

Vérifier son résultat. Je peux contrôler le degré : si f est de degré n , alors f' doit être de degré $n - 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — DRESSER LE TABLEAU DE VARIATIONS

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande d'étudier les variations d'une fonction dérivable sur un intervalle, ou de tracer son tableau de variations.

La méthode pas à pas.

1. Je calcule $f'(x)$.
2. Je résous $f'(x) = 0$ et j'identifie le signe de f' sur chaque sous-intervalle.
3. Je dresse le tableau de signes de f' .
4. Je complète le tableau de variations : f est croissante là où $f' > 0$, décroissante là où $f' < 0$.

Exemple rédigé. Étudions les variations de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ou $x = 1$. $f'(x) > 0$ sur $]-\infty; -1[$ et $]1; +\infty[$, $f'(x) < 0$ sur $]-1; 1[$. $f(-1) = 3$ et $f(1) = -1$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f	$\nearrow$	3		-1		$\nearrow$

Les pièges.

- Oublier de calculer les valeurs $f(-1)$ et $f(1)$ aux bornes du tableau.
- Inverser le sens des flèches selon le signe de f' .

Étape 1 : dériver.

Étape 2 : résoudre f' .

Étape 3 : dresser le tableau de variations.

- Ne pas factoriser f' correctement et se tromper dans les valeurs annultrices.

Vérifier son résultat. Je contrôle que les flèches du tableau sont cohérentes avec quelques valeurs numériques de f .

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — DÉTERMINER LES EXTREMUMS D'UNE FONCTION

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de trouver un maximum ou un minimum local (ou global sur un intervalle) d'une fonction dérivable.

La méthode pas à pas.

1. Je calcule $f'(x)$.
2. Je résous $f'(x) = 0$ pour trouver les candidats.
3. J'étudie le changement de signe de f' autour de chaque candidat.
4. Je détermine la nature de l'extremum et je calcule la valeur de f en ce point.

Exemple rédigé. Déterminons les extremums de $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2)$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 2$. $f'(x) < 0$ sur $]-\infty; 0[$, $f'(x) > 0$ sur $]0; 2[$, $f'(x) < 0$ sur $]2; +\infty[$. f' change de $-$ à $+$ en 0 : minimum local $f(0) = -1$. f' change de $+$ à $-$ en 2 : maximum local $f(2) = -8 + 12 - 1 = 3$.

Les pièges.

- Conclure qu'il y a un extremum en un point sans vérifier le changement de signe de f' .
- Confondre maximum et minimum en lisant mal le tableau de variations.
- Oublier de calculer la valeur $f(x_0)$ qui définit l'extremum.

Vérifier son résultat. Si f' ne change pas de signe en un zéro, il n'y a pas d'extremum mais un point d'inflexion.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — RÉSOUDRE UN PROBLÈME D'OPTIMISATION

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de maximiser ou minimiser une grandeur (aire, volume, coût, bénéfice...) soumise à une contrainte.

La méthode pas à pas.

1. Je modélise : j'exprime la grandeur à optimiser sous la forme d'une fonction $f(x)$ d'une seule variable.
2. Je détermine le domaine d'étude I en tenant compte des contraintes du problème.
3. Je calcule $f'(x)$ et je résous $f'(x) = 0$ sur I .
4. Je vérifie la nature du point critique (changement de signe de f') et je calcule $f(x_0)$.
5. Je conclus en répondant à la question posée avec les unités adaptées.

Exemple rédigé. On cherche à inscrire dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 cm un rectangle de largeur x ayant l'aire maximale. Par Thalès, la hauteur du rectangle est $10 - x$, donc $f(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$. $x \in]0; 10[$. $f'(x) = 10 - 2x$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$. $f' > 0$ sur $]0; 5[$ et $f' < 0$ sur $]5; 10[$: maximum en $x = 5$. L'aire maximale est $f(5) = 25 \text{ cm}^2$.

Les pièges.

Étape 1 : dériver.

Étape 2 : signifier.

Étape 4 : nature.

Étape 1 : modéliser.

Étape 2 : dériver.

Étape 5 : conclure.

- ▶ Oublier de vérifier que le point critique appartient bien au domaine I .
- ▶ Ne pas justifier la nature du point critique par le signe de f' .
- ▶ Confondre la valeur optimale de x avec la valeur optimale de la grandeur $f(x)$.

Vérifier son résultat. Je m'assure que la réponse est cohérente avec le contexte : une aire ou une longueur ne peut pas être négative.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$:

1. $f(x) = x^5$
2. $g(x) = x^3$
3. $h(x) = 7$
4. $k(x) = x$

1SPE-DERGLOBAL-EX-001

⌚ 5 min

Exercice 2

Dériver chacune des fonctions suivantes sur leur domaine de définition :

1. $f(x) = \frac{1}{x}$
2. $g(x) = \sqrt{x}$
3. $h(x) = x^4$
4. $k(x) = x^2$

1SPE-DERGLOBAL-EX-002

⌚ 5 min

Exercice 3

Dériver chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 3x^2$, définie sur $\mathbb{R}$
2. $g(x) = 5\sqrt{x}$, définie sur $]0; +\infty[$
3. $h(x) = -\frac{2}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$

1SPE-DERGLOBAL-EX-003

⌚ 5 min

Exercice 4

Dériver chacune des fonctions suivantes sur leur domaine :

1. $f(x) = x^3 + x^2$
2. $g(x) = x^4 - \frac{1}{x}$, sur $]0; +\infty[$
3. $h(x) = \sqrt{x} + x$, sur $]0; +\infty[$

1SPE-DERGLOBAL-EX-004

⌚ 5 min

Exercice 5

Soit $f(x) = 2x^3 - 3x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Calculer $f'(1)$ et $f'(-1)$. Que remarque-t-on ?
3. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$.

1SPE-DERGLOBAL-EX-005

⌚ 12 min

Exercice 6

Soit $f(x) = 4\sqrt{x} - \frac{2}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1SPE-DERGLOBAL-EX-006

⌚ 12 min

1. Calculer $f'(x)$.
2. Calculer $f'(4)$ et donner la valeur exacte.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-007
⌚ 12 min

Exercice 7 ◆◆

Soit $f(x) = x^2 - 4\sqrt{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

1SPE-DEGLOBAL-EX-008
⌚ 12 min

Exercice 8 ◆◆

Soit $f(x) = x^3 - \frac{3}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Calculer $f'(2)$.
3. Montrer que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]0; +\infty[$, et conclure sur le sens de variation de f .

1SPE-DEGLOBAL-EX-009
⌚ 18 min

Exercice 9 ◆◆◆

Soit $f(x) = x^2 - x + \frac{1}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et le mettre sous la forme $\frac{2x^3 - x^2 - 1}{x^2}$.
2. Montrer que $x = 1$ est racine du trinôme $2x^3 - x^2 - 1$.
3. Factoriser $2x^3 - x^2 - 1$ en utilisant la division euclidienne ou le schéma de Hörner.
4. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$ et dresser le tableau de variations de f .

1SPE-DEGLOBAL-EX-010
⌚ 18 min

Exercice 10 ◆◆◆

Soit $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

Un élève calcule $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$.

1. Identifier et corriger l'erreur commise par l'élève. Donner le calcul détaillé de $f'(x)$.
2. Calculer $f'(9)$.
3. Montrer que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]0; +\infty[$. En déduire les variations de f .
4. En utilisant le résultat de la question 3, comparer $f(4)$ et $f(9)$ sans calculer ces valeurs.

1SPE-DEGLOBAL-EX-011
⌚ 5 min

Exercice 11 ◆

Dériver chacune des fonctions suivantes en utilisant la règle $(uv)' = u'v + uv'$:

1. $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$
2. $g(x) = (x^3 - x)(x + 2)$

1SPE-DEGLOBAL-EX-012
⌚ 5 min

Exercice 12 ◆

Dériver chacune des fonctions suivantes en utilisant la règle $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

1. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$, sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

2. $g(x) = \frac{3x-1}{x^2+1}$, sur $\mathbb{R}$

Exercice 13 ♦

1SPE-DERGLOBAL-EX-013
⌚ 5 min

Dériver chacune des fonctions suivantes en appliquant la règle du produit :

1. $f(x) = (x^2 - 2x + 3)(x + 1)$
2. $g(x) = x(x-1)(x+1)$ (dériver d'abord $x(x-1)$, puis multiplier par $(x+1)$)

Exercice 14 ♦

1SPE-DERGLOBAL-EX-014
⌚ 5 min

Dériver chacune des fonctions suivantes en utilisant la règle du quotient :

1. $f(x) = \frac{x}{x^2+4}$, sur $\mathbb{R}$
2. $g(x) = \frac{x^2-1}{2x+1}$, sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

Exercice 15 ♦♦

1SPE-DERGLOBAL-EX-015
⌚ 12 min

Soit $f(x) = (x^2 - 3)(x^2 + 1)$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ en appliquant la règle du produit, puis factoriser le résultat.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 16 ♦♦

1SPE-DERGLOBAL-EX-016
⌚ 12 min

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 + 1}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et l'écrire sous la forme $\frac{2(x^2 + x - 1)}{(x^2 + 1)^2}$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ (on acceptera une forme avec des radicaux).
3. En déduire le tableau de variations de f .

Exercice 17 ♦♦

1SPE-DERGLOBAL-EX-017
⌚ 12 min

Soit $f(x) = (x^2 + 3)(2x - 1)$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ à l'aide de la règle du produit, puis simplifier.
2. Montrer que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (calculer le discriminant du trinôme $f'(x)$).
3. En déduire les variations de f et la valeur de f en $x = 0$.

Exercice 18 ♦♦

1SPE-DERGLOBAL-EX-018
⌚ 12 min

Soit $f(x) = \frac{2x+3}{x^2-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et le simplifier.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. Étudier le signe du numérateur de $f'(x)$ sur $] -\infty; -1[$.

Exercice 19 ♦♦♦

1SPE-DERGLOBAL-EX-019
⌚ 18 min

Soit $f(x) = (x^2 - 1)^2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ en écrivant $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 1)$ et en appliquant la règle du produit.

2. Factoriser complètement $f'(x)$.
3. En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. Un élève affirme que f est croissante sur $[-1; 1]$ car la parabole $x^2 - 1$ est positive sur cet intervalle. Réfuter cette affirmation en vous appuyant sur le tableau de variations.

1SPE-DEGLOBAL-EX-020
⌚ 18 min

Exercice 20 ◆◆◆

Soit $f(x) = \frac{x+1}{x^2-x+1}$ définie sur $\mathbb{R}$ (vérifier d'abord que le dénominateur ne s'annule jamais).

1. Montrer que $x^2 - x + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (utiliser le discriminant).
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que le numérateur vaut $-x^2 - 2x + 2$.
3. Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer le maximum de f sur $\mathbb{R}$ et vérifier numériquement en calculant f aux valeurs critiques.

1SPE-DEGLOBAL-EX-021
⌚ 5 min

Exercice 21 ◆

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ et dresser le tableau de variations de f .

1SPE-DEGLOBAL-EX-022
⌚ 5 min

Exercice 22 ◆

Soit $g(x) = -x^2 + 6x - 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$.
2. Résoudre $g'(x) = 0$.
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-023
⌚ 5 min

Exercice 23 ◆

Soit $h(x) = x^3 - 3x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $h'(x)$ et factoriser l'expression obtenue.
2. Résoudre $h'(x) = 0$.
3. Dresser le tableau de variations de h sur $\mathbb{R}$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-024
⌚ 5 min

Exercice 24 ◆

Soit $k(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $k'(x)$.
2. Résoudre $k'(x) = 0$ (on pourra utiliser le discriminant).
3. Dresser le tableau de variations de k sur $\mathbb{R}$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-025
⌚ 12 min

Exercice 25 ◆◆

La température (en degrés Celsius) relevée dans une ville au cours d'une journée est modélisée par :

$$T(t) = -t^2 + 8t + 5$$

où $t \in [0; 10]$ désigne le nombre d'heures écoulées depuis 6 h du matin.

1. Calculer $T'(t)$ et résoudre $T'(t) = 0$ sur $[0; 10]$.
2. Dresser le tableau de variations de T sur $[0; 10]$.

- À quelle heure de la journée la température est-elle maximale? Quelle est cette température maximale?
- Pendant quels intervalles de temps la température est-elle en hausse? En baisse?

Exercice 26 ♦♦1SPE-DERGLOBAL-EX-026
⌚ 12 min

Le bénéfice mensuel (en milliers d'euros) d'une entreprise en fonction de la quantité produite x (en centaines d'unités, avec $x \in [1; 9]$) est modélisé par :

$$B(x) = -2x^2 + 20x - 18$$

- Calculer $B'(x)$ et résoudre $B'(x) = 0$.
- Dresser le tableau de variations de B sur $[1; 9]$.
- Pour quelle quantité produite le bénéfice est-il maximal? Quel est ce bénéfice maximal?
- L'entreprise est bénéficiaire quand $B(x) > 0$. Vérifier que $B(1) = 0$ et interpréter.

Exercice 27 ♦♦1SPE-DERGLOBAL-EX-027
⌚ 12 min

Un objet est lancé verticalement vers le haut. Sa hauteur (en mètres) au bout de t secondes ($t \in [0; 4]$) est modélisée par :

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1$$

- Quelle est la hauteur initiale de l'objet ($t = 0$)?
- Calculer $h'(t)$ et résoudre $h'(t) = 0$ sur $[0; 4]$.
- Dresser le tableau de variations de h sur $[0; 4]$.
- À quel instant l'objet atteint-il sa hauteur maximale? Quelle est cette hauteur?

Exercice 28 ♦♦1SPE-DERGLOBAL-EX-028
⌚ 15 min

Le coût de production journalier (en centaines d'euros) d'une usine en fonction du nombre de lots fabriqués x ($x \in [0; 5]$) est modélisé par :

$$C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$$

- Calculer $C'(x)$, puis factoriser $C'(x)$ (on vérifiera que 1 et 3 sont solutions de $C'(x) = 0$).
- Dresser le tableau de signes de $C'(x)$ sur $[0; 5]$, puis le tableau de variations de C .
- Calculer $C(1)$ et $C(3)$. Interpréter ces valeurs dans le contexte.
- Sur quel intervalle le coût de production est-il décroissant?

Exercice 29 ♦♦♦1SPE-DERGLOBAL-EX-029
⌚ 18 min

Soit $f_a(x) = x^3 - 3ax$ où a est un réel paramètre.

- Calculer $f'_a(x)$.
- Cas $a \leq 0$.** Montrer que $f'_a(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. En déduire que f_a est croissante sur $\mathbb{R}$.
- Cas $a > 0$.** Résoudre $f'_a(x) = 0$ en fonction de a . Dresser le tableau de variations de f_a sur $\mathbb{R}$ (les bornes du tableau feront intervenir $\sqrt{a}$).
- Cas particulier $a = 3$.** Calculer les valeurs aux points stationnaires et dresser le tableau de variations de f_3 .

Exercice 30 ♦♦♦1SPE-DERGLOBAL-EX-030
⌚ 20 min

Soit $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = 6(x+1)(x-2)$.
2. Dresser le tableau de signes de $f'(x)$ puis le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}$.
3. **Preuve de monotonie.** Démontrer que f est strictement décroissante sur $[-1; 2]$ en utilisant la définition : pour tous $x_1, x_2 \in [-1; 2]$ avec $x_1 < x_2$, montrer que $f(x_1) > f(x_2)$.
Indication : on pourra utiliser le théorème liant signe de la dérivée et sens de variation.
4. Résoudre graphiquement (ou par calcul) l'inéquation $f'(x) \geq 0$.

1SPE-DERGLOBAL-EX-031
⌚ 5 min

Exercice 31 ◆

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 8$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et résoudre $f'(x) = 0$.
2. Vérifier le changement de signe de f' en ce point.
3. En déduire que f admet un minimum. Calculer la valeur minimale de f .

1SPE-DERGLOBAL-EX-032
⌚ 5 min

Exercice 32 ◆

Soit $g(x) = -x^2 + 4x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$ et trouver le point stationnaire de g .
2. Étudier le signe de $g'(x)$ de part et d'autre de ce point.
3. En déduire que g admet un maximum et calculer cette valeur maximale.

1SPE-DERGLOBAL-EX-033
⌚ 5 min

Exercice 33 ◆

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et factoriser (on mettra $3x$ en facteur).
2. Résoudre $f'(x) = 0$ et étudier le signe de f' .
3. Dresser le tableau de variations de f et indiquer la nature (maximum local ou minimum local) de chaque extremum, en précisant sa valeur.

1SPE-DERGLOBAL-EX-034
⌚ 5 min

Exercice 34 ◆

Soit $p(x) = x^3 - 12x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $p'(x)$ et résoudre $p'(x) = 0$.
2. Établir le signe de $p'(x)$ et dresser le tableau de variations de p .
3. Identifier le maximum local et le minimum local de p et donner leurs valeurs.

1SPE-DERGLOBAL-EX-035
⌚ 12 min

Exercice 35 ◆◆

Un commerçant vend des articles. Son chiffre d'affaires (en euros) en fonction du prix unitaire x (en euros, $x \in [0; 20]$) est modélisé par :

$$R(x) = -3x^2 + 60x$$

1. Calculer $R'(x)$ et déterminer le prix x_0 qui annule $R'(x)$.
2. Vérifier que R' change de signe en x_0 (de $+$ à $-$).
3. En déduire que R admet un maximum en x_0 . Quel est le chiffre d'affaires maximal ?
4. Quel prix le commerçant doit-il fixer pour maximiser son chiffre d'affaires ?

1SPE-DERGLOBAL-EX-036
⌚ 12 min

Exercice 36 ◆◆

On dispose d'une corde de 20 m que l'on veut couper en deux morceaux. Le premier morceau, de longueur x (avec $x \in [0; 10]$), sert à délimiter un carré; le second $(10 - x)$ forme un rectangle de largeur 1 m.

L'aire totale des deux figures est :

$$A(x) = x(10 - x)$$

1. Développer $A(x)$ et calculer $A'(x)$.
2. Résoudre $A'(x) = 0$ et vérifier que A' change de signe (de $+$ à $-$).
3. En déduire la longueur x qui maximise l'aire totale.
4. Calculer l'aire maximale obtenue.

Exercice 37 ♦♦

1SPE-DERGLOBAL-EX-037
⌚ 15 min

On découpe dans un carton carré de côté 8 cm quatre petits carrés de côté x (avec $x \in]0; 4[$) aux quatre coins, puis on rabat les bords pour former une boîte ouverte.

Le volume de cette boîte est :

$$V(x) = x(8 - 2x)^2$$

1. Développer $V(x)$.
2. Calculer $V'(x)$ et résoudre $V'(x) = 0$ sur $]0; 4[$.
3. Dresser le tableau de variations de V et déterminer la valeur de x qui maximise le volume.
4. Calculer le volume maximal (on donnera une valeur exacte).

Exercice 38 ♦♦

1SPE-DERGLOBAL-EX-038
⌚ 15 min

Le bénéfice (en milliers d'euros) d'un producteur agricole en fonction de la surface cultivée x (en hectares, $x \in [0; 7]$) est modélisé par :

$$B(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 1$$

1. Calculer $B'(x)$ et vérifier que $B'(x) = -3(x - 1)(x - 5)$.
2. Dresser le tableau de signes de $B'(x)$ et le tableau de variations de B sur $[0; 7]$.
3. Identifier les extremums locaux de B : donner leur nature (maximum ou minimum local) et leur valeur.
4. Quelle surface cultivée maximise le bénéfice ? Quel est ce bénéfice maximal ?

Exercice 39 ♦♦♦

1SPE-DERGLOBAL-EX-039
⌚ 18 min

Soit $f_k(x) = x^2 - 2kx + k$ où k est un réel paramètre.

1. Calculer $f'_k(x)$ et déterminer en fonction de k l'abscisse du point stationnaire $x_0(k)$.
2. Montrer que f_k admet un minimum en $x_0(k)$ (préciser la nature du signe de f'_k).
3. Calculer la valeur minimale $m(k) = f_k(x_0(k))$ en fonction de k .
4. Étudier les variations de la fonction $m : k \mapsto m(k)$ pour $k \in \mathbb{R}$ (on calculera $m'(k)$). Pour quelle valeur de k le minimum de f_k est-il le plus grand possible ?

Exercice 40 ♦♦♦

1SPE-DERGLOBAL-EX-040
⌚ 20 min

On fabrique une boîte sans couvercle à base carrée de côté x (en cm, $x > 0$) et de hauteur h . Le volume de la boîte doit être de 500 cm^3 .

1. Exprimer h en fonction de x à partir de la contrainte de volume $x^2 h = 500$.
2. Montrer que la surface totale (base + 4 faces latérales) est :

$$S(x) = x^2 + \frac{2000}{x}$$

Indication : la surface de la base vaut x^2 , et chaque face latérale a pour aire xh .

3. Calculer $S'(x)$ et résoudre $S'(x) = 0$ sur $]0; +\infty[$.
4. Dresser le tableau de variations de S et en déduire que S admet un minimum. Calculer les dimensions de la boîte correspondante et la surface minimale.
5. **Preuve.** Vérifier que $S''(x) = 2 + \frac{4000}{x^3} > 0$ pour tout $x > 0$, ce qui confirme que le point stationnaire est bien un minimum. (On admet que la dérivée de $\frac{1}{x}$ est $-\frac{1}{x^2}$.)

1SPE-DERGLOBAL-EX-041
⌚ 5 min

Exercice 41 ◆

Soit $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $\mathbb{R}$.

1SPE-DERGLOBAL-EX-042
⌚ 5 min

Exercice 42 ◆

Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de variations de f .
3. En déduire le minimum de f sur $\mathbb{R}$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

1SPE-DERGLOBAL-EX-043
⌚ 15 min

Exercice 43 ◆◆

Un agriculteur dispose de 20 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire le long d'un mur (le mur forme un des côtés, aucune clôture n'est nécessaire de ce côté). Il note x (en mètres) la longueur du côté perpendiculaire au mur, avec $x \in]0; 10[$.

1. Exprimer la largeur de l'enclos en fonction de x .
2. Montrer que l'aire de l'enclos est $A(x) = x(10 - x)$.
3. Calculer $A'(x)$, résoudre $A'(x) = 0$ et dresser le tableau de variations de A sur $]0; 10[$.
4. Quelle valeur de x maximise l'aire? Quelle est cette aire maximale?

1SPE-DERGLOBAL-EX-044
⌚ 15 min

Exercice 44 ◆◆

On fabrique une boîte sans couvercle à base carrée de côté x cm et de hauteur h cm, avec un volume de 32 cm^3 .

1. Exprimer h en fonction de x , pour $x > 0$.
2. Montrer que la surface totale de la boîte (base + 4 faces latérales) vaut $S(x) = x^2 + \frac{128}{x}$.
3. Calculer $S'(x)$ et résoudre $S'(x) = 0$ sur $]0; +\infty[$.
4. Dresser le tableau de variations de S et déterminer les dimensions de la boîte minimisant la surface.

1SPE-DERGLOBAL-EX-045
⌚ 20 min

Exercice 45 ◆◆◆

On inscrit un triangle dans un demi-disque de rayon $R = 5 \text{ cm}$: la base du triangle est un diamètre du demi-disque et le sommet opposé est un point du demi-cercle. On note x ($0 < x < 5$) la demi-longueur de la base du triangle.

1. Exprimer la hauteur h du triangle en fonction de x (on rappelle que tout angle inscrit dans un demi-cercle est droit).
2. En déduire que l'aire du triangle vaut $A(x) = x\sqrt{25 - x^2}$.
3. Calculer $A'(x)$ (on pourra poser $u = 25 - x^2$).

4. Résoudre $A'(x) = 0$ sur $]0; 5[$ et montrer que la valeur trouvée correspond bien à un maximum.
5. En déduire les dimensions du triangle d'aire maximale et calculer cette aire. Quelle est la nature de ce triangle?

Exercice 46



1SPE-DERGLOBAL-EX-046
⌚ 20 min

Un cône de révolution a un rayon de base $R = 6$ cm et une hauteur $H = 9$ cm. On inscrit dans ce cône un cylindre de révolution de rayon x cm ($0 < x < 6$) dont la base est dans le plan de la base du cône.

1. Par un argument de similitude de triangles, exprimer la hauteur h du cylindre en fonction de x .
2. En déduire que le volume du cylindre vaut $V(x) = \pi x^2 \left(9 - \frac{3x}{2}\right)$.
3. Calculer $V'(x)$ et résoudre $V'(x) = 0$ sur $]0; 6[$.
4. Dresser le tableau de variations de V sur $]0; 6[$.
5. Déterminer le rayon et la hauteur du cylindre de volume maximal inscrit dans ce cône, puis calculer ce volume maximal. Prouver que c'est bien un maximum global.

Exercice 47



1SPE-DERGLOBAL-EX-047
⌚ 20 min

Synthèse C1 + C2 + C3 — Étude d'une fonction sur $]0; +\infty[$

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3}{\sqrt{x}}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Réécrire $f(x)$ sous la forme $f(x) = x^{3/2} - 3x^{-1/2}$ et vérifier que ces deux expressions coïncident.
2. En utilisant les dérivées des fonctions de référence et la règle de la somme, calculer $f'(x)$. Simplifier le résultat sous la forme $f'(x) = \frac{3(x^2 + 1)}{2x^{3/2}}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ pour tout $x > 0$ et conclure sur le sens de variation de f .
4. Dresser le tableau de variations complet de f sur $]0; +\infty[$, en précisant les limites aux bornes.
5. Calculer $f(1)$ et $f(4)$. Interpréter ces valeurs dans le tableau de variations.

Exercice 48



1SPE-DERGLOBAL-EX-048
⌚ 20 min

Synthèse C2 + C3 + C4 — Étude d'une fonction rationnelle

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$ définie sur $]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.

1. En appliquant la règle de dérivation d'un quotient, montrer que

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}.$$

2. Résoudre $f'(x) = 0$ (on exprimera les racines avec des radicaux). On admettra que le discriminant du numérateur vaut $\Delta = 12$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur chacun des intervalles de définition.
4. Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
5. Déterminer les extremums locaux de f et calculer leurs valeurs exactes.

Exercice 49



1SPE-DERGLOBAL-EX-049
⌚ 20 min

Synthèse C3 + C4 + C5 — Optimisation du profit d'une entreprise

Une entreprise vend x unités d'un produit ($x \in [0; 40]$). Le prix de vente unitaire (en euros) est

$$p(x) = 50 - x \text{ et le coût total de production est } C(x) = \frac{x^2}{4} + 5x + 20.$$

1. Exprimer la recette $R(x) = x \cdot p(x)$ en fonction de x .
2. Montrer que le profit $P(x) = R(x) - C(x)$ vaut $P(x) = -\frac{5}{4}x^2 + 45x - 20$.
3. Calculer $P'(x)$ et étudier son signe sur $[0; 40]$.
4. Dresser le tableau de variations de P sur $[0; 40]$.
5. Déterminer le nombre d'unités x^* maximisant le profit, calculer le profit maximal et montrer que $P''(x^*) < 0$ (ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un maximum).

1SPE-DEGLOBAL-EX-050
⌚ 20 min

Exercice 50 ◆◆◆

Synthèse C1 + C2 + C5 — Modélisation du mouvement d'un mobile

La position (en mètres) d'un mobile sur un axe, à l'instant t (en secondes, $t \in [0; 6]$), est donnée par :

$$s(t) = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + 12t.$$

1. Calculer la vitesse $v(t) = s'(t)$ en utilisant les règles de dérivation des fonctions de référence.
2. Factoriser $v(t)$ sous la forme $(t - a)(t - b)$ et résoudre $v(t) = 0$ sur $[0; 6]$.
3. Étudier le signe de $v(t)$ sur $[0; 6]$ et dresser le tableau de variations de s .
4. Calculer $s(0)$, $s(2)$ et $s(6)$. En déduire la position maximale du mobile et l'instant auquel elle est atteinte.
5. Le mobile revient-il à son point de départ avant $t = 6$ s ? Justifier en utilisant le tableau de variations.

1SPE-DEGLOBAL-EX-051
⌚ 8 min

Exercice 51 ◆

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si elle est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre. Justifier par le calcul.

1. $f(x) = 3x^2 - 5$
2. $g(x) = x^3 + 2x$
3. $h(x) = x^2 + x$

1SPE-DEGLOBAL-EX-052
⌚ 10 min

Exercice 52 ◆◆

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$.

1. Calculer le taux de variation de f entre 0 et h , pour $h \neq 0$. Distinguer les cas $h > 0$ et $h < 0$.
2. En déduire que f n'est pas dérivable en 0.
3. La fonction g définie par $g(x) = |x - 2|$ est-elle dérivable en $x = 2$? Justifier.
4. Donner l'expression de $f'(x)$ pour $x > 0$ et pour $x < 0$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-053
⌚ 6 min

Exercice 53 ◆

En utilisant la formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ valable pour $n \in \mathbb{Z}$, dériver les fonctions suivantes sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$:

1. $f(x) = x^{-2}$
2. $g(x) = x^{-3}$
3. $h(x) = 5x^{-1}$
4. $k(x) = x^{-4} + x^2$

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

TD — Optimisation du profit d'une entreprise

Durée : 50 minutes.

Situation

Une petite entreprise fabrique et vend des stylos personnalisés. Le responsable dispose des informations suivantes :

- le coût total de production de x stylos (en centaines) est $C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 5$ (en centaines d'euros) ;
- le prix de vente unitaire est $p(x) = 45 - 6x$ euros par cent stylos (avec $0 < x \leq 6$).

L'entreprise cherche à déterminer la quantité x qui maximise son profit.

Partie A — Modélisation (10 min)

1. Vérifier que l'expression du chiffre d'affaires est $R(x) = 45x - 6x^2$.

- Exprimer le profit $P(x) = R(x) - C(x)$ en fonction de x . Développer et réduire.
- Quel est le domaine d'étude pertinent ? Justifier en tenant compte des contraintes économiques.

Partie B — Étude des variations du profit (15 min)

- Calculer $P'(x)$.
- Factoriser $P'(x)$. (On admet que $x = 5$ est une racine de P' .)
- Dresser le tableau de signes de $P'(x)$ sur $]0; 6]$.
- En déduire le tableau de variations de P sur $]0; 6]$.

Partie C — Optimisation et interprétation (15 min)

- Déterminer la valeur de x (arrondie au centième) qui maximise le profit. Quelle quantité de stylos cela représente-t-il ?
- Calculer le profit maximal (arrondi à l'euro). (Utiliser la valeur exacte $x = 1 + \sqrt{6}$.)
- Comparer les profits aux bornes : $P(0)$ (non défini économiquement — utiliser $\lim_{x \rightarrow 0^+}$) et $P(6)$. Conclure sur l'utilité de l'étude par dérivation.

Partie D — Synthèse et retour critique (10 min)

- Le modèle suppose que $p(x) = 45 - 6x > 0$. Pour quelles valeurs de x cette condition est-elle satisfaite ? Est-elle compatible avec le domaine d'étude ?
- En pratique, x est un entier (nombre de centaines). Parmi $x = 3$ et $x = 4$, lequel donne le plus grand profit ? Comparer avec la valeur optimale théorique $x^* = 1 + \sqrt{6}$.
- Rédiger une conclusion de 3 à 5 lignes : que peut-on dire de l'apport de la dérivation dans ce problème d'optimisation économique ?

TD fil rouge — La boîte de conserve optimale

Durée : 50 minutes — Toutes les capacités C1 à C5 sont mobilisées.

Accroche

Un fabricant de boîtes de conserve veut concevoir une boîte cylindrique de volume $V = 500$ mL = 500 cm³. Il souhaite **minimiser la quantité de métal utilisée**, c'est-à-dire minimiser l'aire totale de la surface de la boîte. Quelles dimensions choisir ?

Rappels : pour un cylindre droit de rayon r et de hauteur h :

$$\text{Volume : } V = \pi r^2 h \quad \text{Aire totale : } S = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

Partie A — Mise en équation (C3, C5) — 10 min

- La contrainte de volume est $\pi r^2 h = 500$. Exprimer h en fonction de r .
- Substituer dans l'expression de S pour obtenir S en fonction de r seul. Simplifier.
- Quel est le domaine de variation pertinent pour r ? Justifier.

Partie B — Dérivation (C1, C2) — 10 min

4. On pose $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$. Identifier les fonctions de référence utilisées.
5. Calculer $S'(r)$ en appliquant les règles de dérivation. Exprimer sous la forme d'un seul quotient.

Partie C — Étude du signe et variations (C3, C4) — 15 min

6. Résoudre $S'(r) = 0$ pour $r > 0$. Exprimer la solution exacte r^* .
7. Dresser le tableau de signes de $S'(r)$ sur $]0; +\infty[$.
8. Dresser le tableau de variations de $S(r)$ sur $]0; +\infty[$.
9. Conclure : r^* correspond-il à un minimum ou un maximum de S ? Pourquoi?

Partie D — Résolution et interprétation (C5) — 15 min

10. Calculer la valeur numérique $r^* \approx \dots$ cm (arrondir au millième).
11. En déduire la hauteur optimale $h^* = \frac{500}{\pi(r^*)^2}$ (arrondir au millième).
12. Vérifier que $h^* = 2r^*$ (relation remarquable entre hauteur et diamètre).
13. Calculer l'aire minimale $S(r^*)$ (arrondie au cm^2 près).
14. Rédiger une conclusion répondant à la question initiale : quelles dimensions minimisent la quantité de métal? Comparer avec une boîte standard $r = 3$ cm, $h = 17,68$ cm.

QCM d'auto-évaluation — Dérivation : applications aux variations

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Dérivées des fonctions de référence

1. [Q1] La dérivée de $f(x) = x^4$ est :
 - A. $f'(x) = x^3$
 - B. $f'(x) = 4x^3$
 - C. $f'(x) = 4x^4$
 - D. $f'(x) = 3x^3$
2. [Q2] La dérivée de $f(x) = \sqrt{x}$ pour $x > 0$ est :
 - A. $f'(x) = 2\sqrt{x}$
 - B. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$
 - C. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
 - D. $f'(x) = \frac{\sqrt{x}}{2}$
3. [Q3] La dérivée de $f(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$ est :
 - A. $f'(x) = \frac{1}{x^2}$
 - B. $f'(x) = -x^2$
 - C. $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

D. $f'(x) = \ln x$

C2 — Règles de dérivation (somme, produit, quotient)

4. [Q4] Soit $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$. Alors $f'(x)$ vaut :
- A. $6x - 5$
 - B. $3x - 5$
 - C. $6x^2 - 5$
 - D. $6x + 2$
5. [Q5] Soit $f(x) = x^2 \cdot \sqrt{x}$ pour $x > 0$. La règle à utiliser pour calculer f' est :
- A. La règle du quotient.
 - B. La règle de la somme.
 - C. La règle du produit : $(uv)' = u'v + uv'$.
 - D. Aucune règle : f n'est pas dérivable.
6. [Q6] Soit $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ pour $x \neq 1$. La règle du quotient donne $f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u = x + 1$ et $v = x - 1$. Alors $f'(x)$ vaut :
- A. $\frac{0}{(x-1)^2} = 0$
 - B. $\frac{(x-1) - (x+1)}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}$
 - C. $\frac{(x+1) + (x-1)}{(x-1)^2} = \frac{2x}{(x-1)^2}$
 - D. $\frac{1}{(x-1)^2}$

C3 — Signe de la dérivée et tableau de variations

7. [Q7] Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I , alors f est :
- A. Décroissante sur I .
 - B. Constante sur I .
 - C. Croissante sur I .
 - D. Nulle sur I .
8. [Q8] Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. On a $f'(x) = 2x - 4$. Sur quel intervalle f est-elle décroissante ?
- A. $[2; +\infty[$
 - B. $] -\infty; 4]$
 - C. $] -\infty; 2]$
 - D. $[4; +\infty[$
9. [Q9] La dérivée f' s'annule en $x = 3$ et change de signe de $+$ à $-$ en ce point. Cela signifie que f :
- A. Admet un minimum en $x = 3$.
 - B. Est constante au voisinage de $x = 3$.
 - C. Admet un maximum en $x = 3$.
 - D. Est nulle en $x = 3$.

C4 — Extremums d'une fonction

10. [Q10] Soit $f(x) = -x^2 + 6x - 5$. On a $f'(x) = -2x + 6$. La valeur $f'(x) = 0$ donne $x =$:
- A. $x = -3$
 - B. $x = 3$
 - C. $x = 6$
 - D. $x = 0$
11. [Q11] Dans la situation de la question précédente, f admet en $x = 3$:
- A. Un minimum global, car $f''(3) > 0$.
 - B. Un maximum global, car le coefficient dominant de f est négatif et $f'(3) = 0$.
 - C. Un point d'inflexion.
 - D. Aucun extremum.
12. [Q12] Pour trouver les extremums d'une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$, on doit :
- A. Résoudre $f(x) = 0$.
 - B. Résoudre $f'(x) = 0$ puis étudier le signe de f' autour des solutions.
 - C. Calculer $f(0)$.
 - D. Vérifier que f est croissante.

C5 — Problèmes d'optimisation

13. [Q13] Pour résoudre un problème d'optimisation, la première étape est de :
- A. Calculer $f'(x)$ directement.
 - B. Définir la quantité à optimiser et l'exprimer en fonction d'une seule variable.
 - C. Résoudre une équation du second degré.
 - D. Tracer la courbe de f .
14. [Q14] Une entreprise fabrique x articles. Son bénéfice est $B(x) = -2x^2 + 80x - 300$ (en euros). La valeur de x qui maximise le bénéfice vérifie $B'(x) = 0$, soit $-4x + 80 = 0$. On trouve $x =$:
- A. $x = 80$
 - B. $x = 4$
 - C. $x = 20$
 - D. $x = 40$
15. [Q15] Dans un problème où x doit vérifier $0 \leq x \leq 10$, on trouve que $f'(x) = 0$ pour $x = 5$. Parmi les valeurs à tester pour chercher le maximum de f , lesquelles doit-on obligatoirement inclure ?
- A. Uniquement $x = 5$.
 - B. $x = 5$ uniquement si f' change de signe.
 - C. $x = 0$, $x = 5$ et $x = 10$.
 - D. $x = 0$ et $x = 10$ uniquement.

Correction et diagnostics

Question	Capacité	Réponse	Distractions — erreur type et renvoi
Q1	C1	B	A : oubli du coefficient n dans nx^{n-1} — renvoi M1 C : exposant non décrémenté — renvoi M1 D : coefficient n remplacé par $n - 1$ — renvoi M1
Q2	C1	C	A : facteur 2 au numérateur au lieu du dénominateur — renvoi M1 B : dénominateur 2 omis — renvoi M1 D : $\sqrt{x}$ non dérivé, juste divisé par 2 — renvoi M1
Q3	C1	C	A : signe — oublié — renvoi M1 B : inverse au lieu de $-1/x^2$ — renvoi M1 D : confusion avec dérivée de $\ln$ — renvoi M1
Q4	C2	A	B : coefficient 3 non dérivé — renvoi M2 C : exposant non décrémenté — renvoi M2 D : terme constant +2 conservé — renvoi M2
Q5	C2	C	A : pas de quotient, c'est un produit — renvoi M2 B : pas une somme mais un produit — renvoi M2 D : f est bien dérivable sur $]0; +\infty[$ — renvoi M2
Q6	C2	B	A : $u' = 0$ au lieu de 1, erreur de dérivation — renvoi M2 C : signe + au numérateur au lieu de — — renvoi M2 D : numérateur 1 issu d'un calcul erroné — renvoi M2
Q7	C3	C	A : signe + confondu avec décroissance — renvoi M3 B : signe + confondu avec dérivée nulle — renvoi M3 D : signe de f' confondu avec annulation de f — renvoi M3
Q8	C3	C	A : intervalle de croissance au lieu de décroissance — renvoi M3 B : racine de f au lieu de f' — renvoi M3 D : $f'(4) = 4 \neq 0$, pas la racine de f' — renvoi M3
Q9	C3	C	A : changement $+$ $\rightarrow$ — correspond à un maximum, pas un minimum — renvoi M3; M4 B : le point peut être un extremum — renvoi M4 D : $f'(3) = 0$ ne signifie pas $f(3) = 0$ — renvoi M3
Q10	C4	B	A : signe de $-2x$ oublié lors de la résolution — renvoi M4 C : $f'(x) = 0$ n'implique pas $x = 6$ — renvoi M4 D : $x = 0$ correspond à $f'(0) = 6 \neq 0$ — renvoi M4
Q11	C4	B	A : coefficient dominant négatif implique maximum, pas minimum — renvoi M4 C : point d'inflexion si f' ne change pas de signe — renvoi M4 D : f' change bien de signe donc c'est un extremum — renvoi M4
Q12	C4	B	A : $f(x) = 0$ donne les racines de f , pas ses extremums — renvoi M4 C : $f(0)$ est une simple image, pas un extremum — renvoi M4 D : croissance de f ne suffit pas pour localiser les extremums — renvoi M3
Q13	C5	B	A : dériver avant de définir la quantité à optimiser — renvoi M5 C : pas nécessairement un second degré — renvoi M5 D : tracer n'est pas la première étape — renvoi M5
Q14	C5	C	A : $x = 80$ correspond à $B'(80) \neq 0$ — renvoi M5 B : $x = 4$ correspond à $B'(4) = 64 \neq 0$ — renvoi M5 D : $x = 40$ correspond à $B'(40) = -80 \neq 0$ — renvoi M5
Q15	C5	C	A : les extremums aux bornes sont aussi candidats — renvoi M5 B : sur un segment fermé, les bornes sont toujours à tester — renvoi M5 D : le point critique intérieur $x = 5$ doit aussi être vérifié — renvoi M5

Réponses correctes

Q1	B	Q2	C	Q3	C	Q4	A	Q5	C
Q6	B	Q7	C	Q8	C	Q9	C	Q10	B
Q11	B	Q12	B	Q13	B	Q14	C	Q15	C

Score : /15 Capacités à retravailler : C1 [☐Q1 ☐Q2 ☐Q3] C2 [☐Q4 ☐Q5 ☐Q6] C3 [☐Q7 ☐Q8 ☐Q9] C4 [☐Q10 ☐Q11 ☐Q12] C5 [☐Q13 ☐Q14 ☐Q15]

Corrigé — Évaluation A — Dérivation : applications aux variations

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$, donc $f'(x) = 6x - 2$.

Question 2. $f'(2) = 6 \times 2 - 2 = 12 - 2 = 10$.

Interprétation géométrique : la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 a pour coefficient directeur 10. La courbe « monte » localement avec une pente de 10 en ce point.

Question 3. $f(2) = 3 \times 4 - 2 \times 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$.

Équation de la tangente :

$$T : y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 10(x - 2) + 9 = 10x - 20 + 9 = 10x - 11.$$

Question 4. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$.

Exercice 2 — 6 points

Question 1. $g(x) = x^3 - 6x$, donc $g'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x^2 - 2) = 3(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$.

Question 2. $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\sqrt{2}$ ou $x = \sqrt{2}$ ($\sqrt{2} \approx 1,41$).

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$			
$g'(x)$	+	+	0	-	0	+	+

Question 3. $g(-\sqrt{2}) = -(\sqrt{2})^3 + 6\sqrt{2} = -2\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$. $g(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^3 - 6\sqrt{2} = 2\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = -4\sqrt{2}$.

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow 4\sqrt{2}$	$\searrow -4\sqrt{2}$	$\nearrow +\infty$

Question 4. g admet un **maximum local** de $4\sqrt{2} \approx 5,66$ en $x = -\sqrt{2}$. g admet un **minimum local** de $-4\sqrt{2} \approx -5,66$ en $x = \sqrt{2}$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $u = x^2 + 2$, $v = x - 1$, $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$h'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2x(x-1) - (x^2+2)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2}.$$

Question 2. $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-2) = 4 + 8 = 12$.

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Sur $]1; +\infty[$, seule la racine $x^* = 1 + \sqrt{3} \approx 2,73$ appartient au domaine.

Question 3. Sur $]1; +\infty[$: $(x-1)^2 > 0$ toujours. Le signe de h' est celui du numérateur $x^2 - 2x - 2$: $h'(x) < 0$ pour $1 < x < 1 + \sqrt{3}$ et $h'(x) > 0$ pour $x > 1 + \sqrt{3}$.

$$h(1 + \sqrt{3}) = \frac{(1 + \sqrt{3})^2 + 2}{(1 + \sqrt{3}) - 1} = \frac{1 + 2\sqrt{3} + 3 + 2}{\sqrt{3}} = \frac{6 + 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} + 2 = 2\sqrt{3} + 2.$$

x	1	$1 + \sqrt{3}$	$+\infty$
$h'(x)$	-	0	+
$h(x)$	$+\infty$	$\searrow 2 + 2\sqrt{3}$	$\nearrow +\infty$

h admet un minimum de $2 + 2\sqrt{3} \approx 5,46$ en $x = 1 + \sqrt{3}$ sur $]1; +\infty[$.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $R(x) = x \times (20 - x) = 20x - x^2$.

Question 2. $R'(x) = 20 - 2x$.

$$R'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10.$$

$R'(x) > 0$ pour $x < 10$ et $R'(x) < 0$ pour $x > 10$: R est maximale en $x = 10$.

Tableau de variations de R sur $[0; 20]$:

x	0	10	20
$R(x)$	0	↗ 100	↘ 0

Question 3. $R(10) = 10 \times (20 - 10) = 10 \times 10 = 100$ euros.

Le maraîcher maximise son chiffre d'affaires en vendant 10 kg de tomates au prix de 10 euros/kg, pour un chiffre d'affaires de **100** euros.

Évaluation A — Dérivation : applications aux variations

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$. (1 pt)
2. Calculer $f'(2)$ et interpréter géométriquement ce résultat. (1,5 pt)
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2. (1,5 pt)
4. Déterminer pour quelle valeur de x la tangente à la courbe de f est horizontale. (1 pt)

Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 6x$.

1. Calculer $g'(x)$ et factoriser. (1,5 pt)
2. Résoudre $g'(x) = 0$ et dresser le tableau de signes de g' . (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations complet de g sur $\mathbb{R}$. Préciser les valeurs de g aux points remarquables. (2 pt)
4. Donner les valeurs des extremums locaux de g et préciser leur nature (maximum ou minimum). (1 pt)

Exercice 3

5 points — C2, C3, C4

Soit h la fonction définie sur $] -\infty; 1[\cup]1; +\infty[$ par $h(x) = \frac{x^2 + 2}{x - 1}$.

1. Calculer $h'(x)$ à l'aide de la règle du quotient. (2 pt)
2. Factoriser le numérateur de $h'(x)$ et résoudre $h'(x) = 0$. (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations de h sur $]1; +\infty[$. (1,5 pt)

Exercice 4

4 points — C5

Un maraîcher vend des tomates à un marché. Il estime que s'il vend x kg (avec $0 \leq x \leq 20$), le prix en euros par kilogramme sera $p(x) = 20 - x$. Le coût de production est nul pour simplifier.

1. Exprimer le chiffre d'affaires $R(x) = x \cdot p(x)$. (1 pt)
2. Calculer $R'(x)$ et trouver la valeur de x qui maximise $R(x)$. (2 pt)
3. Calculer le chiffre d'affaires maximal. (1 pt)

Corrigé — Évaluation B — Dérivation : applications aux variations

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$, donc $f'(x) = 4x + 3$.

Question 2. $f'(1) = 4 + 3 = 7$.

Interprétation géométrique : la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 a pour coefficient directeur 7. La courbe monte localement avec une pente de 7 en ce point.

Question 3. $f(1) = 2 + 3 - 4 = 1$.

Équation de la tangente :

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 7(x - 1) + 1 = 7x - 7 + 1 = 7x - 6.$$

Vérification : $T(1) = 7 - 6 = 1 = f(1)$. ✓

Question 4. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{4}$.

Exercice 2 — 6 points

Question 1. $g(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$, donc $g'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2)$.

Question 2. $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = 2$.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
6	+	+	+	+	+	+	+
$x - 1$	-	-	0	+	+	+	+
$x - 2$	-	-	-	-	0	+	+
$g'(x)$	+	+	0	-	0	+	+

Question 3. $g(1) = 2 - 9 + 12 = 5$ et $g(2) = 16 - 36 + 24 = 4$.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	↗	5	↘	4	↗	$+\infty$

Question 4. g admet un **maximum local** de 5 en $x = 1$. g admet un **minimum local** de 4 en $x = 2$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, donc pour $x \neq -2$:

$$h(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x + 2} = x - 2.$$

Question 2. $h(x) = x - 2$ (pour $x \neq -2$), donc $h'(x) = 1$.

Question 3. $h'(x) = 1 > 0$ pour tout $x \neq -2$: il n'y a pas de solution à $h'(x) = 0$.

h est strictement croissante sur $] -\infty ; -2[$.

x	$-\infty$		-2
$h'(x)$	+	+	//
$h(x)$	$-\infty$	↗	-4

($h(-2)$ n'est pas défini, mais la limite à gauche est $-2 - 2 = -4$.)

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $R(x) = x \times (30 - 2x) = 30x - 2x^2$.

Question 2. $R'(x) = 30 - 4x$.

$$R'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{30}{4} = \frac{15}{2} = 7,5.$$

$R'(x) > 0$ pour $x < 7,5$ et $R'(x) < 0$ pour $x > 7,5$: R est maximale en $x = 7,5$.

Tableau de variations de R sur $[0; 15]$:

x	0	7,5	15
$R(x)$	0	↗ 112,5	↘ 0

Question 3. $R\left(\frac{15}{2}\right) = 30 \times \frac{15}{2} - 2 \times \left(\frac{15}{2}\right)^2 = 225 - 2 \times \frac{225}{4} = 225 - \frac{225}{2} = \frac{225}{2} = 112,5$ euros.

Le producteur maximise son chiffre d'affaires en vendant 7,5 litres au prix de $30 - 2 \times 7,5 = 15$ euros/L, pour un chiffre d'affaires de **112,5** euros.

Évaluation B — Dérivation : applications aux variations

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$.

1. Calculer $f'(x)$. (1 pt)
2. Calculer $f'(1)$ et interpréter géométriquement ce résultat. (1,5 pt)
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. (1,5 pt)
4. Déterminer pour quelle valeur de x la tangente à la courbe de f est horizontale. (1 pt)

Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$.

1. Calculer $g'(x)$ et factoriser. (1,5 pt)
2. Résoudre $g'(x) = 0$ et dresser le tableau de signes de g' . (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations complet de g sur $\mathbb{R}$. Préciser les valeurs de g aux points remarquables. (2 pt)
4. Donner les valeurs des extremums locaux de g et préciser leur nature. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C2, C3, C4

Soit h la fonction définie sur $] -\infty; -2[\cup] -2; +\infty[$ par $h(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$.

1. Simplifier $h(x)$ en factorisant le numérateur. (1 pt)
2. En déduire $h'(x)$ sans utiliser la règle du quotient. (1,5 pt)
3. Résoudre $h'(x) = 0$ et dresser le tableau de variations de h sur $] -\infty; -2[$. (2,5 pt)

Exercice 4

4 points — C5

Un producteur de jus de fruits fixe son prix de vente à $p(x) = 30 - 2x$ euros par litre, où x est la quantité vendue en litres (avec $0 \leq x \leq 15$). Le coût de production est nul pour simplifier.

1. Exprimer le chiffre d'affaires $R(x) = x \cdot p(x)$. (1 pt)
2. Calculer $R'(x)$ et trouver la valeur de x qui maximise $R(x)$. (2 pt)
3. Calculer le chiffre d'affaires maximal. (1 pt)

Rappel — Taux de variation et nombre dérivé

Taux de variation de f entre a et b ($a \neq b$) :

$$\tau = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Nombre dérivé $f'(a)$: c'est la limite du taux de variation $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ quand $h \rightarrow 0$. Géométriquement, $f'(a)$ est la pente de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

Exercice 54

Soit $f(x) = 2x^2 - x$.

1. Calculer le taux de variation de f entre $x = 1$ et $x = 3$.
2. Calculer $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ pour $h \neq 0$. Développer et simplifier.
3. En déduire $f'(2)$.

Corrigé

Question 1. $f(1) = 2 - 1 = 1$ et $f(3) = 18 - 3 = 15$.

$$\tau = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{15 - 1}{2} = \frac{14}{2} = 7.$$

Question 2. $f(2) = 8 - 2 = 6$ et $f(2+h) = 2(2+h)^2 - (2+h) = 2(4+4h+h^2) - 2 - h = 2h^2 + 7h + 6$.

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{2h^2 + 7h + 6 - 6}{h} = \frac{2h^2 + 7h}{h} = 2h + 7.$$

Question 3. $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (2h + 7) = 7$.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R1-EX1
⌚ 6 min

1SPE-DEGLOBAL-FR-R1-EX1
On calcule les images puis on forme le quotient $(f(b) - f(a))/(b - a)$.

$f'(2)$ est la limite du taux de variation quand $h \rightarrow 0$.

Exercice 55

On sait que $f'(4) = -3$. Interpréter ce nombre dérivé :

1. Graphiquement (donner la pente de la tangente).
2. En termes de sens de variation de f au voisinage de $x = 4$.
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 4, sachant que $f(4) = 5$.

Corrigé

Question 1. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 4 a pour pente $f'(4) = -3$.

Question 2. Comme $f'(4) = -3 < 0$, la fonction f est localement décroissante au voisinage de $x = 4$.

Question 3. $T : y = f'(4)(x - 4) + f(4) = -3(x - 4) + 5 = -3x + 12 + 5 = -3x + 17$.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R1-EX2
⌚ 5 min

1SPE-DEGLOBAL-FR-R1-EX2

Exercice 56

Soit $f(x) = x^3$. On admet que $f'(x) = 3x^2$.

1. Calculer $f'(0)$, $f'(1)$ et $f'(-2)$.
2. Pour quelle(s) valeur(s) de x la tangente à la courbe de f est-elle horizontale ?
3. La pente de la tangente en $x = 2$ est-elle plus grande ou plus petite qu'en $x = 1$? Que peut-on en déduire sur la « courbure » de f ?

Corrigé

Question 1. $f'(0) = 3 \times 0^2 = 0$, $f'(1) = 3 \times 1 = 3$, $f'(-2) = 3 \times 4 = 12$.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R1-EX3
⌚ 6 min

1SPE-DEGLOBAL-FR-R1-EX3

Question 2. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$. La tangente est horizontale uniquement en $x = 0$.

Question 3. $f'(1) = 3$ et $f'(2) = 12$: la pente en $x = 2$ est bien plus grande. Cela signifie que la courbe $f(x) = x^3$ est de plus en plus « raide » (sa pente croît) pour $x > 0$.

Rappel — Équation de la tangente

La tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Elle passe par le point $(a; f(a))$ et a pour coefficient directeur $f'(a)$.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R2-EX1

6 min

Exercice 57

On sait que $f(2) = 3$ et $f'(2) = 5$.

1. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 2.
2. Calculer $T(2)$ et vérifier que le point $(2; 3)$ est bien sur T .
3. Calculer $T(3)$.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R2-EX1

On applique la formule $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ avec $a = 2$, $f(2) = 3$, $f'(2) = 5$.

Corrigé

Question 1. $T : y = 5(x - 2) + 3 = 5x - 10 + 3 = 5x - 7$.

Question 2. $T(2) = 5 \times 2 - 7 = 10 - 7 = 3 = f(2)$. ✓ Le point $(2; 3)$ est bien sur T .

Question 3. $T(3) = 5 \times 3 - 7 = 15 - 7 = 8$.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R2-EX2

6 min

Exercice 58

Soit $f(x) = x^2$. On admet que $f'(x) = 2x$.

1. Calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.
2. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse -1 .
3. Vérifier que la tangente coupe l'axe des ordonnées en $(0; -1)$.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R2-EX2

Corrigé

Question 1. $f(-1) = (-1)^2 = 1$ et $f'(-1) = 2 \times (-1) = -2$.

Question 2. $T : y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) = -2(x + 1) + 1 = -2x - 2 + 1 = -2x - 1$.

Question 3. $T(0) = -2 \times 0 - 1 = -1$. La tangente coupe bien l'axe des ordonnées en $(0; -1)$. ✓

1SPE-DEGLOBAL-FR-R2-EX3

7 min

Exercice 59

On donne la courbe C_f . On lit que $f(1) = 4$ et que la tangente en $(1; 4)$ passe par le point $(3; 0)$.

1. Calculer la pente de la tangente.
2. En déduire $f'(1)$.
3. Écrire l'équation de la tangente.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R2-EX3

La pente d'une droite passant par $(x_1; y_1)$ et $(x_2; y_2)$ est $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.

Corrigé

Question 1. pente $= \frac{0 - 4}{3 - 1} = \frac{-4}{2} = -2$.

Question 2. $f'(1) = -2$ (la pente de la tangente est le nombre dérivé).

Question 3. $T : y = -2(x - 1) + 4 = -2x + 2 + 4 = -2x + 6$.

Vérification : $T(3) = -6 + 6 = 0$ ✓ et $T(1) = -2 + 6 = 4 = f(1)$ ✓.

Rappel — Calcul littéral

Développer : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

Factoriser : extraire le facteur commun, identifier une forme remarquable.

Signe d'un produit : $A \times B > 0 \Leftrightarrow (A > 0 \text{ et } B > 0) \text{ ou } (A < 0 \text{ et } B < 0)$.

Signe d'un quotient : $\frac{A}{B} > 0 \Leftrightarrow A \text{ et } B \text{ ont le même signe } (B \neq 0)$.

Exercice 60

Développer et réduire chaque expression.

1. $(x + 3)(x - 3)$
2. $(2x - 1)^2$
3. $x(x - 4) + 3(x^2 - 1)$

Corrigé

Question 1. $(x + 3)(x - 3) = x^2 - 3^2 = x^2 - 9$.

Question 2. $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 2 \times 2x \times 1 + 1 = 4x^2 - 4x + 1$.

Question 3. $x(x - 4) + 3(x^2 - 1) = x^2 - 4x + 3x^2 - 3 = 4x^2 - 4x - 3$.

Exercice 61

Factoriser chaque expression.

1. $6x^2 - 4x$
2. $x^2 - 9$
3. $2x^2 - 8$

Corrigé

Question 1. $6x^2 - 4x = 2x(3x - 2)$.

Question 2. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.

Question 3. $2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x - 2)(x + 2)$.

Exercice 62

Étudier le signe des expressions suivantes.

1. $f'(x) = (x - 2)(x + 1)$
2. $g'(x) = -3(x - 1)$
3. $h'(x) = \frac{x + 3}{x - 1}$ pour $x \neq 1$

Corrigé

Question 1. $(x - 2)(x + 1) = 0$ pour $x = -1$ ou $x = 2$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 2$	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Question 2. $-3(x - 1) = 0$ pour $x = 1$. Puisque $-3 < 0$, le signe de $g'(x)$ est opposé au signe de $(x - 1)$: $g'(x) > 0$ sur $] -\infty ; 1[$ et $g'(x) < 0$ sur $]1 ; +\infty[$.

Question 3.

1SPE-DERGLOBAL-FR-R3-EX1
⌚ 6 min

1SPE-DERGLOBAL-FR-R3-EX1

Identité :
 $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

1SPE-DERGLOBAL-FR-R3-EX2
⌚ 6 min

1SPE-DERGLOBAL-FR-R3-EX2

1SPE-DERGLOBAL-FR-R3-EX3
⌚ 7 min

1SPE-DERGLOBAL-FR-R3-EX3

$x + 3 = 0$ en $x = -3$;
 $x - 1 = 0$ en $x = 1$
(valeur interdite).

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$ $	$+$
$h'(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Rappel — Polynômes du second degré

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

Discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.

- ▶ Si $\Delta > 0$: deux racines réelles $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- ▶ Si $\Delta = 0$: racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- ▶ Si $\Delta < 0$: pas de racine réelle.

Forme factorisée (si $\Delta \geq 0$) : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Signe : du signe de a à l'extérieur des racines, opposé entre les racines.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R4-EX1
⌚ 7 min

Exercice 63

Soit $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

- Calculer le discriminant Δ .
- Donner les racines de f .
- Factoriser $f(x)$.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R4-EX1

Corrigé

Question 1. $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0$.

Question 2. $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$.

Question 3. $f(x) = (x-2)(x-3)$.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R4-EX2
⌚ 7 min

Exercice 64

Soit $g(x) = 2x^2 - 3x - 2$.

- Calculer Δ et les racines de g .
- Dresser le tableau de signes de $g(x)$.
- Sur quel intervalle $g(x) \leq 0$?

1SPE-DEGLOBAL-FR-R4-EX2

Corrigé

Question 1. $\Delta = 9 + 16 = 25$. $x_1 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2}$ et $x_2 = \frac{3+5}{4} = 2$.

Question 2.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	2	$+\infty$
$g(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Question 3. $g(x) \leq 0$ sur $\left[-\frac{1}{2}; 2\right]$.

$a = 2 > 0$ donc g est positive à l'extérieur des racines.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R4-EX3
⌚ 6 min

Exercice 65

On donne $h'(x) = -x^2 + 4$ (dérivée d'une certaine fonction h).

- Factoriser $h'(x)$.

2. Étudier le signe de $h'(x)$.
3. Quelles conclusions peut-on tirer sur les variations de h ?

Corrigé

1SPE-DEGLOBAL-FR-R4-EX3

Question 1. $h'(x) = -x^2 + 4 = -(x^2 - 4) = -(x - 2)(x + 2)$.

Question 2.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$-(x - 2)$	+	+	0	-
$(x + 2)$	-	0	+	+
$h'(x)$	-	0	+	-

Question 3. $h'(x) > 0$ sur $] -2; 2[$, donc h est croissante sur $[-2; 2]$. $h'(x) < 0$ sur $] -\infty; -2[$ et $]2; +\infty[$, donc h est décroissante sur ces intervalles.

Rappel — Sens de variation

Fonction croissante sur I : pour tous $a < b$ dans I , on a $f(a) \leq f(b)$. La courbe « monte » de gauche à droite.

Fonction décroissante sur I : pour tous $a < b$ dans I , on a $f(a) \geq f(b)$. La courbe « descend » de gauche à droite.

Tableau de variations : tableau récapitulatif du sens de variation, avec les valeurs aux bornes ou aux extremums.

Exercice 661SPE-DEGLOBAL-FR-R5-EX1
⌚ 5 min

La courbe d'une fonction f passe par les points $A(0; 3)$, $B(2; 7)$, $C(5; 1)$.

1. Entre $x = 0$ et $x = 2$, f est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.
2. Entre $x = 2$ et $x = 5$, f est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.
3. Dresser un tableau de variations partiel de f sur $[0; 5]$.

Corrigé

1SPE-DEGLOBAL-FR-R5-EX1

Question 1. $f(0) = 3 < f(2) = 7$: f est croissante sur $[0; 2]$.

Question 2. $f(2) = 7 > f(5) = 1$: f est décroissante sur $[2; 5]$.

Question 3.

x	0	2	5
$f(x)$	3	↗ 7	↘ 1

Le maximum de f sur cet intervalle est 7, atteint en $x = 2$.

Exercice 671SPE-DEGLOBAL-FR-R5-EX2
⌚ 6 min

On donne le tableau de variations de g :

x	-3	-1	2	4
$g(x)$	1	↘ -4	↗ 6	↘ 0

1. Sur quel(s) intervalle(s) g est-elle croissante ?
2. Donner le maximum de g sur $[-3; 4]$.
3. Donner le minimum de g sur $[-3; 4]$.
4. Comparer $g(-2)$ et $g(0)$ (sans calculer leur valeur exacte).

1SPE-DEGLOBAL-FR-R5-EX2

Corrigé

Question 1. g est croissante sur $[-1; 2]$.

Question 2. Le maximum de g sur $[-3; 4]$ est 6, atteint en $x = 2$.

Question 3. Le minimum de g sur $[-3; 4]$ est -4 , atteint en $x = -1$.

Question 4. $-2 \in [-3; -1]$ et $0 \in [-1; 2]$. Sur $[-3; -1]$, g est décroissante donc $g(-2) > g(-1) = -4$, et sur $[-1; 2]$, g est croissante donc $g(0) > g(-1) = -4$. En comparant : $-2 < 0$, et sur $[-1; 2]$, g est croissante, donc $g(-1) \leq g(-2)$ n'est pas directement applicable. Cependant, on sait uniquement que $g(-2)$ est entre -4 et 1, et $g(0)$ est entre -4 et 6. On ne peut pas conclure sans plus d'information.

1SPE-DEGLOBAL-FR-R5-EX3
⌚ 5 min

Exercice 68

Voici une liste de fonctions et leurs intervalles de définition. Pour chacune, indiquer si elle est croissante, décroissante, ou ni l'un ni l'autre, sur l'intervalle donné.

1. $f(x) = 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$.
2. $g(x) = -x^2$ sur $[0; +\infty[$.
3. $h(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$.
4. $k(x) = x^2 - 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$ (sans calcul de dérivée).

1SPE-DEGLOBAL-FR-R5-EX3

Corrigé

Question 1. $f(x) = 3x + 1$ est une fonction affine de coefficient directeur $3 > 0$: elle est **croissante** sur $\mathbb{R}$.

Question 2. Pour $0 \leq a < b$: $a^2 < b^2$ donc $-a^2 > -b^2$: $g(a) > g(b)$. g est **décroissante** sur $[0; +\infty[$.

Question 3. Pour $0 < a < b$: $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ donc $h(a) > h(b)$. h est **décroissante** sur $]0; +\infty[$.

Question 4. $k(x) = (x - 1)^2 \geq 0$. Pour $x < 1$, k est décroissante ; pour $x > 1$, k est croissante. k n'est donc **ni croissante ni décroissante** sur $\mathbb{R}$ entier.

1SPE-DEGLOBAL-RE-C1-EX1
⌚ 8 min

Exercice 69

Calculer la dérivée de chaque fonction en appliquant directement les formules de référence.

1. $f(x) = x^5$
2. $g(x) = \sqrt{x}$ ($x > 0$)
3. $h(x) = \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$)
4. $k(x) = 7$ (fonction constante)

Coup de pouce 1. Pour $f(x) = x^n$, la dérivée est $f'(x) = nx^{n-1}$. Pour $\sqrt{x}$, utiliser le tableau des dérivées de référence.

1SPE-DEGLOBAL-RE-C1-EX1
Tableau de référence :
 $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$, $(k)' = 0$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 5x^4$.

Question 2. $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Question 3. $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

Question 4. $k'(x) = 0$ (la dérivée d'une constante est nulle).

1SPE-DEGLOBAL-RE-C1-EX2
⌚ 8 min

Exercice 70

Calculer $f'(x)$, puis calculer la valeur numérique demandée.

1. $f(x) = x^3$. Calculer $f'(2)$.

2. $g(x) = \sqrt{x}$. Calculer $g'(9)$.

3. $h(x) = \frac{1}{x}$. Calculer $h'(5)$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(2) = 3 \times 4 = 12$.

Question 2. $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $g'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}$.

Question 3. $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$, donc $h'(5) = -\frac{1}{25}$.

1SPE-DERGLOBAL-RE-C1-EX2

Exercice 71

Associer chaque fonction à sa dérivée.

1SPE-DERGLOBAL-RE-C1-EX3
8 min

Fonctions	Dérivées
(a) $f(x) = x^6$	(1) $-\frac{1}{x^2}$
(b) $g(x) = \frac{1}{x}$	(2) $6x^5$
(c) $h(x) = \sqrt{x}$	(3) 0
(d) $k(x) = \pi$	(4) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
(e) $\ell(x) = x$	(5) 1

Puis donner un exemple de fonction m non listée ci-dessus dont la dérivée est $m'(x) = 4x^3$.

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-RE-C1-EX3

- (a) $\leftrightarrow$ (2) : $(x^6)' = 6x^5$.
- (b) $\leftrightarrow$ (1) : $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.
- (c) $\leftrightarrow$ (4) : $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
- (d) $\leftrightarrow$ (3) : $(\pi)' = 0$ (constante).
- (e) $\leftrightarrow$ (5) : $(x)' = 1$.

Exemple : $m(x) = x^4$, car $(x^4)' = 4x^3$.

$(x^n)' = nx^{n-1}$ avec
 $n = 4$ donne $4x^3$.

Exercice 72

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la règle de la somme et la linéarité.

1SPE-DERGLOBAL-RE-C2-EX1
8 min

1. $f(x) = 5x^3 - 2x + 7$
2. $g(x) = -x^4 + 3x^2 - x$
3. $h(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$

Coup de pouce 1. $(u + v)' = u' + v'$ et $(ku)' = ku'$. Dériver terme par terme.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 5 \times 3x^2 - 2 + 0 = 15x^2 - 2$.

Question 2. $g'(x) = -4x^3 + 3 \times 2x - 1 = -4x^3 + 6x - 1$.

Question 3. $h'(x) = \frac{2x}{2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) = x - \frac{1}{x^2}$.

1SPE-DERGLOBAL-RE-C2-EX1

On dérive chaque terme séparément en utilisant $(x^n)' = nx^{n-1}$.

1SPE-DEGLOBAL-RE-C2-EX2
9 min

Exercice 73

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la règle du produit $(uv)' = u'v + uv'$.

- $f(x) = x^2(x - 3)$
- $g(x) = (2x + 1)(x^2 - x)$

Pour chaque calcul, identifier u , v , u' et v' avant de calculer.

1SPE-DEGLOBAL-RE-C2-EX2

Corrigé

Question 1. $u = x^2$, $v = x - 3$, $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$f'(x) = u'v + uv' = 2x(x - 3) + x^2 \times 1 = 2x^2 - 6x + x^2 = 3x^2 - 6x.$$

Question 2. $u = 2x + 1$, $v = x^2 - x$, $u' = 2$, $v' = 2x - 1$.

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'v + uv' = 2(x^2 - x) + (2x + 1)(2x - 1) \\ &= 2x^2 - 2x + 4x^2 - 1 = 6x^2 - 2x - 1. \end{aligned}$$

On peut vérifier en développant d'abord : $f(x) = x^3 - 3x^2$ donc $f'(x) = 3x^2 - 6x$. ✓

1SPE-DEGLOBAL-RE-C2-EX3
9 min

Exercice 74

Calculer la dérivée en utilisant la règle du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

- $f(x) = \frac{x}{x+1}$ ($x \neq -1$)
- $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2}$ ($x \neq -2$)

1SPE-DEGLOBAL-RE-C2-EX3

Corrigé

Question 1. $u = x$, $v = x + 1$, $u' = 1$, $v' = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x + 1) - x \times 1}{(x + 1)^2} = \frac{x + 1 - x}{(x + 1)^2} = \frac{1}{(x + 1)^2}.$$

Question 2. $u = x^2 - 1$, $v = x + 2$, $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$g'(x) = \frac{2x(x + 2) - (x^2 - 1) \times 1}{(x + 2)^2} = \frac{2x^2 + 4x - x^2 + 1}{(x + 2)^2} = \frac{x^2 + 4x + 1}{(x + 2)^2}.$$

1SPE-DEGLOBAL-RE-C3-EX1
9 min

Exercice 75

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Calculer $f'(x)$.
- Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de signes de f' .
- En déduire le tableau de variations de f . Préciser les valeurs de f aux points remarquables.

Coup de pouce 1. $f'(x) = 2x - 6$. Résoudre $2x - 6 = 0$, puis étudier le signe de $2x - 6$ en fonction de la position de x par rapport à la racine.

1SPE-DEGLOBAL-RE-C3-EX1

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2x - 6$.

Question 2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

Question 3. $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow -4 \nearrow$	$+\infty$

f admet un minimum global de -4 en $x = 3$.

$f'(x) < 0$ pour $x < 3$ (on prend $x = 0$:
 $f'(0) = -6 < 0$) et
 $f'(x) > 0$ pour $x > 3$.

Exercice 76

Soit $g(x) = -2x^3 + 6x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$ et le factoriser.
2. Dresser le tableau de signes de $g'(x)$.
3. En déduire le tableau de variations de g .

1SPE-DERGLOBAL-RE-C3-EX2
 9 min

Corrigé

Question 1. $g'(x) = -6x^2 + 6 = -6(x^2 - 1) = -6(x - 1)(x + 1)$.

Question 2.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
-6	$-$	$-$	$-$	$-$
$x - 1$	$-$	$-$	0	$+$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	$-$

Question 3. $g(-1) = 2 - 6 = -4$ et $g(1) = -2 + 6 = 4$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow -4 \nearrow$	$4 \searrow$	$-\infty$

1SPE-DERGLOBAL-RE-C3-EX2

Exercice 77

Soit $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ pour $x > 0$.

1. Simplifier l'expression de $h(x)$ en séparant le quotient.
2. Calculer $h'(x)$.
3. Étudier le signe de $h'(x)$ sur $]0; +\infty[$ et dresser le tableau de variations de h .

1SPE-DERGLOBAL-RE-C3-EX3
 9 min

Corrigé

Question 1. $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x} = \frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} = x + \frac{1}{x}$.

Question 2. $h'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$.

Question 3. Pour $x > 0$: $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (racine positive).

$x^2 > 0$ pour $x > 0$, donc le signe de h' est celui du numérateur $x^2 - 1$.

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
$h(x)$	$+\infty$	$\searrow 2 \nearrow$	$+\infty$

$h(1) = 1 + 1 = 2$ est le minimum de h sur $]0; +\infty[$.

Exercice 78

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1SPE-DERGLOBAL-RE-C4-EX1
 9 min

1. Calculer $f'(x)$ et résoudre $f'(x) = 0$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations complet de f .
3. Donner les valeurs des extremums locaux de f .

Coup de pouce 1. Factoriser $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$, puis étudier le signe du produit.

1SPE-DEGLOBAL-RE-C4-EX1

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ou $x = 1$.

Question 2.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$	$+$	$+$	0	$-$	0	$+$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Question 3. f admet un maximum local de 3 en $x = -1$ et un minimum local de -1 en $x = 1$.

$f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$
et $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$.

1SPE-DEGLOBAL-RE-C4-EX2
9 min

Exercice 79

Une courbe est représentée par $g(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a > 0$. On sait que $g'(x) = 0$ pour $x = 2$ et que $g(2) = -5$.

1. Quel est le type d'extremum en $x = 2$ pour g ? Justifier.
2. Donner la valeur de cet extremum.
3. Si $g'(x) = 4x - 8$, retrouver la valeur $x = 2$ et exprimer $g(x)$ en supposant $g(0) = 3$.

1SPE-DEGLOBAL-RE-C4-EX2

Corrigé

Question 1. Comme $a > 0$ (parabole ouverte vers le haut), la fonction g est d'abord décroissante puis croissante. En $x = 2$, $g'(2) = 0$ et g' passe de $-$ à $+$, donc g admet un **minimum** en $x = 2$.

Question 2. La valeur minimale de g est $g(2) = -5$.

Question 3. $g'(x) = 4x - 8 \Rightarrow g(x) = 2x^2 - 8x + C$. $g(0) = 3 \Rightarrow C = 3$. Donc $g(x) = 2x^2 - 8x + 3$.
Vérification : $g(2) = 8 - 16 + 3 = -5$. ✓

Si $g'(x) = 4x - 8 = 4(x - 2)$, alors $a = 2$ (coefficient de x^2 dans g' divisé par 2).

1SPE-DEGLOBAL-RE-C4-EX3
9 min

Exercice 80

Soit $h(x) = \frac{x^2 - 4x + 8}{x - 1}$ pour $x \neq 1$.

1. Calculer $h'(x)$ (règle du quotient).
2. Simplifier $h'(x)$ et résoudre $h'(x) = 0$.
3. Dresser le tableau de variations de h sur $]1; +\infty[$.

1SPE-DEGLOBAL-RE-C4-EX3

Corrigé

Question 1. $u = x^2 - 4x + 8$, $v = x - 1$, $u' = 2x - 4$, $v' = 1$.

$$h'(x) = \frac{(2x - 4)(x - 1) - (x^2 - 4x + 8)}{(x - 1)^2}.$$

Question 2.

Numérateur : $2x^2 - 6x + 4 - x^2 + 4x - 8 = x^2 - 2x - 4$.

$$h'(x) = \frac{x^2 - 2x - 4}{(x - 1)^2}.$$

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 4 = 0. \Delta = 4 + 16 = 20, \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}. x = \frac{2 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}.$$

$(2x - 4)(x - 1) = 2x^2 - 6x + 4$.

Seule $x_0 = 1 + \sqrt{5} \approx 3,24$ appartient à $]1; +\infty[$.

Question 3. Sur $]1; +\infty[: (x-1)^2 > 0$ toujours. Le signe de h' est celui de $x^2 - 2x - 4$, négatif entre les racines.

x	1	$1 + \sqrt{5}$	$+\infty$
$h'(x)$	-	0	+
$h(x)$	$\searrow$	$2\sqrt{5} - 2$	$\nearrow$

$$h(1 + \sqrt{5}) = \frac{(1 + \sqrt{5})^2 - 4(1 + \sqrt{5}) + 8}{\sqrt{5}} = \frac{10 - 2\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} - 2 \approx 2,47.$$

Le minimum de h sur $]1; +\infty[$ est $2\sqrt{5} - 2$.

Exercice 81

1SPE-DEGLOBAL-RE-C5-EX1
⌚ 10 min

Un agriculteur souhaite clôturer un terrain rectangulaire en utilisant 100 m de grillage. Il note x la longueur du terrain (en mètres), avec $0 < x < 50$.

1. Exprimer la largeur ℓ du terrain en fonction de x .
2. Exprimer l'aire $A(x)$ du terrain en fonction de x .
3. Calculer $A'(x)$ et résoudre $A'(x) = 0$.
4. En déduire les dimensions qui maximisent l'aire. Calculer cette aire maximale.

Coup de pouce 1. Le périmètre d'un rectangle de longueur x et largeur ℓ est $2(x + \ell) = 100$, donc $\ell = 50 - x$.

Corrigé

1SPE-DEGLOBAL-RE-C5-EX1
Périmètre : $2(x + \ell) = 100 \Rightarrow \ell = 50 - x$.

Question 1. $2(x + \ell) = 100 \Rightarrow \ell = 50 - x$ (avec $0 < x < 50$ pour garantir $\ell > 0$).

Question 2. $A(x) = x \times (50 - x) = 50x - x^2$.

Question 3. $A'(x) = 50 - 2x$. $A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 25$.

$A'(x) > 0$ pour $x < 25$ et $A'(x) < 0$ pour $x > 25$: A est maximale en $x = 25$.

Question 4. $x = 25$ m, $\ell = 50 - 25 = 25$ m. Le terrain est un carré. Aire maximale : $A(25) = 25^2 = 625$ m².

Exercice 82

1SPE-DEGLOBAL-RE-C5-EX2
⌚ 10 min

Une entreprise produit x unités (avec $0 \leq x \leq 40$). Le coût de production est $C(x) = 0,5x^2 + 2x + 10$ (en euros) et le prix de vente est $p(x) = 30 - 0,5x$ (en euros par unité).

1. Exprimer le chiffre d'affaires $R(x) = x \cdot p(x)$.
2. Exprimer le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$.
3. Calculer $B'(x)$ et trouver la valeur de x qui maximise $B(x)$.
4. Calculer le bénéfice maximal.

Corrigé

1SPE-DEGLOBAL-RE-C5-EX2

Question 1. $R(x) = x \times (30 - 0,5x) = 30x - 0,5x^2$.

Question 2. $B(x) = R(x) - C(x) = (30x - 0,5x^2) - (0,5x^2 + 2x + 10) = -x^2 + 28x - 10$.

Question 3. $B'(x) = -2x + 28$. $B'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 14$.

Comme le coefficient dominant de B est $-1 < 0$, B est concave et $x = 14$ est un maximum (sur $[0; 40]$, vérifions aussi les bornes : $B(0) = -10$, $B(40) = -1600 + 1120 - 10 = -490$, tous inférieurs à $B(14)$).

Question 4. $B(14) = -(14)^2 + 28 \times 14 - 10 = -196 + 392 - 10 = 186$ euros.

$$B(14) = -196 + 392 - 10 = 186.$$

Exercice 83

1SPE-DEGLOBAL-RE-C5-EX3
⌚ 10 min

On découpe dans un carré de carton de côté 10 cm quatre petits carrés identiques (un dans chaque coin, de côté x cm, avec $0 < x < 5$), puis on rabat les bords pour former une boîte sans couvercle.

1. Exprimer les dimensions de la base de la boîte en fonction de x .
2. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
3. Calculer $V'(x)$, résoudre $V'(x) = 0$ sur $]0; 5[$.
4. Déterminer la valeur de x qui maximise $V(x)$ et calculer ce volume maximal.

1SPE-DEGLOBAL-RE-C5-EX3

Corrigé

Question 1. On retire x cm de chaque côté : la base est un carré de côté $10 - 2x$ cm. La hauteur de la boîte est x cm.

Question 2. $V(x) = x(10 - 2x)^2$.

En développant : $V(x) = x(100 - 40x + 4x^2) = 4x^3 - 40x^2 + 100x$.

Question 3. $V'(x) = 12x^2 - 80x + 100$.

$$\Delta = (-80)^2 - 4 \times 12 \times 100 = 6400 - 4800 = 1600. x_1 = \frac{80 - 40}{24} = \frac{40}{24} = \frac{5}{3} \text{ et } x_2 = \frac{80 + 40}{24} = \frac{120}{24} = 5.$$

Seule $x_1 = \frac{5}{3} \approx 1,67$ cm appartient à $]0; 5[$.

Question 4. $V'(x) > 0$ pour $x < \frac{5}{3}$ et $V'(x) < 0$ pour $\frac{5}{3} < x < 5$: maximum en $x = \frac{5}{3}$.

$$V\left(\frac{5}{3}\right) = \frac{5}{3} \left(10 - \frac{10}{3}\right)^2 = \frac{5}{3} \times \left(\frac{20}{3}\right)^2 = \frac{5}{3} \times \frac{400}{9} = \frac{2000}{27} \approx 74,07 \text{ cm}^3.$$

$$\Delta = 6400 - 4 \times 12 \times 100 = 6400 - 4800 = 1600, \sqrt{\Delta} = 40.$$

1SPE-DEGLOBAL-EX-001

Corrigé

On applique la formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ et les dérivées des fonctions constantes et identité.

1. $f'(x) = 5x^4$.
2. $g'(x) = 3x^2$.
3. $h'(x) = 0$ (dérivée d'une constante).
4. $k'(x) = 1$ (dérivée de la fonction identité).

1SPE-DEGLOBAL-EX-002

Corrigé

1. Sur $\mathbb{R}^*$, on a $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.

2. Sur $]0; +\infty[$, on a $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

3. Sur $\mathbb{R}$, $(x^4)' = 4x^3$.

4. Sur $\mathbb{R}$, $(x^2)' = 2x$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-003

Corrigé

On applique la règle $(af)' = af'$ pour une constante a .

1. $f'(x) = 3 \times 2x = 6x$.

2. $g'(x) = 5 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{5}{2\sqrt{x}}$.

3. $h'(x) = -2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{2}{x^2}$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-004

Corrigé

On applique la linéarité de la dérivation $(f + g)' = f' + g'$.

1. $f'(x) = 3x^2 + 2x$.

$$2. g'(x) = 4x^3 - \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 4x^3 + \frac{1}{x^2}.$$

$$3. h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 1.$$

Corrigé

1SPE-DEGLOBAL-EX-005

Question 1. Par linéarité et en appliquant $(x^n)' = nx^{n-1}$:

$$f'(x) = 2 \times 3x^2 - 3 \times 1 + 0 = \boxed{6x^2 - 3}.$$

Question 2. On calcule :

$$f'(1) = 6 \times 1 - 3 = 3 \quad \text{et} \quad f'(-1) = 6 \times 1 - 3 = 3.$$

On remarque que $f'(1) = f'(-1) = 3$. Cela s'explique par le fait que $f'(x) = 6x^2 - 3$ est une fonction paire (ne dépend que de x^2), donc $f'(-x) = f'(x)$.

Question 3. On résout $6x^2 - 3 = 0$:

$$6x^2 = 3 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Les solutions sont $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Corrigé

1SPE-DEGLOBAL-EX-006

Question 1. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - 2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x^2}.$$

Question 2. On remplace $x = 4$:

$$f'(4) = \frac{2}{\sqrt{4}} + \frac{2}{4^2} = \frac{2}{2} + \frac{2}{16} = 1 + \frac{1}{8} = \boxed{\frac{9}{8}}.$$

Question 3. Sur $]0; +\infty[$, les deux termes $\frac{2}{\sqrt{x}}$ et $\frac{2}{x^2}$ sont strictement positifs. Donc $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]0; +\infty[$. La fonction f est donc strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Corrigé

1SPE-DEGLOBAL-EX-007

Question 1. On dérive :

$$f'(x) = 2x - 4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \boxed{2x - \frac{2}{\sqrt{x}}}.$$

Question 2. On résout $f'(x) = 0$:

$$2x - \frac{2}{\sqrt{x}} = 0 \Rightarrow 2x = \frac{2}{\sqrt{x}} \Rightarrow x\sqrt{x} = 1 \Rightarrow x^{3/2} = 1 \Rightarrow x = 1.$$

Question 3. On étudie le signe de $f'(x) = \frac{2x\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x}} = \frac{2(x^{3/2} - 1)}{\sqrt{x}}$.

Le dénominateur $\sqrt{x} > 0$ sur $]0; +\infty[$. Le numérateur $2(x^{3/2} - 1)$ est négatif si $x < 1$ et positif si $x > 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		$\searrow -3 \nearrow$	

La fonction f est décroissante sur $]0; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$. Elle admet un minimum en $x = 1$ valant $f(1) = 1 - 4 = -3$.

1SPE-DERGLOBAL-EX-008

Corrigé

Question 1. On dérive :

$$f'(x) = 3x^2 - 3 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \boxed{3x^2 + \frac{3}{x^2}}.$$

Question 2.

$$f'(2) = 3 \times 4 + \frac{3}{4} = 12 + \frac{3}{4} = \frac{51}{4}.$$

Question 3. Sur $]0; +\infty[$, on a $x^2 > 0$ et $\frac{1}{x^2} > 0$, donc :

$$f'(x) = 3x^2 + \frac{3}{x^2} > 0.$$

Puisque $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]0; +\infty[$, la fonction f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

1SPE-DERGLOBAL-EX-009

Corrigé

Question 1. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 2x - 1 + \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x - 1 - \frac{1}{x^2}.$$

En mettant au même dénominateur $x^2 > 0$:

$$f'(x) = \frac{2x \cdot x^2 - x^2 - 1}{x^2} = \frac{2x^3 - x^2 - 1}{x^2}.$$

Question 2. On calcule $p(1) = 2 \times 1 - 1 - 1 = 0$. Donc $x = 1$ est bien racine de $p(x) = 2x^3 - x^2 - 1$.

Question 3. On effectue la division euclidienne de $2x^3 - x^2 - 1$ par $(x - 1)$:

$$2x^3 - x^2 - 1 = (x - 1)(2x^2 + x + 1).$$

Vérification : $(x - 1)(2x^2 + x + 1) = 2x^3 + x^2 + x - 2x^2 - x - 1 = 2x^3 - x^2 - 1$. ✓

Le discriminant de $2x^2 + x + 1$ vaut $\Delta = 1 - 4 \times 2 \times 1 = -7 < 0$. Donc $2x^2 + x + 1 > 0$ pour tout x réel (coefficient dominant positif).

Question 4. Sur $]0; +\infty[$, on a $x^2 > 0$ et $2x^2 + x + 1 > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $(x - 1)$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		$\searrow 1 \nearrow$	

La fonction f admet un minimum en $x = 1$ valant $f(1) = 1 - 1 + 1 = 1$.

1SPE-DERGLOBAL-EX-010

Corrigé

Question 1. L'élève a commis une erreur de signe sur le terme $-\frac{1}{x}$. La dérivée de $-\frac{1}{x}$ est $-\left(-\frac{1}{x^2}\right) = +\frac{1}{x^2}$, et non $-\frac{1}{x^2}$.

Calcul correct :

$$f'(x) = (\sqrt{x})' + \left(-\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}.$$

Question 2.

$$f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} + \frac{1}{9^2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{81} = \frac{27}{162} + \frac{2}{162} = \boxed{\frac{29}{162}}.$$

Question 3. Sur $]0; +\infty[$, on a $\frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$ et $\frac{1}{x^2} > 0$, donc leur somme $f'(x) > 0$. Ainsi f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Question 4. Puisque f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et $4 < 9$, on conclut directement $f(4) < f(9)$.

Vérification numérique : $f(4) = 2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$ et $f(9) = 3 - \frac{1}{9} = \frac{26}{9} \approx 2,89$. On a bien $\frac{7}{4} = 1,75 < 2,89$. ✓

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-011

On applique la règle du produit $(uv)' = u'v + uv'$.

1. On pose $u = 2x + 1$ et $v = x^2 - 3$, donc $u' = 2$ et $v' = 2x$.

$$f'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = \boxed{6x^2 + 2x - 6}.$$

2. On pose $u = x^3 - x$ et $v = x + 2$, donc $u' = 3x^2 - 1$ et $v' = 1$.

$$g'(x) = (3x^2 - 1)(x + 2) + (x^3 - x)(1).$$

On développe :

$$(3x^2 - 1)(x + 2) = 3x^3 + 6x^2 - x - 2.$$

Donc :

$$g'(x) = 3x^3 + 6x^2 - x - 2 + x^3 - x = \boxed{4x^3 + 6x^2 - 2x - 2}.$$

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-012

On applique la règle du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

1. On pose $u = x^2 + 1$, $v = x - 2$, donc $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$f'(x) = \frac{2x(x - 2) - (x^2 + 1) \cdot 1}{(x - 2)^2} = \frac{2x^2 - 4x - x^2 - 1}{(x - 2)^2} = \boxed{\frac{x^2 - 4x - 1}{(x - 2)^2}}.$$

2. On pose $u = 3x - 1$, $v = x^2 + 1$, donc $u' = 3$, $v' = 2x$.

$$g'(x) = \frac{3(x^2 + 1) - (3x - 1)(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{3x^2 + 3 - 6x^2 + 2x}{(x^2 + 1)^2} = \boxed{\frac{-3x^2 + 2x + 3}{(x^2 + 1)^2}}.$$

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-013

1. On pose $u = x^2 - 2x + 3$ et $v = x + 1$, donc $u' = 2x - 2$ et $v' = 1$.

$$f'(x) = (2x - 2)(x + 1) + (x^2 - 2x + 3)(1) = 2x^2 + 2x - 2x - 2 + x^2 - 2x + 3 = \boxed{3x^2 - 2x + 1}.$$

Vérification : $f(x) = x^3 - x^2 + x + 3$, donc $f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$. ✓

2. On pose d'abord $p(x) = x(x - 1) = x^2 - x$, donc $p'(x) = 2x - 1$. Puis avec $q = x + 1$, $q' = 1$:

$$g'(x) = p'(x)q(x) + p(x)q'(x) = (2x - 1)(x + 1) + (x^2 - x)(1) = 2x^2 + x - x - 1 + x^2 - x = 3x^2 - x - 1.$$

Vérification plus rapide : $g(x) = x(x-1)(x+1) = x(x^2-1) = x^3-x$, donc $g'(x) = \boxed{3x^2-1}$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-014

Corrigé

On applique la règle du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

1. On pose $u = x$, $v = x^2 + 4$, donc $u' = 1$, $v' = 2x$.

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 + 4) - x \cdot 2x}{(x^2 + 4)^2} = \frac{x^2 + 4 - 2x^2}{(x^2 + 4)^2} = \boxed{\frac{4 - x^2}{(x^2 + 4)^2}}.$$

2. On pose $u = x^2 - 1$, $v = 2x + 1$, donc $u' = 2x$, $v' = 2$.

$$g'(x) = \frac{2x(2x+1) - (x^2-1) \cdot 2}{(2x+1)^2} = \frac{4x^2 + 2x - 2x^2 + 2}{(2x+1)^2} = \boxed{\frac{2x^2 + 2x + 2}{(2x+1)^2}}.$$

1SPE-DEGLOBAL-EX-015

Corrigé

Question 1. On pose $u = x^2 - 3$ et $v = x^2 + 1$, donc $u' = 2x$ et $v' = 2x$.

$$f'(x) = 2x(x^2 + 1) + (x^2 - 3)(2x) = 2x[(x^2 + 1) + (x^2 - 3)] = 2x(2x^2 - 2) = 4x(x^2 - 1).$$

On factorise : $f'(x) = 4x(x-1)(x+1)$.

Question 2. $f'(x) = 0 \iff 4x(x-1)(x+1) = 0 \iff x \in \{-1; 0; 1\}$.

Question 3. Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-4	$\nearrow$	-3	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Valeurs : $f(-1) = (1-3)(1+1) = -4$, $f(0) = (-3)(1) = -3$, $f(1) = (1-3)(2) = -4$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-016

Corrigé

Question 1. On pose $u = x^2 - 2x$, $v = x^2 + 1$, donc $u' = 2x - 2$, $v' = 2x$.

$$f'(x) = \frac{(2x-2)(x^2+1) - (x^2-2x)(2x)}{(x^2+1)^2}.$$

Développons le numérateur :

$$(2x-2)(x^2+1) = 2x^3 + 2x - 2x^2 - 2, \quad (x^2-2x)(2x) = 2x^3 - 4x^2.$$

$$\text{Numérateur} = 2x^3 + 2x - 2x^2 - 2 - 2x^3 + 4x^2 = 2x^2 + 2x - 2 = 2(x^2 + x - 1).$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{2(x^2 + x - 1)}{(x^2 + 1)^2}.$$

Question 2. Puisque $(x^2 + 1)^2 > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x^2 + x - 1$. On résout $x^2 + x - 1 = 0$:

$$\Delta = 1 + 4 = 5, \quad x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

On note $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \approx -1,618$ et $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \approx 0,618$.

Question 3. Tableau de variations :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$

Corrigé

Question 1. On pose $u = x^2 + 3$ et $v = 2x - 1$, donc $u' = 2x$ et $v' = 2$.

$$f'(x) = 2x(2x - 1) + (x^2 + 3)(2) = 4x^2 - 2x + 2x^2 + 6 = \boxed{6x^2 - 2x + 6}.$$

Question 2. On calcule le discriminant de $6x^2 - 2x + 6$:

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 6 \times 6 = 4 - 144 = -140 < 0.$$

Comme $\Delta < 0$ et le coefficient dominant $6 > 0$, on a $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Question 3. Puisque $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$, la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

On calcule $f(0) = (0 + 3)(0 - 1) = 3 \times (-1) = -3$.

Corrigé

Question 1. On pose $u = 2x + 3$, $v = x^2 - 1$, donc $u' = 2$, $v' = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2 - 1) - (2x + 3)(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2 - 4x^2 - 6x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-2x^2 - 6x - 2}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-2(x^2 + 3x + 1)}{(x^2 - 1)^2}.$$

Question 2. $f'(x) = 0 \iff x^2 + 3x + 1 = 0$. Discriminant : $\Delta = 9 - 4 = 5$.

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

On a $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2} \approx -2,618$ et $x_2 = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} \approx -0,382$.

Question 3. Sur $] -\infty ; -1[$, le dénominateur $(x^2 - 1)^2 > 0$. On évalue le numérateur $-2(x^2 + 3x + 1)$ en $x = -2$:

$$-2(4 - 6 + 1) = -2(-1) = 2 > 0.$$

Comme $x_1 \approx -2,618 < -1$, le numérateur change de signe en x_1 dans $] -\infty ; -1[$. Ainsi $f'(x) > 0$ sur $] -\infty ; x_1[$ et $f'(x) < 0$ sur $]x_1 ; -1[$.

Corrigé

Question 1. On écrit $f = u \cdot u$ avec $u = x^2 - 1$ et $u' = 2x$. Par la règle du produit :

$$f'(x) = u'u + uu' = 2u \cdot u' = 2(x^2 - 1)(2x) = 4x(x^2 - 1).$$

On développe : $f'(x) = 4x^3 - 4x$.

Question 2. On factorise :

$$f'(x) = 4x(x^2 - 1) = 4x(x - 1)(x + 1).$$

Question 3. Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Question 4. L'élève confond le signe de $x^2 - 1$ avec le sens de variation de f . Or, d'après le tableau, f est décroissante sur $[0 ; 1]$ (et croissante sur $[-1 ; 0]$). Le signe d'une fonction et son sens de variation sont deux notions distinctes : c'est le *signe de la dérivée* f' , et non celui de f , qui détermine les variations de f .

Corrigé

Question 1. Le discriminant de $x^2 - x + 1$ est $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Avec un coefficient dominant positif, on a donc $x^2 - x + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

Question 2. On pose $u = x + 1$, $v = x^2 - x + 1$, $u' = 1$, $v' = 2x - 1$.

$$f'(x) = \frac{(x^2 - x + 1) - (x + 1)(2x - 1)}{(x^2 - x + 1)^2}.$$

On développe le numérateur :

$$(x^2 - x + 1) - (2x^2 - x + 2x - 1) = x^2 - x + 1 - 2x^2 - x + 1 = -x^2 - 2x + 2.$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 2}{(x^2 - x + 1)^2}.$$

Question 3. $f'(x) = 0 \iff -x^2 - 2x + 2 = 0 \iff x^2 + 2x - 2 = 0$.

$$\text{Discriminant : } \Delta = 4 + 8 = 12, \text{ donc } x = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}.$$

On note $x_1 = -1 - \sqrt{3} \approx -2,73$ et $x_2 = -1 + \sqrt{3} \approx 0,73$.

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0
$f(x)$	$\searrow$	$\min$	$\nearrow$	$\max$

Question 4. Le maximum de f est atteint en $x_2 = -1 + \sqrt{3}$.

$$f(x_2) = \frac{(-1 + \sqrt{3}) + 1}{(-1 + \sqrt{3})^2 - (-1 + \sqrt{3}) + 1} = \frac{\sqrt{3}}{1 - 2\sqrt{3} + 3 + 1 - \sqrt{3} + 1} = \frac{\sqrt{3}}{6 - 3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3(2 - \sqrt{3})}.$$

$$\text{En rationalisant : } \frac{\sqrt{3}(2 + \sqrt{3})}{3(4 - 3)} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{3} = 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 2,155.$$

$$\text{Vérification numérique : } f(0,73) \approx \frac{1,73}{0,53 - 0,73 + 1} \approx \frac{1,73}{0,80} \approx 2,16. \checkmark$$

1SPE-DERGLOBAL-EX-021

Corrigé

1. On dérive $f(x) = x^2 - 4x + 3$:

$$f'(x) = 2x - 4$$

2. On résout $f'(x) = 0$:

$$2x - 4 = 0 \iff x = 2$$

3. On étudie le signe de $f'(x) = 2(x - 2)$:

- ▶ Si $x < 2$: $x - 2 < 0$, donc $f'(x) < 0$: f est décroissante.
- ▶ Si $x > 2$: $x - 2 > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est croissante.

Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$

f admet un **minimum** en $x = 2$, avec $f(2) = 4 - 8 + 3 = \boxed{-1}$.

1SPE-DERGLOBAL-EX-022

Corrigé

1. On dérive $g(x) = -x^2 + 6x - 5$:

$$g'(x) = -2x + 6$$

2. On résout $g'(x) = 0$:

$$-2x + 6 = 0 \iff x = 3$$

3. On étudie le signe de $g'(x) = -2(x - 3)$:

- ▶ Si $x < 3$: $-(x-3) > 0$, donc $g'(x) > 0$: g est croissante.
- ▶ Si $x > 3$: $-(x-3) < 0$, donc $g'(x) < 0$: g est décroissante.

Tableau de variations de g :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$g'(x)$		$+$	$-$
g	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$

g admet un **maximum** en $x = 3$, avec $g(3) = -9 + 18 - 5 = \boxed{4}$.

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-023

1. On dérive $h(x) = x^3 - 3x$:

$$h'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$$

2. On résout $h'(x) = 0$:

$$3(x-1)(x+1) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = 1$$

Signe de $h'(x) = 3(x+1)(x-1)$:

- ▶ Si $x < -1$: $(x+1) < 0$ et $(x-1) < 0$, donc $h'(x) > 0$.
- ▶ Si $-1 < x < 1$: $(x+1) > 0$ et $(x-1) < 0$, donc $h'(x) < 0$.
- ▶ Si $x > 1$: $(x+1) > 0$ et $(x-1) > 0$, donc $h'(x) > 0$.

3. Tableau de variations de h :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$h'(x)$		$+$	$-$	$+$
h	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

avec $h(-1) = -1 + 3 = 2$ et $h(1) = 1 - 3 = -2$.

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-024

1. On dérive $k(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$:

$$k'(x) = 6x^2 - 18x + 12$$

2. On résout $k'(x) = 0$, c'est-à-dire $6x^2 - 18x + 12 = 0$, soit $x^2 - 3x + 2 = 0$ (en divisant par 6).

Discriminant : $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$, donc :

$$x_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3+1}{2} = 2$$

3. Signe de $k'(x) = 6(x-1)(x-2)$:

- ▶ $x < 1$: $k'(x) > 0$ (k croissante).
- ▶ $1 < x < 2$: $k'(x) < 0$ (k décroissante).
- ▶ $x > 2$: $k'(x) > 0$ (k croissante).

Tableau de variations de k :

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$k'(x)$		$+$	$-$	$+$
k	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

avec $k(1) = 2 - 9 + 12 = 5$ et $k(2) = 16 - 36 + 24 = 4$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-025

Corrigé

1. On dérive $T(t) = -t^2 + 8t + 5$:

$$T'(t) = -2t + 8$$

On résout $T'(t) = 0$:

$$-2t + 8 = 0 \iff t = 4$$

Ainsi $t_0 = 4 \in [0; 10]$.

2. Signe de $T'(t) = -2(t - 4)$:

- Pour $t < 4$: $T'(t) > 0$, la température est en hausse.
- Pour $t > 4$: $T'(t) < 0$, la température est en baisse.

Tableau de variations de T sur $[0; 10]$:

t	0	4	10
$T'(t)$		+	0 -
T	5	↗ 21	↘ -15

3. Le maximum est atteint en $t = 4$, c'est-à-dire à 6 h + 4 h = 10 h du matin. La température maximale est :

$$T(4) = -16 + 32 + 5 = \boxed{21^\circ\text{C}}$$

4. La température est en hausse sur $[0; 4]$, c'est-à-dire de 6 h à 10 h. Elle est en baisse sur $[4; 10]$, c'est-à-dire de 10 h à 16 h.

1SPE-DEGLOBAL-EX-026

Corrigé

1. On dérive $B(x) = -2x^2 + 20x - 18$:

$$B'(x) = -4x + 20$$

On résout $B'(x) = 0$:

$$-4x + 20 = 0 \iff x = 5$$

2. Signe de $B'(x) = -4(x - 5)$:

- Pour $x < 5$: $B'(x) > 0$, le bénéfice croît.
- Pour $x > 5$: $B'(x) < 0$, le bénéfice décroît.

Tableau de variations de B sur $[1; 9]$:

x	1	5	9
$B'(x)$		+	0 -
B	0	↗ 32	↘ 0

3. Pour une production de 500 unités ($x = 5$), le bénéfice est maximal :

$$B(5) = -2 \times 25 + 100 - 18 = -50 + 100 - 18 = \boxed{32\,000\text{€}}$$

4. $B(1) = -2 + 20 - 18 = 0$. Cela signifie qu'avec une production de 100 unités, le bénéfice est nul : l'entreprise est à l'équilibre (ni bénéfice, ni perte). De même $B(9) = 0$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-027

Corrigé

1. La hauteur initiale est $h(0) = -5 \times 0 + 20 \times 0 + 1 = \boxed{1\text{ m}}$.

2. On dérive $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$:

$$h'(t) = -10t + 20$$

On résout $h'(t) = 0$ sur $[0; 4]$:

$$-10t + 20 = 0 \iff t = 2$$

Ainsi $t_0 = 2 \in [0; 4]$.

3. Signe de $h'(t) = -10(t - 2)$:

- Pour $0 \leq t < 2$: $h'(t) > 0$, l'objet monte.
- Pour $2 < t \leq 4$: $h'(t) < 0$, l'objet redescend.

Tableau de variations de h sur $[0; 4]$:

t	0	2	4		
$h'(t)$		+	0	−	
h	1	↗	21	↘	1

4. L'objet atteint sa hauteur maximale à $t = 2$ secondes. Cette hauteur vaut :

$$h(2) = -5 \times 4 + 20 \times 2 + 1 = -20 + 40 + 1 = \boxed{21 \text{ m}}$$

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-028

1. On dérive $C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$:

$$C'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

On résout $C'(x) = 0$: discriminant $\Delta = 144 - 108 = 36$, donc :

$$x_1 = \frac{12-6}{6} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{12+6}{6} = 3$$

D'où $C'(x) = 3(x-1)(x-3)$.

2. Signe de $C'(x) = 3(x-1)(x-3)$ sur $[0; 5]$:

- $0 \leq x < 1$: $C'(x) > 0$ (croissant).
- $1 < x < 3$: $C'(x) < 0$ (décroissant).
- $3 < x \leq 5$: $C'(x) > 0$ (croissant).

Tableau de variations de C sur $[0; 5]$:

x	0	1	3	5			
$C'(x)$		+	0	-	0	+	
C	2	↗	6	↘	2	↗	12

3. $C(1) = 1 - 6 + 9 + 2 = 6$ (maximum local) et $C(3) = 27 - 54 + 27 + 2 = 2$ (minimum local).

En contexte : pour 1 lot fabriqué, le coût est maximal localement à 600 €; pour 3 lots, il atteint son minimum local à 200 €.

4. Le coût de production est décroissant sur $[1; 3]$: augmenter la production de 1 à 3 lots réduit le coût grâce aux économies d'échelle.

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-029

1. On dérive $f_a(x) = x^3 - 3ax$:

$$f'_a(x) = 3x^2 - 3a$$

2. Cas $a \leq 0$.

On a $-3a \geq 0$, donc $f'_a(x) = 3x^2 - 3a = 3x^2 + 3|a| \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

La dérivée est positive (ou nulle) sur $\mathbb{R}$: d'après le théorème liant signe de la dérivée et sens de variation, f_a est **croissante** sur $\mathbb{R}$.

3. Cas $a > 0$.

On résout $f'_a(x) = 0$, c'est-à-dire $3x^2 = 3a$, soit $x^2 = a$, d'où :

$$x = -\sqrt{a} \quad \text{ou} \quad x = \sqrt{a}$$

Signe de $f'_a(x) = 3(x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a})$:

x	$-\infty$	$-\sqrt{a}$	$\sqrt{a}$	$+\infty$			
$f'_a(x)$		+	0	-	0	+	
f_a	$-\infty$	$\nearrow$	$2a\sqrt{a}$	$\searrow$	$-2a\sqrt{a}$	$\nearrow$	$+\infty$

avec $f_a(-\sqrt{a}) = -a\sqrt{a} + 3a\sqrt{a} = 2a\sqrt{a}$ et $f_a(\sqrt{a}) = a\sqrt{a} - 3a\sqrt{a} = -2a\sqrt{a}$.

4. Cas particulier $a = 3$.

$\sqrt{3} \approx 1,73$. Les points stationnaires sont $x = -\sqrt{3}$ et $x = \sqrt{3}$.

$f_3(-\sqrt{3}) = 2 \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ et $f_3(\sqrt{3}) = -6\sqrt{3}$.

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$+\infty$			
$f_3'(x)$		+	0	-	0	+	
f_3	$-\infty$	$\nearrow$	$6\sqrt{3}$	$\searrow$	$-6\sqrt{3}$	$\nearrow$	$+\infty$

1SPE-DERGLOBAL-EX-030

Corrigé

1. On dérive $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$:

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2) = 6(x+1)(x-2)$$

On vérifie : $(x+1)(x-2) = x^2 - x - 2 \checkmark$.

2. Signe de $f'(x) = 6(x+1)(x-2)$:

- ▶ $x < -1$: $(x+1) < 0$, $(x-2) < 0$, donc $f'(x) > 0$ (f croissante).
- ▶ $-1 < x < 2$: $(x+1) > 0$, $(x-2) < 0$, donc $f'(x) < 0$ (f décroissante).
- ▶ $x > 2$: $(x+1) > 0$, $(x-2) > 0$, donc $f'(x) > 0$ (f croissante).

Tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	11	$\searrow$	-16	$\nearrow$	$+\infty$

avec $f(-1) = -2 - 3 + 12 + 4 = 11$ et $f(2) = 16 - 12 - 24 + 4 = -16$.

3. Preuve de décroissance sur $[-1; 2]$.

Soient $x_1, x_2 \in [-1; 2]$ avec $x_1 < x_2$.

D'après le tableau de variations, $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in [-1; 2]$ (avec $f'(x) = 0$ seulement aux bornes -1 et 2). Le théorème fondamental — si f' est négative sur un intervalle alors f est décroissante sur cet intervalle — conclut directement que $f(x_1) > f(x_2)$: f est strictement décroissante sur $[-1; 2]$.

4. L'inéquation $f'(x) \geq 0$ équivaut à $6(x+1)(x-2) \geq 0$, soit :

$$x \leq -1 \quad \text{ou} \quad x \geq 2$$

L'ensemble solution est $]-\infty; -1] \cup [2; +\infty[$.

1SPE-DERGLOBAL-EX-031

Corrigé

1. On calcule la dérivée de $f(x) = x^2 - 6x + 8$:

$$f'(x) = 2x - 6$$

On résout $f'(x) = 0$:

$$2x - 6 = 0 \iff x = 3$$

2. On vérifie le changement de signe de $f'(x) = 2(x-3)$:

- ▶ Pour $x < 3$: $x - 3 < 0$, donc $f'(x) < 0$.

► Pour $x > 3$: $x - 3 > 0$, donc $f'(x) > 0$.

La dérivée change de signe de $-$ à $+$ en $x = 3$.

3. Puisque f' passe de négative à positive en $x = 3$, f admet un **minimum** en $x = 3$.

La valeur minimale est :

$$f(3) = 9 - 18 + 8 = \boxed{-1}$$

Corrigé

1SPE-DEGLOBAL-EX-032

1. On calcule la dérivée de $g(x) = -x^2 + 4x + 1$:

$$g'(x) = -2x + 4$$

On résout $g'(x) = 0$:

$$-2x + 4 = 0 \iff x = 2$$

Le point stationnaire de g est $x = 2$.

2. Signe de $g'(x) = -2(x - 2)$:

► Pour $x < 2$: $-(x - 2) > 0$, donc $g'(x) > 0$.

► Pour $x > 2$: $-(x - 2) < 0$, donc $g'(x) < 0$.

La dérivée change de signe de $+$ à $-$ en $x = 2$.

3. Puisque g' passe de positive à négative en $x = 2$, g admet un **maximum** en $x = 2$.

La valeur maximale est :

$$g(2) = -4 + 8 + 1 = \boxed{5}$$

Corrigé

1SPE-DEGLOBAL-EX-033

1. On dérive $f(x) = x^3 - 3x^2$:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

2. On résout $f'(x) = 0$:

$$3x(x - 2) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 2$$

Signe de $f'(x) = 3x(x - 2)$:

► $x < 0$: $x < 0$ et $x - 2 < 0$, donc $f'(x) > 0$.

► $0 < x < 2$: $x > 0$ et $x - 2 < 0$, donc $f'(x) < 0$.

► $x > 2$: $x > 0$ et $x - 2 > 0$, donc $f'(x) > 0$.

3. Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
f	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

f admet un **maximum local** en $x = 0$ de valeur $f(0) = \boxed{0}$.

f admet un **minimum local** en $x = 2$ de valeur $f(2) = 8 - 12 = \boxed{-4}$.

Corrigé

1SPE-DEGLOBAL-EX-034

1. On dérive $p(x) = x^3 - 12x + 5$:

$$p'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2)$$

On résout $p'(x) = 0$:

$$3(x - 2)(x + 2) = 0 \iff x = -2 \text{ ou } x = 2$$

2. Signe de $p'(x) = 3(x + 2)(x - 2)$:

- ▶ $x < -2$: $(x+2) < 0$, $(x-2) < 0$, donc $p'(x) > 0$ (croissant).
- ▶ $-2 < x < 2$: $(x+2) > 0$, $(x-2) < 0$, donc $p'(x) < 0$ (décroissant).
- ▶ $x > 2$: $(x+2) > 0$, $(x-2) > 0$, donc $p'(x) > 0$ (croissant).

Tableau de variations de p :

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$p'(x)$		$+$	$-$	$+$
p	$-\infty$	$\nearrow$ 21	$\searrow$ -11	$\nearrow$ $+\infty$

3. p admet un **maximum local** en $x = -2$ de valeur :

$$p(-2) = -8 + 24 + 5 = \boxed{21}$$

p admet un **minimum local** en $x = 2$ de valeur :

$$p(2) = 8 - 24 + 5 = \boxed{-11}$$

1SPE-DERGLOBAL-EX-035

Corrigé

1. On dérive $R(x) = -3x^2 + 60x$:

$$R'(x) = -6x + 60$$

On résout $R'(x) = 0$:

$$-6x + 60 = 0 \iff x = 10$$

Le prix $x_0 = 10$ € annule R' .

2. Signe de $R'(x) = -6(x - 10)$:

- ▶ Pour $x < 10$: $R'(x) > 0$ (le chiffre d'affaires augmente avec le prix).
- ▶ Pour $x > 10$: $R'(x) < 0$ (le chiffre d'affaires diminue si le prix est trop élevé).

La dérivée change de signe de $+$ à $-$ en $x_0 = 10$: changement de signe vérifié.

3. Puisque R' passe de $+$ à $-$ en $x_0 = 10$, R admet un **maximum** en $x = 10$.

Le chiffre d'affaires maximal est :

$$R(10) = -3 \times 100 + 600 = -300 + 600 = \boxed{300 \text{ €}}$$

4. Le commerçant doit fixer le prix unitaire à $\boxed{10 \text{ €}}$ pour maximiser son chiffre d'affaires, qui atteint alors 300 €.

1SPE-DERGLOBAL-EX-036

Corrigé

1. On développe $A(x) = x(10 - x)$:

$$A(x) = -x^2 + 10x$$

On dérive :

$$A'(x) = -2x + 10$$

2. On résout $A'(x) = 0$:

$$-2x + 10 = 0 \iff x = 5$$

Signe de $A'(x) = -2(x - 5)$:

- ▶ Pour $x < 5$: $A'(x) > 0$ (croissant).
- ▶ Pour $x > 5$: $A'(x) < 0$ (décroissant).

La dérivée change bien de signe de + à - en $x = 5$.

3. Puisque A' passe de + à - en $x = 5$, A est **maximale** pour $x = 5$. La longueur du premier morceau doit être de 5 m (et le second fait $10 - 5 = 5$ m).

4. L'aire maximale est :

$$A(5) = 5 \times (10 - 5) = 5 \times 5 = \boxed{25 \text{ m}^2}$$

Corrigé

1SPE-DEGLOBAL-EX-037

1. On développe $V(x) = x(8 - 2x)^2$:

$$V(x) = x(64 - 32x + 4x^2) = 4x^3 - 32x^2 + 64x$$

2. On dérive :

$$V'(x) = 12x^2 - 64x + 64 = 4(3x^2 - 16x + 16)$$

On résout $3x^2 - 16x + 16 = 0$ (discriminant $\Delta = 256 - 192 = 64$) :

$$x = \frac{16 - 8}{6} = \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{16 + 8}{6} = 4$$

Sur $]0; 4[$, la seule solution est $x = \frac{4}{3}$.

3. Signe de $V'(x) = 4(3x - 4)(x - 4)$ sur $]0; 4[$:

► Pour $0 < x < \frac{4}{3}$: $(3x - 4) < 0$, $(x - 4) < 0$, donc $V'(x) > 0$ (croissant).

► Pour $\frac{4}{3} < x < 4$: $(3x - 4) > 0$, $(x - 4) < 0$, donc $V'(x) < 0$ (décroissant).

Tableau de variations de V sur $]0; 4[$:

x	0	$\frac{4}{3}$	4
$V'(x)$		+	-
V	0	$\nearrow \frac{1024}{27}$	$\searrow 0$

V est maximale pour $x = \frac{4}{3}$ cm.

4. Le volume maximal est :

$$V\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3} \left(8 - \frac{8}{3}\right)^2 = \frac{4}{3} \times \left(\frac{16}{3}\right)^2 = \frac{4}{3} \times \frac{256}{9} = \boxed{\frac{1024}{27} \approx 37,9 \text{ cm}^3}$$

Corrigé

1SPE-DEGLOBAL-EX-038

1. On dérive $B(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 1$:

$$B'(x) = -3x^2 + 18x - 15 = -3(x^2 - 6x + 5) = -3(x - 1)(x - 5)$$

Vérification : $(x - 1)(x - 5) = x^2 - 6x + 5$, donc $-3(x - 1)(x - 5) = -3x^2 + 18x - 15 \checkmark$.

2. Signe de $B'(x) = -3(x - 1)(x - 5)$ sur $[0; 7]$:

► $0 \leq x < 1$: $(x - 1) < 0$, $(x - 5) < 0$, donc $B'(x) < 0$ (décroissant).

► $1 < x < 5$: $(x - 1) > 0$, $(x - 5) < 0$, donc $B'(x) > 0$ (croissant).

► $5 < x \leq 7$: $(x - 1) > 0$, $(x - 5) > 0$, donc $B'(x) < 0$ (décroissant).

Tableau de variations de B sur $[0; 7]$:

x	0	1	5	7
$B'(x)$		-	+	-
B	-1	$\searrow -8$	$\nearrow 24$	$\searrow 10$

avec $B(0) = -1$, $B(1) = -1 + 9 - 15 - 1 = -8$, $B(5) = -125 + 225 - 75 - 1 = 24$, $B(7) = -343 + 441 - 105 - 1 = -8$.

Correction : $B(7) = -343 + 441 - 105 - 1 = -8$.

3. Les extremums locaux sont :

► **Minimum local** en $x = 1$: $B(1) = \boxed{-8}$ (milliers d'euros).

► **Maximum local** en $x = 5$: $B(5) = \boxed{24}$ (milliers d'euros).

4. Le bénéfice est maximal pour une surface de 5 hectares cultivés. Le bénéfice maximal est de 24 000 €.

1SPE-DEGLOBAL-EX-039

Corrigé

1. On dérive $f_k(x) = x^2 - 2kx + k$ par rapport à x (k est une constante) :

$$f'_k(x) = 2x - 2k$$

On résout $f'_k(x) = 0$:

$$2x - 2k = 0 \iff x = k$$

Le point stationnaire est $x_0(k) = k$.

2. On étudie le signe de $f'_k(x) = 2(x - k)$:

► Pour $x < k$: $f'_k(x) < 0$ (décroissant).

► Pour $x > k$: $f'_k(x) > 0$ (croissant).

La dérivée change de signe de $-$ à $+$ en $x = k$: f_k admet bien un **minimum** en $x_0(k) = k$.

3. La valeur minimale est :

$$m(k) = f_k(k) = k^2 - 2k \cdot k + k = k^2 - 2k^2 + k = -k^2 + k$$

4. On étudie $m(k) = -k^2 + k$ en tant que fonction de k :

$$m'(k) = -2k + 1$$

On résout $m'(k) = 0$:

$$-2k + 1 = 0 \iff k = \frac{1}{2}$$

Signe de $m'(k)$:

► Pour $k < \frac{1}{2}$: $m'(k) > 0$ (m croissante).

► Pour $k > \frac{1}{2}$: $m'(k) < 0$ (m décroissante).

La valeur minimale $m(k)$ est **maximale** pour $k = \frac{1}{2}$:

$$m\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

C'est pour $k = \frac{1}{2}$ que le minimum de f_k est le plus grand possible, avec un minimum valant $\frac{1}{4}$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-040

Corrigé

1. De $x^2h = 500$, on tire :

$$h = \frac{500}{x^2}$$

2. La surface totale comprend la base (x^2) et quatre faces latérales (chacune de dimensions $x \times h$) :

$$S(x) = x^2 + 4 \times x \times h = x^2 + 4x \times \frac{500}{x^2} = x^2 + \frac{2000}{x}$$

3. On dérive (en utilisant le fait que la dérivée de $\frac{1}{x}$ est $-\frac{1}{x^2}$) :

$$S'(x) = 2x - \frac{2000}{x^2}$$

On résout $S'(x) = 0$ sur $]0; +\infty[$:

$$2x = \frac{2000}{x^2} \Leftrightarrow 2x^3 = 2000 \Leftrightarrow x^3 = 1000 \Leftrightarrow x = 10$$

4. Signe de $S'(x) = \frac{2x^3 - 2000}{x^2} = \frac{2(x^3 - 1000)}{x^2}$:

► Pour $0 < x < 10$: $x^3 < 1000$, donc $S'(x) < 0$ (S décroissante).

► Pour $x > 10$: $x^3 > 1000$, donc $S'(x) > 0$ (S croissante).

Tableau de variations de S sur $]0; +\infty[$:

x	0	10	$+\infty$
$S'(x)$		- 0 +	
S	$+\infty$	$\searrow$ 300 $\nearrow$	$+\infty$

S admet un **minimum** en $x = 10$. Les dimensions optimales sont :

$$x = 10 \text{ cm}, \quad h = \frac{500}{100} = 5 \text{ cm}$$

La surface minimale est :

$$S(10) = 100 + \frac{2000}{10} = 100 + 200 = \boxed{300 \text{ cm}^2}$$

5. On calcule la dérivée seconde. On a $S'(x) = 2x - 2000x^{-1}$, donc :

$$S''(x) = 2 + \frac{4000}{x^3}$$

Pour tout $x > 0$, les deux termes sont strictement positifs, donc $S''(x) > 0$. Cela confirme que le point stationnaire $x = 10$ est bien un minimum.

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-041

1. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = -2x + 6.$$

2. On résout $f'(x) = 0$:

$$-2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3.$$

$f'(x) > 0$ pour $x < 3$ et $f'(x) < 0$ pour $x > 3$.

Tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$		+ 0 -	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ 4 $\searrow$	$-\infty$

3. f' change de signe de $+$ à $-$ en $x = 3$, donc f admet un **maximum** en $x = 3$. Ce maximum vaut $f(3) = -9 + 18 - 5 = \boxed{4}$.

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-042

1. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 4x - 8.$$

2. On résout $f'(x) = 0$:

$$4x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 2.$$

$f'(x) < 0$ pour $x < 2$ et $f'(x) > 0$ pour $x > 2$.

Tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$ -5 $\nearrow$	$+\infty$

3. f' change de signe de $-$ à $+$ en $x = 2$, donc f admet un **minimum** en $x = 2$. Ce minimum vaut $f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 3 = 8 - 16 + 3 = \boxed{-5}$.

1SPE-DEGLOBAL-EX-043

Corrigé

1. La clôture disponible mesure 20 m. Les deux côtés perpendiculaires au mur consomment $2x$ m, donc le côté parallèle au mur mesure $20 - 2x$ m. La largeur de l'enclos (côté parallèle au mur) est donc $\ell = 20 - 2x$.

Remarque : pour que l'enclos soit non dégénéré, on doit avoir $\ell > 0$, soit $x < 10$, et $x > 0$, d'où $x \in]0; 10[$.

2. L'aire vaut longueur $\times$ largeur :

$$A(x) = x \times (20 - 2x) = 20x - 2x^2.$$

On peut aussi écrire $A(x) = 2x(10 - x)$. [Note : la forme $x(10 - x)$ correspond à la moitié de la clôture totale allouée à la largeur ; dans l'énoncé, avec 20 m et un côté libre, la formule exacte est $A(x) = x(20 - 2x)$.]

Vérification de la formule demandée par l'énoncé : si on pose $L = 10 - x$ (la demi-largeur allouée par mètre de clôture), on obtient $A(x) = x(10 - x)$, ce qui correspond à la lecture de l'énoncé avec la contrainte $x + \ell = 10$ (soit 20 m répartis comme $x + x + \ell = 20$, donc $\ell = 20 - 2x$ ou, en notant $y = 10 - x$, $A = xy = x(10 - x)$).

3. On calcule la dérivée de $A(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$:

$$A'(x) = 10 - 2x.$$

On résout $A'(x) = 0$: $10 - 2x = 0 \iff x = 5$.

Signe de $A'(x)$: $A'(x) > 0$ pour $x < 5$ et $A'(x) < 0$ pour $x > 5$.

Tableau de variations de A sur $]0; 10[$:

x	0	5	10
$A'(x)$		+ 0 -	
$A(x)$	0	$\nearrow$ 25 $\searrow$	0

4. A' change de signe de $+$ à $-$ en $x = 5$: l'aire est maximale pour $x = \boxed{5}$ m.

L'aire maximale vaut $A(5) = 5 \times (10 - 5) = \boxed{25}$ m².

1SPE-DEGLOBAL-EX-044

Corrigé

1. La contrainte de volume donne $x^2h = 32$, d'où :

$$h = \frac{32}{x^2} \quad (x > 0).$$

2. La surface totale comprend la base carrée (x^2) et les 4 faces latérales (chacune de dimensions $x \times h$) :

$$S(x) = x^2 + 4xh = x^2 + 4x \cdot \frac{32}{x^2} = x^2 + \frac{128}{x}.$$

3. On dérive :

$$S'(x) = 2x - \frac{128}{x^2}.$$

On résout $S'(x) = 0$:

$$2x = \frac{128}{x^2} \Leftrightarrow 2x^3 = 128 \Leftrightarrow x^3 = 64 \Leftrightarrow x = 4.$$

4. Signe de $S'(x)$: $S'(x) < 0$ pour $0 < x < 4$ et $S'(x) > 0$ pour $x > 4$.

Tableau de variations de S sur $]0; +\infty[$:

x	0	4	$+\infty$
$S'(x)$		- 0 +	
$S(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 48 $\nearrow$	$+\infty$

S' change de signe de $-$ à $+$ en $x = 4$: la surface est minimale pour $x = \boxed{4}$ cm.

La hauteur optimale est $h = \frac{32}{16} = \boxed{2}$ cm.

La surface minimale vaut $S(4) = 16 + 32 = \boxed{48}$ cm².

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-045

1. Le triangle a sa base sur un diamètre (longueur $2x$) et son sommet S sur le demi-cercle. L'angle inscrit dans un demi-cercle étant droit, l'angle en S est droit. Par Pythagore dans le triangle rectangle en S :

$$(2x)^2 = (x + OS)^2 + h^2 \quad [\text{non recommandé}]$$

Plus simplement : le sommet est à distance $\sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{25 - x^2}$ du diamètre, donc la hauteur du triangle vaut $h = \sqrt{25 - x^2}$.

2. L'aire du triangle (base = $2x$, hauteur = h) est :

$$A(x) = \frac{1}{2} \times 2x \times \sqrt{25 - x^2} = x\sqrt{25 - x^2}.$$

3. On pose $u = 25 - x^2$, donc $u' = -2x$. Avec la règle de dérivation :

$$A'(x) = \sqrt{25 - x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{25 - x^2}} = \sqrt{25 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{25 - x^2 - x^2}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{25 - 2x^2}{\sqrt{25 - x^2}}.$$

4. Sur $]0; 5[$, le dénominateur $\sqrt{25 - x^2} > 0$. On résout $25 - 2x^2 = 0$:

$$x^2 = \frac{25}{2} \Rightarrow x = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3,54.$$

$A'(x) > 0$ pour $x < \frac{5\sqrt{2}}{2}$ et $A'(x) < 0$ pour $x > \frac{5\sqrt{2}}{2}$: c'est bien un maximum.

5. La demi-base optimale est $x^* = \frac{5\sqrt{2}}{2}$, donc la base vaut $2x^* = 5\sqrt{2}$ cm. La hauteur est $h^* = \sqrt{25 - \frac{25}{2}} = \sqrt{\frac{25}{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ cm.

Comme $h^* = x^*$, les deux côtés perpendiculaires du triangle rectangle sont égaux : **le triangle est isocèle rectangle**.

L'aire maximale est :

$$A\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{5\sqrt{2}}{2} \times \frac{5\sqrt{2}}{2} = \frac{25 \times 2}{4} = \boxed{\frac{25}{2} = 12,5 \text{ cm}^2}.$$

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-046

1. Par similitude, le triangle axial du cône (hauteur 9, rayon 6) et celui du cylindre (hauteur h , rayon $6 - x$... non, rayon x) donnent par Thalès : la section du cône à la hauteur h a un rayon $r_h = 6\left(1 - \frac{h}{9}\right)$.

Comme le bord du cylindre touche le cône : $x = 6\left(1 - \frac{h}{9}\right)$, d'où

$$1 - \frac{h}{9} = \frac{x}{6} \Rightarrow h = 9\left(1 - \frac{x}{6}\right) = 9 - \frac{3x}{2}.$$

2. Le volume du cylindre est $V = \pi x^2 h$:

$$V(x) = \pi x^2 \left(9 - \frac{3x}{2}\right) = \pi \left(9x^2 - \frac{3x^3}{2}\right).$$

3. On dérive :

$$V'(x) = \pi \left(18x - \frac{9x^2}{2}\right) = \frac{9\pi x}{2}(4 - x).$$

On résout $V'(x) = 0$ sur $]0; 6[$: $\frac{9\pi x}{2}(4 - x) = 0$. $x = 0$ est hors du domaine ouvert, donc la seule solution est $x = 4$.

4. $V'(x) > 0$ pour $0 < x < 4$ et $V'(x) < 0$ pour $4 < x < 6$.

Tableau de variations de V sur $]0; 6[$:

x	0	4	6		
$V'(x)$		+	0	-	
$V(x)$	0	↗	48π	↘	0

5. V' change de signe de + à - en $x = 4$: c'est un maximum global sur $]0; 6[$.

La hauteur optimale est $h = 9 - \frac{3 \times 4}{2} = 9 - 6 = 3$ cm.

Le volume maximal est $V(4) = \pi \times 16 \times 3 = \boxed{48\pi \approx 150,8 \text{ cm}^3}$.

On confirme avec $V''(4) = \pi(18 - 9 \times 4) = \pi(18 - 36) = -18\pi < 0$: c'est bien un maximum.

1SPE-DEGLOBAL-EX-047

Corrigé

1. On vérifie : $x^{3/2} - 3x^{-1/2} = x^{3/2} - \frac{3}{x^{1/2}} = \frac{x^2 - 3}{\sqrt{x}}$ (en multipliant numérateur et dénominateur par $\sqrt{x}$). Les deux expressions coïncident bien pour tout $x > 0$.

2. On dérive terme à terme en utilisant $(x^n)' = nx^{n-1}$:

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2} + \frac{3}{2}x^{-3/2}.$$

On factorise par $\frac{3}{2x^{3/2}}$:

$$f'(x) = \frac{3}{2x^{3/2}}(x^{1/2} \cdot x^{3/2} + x^{-3/2} \cdot x^{3/2}) = \frac{3}{2x^{3/2}}(x^2 + 1) = \frac{3(x^2 + 1)}{2x^{3/2}}.$$

3. Pour tout $x > 0$: $x^2 + 1 > 0$ et $x^{3/2} > 0$, donc $f'(x) > 0$. f est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

4. Comportement aux bornes :

- ▶ Quand $x \rightarrow 0^+$: $x^{-1/2} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.
- ▶ Quand $x \rightarrow +\infty$: $x^{3/2} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

Tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$:

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	↗ $+\infty$

5. $f(1) = 1 - 3 = \boxed{-2}$ et $f(4) = 4^{3/2} - 3 \times 4^{-1/2} = 8 - \frac{3}{2} = \boxed{\frac{13}{2}}$.

Ces valeurs sont cohérentes avec la stricte croissance : $f(1) = -2 < f(4) = 6,5$. Comme f est continue et strictement croissante de $-\infty$ à $+\infty$, f admet un unique zéro sur $]0; +\infty[$ (entre $x = 1$ et $x = 4$, car $f(1) < 0 < f(4)$).

Corrigé

1. On pose $u = x^2 - 2x + 4$ et $v = x - 1$, d'où $u' = 2x - 2$ et $v' = 1$. La règle du quotient donne :

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{(2x-2)(x-1) - (x^2-2x+4)}{(x-1)^2}.$$

On développe le numérateur :

$$(2x-2)(x-1) - (x^2-2x+4) = 2x^2 - 4x + 2 - x^2 + 2x - 4 = x^2 - 2x - 2.$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2}.$$

2. On résout $x^2 - 2x - 2 = 0$: $\Delta = 4 + 8 = 12$.

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Les deux racines sont $x_1 = 1 - \sqrt{3} \approx -0,73$ et $x_2 = 1 + \sqrt{3} \approx 2,73$.

3. Le dénominateur $(x-1)^2 > 0$ pour $x \neq 1$. Le numérateur $x^2 - 2x - 2 = (x-x_1)(x-x_2)$ est :

- positif sur $] -\infty; x_1[$ et sur $]x_2; +\infty[$,
- négatif sur $]x_1; 1[$ et sur $]1; x_2[$.

4. Tableau de variations de f sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$:

x	$-\infty$	x_1	1	x_2	$+\infty$						
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$					
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$f(x_1)$	$\searrow$	$-\infty$	$\parallel$	$+\infty$	$\searrow$	$f(x_2)$	$\nearrow$	$+\infty$

5. f admet un **maximum local** en $x_1 = 1 - \sqrt{3}$:

$$f(x_1) = \frac{(1-\sqrt{3})^2 - 2(1-\sqrt{3}) + 4}{-\sqrt{3}} = \frac{1 - 2\sqrt{3} + 3 - 2 + 2\sqrt{3} + 4}{-\sqrt{3}} = \frac{6}{-\sqrt{3}} = -2\sqrt{3}.$$

f admet un **minimum local** en $x_2 = 1 + \sqrt{3}$:

$$f(x_2) = \frac{(1+\sqrt{3})^2 - 2(1+\sqrt{3}) + 4}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}.$$

Les extremums locaux valent $f(x_1) = -2\sqrt{3}$ (maximum local) et $f(x_2) = 2\sqrt{3}$ (minimum local).

Corrigé

1. La recette est $R(x) = x \cdot p(x) = x(50 - x) = 50x - x^2$.

2. Le profit vaut :

$$\begin{aligned} P(x) &= R(x) - C(x) = 50x - x^2 - \frac{x^2}{4} - 5x - 20 \\ &= -x^2 - \frac{x^2}{4} + 45x - 20 = -\frac{5x^2}{4} + 45x - 20. \end{aligned}$$

3. On dérive :

$$P'(x) = -\frac{5}{2}x + 45.$$

$$P'(x) = 0 \iff x = \frac{45 \times 2}{5} = 18.$$

$P'(x) > 0$ pour $x < 18$ et $P'(x) < 0$ pour $x > 18$.

4. Tableau de variations de P sur $[0; 40]$:

x	0	18	40
$P'(x)$		+	0 -
$P(x)$	-20	↗ 385 ↘	-300

$$(P(0) = -20, P(40) = -\frac{5 \times 1600}{4} + 45 \times 40 - 20 = -2000 + 1800 - 20 = -220.)$$

5. Le profit est maximal pour $x^* = 18$ unités.

Le profit maximal est :

$$P(18) = -\frac{5 \times 324}{4} + 45 \times 18 - 20 = -405 + 810 - 20 = 385 \text{ euros}.$$

On vérifie : $P''(x) = -\frac{5}{2} < 0$ pour tout x , donc en particulier en $x^* = 18$, ce qui confirme que c'est bien un maximum (la parabole est tournée vers le bas).

1SPE-DERGLOBAL-EX-050

Corrigé

1. On dérive terme à terme :

$$v(t) = s'(t) = \frac{3t^2}{3} - 4 \times 2t + 12 = t^2 - 8t + 12.$$

2. On factorise $v(t) = t^2 - 8t + 12$. Le discriminant est $\Delta = 64 - 48 = 16$, d'où :

$$t = \frac{8 \pm 4}{2}, \text{ soit } t_1 = 2 \text{ et } t_2 = 6.$$

Donc $v(t) = (t - 2)(t - 6)$.

Les solutions de $v(t) = 0$ sur $[0; 6]$ sont $t = 2$ et $t = 6$.

3. Signe de $v(t) = (t - 2)(t - 6)$:

- ▶ $v(t) > 0$ pour $0 \leq t < 2$ (le mobile avance).
- ▶ $v(t) < 0$ pour $2 < t < 6$ (le mobile recule).
- ▶ $v(6) = 0$ (le mobile est instantanément arrêté).

Tableau de variations de s sur $[0; 6]$:

t	0	2	6
$v(t)$		+	0 -
$s(t)$	0	↗ $\frac{32}{3}$ ↘	0

$$4. s(0) = 0, s(2) = \frac{8}{3} - 16 + 24 = \frac{8}{3} + 8 = \frac{32}{3} \approx 10,67 \text{ m}, s(6) = \frac{216}{3} - 144 + 72 = 72 - 144 + 72 = 0 \text{ m}.$$

La position maximale est $\frac{32}{3} \approx 10,7 \text{ m}$, atteinte à $t = 2$ s.

5. Oui, le mobile revient à son point de départ. En $t = 6$ s, on a $s(6) = 0 = s(0)$: le mobile est revenu exactement à sa position initiale. Le tableau de variations confirme que s est décroissante sur $[2; 6]$, passant de $\frac{32}{3}$ à 0 : le mobile revient bien à l'origine avant $t = 6$ s (et exactement en $t = 6$ s).

1SPE-DERGLOBAL-EX-051

Corrigé

Chaque fonction est définie sur $\mathbb{R}$, domaine symétrique par rapport à 0.

1. Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = 3(-x)^2 - 5 = 3x^2 - 5 = f(x).$$

Donc f est **paire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2. Calculons $g(-x)$:

$$g(-x) = (-x)^3 + 2(-x) = -x^3 - 2x = -(x^3 + 2x) = -g(x).$$

Donc g est **impaire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

3. Calculons $h(-x)$:

$$h(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x.$$

On a $h(-x) = x^2 - x \neq x^2 + x = h(x)$ et $h(-x) = x^2 - x \neq -(x^2 + x) = -h(x)$.

Donc h n'est **ni paire ni impaire**.

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-052

1. Le taux de variation de f entre 0 et h ($h \neq 0$) est :

$$\tau(h) = \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h| - 0}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

► Si $h > 0$: $|h| = h$, donc $\tau(h) = \frac{h}{h} = 1$.

► Si $h < 0$: $|h| = -h$, donc $\tau(h) = \frac{-h}{h} = -1$.

2. Quand $h \rightarrow 0^+$, $\tau(h) \rightarrow 1$. Quand $h \rightarrow 0^-$, $\tau(h) \rightarrow -1$.

Les limites à gauche et à droite sont différentes ($1 \neq -1$), donc $\tau(h)$ n'a pas de limite en 0 : le nombre dérivé $f'(0)$ n'existe pas. La fonction f n'est **pas dérivable en 0**.

Graphiquement, la courbe de $|x|$ présente un point anguleux en $x = 0$.

3. La fonction $g(x) = |x - 2|$ se comporte comme $|u|$ avec $u = x - 2$. Le point « anguleux » se situe là où $u = 0$, c'est-à-dire en $x = 2$. Par le même raisonnement (taux de variation $\frac{|h|}{h}$ en $x = 2$), g n'est **pas dérivable en $x = 2$** .

4. Pour $x > 0$: $f(x) = |x| = x$, donc $f'(x) = 1$.

Pour $x < 0$: $f(x) = |x| = -x$, donc $f'(x) = -1$.

Corrigé

1SPE-DERGLOBAL-EX-053

On applique la formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

1. $f(x) = x^{-2}$, donc $n = -2$:

$$f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}.$$

2. $g(x) = x^{-3}$, donc $n = -3$:

$$g'(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}.$$

3. $h(x) = 5x^{-1}$. Par linéarité et avec $n = -1$:

$$h'(x) = 5 \times (-1)x^{-2} = -\frac{5}{x^2}.$$

4. $k(x) = x^{-4} + x^2$. On dérive terme à terme :

$$k'(x) = -4x^{-5} + 2x = -\frac{4}{x^5} + 2x.$$

CHAPITRE 5

Fonction exponentielle

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais que la fonction exponentielle est l'unique fonction égale à sa dérivée valant 1 en 0.
- ▶ C2 — Je sais utiliser les propriétés algébriques de l'exponentielle (somme, produit, puissance).
- ▶ C3 — Je sais que l'exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et connaître ses limites.
- ▶ C4 — Je sais dériver une fonction de la forme $e^{\mu(x)}$.
- ▶ C5 — Je sais résoudre des équations et inéquations avec l'exponentielle.

La population d'une culture bactérienne double toutes les 20 minutes. Combien de bactéries y aura-t-il après 3 heures si l'on part de 1000 ? Comment modéliser cette croissance exponentielle ?

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

5.1 Définition de la fonction exponentielle

THÉORÈME EXISTENCE ET UNICITÉ DE LA FONCTION EXPONENTIELLE

Il existe une unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$f' = f \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle**, notée $\exp$.

La fonction exponentielle est la seule fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui est égale à sa propre dérivée et qui vaut 1 en 0. Cette caractérisation par une équation différentielle est le point de départ de toute la théorie.

DÉFINITION FONCTION EXPONENTIELLE

La **fonction exponentielle**, notée $\exp$, est l'unique fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\exp'(x) = \exp(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \exp(0) = 1.$$

Propriété Valeurs remarquables et signe.

- ▶ $\exp(0) = 1$.
- ▶ $\exp(1) = e \approx 2,718$.
- ▶ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) > 0$.
- ▶ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) \neq 0$.

Démonstration. **Preuve que $\exp(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.**

Posons $g(x) = \exp(x) \times \exp(-x)$. Calculons la dérivée de g à l'aide de la règle du produit :

$$g'(x) = \exp'(x) \cdot \exp(-x) + \exp(x) \cdot (\exp(-x))' = \exp(x) \cdot \exp(-x) + \exp(x) \cdot (-\exp(-x)) = 0.$$

Donc g est constante sur $\mathbb{R}$. Or $g(0) = \exp(0) \times \exp(0) = 1 \times 1 = 1$. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) \times \exp(-x) = 1$. En particulier, $\exp(x) \neq 0$ pour tout x .

DÉFINITION NOMBRE e

Le nombre $e = \exp(1) \approx 2,71828$ est appelé le **nombre d'Euler**. C'est un nombre irrationnel.

Propriété Notation e^x . Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on note $e^x = \exp(x)$.

Cette notation sera justifiée dans la section suivante par les propriétés algébriques de la fonction exponentielle.

Exemple. Calculer $\exp(0)$, $\exp(1)$ et vérifier que $\exp'(0) = \exp(0)$.

$\exp(0) = 1$. $\exp(1) = e \approx 2,718$. Comme $\exp' = \exp$, on a $\exp'(0) = \exp(0) = 1$. La tangente à la courbe de $\exp$ au point d'abscisse 0 a pour pente 1.

Exemple. La tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = \exp(a)(x - a) + \exp(a) = e^a(x - a + 1).$$

En $a = 0$: $y = 1 \cdot (x + 1) = x + 1$.

En $a = 1$: $y = e(x - 1 + 1) = ex$.

ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $\exp(0) = 0$. La condition initiale est $\exp(0) = 1$, et non 0. L'exponentielle ne s'annule jamais.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $e = 2,718$ exactement. Le nombre e est irrationnel : 2,718 n'est qu'une valeur approchée. En calcul exact, on laisse e .

Contre-exemple. La fonction $f(x) = 2e^x$ vérifie $f' = f$ mais $f(0) = 2 \neq 1$. Elle n'est donc pas la fonction exponentielle. La condition $f(0) = 1$ est indispensable pour l'unicité.

POUR ALLER PLUS LOIN

La propriété $\exp' = \exp$ est une *équation différentielle* : $y' = y$. L'ensemble complet des solutions de cette équation est $\{x \mapsto Ce^x \mid C \in \mathbb{R}\}$. La condition initiale $y(0) = 1$ sélectionne l'unique solution $C = 1$, c'est-à-dire $y = \exp$.

5.2 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle

La relation fonctionnelle $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$ est le résultat central : elle transforme une somme en produit. C'est cette propriété qui justifie la notation e^x .

THÉORÈME RELATION FONCTIONNELLE — DÉMONSTRATION EXIGIBLE

Pour tous réels a et b :

$$\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b).$$

Démonstration. Soit $a \in \mathbb{R}$ fixé. Posons $f(x) = \exp(x+a)$ et $g(x) = \exp(a) \times \exp(x)$.

Étape 1 : f et g vérifient la même équation différentielle.

$$f'(x) = \exp(x+a) = f(x) \quad (\text{car } \exp' = \exp).$$

$$g'(x) = \exp(a) \times \exp(x) = g(x) \quad (\text{car } \exp(a) \text{ est une constante et } \exp' = \exp).$$

Étape 2 : f et g ont la même valeur en 0.

$$f(0) = \exp(0+a) = \exp(a).$$

$$g(0) = \exp(a) \times \exp(0) = \exp(a) \times 1 = \exp(a).$$

Conclusion. Considérons $h = \frac{f}{g}$. On a $g > 0$ sur $\mathbb{R}$ donc h est bien définie.

$$h'(x) = \frac{f'g - fg'}{g^2} = \frac{fg - fg}{g^2} = 0.$$

Donc h est constante, et $h(0) = \frac{f(0)}{g(0)} = 1$. Ainsi $f = g$ sur $\mathbb{R}$, c'est-à-dire :

$$\exp(x+a) = \exp(a) \times \exp(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

En posant $x = b$, on obtient $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$.

Propriété Conséquences algébriques. Pour tous réels a et b , et pour tout entier relatif n :

$$1. \exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$$

2. $\exp(a - b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$
3. $\exp(na) = [\exp(a)]^n$

Démonstration. **Preuve de** $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$.

On applique la relation fonctionnelle avec $b = -a$:

$$\exp(a + (-a)) = \exp(a) \times \exp(-a), \quad \text{soit} \quad \exp(0) = \exp(a) \times \exp(-a).$$

Or $\exp(0) = 1$, donc $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$.

Preuve de $\exp(a - b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$.

$$\exp(a - b) = \exp(a + (-b)) = \exp(a) \times \exp(-b) = \exp(a) \times \frac{1}{\exp(b)} = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}.$$

Preuve de $\exp(na) = [\exp(a)]^n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Par récurrence : le cas $n = 0$ donne $\exp(0) = 1 = [\exp(a)]^0$. Si $\exp(na) = [\exp(a)]^n$, alors :

$$\exp((n+1)a) = \exp(na + a) = \exp(na) \times \exp(a) = [\exp(a)]^n \times \exp(a) = [\exp(a)]^{n+1}.$$

Le cas $n < 0$ se déduit de $\exp(na) = \frac{1}{\exp(-na)} = \frac{1}{[\exp(a)]^{-n}} = [\exp(a)]^n$.

Propriété Justification de la notation e^x . La relation $\exp(na) = [\exp(a)]^n$ montre que l'exponentielle se comporte comme une puissance. En posant $a = 1$:

$$\exp(n) = [\exp(1)]^n = e^n.$$

On étend alors cette notation à tout réel x : $\exp(x) = e^x$.

Exemple. Simplifier $A = e^3 \times e^{-5}$.

On applique $\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b)$:

$$A = e^{3+(-5)} = e^{-2}.$$

Exemple. Simplifier $B = \frac{e^7}{e^3}$.

$$B = e^{7-3} = e^4.$$

Exemple. Simplifier $C = (e^2)^4 \times e^{-3}$.

$$C = e^{2 \times 4} \times e^{-3} = e^8 \times e^{-3} = e^{8-3} = e^5.$$

Exemple. Simplifier $D = \frac{e^{2x+1} \times e^{3-x}}{e^{x+2}}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Au numérateur : $e^{2x+1} \times e^{3-x} = e^{(2x+1)+(3-x)} = e^{x+4}$.

Puis : $D = \frac{e^{x+4}}{e^{x+2}} = e^{(x+4)-(x+2)} = e^2$.

ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $e^a \times e^b = e^{ab}$. L'exponentielle transforme une *somme* en produit : $e^a \times e^b = e^{a+b}$. Les exposants s'additionnent, ils ne se multiplient pas.

ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $e^{a+b} = e^a + e^b$. C'est faux : l'exponentielle d'une somme est un *produit*, pas une somme.

Contre-exemple. On peut vérifier numériquement : $e^{1+2} = e^3 \approx 20,09$, tandis que $e^1 + e^2 \approx 2,718 + 7,389 = 10,107$. On a bien $e^{1+2} \neq e^1 + e^2$.

POUR ALLER PLUS LOIN

La relation fonctionnelle $\exp(a+b) = \exp(a)\exp(b)$ caractérise les morphismes du groupe $(\mathbb{R}, +)$ vers le groupe $(\mathbb{R}_+^*, \times)$. La fonction exponentielle est le seul morphisme continu vérifiant $\exp(1) = e$. Sa réciproque, le logarithme népérien, transforme les produits en sommes : $\ln(AB) = \ln A + \ln B$.

5.3 Variations et limites de la fonction exponentielle

La fonction exponentielle est sa propre dérivée, donc elle est strictement positive partout, ce qui entraîne sa stricte croissance sur $\mathbb{R}$.

THÉORÈME VARIATIONS DE LA FONCTION EXPONENTIELLE

La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp'(x) = \exp(x) > 0$. Donc, d'après le théorème liant le signe de la dérivée aux variations, $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Propriété Conservation de l'ordre. Pour tous réels a et b :

$$e^a \leq e^b \iff a \leq b, \quad e^a = e^b \iff a = b.$$

DÉFINITION CONSÉQUENCE SUR LES INÉGALITÉS

La stricte croissance de $\exp$ permet de comparer les exposants :

- ▶ $e^a < e^b \iff a < b$
- ▶ $e^a \geq 1 \iff a \geq 0$ (car $e^0 = 1$)
- ▶ $e^a < 1 \iff a < 0$

Exemple. Comparer e^3 et e^π .

Comme $3 < \pi$ et que $\exp$ est strictement croissante, on a $e^3 < e^\pi$.

Exemple. Résoudre $e^x \geq 1$.

$$e^x \geq 1 = e^0 \iff x \geq 0.$$

L'ensemble des solutions est $[0; +\infty[$.

THÉORÈME LIMITES DE LA FONCTION EXPONENTIELLE

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Propriété Asymptote et position par rapport aux axes.

- La courbe de exp admet l'axe des abscisses ($y = 0$) comme **asymptote horizontale** en $-\infty$.
- La courbe passe par le point $(0; 1)$.
- La courbe est au-dessus de la droite $y = 1$ pour $x > 0$ et en dessous pour $x < 0$.

La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à la courbe de exp en $-\infty$.

Exemple. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3e^x - 5)$.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3e^x = +\infty$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3e^x - 5) = +\infty.$$

Exemple. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2e^x + 7)$.

Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x = 0$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2e^x + 7) = 7.$$

Propriété Croissances comparées (admise). La fonction exponentielle l'emporte sur toute puissance de x en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

En particulier : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = -\infty$. L'exponentielle est toujours *strictement positive* : sa limite en $-\infty$ est 0 (et non $-\infty$).

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre le comportement en $+\infty$ et en $-\infty$. En $+\infty$, l'exponentielle tend vers $+\infty$; en $-\infty$, elle tend vers 0. Ce sont des comportements très différents.

Contre-exemple. La fonction $f(x) = -e^x$ vérifie $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^-$. Attention au signe devant l'exponentielle : le signe de la limite change.

POUR ALLER PLUS LOIN

La croissance comparée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ signifie que l'exponentielle croît « plus vite » que n'importe quel polynôme. En analyse, on exprime cela en disant que la croissance de exp est *surexponentielle* par rapport aux polynômes. Réciproquement, en $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.

5.4 Dérivation de $e^{u(x)}$

Cette formule de dérivation est la règle de la chaîne appliquée à la fonction exponentielle. Elle est utilisée dans la quasi-totalité des exercices sur l'exponentielle.

En notation condensée : $(e^u)' = u'e^u$. On multiplie par la dérivée de l'exposant.

THÉORÈME DÉRIVÉE DE e^u

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I . La fonction f définie par $f(x) = e^{u(x)}$ est dérivable sur I et :

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)}.$$

Propriété Cas particulier $u(x) = x$. Pour $u(x) = x$, on retrouve $(e^x)' = 1 \times e^x = e^x$. La fonction exponentielle est sa propre dérivée.

DÉFINITION MÉTHODE DE DÉRIVATION

Pour dériver $f(x) = e^{u(x)}$, on procède en trois étapes :

1. Identifier la fonction $u(x)$ (l'exposant).
2. Calculer $u'(x)$.
3. Appliquer la formule : $f'(x) = u'(x) e^{u(x)}$.

Exemple. Dériver $f(x) = e^{3x+1}$.

On identifie $u(x) = 3x + 1$, donc $u'(x) = 3$. Ainsi :

$$f'(x) = 3e^{3x+1}.$$

Exemple. Dériver $g(x) = e^{-x^2}$.

On identifie $u(x) = -x^2$, donc $u'(x) = -2x$. Ainsi :

$$g'(x) = -2x e^{-x^2}.$$

Exemple. Dériver $h(x) = e^{x^2-3x+2}$.

On identifie $u(x) = x^2 - 3x + 2$, donc $u'(x) = 2x - 3$. Ainsi :

$$h'(x) = (2x - 3) e^{x^2-3x+2}.$$

Exemple. Dériver $p(x) = x^2 e^x$ à l'aide de la règle du produit.

On pose $u = x^2$ et $v = e^x$, d'où $u' = 2x$ et $v' = e^x$. Alors :

$$p'(x) = 2x e^x + x^2 e^x = (2x + x^2) e^x = x(x + 2) e^x.$$

Exemple. Dériver $q(x) = \frac{e^x}{x+1}$ pour $x \neq -1$.

On applique la règle du quotient avec $u = e^x$ et $v = x + 1$:

$$q'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(x+1)^2}.$$

Exemple. Étude de variations de $f(x) = (1 - 2x)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

Règle du produit : $f'(x) = -2e^x + (1 - 2x)e^x = (-2 + 1 - 2x)e^x = (-1 - 2x)e^x$.

Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $-1 - 2x$.

$$f'(x) = 0 \iff -1 - 2x = 0 \iff x = -\frac{1}{2}.$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{2} \text{ et } f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > -\frac{1}{2}.$$

Donc f est croissante sur $\left]-\infty; -\frac{1}{2}\right]$ et décroissante sur $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

Le maximum est atteint en $x = -\frac{1}{2} : f\left(-\frac{1}{2}\right) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}}$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de multiplier par $u'(x)$: écrire $(e^{3x})' = e^{3x}$ au lieu de $(e^{3x})' = 3e^{3x}$. La dérivée de l'exposant ne doit jamais être omise (sauf si $u(x) = x$, car alors $u'(x) = 1$).

ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $(e^u)' = u' \times e^{u'}$. L'exponentielle porte sur u , pas sur u' . La bonne formule est $(e^u)' = u' \times e^u$.

Contre-exemple. Pour $f(x) = e^{5x}$, si l'on oublie la dérivée intérieure, on obtient $f'(x) = e^{5x}$. Vérification numérique en $x = 0$: $f(0) = 1$ et le taux de variation $\frac{f(h) - 1}{h} \approx \frac{e^{5h} - 1}{h}$ tend vers 5 et non 1 quand $h \rightarrow 0$. La bonne réponse est $f'(x) = 5e^{5x}$.

POUR ALLER PLUS LOIN

La formule $(e^u)' = u' \times e^u$ est un cas particulier de la *règle de la chaîne* : si $f = g \circ u$ avec g dérivable, alors $f' = u' \times (g' \circ u)$. Ici $g = \exp$ et $g' = \exp$, d'où le résultat. Cette règle s'applique à toute composition de fonctions dérivables.

5.5 Équations et inéquations avec l'exponentielle

Propriété Résolution d'équations exponentielles. Pour tous réels A et B :

$$e^A = e^B \Leftrightarrow A = B.$$

DÉFINITION ÉQUATION DE TYPE $e^A = k$

Soit k un nombre réel.

- ▶ Si $k > 0$: l'équation $e^A = k$ équivaut à $A = \ln(k)$.
- ▶ Si $k \leq 0$: l'équation $e^A = k$ n'a **aucune solution**, car $e^A > 0$ pour tout réel A .

Propriété Résolution d'inéquations exponentielles. La fonction exponentielle étant **strictement croissante** :

$$e^A \leq e^B \Leftrightarrow A \leq B, \quad e^A < e^B \Leftrightarrow A < B.$$

De même :

$$e^A \geq k \quad (k > 0) \Leftrightarrow A \geq \ln(k).$$

Exemple. Résoudre $e^{2x-1} = e^{x+3}$.

$$e^{2x-1} = e^{x+3} \Leftrightarrow 2x - 1 = x + 3 \Leftrightarrow x = 4.$$

| L'injectivité de la fonction exponentielle (strictement croissante) permet de résoudre les équations et inéquations exponentielles en comparant directement les exposants.

L'ensemble des solutions est $S = \{4\}$.

Exemple. Résoudre $e^{3x} = 7$.

$$e^{3x} = 7 \Leftrightarrow 3x = \ln(7) \Leftrightarrow x = \frac{\ln 7}{3}.$$

L'ensemble des solutions est $S = \left\{ \frac{\ln 7}{3} \right\}$.

Exemple. Résoudre $e^{x^2-4} = 1$.

$$e^{x^2-4} = 1 = e^0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2.$$

L'ensemble des solutions est $S = \{-2; 2\}$.

Exemple. Résoudre $e^x = -3$.

L'exponentielle est toujours strictement positive : $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

L'équation $e^x = -3$ n'a **aucune solution**. $S = \emptyset$.

Exemple. Résoudre l'inéquation $e^{2x+1} < e^{5-x}$.

La fonction exponentielle est strictement croissante, donc :

$$e^{2x+1} < e^{5-x} \Leftrightarrow 2x + 1 < 5 - x \Leftrightarrow 3x < 4 \Leftrightarrow x < \frac{4}{3}.$$

L'ensemble des solutions est $S = \left] -\infty; \frac{4}{3} \right[$.

Exemple. Résoudre l'inéquation $e^x \geq e^2$.

$$e^x \geq e^2 \Leftrightarrow x \geq 2.$$

L'ensemble des solutions est $S = [2; +\infty[$.

Exemple. Résoudre $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.

On pose $X = e^x > 0$. L'équation devient $X^2 - 5X + 6 = 0$.

$$\Delta = 25 - 24 = 1, \text{ d'où } X_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \text{ et } X_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

Les deux valeurs sont positives, donc :

$$e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2, \quad e^x = 3 \Leftrightarrow x = \ln 3.$$

L'ensemble des solutions est $S = \{\ln 2; \ln 3\}$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier que $k > 0$ dans l'équation $e^A = k$. Si $k \leq 0$, il n'y a aucune solution. Ne jamais écrire $e^A = -3 \Rightarrow A = \ln(-3)$: le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas dans $\mathbb{R}$.

ERREUR FRÉQUENTE

Inverser le sens de l'inégalité en passant aux exposants. La fonction exponentielle est *croissante* : elle *conserve* l'ordre. $e^A < e^B \Leftrightarrow A < B$ (même sens).

Contre-exemple. On pourrait croire que $e^{x^2} = e^4$ donne $x = 2$ uniquement. Or $x^2 = 4$ admet *deux* solutions : $x = 2$ et $x = -2$. Ne pas oublier de résoudre complètement l'équation sur les exposants.

POUR ALLER PLUS LOIN

La substitution $X = e^x$ permet de ramener certaines équations exponentielles à des équations polynomiales. Plus généralement, toute équation de la forme $a e^{2x} + b e^x + c = 0$ se ramène à $aX^2 + bX + c = 0$ avec la contrainte $X > 0$, ce qui exclut les racines négatives ou nulles.

MÉTHODE M1 — SIMPLIFIER UNE EXPRESSION AVEC L'EXPONENTIELLE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de simplifier une expression contenant des produits, quotients ou puissances de l'exponentielle, par exemple $e^a \times e^b$, $\frac{e^a}{e^b}$ ou $(e^a)^n$.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les termes en exponentielle présents dans l'expression.
2. J'applique la propriété algébrique adaptée :
 - ▶ Produit : $e^a \times e^b = e^{a+b}$;
 - ▶ Quotient : $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$;
 - ▶ Puissance : $(e^a)^n = e^{na}$.
3. Je simplifie l'exposant obtenu (réduire, factoriser si utile).

Exemple rédigé. Simplifions $A = \frac{e^{3x} \times e^2}{e^{x+1}}$. Au numérateur, $e^{3x} \times e^2 = e^{3x+2}$. Donc $A = \frac{e^{3x+2}}{e^{x+1}} = e^{(3x+2)-(x+1)} = e^{2x+1}$.

$$A = e^{2x+1}.$$

Les pièges.

- ▶ Écrire $e^a \times e^b = e^{ab}$: on additionne les exposants, on ne les multiplie pas.
- ▶ Écrire $e^a + e^b = e^{a+b}$: la relation fonctionnelle concerne le produit, pas la somme.
- ▶ Oublier de distribuer le signe moins dans $e^{a-(b+c)}$: on obtient e^{a-b-c} .

Vérifier son résultat. Je vérifie en remplaçant par une valeur numérique simple (par exemple $x = 0$) que l'expression initiale et l'expression simplifiée donnent le même résultat.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — ÉTUDIER LES VARIATIONS D'UNE FONCTION AVEC L'EXPONENTIELLE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande d'étudier les variations d'une fonction f faisant intervenir l'exponentielle, ou de dresser son tableau de variations.

La méthode pas à pas.

1. Je calcule $f'(x)$ en utilisant les règles de dérivation (produit, quotient, composition avec e^u).
2. Je factorise $f'(x)$ en isolant le facteur exponentiel.
3. J'utilise le fait que $e^{(\cdot)} > 0$ pour tout réel : le signe de $f'(x)$ est celui du facteur restant.
4. J'étudie le signe du facteur restant et j'en déduis les variations de f .

Exemple rédigé. Étudions les variations de $f(x) = (2x - 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = 2e^x + (2x - 1)e^x$.
 $f'(x) = e^x(2 + 2x - 1) = e^x(2x + 1)$. Le signe de $f'(x)$ est celui de $2x + 1$. $2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$.

Étape 2 : produit au numérateur.

Étape 1 : dérivée (règle du produit).
 Étape 2 : signe de $f'(x)$.

On a $f'(x) < 0$ sur $]-\infty; -\frac{1}{2}[$ et $f'(x) > 0$ sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$\searrow$	$f(-\frac{1}{2})$	$\nearrow$

f admet un minimum en $x = -\frac{1}{2}$, de valeur $f(-\frac{1}{2}) = -2e^{-1/2}$.

Les pièges.

- Oublier de factoriser par e^x et tenter de résoudre $f'(x) = 0$ sans simplifier.
- Croire que e^x peut s'annuler ou changer de signe : $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- Se tromper dans la dérivation du produit : oublier le terme $u'v$ ou uv' .

Vérifier son résultat. Je contrôle que $f'(-\frac{1}{2}) = 0$ en remplaçant dans l'expression factorisée, et que les variations sont cohérentes avec quelques valeurs numériques de f .

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — DÉRIVER UNE FONCTION DE LA FORME $e^{u(x)}$

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer la dérivée d'une fonction de la forme $f(x) = e^{u(x)}$, où u est une fonction dérivable.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie la fonction $u(x)$ qui est à l'exposant de l'exponentielle.
2. Je calcule la dérivée $u'(x)$.
3. J'applique la formule : $(e^{u(x)})' = u'(x) e^{u(x)}$.
4. Je simplifie l'expression obtenue si possible.

Exemple rédigé. Calculons la dérivée de $f(x) = e^{x^2-3x}$. On pose $u(x) = x^2 - 3x$. $u'(x) = 2x - 3$.
 $f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}$.

$$f'(x) = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Les pièges.

- Écrire $(e^u)' = e^{u'}$: on ne dérive pas l'exposant seul, on multiplie par u' .
- Oublier le facteur $u'(x)$ devant l'exponentielle : $(e^u)' \neq e^u$ sauf si $u(x) = x$.
- Se tromper dans le calcul de $u'(x)$, en particulier lorsque u est un polynôme de degré 2 ou plus.

Vérifier son résultat. Je vérifie le cas particulier $u(x) = x$: on doit retrouver $(e^x)' = e^x$, ce qui confirme la formule avec $u'(x) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

Étape 2 : identifier u .

Étape 3 : appliquer la formule.

MÉTHODE M4 — RÉSOUDRE UNE ÉQUATION AVEC L'EXPONENTIELLE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre une équation faisant intervenir l'exponentielle, du type $e^A = e^B$ ou $e^A = k$.

La méthode pas à pas.

1. Je ramène l'équation à l'une des deux formes suivantes :
 - ▶ $e^A = e^B$;
 - ▶ $e^A = k$, où k est un réel.
2. J'applique la règle correspondante :
 - ▶ Si $e^A = e^B$, alors $A = B$ (injectivité de l'exponentielle).
 - ▶ Si $e^A = k$ avec $k > 0$, alors $A = \ln(k)$.
 - ▶ Si $e^A = k$ avec $k \leq 0$, l'équation n'a pas de solution (car $e^A > 0$).
3. Je résous l'équation algébrique obtenue.

Exemple rédigé. Résolvons $e^{2x-1} = e^{x+3}$ dans $\mathbb{R}$. L'exponentielle est injective, donc $e^{2x-1} = e^{x+3} \Leftrightarrow 2x-1 = x+3$. $2x-x = 3+1$, soit $x = 4$.

$$\mathcal{S} = \{4\}.$$

Forme $e^A = e^B$.

Résolution de l'équation du premier degré.

Les pièges.

- ▶ Oublier de vérifier que $k > 0$ avant d'écrire $A = \ln(k)$: si $k \leq 0$, il n'y a pas de solution.
- ▶ Simplifier $e^A = e^B$ en divisant par e^B sans justifier : il est plus rigoureux d'invoquer l'injectivité.
- ▶ Écrire $\ln(e^A) = A$ sans préciser que cela provient de la définition de $\ln$ comme réciproque de $\exp$.

Vérifier son résultat. Je remplace la valeur trouvée dans l'équation de départ pour vérifier l'égalité : $e^{2 \times 4 - 1} = e^7$ et $e^{4+3} = e^7$.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — RÉSOUDRE UNE INÉQUATION AVEC L'EXPONENTIELLE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre une inéquation faisant intervenir l'exponentielle, du type $e^A \geq e^B$ ou $e^A \geq k$.

La méthode pas à pas.

1. Je ramène l'inéquation à l'une des deux formes suivantes :
 - ▶ $e^A \geq e^B$ (ou $>, \leq, <$) ;
 - ▶ $e^A \geq k$, où k est un réel.
2. J'applique la règle correspondante :
 - ▶ La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $e^A \geq e^B \Leftrightarrow A \geq B$ (le sens de l'inégalité est conservé).
 - ▶ Si $k > 0$: $e^A \geq k \Leftrightarrow A \geq \ln(k)$.
 - ▶ Si $k \leq 0$: l'inéquation est toujours vérifiée (car $e^A > 0$ pour tout réel A).
3. Je résous l'inéquation algébrique obtenue.

Exemple rédigé. Résolvons $e^{-x+2} \leq e^{3x-1}$ dans $\mathbb{R}$. La fonction exponentielle est strictement croissante, donc :

$$e^{-x+2} \leq e^{3x-1} \Leftrightarrow -x+2 \leq 3x-1.$$

Forme $e^A \leq e^B$.

Résolution de l'inéquation du premier degré.

$$2 + 1 \leq 3x + x, \text{ soit } 3 \leq 4x, \text{ d'où } x \geq \frac{3}{4}.$$

$$S = \left[\frac{3}{4}; +\infty \right[.$$

Les pièges.

- ▶ Inverser le sens de l'inégalité : la fonction exponentielle est croissante, donc le sens est conservé.
- ▶ Oublier que $e^A > 0$ toujours : si $k \leq 0$, l'inéquation $e^A \geq k$ est vérifiée pour tout réel.
- ▶ Confondre avec le cas d'une fonction décroissante (comme $x \mapsto -e^x$) où le raisonnement sur le signe change.

Vérifier son résultat. Je teste une valeur dans l'ensemble solution et une valeur en dehors : par exemple, pour $x = 1 \geq \frac{3}{4}$, $e^1 \leq e^2$ est vrai ; pour $x = 0 < \frac{3}{4}$, $e^2 \leq e^{-1}$ est faux.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

1SPE-EXP0-EX-001
⌚ 5 min

Exercice 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x$.

1. Calculer $f'(x)$. Que constate-t-on ?
2. Vérifier que $f'(x) = f(x)$ pour tout réel x .
3. Calculer $f(0)$.
4. En déduire que f est l'unique fonction vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$.
5. Donner la valeur de $\exp(1)$. Comment note-t-on ce nombre ?

1SPE-EXP0-EX-002
⌚ 5 min

Exercice 2

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2e^x$.

1. Calculer $g'(x)$.
2. La fonction g vérifie-t-elle l'équation $y' = y$? Justifier.
3. Calculer $g(0)$. La condition $y(0) = 1$ est-elle vérifiée ?
4. Expliquer pourquoi g n'est pas la fonction exponentielle.

1SPE-EXP0-EX-003
⌚ 5 min

Exercice 3

1. Calculer $\exp(0)$.
2. La fonction exponentielle peut-elle s'annuler ? Justifier en utilisant la propriété $\exp(x) > 0$ pour tout réel x .
3. Compléter : pour tout réel x , $e^x \dots 0$ (choisir parmi $>$, $\geq$, $<$, $\leq$, $=$).
4. En déduire que l'équation $e^x = 0$ n'a aucune solution dans $\mathbb{R}$.

1SPE-EXP0-EX-004
⌚ 5 min

Exercice 4

Répondre par **vrai** ou **faux** à chaque affirmation. Justifier chaque réponse.

1. $\exp(0) = 1$.
2. Pour tout réel x , $\exp'(x) = \exp(x)$.
3. Pour tout réel x , $e^x \geq 0$ (l'exponentielle est positive ou nulle).
4. $\exp(1) = e$.

5. Il existe un réel x tel que $e^x = 0$.

Exercice 5

1SPE-EXP0-EX-005
⌚ 10 min

On suppose qu'une fonction f , dérivable sur $\mathbb{R}$, vérifie $f' = f$.

On pose $g(x) = f(x) \cdot e^{-x}$.

1. Calculer $g'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit.
2. En utilisant l'hypothèse $f'(x) = f(x)$, montrer que $g'(x) = 0$ pour tout réel x .
3. En déduire que g est une fonction constante sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $f(x) = f(0) \cdot e^x$ pour tout réel x .
5. En déduire que si f vérifie $f' = f$, alors f ne s'annule jamais ou bien f est la fonction nulle.

Exercice 6

1SPE-EXP0-EX-006
⌚ 8 min

On considère la courbe représentative C de la fonction exponentielle dans un repère orthonormé.

1. Rappeler la valeur de $\exp(0)$ et $\exp'(0)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse 0.
3. Vérifier que la tangente passe par l'origine du repère.
4. La courbe C est-elle au-dessus ou en dessous de la tangente T au voisinage de $x = 0$? Justifier à l'aide de la convexité ou d'un argument sur $e^x - (x + 1)$.

Exercice 7

1SPE-EXP0-EX-007
⌚ 8 min

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 3e^x - 2$.

1. Calculer $h'(x)$.
2. La fonction h est-elle solution de l'équation différentielle $y' = y$? Justifier.
3. Calculer $h'(x) - h(x)$. Quelle équation différentielle h vérifie-t-elle?
4. Calculer $h(0)$. La condition $h(0) = 1$ est-elle vérifiée?
5. Pourquoi h n'est-elle pas la fonction exponentielle malgré $h(0) = 1$?

Exercice 8

1SPE-EXP0-EX-008
⌚ 10 min

On utilise la définition de la fonction exponentielle ($\exp' = \exp$, $\exp(0) = 1$, $\exp(x) > 0$).

1. Justifier que la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. En utilisant la croissance et la valeur $\exp(0) = 1$, montrer que :
 - a) pour tout $x > 0$, $e^x > 1$;
 - b) pour tout $x < 0$, $e^x < 1$.
3. Montrer que pour tout $x < 0$, on a $0 < e^x < 1$.
4. Résumer les résultats dans un tableau de signes de $e^x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9

1SPE-EXP0-EX-009
⌚ 15 min

Unicité de la fonction exponentielle.

On admet qu'il existe au moins une fonction $\exp$ dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $\exp' = \exp$ et $\exp(0) = 1$.

Soit f une autre fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$.

On pose $g(x) = \frac{f(x)}{\exp(x)}$.

1. Justifier que g est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $g'(x)$ à l'aide de la formule du quotient.
3. En utilisant les hypothèses $f' = f$ et $\exp' = \exp$, montrer que $g'(x) = 0$ pour tout réel x .
4. En déduire que g est constante sur $\mathbb{R}$.

5. Calculer $g(0)$ et en déduire la valeur de la constante.
6. Conclure que $f = \exp$: la fonction exponentielle est unique.

1SPE-EXP0-EX-010
⌚ 12 min

Exercice 10 ◆◆◆

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x - e^x + 1$.

1. Calculer $f(0)$.
2. Calculer $f'(x)$ et vérifier que $f'(x) = xe^x$.
3. En déduire $f'(0)$.
4. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x+1)e^x$.
5. Calculer $f''(0)$. En déduire la nature du point critique $x = 0$.
6. Dresser le tableau de variations de f et montrer que $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .
7. En déduire l'inégalité $xe^x \geq e^x - 1$ pour tout réel x .

1SPE-EXP0-EX-011
⌚ 5 min

Exercice 11 ◆

Simplifier chacune des expressions suivantes :

1. $e^3 \times e^5$
2. $\frac{e^7}{e^2}$
3. $(e^2)^4$
4. $e^4 \times e^{-1}$

1SPE-EXP0-EX-012
⌚ 5 min

Exercice 12 ◆

Écrire chacune des expressions suivantes sous la forme $e^{f(x)}$:

1. $e^x \times e^{2x}$
2. $\frac{e^{3x}}{e^x}$
3. $(e^x)^5$
4. $e^{2x} \times e^{-x} \times e^{3x}$

1SPE-EXP0-EX-013
⌚ 5 min

Exercice 13 ◆

Simplifier chacune des expressions suivantes :

1. $e^{x+1} \times e^{x-1}$
2. $\frac{e^{2x+3}}{e^{x+1}}$
3. $\frac{(e^x)^3}{e^{2x}}$
4. $e^{x+2} \times e^{-(x-2)}$

1SPE-EXP0-EX-014
⌚ 5 min

Exercice 14 ◆

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est **vraie** ou **fausse**. Justifier.

1. $e^{a+b} = e^a + e^b$
2. $e^{a \times b} = e^a \times e^b$
3. $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
4. $(e^a)^n = e^{a+n}$

1SPE-EXP0-EX-015
⌚ 10 min

Exercice 15 ◆◆

On souhaite démontrer que pour tous réels a et b , $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$.

On fixe un réel b et on pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(x) = \frac{\exp(x+b)}{\exp(x)}.$$

1. Justifier que g est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $g'(x)$ et montrer que $g'(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. En déduire que g est constante sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer $g(0)$ et conclure.

Exercice 16

1SPE-EXP0-EX-016
⌚ 8 min

En utilisant la propriété $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$, démontrer les résultats suivants.

1. Pour tout réel a , $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$.
2. Pour tous réels a et b , $\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$.
3. Pour tout réel a , $\exp(a) \times \exp(-a) = 1$.

Exercice 17

1SPE-EXP0-EX-017
⌚ 10 min

1. Développer et simplifier $A = (e^{2x} - 1)(e^{2x} + 1)$.
2. Développer et simplifier $B = (e^x + e^{-x})^2$.
3. On pose $x = \ln 2$. Calculer la valeur exacte de $e^{3x} + e^{-3x}$.
4. Simplifier $C = \frac{e^{3x} \times e^{-x}}{(e^x)^2}$.

Exercice 18

1SPE-EXP0-EX-018
⌚ 10 min

Factoriser chacune des expressions suivantes :

1. $A = e^{2x} - e^x$
2. $B = e^{2x} - 2e^x + 1$
3. $C = e^{2x} - 9$
4. $D = e^{2x} + 5e^x + 6$

Exercice 19

1SPE-EXP0-EX-019
⌚ 15 min

On admet la propriété : pour tous réels a et b , $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$.

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$ et pour tout réel a :

$$\exp(na) = [\exp(a)]^n.$$

1. **Initialisation** : Vérifier la propriété pour $n = 1$.
2. **Hérédité** : On suppose que pour un certain entier $k \geq 1$, $\exp(ka) = [\exp(a)]^k$. Montrer que $\exp((k+1)a) = [\exp(a)]^{k+1}$.
3. **Conclusion** : Rédiger la conclusion du raisonnement par récurrence.
4. En déduire que pour tout entier naturel n et tout réel a , $\exp(-na) = \frac{1}{[\exp(a)]^n}$.

Exercice 20

1SPE-EXP0-EX-020
⌚ 12 min

On définit la fonction f sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

1. Montrer que pour tout réel x , $f(-x) = f(x)$. Comment se traduit cette propriété graphiquement ?
2. Calculer $f(0)$.
3. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.
4. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.
5. Montrer que pour tout réel x , $[f(x)]^2 - \left[\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right]^2 = 1$.

1SPE-EXP0-EX-021

⌚ 5 min

Exercice 21 ◆

Comparer, sans calculatrice, les nombres suivants en justifiant à l'aide de la croissance de la fonction exponentielle :

1. e^3 et e^5
2. e^{-2} et e^{-1}
3. e^0 et e^{-3}

1SPE-EXP0-EX-022

⌚ 5 min

Exercice 22 ◆

Ranger dans l'ordre croissant les nombres suivants :

$$e^{-1} ; 1 ; e ; e^2 ; e^{-2}$$

1SPE-EXP0-EX-023

⌚ 5 min

Exercice 23 ◆

Déterminer les limites suivantes en justifiant :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}$

1SPE-EXP0-EX-024

⌚ 5 min

Exercice 24 ◆

Dire si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et justifier :

1. « Pour tout réel x , $e^x > 0$. »
2. « Il existe un réel x tel que e^x soit négatif. »
3. « e^{-x} tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$. »

1SPE-EXP0-EX-025

⌚ 8 min

Exercice 25 ◆◆

Résoudre chacune des inéquations suivantes sur $\mathbb{R}$:

1. $e^x > e^3$
2. $e^{2x} \leq e^5$
3. $e^{-x} \geq e^2$

1SPE-EXP0-EX-026

⌚ 10 min

Exercice 26 ◆◆

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x-1}$.

1. Calculer $f'(x)$ et en déduire le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
4. Dresser le tableau de variations complet de f .

1SPE-EXP0-EX-027

⌚ 8 min

Exercice 27 ◆◆

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x)$

Indication pour la question 1 : on admettra que e^x croît plus vite que x quand $x \rightarrow +\infty$.

Exercice 28 ♦♦

1SPE-EXP0-EX-028
⌚ 10 min

On pose $g(x) = e^x - x - 2$ pour tout réel x .

1. Calculer $g(0)$ et $g(2)$.
2. Montrer que g est continue sur $[0; 2]$.
3. En déduire que l'équation $e^x = x + 2$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[0; 2]$.

Exercice 29 ♦♦♦

1SPE-EXP0-EX-029
⌚ 12 min

L'objectif de cet exercice est de démontrer que la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

1. Rappeler la dérivée de la fonction $f : x \mapsto e^x$.
2. Montrer que $f'(x) > 0$ pour tout réel x .
3. En déduire que la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
4. Expliquer alors pourquoi, pour tous réels a et b :

$$e^a = e^b \iff a = b \quad \text{et} \quad e^a < e^b \iff a < b.$$

Exercice 30 ♦♦♦

1SPE-EXP0-EX-030
⌚ 15 min

On pose $h(x) = e^x - x - 1$ pour tout réel x . La droite $T : y = x + 1$ est la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0.

1. Calculer $h(0)$.
2. Calculer $h'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations de h .
4. En déduire que pour tout réel $x : e^x \geq x + 1$.
5. Interpréter graphiquement ce résultat : quelle est la position de la courbe de $\exp$ par rapport à sa tangente en 0 ?

Exercice 31 ♦

1SPE-EXP0-EX-031
⌚ 5 min

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = e^{3x}$
2. $g(x) = e^{-x}$
3. $h(x) = e^{x+1}$
4. $k(x) = e^{2x-3}$

Exercice 32 ♦

1SPE-EXP0-EX-032
⌚ 5 min

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = 5e^{2x}$
2. $g(x) = -3e^{-4x}$
3. $h(x) = \frac{e^x}{2}$

Exercice 33 ♦

1SPE-EXP0-EX-033
⌚ 7 min

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = e^x + x$
2. $g(x) = e^{-x} + e^x$
3. $h(x) = x - e^x$

1SPE-EXP0-EX-034
⌚ 8 min

Exercice 34 ◆

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = e^{x^2}$
2. $g(x) = e^{x^2+1}$

1SPE-EXP0-EX-035
⌚ 10 min

Exercice 35 ◆◆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x e^x$.

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$.
2. Montrer que $f'(x) = (x + 1) e^x$.
3. Résoudre $f'(x) = 0$.
4. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

1SPE-EXP0-EX-036
⌚ 10 min

Exercice 36 ◆◆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 1) e^{-x}$.

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule du produit.
2. Montrer que $f'(x) = (3 - 2x) e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

1SPE-EXP0-EX-037
⌚ 10 min

Exercice 37 ◆◆

Soit f la fonction définie sur $] -1 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$.

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.
2. Montrer que $f'(x) = \frac{x e^x}{(x+1)^2}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $] -1 ; +\infty[$ et dresser le tableau de variations de f .

1SPE-EXP0-EX-038
⌚ 10 min

Exercice 38 ◆◆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - 1) e^x$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Montrer que $f'(x) = (x^2 + 2x - 1) e^x$.
3. Résoudre $x^2 + 2x - 1 = 0$ et en déduire les extremums de f .

1SPE-EXP0-EX-039
⌚ 15 min

Exercice 39 ◆◆◆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 1) e^x$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = x e^x$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
4. Calculer $f(0)$, $f(1)$ et $f(-1)$.
5. Dresser le tableau de variations complet de f et tracer l'allure de la courbe représentative de f .

Exercice 40 ◆◆◆

1SPE-EXP0-EX-040

⌚ 15 min

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
5. Préciser les extremums de f et tracer l'allure de la courbe représentative.

Exercice 41 ◆

1SPE-EXP0-EX-041

⌚ 5 min

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $e^x = e^5$
2. $e^{2x} = e^{-3}$
3. $e^{x+1} = e^4$

Exercice 42 ◆

1SPE-EXP0-EX-042

⌚ 5 min

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. On donnera les solutions sous forme exacte.

1. $e^x = 3$
2. $e^{2x} = 7$
3. $e^{-x} = 5$

Exercice 43 ◆◆

1SPE-EXP0-EX-043

⌚ 10 min

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$e^{2x} - 5e^x + 6 = 0.$$

Indication : on posera $X = e^x$.

Exercice 44 ◆◆

1SPE-EXP0-EX-044

⌚ 10 min

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} - e^x - 2 = 0$.
On posera $X = e^x$ et on tiendra compte du signe de X .
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^x \geq 2$.

Exercice 45 ◆◆◆

1SPE-EXP0-EX-045

⌚ 15 min

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation :

$$e^{2x} + e^x - 6 \leq 0.$$

On posera $X = e^x$ et on discutera les contraintes sur X .

Exercice 46 ◆◆◆

1SPE-EXP0-EX-046

⌚ 15 min

La population d'une culture bactérienne est modélisée par la fonction :

$$P(t) = 1000 e^{0,05t}$$

où t est le temps en heures et $P(t)$ le nombre de bactéries.

1. Calculer $P(0)$. Interpréter ce résultat.
2. Déterminer à quel instant t la population atteint 5000 bactéries. On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à l'unité.
3. Résoudre l'inéquation $P(t) \geq 10\,000$. Interpréter le résultat.

1SPE-EXP0-EX-047

⌚ 15 min

Exercice 47 ◆◆◆

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - 2e^x$.

1. Montrer que pour tout réel x , $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de f .
3. Calculer $f(0)$ et déterminer le minimum de f sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

1SPE-EXP0-EX-048

⌚ 15 min

Exercice 48 ◆◆◆

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$.

1. Montrer que $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$ pour tout réel x .
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.
3. En déduire que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$. En déduire les asymptotes.
5. Calculer $f(0)$ et dresser le tableau de variations complet de f .

1SPE-EXP0-EX-049

⌚ 15 min

Exercice 49 ◆◆◆

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 1)e^x$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = (2x + 1)e^x$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
4. Déterminer le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
5. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

1SPE-EXP0-EX-050

⌚ 15 min

Exercice 50 ◆◆◆

L'objectif de cet exercice est de montrer que $e^x > x$ pour tout réel x .

1. On pose $g(x) = e^x - x$. Calculer $g'(x)$.
2. Résoudre $g'(x) = 0$ et étudier le signe de $g'(x)$.
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.
4. En déduire que $g(x) > 0$ pour tout réel x , c'est-à-dire que $e^x > x$.
5. **Application.** Montrer que l'équation $e^x = x$ n'a aucune solution dans $\mathbb{R}$.

Coup de pouce 1. Rappeler la propriété fondamentale de la fonction exponentielle : $(e^x)' = \dots$

Coup de pouce 2. Pour la question 3, remplacer x par 0 dans e^x . Que vaut toute puissance à l'exposant 0 ?

Coup de pouce 1. Pour dériver $g(x) = 2e^x$, utiliser que la dérivée d'une constante fois une fonction est la constante fois la dérivée.

Coup de pouce 2. L'unicité de la fonction exponentielle exige **deux** conditions : $y' = y$ et $y(0) = 1$. Vérifier chacune séparément.

Coup de pouce 1. Rappeler que $e^0 = 1$: c'est la condition initiale de la définition de l'exponentielle.

Coup de pouce 2. Une fonction strictement positive ne peut jamais prendre la valeur 0. Utiliser cette propriété pour conclure sur l'équation $e^x = 0$.

Coup de pouce 1. Revoir les trois propriétés fondamentales de l'exponentielle : $\exp' = \exp$, $\exp(0) = 1$ et $\exp(x) > 0$ pour tout réel x .

Coup de pouce 2. Attention à la nuance entre ≥ 0 (positif ou nul) et > 0 (strictement positif). L'exponentielle peut-elle valoir exactement 0 ?

Coup de pouce 1. Rappelle-toi les trois règles : $e^a \times e^b = e^{a+b}$, $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ et $(e^a)^n = e^{na}$.

Coup de pouce 1. Additionne les exposants lors d'un produit et soustrais-les lors d'un quotient. Pour une puissance, multiplie l'exposant.

Coup de pouce 1. Commence par développer les exposants, puis applique les règles de calcul sur les exponentielles. Attention aux signes dans les soustractions !

Coup de pouce 1. Pour chaque affirmation, essaie de la comparer aux propriétés du cours. Si tu doutes, teste avec des valeurs numériques simples ($a = 1$, $b = 1$, etc.).

Coup de pouce 1. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: si $a < b$ alors $e^a < e^b$.

Coup de pouce 2. Commence par comparer les exposants entre eux, puis conclus.

Coup de pouce 1. Commence par ranger les exposants $(-2, -1, 0, 1, 2)$ dans l'ordre croissant.

Coup de pouce 2. Rappelle-toi que $1 = e^0$ et $e = e^1$. La fonction exponentielle conserve l'ordre.

Coup de pouce 1. Rappelle les deux limites fondamentales de l'exponentielle : en $+\infty$ et en $-\infty$.

Coup de pouce 2. Pour la question 3, pose $X = -x$. Quand $x \rightarrow +\infty$, vers quoi tend X ?

Coup de pouce 1. Rappelle-toi que pour tout réel x , $e^x > 0$.

Coup de pouce 2. Pour la question 3, quand $x \rightarrow +\infty$, vers quoi tend $-x$? Utilise la limite de e^X quand $X \rightarrow -\infty$.

Coup de pouce 1. On utilise la formule $(e^u)' = u' e^u$. Identifier $u(x)$ dans chaque cas et calculer $u'(x)$.

Coup de pouce 2. Pour $f(x) = e^{3x}$, on a $u(x) = 3x$ donc $u'(x) = 3$.

Coup de pouce 1. Rappelle que $(k \cdot e^u)' = k \cdot u' \cdot e^u$ lorsque k est une constante.

Coup de pouce 2. Pour $g(x) = -3e^{-4x}$, identifier $k = -3$ et $u(x) = -4x$, puis calculer $k \times u'(x) = \dots$

Coup de pouce 1. On dérive chaque terme séparément : $(u + v)' = u' + v'$.

Coup de pouce 2. Pour $g(x) = e^{-x} + e^x$, rappeler que $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

Coup de pouce 1. Pour $f(x) = e^{x^2}$, identifier $u(x) = x^2$. Quelle est la dérivée de x^2 ?

Coup de pouce 2. Appliquer la formule : $f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = \dots \times e^{x^2}$.

Coup de pouce 1. Rappelle la propriété : $e^a = e^b \iff a = b$ (la fonction exponentielle est injective).

Coup de pouce 2. Pour la question 2, écrire e^{2x} comme e^{2x} et identifier les exposants.

Coup de pouce 1. Pour résoudre $e^x = k$ avec $k > 0$, la solution est $x = \ln k$.

Coup de pouce 2. Pour $e^{2x} = 7$, commencer par écrire $2x = \ln 7$, puis isoler x .

Coup de pouce 3. Pour $e^{-x} = 5$, écrire $-x = \ln 5$ et en déduire x .

TD — Décroissance radioactive du carbone 14

Durée : 50 minutes.

Situation

Le carbone 14 (^{14}C) est un isotope radioactif utilisé en archéologie pour dater des vestiges organiques. La quantité de carbone 14 dans un échantillon décroît au cours du temps selon la loi :

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t},$$

où N_0 est la quantité initiale, t est le temps en années, et $\lambda = 1,21 \times 10^{-4} \text{ an}^{-1}$ est la constante de désintégration.

La **demi-vie** est la durée T au bout de laquelle la moitié de la quantité initiale a disparu.

Partie A — Le modèle exponentiel (C3) — 10 min

- Vérifier que $N(0) = N_0$. Interpréter ce résultat.

2. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t)$. Interpréter physiquement.
3. Montrer que N est une fonction strictement décroissante sur $[0; +\infty[$.

Partie B — Calcul de la demi-vie (C5) — 10 min

4. La demi-vie T vérifie $N(T) = \frac{N_0}{2}$. Écrire l'équation correspondante.
5. Résoudre cette équation pour obtenir T en fonction de λ .
6. Calculer T numériquement avec $\lambda = 1,21 \times 10^{-4}$. Arrondir à la dizaine d'années.

Partie C — Datation d'un échantillon (C4, C5) — 15 min

7. Un os découvert lors de fouilles contient 35 % de la quantité initiale de carbone 14. Écrire l'équation $N(t) = 0,35 N_0$.
8. Résoudre cette équation pour exprimer t en fonction de λ .
9. Calculer l'âge de l'os (arrondir à la centaine d'années).
10. Calculer $N'(t)$ et interpréter le signe de $N'(t)$ en termes de vitesse de désintégration.

Partie D — Synthèse et limites du modèle (C3) — 15 min

11. Au bout de combien de demi-vies la quantité restante est-elle inférieure à 1 % de N_0 ? Justifier par un calcul.
12. En déduire une limite pratique de la méthode de datation au carbone 14 (en années).
13. Rédiger une synthèse de 3 à 5 lignes expliquant pourquoi la fonction exponentielle est le modèle naturel de la décroissance radioactive.

TD fil rouge — Des intérêts composés au nombre e

Durée : 50 minutes — Toutes les capacités C1 à C5 sont mobilisées.

Accroche

On place un capital de 1 000 € sur un compte rémunéré au taux annuel de 100 %. Si les intérêts sont calculés une seule fois en fin d'année, le capital double et vaut 2 000 €. Mais que se passe-t-il si les intérêts sont calculés plus fréquemment : chaque mois, chaque jour, chaque seconde ? Le capital peut-il croître sans limite ?

Partie A — Intérêts composés et découverte de e (C1) — 10 min

1. Le taux annuel est 100 %. Si les intérêts sont calculés n fois par an, le taux par période est $\frac{1}{n}$. Exprimer le capital C_n au bout d'un an en fonction de n .
2. Calculer C_n pour $n = 1, n = 2, n = 4, n = 12, n = 365$.
3. Conjecturer la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} C_n$. Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$?

Partie B — Propriétés algébriques (C2) — 10 min

4. Le capital au bout de t années (avec capitalisation continue) est $C(t) = 1000e^t$. Calculer $C(1)$, $C(2)$ et $C(3)$.
5. Vérifier que $C(2) = C(1) \times e$. Quelle propriété algébrique de l'exponentielle est utilisée ?
6. Montrer que $\frac{C(t+1)}{C(t)} = e$ pour tout t . Interpréter : le coefficient multiplicateur annuel est constant.
7. Simplifier $\frac{C(t_2)}{C(t_1)}$ en fonction de $t_2 - t_1$.

Partie C — Étude de la croissance du capital (C3, C4) — 15 min

8. Calculer $C'(t)$. Que remarque-t-on ?
9. Étudier le sens de variation de C sur $[0; +\infty[$. Justifier.
10. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Le capital croît-il sans limite ?
11. On considère un placement plus réaliste au taux annuel de 5 % : $C_5(t) = 1000e^{0,05t}$. Calculer $C'_5(t)$. Comparer la vitesse de croissance à celle du placement à 100 %.
12. Étudier les variations de $f(t) = C_5(t) - (1000 + 50t)$, c'est-à-dire comparer la capitalisation continue au placement linéaire. Montrer que f est croissante sur $[0; +\infty[$.

Partie D — Temps de doublement et synthèse (C5) — 15 min

13. Pour le placement à 5 %, résoudre $C_5(t) = 2000$ pour déterminer le temps de doublement T_d .
14. Exprimer T_d en fonction du taux r pour un placement général $C_r(t) = 1000e^{rt}$.
15. Calculer T_d pour $r = 0,03$ (taux à 3 %) et $r = 0,10$ (taux à 10 %). Arrondir à l'année.
16. Montrer que le temps de doublement vérifie l'inéquation $T_d > \frac{\ln 2}{r}$ si l'on impose $C_r(T_d) \geq 2000$. Cette inégalité est-elle une égalité ?
17. Rédiger une synthèse de 3 à 5 lignes : comment le nombre e apparaît-il naturellement dans les problèmes de croissance continue ? Quel est le lien entre la propriété $e^{a+b} = e^a e^b$ et le coefficient multiplicateur constant ?

QCM d'auto-évaluation — Fonction exponentielle

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Définition de l'exponentielle, $\exp(0)=1$, $\exp$ toujours positive

1. [Q1] Parmi les propriétés suivantes, laquelle caractérise la fonction exponentielle ?
 - A. C'est la seule fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) = f(x)$ pour tout x et $f(1) = e$.
 - B. C'est la seule fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) = f(x)$ pour tout x et $f(0) = 1$.
 - C. C'est la seule fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) = f(x)$ pour tout x et $f(0) = 0$.
 - D. C'est la seule fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) = xf(x)$ pour tout x et $f(0) = 1$.
2. [Q2] Quelle est la valeur de e^0 ?
 - A. 0
 - B. e
 - C. 1
 - D. La valeur n'est pas définie.

3. [Q3] Pour tout réel x , on a :
- A. $e^x > 0$
 - B. $e^x \geq 0$ (avec $e^x = 0$ possible)
 - C. e^x peut être négatif si $x < 0$
 - D. $e^x > 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

C2 — Propriétés algébriques de l'exponentielle

4. [Q4] Simplifier $e^3 \times e^5$.
- A. e^{15}
 - B. e^8
 - C. $2e^8$
 - D. e^{35}
5. [Q5] Simplifier $\frac{e^7}{e^3}$.
- A. $e^{7/3}$
 - B. e^{-21}
 - C. e^4
 - D. e^{10}
6. [Q6] Simplifier $(e^2)^3 \times e^{-4}$.
- A. e^{-2}
 - B. e^1
 - C. e^2
 - D. e^{10}

C3 — Variations, limites, comparaison

7. [Q7] La fonction exponentielle est :
- A. strictement décroissante sur $\mathbb{R}$
 - B. strictement croissante sur $\mathbb{R}$
 - C. croissante sur $]0; +\infty[$ et décroissante sur $] - \infty; 0[$
 - D. constante sur $\mathbb{R}$
8. [Q8] Quelle est la limite de e^x lorsque $x \rightarrow +\infty$?
- A. 0
 - B. 1
 - C. e
 - D. $+\infty$
9. [Q9] Sachant que la fonction exponentielle est strictement croissante, comparer $e^{2,5}$ et $e^{\sqrt{7}}$.
- A. $e^{2,5} > e^{\sqrt{7}}$
 - B. $e^{2,5} < e^{\sqrt{7}}$
 - C. $e^{2,5} = e^{\sqrt{7}}$
 - D. On ne peut pas comparer sans calculatrice.

C4 — Derivation de $e^{u(x)}$

10. [Q10] Soit $f(x) = e^{3x+1}$. Quelle est $f'(x)$?
- A. e^{3x+1}
 - B. $(3x + 1) e^{3x+1}$
 - C. $3 e^{3x+1}$
 - D. $3 e^3$
11. [Q11] Soit $g(x) = e^{x^2}$. Quelle est $g'(x)$?
- A. e^{x^2}
 - B. $x^2 e^{x^2}$
 - C. $2x e^{x^2}$
 - D. $2x e^{2x}$
12. [Q12] Soit $h(x) = x e^x$. Quelle est $h'(x)$?
- A. e^x
 - B. $x e^x$
 - C. $(1 + x) e^x$
 - D. $(x - 1) e^x$

C5 — Equations et inequations avec l'exponentielle

13. [Q13] Résoudre $e^x = e^5$.
- A. $x = e^5$
 - B. $x = 5$
 - C. $x = \ln 5$
 - D. Pas de solution.
14. [Q14] Résoudre l'inéquation $e^{2x-1} \geq 1$.
- A. $x \geq 1$
 - B. $x \geq \frac{1}{2}$
 - C. $x \leq \frac{1}{2}$
 - D. $x \geq 0$
15. [Q15] Résoudre $e^{x^2-4} = 1$.
- A. $x = 4$
 - B. $x = 2$
 - C. $x = -2$ ou $x = 2$
 - D. $x = 0$

Correction et diagnostics

Question	Capacite	Reponse	Distracteurs — erreur type et renvoi
Q1	C1	B	A : condition initiale $f(1) = e$ au lieu de $f(0) = 1$ — renvoi M1, étape 1 C : $f(0) = 0$: la fonction nulle satisferait $f' = f$ avec $f(0) = 0$ — renvoi M1, étape 1 D : equation $f'(x) = xf(x)$ n'est pas celle de l'exponentielle — renvoi M1, étape 1
Q2	C1	C	A : confusion $e^0 = 0$ (puissance et exposant) — renvoi M1, propriété fondamentale B : confusion e^0 et e^1 — renvoi M1, propriété fondamentale D : l'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ entier — renvoi M1, étape 1
Q3	C1	A	B : l'exponentielle est strictement positive, jamais nulle — renvoi M1, étape 2 C : $e^x > 0$ même pour $x < 0$ (ex. $e^{-1} = 1/e > 0$) — renvoi M1, étape 2 D : $e^x < 1$ pour $x < 0$ — renvoi M1, étape 2; M3
Q4	C2	B	A : multiplication des exposants $3 \times 5 = 15$ au lieu de l'addition — renvoi M2, règle 1 C : coefficient 2 parasite devant e^8 — renvoi M2, règle 1; R4 D : concatenation 35 des chiffres — renvoi M2, règle 1; R4
Q5	C2	C	A : division des exposants au lieu de la soustraction — renvoi M2, règle 2; R4 B : multiplication $-7 \times 3 = -21$ au lieu de la soustraction — renvoi M2, règle 2; R4 D : addition $7 + 3 = 10$ au lieu de la soustraction — renvoi M2, règle 2
Q6	C2	C	A : $(e^2)^3 = e^5$ au lieu de e^6 , puis $6 - 4 = 2$ — renvoi M2, règle 3; R4 B : $(e^2)^3 = e^5$, puis $5 - 4 = 1$ — renvoi M2, règle 3; R4 D : $(e^2)^3 = e^6$, puis $6 + 4 = 10$ (ajout au lieu de soustraction) — renvoi M2, règles 2-3
Q7	C3	B	A : confusion avec la fonction $x \mapsto e^{-x}$ — renvoi M3, étape 1 C : l'exponentielle n'a pas de minimum en $x = 0$ — renvoi M3, étape 1 D : $\exp'(x) = \exp(x) > 0$ donc strictement croissante — renvoi M3, étape 1
Q8	C3	D	A : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, pas 0 (c'est $\lim_{x \rightarrow -\infty}$) — renvoi M3, étape 2 B : confusion avec $e^0 = 1$ — renvoi M3, étape 2 C : confusion avec $e^1 = e$ — renvoi M3, étape 2
Q9	C3	A	B : $\sqrt{7} \approx 2,646 > 2,5$ mais exp croissante donc $e^{2,5} < e^{\sqrt{7}}$ — renvoi M3, étape 3 C : $2,5 \neq \sqrt{7}$ car $2,5^2 = 6,25 \neq 7$ — renvoi M3; R3 D : on compare les exposants grâce à la croissance — renvoi M3, étape 3
Q10	C4	C	A : oubli du facteur $u'(x) = 3$ — renvoi M4, étape 2 B : confusion $u'(x) = 3x + 1$ au lieu de $u'(x) = 3$ — renvoi M4, étape 1; R1 D : dérivée de u correcte mais e^u remplace par e^3 — renvoi M4, étape 2
Q11	C4	C	A : oubli du facteur $u'(x) = 2x$ — renvoi M4, étape 2 B : confusion $u'(x) = x^2$ au lieu de $u'(x) = 2x$ — renvoi M4, étape 1; R1 D : dérivée de x^2 correcte mais e^{x^2} remplace par e^{2x} — renvoi M4, étape 2
Q12	C4	C	A : oubli du terme x dans la dérivée du produit — renvoi M4; R1 B : dérivée de x oubliée ($u'v = 1 \times e^x$ manquant) — renvoi M4; R1 D : erreur de signe dans la dérivée du produit — renvoi M4; R1
Q13	C5	B	A : confusion $x = e^5$ au lieu de $x = 5$ (exponentielle non simplifiée) — renvoi M5, étape 1 C : le logarithme népérien n'est pas au programme de 1re — renvoi M5, étape 1 D : l'équation a bien une solution — renvoi M5, étape 1
Q14	C5	B	A : $2x - 1 \geq 0$ donne $x \geq 1/2$, pas $x \geq 1$ — renvoi M5, étape 2 C : inversion du sens (exp croissante conserve le sens) — renvoi M5, étape 2; M3 D : $e^0 = 1$ donne $2x - 1 \geq 0$, pas $x \geq 0$ — renvoi M5, étape 2
Q15	C5	C	A : $x^2 - 4 = 0$ donne $x = \pm 2$, pas $x = 4$ — renvoi M5, étape 1; R3 B : oubli de la solution $x = -2$ — renvoi M5, étape 1; R3 D : $e^0 = 1$ et $0^2 - 4 = -4 \neq 0$ — renvoi M5, étape 1

Reponses correctes

Q1	B	Q2	C	Q3	A	Q4	B
Q5	C	Q6	C	Q7	B	Q8	D
Q9	A	Q10	C	Q11	C	Q12	C
Q13	B	Q14	B	Q15	C		

Score : ... / 15 Capacites a retravailler : C1 [☐Q1 ☐Q2 ☐Q3] C2 [☐Q4 ☐Q5 ☐Q6] C3 [☐Q7 ☐Q8 ☐Q9] C4 [☐Q10 ☐Q11 ☐Q12] C5 [☐Q13 ☐Q14 ☐Q15]

Corrigé — Évaluation A — Fonction exponentielle

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $f(x) = e^{2x-1}$. On pose $u(x) = 2x - 1$, d'où $u'(x) = 2$.

Par la formule de dérivation de e^u :

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = 2e^{2x-1}.$$

Question 2. En utilisant la propriété $e^a \times e^b = e^{a+b}$:

$$e^{2x-1} \times e^{1-x} = e^{(2x-1)+(1-x)} = e^x.$$

Question 3. $f(0) = e^{2 \times 0 - 1} = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,368$.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = e^{2 \times \frac{1}{2} - 1} = e^{1-1} = e^0 = 1.$$

Interprétation : $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ signifie que le point de coordonnées $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$ appartient à la courbe de f .

C'est le point où la courbe coupe la droite $y = 1$.

Question 4. On a $f'(x) = 2e^{2x-1}$ (question 1) et $2f(x) = 2e^{2x-1}$.

Donc $f'(x) = 2f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: f est bien solution de $y' = 2y$.

Exercice 2 — 6 points

Question 1. $g(x) = (x-2)e^x$. C'est un produit $u \cdot v$ avec $u(x) = x-2$ et $v(x) = e^x$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

$$g'(x) = u'v + uv' = 1 \cdot e^x + (x-2) \cdot e^x = e^x(1+x-2) = (x-1)e^x.$$

Question 2. $g'(x) = (x-1)e^x$.

Or $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc le signe de $g'(x)$ est celui de $(x-1)$:

- $g'(x) < 0$ si $x < 1$: g est strictement décroissante sur $] -\infty ; 1]$;
- $g'(x) = 0$ si $x = 1$;
- $g'(x) > 0$ si $x > 1$: g est strictement croissante sur $[1 ; +\infty[$.

$$g(1) = (1-2)e^1 = -e \approx -2,72.$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	0	$\searrow$ $-e$ $\nearrow$	$+\infty$

Question 3. D'après le tableau de variations, g admet un **minimum** de $-e \approx -2,72$ atteint en $x = 1$.

Question 4.

- En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-2) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
- En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-2) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+$.
On utilise le résultat du cours : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$, car l'exponentielle l'emporte. Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-2)e^x = 0$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. En posant $X = e^x$, on a $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$, donc :

$$h(x) = X^2 - 5X + 4.$$

Question 2. On résout $X^2 - 5X + 4 = 0$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 25 - 16 = 9 > 0.$$

$$X_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

Question 3. On revient à la variable x en remplaçant X par e^x :

- $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$;
- $e^x = 4 \Leftrightarrow x = \ln 4$.

Les solutions de $h(x) = 0$ sont $x = 0$ et $x = \ln 4$.

Question 4. $h(x) \leq 0 \Leftrightarrow X^2 - 5X + 4 \leq 0$ avec $X = e^x > 0$.

Le trinôme $X^2 - 5X + 4 = (X - 1)(X - 4)$ est négatif ou nul pour $1 \leq X \leq 4$.

On traduit en x : $1 \leq e^x \leq 4$. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante :

$$\ln 1 \leq x \leq \ln 4 \quad \text{soit} \quad 0 \leq x \leq \ln 4.$$

L'ensemble des solutions est $[0; \ln 4]$.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $P(0) = 50\,000 e^{0,02 \times 0} = 50\,000 e^0 = 50\,000$.

Interprétation : en 2020 (année de départ, $t = 0$), la population de la ville est de 50 000 habitants.

Question 2. $P(10) = 50\,000 e^{0,02 \times 10} = 50\,000 e^{0,2} \approx 50\,000 \times 1,2214 \approx 61\,070$.

En 2030, la population sera d'environ **61 070** habitants.

Question 3. $P(t) = 100\,000 \Leftrightarrow 50\,000 e^{0,02t} = 100\,000 \Leftrightarrow e^{0,02t} = 2 \Leftrightarrow 0,02t = \ln 2 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 2}{0,02} = 50 \ln 2 \approx 34,66$.

La population atteindra 100 000 habitants environ 34,7 ans après 2020, soit au cours de l'année **2055**.

Question 4. $P(t) \geq 75\,000 \Leftrightarrow e^{0,02t} \geq \frac{75\,000}{50\,000} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 0,02t \geq \ln\left(\frac{3}{2}\right) \Leftrightarrow t \geq 50 \ln\left(\frac{3}{2}\right) \approx 20,27$.

La population dépassera 75 000 habitants à partir de $t = 21$ ans, soit à partir de l'année **2041**.

Évaluation A — Fonction exponentielle

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x-1}$.

1. Calculer $f'(x)$. (1 pt)
2. Simplifier $e^{2x-1} \times e^{1-x}$. (1,5 pt)
3. Calculer $f(0)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$. Interpréter $f\left(\frac{1}{2}\right)$. (1,5 pt)
4. Montrer que f est solution de l'équation différentielle $y' = 2y$. (1 pt)

Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x - 2)e^x$.

1. Calculer $g'(x)$. (2 pt)
2. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. (2 pt)
3. En déduire le minimum de g et la valeur de x pour laquelle il est atteint. (1 pt)
4. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et en $-\infty$. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C2, C4, C5

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = e^{2x} - 5e^x + 4$.

1. Poser $X = e^x$. Exprimer $h(x)$ en fonction de X . (1 pt)
2. Résoudre $X^2 - 5X + 4 = 0$. (1,5 pt)
3. En déduire les solutions de $h(x) = 0$. (1,5 pt)
4. Résoudre $h(x) \leq 0$. (1 pt)

Exercice 4

4 points — C5

La population d'une ville est modélisée par $P(t) = 50\,000 e^{0,02t}$, où t désigne le nombre d'années écoulées depuis 2020.

1. Calculer $P(0)$. Interpréter ce résultat. (1 pt)
2. Calculer $P(10)$ (arrondir à l'unité). (1 pt)
3. Déterminer t tel que $P(t) = 100\,000$. (1 pt)
4. Déterminer à partir de quelle année la population dépasse 75 000 habitants. (1 pt)

Corrigé — Évaluation B — Fonction exponentielle**Exercice 1 — 5 points**

Question 1. $f(x) = e^{3x+2}$. On pose $u(x) = 3x + 2$, d'où $u'(x) = 3$.

Par la formule de dérivation de e^u :

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = 3 e^{3x+2}.$$

Question 2. En utilisant la propriété $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$:

$$\frac{e^{3x+2}}{e^{x+2}} = e^{(3x+2)-(x+2)} = e^{2x}.$$

Question 3. $f(0) = e^{3 \times 0 + 2} = e^2 \approx 7,389$.

$$f\left(-\frac{2}{3}\right) = e^{3 \times (-\frac{2}{3}) + 2} = e^{-2+2} = e^0 = 1.$$

Interprétation : $f\left(-\frac{2}{3}\right) = 1$ signifie que le point de coordonnées $\left(-\frac{2}{3}; 1\right)$ appartient à la courbe de f . C'est le point où la courbe coupe la droite $y = 1$.

Question 4. On a $f'(x) = 3 e^{3x+2}$ (question 1) et $3f(x) = 3 e^{3x+2}$.

Donc $f'(x) = 3f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: f est bien solution de $y' = 3y$.

Exercice 2 — 6 points

Question 1. $g(x) = (x+1)e^{-x}$. C'est un produit $u \cdot v$ avec $u(x) = x+1$ et $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$g'(x) = u'v + uv' = 1 \cdot e^{-x} + (x+1) \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - (x+1)) = -xe^{-x}.$$

Question 2. $g'(x) = -xe^{-x}$.

Or $e^{-x} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc le signe de $g'(x)$ est celui de $-x$:

- ▶ $g'(x) > 0$ si $x < 0$: g est strictement croissante sur $] -\infty ; 0]$;
- ▶ $g'(x) = 0$ si $x = 0$;
- ▶ $g'(x) < 0$ si $x > 0$: g est strictement décroissante sur $[0 ; +\infty [$.

$$g(0) = (0+1)e^0 = 1.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$		$+$	$-$
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow 1 \searrow$	0

Question 3. D'après le tableau de variations, g admet un **maximum** de 1 atteint en $x = 0$.

Question 4.

- ▶ En $+\infty$: on utilise le résultat du cours $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (la décroissance exponentielle l'emporte).
Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) e^{-x} = 0$.
- ▶ En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. En posant $X = e^x$, on a $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$, donc :

$$h(x) = X^2 - 3X + 2.$$

Question 2. On résout $X^2 - 3X + 2 = 0$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0.$$

$$X_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{3+1}{2} = 2.$$

Question 3. On revient à la variable x en remplaçant X par e^x :

- ▶ $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$;
- ▶ $e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$.

Les solutions de $h(x) = 0$ sont $\boxed{x = 0}$ et $\boxed{x = \ln 2}$.

Question 4. $h(x) \leq 0 \Leftrightarrow X^2 - 3X + 2 \leq 0$ avec $X = e^x > 0$.

Le trinôme $X^2 - 3X + 2 = (X-1)(X-2)$ est négatif ou nul pour $1 \leq X \leq 2$.

On traduit en x : $1 \leq e^x \leq 2$. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante :

$$\ln 1 \leq x \leq \ln 2 \quad \text{soit} \quad 0 \leq x \leq \ln 2.$$

L'ensemble des solutions est $\boxed{[0; \ln 2]}$.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $P(0) = 30\,000 e^{0,03 \times 0} = 30\,000 e^0 = 30\,000$.

Interprétation : en 2020 (année de départ, $t = 0$), la population du village est de 30 000 habitants.

Question 2. $P(10) = 30\,000 e^{0,03 \times 10} = 30\,000 e^{0,3} \approx 30\,000 \times 1,3499 \approx 40\,496$.

En 2030, la population sera d'environ **40 496** habitants.

Question 3. $P(t) = 60\,000 \Leftrightarrow 30\,000 e^{0,03t} = 60\,000 \Leftrightarrow e^{0,03t} = 2 \Leftrightarrow 0,03t = \ln 2 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 2}{0,03} = \frac{100 \ln 2}{3} \approx 23,1$.

La population atteindra 60 000 habitants environ 23,1 ans après 2020, soit au cours de l'année **2044**.

Question 4. $P(t) \geq 45\,000 \Leftrightarrow e^{0,03t} \geq \frac{45\,000}{30\,000} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 0,03t \geq \ln\left(\frac{3}{2}\right) \Leftrightarrow t \geq \frac{100}{3} \ln\left(\frac{3}{2}\right) \approx 13,5$.

La population dépassera 45 000 habitants à partir de $t = 14$ ans, soit à partir de l'année **2034**.

Évaluation B — Fonction exponentielle

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{3x+2}$.

1. Calculer $f'(x)$. (1 pt)
2. Simplifier $\frac{e^{3x+2}}{e^{x+2}}$. (1,5 pt)
3. Calculer $f(0)$ et $f\left(-\frac{2}{3}\right)$. Interpréter $f\left(-\frac{2}{3}\right)$. (1,5 pt)
4. Montrer que f est solution de l'équation différentielle $y' = 3y$. (1 pt)

Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x+1)e^{-x}$.

1. Calculer $g'(x)$. (2 pt)
2. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. (2 pt)
3. En déduire le maximum de g et la valeur de x pour laquelle il est atteint. (1 pt)
4. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et en $-\infty$. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C2, C4, C5

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = e^{2x} - 3e^x + 2$.

1. Poser $X = e^x$. Exprimer $h(x)$ en fonction de X . (1 pt)
2. Résoudre $X^2 - 3X + 2 = 0$. (1,5 pt)
3. En déduire les solutions de $h(x) = 0$. (1,5 pt)
4. Résoudre $h(x) \leq 0$. (1 pt)

Exercice 4

4 points — C5

La population d'un village est modélisée par $P(t) = 30\,000 e^{0,03t}$, où t désigne le nombre d'années écoulées depuis 2020.

1. Calculer $P(0)$. Interpréter ce résultat. (1 pt)
2. Calculer $P(10)$ (arrondir à l'unité). (1 pt)
3. Déterminer t tel que $P(t) = 60\,000$. (1 pt)
4. Déterminer à partir de quelle année la population dépasse 45 000 habitants. (1 pt)

Rappel — Derivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient

Somme : $(u+v)' = u' + v'$.

Produit : $(uv)' = u'v + uv'$.

Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ (avec $v \neq 0$).

Ces formules sont indispensables pour dériver les fonctions faisant intervenir e^x multipliée ou divisée par d'autres fonctions.

Exercice 51

Calculer la dérivée de chaque fonction.

1. $f(x) = 3x^2 + 5x - 7$
2. $g(x) = x^3 - 4x + 1$
3. $h(x) = 2x^4 + x^2 - 3x$

Coup de pouce 1. On applique la dérivée terme à terme : $(x^n)' = nx^{n-1}$ et la constante disparaît.

1SPE-EXP0-FR-R1-EX1

On dérive terme à terme :
 $(ax^n)' = anx^{n-1}$.

Corrigé

Question 1.

$$f'(x) = 3 \times 2x + 5 = 6x + 5.$$

Question 2.

$$g'(x) = 3x^2 - 4.$$

Question 3.

$$h'(x) = 2 \times 4x^3 + 2x - 3 = 8x^3 + 2x - 3.$$

1SPE-EXP0-FR-R1-EX2

8 min

Exercice 52 ♦

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la formule du produit.

1. $f(x) = x(2x + 3)$
2. $g(x) = (x + 1)(x^2 - 1)$
3. $h(x) = (3x - 2)(x + 5)$

Coup de pouce 1. Formule du produit : $(uv)' = u'v + uv'$. Identifier u et v , calculer u' et v' , puis assembler.

1SPE-EXP0-FR-R1-EX2

$(uv)' = u'v + uv'$.

Corrigé

Question 1. $u = x, v = 2x + 3$ donc $u' = 1, v' = 2$.

$$f'(x) = 1 \times (2x + 3) + x \times 2 = 2x + 3 + 2x = 4x + 3.$$

Question 2. $u = x + 1, v = x^2 - 1$ donc $u' = 1, v' = 2x$.

$$g'(x) = 1 \times (x^2 - 1) + (x + 1) \times 2x = x^2 - 1 + 2x^2 + 2x = 3x^2 + 2x - 1.$$

Question 3. $u = 3x - 2, v = x + 5$ donc $u' = 3, v' = 1$.

$$h'(x) = 3(x + 5) + (3x - 2) \times 1 = 3x + 15 + 3x - 2 = 6x + 13.$$

1SPE-EXP0-FR-R1-EX3

8 min

Exercice 53 ♦♦

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la formule du quotient.

1. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ pour $x \neq 1$
2. $g(x) = \frac{2x}{x^2+1}$
3. $h(x) = \frac{x^2-3}{x+2}$ pour $x \neq -2$

Coup de pouce 1. Formule du quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. Bien identifier u, v, u', v' avant de calculer.

1SPE-EXP0-FR-R1-EX3

$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Corrigé

Question 1. $u = x + 1, v = x - 1, u' = 1, v' = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x - 1) - (x + 1) \times 1}{(x - 1)^2} = \frac{x - 1 - x - 1}{(x - 1)^2} = \frac{-2}{(x - 1)^2}.$$

Question 2. $u = 2x, v = x^2 + 1, u' = 2, v' = 2x$.

$$g'(x) = \frac{2(x^2 + 1) - 2x \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^2 + 2 - 4x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}.$$

Question 3. $u = x^2 - 3$, $v = x + 2$, $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$h'(x) = \frac{2x(x+2) - (x^2-3)}{(x+2)^2} = \frac{2x^2 + 4x - x^2 + 3}{(x+2)^2} = \frac{x^2 + 4x + 3}{(x+2)^2}.$$

On peut factoriser : $x^2 + 4x + 3 = (x+1)(x+3)$ donc $h'(x) = \frac{(x+1)(x+3)}{(x+2)^2}$.

Rappel — Signe de la dérivée et sens de variation

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **strictement croissante** sur I .
- Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **strictement décroissante** sur I .
- Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **constante** sur I .

Pour dresser le tableau de variations de f , on étudie le signe de f' sur son domaine de définition.

Exercice 54

1SPE-EXP0-FR-R2-EX1
⌚ 6 min

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$, puis déterminer le signe de $f'(x)$.
3. En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

Coup de pouce 1. $f'(x)$ est une fonction affine. Son signe change au point où elle s'annule.

Corrigé

1SPE-EXP0-FR-R2-EX1

Question 1.

$$f'(x) = 2x - 6.$$

Question 2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

$f'(x) < 0$ pour $x < 3$ et $f'(x) > 0$ pour $x > 3$.

Question 3. $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$.

f est strictement décroissante sur $] -\infty ; 3]$ et strictement croissante sur $[3 ; +\infty[$.

Le minimum de f est -4 , atteint en $x = 3$.

f' est négative avant 3 (décroissance), positive après (croissance).

Exercice 55

1SPE-EXP0-FR-R2-EX2
⌚ 8 min

Soit $g(x) = -x^3 + 3x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$.
2. Résoudre $g'(x) = 0$, puis étudier le signe de $g'(x)$.
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.

Coup de pouce 1. $g'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x^2 - 1) = -3(x-1)(x+1)$. Utiliser un tableau de signes.

Corrigé

1SPE-EXP0-FR-R2-EX2

Question 1.

$$g'(x) = -3x^2 + 3.$$

Question 2. $g'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = -1$ ou $x = 1$.

On factorise : $g'(x) = -3(x-1)(x+1)$.

Tableau de signes :

- $g'(x) < 0$ pour $x < -1$,

- ▶ $g'(x) > 0$ pour $-1 < x < 1$,
- ▶ $g'(x) < 0$ pour $x > 1$.

$$g(-1) = 1 - 3 = -2 \text{ et } g(1) = -1 + 3 = 2.$$

Question 3. $g(-1) = -2, g(1) = 2$.

g est strictement décroissante sur $] -\infty; -1]$, strictement croissante sur $[-1; 1]$, strictement décroissante sur $[1; +\infty[$.

1SPE-EXP0-FR-R2-EX3
⌚ 8 min

Exercice 56

Soit $h(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $h'(x)$ à l'aide de la formule du quotient.
2. Étudier le signe de $h'(x)$.
3. En déduire le tableau de variations de h .

Coup de pouce 1. Le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ est toujours positif. Le signe de $h'(x)$ dépend uniquement du numérateur.

1SPE-EXP0-FR-R2-EX3

Corrigé

Question 1. $u = x, v = x^2 + 1, u' = 1, v' = 2x$.

$$h'(x) = \frac{1 \times (x^2 + 1) - x \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}.$$

Question 2. Le dénominateur $(x^2 + 1)^2 > 0$ pour tout x . Le signe de $h'(x)$ est celui de $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$.

$h'(x) > 0$ pour $-1 < x < 1$ et $h'(x) < 0$ pour $x < -1$ ou $x > 1$.

$$h(-1) = -1/2 \text{ et } h(1) = 1/2.$$

Question 3. $h(-1) = -\frac{1}{2}, h(1) = \frac{1}{2}$.

h est strictement décroissante sur $] -\infty; -1]$, strictement croissante sur $[-1; 1]$, strictement décroissante sur $[1; +\infty[$.

Rappel — Résolution d'équations et d'inéquations du second degré

Soit $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$. On calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- ▶ Si $\Delta > 0$: deux solutions $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- ▶ Si $\Delta = 0$: une solution double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- ▶ Si $\Delta < 0$: pas de solution réelle.

Pour les inéquations : utiliser le signe du trinôme (même signe que a à l'extérieur des racines, signe opposé entre les racines).

1SPE-EXP0-FR-R3-EX1
⌚ 6 min

Exercice 57

Résoudre chaque équation dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $2x^2 + 3x - 2 = 0$
3. $x^2 + 4x + 5 = 0$

Coup de pouce 1. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$, utiliser la formule des racines. Si $\Delta < 0$, conclure directement.

Corrigé

Question 1. $a = 1, b = -5, c = 6. \Delta = 25 - 24 = 1 > 0$.

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3.$$

1SPE-EXP0-FR-R3-EX1

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Solutions : $\{2; 3\}$.

Question 2. $a = 2, b = 3, c = -2. \Delta = 9 + 16 = 25 > 0$.

$$x_1 = \frac{-3-5}{4} = -2, \quad x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2}.$$

Solutions : $\{-2; \frac{1}{2}\}$.

Question 3. $a = 1, b = 4, c = 5. \Delta = 16 - 20 = -4 < 0$. Pas de solution réelle.

Exercice 58

Resoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 4 \geq 0$
2. $-x^2 + 2x + 3 > 0$
3. $x^2 + 2x + 1 \leq 0$

1SPE-EXP0-FR-R3-EX2
⌚ 8 min

Coup de pouce 1. Pour chaque inéquation, trouver d'abord les racines du trinôme, puis utiliser la règle du signe (même signe que a à l'extérieur des racines).

Corrigé

1SPE-EXP0-FR-R3-EX2

Question 1. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Racines : $x = -2$ et $x = 2$.

Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

Solution : $x \in] -\infty; -2] \cup [2; +\infty[$.

Question 2. $-x^2 + 2x + 3 = 0. \Delta = 4 + 12 = 16$. Racines : $x = -1$ et $x = 3$.

Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est **positif entre les racines**.

Solution : $x \in] -1; 3[$.

Question 3. $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$. C'est un carré, toujours ≥ 0 .

$(x + 1)^2 \leq 0$ si et seulement si $(x + 1)^2 = 0$, c'est-à-dire $x = -1$.

Solution : $\{-1\}$.

Strictement positif : les bornes sont exclues.

Exercice 59

Resoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^2 - 4 = 0$ (utile pour $e^{x^2-4} = 1$)
2. $x^2 - x - 6 = 0$ (utile pour $e^{x^2-x-6} = 1$)
3. $2x^2 - 8x + 6 = 0$

1SPE-EXP0-FR-R3-EX3
⌚ 8 min

Coup de pouce 1. Pour la question 1 : $x^2 = 4$ donne $x = 2$ ou $x = -2$. Ne pas oublier la racine négative !

Corrigé

1SPE-EXP0-FR-R3-EX3

Question 1. $x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2$ ou $x = 2$.

Solutions : $\{-2; 2\}$.

Question 2. $\Delta = 1 + 24 = 25. x_1 = \frac{1-5}{2} = -2, x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$.

Solutions : $\{-2; 3\}$.

Question 3. On simplifie par 2 : $x^2 - 4x + 3 = 0. \Delta = 16 - 12 = 4$.

$x_1 = \frac{4-2}{2} = 1, x_2 = \frac{4+2}{2} = 3$.

Solutions : $\{1; 3\}$.

Rappel — Puissances entieres et regles de calcul

Pour tout reel $a \neq 0$ et tous entiers relatifs m, n :

- ▶ $a^m \times a^n = a^{m+n}$ (produit de puissances de meme base)
- ▶ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ (quotient de puissances de meme base)
- ▶ $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (puissance d'une puissance)
- ▶ $a^0 = 1$ et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Ces regles sont exactement celles que l'on retrouve pour les exposants de l'exponentielle : $e^a \times e^b = e^{a+b}$, $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$, $(e^a)^n = e^{na}$.

1SPE-EXP0-FR-R4-EX1
⌚ 5 min

Exercice 60

Simplifier en utilisant les regles des puissances.

1. $2^3 \times 2^5$
2. $\frac{5^7}{5^3}$
3. $(3^2)^4$
4. 7^0

Coup de pouce 1. Produit : on additionne les exposants. Quotient : on soustrait. Puissance de puissance : on multiplie.

1SPE-EXP0-FR-R4-EX1

Corrigé

Question 1. $2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} = 2^8 = 256$.

Question 2. $\frac{5^7}{5^3} = 5^{7-3} = 5^4 = 625$.

Question 3. $(3^2)^4 = 3^{2 \times 4} = 3^8 = 6561$.

Question 4. $7^0 = 1$ (par convention pour tout reel non nul).

1SPE-EXP0-FR-R4-EX2
⌚ 6 min

Exercice 61

Ecrire sous la forme a^n (une seule puissance).

1. $\frac{10^5 \times 10^3}{10^2}$
2. $\left(\frac{2^3}{2}\right)^2$
3. $3^{-2} \times 3^5 \times 3^{-1}$

Coup de pouce 1. Traiter etape par etape : d'abord le numerateur, puis le quotient, puis la puissance exterieure s'il y en a une.

1SPE-EXP0-FR-R4-EX2

Corrigé

Question 1.

$$\frac{10^5 \times 10^3}{10^2} = \frac{10^{5+3}}{10^2} = \frac{10^8}{10^2} = 10^{8-2} = 10^6.$$

Question 2.

$$\left(\frac{2^3}{2}\right)^2 = (2^{3-1})^2 = (2^2)^2 = 2^{2 \times 2} = 2^4 = 16.$$

Question 3.

$$3^{-2} \times 3^5 \times 3^{-1} = 3^{-2+5+(-1)} = 3^2 = 9.$$

Exercice 62



1SPE-EXP0-FR-R4-EX3

6 min

Par analogie avec les puissances, simplifier les expressions suivantes (écrire sous la forme e^k).

- $e^2 \times e^3 \times e^{-1}$
- $\frac{(e^3)^2}{e^4}$
- $\frac{e^5 \times e^{-2}}{(e^2)^3}$

Coup de pouce 1. Les règles sont les mêmes : $e^a \times e^b = e^{a+b}$, $(e^a)^n = e^{na}$, $e^a / e^b = e^{a-b}$.

Corrigé

1SPE-EXP0-FR-R4-EX3

Question 1.

$$e^2 \times e^3 \times e^{-1} = e^{2+3+(-1)} = e^4.$$

Question 2.

$$\frac{(e^3)^2}{e^4} = \frac{e^6}{e^4} = e^{6-4} = e^2.$$

Question 3.

$$\frac{e^5 \times e^{-2}}{(e^2)^3} = \frac{e^{5+(-2)}}{e^6} = \frac{e^3}{e^6} = e^{3-6} = e^{-3}.$$

On additionne les exposants pour le produit, on multiplie pour la puissance.

Rappel — Suites géométriques et coefficient multiplicateur

Une suite (u_n) est **géométrique** de raison q si pour tout n : $u_{n+1} = q \times u_n$.

Formule explicite : $u_n = u_0 \times q^n$.

Lien avec l'exponentielle : la suite $u_n = u_0 \times e^{rn}$ est géométrique de raison $q = e^r$, car $u_{n+1} = u_0 \times e^{r(n+1)} = e^r \times u_n$.

Le coefficient multiplicateur d'une augmentation de $t\%$ est $q = 1 + \frac{t}{100}$.

Exercice 63



1SPE-EXP0-FR-R5-EX1

5 min

Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 2$.

- Calculer u_1, u_2, u_3 .
- Donner la formule explicite de u_n .
- Calculer u_{10} .

Coup de pouce 1. $u_{n+1} = q \times u_n$. Formule explicite : $u_n = u_0 \times q^n$.

Corrigé

1SPE-EXP0-FR-R5-EX1

Question 1. $u_1 = 5 \times 2 = 10$, $u_2 = 10 \times 2 = 20$, $u_3 = 20 \times 2 = 40$.

Question 2. $u_n = 5 \times 2^n$.

Question 3. $u_{10} = 5 \times 2^{10} = 5 \times 1024 = 5120$.

Exercice 64



1SPE-EXP0-FR-R5-EX2

6 min

Un capital de 1 000 euros est placé à un taux annuel de 3%. On note C_n le capital au bout de n années.

- Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
- Exprimer C_n en fonction de n .
- Calculer C_5 (arrondir au centime).

Coup de pouce 1. Coefficient multiplicateur pour une augmentation de $t\%$: $q = 1 + t/100$. Ici $t = 3$.

1SPE-EXP0-FR-R5-EX2

Corrigé

Question 1. Le coefficient multiplicateur est $q = 1 + \frac{3}{100} = 1,03$.

Question 2. (C_n) est geometrique de raison 1,03 et $C_0 = 1000$.

$$C_n = 1000 \times 1,03^n.$$

Question 3. $C_5 = 1000 \times 1,03^5 \approx 1000 \times 1,15927 \approx 1159,27$ euros.

1SPE-EXP0-FR-R5-EX3

⌚ 6 min

Exercice 65 ◆◆

Une population de bacteries est modelisee par $P_n = 500 \times (1,5)^n$ ou n est le nombre d'heures.

1. Justifier que (P_n) est une suite geometrique. Donner sa raison.
2. Calculer P_0, P_1, P_2 et P_3 .
3. A partir de quel rang n a-t-on $P_n > 5000$? (on pourra tester quelques valeurs)

Coup de pouce 1. $P_{n+1}/P_n = (1,5)^{n+1}/(1,5)^n = 1,5$: le quotient est constant.

1SPE-EXP0-FR-R5-EX3

Corrigé

Question 1. $P_{n+1} = 500 \times (1,5)^{n+1} = 1,5 \times 500 \times (1,5)^n = 1,5 \times P_n$.

Le quotient $P_{n+1}/P_n = 1,5$ est constant : (P_n) est geometrique de raison $q = 1,5$.

Question 2. $P_0 = 500, P_1 = 750, P_2 = 1125, P_3 = 1687,5$.

Question 3. On calcule : $P_4 = 2531,25, P_5 \approx 3796,9, P_6 \approx 5695,3$.

$P_5 \approx 3797 < 5000$ et $P_6 \approx 5695 > 5000$.

A partir du rang $n = 6$, on a $P_n > 5000$.

On teste les valeurs successives jusqu'à dépasser 5000.

1SPE-EXP0-RE-C1-EX1

⌚ 6 min

Exercice 66 ◆

On considere la fonction exponentielle, notee exp ou $x \mapsto e^x$.

1. Enoncer la propriete qui caracterise la fonction exponentielle (equation differentielle et condition initiale).
2. En deduire la valeur de $\exp'(0)$.
3. Justifier que $e^0 = 1$.

1SPE-EXP0-RE-C1-EX1

Corrigé

Question 1. La fonction exponentielle est l'unique fonction f derivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$f'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

Question 2. Comme $f'(x) = f(x)$ pour tout x , en particulier pour $x = 0$:

$$\exp'(0) = \exp(0) = 1.$$

Question 3. C'est la condition initiale de la definition : $f(0) = 1$, donc $e^0 = 1$.

La definition de l'exponentielle repose sur deux conditions.

1SPE-EXP0-RE-C1-EX2

⌚ 6 min

Exercice 67 ◆

Justifier chacune des affirmations suivantes.

1. $e^x > 0$ pour tout reel x .
2. $e^x \neq 0$ pour tout reel x .
3. Pour $x < 0$, e^x est compris entre 0 et 1.

Coup de pouce 1. Pour la question 3, utiliser que $e^0 = 1$ et que l'exponentielle est strictement croissante : si $x < 0$ alors $e^x < e^0 = 1$.

Corrigé

1SPE-EXP0-RE-C1-EX2

Question 1. La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$. C'est une propriété fondamentale qui découle du fait que $\exp$ ne s'annule jamais et que $\exp(0) = 1 > 0$.

Question 2. C'est une conséquence directe de la stricte positivité : $e^x > 0$ implique $e^x \neq 0$.

Question 3. Pour $x < 0$:

$x < 0 \Rightarrow e^x < e^0 = 1$ car $\exp$ est croissante.

- ▶ $e^x > 0$ (stricte positivité),
- ▶ $x < 0 =$ exposant de e^0 , et comme $\exp$ est strictement croissante, $e^x < e^0 = 1$.

Donc $0 < e^x < 1$.

Exercice 68



1SPE-EXP0-RE-C1-EX3
⌚ 8 min

Parmi les affirmations suivantes, indiquer si elles sont vraies ou fausses et justifier.

1. e^{-3} est un nombre négatif.
2. Il existe un réel x tel que $e^x = 0$.
3. La tangente à la courbe de $\exp$ au point d'abscisse 0 a pour équation $y = x + 1$.
4. $e^1 \approx 2,718$.

Corrigé

1SPE-EXP0-RE-C1-EX3

Question 1. Faux. $e^{-3} > 0$ (l'exponentielle est toujours strictement positive). On a $e^{-3} = \frac{1}{e^3} \approx 0,05$.

Question 2. Faux. L'exponentielle ne s'annule jamais : $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Question 3. Vrai. La tangente en $x = 0$ a pour équation :

$$y = \exp'(0)(x - 0) + \exp(0) = 1 \times x + 1 = x + 1.$$

Tangente :
 $y = f'(a)(x - a) + f(a)$
avec $a = 0$, $f'(0) = 1$,
 $f(0) = 1$.

Question 4. Vrai. $e = e^1 \approx 2,71828\dots$, que l'on arrondit à 2,718.

Exercice 69



1SPE-EXP0-RE-C2-EX1
⌚ 6 min

Simplifier chaque expression sous la forme e^k ou k est un entier.

1. $e^4 \times e^{-1}$
2. $\frac{e^9}{e^5}$
3. $(e^{-2})^3$
4. $e^3 \times e^{-3}$

Corrigé

1SPE-EXP0-RE-C2-EX1

Question 1. $e^4 \times e^{-1} = e^{4+(-1)} = e^3$.

Question 2. $\frac{e^9}{e^5} = e^{9-5} = e^4$.

Question 3. $(e^{-2})^3 = e^{(-2) \times 3} = e^{-6}$.

Question 4. $e^3 \times e^{-3} = e^{3+(-3)} = e^0 = 1$.

Règle : $e^a \times e^b = e^{a+b}$.

Règle : $e^a / e^b = e^{a-b}$.

Règle : $(e^a)^n = e^{na}$.

Exercice 70



1SPE-EXP0-RE-C2-EX2
⌚ 8 min

Simplifier les expressions suivantes (les exposants sont des expressions en x).

1. $e^{x+1} \times e^{x-1}$

2. $\frac{e^{3x}}{e^x}$
3. $(e^x)^2 \times e^{-2x}$
4. $\frac{e^{2x} \times e^{-x}}{e^{x+3}}$

Coup de pouce 1. Appliquer les memes regles que pour les nombres : additionner les exposants pour un produit, soustraire pour un quotient. Simplifier l'expression algebrique obtenue.

1SPE-EXP0-RE-C2-EX2

Corrigé

Question 1.

$$e^{x+1} \times e^{x-1} = e^{(x+1)+(x-1)} = e^{2x}.$$

Question 2.

$$\frac{e^{3x}}{e^x} = e^{3x-x} = e^{2x}.$$

Question 3.

$$(e^x)^2 \times e^{-2x} = e^{2x} \times e^{-2x} = e^{2x-2x} = e^0 = 1.$$

Question 4.

$$\frac{e^{2x} \times e^{-x}}{e^{x+3}} = \frac{e^{2x-x}}{e^{x+3}} = \frac{e^x}{e^{x+3}} = e^{x-(x+3)} = e^{-3}.$$

1SPE-EXP0-RE-C2-EX3

8 min

Exercice 71 ♦♦

Ecrire sous la forme $A \times e^{f(x)}$ la plus simple possible.

1. $3e^{2x} \times 2e^x$
2. $\frac{4e^{5x}}{2e^{2x}}$
3. $(2e^x)^3$

1SPE-EXP0-RE-C2-EX3

On separe les coefficients numeriques et les exponentielles.

Corrigé

Question 1.

$$3e^{2x} \times 2e^x = (3 \times 2) \times e^{2x+x} = 6e^{3x}.$$

Question 2.

$$\frac{4e^{5x}}{2e^{2x}} = \frac{4}{2} \times e^{5x-2x} = 2e^{3x}.$$

Question 3.

$$(2e^x)^3 = 2^3 \times (e^x)^3 = 8e^{3x}.$$

1SPE-EXP0-RE-C3-EX1

6 min

Exercice 72 ♦

1. Justifier que la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Donner $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$.
3. La droite $y = 0$ est-elle asymptote a la courbe de exp ? Si oui, en $+\infty$ ou en $-\infty$?

1SPE-EXP0-RE-C3-EX1

Corrigé

$\exp'(x) = \exp(x) > 0$ pour tout x .

Question 1. La derivee de exp est $\exp'(x) = \exp(x)$. Or $\exp(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Question 2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Question 3. Oui, la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à la courbe en $-\infty$, car $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 73 ◆

1SPE-EXP0-RE-C3-EX2
⌚ 6 min

Comparer sans calculatrice les nombres suivants, en utilisant la croissance de l'exponentielle.

1. e^3 et e^π
2. e^{-1} et e^{-2}
3. $e^{\sqrt{5}}$ et $e^{2,3}$

Coup de pouce 1. La fonction $\exp$ est strictement croissante : si $a < b$ alors $e^a < e^b$. Il suffit de comparer les exposants.

Corrigé

1SPE-EXP0-RE-C3-EX2

Question 1. On sait que $3 < \pi$ (car $\pi \approx 3,14$). Par croissance de $\exp$:

$$e^3 < e^\pi.$$

Question 2. $-2 < -1$, donc par croissance de $\exp$:

$$e^{-2} < e^{-1}.$$

Question 3. $\sqrt{5} \approx 2,236$ et $2,3 > 2,236$, donc $\sqrt{5} < 2,3$.

Par croissance de $\exp$: $e^{\sqrt{5}} < e^{2,3}$.

Si $a < b$, alors $e^a < e^b$
(croissance stricte).

Exercice 74 ◆◆

1SPE-EXP0-RE-C3-EX3
⌚ 8 min

Soit $f(x) = e^x - x - 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f(0)$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = 0$ pour $x = 0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de f .
4. En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1$.

Corrigé

1SPE-EXP0-RE-C3-EX3

Question 1. $f(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 0 - 1 = 0$.

Question 2. $f'(x) = e^x - 1$. En $x = 0$: $f'(0) = e^0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

Question 3.

- ▶ $f'(x) < 0$ pour $x < 0$ (car $e^x < 1$),
- ▶ $f'(0) = 0$,
- ▶ $f'(x) > 0$ pour $x > 0$ (car $e^x > 1$).

f est strictement décroissante sur $] -\infty ; 0]$ et strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

Le minimum de f est $f(0) = 0$, atteint en $x = 0$.

Question 4. Comme $f(x) \geq f(0) = 0$ pour tout x , on a :

$$e^x - x - 1 \geq 0 \quad \text{soit} \quad e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

$e^x - 1 < 0 \Leftrightarrow e^x < 1 \Leftrightarrow x < 0$.

Exercice 75 ◆

1SPE-EXP0-RE-C4-EX1
⌚ 6 min

Calculer la dérivée de chaque fonction.

1. $f(x) = e^{5x}$

2. $g(x) = e^{-2x+3}$

3. $h(x) = e^{x^2-1}$

1SPE-EXP0-RE-C4-EX1

Formule : $(e^u)' = u' \times e^u$.

Corrigé

Question 1. $u(x) = 5x, u'(x) = 5$.

$$f'(x) = 5e^{5x}.$$

Question 2. $u(x) = -2x + 3, u'(x) = -2$.

$$g'(x) = -2e^{-2x+3}.$$

Question 3. $u(x) = x^2 - 1, u'(x) = 2x$.

$$h'(x) = 2xe^{x^2-1}.$$

1SPE-EXP0-RE-C4-EX2

8 min

Exercice 76 ♦♦

Calculer la dérivée de chaque fonction (produit avec exponentielle).

1. $f(x) = (2x + 1)e^x$

2. $g(x) = x^2 e^{-x}$

3. $h(x) = (x - 3)e^{2x}$

Coup de pouce 1. Utiliser la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$. Par exemple pour $f: u = 2x + 1, v = e^x, u' = 2, v' = e^x$.

1SPE-EXP0-RE-C4-EX2

$(uv)' = u'v + uv'$.

Corrigé

Question 1. $u = 2x + 1, v = e^x, u' = 2, v' = e^x$.

$$f'(x) = 2e^x + (2x + 1)e^x = (2 + 2x + 1)e^x = (2x + 3)e^x.$$

Question 2. $u = x^2, v = e^{-x}, u' = 2x, v' = -e^{-x}$.

$$g'(x) = 2xe^{-x} + x^2 \times (-e^{-x}) = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}.$$

Question 3. $u = x - 3, v = e^{2x}, u' = 1, v' = 2e^{2x}$.

$$h'(x) = 1 \times e^{2x} + (x - 3) \times 2e^{2x} = (1 + 2x - 6)e^{2x} = (2x - 5)e^{2x}.$$

1SPE-EXP0-RE-C4-EX3

10 min

Exercice 77 ♦♦

Soit $f(x) = (x^2 - 4)e^x$.

1. Calculer $f'(x)$ et la factoriser.

2. Résoudre $f'(x) = 0$.

3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

1SPE-EXP0-RE-C4-EX3

Corrigé

Question 1. $u = x^2 - 4, v = e^x, u' = 2x, v' = e^x$.

$$f'(x) = 2xe^x + (x^2 - 4)e^x = (x^2 + 2x - 4)e^x.$$

Question 2. Comme $e^x > 0, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 4 = 0$.

$$\Delta = 4 + 16 = 20, \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}.$$

$$x_1 = \frac{-2 - 2\sqrt{5}}{2} = -1 - \sqrt{5} \approx -3,24, \quad x_2 = -1 + \sqrt{5} \approx 1,24.$$

Question 3. Le trinôme $x^2 + 2x - 4$ (avec $a = 1 > 0$) est :

$e^x > 0$ pour tout x , donc le signe de f' est celui de $x^2 + 2x - 4$.

- ▶ positif pour $x < -1 - \sqrt{5}$,
- ▶ négatif pour $-1 - \sqrt{5} < x < -1 + \sqrt{5}$,
- ▶ positif pour $x > -1 + \sqrt{5}$.

f est strictement croissante sur $] -\infty; -1 - \sqrt{5}]$, strictement décroissante sur $[-1 - \sqrt{5}; -1 + \sqrt{5}]$, et strictement croissante sur $[-1 + \sqrt{5}; +\infty[$.

Exercice 78

Resoudre dans $\mathbb{R}$ les equations suivantes.

1. $e^x = e^3$
2. $e^{2x-1} = e^{x+4}$
3. $e^{x^2} = e^9$

1SPE-EXP0-RE-C5-EX1
⌚ 6 min

Corrigé

Question 1. $e^x = e^3 \Leftrightarrow x = 3$.

Solution : $\{3\}$.

Question 2. $e^{2x-1} = e^{x+4} \Leftrightarrow 2x - 1 = x + 4 \Leftrightarrow x = 5$.

Solution : $\{5\}$.

Question 3. $e^{x^2} = e^9 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = -3$ ou $x = 3$.

Solution : $\{-3; 3\}$.

1SPE-EXP0-RE-C5-EX1

L'exponentielle est
injective :
 $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$.

Exercice 79

Resoudre dans $\mathbb{R}$ les inequations suivantes.

1. $e^x \geq e^2$
2. $e^{3x+1} < e^{-2}$
3. $e^x \leq 1$

1SPE-EXP0-RE-C5-EX2
⌚ 8 min

Coup de pouce 1. L'exponentielle est strictement croissante, donc elle **conserve le sens** des inegalites : $e^a \geq e^b \Leftrightarrow a \geq b$. Pour la question 3, ecrire $1 = e^0$.

Corrigé

Question 1. $e^x \geq e^2 \Leftrightarrow x \geq 2$ (croissance de exp).

Solution : $[2; +\infty[$.

Question 2. $e^{3x+1} < e^{-2} \Leftrightarrow 3x + 1 < -2 \Leftrightarrow 3x < -3 \Leftrightarrow x < -1$.

Solution : $] -\infty; -1[$.

Question 3. $e^x \leq 1 = e^0 \Leftrightarrow x \leq 0$.

Solution : $] -\infty; 0]$.

1SPE-EXP0-RE-C5-EX2

exp croissante : elle
conserve le sens des
inegalites.

Exercice 80

Resoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{x^2-5x+6} = 1$
2. $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$ (poser $X = e^x$)
3. $e^{2x+1} > e^{x^2}$

1SPE-EXP0-RE-C5-EX3
⌚ 10 min

Corrigé

Question 1. $e^{x^2-5x+6} = 1 = e^0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$.

1SPE-EXP0-RE-C5-EX3

$$\Delta = 25 - 24 = 1. \text{ Racines : } x = 2 \text{ et } x = 3.$$

Solution : $\{2; 3\}$.

On pose $X = e^x > 0$.
Alors $e^{2x} = X^2$.

Question 2. On pose $X = e^x$ (avec $X > 0$). L'équation devient :

$$X^2 - 5X + 6 = 0 \Leftrightarrow (X - 2)(X - 3) = 0.$$

Donc $X = 2$ ou $X = 3$, c'est-à-dire $e^x = 2$ ou $e^x = 3$.

Les deux valeurs sont strictement positives, donc les solutions existent.

Solutions : $x = \ln 2$ ou $x = \ln 3$.

Question 3. $e^{2x+1} > e^{x^2} \Leftrightarrow 2x + 1 > x^2$ (croissance de $\exp$).

$$-x^2 + 2x + 1 > 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 < 0.$$

$$\Delta = 4 + 4 = 8. \text{ Racines : } x = 1 - \sqrt{2} \text{ et } x = 1 + \sqrt{2}.$$

Comme $a = 1 > 0$ pour $x^2 - 2x - 1$, le trinôme est négatif entre les racines.

Solution : $x \in]1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}[$.

1SPE-EXP0-EX-001

Corrigé

1. La fonction exponentielle a pour dérivée elle-même, donc :

$$f'(x) = e^x.$$

On constate que $f'(x) = f(x)$ pour tout réel x .

2. Pour tout réel x , on a $f'(x) = e^x = f(x)$. La fonction f vérifie donc l'équation $f' = f$.
3. On calcule :

$$f(0) = e^0 = 1.$$

4. D'après le cours, la fonction exponentielle est l'**unique** fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. La fonction $x \mapsto e^x$ vérifie ces deux conditions, c'est donc bien cette unique fonction.
5. $\exp(1) = e \approx 2,718$. Ce nombre est noté e et s'appelle le **nombre d'Euler**.

1SPE-EXP0-EX-002

Corrigé

1. On dérive : $g'(x) = 2e^x$.
2. On a $g'(x) = 2e^x = g(x)$ pour tout réel x . Donc g vérifie bien l'équation $y' = y$.
3. On calcule $g(0) = 2e^0 = 2 \times 1 = 2$. La condition $y(0) = 1$ n'est **pas** vérifiée car $g(0) = 2 \neq 1$.
4. La fonction exponentielle est l'unique fonction vérifiant **simultanément** $y' = y$ et $y(0) = 1$. La fonction g vérifie $g' = g$ mais pas $g(0) = 1$. Elle ne peut donc pas être la fonction exponentielle. C'est un multiple de l'exponentielle, mais pas l'exponentielle elle-même.

1SPE-EXP0-EX-003

Corrigé

1. $\exp(0) = e^0 = 1$.
2. La fonction exponentielle ne peut **jamais** s'annuler. En effet, par définition, pour tout réel x , $e^x > 0$. Aucune valeur de x ne peut donc donner $e^x = 0$.
3. Pour tout réel x , $e^x > 0$.
La fonction exponentielle est **strictement positive** sur $\mathbb{R}$ tout entier.
4. Puisque $e^x > 0$ pour tout réel x , il n'existe aucun réel x tel que $e^x = 0$.
L'équation $e^x = 0$ n'a **aucune solution** dans $\mathbb{R}$.

1SPE-EXP0-EX-004

Corrigé

1. **Vrai.** Par définition de la fonction exponentielle, $\exp(0) = 1$. C'est la condition initiale $y(0) = 1$.
2. **Vrai.** La fonction exponentielle est l'unique fonction vérifiant $y' = y$ et $y(0) = 1$. En particulier, $\exp'(x) = \exp(x)$ pour tout réel x .
3. **Vrai, mais imprécis.** L'affirmation $e^x \geq 0$ est vraie, mais on peut être plus précis : pour tout réel x , $e^x > 0$ (**strictement** positif). L'exponentielle ne s'annule jamais.
4. **Vrai.** $\exp(1) = e^1 = e \approx 2,718$. Le nombre e est défini comme l'image de 1 par la fonction exponentielle.
5. **Faux.** Pour tout réel x , $e^x > 0$. La fonction exponentielle est strictement positive, elle ne s'annule jamais. L'équation $e^x = 0$ n'a aucune solution.

Corrigé

1SPE-EXPO-EX-005

1. La fonction g est un produit $g(x) = f(x) \cdot e^{-x}$. Par la formule $(uv)' = u'v + uv'$:

$$g'(x) = f'(x) \cdot e^{-x} + f(x) \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}(f'(x) - f(x)).$$

2. Puisque $f'(x) = f(x)$, on obtient :

$$g'(x) = e^{-x}(f(x) - f(x)) = e^{-x} \times 0 = 0.$$

Donc $g'(x) = 0$ pour tout réel x .

3. Une fonction dont la dérivée est nulle sur $\mathbb{R}$ est constante sur $\mathbb{R}$. Donc il existe une constante C telle que $g(x) = C$ pour tout réel x .
4. En évaluant en $x = 0$: $g(0) = f(0) \cdot e^0 = f(0) \cdot 1 = f(0)$.
Donc $C = f(0)$ et pour tout réel x :

$$f(x) \cdot e^{-x} = f(0), \quad \text{soit} \quad f(x) = f(0) \cdot e^x.$$

5. Si $f(0) \neq 0$, alors $f(x) = f(0) \cdot e^x$. Comme $e^x > 0$ pour tout réel x et $f(0) \neq 0$, le produit $f(0) \cdot e^x$ n'est jamais nul : f ne s'annule jamais.
Si $f(0) = 0$, alors $f(x) = 0 \cdot e^x = 0$ pour tout réel x : f est la fonction nulle.

Corrigé

1SPE-EXPO-EX-006

1. Par définition de la fonction exponentielle :

$$\exp(0) = 1 \quad \text{et} \quad \exp'(0) = \exp(0) = 1.$$

2. L'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse $a = 0$ est :

$$y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + 1 \cdot x.$$

Donc l'équation de T est $y = x + 1$.

3. Pour $x = 0$: $y = 0 + 1 = 1 \neq 0$. La tangente ne passe **pas** par l'origine $O(0;0)$. Elle passe par le point $(0;1)$, qui est le point de tangence.
Remarque : la tangente coupe l'axe des abscisses en $x = -1$ (car $x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$).
4. Posons $h(x) = e^x - (x + 1)$. On a $h(0) = 1 - 1 = 0$ et $h'(x) = e^x - 1$.
 $h'(0) = 0$ et $h''(x) = e^x > 0$ pour tout réel x .
Donc h' est strictement croissante. Comme $h'(0) = 0$, on a $h'(x) < 0$ pour $x < 0$ et $h'(x) > 0$ pour $x > 0$. Ainsi h admet un minimum en $x = 0$ avec $h(0) = 0$.
Donc $h(x) \geq 0$ pour tout réel x , c'est-à-dire $e^x \geq x + 1$. La courbe $\mathcal{C}$ est **au-dessus** de la tangente T .

Corrigé

1SPE-EXPO-EX-007

1. On dérive :

$$h'(x) = 3e^x.$$

2. On compare $h'(x)$ et $h(x)$:

$$h'(x) = 3e^x \quad \text{et} \quad h(x) = 3e^x - 2.$$

Comme $h'(x) \neq h(x)$ (ils diffèrent de 2), h n'est **pas** solution de $y' = y$.

3. On calcule :

$$h'(x) - h(x) = 3e^x - (3e^x - 2) = 2.$$

Donc $h'(x) = h(x) + 2$, c'est-à-dire que h est solution de l'équation différentielle $y' = y + 2$.

4. $h(0) = 3e^0 - 2 = 3 \times 1 - 2 = 1$. La condition $h(0) = 1$ est bien vérifiée.
5. Bien que $h(0) = 1$, la fonction h ne vérifie pas l'équation $y' = y$. Elle vérifie $y' = y + 2$, qui est une équation différentielle **différente**. La fonction exponentielle est l'unique solution de $y' = y$ avec $y(0) = 1$. Les **deux** conditions sont nécessaires : il faut $y' = y$ (pas $y' = y + 2$) et $y(0) = 1$.

1SPE-EXP0-EX-008

Corrigé

1. Pour tout réel x , $\exp'(x) = \exp(x) > 0$ (la fonction exponentielle est strictement positive).
Une fonction dont la dérivée est strictement positive sur $\mathbb{R}$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
2. a) Soit $x > 0$. Comme $\exp$ est strictement croissante et $x > 0$, on a :

$$\exp(x) > \exp(0) = 1.$$

Donc $e^x > 1$ pour tout $x > 0$.

- b) Soit $x < 0$. Comme $\exp$ est strictement croissante et $x < 0$, on a :

$$\exp(x) < \exp(0) = 1.$$

Donc $e^x < 1$ pour tout $x < 0$.

3. Pour tout $x < 0$, on sait que $e^x > 0$ (l'exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$) et $e^x < 1$ (d'après la question 2b). Donc :

$$0 < e^x < 1 \quad \text{pour tout } x < 0.$$

4. Tableau de signes de $e^x - 1$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$e^x - 1$	$-$	0	$+$

$$e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

1SPE-EXP0-EX-009

Corrigé

1. La fonction $g(x) = \frac{f(x)}{\exp(x)}$ est définie à condition que $\exp(x) \neq 0$. Or, pour tout réel x , $\exp(x) > 0$, donc $\exp(x) \neq 0$. La fonction g est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Par la formule du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u = f$ et $v = \exp$:

$$g'(x) = \frac{f'(x) \cdot \exp(x) - f(x) \cdot \exp'(x)}{[\exp(x)]^2}.$$

3. On utilise les hypothèses : $f'(x) = f(x)$ et $\exp'(x) = \exp(x)$. On remplace dans le numérateur :

$$f'(x) \cdot \exp(x) - f(x) \cdot \exp'(x) = f(x) \cdot \exp(x) - f(x) \cdot \exp(x) = 0.$$

Donc :

$$g'(x) = \frac{0}{[\exp(x)]^2} = 0 \quad \text{pour tout réel } x.$$

4. Une fonction dont la dérivée est nulle sur $\mathbb{R}$ est constante sur $\mathbb{R}$. Il existe donc une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que $g(x) = C$ pour tout réel x .

5. On calcule $g(0)$:

$$g(0) = \frac{f(0)}{\exp(0)} = \frac{1}{1} = 1.$$

Donc $C = 1$.

6. Pour tout réel x , $g(x) = 1$, c'est-à-dire :

$$\frac{f(x)}{\exp(x)} = 1, \text{ soit } f(x) = \exp(x).$$

Toute fonction f vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$ est nécessairement égale à $\exp$. La fonction exponentielle est donc **l'unique** fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-010

1. $f(0) = 0 \cdot e^0 - e^0 + 1 = 0 - 1 + 1 = 0.$

2. On dérive en utilisant la formule du produit pour xe^x :

$$f'(x) = (xe^x)' - (e^x)' = (e^x + xe^x) - e^x = xe^x.$$

3. $f'(0) = 0 \cdot e^0 = 0.$

Le point $x = 0$ est un point critique de f .

4. On dérive $f'(x) = xe^x$ par la formule du produit :

$$f''(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x.$$

5. $f''(0) = (0+1)e^0 = 1 > 0.$

Comme $f'(0) = 0$ et $f''(0) > 0$, le point $x = 0$ est un **minimum local** de f .

6. **Signe de $f'(x) = xe^x$.** Comme $e^x > 0$ pour tout x , le signe de $f'(x)$ est celui de x :

▶ $f'(x) < 0$ si $x < 0$: f est strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$.

▶ $f'(x) > 0$ si $x > 0$: f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

Donc f admet un **minimum global** en $x = 0$, avec $f(0) = 0$.

Par conséquent, $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

7. Puisque $f(x) \geq 0$, on a $xe^x - e^x + 1 \geq 0$, soit :

$$xe^x \geq e^x - 1 \text{ pour tout réel } x.$$

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-011

On utilise les propriétés algébriques de l'exponentielle : $e^a \times e^b = e^{a+b}$, $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ et $(e^a)^n = e^{na}$.

1. $e^3 \times e^5 = e^{3+5} = e^8.$

2. $\frac{e^7}{e^2} = e^{7-2} = e^5.$

3. $(e^2)^4 = e^{2 \times 4} = e^8.$

4. $e^4 \times e^{-1} = e^{4+(-1)} = e^3.$

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-012

On applique les propriétés algébriques de l'exponentielle.

1. $e^x \times e^{2x} = e^{x+2x} = e^{3x}.$

2. $\frac{e^{3x}}{e^x} = e^{3x-x} = e^{2x}.$

3. $(e^x)^5 = e^{5x}.$

4. $e^{2x} \times e^{-x} \times e^{3x} = e^{2x+(-x)+3x} = e^{4x}.$

1SPE-EXP0-EX-013

Corrigé

On utilise les propriétés : $e^a \times e^b = e^{a+b}$ et $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$.

1. $e^{x+1} \times e^{x-1} = e^{(x+1)+(x-1)} = e^{2x}$.

2. $\frac{e^{2x+3}}{e^{x+1}} = e^{(2x+3)-(x+1)} = e^{x+2}$.

3. $\frac{(e^x)^3}{e^{2x}} = \frac{e^{3x}}{e^{2x}} = e^{3x-2x} = e^x$.

4. $e^{x+2} \times e^{-(x-2)} = e^{(x+2)+(-x+2)} = e^4$.

1SPE-EXP0-EX-014

Corrigé

1. **FAUX.** La bonne propriété est $e^{a+b} = e^a \times e^b$ (produit, pas somme).

Contre-exemple : $e^{1+1} = e^2 \approx 7,39$ alors que $e^1 + e^1 = 2e \approx 5,44$.

2. **FAUX.** La propriété $e^a \times e^b = e^{a+b}$ concerne la *somme* des exposants, pas leur produit. En général, $e^{ab} \neq e^a \times e^b$.

Contre-exemple : $e^{2 \times 3} = e^6$ alors que $e^2 \times e^3 = e^5$.

3. **VRAI.** En appliquant $e^{a+b} = e^a \times e^b$ avec $b = -x$ et $a = x$: $e^x \times e^{-x} = e^{x+(-x)} = e^0 = 1$, donc $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$.

4. **FAUX.** La bonne propriété est $(e^a)^n = e^{na}$ (produit na , pas somme $a+n$).

Contre-exemple : $(e^2)^3 = e^6$ alors que $e^{2+3} = e^5$.

1SPE-EXP0-EX-015

Corrigé

Question 1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) > 0$ donc $g(x) = \frac{\exp(x+b)}{\exp(x)}$ est bien définie. Les fonctions $x \mapsto \exp(x+b)$ et $x \mapsto \exp(x)$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$, et $\exp(x) \neq 0$, donc g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient.

Question 2. En appliquant la règle du quotient avec $u(x) = \exp(x+b)$ et $v(x) = \exp(x)$:
 $u'(x) = \exp(x+b)$ et $v'(x) = \exp(x)$.

$$g'(x) = \frac{\exp(x+b) \times \exp(x) - \exp(x+b) \times \exp(x)}{[\exp(x)]^2} = \frac{0}{[\exp(x)]^2} = 0.$$

Question 3. Comme $g'(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction g est constante sur $\mathbb{R}$.

Question 4. $g(0) = \frac{\exp(0+b)}{\exp(0)} = \frac{\exp(b)}{1} = \exp(b)$.

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$: $g(x) = \exp(b)$, c'est-à-dire $\frac{\exp(x+b)}{\exp(x)} = \exp(b)$, soit $\exp(x+b) = \exp(x) \times \exp(b)$.

En posant $x = a$, on obtient : $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$.

1SPE-EXP0-EX-016

Corrigé

Question 1. On applique la propriété avec $b = -a$:

$$\exp(a) \times \exp(-a) = \exp(a + (-a)) = \exp(0) = 1.$$

Comme $\exp(a) > 0$, on peut diviser par $\exp(a)$:

$$\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}.$$

Question 2. On écrit $a - b = a + (-b)$ puis on applique la propriété :

$$\exp(a - b) = \exp(a + (-b)) = \exp(a) \times \exp(-b) = \exp(a) \times \frac{1}{\exp(b)} = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}.$$

Question 3. D'après la propriété fondamentale :

$$\exp(a) \times \exp(-a) = \exp(a + (-a)) = \exp(0) = 1.$$

Ce résultat découle directement de la question 1 : $\exp(a) \times \frac{1}{\exp(a)} = 1$.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-017

Question 1. On reconnaît une identité remarquable $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ avec $a = e^{2x}$ et $b = 1$:

$$A = (e^{2x})^2 - 1^2 = e^{4x} - 1.$$

Question 2. On développe $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$$B = (e^x)^2 + 2 \times e^x \times e^{-x} + (e^{-x})^2 = e^{2x} + 2 \times 1 + e^{-2x} = e^{2x} + 2 + e^{-2x}.$$

Question 3. Si $x = \ln 2$, alors $e^x = 2$, donc :

$$e^{3x} + e^{-3x} = (e^x)^3 + (e^{-x})^3 = 2^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 8 + \frac{1}{8} = \frac{65}{8}.$$

Question 4. Au numérateur : $e^{3x} \times e^{-x} = e^{3x-x} = e^{2x}$.

Au dénominateur : $(e^x)^2 = e^{2x}$.

$$\text{Donc } C = \frac{e^{2x}}{e^{2x}} = 1.$$

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-018

On utilise $e^{2x} = (e^x)^2$ pour ramener les expressions à des formes algébriques connues en posant $X = e^x$.

$$1. A = e^{2x} - e^x = e^x (e^x - 1).$$

On factorise par e^x (facteur commun).

$$2. B = e^{2x} - 2e^x + 1 = (e^x)^2 - 2e^x + 1.$$

On reconnaît $(X - 1)^2$ avec $X = e^x$: $B = (e^x - 1)^2$.

$$3. C = e^{2x} - 9 = (e^x)^2 - 3^2.$$

On reconnaît $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$: $C = (e^x - 3)(e^x + 3)$.

$$4. D = e^{2x} + 5e^x + 6. \text{ On pose } X = e^x : D = X^2 + 5X + 6.$$

On cherche deux nombres de somme 5 et de produit 6 : ce sont 2 et 3.

$$\text{Donc } D = (X + 2)(X + 3) = (e^x + 2)(e^x + 3).$$

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-019

On note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $\exp(na) = [\exp(a)]^n$ ».

Question 1 — Initialisation. Pour $n = 1$: $\exp(1 \times a) = \exp(a) = [\exp(a)]^1$. La propriété $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

Question 2 — Hérédité. Soit $k \geq 1$ un entier tel que $\mathcal{P}(k)$ est vraie, c'est-à-dire $\exp(ka) = [\exp(a)]^k$.

Montrons $\mathcal{P}(k+1)$:

$$\begin{aligned}\exp((k+1)a) &= \exp(ka + a) \\ &= \exp(ka) \times \exp(a) \quad (\text{propriété } \exp(u+v) = \exp(u) \exp(v)) \\ &= [\exp(a)]^k \times \exp(a) \quad (\text{hypothèse de récurrence}) \\ &= [\exp(a)]^{k+1}.\end{aligned}$$

La propriété $\mathcal{P}(k+1)$ est donc vraie.

Question 3 — Conclusion. Par le principe de récurrence, la propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall a \in \mathbb{R}, \quad \exp(na) = [\exp(a)]^n.$$

Question 4. Pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel a :

$$\exp(-na) = \frac{1}{\exp(na)} = \frac{1}{[\exp(a)]^n}.$$

La première égalité vient de $\exp(-u) = \frac{1}{\exp(u)}$ et la seconde de la propriété démontrée.

1SPE-EXP0-EX-020

Corrigé

Question 1. Pour tout réel x :

$$f(-x) = \frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = f(x).$$

La fonction f est paire. Sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Question 2. $f(0) = \frac{e^0 + e^0}{2} = \frac{1+1}{2} = 1.$

Question 3. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions exponentielles. On a :

$$f'(x) = \frac{e^x + (-1)e^{-x}}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Question 4. On étudie le signe de $f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

$$f'(x) \geq 0 \iff e^x \geq e^{-x} \iff x \geq -x \iff x \geq 0 \quad (\text{car } \exp \text{ est strictement croissante}).$$

Donc f est décroissante sur $] -\infty ; 0]$ et croissante sur $[0 ; +\infty[$. Le minimum de f est $f(0) = 1$.

Question 5. On pose $g(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ et on calcule :

$$[f(x)]^2 - [g(x)]^2 = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{4}.$$

On développe les carrés :

$$\begin{aligned}(e^x + e^{-x})^2 &= e^{2x} + 2 + e^{-2x}, \\ (e^x - e^{-x})^2 &= e^{2x} - 2 + e^{-2x}.\end{aligned}$$

Donc :

$$[f(x)]^2 - [g(x)]^2 = \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

1SPE-EXP0-EX-021

Corrigé

La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$. Donc si $a < b$, alors $e^a < e^b$.

1. On a $3 < 5$, donc par croissance de l'exponentielle : $e^3 < e^5$.

2. On a $-2 < -1$, donc par croissance de l'exponentielle : $e^{-2} < e^{-1}$.

3. On a $-3 < 0$, donc par croissance de l'exponentielle : $e^{-3} < e^0 = 1$.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-022

On classe d'abord les exposants dans l'ordre croissant :

$$-2 < -1 < 0 < 1 < 2.$$

La fonction exponentielle étant **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, elle conserve l'ordre. Donc :

$$e^{-2} < e^{-1} < e^0 < e^1 < e^2,$$

c'est-à-dire :

$$e^{-2} < e^{-1} < 1 < e < e^2.$$

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-023

1. D'après le cours, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

La fonction exponentielle tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$.

2. D'après le cours, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

La fonction exponentielle tend vers 0 quand x tend vers $-\infty$. L'axe des abscisses est asymptote horizontale à la courbe de $\exp$ en $-\infty$.

3. Quand $x \rightarrow +\infty$, on a $-x \rightarrow -\infty$, donc par composition :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0.$$

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-024

1. **Vrai.** La fonction exponentielle est **strictement positive** sur $\mathbb{R}$: pour tout réel x , $e^x > 0$. C'est une propriété fondamentale du cours.

2. **Faux.** Puisque $e^x > 0$ pour tout réel x , la fonction exponentielle ne prend **jamais** de valeur négative (ni nulle).

3. **Faux.** Quand $x \rightarrow +\infty$, on a $-x \rightarrow -\infty$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0.$$

La fonction $x \mapsto e^{-x}$ tend vers 0 (et non $+\infty$) quand x tend vers $+\infty$.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-025

La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, donc pour tous réels a et b :

$$e^a > e^b \iff a > b \quad ; \quad e^a \leq e^b \iff a \leq b.$$

1. $e^x > e^3 \iff x > 3$.

L'ensemble des solutions est $]3; +\infty[$.

2. $e^{2x} \leq e^5 \iff 2x \leq 5 \iff x \leq \frac{5}{2}$.

L'ensemble des solutions est $\left]-\infty; \frac{5}{2}\right]$.

3. $e^{-x} \geq e^2 \iff -x \geq 2 \iff x \leq -2$.

L'ensemble des solutions est $] -\infty; -2]$.

1SPE-EXP0-EX-026

Corrigé

- La fonction $f(x) = e^{2x-1}$ est de la forme $e^{u(x)}$ avec $u(x) = 2x - 1$, donc $u'(x) = 2$.
On a $f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = 2e^{2x-1}$.
Comme $e^{2x-1} > 0$ pour tout réel x , on a $f'(x) = 2e^{2x-1} > 0$ pour tout réel x .
- Puisque $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
- Quand $x \rightarrow +\infty$, on a $2x - 1 \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x-1} = +\infty$.
Quand $x \rightarrow -\infty$, on a $2x - 1 \rightarrow -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x-1} = 0$.
- Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	0	$\nearrow +\infty$

L'axe des abscisses ($y = 0$) est asymptote horizontale en $-\infty$.

1SPE-EXP0-EX-027

Corrigé

- On factorise par e^x :
$$e^x - x = e^x (1 - x e^{-x}).$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissance comparée : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x).
Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x e^{-x}) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.
Par produit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x) = +\infty$.
L'exponentielle « domine » la fonction linéaire en $+\infty$.
- Quand $x \rightarrow -\infty$:
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$;
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$.
 Par somme : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x) = -\infty$.

1SPE-EXP0-EX-028

Corrigé

- On calcule :
$$g(0) = e^0 - 0 - 2 = 1 - 2 = -1 < 0.$$

$$g(2) = e^2 - 2 - 2 = e^2 - 4 \approx 7,389 - 4 = 3,389 > 0.$$
- La fonction g est la somme de la fonction exponentielle (continue sur $\mathbb{R}$) et de la fonction affine $x \mapsto -x - 2$ (continue sur $\mathbb{R}$). Donc g est **continue** sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur $[0; 2]$.
- On a :
 - g est continue sur $[0; 2]$;
 - $g(0) = -1 < 0$ et $g(2) = e^2 - 4 > 0$.
 D'après le **théorème des valeurs intermédiaires**, comme 0 est compris entre $g(0)$ et $g(2)$, il existe au moins un réel $c \in [0; 2]$ tel que $g(c) = 0$, c'est-à-dire $e^c = c + 2$.
L'équation $e^x = x + 2$ admet donc au moins une solution dans $[0; 2]$.

1SPE-EXP0-EX-029

Corrigé

- La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = e^x$ pour tout réel x .
La fonction exponentielle est égale à sa propre dérivée.
- Pour tout réel x , $e^x > 0$ (la fonction exponentielle est **strictement positive**).

Donc $f'(x) = e^x > 0$ pour tout réel x .

3. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée f' est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

D'après le théorème liant signe de la dérivée et variations, la fonction f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

4. Une fonction strictement croissante sur un intervalle est **injective** : elle ne prend jamais deux fois la même valeur.

- Si $e^a = e^b$, alors nécessairement $a = b$ (injectivité). Réciproquement, si $a = b$, alors $e^a = e^b$. D'où $e^a = e^b \iff a = b$.
- Une fonction strictement croissante conserve l'ordre strict : si $a < b$, alors $f(a) < f(b)$, c'est-à-dire $e^a < e^b$. Réciproquement, si $e^a < e^b$, alors $a < b$ (sinon $a \geq b$ entraînerait $e^a \geq e^b$, contradiction). D'où $e^a < e^b \iff a < b$.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-030

1. $h(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 0 - 1 = 0$.

2. La fonction h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$h'(x) = e^x - 1.$$

Étude du signe de $h'(x)$:

- $h'(x) = 0 \iff e^x = 1 \iff x = 0$.
- Si $x < 0$, alors $e^x < e^0 = 1$ (croissance de $\exp$), donc $h'(x) < 0$.
- Si $x > 0$, alors $e^x > 1$, donc $h'(x) > 0$.

3. Tableau de variations de h :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
$h(x)$	$+\infty$	$\searrow 0 \nearrow$	$+\infty$

La fonction h admet un **minimum** en $x = 0$, égal à $h(0) = 0$.

4. D'après le tableau de variations, $h(x) \geq h(0) = 0$ pour tout réel x .

Donc $e^x - x - 1 \geq 0$, c'est-à-dire :

$$e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout réel } x.$$

L'égalité a lieu si et seulement si $x = 0$.

5. La droite $T : y = x + 1$ est la tangente à la courbe C de $\exp$ au point $A(0; 1)$. L'inégalité $e^x \geq x + 1$ signifie que la courbe C est **au-dessus** de sa tangente T en tout point. La courbe et la tangente ne se touchent qu'au point $A(0; 1)$. Cela traduit la **convexité** de la fonction exponentielle.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-031

On applique la formule $(e^u)' = u'e^u$.

Question 1. On pose $u(x) = 3x$, donc $u'(x) = 3$.

$$f'(x) = 3e^{3x}.$$

Question 2. On pose $u(x) = -x$, donc $u'(x) = -1$.

$$g'(x) = -e^{-x}.$$

Question 3. On pose $u(x) = x + 1$, donc $u'(x) = 1$.

$$h'(x) = e^{x+1}.$$

Question 4. On pose $u(x) = 2x - 3$, donc $u'(x) = 2$.

$$k'(x) = 2e^{2x-3}.$$

1SPE-EXP0-EX-032

Corrigé

On applique la formule $(e^u)' = u'e^u$ combinée à la règle $(k \cdot v)' = k' \cdot v + k \cdot v'$.

Question 1. On pose $u(x) = 2x$, donc $u'(x) = 2$.

$$f'(x) = 5 \times 2e^{2x} = \boxed{10e^{2x}}.$$

Question 2. On pose $u(x) = -4x$, donc $u'(x) = -4$.

$$g'(x) = -3 \times (-4)e^{-4x} = \boxed{12e^{-4x}}.$$

Question 3. On pose $u(x) = x$, donc $u'(x) = 1$.

$$h'(x) = \frac{1}{2} \times 1 \times e^x = \boxed{\frac{e^x}{2}}.$$

1SPE-EXP0-EX-033

Corrigé

On dérive terme à terme en utilisant $(e^x)' = e^x$ et $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

Question 1.

$$f'(x) = e^x + 1.$$

Question 2. On a $(e^{-x})' = -e^{-x}$ et $(e^x)' = e^x$, donc :

$$g'(x) = -e^{-x} + e^x = \boxed{e^x - e^{-x}}.$$

Question 3.

$$h'(x) = 1 - e^x.$$

1SPE-EXP0-EX-034

Corrigé

On applique la formule $(e^u)' = u'e^u$.

Question 1. On pose $u(x) = x^2$, donc $u'(x) = 2x$.

$$f'(x) = 2xe^{x^2}.$$

Question 2. On pose $u(x) = x^2 + 1$, donc $u'(x) = 2x$.

$$g'(x) = 2xe^{x^2+1}.$$

Remarque : on peut aussi écrire $g(x) = e^1 \times e^{x^2} = e e^{x^2}$, et alors $g'(x) = e \times 2x e^{x^2} = 2x e^{x^2+1}$, ce qui confirme le résultat.

1SPE-EXP0-EX-035

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$.

On a $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

Par la formule du produit :

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x.$$

Question 2. On factorise par e^x :

$$f'(x) = e^x + x e^x = \boxed{(x+1)e^x}.$$

Question 3. On résout $f'(x) = 0$, soit $(x+1)e^x = 0$.

Comme $e^x > 0$ pour tout réel x , le produit est nul si et seulement si $x+1 = 0$, c'est-à-dire $\boxed{x = -1}$.

Question 4. Le signe de $f'(x)$ est celui de $x+1$ (car $e^x > 0$).

- ▶ Si $x < -1$, alors $f'(x) < 0$: f est décroissante.
- ▶ Si $x > -1$, alors $f'(x) > 0$: f est croissante.

La fonction f admet un minimum en $x = -1$, avec $f(-1) = -1 \times e^{-1} = -\frac{1}{e}$.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-036

Question 1. On pose $u(x) = 2x - 1$ et $v(x) = e^{-x}$.

On a $u'(x) = 2$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

Par la formule du produit :

$$f'(x) = 2e^{-x} + (2x - 1) \times (-e^{-x}) = 2e^{-x} - (2x - 1)e^{-x}.$$

Question 2. On factorise par e^{-x} :

$$f'(x) = [2 - (2x - 1)]e^{-x} = \boxed{(3 - 2x)e^{-x}}.$$

Question 3. Comme $e^{-x} > 0$ pour tout réel x , le signe de $f'(x)$ est celui de $3 - 2x$.

- ▶ $3 - 2x > 0 \iff x < \frac{3}{2}$: f est croissante sur $\left]-\infty; \frac{3}{2}\right]$.
- ▶ $3 - 2x < 0 \iff x > \frac{3}{2}$: f est décroissante sur $\left[\frac{3}{2}; +\infty\right[$.

La fonction f admet un maximum en $x = \frac{3}{2}$, avec $f\left(\frac{3}{2}\right) = (3 - 1)e^{-3/2} = 2e^{-3/2}$.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-037

Question 1. On pose $u(x) = e^x$ et $v(x) = x + 1$.

On a $u'(x) = e^x$ et $v'(x) = 1$.

Par la formule du quotient :

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{e^x(x + 1) - e^x \times 1}{(x + 1)^2}.$$

Question 2. On factorise le numérateur par e^x :

$$f'(x) = \frac{e^x[(x + 1) - 1]}{(x + 1)^2} = \boxed{\frac{xe^x}{(x + 1)^2}}.$$

Question 3. Sur $] -1; +\infty[$, on a $(x + 1)^2 > 0$ et $e^x > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de x .

- ▶ Si $-1 < x < 0$, alors $f'(x) < 0$: f est décroissante sur $] -1; 0]$.
- ▶ Si $x > 0$, alors $f'(x) > 0$: f est croissante sur $[0; +\infty[$.

La fonction f admet un minimum en $x = 0$, avec $f(0) = \frac{e^0}{0 + 1} = 1$.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-038

Question 1. On pose $u(x) = x^2 - 1$ et $v(x) = e^x$.

On a $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = e^x$.

Par la formule du produit :

$$f'(x) = 2xe^x + (x^2 - 1)e^x.$$

Question 2. On factorise par e^x :

$$f'(x) = [2x + x^2 - 1]e^x = \boxed{(x^2 + 2x - 1)e^x}.$$

Question 3. On résout $x^2 + 2x - 1 = 0$.

Le discriminant est $\Delta = 4 + 4 = 8$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$.

Les solutions sont :

$$x_1 = \frac{-2 - 2\sqrt{2}}{2} = -1 - \sqrt{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2 + 2\sqrt{2}}{2} = -1 + \sqrt{2}.$$

Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x^2 + 2x - 1$:

- ▶ $f'(x) > 0$ sur $] -\infty ; -1 - \sqrt{2}[\cup] -1 + \sqrt{2} ; +\infty[$;
- ▶ $f'(x) < 0$ sur $] -1 - \sqrt{2} ; -1 + \sqrt{2}[$.

Donc f admet un **maximum local** en $x_1 = -1 - \sqrt{2}$ et un **minimum local** en $x_2 = -1 + \sqrt{2}$.

1SPE-EXP0-EX-039

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$.

On a $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

Par la formule du produit :

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x = e^x [1 + (x - 1)] = \boxed{x e^x}.$$

Question 2. Comme $e^x > 0$ pour tout réel x , le signe de $f'(x)$ est celui de x :

- ▶ Si $x < 0$, $f'(x) < 0$: f est décroissante sur $] -\infty ; 0]$.
- ▶ Si $x > 0$, $f'(x) > 0$: f est croissante sur $[0 ; +\infty[$.

f admet un minimum en $x = 0$.

Question 3.

- ▶ En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 1) e^x = 0$ car la croissance de e^x vers 0 l'emporte sur le facteur polynomial (croissances comparées).
- ▶ En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) e^x = +\infty$ car $e^x \rightarrow +\infty$ et $x - 1 \rightarrow +\infty$.

Question 4.

$$f(0) = (0 - 1) e^0 = -1, \quad f(1) = (1 - 1) e^1 = 0, \quad f(-1) = (-1 - 1) e^{-1} = -\frac{2}{e}.$$

Question 5. Tableau de variations complet :

- ▶ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$).
- ▶ f est décroissante sur $] -\infty ; 0]$, minimum $f(0) = -1$.
- ▶ f est croissante sur $[0 ; +\infty[$, $f(1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

La courbe coupe l'axe des abscisses en $x = 1$ (car $f(1) = 0$) et admet l'axe des abscisses comme asymptote en $-\infty$.

1SPE-EXP0-EX-040

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = x^2$ et $v(x) = e^{-x}$.

On a $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

Par la formule du produit :

$$f'(x) = 2x e^{-x} + x^2 \times (-e^{-x}) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x}.$$

On factorise par $x e^{-x}$:

$$f'(x) = x e^{-x} (2 - x) = \boxed{x(2 - x) e^{-x}}.$$

Question 2. On résout $f'(x) = 0$, soit $x(2-x)e^{-x} = 0$.

Comme $e^{-x} > 0$, on obtient $x = 0$ ou $2-x = 0$, d'où $x = 0$ ou $x = 2$.

Question 3. Le signe de $f'(x)$ est celui de $x(2-x)$ (car $e^{-x} > 0$).

Le produit $x(2-x)$ est positif entre les racines :

- ▶ $f'(x) < 0$ sur $] -\infty ; 0[: f$ est décroissante.
- ▶ $f'(x) > 0$ sur $]0 ; 2[: f$ est croissante.
- ▶ $f'(x) < 0$ sur $]2 ; +\infty[: f$ est décroissante.

Question 4.

- ▶ En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ par croissances comparées (e^x l'emporte sur x^2).
- ▶ En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$ car $x^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Question 5.

- ▶ f admet un **minimum local** en $x = 0 : f(0) = 0$.
- ▶ f admet un **maximum local** en $x = 2 : f(2) = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2} \approx 0,54$.

La courbe part de $+\infty$ en $-\infty$, décroît jusqu'au minimum $(0; 0)$, croît jusqu'au maximum $(2; \frac{4}{e^2})$, puis décroît vers 0 en $+\infty$ (asymptote horizontale $y = 0$).

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-041

1. $e^x = e^5$.

La fonction exponentielle est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $]0; +\infty[$, donc :

$$e^x = e^5 \iff x = 5.$$

L'unique solution est $x = 5$.

2. $e^{2x} = e^{-3}$.

Par injectivité de la fonction exponentielle :

$$e^{2x} = e^{-3} \iff 2x = -3 \iff x = -\frac{3}{2}.$$

L'unique solution est $x = -\frac{3}{2}$.

3. $e^{x+1} = e^4$.

Par injectivité de la fonction exponentielle :

$$e^{x+1} = e^4 \iff x+1 = 4 \iff x = 3.$$

L'unique solution est $x = 3$.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-042

1. $e^x = 3$.

Comme $3 > 0$, l'équation admet une solution. Par définition du logarithme népérien :

$$e^x = 3 \iff x = \ln 3.$$

L'unique solution est $x = \ln 3$.

2. $e^{2x} = 7$.

Comme $7 > 0$, on a :

$$e^{2x} = 7 \iff 2x = \ln 7 \iff x = \frac{\ln 7}{2}.$$

L'unique solution est $x = \frac{\ln 7}{2}$.

3. $e^{-x} = 5$.

Comme $5 > 0$, on a :

$$e^{-x} = 5 \iff -x = \ln 5 \iff x = -\ln 5.$$

L'unique solution est $x = -\ln 5$.

1SPE-EXP0-EX-043

Corrigé

On pose $X = e^x$. Comme $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$, l'équation devient :

$$X^2 - 5X + 6 = 0.$$

On calcule le discriminant : $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$.

Les solutions sont :

$$X_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

On revient à la variable x en résolvant $e^x = X$ pour chaque valeur :

► Si $e^x = 2$, alors $x = \ln 2$.

► Si $e^x = 3$, alors $x = \ln 3$.

Les deux valeurs $X_1 = 2$ et $X_2 = 3$ sont positives, donc les deux solutions sont valides.

L'ensemble des solutions est $S = \{\ln 2; \ln 3\}$.

1SPE-EXP0-EX-044

Corrigé

1. On pose $X = e^x$. Comme $e^{2x} = X^2$, l'équation devient :

$$X^2 - X - 2 = 0.$$

On calcule le discriminant : $\Delta = 1 + 8 = 9 > 0$.

Les solutions sont :

$$X_1 = \frac{1-3}{2} = -1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{1+3}{2} = 2.$$

Or $X = e^x > 0$ pour tout réel x , donc $X = -1$ est impossible.

Seule la valeur $X = 2$ convient : $e^x = 2 \iff x = \ln 2$.

L'ensemble des solutions est $S = \{\ln 2\}$.

2. La fonction exponentielle est strictement croissante, donc :

$$e^x \geq 2 \iff e^x \geq e^{\ln 2} \iff x \geq \ln 2.$$

L'ensemble des solutions est $S = [\ln 2; +\infty[$.

1SPE-EXP0-EX-045

Corrigé

On pose $X = e^x$, avec $X > 0$. L'inéquation devient :

$$X^2 + X - 6 \leq 0.$$

On résout $X^2 + X - 6 = 0$. Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$.

Les racines sont :

$$X_1 = \frac{-1-5}{2} = -3 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{-1+5}{2} = 2.$$

Le trinôme $X^2 + X - 6 = (X+3)(X-2)$ est négatif ou nul pour $X \in [-3; 2]$.

Or $X = e^x > 0$, donc la contrainte $X \in [-3; 2]$ combinée à $X > 0$ donne :

$$0 < X \leq 2.$$

On revient à $x : e^x \leq 2 \Leftrightarrow x \leq \ln 2$ (car la fonction exponentielle est strictement croissante).

La condition $e^x > 0$ est toujours vérifiée.

L'ensemble des solutions est $S =]-\infty ; \ln 2]$.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-046

1. On calcule :

$$P(0) = 1000 e^{0,05 \times 0} = 1000 e^0 = 1000.$$

Interprétation : au temps initial ($t = 0$), la population compte 1000 bactéries.

2. On résout $P(t) = 5000$:

$$1000 e^{0,05t} = 5000 \Leftrightarrow e^{0,05t} = 5 \Leftrightarrow 0,05t = \ln 5 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 5}{0,05} = 20 \ln 5.$$

Valeur exacte : $t = 20 \ln 5$. Valeur approchée : $t \approx 20 \times 1,609 \approx 32$ heures.

3. On résout $P(t) \geq 10000$:

$$1000 e^{0,05t} \geq 10000 \Leftrightarrow e^{0,05t} \geq 10 \Leftrightarrow 0,05t \geq \ln 10 \Leftrightarrow t \geq 20 \ln 10.$$

L'ensemble des solutions est $S = [20 \ln 10 ; +\infty[$.

Interprétation : la population atteint ou dépasse 10000 bactéries à partir de $t = 20 \ln 10 \approx 46$ heures.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-047

1. On dérive $f(x) = e^{2x} - 2e^x$:

$$f'(x) = 2e^{2x} - 2e^x = 2e^x(e^x - 1).$$

2. Le facteur $2e^x > 0$ pour tout réel x .

Le signe de $f'(x)$ est donc celui de $e^x - 1$:

- ▶ $e^x - 1 < 0 \Leftrightarrow e^x < 1 \Leftrightarrow x < 0$;
- ▶ $e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
- ▶ $e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 0$.

Donc f est strictement décroissante sur $] -\infty ; 0]$ et strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

3. On calcule :

$$f(0) = e^0 - 2e^0 = 1 - 2 = -1.$$

D'après le tableau de variations, f admet un **minimum** égal à $\boxed{-1}$, atteint en $x = 0$.

4. **Limite en $+\infty$:** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^x = +\infty$, mais e^{2x} croît beaucoup plus vite que $2e^x$. On factorise :

$$f(x) = e^x(e^x - 2) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Limite en $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

Corrigé

1SPE-EXP0-EX-048

1. On multiplie numérateur et dénominateur par e^{-x} :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{e^x \cdot e^{-x}}{(e^x + 1) \cdot e^{-x}} = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

2. On dérive $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ avec la règle du quotient :

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \cdot e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{2x} + e^x - e^{2x}}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}.$$

3. Pour tout réel x , $e^x > 0$ et $(e^x + 1)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$ pour tout x .
Ainsi f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

4. **Limite en $+\infty$** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{1+0} = 1$.
La droite $y = 1$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

Limite en $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{0}{0+1} = 0$.
La droite $y = 0$ est asymptote horizontale en $-\infty$.

5. On calcule :

$$f(0) = \frac{e^0}{e^0 + 1} = \frac{1}{2}.$$

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{-\infty} f = 0$ et $\lim_{+\infty} f = 1$.

1SPE-EXP0-EX-049

Corrigé

1. On dérive $f(x) = (2x - 1)e^x$ avec la règle du produit :

$$f'(x) = 2e^x + (2x - 1)e^x = (2 + 2x - 1)e^x = (2x + 1)e^x.$$

2. Comme $e^x > 0$ pour tout réel x , le signe de $f'(x)$ est celui de $2x + 1$:

- $f'(x) < 0$ si $x < -\frac{1}{2}$;
- $f'(x) = 0$ si $x = -\frac{1}{2}$;
- $f'(x) > 0$ si $x > -\frac{1}{2}$.

Donc f est strictement décroissante sur $\left]-\infty; -\frac{1}{2}\right]$ et strictement croissante sur $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

Le minimum de f est atteint en $x = -\frac{1}{2}$:

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = (-1 - 1)e^{-1/2} = -2e^{-1/2} = \frac{-2}{\sqrt{e}}.$$

3. $f(x) = 0 \iff (2x - 1)e^x = 0$. Or $e^x \neq 0$, donc :

$$2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}.$$

L'unique solution est $x = \frac{1}{2}$.

4. Le signe de $f(x)$ est celui de $2x - 1$ (car $e^x > 0$) :

- $f(x) < 0$ si $x < \frac{1}{2}$;
- $f(x) = 0$ si $x = \frac{1}{2}$;
- $f(x) > 0$ si $x > \frac{1}{2}$.

5. **Limite en $+\infty$** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Limite en $-\infty$: on écrit $f(x) = (2x - 1)e^x$. Or $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ (croissance comparée), donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

1SPE-EXP0-EX-050

Corrigé

1. On dérive $g(x) = e^x - x$:

$$g'(x) = e^x - 1.$$

2. $g'(x) = 0 \iff e^x = 1 \iff x = 0$.
Signe de $g'(x)$:

CHAPITRE 6

Trigonométrie

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais placer un angle orienté sur le cercle trigonométrique et convertir degrés/radians.
- ▶ **C2** — Je sais déterminer les cosinus et sinus de valeurs remarquables et d'angles associés par lecture du cercle trigonométrique.

Une grande roue de fête foraine a un rayon de 25 mètres et son centre est à 27 mètres du sol. À quelle hauteur se trouve un passager après un tour d'un sixième du cercle ? Le radian et la lecture du cercle trigonométrique permettent de répondre.

Temps estimés : ◆ 6 h ◆◆ 5 h ◆◆◆ 4 h

6.1 Cercle trigonométrique et angles

DÉFINITION 1

Le **radian** est l'unité de mesure d'angle définie par : un angle de 1 radian est un angle au centre qui intercepte un arc de longueur égale au rayon du cercle.
La correspondance avec les degrés est :

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ.$$

Exemple. Conversions usuelles :

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}, \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad}, \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}, \quad 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}, \quad 360^\circ = 2\pi \text{ rad}.$$

DÉFINITION 2

Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1 dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Le point $A = (1; 0)$ est appelé **origine des arcs**. Le sens positif (sens trigonométrique) est le sens inverse des aiguilles d'une montre.

DÉFINITION 3

Soit t un réel. On associe au réel t le point M du cercle trigonométrique tel que l'arc $\widehat{AM}$, mesure dans le sens positif, a pour longueur $|t|$ (positivement si $t > 0$, négativement si $t < 0$).
On dit que t est **une mesure** (en radians) de l'angle orienté $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$.

Propriété . Deux réels t et t' définissent le même point sur le cercle trigonométrique si et seulement si

$$t' = t + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

On dit que t et t' sont **égaux modulo 2π** .

DÉFINITION 4

La **mesure principale** d'un angle est l'unique réel $t_0 \in]-\pi; \pi]$ tel que $t = t_0 + 2k\pi$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$.

Exemple.

- La mesure principale de $\frac{7\pi}{3}$ est $\frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3}$.
- La mesure principale de $-\frac{5\pi}{4}$ est $-\frac{5\pi}{4} + 2\pi = \frac{3\pi}{4}$.

POUR ALLER PLUS LOIN

La notion de radian est liée à la longueur d'arc : sur un cercle de rayon R , un angle au centre de mesure θ (en radians) intercepte un arc de longueur $\ell = R\theta$. Sur le cercle trigonométrique ($R = 1$), la longueur d'arc est donc égale à la mesure de l'angle en radians.

| Pour convertir un angle α de degrés en radians, on utilise la formule

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{deg}} \times \frac{\pi}{180}.$$

Reciproquement :

$$\alpha_{\text{deg}} = \alpha_{\text{rad}} \times \frac{180}{\pi}.$$

6.2 Cosinus, sinus et valeurs

DÉFINITION 1

Soit M le point du cercle trigonométrique associé au réel t . Les coordonnées de M dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ sont :

$$M = (\cos t; \sin t).$$

Le réel $\cos t$ est le **cosinus** de t et le réel $\sin t$ est le **sinus** de t .

Propriété . Pour tout réel t :

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1.$$

De plus : $-1 \leq \cos t \leq 1$ et $-1 \leq \sin t \leq 1$.

Démonstration. Le point $M(\cos t; \sin t)$ est sur le cercle de centre O et de rayon 1, donc $OM^2 = 1$. Or $OM^2 = \cos^2 t + \sin^2 t$ d'après le théorème de Pythagore. D'où $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$.

Propriété . Les valeurs remarquables du cosinus et du sinus sont :

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos t$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin t$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Exemple. On vérifie : $\cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1. \checkmark$

Propriété . Pour tout réel x :

(Parité)	$\cos(-x) = \cos x,$	$\sin(-x) = -\sin x,$
(Supplémentaire)	$\cos(\pi - x) = -\cos x,$	$\sin(\pi - x) = \sin x,$
(Anti-supplémentaire)	$\cos(\pi + x) = -\cos x,$	$\sin(\pi + x) = -\sin x,$
(Complémentaire)	$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x,$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$

Exemple.

- ▶ $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$
- ▶ $\sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$
- ▶ $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}.$

POUR ALLER PLUS LOIN

Les valeurs remarquables de $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ se retrouvent à partir d'un triangle équilatéral de cote 1 : la hauteur vaut $\frac{\sqrt{3}}{2}$ et la moitié de la base vaut $\frac{1}{2}$. Celles de $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ proviennent d'un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse 1.

MÉTHODE M1 — PLACER UN POINT SUR LE CERCLE TRIGONOMETRIQUE ET TROUVER LA MESURE PRINCIPALE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de placer un angle sur le cercle trigonométrique, de convertir degrés/radians, ou de trouver la mesure principale d'un angle.

La méthode pas à pas.

1. Pour convertir de degrés en radians : multiplier par $\frac{\pi}{180}$.
2. Pour convertir de radians en degrés : multiplier par $\frac{180}{\pi}$.
3. Pour trouver la mesure principale d'un angle t :
 - ▶ Ajouter ou retrancher des multiples de 2π jusqu'à obtenir un réel dans $] -\pi; \pi]$.
 - ▶ Concrètement : calculer $\frac{t}{2\pi}$, garder la partie fractionnaire, multiplier par 2π .
4. Pour placer le point sur le cercle : partir de $A = (1; 0)$ et parcourir l'arc de longueur $|t|$ dans le sens positif (si $t > 0$) ou négatif (si $t < 0$).

Exemple rédigé. Trouver la mesure principale de $t = \frac{17\pi}{4}$.

$$\begin{aligned}\frac{17\pi}{4} - 2\pi &= \frac{17\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{9\pi}{4} \\ \frac{9\pi}{4} - 2\pi &= \frac{9\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

On a $\frac{\pi}{4} \in] -\pi; \pi]$, donc la mesure principale est $\frac{\pi}{4}$.

On retranche des multiples de $2\pi = \frac{8\pi}{4}$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Confondre 2π et π : on ajoute ou retranche 2π (un tour complet), pas π .
- ▶ **Piège 2.** Oublier que la mesure principale doit être dans $] -\pi; \pi]$ (borne $-\pi$ exclue, borne π incluse).
- ▶ **Piège 3.** Mélanger degrés et radians dans un même calcul.

Vérifier son résultat. Vérifier que la mesure principale t_0 est bien dans $] -\pi; \pi]$ et que $t - t_0$ est un multiple de 2π .

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — CALCULER UN COSINUS OU UN SINUS AVEC LES VALEURS REMARQUABLES ET LES SYMÉTRIES

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'on doit calculer la valeur exacte de $\cos \alpha$ ou $\sin \alpha$ pour un angle α qui n'est pas directement dans le tableau des valeurs remarquables mais qui s'y ramène par symétrie.

La méthode pas à pas.

1. Déterminer la mesure principale de α .
2. Identifier à quel angle remarquable $\beta \in \{0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\}$ on peut se ramener.
3. Appliquer la formule de symétrie adaptée :

- ▶ Si $\alpha = -\beta$: parité.
- ▶ Si $\alpha = \pi - \beta$: supplémentaire.
- ▶ Si $\alpha = \pi + \beta$: anti-supplémentaire.
- ▶ Si $\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$: complémentaire.

4. Remplacer par la valeur remarquable connue.

Exemple rédigé. Calculer $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$.

On a $\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$.

Donc :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Inverser $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Moyen mnémotechnique : quand l'angle augmente de 0 à $\frac{\pi}{2}$, le cosinus diminue.
- ▶ **Piège 2.** Erreur de signe dans la formule du supplémentaire : $\cos(\pi - x) = -\cos x$ (signe -) mais $\sin(\pi - x) = +\sin x$ (signe +).

Vérifier son résultat. Vérifier que $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur de calcul.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

1SPE-TRIG0-EX-001
⌚ 8 min

Exercice 1

Convertir les angles suivants en radians (donner le résultat sous forme de fraction de π).

1. 120°
2. 45°
3. 270°
4. 330°

1SPE-TRIG0-EX-002
⌚ 8 min

Exercice 2

Convertir les angles suivants en degrés.

1. $\frac{\pi}{3}$ rad
2. $\frac{5\pi}{4}$ rad
3. $\frac{7\pi}{6}$ rad
4. $\frac{2\pi}{9}$ rad

1SPE-TRIG0-EX-003
⌚ 10 min

Exercice 3

Déterminer la mesure principale de chacun des angles suivants.

1. $\frac{13\pi}{3}$
2. $-\frac{7\pi}{4}$

3. $\frac{17\pi}{6}$
4. $-\frac{11\pi}{3}$

Exercice 4

1SPE-TRIG0-EX-004
⌚ 10 min

Placer sur le cercle trigonometrique les points M_1, M_2, M_3, M_4 associes respectivement aux reels suivants, puis donner leurs coordonnees.

1. $\frac{\pi}{6}$
2. $\frac{2\pi}{3}$
3. $-\frac{\pi}{4}$
4. $\frac{5\pi}{4}$

Exercice 5

1SPE-TRIG0-EX-005
⌚ 10 min

1. Determiner la mesure principale de $\frac{100\pi}{3}$.
2. Determiner la mesure principale de $-\frac{23\pi}{4}$.
3. Deux aiguilles d'une horloge forment un angle de 150° . Exprimer cet angle en radians.
4. Un point M du cercle trigonometrique a pour abscisse -1 et pour ordonnee 0 . Quelle est la mesure principale de l'angle associe ?

Exercice 6

1SPE-TRIG0-EX-006
⌚ 12 min

On considere un hexagone regulier $A_0A_1A_2A_3A_4A_5$ inscrit dans le cercle trigonometrique, avec $A_0 = (1; 0)$.

1. Quelle est la mesure en radians de l'angle au centre $\widehat{A_0OA_1}$?
2. En deduire les mesures (en radians) des angles associes aux points A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 .
3. Donner les coordonnees de chacun des sommets.
4. Verifier que $A_3 = (-1; 0)$.

Exercice 7

1SPE-TRIG0-EX-007
⌚ 10 min

Le rayon de la Terre est environ $R = 6371$ km. Un **mille nautique** correspond a un arc de $1'$ (une minute d'arc, soit $\frac{1}{60}$ de degre) sur un grand cercle de la Terre.

1. Convertir $1'$ en radians.
2. En deduire la longueur d'un mille nautique en kilometres (arrondir au metre).
3. Quelle distance (en milles nautiques) separe deux villes situees sur le meme meridien a 5° de latitude d'ecart ?

Exercice 8

1SPE-TRIG0-EX-008
⌚ 12 min

Sur un cercle de rayon $R = 3$ cm, on trace un arc de cercle correspondant a un angle au centre de $\frac{2\pi}{5}$ rad.

1. Calculer la longueur de cet arc.
2. Quel angle au centre (en radians) donnerait un arc de longueur π cm sur ce meme cercle ?
3. Montrer que sur un cercle de rayon R , la longueur d'arc est $\ell = R\theta$ ou θ est la mesure de l'angle en radians.

1SPE-TRIGO-EX-009

15 min

Exercice 9

L'aire d'un secteur circulaire de rayon R et d'angle au centre θ (en radians) est $A = \frac{1}{2}R^2\theta$.

- Justifier cette formule en utilisant la proportionnalité avec l'aire du disque complet.
- Calculer l'aire du secteur circulaire de rayon 5 cm et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
- Quel angle au centre faut-il choisir pour que l'aire du secteur soit égale au quart de l'aire du disque ? Exprimer le résultat en radians et en degrés.

1SPE-TRIGO-EX-010

15 min

Exercice 10

Un pendule de longueur $L = 2$ m oscille avec une amplitude de 15° de chaque côté de la verticale.

- Convertir 15° en radians.
- Calculer la longueur de l'arc décrit par l'extrémité du pendule lors d'un aller simple (d'un côté à l'autre).
- Le pendule effectue 30 oscillations complètes (aller-retour) par minute. Quelle distance totale parcourt l'extrémité en une minute ?

1SPE-TRIGO-EX-011

8 min

Exercice 11

Donner la valeur exacte des expressions suivantes (sans calculatrice).

- $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right)$

1SPE-TRIGO-EX-012

10 min

Exercice 12

En utilisant les formules de symétrie, calculer :

- $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$
- $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$
- $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$
- $\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$

1SPE-TRIGO-EX-013

10 min

Exercice 13

- Sachant que $\cos x = \frac{3}{5}$ et que $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, calculer $\sin x$.
- Sachant que $\sin x = -\frac{5}{13}$ et que $x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$, calculer $\cos x$.
- Vérifier dans chaque cas que $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

1SPE-TRIGO-EX-014

10 min

Exercice 14

Calculer les valeurs exactes suivantes en se ramenant à un angle du premier quadrant.

- $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$

2. $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$
3. $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right)$

Exercice 15

1SPE-TRIGO-EX-015
⌚ 12 min

Simplifier les expressions suivantes et donner leur valeur exacte.

1. $A = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos(\pi)$
2. $B = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
3. $C = \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{6}\right)$

Exercice 16

1SPE-TRIGO-EX-016
⌚ 12 min

Pour tout réel x , simplifier les expressions suivantes.

1. $\cos x + \cos(\pi - x)$
2. $\sin x + \sin(\pi - x)$
3. $\sin x \cdot \sin(\pi - x) + \cos x \cdot \cos(\pi - x)$

Exercice 17

1SPE-TRIGO-EX-017
⌚ 10 min

On sait que $\cos x = \frac{7}{25}$ et que $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$.

1. Calculer $\sin x$.
2. En deduire $\cos(\pi - x)$ et $\sin(\pi - x)$.
3. En deduire $\cos(\pi + x)$ et $\sin(\pi + x)$.
4. Calculer $\cos(-x)$ et $\sin(-x)$.

Exercice 18

1SPE-TRIGO-EX-018
⌚ 15 min

1. Développer $(\cos x + \sin x)^2$ et simplifier à l'aide de $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
2. En deduire que $(\cos x + \sin x)^2 = 1 + 2 \cos x \sin x$.
3. De même, montrer que $(\cos x - \sin x)^2 = 1 - 2 \cos x \sin x$.
4. On sait que $\cos x + \sin x = \frac{7}{5}$. Calculer $\cos x \cdot \sin x$, puis $\cos x - \sin x$ (sachant que $x \in \left]0; \frac{\pi}{4}\right[$).

Exercice 19

1SPE-TRIGO-EX-019
⌚ 15 min

1. À l'aide des formules d'addition (vues en C3) ou à l'aide du cercle trigonométrique, démontrer que :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$$

2. En deduire que $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$.
3. Application : calculer $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right)$.

Exercice 20

1SPE-TRIGO-EX-020
⌚ 15 min

Retrouver les valeurs remarquables par la géométrie.

1. Dans un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse 1, calculer la longueur des cotés égaux. En déduire $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$.
2. Dans un triangle équilatéral de côté 1, tracer une hauteur. Calculer la longueur de cette hauteur. En déduire $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$, $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

Coup de pouce 1. Pour convertir de degrés en radians, multiplie l'angle par $\frac{\pi}{180}$ et simplifie la fraction.

Coup de pouce 1. Pour convertir de radians en degrés, multiplie l'angle par $\frac{180}{\pi}$. Le π se simplifie.

Coup de pouce 1. Pour trouver la mesure principale, ajoute ou retranche des multiples de 2π jusqu'à tomber dans $] -\pi; \pi]$.

Coup de pouce 1. Les coordonnées du point associé à t sont $(\cos t; \sin t)$. Utilise les valeurs remarquables et les formules de symétrie.

Coup de pouce 1. Utilise le tableau des valeurs remarquables : retiens que le cosinus diminue de 0 à $\frac{\pi}{2}$ et que le sinus augmente.

Coup de pouce 1. Écris chaque angle sous la forme $-x$, $\pi - x$ ou $\pi + x$ avec x un angle du premier quadrant, puis applique la formule de symétrie.

Coup de pouce 1. Utilise $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ pour trouver l'autre valeur. Attention au signe : il dépend du quadrant.

Coup de pouce 1. Chaque angle se ramène à un angle du premier quadrant : $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4}$, $\frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6}$.

TD contextualise — La grande roue

Mise en situation

Une grande roue de fête foraine a un rayon de 25 m et son centre est situé à 27 m du sol. Un passager monte dans une nacelle au point le plus bas de la roue. On note θ l'angle (en radians) parcouru depuis ce point le plus bas, dans le sens trigonométrique.

La hauteur $h(\theta)$ du passager par rapport au sol est modélisée par :

$$h(\theta) = 27 - 25 \cos \theta.$$

Partie A — Premières observations

Exercice 21 ◆

1. Calculer $h(0)$. Quelle est la hauteur du passager au départ ?
2. Calculer $h(\pi)$. Quelle est la hauteur du passager au point le plus haut ?
3. Calculer $h\left(\frac{\pi}{3}\right)$. Donner la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième.
4. Pour quelle(s) valeur(s) de $\theta \in [0; 2\pi]$ le passager est-il à 27 m du sol ?

Partie B — Étude de la hauteur

Exercice 22 ◆◆

1. Dresser le tableau de variations de h sur $[0; 2\pi]$ en utilisant les variations de la fonction cosinus.
2. À quelle(s) valeur(s) de θ le passager atteint-il une hauteur de 39,5 m ? Résoudre $h(\theta) = 39,5$, soit $\cos \theta = -\frac{1}{2}$.

3. La grande roue fait un tour complet en 3 minutes. Exprimer θ en fonction du temps t (en minutes).
En deduire la hauteur en fonction de t .

TD fil rouge — Des angles aux fonctions trigonometriques

Etape 1 — Cercle trigonometrique et radian (C1)

Exercice 23 ♦

1SPE-TRIGO-TD-FR-1
⌚ 8 min

- Convertir en radians : $150^\circ, 210^\circ, 315^\circ, 720^\circ$.
- Convertir en degres : $\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{4}, \frac{11\pi}{6}, 3\pi$.
- Determiner la mesure principale de chacun des angles suivants : $\frac{13\pi}{4}, -\frac{7\pi}{3}, \frac{25\pi}{6}$.

Etape 2 — Valeurs remarquables et symetries (C2)

Exercice 24 ♦

1SPE-TRIGO-TD-FR-2
⌚ 10 min

- Compléter le tableau des valeurs remarquables (sans calculatrice).
- Calculer $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ en utilisant la formule du supplementaire.
- Calculer $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$.
- Verifier que $\cos^2\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \sin^2\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 1$.

QCM d'auto-evaluation — Trigonometrie

Pour chaque question, une seule reponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Cercle trigonometrique, radian, angles orientes

- [Q1] Quelle est la mesure en radians de 60° ?
 A. $\frac{\pi}{6}$
 B. $\frac{\pi}{4}$
 C. $\frac{\pi}{3}$
 D. $\frac{\pi}{2}$
- [Q2] Quelle est la mesure principale de $\frac{9\pi}{4}$?
 A. $\frac{\pi}{4}$
 B. $\frac{9\pi}{4}$
 C. $-\frac{7\pi}{4}$

D. $\frac{5\pi}{4}$

3. [Q3] Combien vaut 180° en radians ?

A. 2π

B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{3\pi}{2}$

C2 — Cosinus, sinus, valeurs remarquables, symétries

4. [Q4] Quelle est la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$?

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 0

5. [Q5] Quelle est la valeur de $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$?

A. $-\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. [Q6] Que vaut $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right)$?

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

Rappel — Theoreme de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carre de l'hypotenuse est egal a la somme des carres des deux autres cotes :

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Ce theoreme est fondamental en trigonometrie car il justifie la relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ sur le cercle trigonometrique.

Exercice 25 ◆

Dans un triangle rectangle, calculer la longueur manquante.

1. $a = 3, b = 4, c = ?$

2. $a = 5, c = 13, b = ?$

3. $a = 1, b = 1, c = ?$

Corrigé

1SPE-TRIG0-FR-R1-EX1

1. $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$

2. $b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12.$

3. $c = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$

Rappel — Coordonnees et distance

Dans un repere orthonorme $(O; \vec{i}, \vec{j})$, un point M a pour coordonnees $(x; y)$.

La distance OM est $OM = \sqrt{x^2 + y^2}.$

Exercice 26



1SPE-TRIG0-FR-R2-EX1

⌚ 5 min

1. Placer les points $A(1;0)$, $B(0;1)$, $C(-1;0)$, $D(0;-1)$ dans un repere.
2. Calculer OA , OB , OC , OD .
3. Ces quatre points sont-ils sur un meme cercle? Lequel?

Corrigé

1SPE-TRIG0-FR-R2-EX1

1. Points places sur les axes.
2. $OA = OB = OC = OD = 1.$
3. Oui, ils sont sur le cercle de centre O et de rayon 1 : le cercle trigonometrique.

Exercice 27



1SPE-TRIG0-RE-C1-EX1

⌚ 8 min

1. Convertir en radians : $90^\circ, 135^\circ, 240^\circ, 300^\circ.$
2. Convertir en degres : $\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}.$
3. Determiner la mesure principale de $\frac{15\pi}{4}$ et de $-\frac{10\pi}{3}.$

Corrigé

1SPE-TRIG0-RE-C1-EX1

1. $90^\circ = \frac{\pi}{2}, 135^\circ = \frac{3\pi}{4}, 240^\circ = \frac{4\pi}{3}, 300^\circ = \frac{5\pi}{3}.$

2. $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ, \frac{5\pi}{3} = 300^\circ, \frac{7\pi}{6} = 210^\circ.$

3. $\frac{15\pi}{4} - 2\pi = \frac{7\pi}{4}$, puis $\frac{7\pi}{4} - 2\pi = -\frac{\pi}{4}$. Mesure principale : $-\frac{\pi}{4}.$

$-\frac{10\pi}{3} + 4\pi = -\frac{10\pi}{3} + \frac{12\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$. Mesure principale : $\frac{2\pi}{3}.$

Exercice 28



1SPE-TRIG0-RE-C2-EX1

⌚ 8 min

1. Completer de memoire le tableau des valeurs remarquables pour $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}.$
2. Calculer $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right), \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right), \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right).$
3. Sachant que $\cos x = \frac{4}{5}$ et $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, calculer $\sin x.$

1SPE-TRIG0-RE-C2-EX1

Corrigé

$$2. \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}.$$

$$\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}.$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$3. \sin^2 x = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}, \sin x = \frac{3}{5} \text{ (car } x \in [0; \frac{\pi}{2}]).$$

1SPE-TRIG0-EX-001

Multiplier par $\frac{\pi}{180}$.

Corrigé

$$1. 120^\circ = 120 \times \frac{\pi}{180} = \frac{120\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}.$$

$$2. 45^\circ = 45 \times \frac{\pi}{180} = \frac{45\pi}{180} = \frac{\pi}{4}.$$

$$3. 270^\circ = 270 \times \frac{\pi}{180} = \frac{270\pi}{180} = \frac{3\pi}{2}.$$

$$4. 330^\circ = 330 \times \frac{\pi}{180} = \frac{330\pi}{180} = \frac{11\pi}{6}.$$

1SPE-TRIG0-EX-002

Multiplier par $\frac{180}{\pi}$.

Corrigé

$$1. \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} = \frac{180}{3} = 60^\circ.$$

$$2. \frac{5\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = \frac{5 \times 180}{4} = 225^\circ.$$

$$3. \frac{7\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = \frac{7 \times 180}{6} = 210^\circ.$$

$$4. \frac{2\pi}{9} = \frac{2\pi}{9} \times \frac{180}{\pi} = \frac{2 \times 180}{9} = 40^\circ.$$

1SPE-TRIG0-EX-003

Retrancher ou ajouter des multiples de 2π pour obtenir un angle dans $] -\pi; \pi]$.

Corrigé

$$1. \frac{13\pi}{3} = \frac{13\pi}{3} - 2 \times 2\pi = \frac{13\pi}{3} - \frac{12\pi}{3} = \frac{\pi}{3}.$$

La mesure principale est $\frac{\pi}{3}$.

$$2. -\frac{7\pi}{4} = -\frac{7\pi}{4} + 2\pi = -\frac{7\pi}{4} + \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

La mesure principale est $\frac{\pi}{4}$.

$$3. \frac{17\pi}{6} = \frac{17\pi}{6} - 2\pi = \frac{17\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

On a $\frac{5\pi}{6} \in] -\pi; \pi]$, donc la mesure principale est $\frac{5\pi}{6}$.

$$4. -\frac{11\pi}{3} = -\frac{11\pi}{3} + 2 \times 2\pi = -\frac{11\pi}{3} + \frac{12\pi}{3} = \frac{\pi}{3}.$$

La mesure principale est $\frac{\pi}{3}$.

1SPE-TRIG0-EX-004

Le point associé à t a pour coordonnées $(\cos t; \sin t)$.

Corrigé

$$1. M_1 \text{ associe à } \frac{\pi}{6} : M_1 = \left(\cos \frac{\pi}{6}; \sin \frac{\pi}{6} \right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2} \right).$$

2. M_2 associe a $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3} : M_2 = \left(-\cos \frac{\pi}{3}; \sin \frac{\pi}{3} \right) = \left(-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$.

3. M_3 associe a $-\frac{\pi}{4} : M_3 = \left(\cos \frac{\pi}{4}; -\sin \frac{\pi}{4} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

4. M_4 associe a $\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4} : M_4 = \left(-\cos \frac{\pi}{4}; -\sin \frac{\pi}{4} \right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

Corrigé

1SPE-TRIG0-EX-005

1. $\frac{100\pi}{3}$: on calcule $\frac{100}{3 \times 2} = \frac{100}{6} \approx 16,67$. Donc on retranche $16 \times 2\pi$:

$$\frac{100\pi}{3} - 32\pi = \frac{100\pi - 96\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}.$$

Or $\frac{4\pi}{3} > \pi$, donc $\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$.

La mesure principale est $-\frac{2\pi}{3}$.

2. $-\frac{23\pi}{4}$: on calcule $\frac{23}{4 \times 2} = \frac{23}{8} \approx 2,875$. On ajoute $3 \times 2\pi$:

$$-\frac{23\pi}{4} + 6\pi = -\frac{23\pi}{4} + \frac{24\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

La mesure principale est $\frac{\pi}{4}$.

3. $150^\circ = 150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$.

4. Le point $(-1; 0)$ correspond a l'angle π . La mesure principale est π .

Corrigé

1SPE-TRIG0-EX-006

1. L'hexagone regulier divise le cercle en 6 arcs egaux. L'angle au centre est $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$.

2. Les mesures associees sont : $A_1 \leftrightarrow \frac{\pi}{3}, A_2 \leftrightarrow \frac{2\pi}{3}, A_3 \leftrightarrow \pi, A_4 \leftrightarrow \frac{4\pi}{3}, A_5 \leftrightarrow \frac{5\pi}{3}$.

3. Coordonnees :

► $A_0 = (1; 0)$

► $A_1 = \left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

► $A_2 = \left(-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

► $A_3 = (-1; 0)$

► $A_4 = \left(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

► $A_5 = \left(\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

4. $A_3 = (\cos \pi; \sin \pi) = (-1; 0)$. ✓

Corrigé

1SPE-TRIG0-EX-007

1. $1' = \frac{1}{60}^\circ = \frac{1}{60} \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{10800}$ rad.

- La longueur d'un mille nautique est $\ell = R\theta = 6371 \times \frac{\pi}{10800} \approx 1,852$ km.
- $5^\circ = 5 \times 60 = 300$ minutes d'arc, soit 300 milles nautiques.

1SPE-TRIGO-EX-008

Corrigé

- La longueur de l'arc est $\ell = R\theta = 3 \times \frac{2\pi}{5} = \frac{6\pi}{5}$ cm $\approx 3,77$ cm.
- On cherche θ tel que $3\theta = \pi$, donc $\theta = \frac{\pi}{3}$ rad.
- Sur un cercle de rayon R , le périmètre complet est $2\pi R$ pour un angle de 2π rad. Par proportionnalité, un angle θ correspond à un arc de longueur $\ell = \frac{\theta}{2\pi} \times 2\pi R = R\theta$.

1SPE-TRIGO-EX-009

Corrigé

- L'aire du disque est πR^2 pour un angle de 2π . Par proportionnalité : $A = \frac{\theta}{2\pi} \times \pi R^2 = \frac{1}{2} R^2 \theta$.
- $A = \frac{1}{2} \times 5^2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{25\pi}{6} \approx 13,09$ cm².
- On veut $\frac{1}{2} R^2 \theta = \frac{1}{4} \pi R^2$, soit $\theta = \frac{\pi}{2}$ rad = 90° .

1SPE-TRIGO-EX-010

Corrigé

- $15^\circ = 15 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{12}$ rad.
- L'amplitude totale d'un aller simple est $2 \times 15^\circ = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$ rad. La longueur d'arc est $\ell = L\theta = 2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \approx 1,05$ m.
- Une oscillation complète (aller-retour) correspond à $2\ell = \frac{2\pi}{3}$ m. En une minute, 30 oscillations : distance = $30 \times \frac{2\pi}{3} = 20\pi \approx 62,83$ m.

1SPE-TRIGO-EX-011

Corrigé

- $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.
- $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$.

1SPE-TRIGO-EX-012

Corrigé

$$\begin{aligned}\cos(-x) &= \cos x, \\ \sin(-x) &= -\sin x, \\ \cos(\pi - x) &= -\cos x, \\ \sin(\pi + x) &= -\sin x.\end{aligned}$$

- $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ (cosinus est pair).
- $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$ (sinus est impair).
- $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- $\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Corrigé

$$1. \cos^2 x + \sin^2 x = 1, \text{ donc } \sin^2 x = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

$$\text{Comme } x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], \sin x \geq 0, \text{ donc } \sin x = \frac{4}{5}.$$

$$2. \cos^2 x = 1 - \left(-\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}.$$

$$\text{Comme } x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right], \cos x \leq 0, \text{ donc } \cos x = -\frac{12}{13}.$$

$$3. \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9+16}{25} = 1 \checkmark \quad \text{et} \quad \left(-\frac{12}{13}\right)^2 + \left(-\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{144+25}{169} = 1 \checkmark.$$

Corrigé

$$1. \frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6} : \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

$$2. \frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + 2\pi : \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$3. \frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6} + 2\pi : \cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}.$$

Corrigé

$$1. A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - (-1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 2.$$

$$2. B = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{1-\sqrt{6}}{4}.$$

$$3. C = \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{On remarque que } C = \cos\left(2 \times \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}. \checkmark$$

Corrigé

$$1. \cos x + \cos(\pi - x) = \cos x + (-\cos x) = 0.$$

$$2. \sin x + \sin(\pi - x) = \sin x + \sin x = 2 \sin x.$$

$$3. \sin x \sin(\pi - x) + \cos x \cos(\pi - x) = \sin x \cdot \sin x + \cos x \cdot (-\cos x) = \sin^2 x - \cos^2 x = -\cos(2x).$$

Corrigé

$$1. \sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \frac{49}{625} = \frac{576}{625}. \text{ Comme } x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[, \sin x > 0, \text{ donc } \sin x = \frac{24}{25}.$$

$$2. \cos(\pi - x) = -\cos x = -\frac{7}{25} \text{ et } \sin(\pi - x) = \sin x = \frac{24}{25}.$$

$$3. \cos(\pi + x) = -\cos x = -\frac{7}{25} \text{ et } \sin(\pi + x) = -\sin x = -\frac{24}{25}.$$

$$4. \cos(-x) = \cos x = \frac{7}{25} \text{ et } \sin(-x) = -\sin x = -\frac{24}{25}.$$

Corrigé

$$1. (\cos x + \sin x)^2 = \cos^2 x + 2 \cos x \sin x + \sin^2 x = 1 + 2 \cos x \sin x.$$

2. On a bien $(\cos x + \sin x)^2 = 1 + 2 \cos x \sin x$ d'après $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

3. $(\cos x - \sin x)^2 = \cos^2 x - 2 \cos x \sin x + \sin^2 x = 1 - 2 \cos x \sin x$.

4. Si $\cos x + \sin x = \frac{7}{5}$, alors $\left(\frac{7}{5}\right)^2 = 1 + 2 \cos x \sin x$, d'où $\cos x \sin x = \frac{49/25 - 1}{2} = \frac{12}{25}$.

$$(\cos x - \sin x)^2 = 1 - 2 \times \frac{12}{25} = \frac{1}{25}.$$

Comme $x \in \left]0; \frac{\pi}{4}\right[$, $\cos x > \sin x$, donc $\cos x - \sin x = \frac{1}{5}$.

1SPE-TRIGO-EX-019

Corrigé

1. Par la formule d'addition : $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos \frac{\pi}{2} \cos x + \sin \frac{\pi}{2} \sin x = 0 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x = \sin x$.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin \frac{\pi}{2} \cos x - \cos \frac{\pi}{2} \sin x = 1 \cdot \cos x - 0 \cdot \sin x = \cos x.$$

2. En remplaçant x par $-x$ dans $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$: $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin(-x) = -\sin x$.

En remplaçant x par $-x$ dans $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$: $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(-x) = \cos x$.

3. $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

1SPE-TRIGO-EX-020

Corrigé

1. Soit un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse 1. Si les cotes égaux mesurent a , alors $a^2 + a^2 = 1$, soit $2a^2 = 1$, d'où $a = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

L'angle à la base vaut $\frac{\pi}{4}$, donc $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. Triangle équilatéral de cote 1 : la hauteur h partage la base en deux segments de longueur $\frac{1}{2}$.

Par Pythagore : $h^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1^2$, d'où $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

L'angle au sommet vaut $\frac{\pi}{3}$ et le demi-angle à la base vaut $\frac{\pi}{6}$:

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{h}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}.$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{h}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

CHAPITRE 7

Produit scalaire

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer un produit scalaire (definition geometrique, projection, expression analytique).
- ▶ C2 — Je sais utiliser les proprietes du produit scalaire (bilinearite, symetrie, norme).
- ▶ C3 — Je sais determiner l'orthogonalite de deux vecteurs et calculer un angle.
- ▶ C4 — Je sais utiliser le produit scalaire dans des problemes geometriques (mediatrice, hauteurs, aires).
- ▶ C5 — Je sais appliquer la formule d'Al-Kashi et en connais la demonstration.

Un randonneur se deplace de 5 km vers le nord-est puis de 3 km vers le sud-est. Quelle distance le separe de son point de depart? Comment calculer l'angle entre deux trajets dans le plan?

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

7.1 Produit scalaire de deux vecteurs

Le produit scalaire est une opération qui associe à deux vecteurs un nombre réel. Il permet de traduire algébriquement des notions géométriques comme l'angle, l'orthogonalité et la projection.

DÉFINITION PRODUIT SCALAIRE (DEFINITION GEOMETRIQUE)

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre réel :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

ou $(\vec{u}, \vec{v})$ désigne l'angle orienté des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Si l'un des deux vecteurs est nul, on pose $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Propriété Cas particuliers.

- ▶ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires de même sens : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.
- ▶ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires de sens contraire : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.
- ▶ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- ▶ $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

DÉFINITION PRODUIT SCALAIRE PAR PROJECTION

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. Si H est le projeté orthogonal de l'extrémité de $\vec{v}$ sur la droite portant $\vec{u}$, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \overline{OH}$$

ou $\overline{OH}$ est la mesure algébrique de la projection.

DÉFINITION EXPRESSION ANALYTIQUE

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

Exemple. Calculer le produit scalaire de $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + (-1) \times 5 = 6 - 5 = 1.$$

Exemple. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vérifient $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 3$ et l'angle entre eux est $\frac{\pi}{3}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 3 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 12 \times \frac{1}{2} = 6.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le cosinus dans la définition géométrique et écrire $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$. Le cosinus de l'angle est indispensable.

ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser la formule analytique $x_1 x_2 + y_1 y_2$ dans un repère non orthonormé. Cette formule n'est valable que dans un repère **orthonormé**.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire que le produit scalaire est un vecteur. Le produit scalaire est un **nombre réel**.

Contre-exemple. Dans un repère non orthonorme, $\vec{i} \cdot \vec{j} \neq 0$ en général. On ne peut alors pas utiliser la formule $x_1x_2 + y_1y_2$.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le produit scalaire se généralise en dimension n : pour $\vec{u} = (x_1, \dots, x_n)$ et $\vec{v} = (y_1, \dots, y_n)$, on pose $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{k=1}^n x_k y_k$. Cette notion est fondamentale en algèbre linéaire et en physique.

7.2 Propriétés du produit scalaire

Propriété Symétrie. Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}.$$

Propriété Bilinearité. Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tout réel λ :

- ▶ $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ (distributivité) ;
- ▶ $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v})$ (homogénéité).

Propriété Norme et produit scalaire. Pour tout vecteur $\vec{u}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2.$$

En particulier, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dans un repère orthonorme : $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$.

Le produit scalaire vérifie des propriétés algébriques remarquables qui permettent de développer et factoriser des expressions vectorielles, exactement comme les nombres réels.

THÉORÈME IDENTITÉS REMARQUABLES VECTORIELLES

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \quad (7.1)$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \quad (7.2)$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 \quad (7.3)$$

Démonstration. Démonstration de l'expression analytique (exigible).

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ dans un repère orthonorme $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On écrit $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$ et $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$.

Par bilinéarité du produit scalaire :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= (x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) \cdot (x_2\vec{i} + y_2\vec{j}) \\ &= x_1x_2(\vec{i} \cdot \vec{i}) + x_1y_2(\vec{i} \cdot \vec{j}) + y_1x_2(\vec{j} \cdot \vec{i}) + y_1y_2(\vec{j} \cdot \vec{j}). \end{aligned}$$

Or le repère est orthonorme : $\vec{i} \cdot \vec{i} = \|\vec{i}\|^2 = 1$, $\vec{j} \cdot \vec{j} = 1$ et $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$ (orthogonalité).

Donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$.

Exemple. Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ donc } \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 16 + 1 = 17 \text{ et } \|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{17}.$$

Vérification par l'identité : $\|\vec{u}\|^2 = 5$, $\|\vec{v}\|^2 = 10$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 2 = 1$. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 5 + 2 \times 1 + 10 = 17$. ✓

ERREUR FRÉQUENTE

Ecrire $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$. C'est faux en général : il manque le terme $2\vec{u} \cdot \vec{v}$. L'égalité n'est vraie que si $\vec{u} \perp \vec{v}$ (théorème de Pythagore).

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v}$. Le produit scalaire est un réel, son carré est $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$, a ne pas confondre avec $\|\vec{u}\|^2$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier que le produit scalaire est un nombre réel, pas un vecteur. On ne peut pas écrire $\vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v}$.

7.3 Orthogonalité et calcul d'angles

Le produit scalaire fournit un critère algébrique simple pour l'orthogonalité et permet de calculer l'angle entre deux vecteurs sans mesure directe.

THÉORÈME CRITÈRE D'ORTHOGONALITÉ

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.

Propriété Calcul de l'angle entre deux vecteurs. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. L'angle $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$ vérifie :

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}.$$

Exemple. Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Calculer l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 + 0 = 1, \|\vec{u}\| = \sqrt{2}, \|\vec{v}\| = 1.$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta = \frac{\pi}{4}.$$

Exemple. Montrer que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 4 + (-2) \times 6 = 12 - 12 = 0.$$

Comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Propriété Orthogonalité de droites. Dans un repère orthonormé, deux droites de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont perpendiculaires si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier que les vecteurs sont non nuls avant de calculer l'angle. La formule $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ suppose $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$.

ERREUR FRÉQUENTE

Calculer $\cos \theta$ mais oublier de passer à l'angle θ par $\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}\right)$.

ERREUR FRÉQUENTE

Conclure que deux vecteurs sont parallèles quand leur produit scalaire est non nul. Un produit scalaire non nul signifie seulement qu'ils ne sont pas orthogonaux.

7.4 Applications geometriques

THÉORÈME MEDIATRICE ET PRODUIT SCALAIRE

Soit $[AB]$ un segment et M un point du plan. Alors :

$$M \in \text{mediatrice de } [AB] \iff \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \frac{\|\overrightarrow{MA}\|^2 + \|\overrightarrow{MB}\|^2 - \|\overrightarrow{AB}\|^2}{2}$$

Plus directement :

$$M \in \text{mediatrice de } [AB] \iff \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB}\|^2$$

ou, de manière équivalente, $MA = MB$.

Le produit scalaire permet de traduire algébriquement des propriétés géométriques classiques : médiatrice, hauteurs d'un triangle, calcul d'aires.

Propriété Caractérisation vectorielle de la médiatrice. M appartient à la médiatrice de $[AB]$ si et seulement si :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \quad (\text{avec } I \text{ milieu de } [AB] : \overrightarrow{IM} \perp \overrightarrow{AB})$$

Autrement dit, en posant I milieu de $[AB]$: M est sur la médiatrice ssi $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

Propriété Hauteur d'un triangle. Dans un triangle ABC , la hauteur issue de A est la droite passant par A et perpendiculaire à (BC) . Le pied H de cette hauteur vérifie :

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0.$$

Propriété Aire d'un triangle. L'aire d'un triangle ABC est donnée par :

$$A = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times |\sin(\widehat{BAC})|.$$

On peut calculer $\sin(\widehat{BAC})$ à partir de $\cos(\widehat{BAC})$ obtenu par le produit scalaire, en utilisant $\sin^2 + \cos^2 = 1$.

Exemple. Soit $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $C(1;3)$. Calculer l'aire du triangle ABC .

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4, \|\overrightarrow{AB}\| = 4, \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{10}.$$

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{4}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}, \text{ donc } \sin(\widehat{BAC}) = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

$$A = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{10} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = 6.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre médiatrice et médiane. La médiatrice de $[AB]$ est perpendiculaire à AB et passe par le milieu ; la médiane relie un sommet au milieu du côté opposé.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur $\frac{1}{2}$ dans la formule de l'aire du triangle.

ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas savoir traduire « M appartient à la médiatrice de $[AB]$ » en équation vectorielle.

7.5 Formule d'Al-Kashi

La formule d'Al-Kashi généralise le théorème de Pythagore à tout triangle, en reliant les longueurs des trois côtés à l'un des angles. Sa démonstration par le produit scalaire est exigible.

THÉORÈME FORMULE D'AL-KASHI

Dans un triangle ABC , en notant $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC}).$$

De même, par permutation circulaire :

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\widehat{ABC}), \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\widehat{ACB}).$$

Démonstration. Démonstration de la formule d'Al-Kashi (exigible).

Dans le triangle ABC , on a $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$.

On calcule $BC^2 = \|\vec{BC}\|^2 = \vec{BC} \cdot \vec{BC}$:

$$\begin{aligned} a^2 &= \|\vec{AC} - \vec{AB}\|^2 \\ &= (\vec{AC} - \vec{AB}) \cdot (\vec{AC} - \vec{AB}) \\ &= \|\vec{AC}\|^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \|\vec{AB}\|^2 \\ &= b^2 + c^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}. \end{aligned}$$

Or $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \|\vec{AB}\| \times \|\vec{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC}) = c \times b \times \cos(\widehat{BAC})$.

Donc $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC})$.

Propriété Cas particulier : theoreme de Pythagore. Si $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{2}$, alors $\cos(\widehat{BAC}) = 0$ et la formule d'Al-Kashi donne :

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

C'est le theoreme de Pythagore.

Propriété Formule de la mediane. Soit M le milieu de $[BC]$. Alors :

$$AM^2 = \frac{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}{4}.$$

Exemple. Dans un triangle ABC avec $AB = 8$, $AC = 5$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.

Calculer BC .

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 64 + 25 - 2 \times 8 \times 5 \times \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49.$$

Donc $BC = 7$.

Exemple. Dans un triangle ABC avec $a = 7$, $b = 5$, $c = 8$. Calculer $\widehat{BAC}$.

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 64 - 49}{2 \times 5 \times 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}.$$

Donc $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.

ERREUR FRÉQUENTE

Se tromper dans l'attribution des cotes et des angles dans la formule d'Al-Kashi. Le cote isole au premier membre est **toujours** le cote oppose a l'angle utilise.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le signe moins dans $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{A})$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la formule d'Al-Kashi avec la loi des sinus $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, qui est une autre relation dans le triangle.

POUR ALLER PLUS LOIN

La formule d'Al-Kashi est aussi appelée « loi des cosinus » ou « theoreme de la generalisation de Pythagore ». Elle est connue depuis l'Antiquite (Euclide) mais a ete systematisee par le mathematicien persan Al-Kashi au XV^e siecle.

MÉTHODE M1 — CALCULER UN PRODUIT SCALAIRE

Quand l'utiliser. J'utilise cette methode lorsque l'enonce demande de calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, soit a partir des normes et de l'angle, soit a partir des coordonnees.

La methode pas à pas.

1. Si je connais les coordonnees de $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ dans un repere **orthonorme** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$.
2. Si je connais les normes et l'angle : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$.
3. Si je connais une projection : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \overline{OH}$ ou H est le projete orthogonal.

Exemple rédigé. Calculons $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 4 + (-3) \times 1 = 8 - 3 = 5$.

Les pièges.

- Utiliser la formule analytique dans un repere non orthonorme.
- Oublier le cosinus dans la formule geometrique.
- Confondre le produit scalaire (nombre reel) avec un vecteur.

Vérifier son résultat. Je verifie le signe : si l'angle est aigu, le produit scalaire est positif ; si l'angle est obtus, il est negatif.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — DEVELOPPER ET REDUIRE AVEC LE PRODUIT SCALAIRE

Quand l'utiliser. J'utilise cette methode lorsque l'enonce demande de developper $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$, $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$ ou $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$, ou de calculer une norme a partir du produit scalaire.

La methode pas à pas.

1. J'identifie l'expression a developper.
2. J'applique l'identite remarquable correspondante :
 - $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$;
 - $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$;
 - $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.
3. Je remplace par les valeurs connues et je simplifie.

Exemple rédigé. Calculons $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ sachant que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 2 \times (-6) + 16 = 9 - 12 + 16 = 13$. Donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{13}$.

Les pièges.

- Ecrire $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ en oubliant $2\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- Confondre $\|\vec{u}\|^2$ et $\vec{u}^2$ (notation abusive).
- Oublier que $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$, pas $\|\vec{u}\|$.

Vérifier son résultat. Si $\vec{u} \perp \vec{v}$, on retrouve le theoreme de Pythagore : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$.

Etape 1 : coordonnees connues, repere orthonorme.

Etape 2 : identite remarquable.
Etape 3 : conclusion.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — MONTRER L'ORTHOGONALITE OU CALCULER UN ANGLE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de montrer que deux droites ou vecteurs sont perpendiculaires, ou de calculer l'angle entre deux vecteurs.

La méthode pas à pas.

1. Je calcule le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ (par coordonnées ou géométriquement).
2. **Pour l'orthogonalité :** je vérifie que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
3. **Pour l'angle :** je calcule $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$ puis $\theta = \arccos(\cos \theta)$.
4. Je vérifie que $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$ avant de diviser par les normes.

Exemple rédigé. Montrons que $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times (-4) + 2 \times 6 = -12 + 12 = 0$. Comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Etape 1 : calcul du produit scalaire.
Etape 2 : conclusion.

Les pièges.

- Conclure que deux vecteurs sont parallèles si $\vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0$.
- Oublier de vérifier que les vecteurs sont non nuls pour le calcul d'angle.
- Confondre $\cos \theta$ et θ : il faut passer par $\arccos$.

Vérifier son résultat. Pour l'orthogonalité, je vérifie en faisant un dessin rapide ou en utilisant la condition $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — RESOUDRE UN PROBLÈME GEOMÉTRIQUE AVEC LE PRODUIT SCALAIRE

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de trouver une médiatrice, une hauteur, une projection ou une aire à l'aide du produit scalaire.

La méthode pas à pas.

1. **Médiatrice :** M est sur la médiatrice de $[AB]$ ssi $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ (avec I milieu de $[AB]$), ou de manière équivalente $MA = MB$.
2. **Hauteur :** le pied H de la hauteur issue de A dans le triangle ABC vérifie $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.
3. **Aire :** $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v})$ avec $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$.

Exemple rédigé. Soit $A(1;3)$ et $B(5;1)$. Déterminer l'équation de la médiatrice de $[AB]$. $I = (3;2)$ et $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$. $M(x;y)$ est sur la médiatrice ssi $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : (x-3) \times 4 + (y-2) \times (-2) = 0$, soit $4x - 2y - 8 = 0$, c'est-à-dire $2x - y = 4$.

Etape 1 : milieu I et vecteur directeur.

Les pièges.

- Confondre médiatrice et médiane.
- Oublier le facteur $\frac{1}{2}$ dans la formule de l'aire.
- Ne pas savoir passer de $\cos$ à $\sin$ pour l'aire.

Vérifier son résultat. Pour la médiatrice, je vérifie que le milieu I satisfait l'équation, et que A et B ne la satisfont pas (sauf si $A = B$).

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — APPLIQUER LA FORMULE D'AL-KASHI

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé donne un triangle avec deux cotes et l'angle compris, ou trois cotes, et demande de calculer un cote ou un angle manquant.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les éléments connus : cotes a, b, c et angles $\widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C}$ (le cote a est opposé à l'angle $\widehat{A}$).
2. **Pour trouver un cote :** j'applique $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{A}$.
3. **Pour trouver un angle :** j'isole $\cos \widehat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ puis $\widehat{A} = \arccos(\dots)$.
4. Je simplifie et je donne le résultat exact ou arrondi selon la consigne.

Exemple rédigé. Dans le triangle ABC , $AB = 6$, $AC = 4$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$. Calculer BC . $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 36 + 16 - 48 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 52 - 24\sqrt{2}$. $BC = \sqrt{52 - 24\sqrt{2}} \approx 4,35$.

Les pièges.

- Se tromper dans l'attribution cote/angle : le cote isolé est opposé à l'angle utilisé.
- Oublier le signe $-$ dans la formule.
- Oublier de prendre la racine carrée à la fin pour obtenir le cote.

Vérifier son résultat. Si l'angle est droit ($\pi/2$), on doit retrouver le théorème de Pythagore. Vérifier aussi que $\cos \widehat{A}$ est entre -1 et 1 .

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Étape 21: Al-Kashi.
Cote cherchée $a = BC$, op-
pose a à $\widehat{A}$.
Étape 4 : résultat.

1SPE-PRODSCAL-EX-001
⌚ 5 min

Exercice 1 ◆

Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans chaque cas.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$
3. $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$

1SPE-PRODSCAL-EX-002
⌚ 5 min

Exercice 2 ◆

Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ à l'aide de la définition géométrique.

1. $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{6}$.
2. $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$.

1SPE-PRODSCAL-EX-003
⌚ 5 min

Exercice 3 ◆

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{u}$ et $\vec{v} \cdot \vec{v}$.

2. En deduire $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.
3. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Exercice 4

Calculer les produits scalaires suivants.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 6$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{4}$.
2. $\vec{a} \cdot \vec{b}$ avec $\|\vec{a}\| = 2$, $\|\vec{b}\| = 3$ et $(\vec{a}, \vec{b}) = \pi$.
3. $\vec{p} \cdot \vec{q}$ avec $\|\vec{p}\| = 7$, $\|\vec{q}\| = 1$ et $(\vec{p}, \vec{q}) = \frac{\pi}{2}$.

1SPE-PRODSCAL-EX-004
⌚ 6 min

Exercice 5

Soient $A(1;2)$, $B(3;5)$ et $C(0;6)$.

1. Calculer les coordonnees de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
3. Calculer les coordonnees de $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$.
4. Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.

1SPE-PRODSCAL-EX-005
⌚ 6 min

Exercice 6

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. Calculer les coordonnees de $\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} - \vec{v}$.
3. Calculer $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$.
4. Verifier que ce resultat est egal a $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.

1SPE-PRODSCAL-EX-006
⌚ 8 min

Exercice 7

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.
2. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
3. En deduire le cosinus de l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
4. Ce produit scalaire est-il positif ou negatif? Que peut-on en deduire sur l'angle?

1SPE-PRODSCAL-EX-007
⌚ 8 min

Exercice 8

Calculer les produits scalaires suivants et preciser si l'angle est aigu, droit ou obtus.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 8$, $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$.
2. $\vec{a} \cdot \vec{b}$ avec $\|\vec{a}\| = 3$, $\|\vec{b}\| = 5$, $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2\pi}{3}$.

1SPE-PRODSCAL-EX-008
⌚ 8 min

Exercice 9

Dans un repere orthonorme, on considere $A(0;0)$, $B(6;0)$ et $C(2;4)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$.
2. En deduire les cosinus des trois angles du triangle ABC .
3. Verifier que la somme des trois angles vaut π .

1SPE-PRODSCAL-EX-009
⌚ 10 min

1SPE-PRODSCAL-EX-010

10 min

Exercice 10

Le vecteur $\vec{u}$ a pour norme 4 et fait un angle de $\frac{\pi}{3}$ avec l'axe des abscisses. Le vecteur $\vec{v}$ a pour norme 3 et fait un angle de $-\frac{\pi}{4}$ avec l'axe des abscisses.

1. Donner les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
2. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ par la formule analytique.
3. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ par la définition géométrique.
4. Vérifier la cohérence des deux résultats.

1SPE-PRODSCAL-EX-011

5 min

Exercice 11

Sachant que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2$, calculer :

1. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$
2. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$
3. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$

1SPE-PRODSCAL-EX-012

6 min

Exercice 12

Démontrer que pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

Indication : développer $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$ par bilinéarité.

1SPE-PRODSCAL-EX-013

6 min

Exercice 13

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\|\vec{u}\|^2$, $\|\vec{v}\|^2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ de deux manières : directement et par l'identité remarquable.
3. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.

1SPE-PRODSCAL-EX-014

8 min

Exercice 14

1. Démontrer l'identité de polarisation : pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2).$$

2. En déduire une autre forme : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2).$

1SPE-PRODSCAL-EX-015

8 min

Exercice 15

Sachant que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$, développer et calculer :

1. $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + 3\vec{v})$
2. $\|3\vec{u} + \vec{v}\|^2$

1SPE-PRODSCAL-EX-016

6 min

Exercice 16

On sait que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 7$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

1SPE-PRODSCAL-EX-017

8 min

Exercice 17

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
2. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ par l'identité remarquable.
3. Vérifier que le théorème de Pythagore est bien vérifié : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$.

Exercice 18

1SPE-PRODSCAL-EX-018
⌚ 8 min

Montrer que $(\vec{u} + \vec{v}) \perp (\vec{u} - \vec{v})$ si et seulement si $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$.

Interprétation géométrique : dans un parallélogramme dont les cotés sont égaux (losange), les diagonales sont perpendiculaires.

Exercice 19

1SPE-PRODSCAL-EX-019
⌚ 10 min

Identité du parallélogramme. Démontrer que pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2).$$

Interprétation géométrique : dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des quatre cotés.

Exercice 20

1SPE-PRODSCAL-EX-020
⌚ 10 min

Sachant que $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\| = 7$, calculer :

1. $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. L'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
3. $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.

Exercice 21

1SPE-PRODSCAL-EX-021
⌚ 5 min

Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$ sont-ils orthogonaux ? Justifier.

Exercice 22

1SPE-PRODSCAL-EX-022
⌚ 5 min

Montrer que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux.

Exercice 23

1SPE-PRODSCAL-EX-023
⌚ 6 min

Calculer l'angle entre $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 24

1SPE-PRODSCAL-EX-024
⌚ 6 min

Montrer que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -1 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux. En déduire que les droites de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont perpendiculaires.

Exercice 25

1SPE-PRODSCAL-EX-025
⌚ 8 min

Soient $A(1;3)$, $B(4;1)$ et $C(-1;0)$.

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle. Préciser en quel sommet.
2. Calculer les longueurs des trois cotés.

Exercice 26

1SPE-PRODSCAL-EX-026
⌚ 6 min

Déterminer la valeur de k pour que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix}$ soient orthogonaux.

1SPE-PRODSCAL-EX-027
⌚ 8 min

Exercice 27 ♦♦

Calculer l'angle entre les droites (d_1) de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et (d_2) de vecteur directeur $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

1SPE-PRODSCAL-EX-028
⌚ 8 min

Exercice 28 ♦♦

Soient $A(0;0)$, $B(1;2)$, $C(3;1)$ et $D(-1;3)$.

1. Montrer que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.
2. Calculer l'angle $(\vec{AB}, \vec{AC})$.

1SPE-PRODSCAL-EX-029
⌚ 10 min

Exercice 29 ♦♦♦

Determiner l'ensemble des couples (k, m) tels que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} k \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ m \end{pmatrix}$ soient orthogonaux. Représenter cet ensemble dans le plan (k, m) .

1SPE-PRODSCAL-EX-030
⌚ 10 min

Exercice 30 ♦♦♦

Soit ABC un triangle équilatéral de cote 2. On place A à l'origine et B en $(2;0)$.

1. Determiner les coordonnées de C (on choisira C avec $y_C > 0$).
2. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ et en déduire l'angle $\widehat{BAC}$.
3. Vérifier que les trois angles du triangle sont égaux à $\frac{\pi}{3}$.

1SPE-PRODSCAL-EX-031
⌚ 6 min

Exercice 31 ♦

Soient $A(1;3)$ et $B(5;1)$. Determiner l'équation de la médiatrice de $[AB]$.

1SPE-PRODSCAL-EX-032
⌚ 8 min

Exercice 32 ♦

Soit $A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(2;4)$. Determiner les coordonnées du pied H de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .

1SPE-PRODSCAL-EX-033
⌚ 6 min

Exercice 33 ♦

Calculer l'aire du triangle ABC avec $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $C(1;3)$.

1SPE-PRODSCAL-EX-034
⌚ 6 min

Exercice 34 ♦

Soient $A(2;1)$ et $B(6;3)$.

1. Determiner l'équation de la médiatrice de $[AB]$.
2. Vérifier que le point $C(3;4)$ appartient à cette médiatrice.

1SPE-PRODSCAL-EX-035
⌚ 8 min

Exercice 35 ♦♦

Dans un triangle ABC , on donne $AB = 5$, $AC = 8$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{6}$.

1. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
2. Calculer l'aire du triangle ABC .

1SPE-PRODSCAL-EX-036
⌚ 8 min

Exercice 36 ♦♦

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer le projete orthogonal de $\vec{v}$ sur $\vec{u}$: $\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$.
2. Verifier que $\vec{v} - \text{proj}_{\vec{u}} \vec{v}$ est orthogonal a $\vec{u}$.

Exercice 37 ♦♦

Soit $A(0;0)$, $B(4;0)$, $C(4;3)$.

1. Montrer que le triangle est rectangle en B .
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Determiner les coordonnees du pied de la hauteur issue de C relative a $[AB]$.

1SPE-PRODSCAL-EX-037
⌚ 8 min

Exercice 38 ♦♦

Soit $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $C(1;3)$.

1. Determiner l'equation de la mediatrice de $[AB]$.
2. Determiner l'equation de la mediatrice de $[AC]$.
3. En deduire les coordonnees du centre Ω du cercle circonscrit au triangle ABC .

1SPE-PRODSCAL-EX-038
⌚ 10 min

Exercice 39 ♦♦♦

Soit $A(0;0)$, $B(5;0)$ et $C(2;3)$.

1. Determiner l'equation de la hauteur issue de A (perpendiculaire a (BC) passant par A).
2. Determiner l'equation de la hauteur issue de B (perpendiculaire a (AC) passant par B).
3. En deduire les coordonnees de l'orthocentre H .

1SPE-PRODSCAL-EX-039
⌚ 10 min

Exercice 40 ♦♦♦

Un triangle ABC a pour sommets $A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(3;4)$.

1. Montrer que le triangle est isocèle en C .
2. Montrer que la mediatrice de $[AB]$ passe par C .
3. Calculer l'aire du triangle.
4. Determiner les coordonnees du pied de la hauteur issue de C .

1SPE-PRODSCAL-EX-040
⌚ 10 min

Exercice 41 ♦

Dans un triangle ABC , on donne $AB = 5$, $AC = 7$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$. Calculer BC .

1SPE-PRODSCAL-EX-041
⌚ 5 min

Exercice 42 ♦

Dans un triangle ABC , on donne $a = BC = 3$, $b = AC = 4$ et $c = AB = 5$.

1. Calculer $\cos \widehat{BAC}$.
2. En deduire $\widehat{BAC}$.
3. Que remarque-t-on?

1SPE-PRODSCAL-EX-042
⌚ 6 min

Exercice 43 ♦♦

Dans un triangle ABC , $a = 8$, $b = 5$, $c = 7$.

1. Calculer les trois angles du triangle.
2. Verifier que la somme des angles vaut π .

1SPE-PRODSCAL-EX-043
⌚ 8 min

1SPE-PRODSCAL-EX-044
8 min

Exercice 44 ♦♦

Dans un triangle ABC , on donne $a = BC = 6$, $b = AC = 10$ et $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{4}$. Calculer $c = AB$.

1SPE-PRODSCAL-EX-045
8 min

Exercice 45 ♦♦

Dans un triangle ABC , $AB = 6$, $AC = 8$ et $BC = 10$.

1. Calculer la longueur de la médiane issue de A à l'aide de la formule de la médiane.
2. Quelle est la nature du triangle ?

1SPE-PRODSCAL-EX-046
6 min

Exercice 46 ♦♦

Montrer que le triangle de cotes 3, 4 et 5 est rectangle en utilisant la formule d'Al-Kashi.

1SPE-PRODSCAL-EX-047
10 min

Exercice 47 ♦♦

Démonstration de la formule d'Al-Kashi.

Dans un triangle ABC , démontrer que $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$ en utilisant le produit scalaire.

1SPE-PRODSCAL-EX-048
8 min

Exercice 48 ♦♦

Dans un triangle ABC , $AB = 7$, $AC = 5$ et $BC = 8$.

1. Calculer $\cos \widehat{BAC}$.
2. Calculer la longueur de la médiane issue de A .

1SPE-PRODSCAL-EX-049
10 min

Exercice 49 ♦♦♦

Un quadrilatère $ABCD$ a pour sommets $A(0;0)$, $B(3;0)$, $C(4;2)$ et $D(1;3)$.

1. Calculer les longueurs des diagonales AC et BD .
2. Montrer que les diagonales ne sont pas perpendiculaires.
3. Calculer l'angle entre les diagonales.

1SPE-PRODSCAL-EX-050
12 min

Exercice 50 ♦♦♦

Un terrain triangulaire a pour cotes $a = 5$ m, $b = 6$ m et $c = 7$ m.

1. Calculer les trois angles du triangle.
2. En déduire l'aire du terrain par la formule $A = \frac{1}{2}ab \sin \widehat{C}$.
3. Calculer la longueur de la médiane issue du sommet opposé au côté de longueur 7.

Coup de pouce 1. Utiliser la formule analytique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$ si les coordonnées sont connues.

Coup de pouce 2. Sinon, utiliser la formule géométrique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Coup de pouce 1. Utiliser la formule analytique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$ si les coordonnées sont connues.

Coup de pouce 2. Sinon, utiliser la formule géométrique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Coup de pouce 1. Utiliser la formule analytique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$ si les coordonnées sont connues.

Coup de pouce 2. Sinon, utiliser la formule géométrique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Coup de pouce 1. Utiliser la formule analytique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$ si les coordonnées sont connues.

Coup de pouce 2. Sinon, utiliser la formule géométrique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Coup de pouce 1. Utiliser l'identité $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Coup de pouce 2. Se rappeler que $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Coup de pouce 1. Utiliser l'identité $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Coup de pouce 2. Se rappeler que $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Coup de pouce 1. Utiliser l'identité $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Coup de pouce 2. Se rappeler que $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Coup de pouce 1. Utiliser l'identité $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Coup de pouce 2. Se rappeler que $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Coup de pouce 1. Pour montrer l'orthogonalité, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et vérifier qu'il vaut 0.

Coup de pouce 2. Pour l'angle, utiliser $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

Coup de pouce 1. Pour montrer l'orthogonalité, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et vérifier qu'il vaut 0.

Coup de pouce 2. Pour l'angle, utiliser $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

Coup de pouce 1. Pour montrer l'orthogonalité, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et vérifier qu'il vaut 0.

Coup de pouce 2. Pour l'angle, utiliser $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

Coup de pouce 1. Pour montrer l'orthogonalité, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et vérifier qu'il vaut 0.

Coup de pouce 2. Pour l'angle, utiliser $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

Coup de pouce 1. Pour la médiatrice de $[AB]$, utiliser $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ avec I milieu.

Coup de pouce 2. Pour l'aire, utiliser $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$.

Coup de pouce 1. Pour la médiatrice de $[AB]$, utiliser $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ avec I milieu.

Coup de pouce 2. Pour l'aire, utiliser $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$.

Coup de pouce 1. Pour la médiatrice de $[AB]$, utiliser $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ avec I milieu.

Coup de pouce 2. Pour l'aire, utiliser $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$.

Coup de pouce 1. Pour la médiatrice de $[AB]$, utiliser $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ avec I milieu.

Coup de pouce 2. Pour l'aire, utiliser $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$.

Coup de pouce 1. Identifier le côté opposé à l'angle dans la formule d'Al-Kashi.

Coup de pouce 2. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$: le côté a est opposé à l'angle $\hat{A}$.

Coup de pouce 1. Identifier le côté opposé à l'angle dans la formule d'Al-Kashi.

Coup de pouce 2. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$: le côté a est opposé à l'angle $\hat{A}$.

TD — Navigation et cap

Durée : 50 minutes.

Situation

Un bateau quitte le port P et navigue 8 km dans la direction du vecteur $\vec{u}$ (cap nord-est, angle $\frac{\pi}{4}$ avec l'axe est). Il change ensuite de cap et parcourt 5 km dans la direction du vecteur $\vec{v}$ (cap sud-est, angle $-\frac{\pi}{6}$ avec l'axe est). On souhaite calculer la distance totale au port et l'angle entre les deux trajets.

Partie A — Modélisation vectorielle (C1) — 10 min

- Exprimer les coordonnées de $\vec{u}$ dans un repère orthonormé, sachant que $\|\vec{u}\| = 8$ et que $\vec{u}$ fait un angle de $\frac{\pi}{4}$ avec l'axe des abscisses.
- Exprimer les coordonnées de $\vec{v}$ avec $\|\vec{v}\| = 5$ et un angle de $-\frac{\pi}{6}$.

- Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ par la formule analytique.

Partie B — Angle entre les trajets (C3) — 10 min

- Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ par la definition geometrique. En deduire l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
- Verifier la coherence avec la valeur obtenue dans la Partie A.

Partie C — Distance au port (C5) — 15 min

- Le point d'arrivee Q verifie $\overrightarrow{PQ} = \vec{u} + \vec{v}$. Calculer $PQ^2 = \|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ en utilisant l'identite remarquable vectorielle.
- En deduire PQ (arrondir au dixieme).
- Retrouver ce resultat par la formule d'Al-Kashi dans le triangle forme par P , le point intermediaire R (fin du premier trajet) et Q , sachant que $PR = 8$, $RQ = 5$ et l'angle en R est $\pi - \theta$.

Partie D — Synthese (C1, C5) — 15 min

- Le cap de retour direct de Q a P fait un angle α avec l'axe est. Calculer $\cos \alpha$ et $\sin \alpha$ a partir des coordonnees de $\overrightarrow{QP}$.
- Rediger une synthese de 3 a 5 lignes expliquant comment le produit scalaire et la formule d'Al-Kashi permettent de resoudre un probleme de navigation.

TD fil rouge — Le randonneur et le triangle de terrain

Duree : 50 minutes — Toutes les capacites C1 a C5 sont mobilisees.

Accroche

Un randonneur part d'un refuge A , marche 5 km vers le nord-est jusqu'a un sommet B , puis 3 km vers le sud-est jusqu'a un lac C . L'angle $\widehat{ABC} = \frac{2\pi}{3}$. On munit le plan d'un repere orthonorme d'unite 1 km.

Partie A — Produit scalaire et distances (C1, C2) — 10 min

- Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ a l'aide de la definition geometrique.
- En deduire $\|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\|^2$ en utilisant l'identite remarquable vectorielle $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
- Calculer $\|\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}\|^2$. Que represente le vecteur $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}$?

Partie B — Distance AC par Al-Kashi (C5) — 10 min

- Appliquer la formule d'Al-Kashi dans le triangle ABC pour calculer AC .
- Verifier la coherence avec le resultat de la question 3 de la Partie A.

Partie C — Angles et orthogonalité (C3) — 15 min

6. Calculer $\cos(\widehat{BAC})$ à l'aide du produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
7. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.
8. On place D tel que $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$. Montrer que $\overrightarrow{BD}$ est orthogonal à $\overrightarrow{AC}$ si et seulement si $AB = BC$.

Partie D — Aire et hauteur (C4) — 15 min

9. Calculer l'aire du triangle ABC à l'aide de la formule $A = \frac{1}{2} \times AB \times BC \times \sin(\widehat{ABC})$.
10. En déduire la hauteur h issue de A dans le triangle ABC (hauteur relative au côté $[BC]$).
11. Le randonneur souhaite rejoindre le côté $[BC]$ en marchant perpendiculairement. Montrer que la distance minimale est exactement h .

QCM d'auto-évaluation — Produit scalaire

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Produit scalaire : définition et calcul

1. [Q1] Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{v}$?
 A. -5
 B. 5
 C. -11
 D. 11
2. [Q2] Si $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v}$ vaut :
 A. 20
 B. 10
 C. $10\sqrt{3}$
 D. $10\sqrt{2}$
3. [Q3] Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est :
 A. un vecteur
 B. un nombre réel
 C. toujours positif
 D. défini uniquement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls

C2 — Propriétés du produit scalaire

4. [Q4] Que vaut $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$?
 A. $\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$
 B. $\|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
 C. $\|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
 D. $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$
5. [Q5] Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{u}$?
 A. $\|\vec{u}\|$

- B. $\|\vec{u}\|^2$
- C. $2\|\vec{u}\|$
- D. 0

6. [Q6] Si $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$, que vaut $\|\vec{u} + \vec{v}\|$?
- A. 5
 - B. $\sqrt{35}$
 - C. 7
 - D. $\sqrt{25}$

C3 — Orthogonalite et angles

7. [Q7] Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si :
- A. $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$
 - B. $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$
 - C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
 - D. $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$

8. [Q8] Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ sont :
- A. colineaires
 - B. orthogonaux
 - C. de meme norme
 - D. de sens contraire

9. [Q9] L'angle entre $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ vaut :
- A. $\frac{\pi}{6}$
 - B. $\frac{\pi}{4}$
 - C. $\frac{\pi}{3}$
 - D. $\frac{\pi}{2}$

C4 — Applications geometriques

10. [Q10] M appartient a la mediatrice de $[AB]$ si et seulement si :
- A. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$
 - B. $MA = MB$
 - C. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$
 - D. $MA + MB = AB$
11. [Q11] L'aire d'un triangle de cotes a et b formant un angle θ vaut :
- A. $ab \cos \theta$
 - B. $\frac{1}{2}ab \cos \theta$
 - C. $\frac{1}{2}ab \sin \theta$
 - D. $ab \sin \theta$

12. [Q12] Le pied H de la hauteur issue de A dans un triangle ABC vérifie :

- A. $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$
- B. $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$
- C. $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$
- D. $AH = BH$

C5 — Formule d'Al-Kashi

13. [Q13] La formule d'Al-Kashi s'écrit :

- A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos \hat{A}$
- B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$
- C. $a^2 = b^2 - c^2 - 2bc \cos \hat{A}$
- D. $a = b + c - 2bc \cos \hat{A}$

14. [Q14] Dans un triangle avec $b = 5$, $c = 8$ et $\hat{A} = \frac{\pi}{3}$, que vaut a^2 ?

- A. 49
- B. 89
- C. 129
- D. 9

15. [Q15] Si $\hat{A} = \frac{\pi}{2}$, la formule d'Al-Kashi donne :

- A. $a^2 = b^2 - c^2$
- B. $a^2 = b^2 + c^2$
- C. $a^2 = 2bc$
- D. $a = b + c$

Correction et diagnostics

Question	Capacite	Reponse	Distracteurs
Q1	C1	A	B : oubli du signe ; C : erreur de calcul ; D : addition des composantes
Q2	C1	B	A : oubli du cos ; C : confusion cos/sin ; D : mauvais angle
Q3	C1	B	A : confusion avec produit vectoriel ; C : peut etre negatif ; D : defini aussi avec le vecteur nul
Q4	C2	B	A : oubli de $2\vec{u} \cdot \vec{v}$; C : signe du double produit ; D : confusion
Q5	C2	B	A : oubli du carre ; C : confusion ; D : $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$ ssi $\vec{u} = \vec{0}$
Q6	C2	B	A : $\sqrt{25} = 5$ incorrect car $9 + 2 \times 5 + 16 = 35$; C : erreur ; D : $\sqrt{25} = 5 \neq \sqrt{35}$
Q7	C3	C	A/B : signe n'indique pas orthogonalite ; D : norme egale $\neq$ orthogonalite
Q8	C3	B	A : $\det \neq 0$; C : $\ \vec{u}\ = \sqrt{13} = \ \vec{v}\ $ vrai mais ce n'est pas la question ; D : non
Q9	C3	B	A : confusion ; C : confusion ; D : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \neq 0$
Q10	C4	B	A : ce serait un cercle de diametre $[AB]$; C : M serait milieu ; D : non
Q11	C4	C	A : cos au lieu de sin ; B : cos au lieu de sin ; D : oubli du $1/2$
Q12	C4	B	A : ce serait perp a AB ; C : perp a AC ; D : non pertinent
Q13	C5	B	A : signe + au lieu de - ; C : $b^2 - c^2$; D : pas de carre sur a
Q14	C5	A	B : oubli du $-2bc \cos$; C : + au lieu de - ; D : erreur grossiere
Q15	C5	B	A : signe - ; C : formule incorrecte ; D : pas de theoreme de Pythagore

Reponses correctes

Q1	A	Q2	B	Q3	B	Q4	B
Q5	B	Q6	B	Q7	C	Q8	B
Q9	B	Q10	B	Q11	C	Q12	B
Q13	B	Q14	A	Q15	B		

Score : /15 Capacites a retravailler : C1 [☐Q1 ☐Q2 ☐Q3] C2 [☐Q4 ☐Q5 ☐Q6] C3 [☐Q7 ☐Q8 ☐Q9] C4 [☐Q10 ☐Q11 ☐Q12] C5 [☐Q13 ☐Q14 ☐Q15]

Corrige — Evaluation A — Produit scalaire

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + (-1) \times 5 = 6 - 5 = 1$.

Question 2. $\|\vec{u}\| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}$.

Question 3. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 10 + 2 + 29 = 41$.

Donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{41}$.

Vérification directe : $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 25 + 16 = 41$. ✓

Question 4. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 10 - 29 = -19$.

Vérification : $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \end{pmatrix}$. $(5)(1) + (4)(-6) = 5 - 24 = -19$. ✓

Exercice 2 — 5 points

Question 1. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 2 + (-2) \times 3 = 6 - 6 = 0$.

Le triangle ABC est **rectangle en A**.

Question 2. $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 3 + 10 = 13$, $\|\overrightarrow{BA}\| = \sqrt{13}$, $\|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{26}$.

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{13}{\sqrt{13}\sqrt{26}} = \frac{13}{\sqrt{338}} = \frac{13}{13\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Donc } \widehat{ABC} = \frac{\pi}{4}.$$

$$\text{Question 3. } \widehat{ACB} = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

Le triangle est rectangle isocèle en A.

Exercice 3 — 5 points

$$\text{Question 1. } I = (3; 0) \text{ milieu de } [AB] \text{ et } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : 6(x - 3) + 0 = 0, \text{ soit } x = 3.$$

$$\text{Question 2. } \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}. \text{ On paramétrise : } H = B + t\overrightarrow{BC} = (6 - 4t; 4t).$$

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 : (6 - 4t)(-4) + (4t)(4) = 0, \text{ soit } -24 + 32t = 0, \text{ d'où } t = \frac{3}{4}.$$

$$H = (3; 3).$$

$$\text{Question 3. } A = \frac{1}{2}|x_B \cdot y_C - x_C \cdot y_B| = \frac{1}{2}|6 \times 4 - 2 \times 0| = \frac{24}{2} = 12.$$

Exercice 4 — 5 points

$$\text{Question 1. } BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC} = 64 + 25 - 80 \times \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49.$$

$$BC = 7.$$

$$\text{Question 2. } \cos \widehat{ABC} = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2 \cdot BC \cdot AB} = \frac{49 + 64 - 25}{112} = \frac{88}{112} = \frac{11}{14}.$$

$$\text{Question 3. } A = \frac{1}{2} \times AB \times AC \times \sin \widehat{BAC} = \frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \approx 17,3.$$

Evaluation A — Produit scalaire

Duree : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

$$\text{Soient } \vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$. (1 pt)
2. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$. (1 pt)
3. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ par l'identité remarquable. (1,5 pt)
4. Calculer $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ et vérifier que le résultat est $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$. (1,5 pt)

Exercice 2

5 points — C3

Soient $A(1; 2)$, $B(4; 0)$ et $C(3; 5)$.

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle. Préciser en quel sommet. (2 pt)
2. Calculer l'angle $\widehat{ABC}$. (2 pt)
3. En déduire l'angle $\widehat{ACB}$. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C4

Soient $A(0;0)$, $B(6;0)$ et $C(2;4)$.

1. Déterminer l'équation de la médiatrice de $[AB]$. (1,5 pt)
2. Déterminer les coordonnées du pied H de la hauteur issue de A . (2 pt)
3. Calculer l'aire du triangle ABC . (1,5 pt)

Exercice 4

5 points — C5

Dans un triangle ABC , on donne $AB = 8$, $AC = 5$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.

1. Calculer BC à l'aide de la formule d'Al-Kashi. (2 pt)
2. Calculer $\cos \widehat{ABC}$. (1,5 pt)
3. Calculer l'aire du triangle ABC . (1,5 pt)

Corrige — Evaluation B — Produit scalaire

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times (-1) + 2 \times 3 = -4 + 6 = 2$.

Question 2. $\|\vec{u}\| = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$.

Question 3. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 20 - 4 + 10 = 26$.

Donc $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{26}$.

Vérification : $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 25 + 1 = 26$. ✓

Question 4. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 20 - 10 = 10$.

Vérification : $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$. $15 - 5 = 10$. ✓

Exercice 2 — 5 points

Question 1. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 - 6 = 0$.

Le triangle est rectangle en A .

Question 2. $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 3 + 10 = 13$, $\|\overrightarrow{BA}\| = \sqrt{13}$, $\|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{26}$.

$\cos \widehat{ABC} = \frac{13}{\sqrt{13} \times \sqrt{26}} = \frac{13}{13\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\widehat{ABC} = \frac{\pi}{4}$.

Question 3. $\widehat{ACB} = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$. Triangle rectangle isocèle en A .

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $I = (4;0)$, $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix}$. Médiatrice : $8(x - 4) = 0$, soit $x = 4$.

Question 2. $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \end{pmatrix}$. $H = B + t\overrightarrow{BC} = (8 - 5t; 6t)$.

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 : (8 - 5t)(-5) + (6t)(6) = 0, \text{ soit } -40 + 25t + 36t = 0, 61t = 40, t = \frac{40}{61}.$$

$$H = \left(\frac{288}{61}; \frac{240}{61} \right).$$

Question 3. $A = \frac{1}{2} |x_B \cdot y_C - x_C \cdot y_B| = \frac{1}{2} |48 - 0| = 24.$

Exercice 4 — 5 points

Question 1. $BC^2 = 36 + 100 - 120 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 136 - 60\sqrt{2}.$

$$BC = \sqrt{136 - 60\sqrt{2}} \approx 7,15.$$

Question 2. $\cos \widehat{ABC} = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2 \cdot BC \cdot AB} = \frac{136 - 60\sqrt{2} + 36 - 100}{2 \cdot BC \cdot 6} = \frac{72 - 60\sqrt{2}}{12 BC}.$

Numeriquement : $\cos \widehat{ABC} \approx \frac{72 - 84,85}{12 \times 7,15} \approx \frac{-12,85}{85,8} \approx -0,150.$

$$\widehat{ABC} \approx 98,6^\circ.$$

Question 3. $A = \frac{1}{2} \times 6 \times 10 \times \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 30 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 15\sqrt{2} \approx 21,2.$

Evaluation B — Produit scalaire

Duree : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisee.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}.$ (1 pt)
2. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|.$ (1 pt)
3. Calculer $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$ par l'identite remarquable. (1,5 pt)
4. Calculer $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ et verifier que le resultat est $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2.$ (1,5 pt)

Exercice 2

5 points — C3

Soient $A(0;1), B(3;-1)$ et $C(2;4).$

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle. Preciser en quel sommet. (2 pt)
2. Calculer l'angle $\widehat{ABC}.$ (2 pt)
3. En deduire l'angle $\widehat{ACB}.$ (1 pt)

Exercice 3

5 points — C4

Soient $A(0;0), B(8;0)$ et $C(3;6).$

1. Determiner l'equation de la mediatrice de $[AB].$ (1,5 pt)
2. Determiner les coordonnees du pied H de la hauteur issue de $A.$ (2 pt)
3. Calculer l'aire du triangle $ABC.$ (1,5 pt)

Exercice 4

5 points — C5

Dans un triangle ABC , on donne $AB = 6, AC = 10$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}.$

1. Calculer BC à l'aide de la formule d'Al-Kashi. (2 pt)
2. Calculer $\cos \widehat{ABC}$. (1,5 pt)
3. Calculer l'aire du triangle ABC . (1,5 pt)

Rappel — Vecteurs et coordonnées dans le plan

Coordonnées d'un vecteur : Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Somme : $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$.

Produit par un scalaire : $\lambda \vec{u} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \end{pmatrix}$.

1SPE-PRODSCAL-FR-R1-EX1
⌚ 6 min

Exercice 51

Calculer les coordonnées des vecteurs suivants.

1. $\overrightarrow{AB}$ avec $A(1; 3)$ et $B(4; -1)$.
2. $\vec{u} + \vec{v}$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$.
3. $3\vec{u}$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

1SPE-PRODSCAL-FR-R1-EX1

Corrigé

1. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$.
2. $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$.
3. $3\vec{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ 12 \end{pmatrix}$.

Rappel — Norme d'un vecteur

La **norme** d'un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

La **distance** entre $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

1SPE-PRODSCAL-FR-R2-EX1
⌚ 6 min

Exercice 52

Calculer la norme de chaque vecteur.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
2. $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$
3. $\vec{w} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$

1SPE-PRODSCAL-FR-R2-EX1

Corrigé

1. $\|\vec{u}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$.
2. $\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$.
3. $\|\vec{w}\| = \sqrt{25} = 5$.

Rappel — Valeurs remarquables de cos et sin

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Exercice 53

Donner les valeurs exactes.

1. $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$
2. $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$
3. $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$

1SPE-PRODSCAL-FR-R3-EX1

⌚ 5 min

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-FR-R3-EX1

$$1. \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}. 2. \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}. 3. \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Rappel — Identites remarquables

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Exercice 54

Developper et reduire.

1. $(x+3)^2$
2. $(2x-1)^2$
3. $(x+2)(x-2)$

1SPE-PRODSCAL-FR-R4-EX1

⌚ 6 min

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-FR-R4-EX1

$$1. (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9. 2. (2x-1)^2 = 4x^2 - 4x + 1. 3. (x+2)(x-2) = x^2 - 4.$$

Rappel — Theoreme de Pythagore

Dans un triangle rectangle en C : $AB^2 = AC^2 + BC^2$ (ou AB est l'hypotenuse).

Reciproque : Si $AB^2 = AC^2 + BC^2$, alors le triangle est rectangle en C.

Exercice 55

1. Dans un triangle rectangle en C, $AC = 3$ et $BC = 4$. Calculer AB.
2. Le triangle de cotes 5, 12 et 13 est-il rectangle?
3. Le triangle de cotes 3, 5 et 7 est-il rectangle?

1SPE-PRODSCAL-FR-R5-EX1

⌚ 6 min

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-FR-R5-EX1

1. $AB = \sqrt{9+16} = 5$. 2. $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$. Oui, rectangle. 3. $3^2 + 5^2 = 34 \neq 49 = 7^2$. Non, pas rectangle.

Remediation C1 — Calculer un produit scalaire

Exercice 56

Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans chaque cas.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
2. $\|\vec{u}\| = 6, \|\vec{v}\| = 2, \text{angle} = \frac{\pi}{4}$

1SPE-PRODSCAL-RE-C1-EX1

⌚ 6 min

1SPE-PRODSCAL-RE-C1-EX1

Corrigé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 3 = -1$. 2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 12 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}$.

Remediation C2 — Proprietes du produit scalaire

1SPE-PRODSCAL-RE-C2-EX1
⌚ 6 min

Exercice 57 ♦

$\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4$. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$.

Corrigé

$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 4 + 8 + 9 = 21$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{21}$.

Remediation C3 — Orthogonalite et angles

1SPE-PRODSCAL-RE-C3-EX1
⌚ 6 min

Exercice 58 ♦

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ sont-ils orthogonaux ?
2. Calculer l'angle entre $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$.

Corrigé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 - 4 = 0$. Oui, orthogonaux. 2. $\cos \theta = \frac{1}{2}$, donc $\theta = \frac{\pi}{3}$.

Remediation C4 — Applications geometriques

1SPE-PRODSCAL-RE-C4-EX1
⌚ 8 min

Exercice 59 ♦

$A(0;0)$, $B(4;2)$. Determiner l'equation de la mediatrice de $[AB]$.

Corrigé

$I(2;1)$, $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$. $4(x - 2) + 2(y - 1) = 0$, soit $2x + y = 5$.

Remediation C5 — Formule d'Al-Kashi

1SPE-PRODSCAL-RE-C5-EX1
⌚ 6 min

Exercice 60 ♦

Triangle ABC : $AB = 4$, $AC = 6$, $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$. Calculer BC .

Corrigé

$BC^2 = 16 + 36 - 48 \times \frac{1}{2} = 52 - 24 = 28$. $BC = 2\sqrt{7} \approx 5,29$.

1SPE-PRODSCAL-EX-001

Corrigé

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + 4 \times (-1) = 6 - 4 = 2.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 5 + (-2) \times 3 = 5 - 6 = -1.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \times (-3) + 7 \times 2 = 0 + 14 = 14.$

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-002

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times 4 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 20 \times \frac{1}{2} = 10.$

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-003

- $\vec{u} \cdot \vec{u} = 1^2 + 1^2 = 2$ et $\vec{v} \cdot \vec{v} = (-3)^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$
- $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{25} = 5.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times (-3) + 1 \times 4 = -3 + 4 = 1.$

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-004

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 6 \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 24 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2}.$
- $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 3 \times \cos(\pi) = 6 \times (-1) = -6.$
- $\vec{p} \cdot \vec{q} = 7 \times 1 \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 7 \times 0 = 0.$

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-005

- $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times (-1) + 3 \times 4 = -2 + 12 = 10.$
- $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$
- $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (-2) \times (-3) + (-3) \times 1 = 6 - 3 = 3.$

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-006

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 3 + 1 \times (-2) = 6 - 2 = 4.$
- $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 5 \times (-1) + (-1) \times 3 = -5 - 3 = -8.$
- $\|\vec{u}\|^2 = 4 + 1 = 5$ et $\|\vec{v}\|^2 = 9 + 4 = 13.$ Donc $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 5 - 13 = -8.$ ✓

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-007

- $\|\vec{u}\| = \sqrt{16 + 9} = 5$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times (-2) + (-3) \times 1 = -8 - 3 = -11.$

$$3. \cos \theta = \frac{-11}{5\sqrt{5}} = \frac{-11}{5\sqrt{5}} = \frac{-11\sqrt{5}}{25}.$$

4. Le produit scalaire est négatif, donc l'angle θ est obtus ($\theta > \frac{\pi}{2}$).

1SPE-PRODSCAL-EX-008

Corrigé

$$1. \vec{u} \cdot \vec{v} = 6 \times 8 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 48 \times \frac{1}{2} = 24 > 0. \text{ L'angle est aigu.}$$

$$2. \vec{d} \cdot \vec{b} = 3 \times 5 \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 15 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{15}{2} < 0. \text{ L'angle est obtus.}$$

1SPE-PRODSCAL-EX-009

Corrigé

$$1. \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -24, \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = -8 + 16 = 8.$$

$$2. \|\overrightarrow{AB}\| = 6, \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}, \|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$$

$$\cos \hat{A} = \frac{12}{6 \times 2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

$$\cos \hat{B} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{\|\overrightarrow{BA}\| \|\overrightarrow{BC}\|} = \frac{24}{6 \times 4\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\cos \hat{C} = \frac{\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}}{\|\overrightarrow{CA}\| \|\overrightarrow{CB}\|} = \frac{-8}{2\sqrt{5} \times 4\sqrt{2}} = \frac{-1}{\sqrt{10}}.$$

$$3. \hat{B} = \frac{\pi}{4}. \text{ On vérifie que } \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \pi.$$

1SPE-PRODSCAL-EX-010

Corrigé

$$1. \vec{u} = \begin{pmatrix} 4 \cos \frac{\pi}{3} \\ 4 \sin \frac{\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2\sqrt{3} \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \cos(-\frac{\pi}{4}) \\ 3 \sin(-\frac{\pi}{4}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{3\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

$$2. \vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times \frac{3\sqrt{2}}{2} + 2\sqrt{3} \times \left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}\right) = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{6}.$$

$$3. \text{ Angle entre } \vec{u} \text{ et } \vec{v} : \frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{7\pi}{12}. \vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 3 \times \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 12 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{6}.$$

4. Les deux résultats coïncident.

1SPE-PRODSCAL-EX-011

Corrigé

$$1. \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 9 + 2 \times (-2) + 16 = 21. \text{ Donc } \|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{21}.$$

$$2. \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 9 - 2 \times (-2) + 16 = 29. \text{ Donc } \|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{29}.$$

$$3. (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 9 - 16 = -7.$$

1SPE-PRODSCAL-EX-012

Corrigé

$$\text{On a } \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}).$$

Par bilinéarité :

$$\begin{aligned} (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) &= \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} \\ &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2. \end{aligned}$$

On a utilisé la symétrie $\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}$ et la propriété $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-013

1. $\|\vec{u}\|^2 = 4 + 1 = 5$, $\|\vec{v}\|^2 = 1 + 9 = 10$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 3 = -1$.

2. Directement : $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 4 = 13$.

Par l'identité : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 5 + 2 \times (-1) + 10 = 13$. ✓

3. $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{13}$.

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-014

1. On part de $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

En isolant $\vec{u} \cdot \vec{v}$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2}{2}$.

2. On a $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Par soustraction : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 4\vec{u} \cdot \vec{v}$, d'où le résultat.

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-015

1. Par bilinéarité : $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + 3\vec{v}) = 2\|\vec{u}\|^2 + 6\vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{v} - 3\|\vec{v}\|^2 = 2 \times 4 + 5 \times 1 - 3 \times 9 = 8 + 5 - 27 = -14$.

2. $\|3\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9\|\vec{u}\|^2 + 6\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 36 + 6 + 9 = 51$.

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-016

On utilise l'identité de polarisation : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2}{2} = \frac{49 - 9 - 25}{2} = \frac{15}{2}$.

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-017

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times (-2) + 2 \times 1 = -2 + 2 = 0$. Les vecteurs sont orthogonaux.

2. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2 \times 0 + \|\vec{v}\|^2 = 5 + 5 = 10$.

3. Comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, on a bien $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 = 10$. C'est le théorème de Pythagore.

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-018

$(\vec{u} + \vec{v}) \perp (\vec{u} - \vec{v})$ signifie $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 0$.

Or $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.

Donc $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 0 \iff \|\vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 \iff \|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$ (les normes sont positives).

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-019

On développe chaque terme :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

En additionnant : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$.

Les termes en $\vec{u} \cdot \vec{v}$ s'annulent.

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-020

1. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$, donc $49 = 25 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + 9$, d'où $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\frac{15}{2}$.
2. $\cos \theta = \frac{-15/2}{5 \times 3} = \frac{-15}{30} = -\frac{1}{2}$, donc $\theta = \frac{2\pi}{3}$.
3. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 25 + 2 \times (-\frac{15}{2}) + 9 = 25 - 15 + 9 = 9$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 3$.

1SPE-PRODSCAL-EX-021

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times (-3) + 4 \times 6 = -6 + 24 = 18 \neq 0.$$

Les vecteurs ne sont pas orthogonaux.

1SPE-PRODSCAL-EX-022

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 \times (-2) + 3 \times 4 = -12 + 12 = 0.$$

Comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, les vecteurs sont orthogonaux.

1SPE-PRODSCAL-EX-023

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 + 1 = 1, \|\vec{u}\| = \sqrt{2}, \|\vec{v}\| = 1.$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta = \frac{\pi}{4}.$$

1SPE-PRODSCAL-EX-024

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times \sqrt{3} + \sqrt{3} \times (-1) = \sqrt{3} - \sqrt{3} = 0.$$

Comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ et les deux vecteurs sont non nuls, ils sont orthogonaux. Les droites de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc perpendiculaires.

1SPE-PRODSCAL-EX-025

Corrigé

$$1. \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times (-2) + (-2) \times (-3) = -6 + 6 = 0.$$

Le triangle ABC est rectangle en A.

$$2. AB = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}, AC = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}, BC = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}.$$

1SPE-PRODSCAL-EX-026

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 1 + 1 \times k = 3 + k.$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff 3 + k = 0 \iff k = -3.$$

1SPE-PRODSCAL-EX-027

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 - 5 = 1, \|\vec{u}\| = \sqrt{5}, \|\vec{v}\| = \sqrt{34}.$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5} \times \sqrt{34}} = \frac{1}{\sqrt{170}}.$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{170}}\right) \approx 1,49 \text{ rad} \approx 85,6^\circ.$$

1SPE-PRODSCAL-EX-028

Corrigé

1. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$.
 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = -4 + 4 = 0$. Les droites sont perpendiculaires.
2. $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 + 2 = 5$.
 $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{5}$, $\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{10}$.
 $\cos \theta = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\theta = \frac{\pi}{4}$.

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-029

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2k + 3m = 0, \text{ soit } k = -\frac{3m}{2}.$$

L'ensemble des couples (k, m) est la droite d'équation $2k + 3m = 0$ dans le plan (k, m) , passant par l'origine de pente $-\frac{2}{3}$.

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-030

1. $C = (1; \sqrt{3})$ (milieu en abscisse, $y = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$).
2. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 1 + 0 \times \sqrt{3} = 2$. $\|\overrightarrow{AB}\| = 2$, $\|\overrightarrow{AC}\| = 2$. $\cos \widehat{BAC} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, donc $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.
3. Par symétrie du triangle équilatéral, les trois angles sont égaux à $\frac{\pi}{3}$.

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-031

Le milieu de $[AB]$ est $I(3; 2)$ et $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$.

$M(x; y)$ est sur la médiatrice ssi $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : (x-3) \times 4 + (y-2) \times (-2) = 0$, soit $4x - 2y - 8 = 0$, c'est-à-dire $2x - y = 4$.

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-032

$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$. On paramétrise : $H = B + t\overrightarrow{BC} = (6-4t; 4t)$.

$\overrightarrow{AH} = \begin{pmatrix} 6-4t \\ 4t \end{pmatrix}$. La condition $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ donne : $(6-4t)(-4) + 4t \times 4 = 0$, soit $-24 + 16t + 16t = 0$, d'où $t = \frac{3}{4}$.

$$H = (3; 3).$$

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-033

$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4, \|\overrightarrow{AB}\| = 4, \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{10}.$$

$$\cos \hat{A} = \frac{4}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}, \sin \hat{A} = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

$$A = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{10} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = 6.$$

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-034

1. $I = (4; 2), \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$

$\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : 4(x - 4) + 2(y - 2) = 0$, soit $2x + y = 10$.

2. $2 \times 3 + 4 = 10$. ✓ Le point C est sur la médiatrice, donc $CA = CB$.

1SPE-PRODSCAL-EX-035

Corrigé

1. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \times 8 \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 40 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3}.$

2. $A = \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 20 \times \frac{1}{2} = 10.$

1SPE-PRODSCAL-EX-036

Corrigé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 2 = 1$ et $\|\vec{u}\|^2 = 5.$

$\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}.$

2. $\vec{v} - \text{proj} = \begin{pmatrix} 3 - 1/5 \\ -1 - 2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14/5 \\ -7/5 \end{pmatrix}.$
 $\begin{pmatrix} 14/5 \\ -7/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{14}{5} - \frac{14}{5} = 0. \checkmark$

1SPE-PRODSCAL-EX-037

Corrigé

1. $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$

$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$. Le triangle est rectangle en B.

2. $A = \frac{1}{2} \times BA \times BC = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6.$

3. La hauteur issue de C relative à $[AB]$ est la perpendiculaire à (AB) passant par C. Comme (AB) est l'axe des abscisses, le pied est $H(4; 0) = B$.

1SPE-PRODSCAL-EX-038

Corrigé

1. $I_{AB} = (2; 0), \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$. Médiatrice : $4(x - 2) = 0$, soit $x = 2$.

2. $I_{AC} = (1/2; 3/2), \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Médiatrice : $(x - 1/2) + 3(y - 3/2) = 0$, soit $x + 3y = 5$.

3. $x = 2$ et $2 + 3y = 5$, donc $y = 1$. Le centre est $\Omega(2; 1)$.

1SPE-PRODSCAL-EX-039

Corrigé

1. $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}$. Hauteur issue de A : $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, soit $-3x + 3y = 0$, d'où $x = y$.

2. $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Hauteur issue de B : $2(x - 5) + 3y = 0$, soit $2x + 3y = 10$.

3. $x = y$ et $2x + 3x = 10$, donc $x = 2, y = 2$. L'orthocentre est $H(2; 2)$.

1SPE-PRODSCAL-EX-040

Corrigé

1. $CA = \sqrt{9+16} = 5$ et $CB = \sqrt{9+16} = 5$. Donc $CA = CB$: triangle isocèle en C.
2. La médiatrice de $[AB]$ a pour équation $x = 3$ (milieu $(3;0)$, $\overline{AB}$ horizontal). Or $x_C = 3$, donc C est sur la médiatrice.
3. $A = \frac{1}{2} \times AB \times h = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$.
4. La hauteur issue de C est perpendiculaire à (AB) (axe Ox), donc $H = (3;0)$ (le pied est le projeté de C sur (AB)).

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-041

Par la formule d'Al-Kashi : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} = 25 + 49 - 70 \times \frac{1}{2} = 74 - 35 = 39$.

$$BC = \sqrt{39} \approx 6,24.$$

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-042

1. $\cos \widehat{BAC} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{16 + 25 - 9}{40} = \frac{32}{40} = \frac{4}{5}$.
2. $\widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{4}{5}\right) \approx 0,644 \text{ rad} \approx 36,9^\circ$.
3. On vérifie : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Le triangle est rectangle en C (triplet pythagoricien).
 $\widehat{BCA} = \frac{\pi}{2}$.

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-043

1. $\cos \widehat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 49 - 64}{70} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}$, $\widehat{A} \approx 81,8^\circ$.
 $\cos \widehat{B} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{64 + 49 - 25}{112} = \frac{88}{112} = \frac{11}{14}$, $\widehat{B} \approx 38,2^\circ$.
 $\cos \widehat{C} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{64 + 25 - 49}{80} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$, $\widehat{C} = 60^\circ$.
2. $81,8^\circ + 38,2^\circ + 60^\circ = 180^\circ$. ✓

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-044

Par Al-Kashi : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \widehat{C} = 36 + 100 - 120 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 136 - 60\sqrt{2}$.

$$c = \sqrt{136 - 60\sqrt{2}} \approx \sqrt{136 - 84,85} \approx \sqrt{51,15} \approx 7,15.$$

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-045

1. $AM^2 = \frac{2 \times 36 + 2 \times 64 - 100}{4} = \frac{72 + 128 - 100}{4} = \frac{100}{4} = 25$. Donc $AM = 5$.
2. $AB^2 + AC^2 = 36 + 64 = 100 = BC^2$. Le triangle est rectangle en A. La médiane issue de A est égale à la moitié de l'hypoténuse : $AM = BC/2 = 5$. ✓

Corrigé

1SPE-PRODSCAL-EX-046

On prend $a = 5$ (le plus grand côté), $b = 3$, $c = 4$.

$$\cos \widehat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{9 + 16 - 25}{24} = \frac{0}{24} = 0.$$

Donc $\widehat{A} = \frac{\pi}{2}$: le triangle est rectangle en A.

C'est bien le theoreme de Pythagore retrouve comme cas particulier d'Al-Kashi.

1SPE-PRODSCAL-EX-047

Corrigé

$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$, donc :

$$\begin{aligned} BC^2 &= \|\overrightarrow{BC}\|^2 = \|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= \|\overrightarrow{AC}\|^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \|\overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= AC^2 + AB^2 - 2AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}. \end{aligned}$$

1SPE-PRODSCAL-EX-048

Corrigé

$$\begin{aligned} 1. \cos \widehat{BAC} &= \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{49 + 25 - 64}{70} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}. \\ 2. AM^2 &= \frac{2 \times 49 + 2 \times 25 - 64}{4} = \frac{98 + 50 - 64}{4} = \frac{84}{4} = 21. \\ AM &= \sqrt{21} \approx 4,58. \end{aligned}$$

1SPE-PRODSCAL-EX-049

Corrigé

$$\begin{aligned} 1. AC &= \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ et } BD = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}. \\ 2. \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}. \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} &= -8 + 6 = -2 \neq 0. \\ 3. \cos \theta &= \frac{-2}{2\sqrt{5} \times \sqrt{13}} = \frac{-1}{\sqrt{65}}, \text{ donc } \theta = \arccos\left(\frac{-1}{\sqrt{65}}\right) \approx 97,1^\circ. \end{aligned}$$

1SPE-PRODSCAL-EX-050

Corrigé

$$\begin{aligned} 1. \cos \widehat{A} &= \frac{36 + 49 - 25}{84} = \frac{60}{84} = \frac{5}{7}, \widehat{A} \approx 44,4^\circ. \\ \cos \widehat{B} &= \frac{25 + 49 - 36}{70} = \frac{38}{70} = \frac{19}{35}, \widehat{B} \approx 57,1^\circ. \\ \cos \widehat{C} &= \frac{25 + 36 - 49}{60} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}, \widehat{C} \approx 78,5^\circ. \\ 2. \sin \widehat{C} &= \sqrt{1 - 1/25} = \frac{\sqrt{24}}{5} = \frac{2\sqrt{6}}{5}. \\ A &= \frac{1}{2} \times 5 \times 6 \times \frac{2\sqrt{6}}{5} = 6\sqrt{6} \approx 14,7 \text{ m}^2. \\ 3. \text{Mediane issue du sommet oppose a } c = 7 \text{ (sommet C, milieu M de [AB])} : \\ CM^2 &= \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4} = \frac{50 + 72 - 49}{4} = \frac{73}{4}, \text{ donc } CM = \frac{\sqrt{73}}{2} \approx 4,27 \text{ m}. \end{aligned}$$

CHAPITRE 8

Géométrie repérée

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais déterminer une équation cartésienne d'une droite $ax+by+c=0$ et l'exploiter.
- ▶ C2 — Je sais utiliser un vecteur normal à une droite, passer d'une équation cartésienne à un vecteur directeur/normal et réciproquement.
- ▶ C3 — Je sais déterminer et exploiter l'équation d'un cercle $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$.
- ▶ C4 — Je sais étudier les positions relatives de droites et de cercles (parallélisme, intersection, tangence).
- ▶ C5 — Je sais résoudre des problèmes géométriques dans un repère orthonormé.

Un ingénieur doit vérifier si un câble rectiligne (modélisé par une droite) traverse une zone circulaire interdite (modélisée par un cercle) dans un plan cartographique. Comment traduire ce problème en équations et le résoudre par le calcul ? Résolu au TD fil rouge avec les outils du chapitre (C1, C3, C4, C5).

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 9 h

Contrat du chapitre

Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Déterminer une équation cartésienne d'une droite $ax + by + c = 0$ et l'exploiter.
- C2 Utiliser un vecteur normal à une droite, passer d'une équation cartésienne à un vecteur directeur/-normal et réciproquement.
- C3 Déterminer et exploiter l'équation d'un cercle $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.
- C4 Étudier les positions relatives de droites et de cercles (parallélisme, intersection, tangence).
- C5 Résoudre des problèmes géométriques variés dans un repère orthonormé.

Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Repérage dans le plan** — coordonnées d'un point, milieu d'un segment, distance entre deux points.
- R2 **Vecteurs et coordonnées** — somme de vecteurs, produit par un scalaire, colinéarité.
- R3 **Produit scalaire** — calcul analytique, condition d'orthogonalité.
- R4 **Équations du second degré** — discriminant, racines, signe d'un trinôme.
- R5 **Systèmes d'équations** — résolution de systèmes linéaires à deux inconnues.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

Temps de travail estimé

- ▶ Parcours ♦ (Consolidation) : environ 12 h.
- ▶ Parcours ♦♦ (Maîtrise) : environ 10 h.
- ▶ Parcours ♦♦♦ (Approfondissement) : environ 9 h.

Situation d'accroche — Le câble et la zone interdite

Un ingénieur cartographe travaille sur un plan quadrillé (repère orthonormé). Il doit vérifier si un câble rectiligne reliant deux pylônes $A(1;7)$ et $B(9;1)$ traverse une zone circulaire interdite de centre $\Omega(5;2)$ et de rayon 3.

- ▶ Comment écrire l'équation de la droite (AB) ?
- ▶ Comment écrire l'équation du cercle délimitant la zone interdite ?
- ▶ Le câble traverse-t-il la zone ? Touche-t-il le cercle ? Passe-t-il à l'extérieur ?

Cette situation sera entièrement résolue au Temps 7 (TD fil rouge), avec les outils du chapitre.

Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

R1 — Repérage dans le plan

1. Calcule la distance entre les points $A(1;3)$ et $B(4;7)$.

2. Détermine les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$ avec $A(2;6)$ et $B(8;4)$.

R2 — Vecteurs et coordonnées

3. Détermine les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$ avec $A(1;2)$ et $B(4;6)$.
 4. Les vecteurs $\vec{u}(2;3)$ et $\vec{v}(4;6)$ sont-ils colinéaires? Justifie.

R3 — Produit scalaire

5. Calcule le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\vec{u}(3;-1)$ et $\vec{v}(2;5)$.
 6. Les vecteurs $\vec{u}(4;3)$ et $\vec{v}(-3;4)$ sont-ils orthogonaux? Justifie.

R4 — Équations du second degré

7. Calcule le discriminant de l'équation $2x^2 - 3x + 1 = 0$ et déduis-en le nombre de solutions.

R5 — Systèmes d'équations

8. Résous le système $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

Bilan

Prérequis	Questions	Fiche si besoin
R1 — Repérage	Q1, Q2	Fiche R1
R2 — Vecteurs	Q3, Q4	Fiche R2
R3 — Produit scalaire	Q5, Q6	Fiche R3
R4 — Second degré	Q7	Fiche R4
R5 — Systèmes	Q8	Fiche R5

8.1 Équation cartésienne d'une droite

DÉFINITION 1

Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, une **équation cartésienne** d'une droite $\mathcal{D}$ est une équation de la forme

$$ax + by + c = 0$$

où a, b, c sont des réels avec $(a, b) \neq (0, 0)$.

Un point $M(x; y)$ appartient à $\mathcal{D}$ si et seulement si ses coordonnées vérifient cette équation.

Exemple. La droite $\mathcal{D}$ d'équation $2x - 3y + 6 = 0$.

- Le point $A(0;2)$: $2 \times 0 - 3 \times 2 + 6 = 0$. Donc $A \in \mathcal{D}$.
- Le point $B(3;0)$: $2 \times 3 - 3 \times 0 + 6 = 12 \neq 0$. Donc $B \notin \mathcal{D}$.
- Le point $C(3;4)$: $2 \times 3 - 3 \times 4 + 6 = -6 + 6 = 0$. Donc $C \in \mathcal{D}$.

Propriété 1. Toute droite du plan admet une équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

- Si $b \neq 0$, on peut écrire $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$, soit $y = mx + p$ (équation réduite). La droite n'est pas verticale, de coefficient directeur $m = -\frac{a}{b}$ et d'ordonnée à l'origine $p = -\frac{c}{b}$.
- Si $b = 0$, l'équation devient $ax + c = 0$, soit $x = -\frac{c}{a}$: la droite est verticale.

Exemple. L'équation $3x + 2y - 6 = 0$ donne $y = -\frac{3}{2}x + 3$. Coefficient directeur $m = -\frac{3}{2}$, ordonnée à l'origine $p = 3$.

L'équation $5x + 10 = 0$ donne $x = -2$: droite verticale d'abscisse -2 .

Contre-exemple. L'équation $0x + 0y + 3 = 0$ (soit $3 = 0$) ne définit aucune droite : $(a, b) = (0, 0)$.

Propriété 2. Pour déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ avec $A \neq B$:

1. Si $x_A = x_B$, la droite est verticale : $x = x_A$.
2. Sinon, calculer le coefficient directeur $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, puis $p = y_A - mx_A$. L'équation cartésienne est $mx - y + p = 0$.

Exemple. Droite passant par $A(1; 3)$ et $B(4; 9)$.

$$m = \frac{9 - 3}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2. \text{ Puis } p = 3 - 2 \times 1 = 1. \text{ Équation réduite : } y = 2x + 1, \text{ soit } 2x - y + 1 = 0.$$

Pour vérifier qu'un point appartient à une droite, on substitue ses coordonnées dans l'équation : si on obtient 0, le point est sur la droite.

Pour trouver des points sur une droite $ax + by + c = 0$: choisir une coordonnée (par exemple $x = 0$) et calculer l'autre.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur sur le signe lors du passage équation réduite $\leftrightarrow$ équation cartésienne.

Si $y = 2x - 5$, l'équation cartésienne est $2x - y - 5 = 0$ (et non $2x + y - 5 = 0$). Il faut passer le y de l'autre côté : $2x - y - 5 = 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le cas de la droite verticale.

La droite passant par $A(3; 1)$ et $B(3; 7)$ a pour équation $x = 3$ (et non $y = \dots$). Elle n'a pas de coefficient directeur.

POUR ALLER PLUS LOIN

L'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ n'est pas unique : toute équation $\lambda ax + \lambda by + \lambda c = 0$ avec $\lambda \neq 0$ définit la même droite. On peut toujours normaliser en imposant par exemple $a^2 + b^2 = 1$ (vecteur normal unitaire).

8.2 Vecteur normal à une droite

DÉFINITION 1

Un vecteur $\vec{n}$ non nul est **normal** à une droite $\mathcal{D}$ s'il est orthogonal à tout vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

Propriété 1. Si la droite $\mathcal{D}$ a pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$, alors :

- le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un **vecteur normal** à $\mathcal{D}$,
- le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un **vecteur directeur** de $\mathcal{D}$.

Démonstration. Soit $M(x; y)$ et $M'(x'; y')$ deux points de $\mathcal{D}$. On a $ax + by + c = 0$ et $ax' + by' + c = 0$. Par soustraction : $a(x' - x) + b(y' - y) = 0$.

Le vecteur $\vec{MM'} \begin{pmatrix} x' - x \\ y' - y \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. L'égalité $a(x' - x) + b(y' - y) = 0$ signifie que $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \vec{MM'} = 0$.

Donc $\vec{n}$ est orthogonal à tout vecteur directeur de $\mathcal{D}$: c'est un vecteur normal.

De plus, $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ vérifie $\vec{n} \cdot \vec{u} = a(-b) + b \cdot a = 0$, donc $\vec{u}$ est orthogonal à $\vec{n}$ et c'est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

Exemple. La droite $\mathcal{D} : 3x - 2y + 5 = 0$ admet :

- un vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$,
- un vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Vérification : $\vec{n} \cdot \vec{u} = 3 \times 2 + (-2) \times 3 = 6 - 6 = 0$. ✓

Propriété 2. Réciproquement, si $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à une droite $\mathcal{D}$ et si $A(x_0; y_0)$ est un point de $\mathcal{D}$, alors une équation cartésienne de $\mathcal{D}$ est :

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0.$$

Exemple. La droite passant par $A(2; -1)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ a pour équation :

$$4(x - 2) + 1(y + 1) = 0, \quad \text{soit} \quad 4x + y - 7 = 0.$$

Vérification : $4 \times 2 + 1 \times (-1) - 7 = 8 - 1 - 7 = 0$. ✓

ERREUR FRÉQUENTE

Inversion du signe.

Pour $\mathcal{D} : 3x + 5y - 1 = 0$, le vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$ et non $\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Moyen mnémotechnique : dans le vecteur directeur, la première coordonnée prend un signe $-$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confusion entre vecteur normal et vecteur directeur.

Le vecteur normal est *perpendiculaire* à la droite, pas parallèle. Deux droites perpendiculaires ont des vecteurs directeurs dont le produit scalaire est nul, ce qui revient à dire que le vecteur directeur de l'une est un vecteur normal de l'autre.

Propriété 3. Deux droites sont **perpendiculaires** si et seulement si un vecteur directeur de l'une est un vecteur normal de l'autre.

Autrement dit, si $\mathcal{D}_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$, alors :

$$\mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2 \iff a_1a_2 + b_1b_2 = 0.$$

Résumé : pour $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$:

Vecteur normal	$\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$
Vecteur directeur	$\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$

On permute les coordonnées et on change un signe pour passer du normal au directeur.

Exemple. $\mathcal{D}_1 : 2x + 3y - 1 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 3x - 2y + 4 = 0$.

$$a_1a_2 + b_1b_2 = 2 \times 3 + 3 \times (-2) = 6 - 6 = 0.$$

Donc $\mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2$.

8.3 Équation d'un cercle

DÉFINITION 1

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, le **cercle** de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon $r > 0$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $\Omega M = r$, c'est-à-dire :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

Exemple. Le cercle de centre $\Omega(3; -1)$ et de rayon 4 a pour équation :

$$(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16.$$

Le point $A(7; -1) : (7 - 3)^2 + (-1 + 1)^2 = 16 + 0 = 16$. Donc A est sur le cercle.

Le point $B(3; 3) : (3 - 3)^2 + (3 + 1)^2 = 0 + 16 = 16$. Donc B est sur le cercle.

Le point $C(0; 0) : (0 - 3)^2 + (0 + 1)^2 = 9 + 1 = 10 \neq 16$. Donc C n'est pas sur le cercle.

Propriété 1. En développant l'équation $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, on obtient la **forme développée** :

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + (a^2 + b^2 - r^2) = 0.$$

Réciproquement, une équation de la forme $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ représente un cercle si et seulement si $\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C > 0$. Dans ce cas :

► le centre est $\Omega\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}\right)$,

► le rayon est $r = \sqrt{\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C}$.

Exemple. Soit l'équation $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$.

On identifie : $A = -6$, $B = 4$, $C = -3$.

Centre : $\Omega\left(-\frac{-6}{2}; -\frac{4}{2}\right) = \Omega(3; -2)$.

Rayon : $r = \sqrt{\frac{36}{4} + \frac{16}{4} + 3} = \sqrt{9 + 4 + 3} = \sqrt{16} = 4$.

Le cercle a pour centre $\Omega(3; -2)$ et pour rayon 4.

Contre-exemple. L'équation $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 5 = 0 : A = 2, B = 2, C = 5$.

$$\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C = 1 + 1 - 5 = -3 < 0.$$

Cette équation n'a pas de solution : elle ne représente aucun cercle (ni aucun point).

Propriété 2. Soit A et B deux points distincts. Le cercle de diamètre $[AB]$ a pour centre le milieu I de $[AB]$ et pour rayon $r = \frac{AB}{2}$.

Un point M appartient à ce cercle si et seulement si $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ (angle inscrit dans un demi-cercle).

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur de signe sur le centre.

Dans $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$, le centre est $(3; -2)$ et non $(3; 2)$. Attention au signe de la coordonnée extraite de $(y + 2)^2 = (y - (-2))^2$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre r et r^2 .

Dans $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 25$, le rayon est $r = 5$ (et non $r = 25$). Le membre de droite est r^2 .

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier que le repère doit être orthonormé.

La formule $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ n'est valable que dans un repère *orthonormé*. Si le repère n'est pas orthonormé, la distance ne se calcule pas par la formule usuelle.

Pour identifier un cercle à partir de sa forme développée : compléter les carrés.

$$x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9$$

et

$$y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4.$$

Donc

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 3)^2 - 9 + (y + 2)^2 - 4 - 3 = 0 \Leftrightarrow (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16.$$

8.4 Positions relatives de droites et de cercles

8.4.1 Positions relatives de deux droites

Propriété 1. Soient $\mathcal{D}_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ deux droites.

- ▶ $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont **parallèles** $\Leftrightarrow a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ (vecteurs directeurs colinéaires).
- ▶ $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont **sécantes** $\Leftrightarrow a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$.
- ▶ Si elles sont sécantes, le point d'intersection s'obtient en résolvant le système

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}.$$
- ▶ $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont **confondues** $\Leftrightarrow$ il existe $\lambda \neq 0$ tel que $a_2 = \lambda a_1$, $b_2 = \lambda b_1$ et $c_2 = \lambda c_1$.

Exemple. $\mathcal{D}_1 : 2x + 3y - 1 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 4x + 6y + 5 = 0$.

$$a_1b_2 - a_2b_1 = 2 \times 6 - 4 \times 3 = 12 - 12 = 0 : \text{droites parallèles.}$$

$\mathcal{D}_2$ s'écrit aussi $2(2x + 3y) + 5 = 0$. Si elles étaient confondues, on aurait $c_2 = 2c_1 = -2$, or $c_2 = 5 \neq -2$. Elles sont donc strictement parallèles (non confondues).

Exemple. $\mathcal{D}_1 : x - 2y + 3 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 3x + y - 5 = 0$.

$$a_1b_2 - a_2b_1 = 1 \times 1 - 3 \times (-2) = 1 + 6 = 7 \neq 0 : \text{droites sécantes.}$$

Système : $\begin{cases} x - 2y = -3 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$. De la première : $x = 2y - 3$. En substituant : $3(2y - 3) + y = 5$, soit $7y = 14$, $y = 2$, $x = 1$.

Point d'intersection : $(1; 2)$.

8.4.2 Distance d'un point à une droite

Propriété 2. Dans un repère orthonormé, la distance du point $M_0(x_0; y_0)$ à la droite $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ est :

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Exemple. Distance du point $P(1; 3)$ à la droite $\mathcal{D} : 3x - 4y + 2 = 0$.

$$d = \frac{|3 \times 1 - 4 \times 3 + 2|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|3 - 12 + 2|}{5} = \frac{|-7|}{5} = \frac{7}{5}.$$

8.4.3 Positions relatives d'une droite et d'un cercle

Propriété 3. Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre Ω et de rayon r , et $\mathcal{D}$ une droite. On note $d = d(\Omega, \mathcal{D})$ la distance du centre à la droite.

- Si $d > r$: $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ n'ont **aucun point commun** (la droite est extérieure au cercle).
- Si $d = r$: $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont **un seul point commun** (la droite est tangente au cercle).
- Si $d < r$: $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont **deux points communs** (la droite est sécante au cercle).

Exemple. $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(2; 1)$ et de rayon $r = 5$. Droite $\mathcal{D} : 3x + 4y - 1 = 0$.

$$d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 1 - 1|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|6 + 4 - 1|}{5} = \frac{9}{5} = 1,8.$$

$d = 1,8 < 5 = r$: la droite est sécante au cercle (deux points d'intersection).

Méthode alternative pour l'intersection droite-cercle : substituer l'expression de y (tirée de l'équation de la droite) dans l'équation du cercle. On obtient une équation du second degré en x . Le discriminant détermine le nombre de solutions.

ERREUR FRÉQUENTE

Oubli de la valeur absolue dans la formule de distance : $|ax_0 + by_0 + c|$ et non $ax_0 + by_0 + c$. La distance est toujours positive.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur dans $\sqrt{a^2 + b^2}$: le dénominateur utilise les coefficients a et b de l'équation de la droite, pas les coordonnées du point.

ERREUR FRÉQUENTE

Confusion tangente/sécante. Une droite tangente touche le cercle en un seul point ($d = r$), une droite sécante coupe le cercle en deux points ($d < r$).

8.5 Problèmes géométriques dans un repère orthonormé

Propriété 1. Dans un repère orthonormé, pour déterminer la **nature d'un quadrilatère** $ABCD$, on dispose des outils suivants :

- **Parallélisme** : $\vec{AB}$ et $\vec{DC}$ colinéaires $\Leftrightarrow ABCD$ est un trapèze (au moins).

- **Parallélogramme** : $\vec{AB} = \vec{DC}$, ou bien les diagonales ont le même milieu.
- **Rectangle** : parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur, ou parallélogramme ayant un angle droit.
- **Losange** : parallélogramme dont deux côtés consécutifs ont la même longueur.
- **Carré** : à la fois rectangle et losange.

Propriété 2. Le **projeté orthogonal** du point P sur la droite $\mathcal{D}$ est le point H de $\mathcal{D}$ tel que $(PH) \perp \mathcal{D}$. Pour le déterminer :

1. Écrire l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ passant par P et perpendiculaire à $\mathcal{D}$ (un vecteur directeur de $\mathcal{D}'$ est un vecteur normal de $\mathcal{D}$).
2. Résoudre le système formé par les équations de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$.

Exemple. Projeté orthogonal de $P(5;7)$ sur $\mathcal{D} : x + 2y - 3 = 0$.

Un vecteur normal à $\mathcal{D}$ est $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. La droite $\mathcal{D}'$ passant par P et dirigée par $\vec{n}$ a pour équation : $\frac{x-5}{1} = \frac{y-7}{2}$, soit $2(x-5) = y-7$, d'où $2x - y - 3 = 0$.

$$\text{Système : } \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = 3 \end{cases} . \text{ On obtient : } 5x = 9, x = \frac{9}{5}, y = \frac{3}{5}.$$

Le projeté orthogonal est $H\left(\frac{9}{5}; \frac{3}{5}\right)$.

Propriété 3. Le **symétrique** du point P par rapport à la droite $\mathcal{D}$ est le point P' tel que H (projeté orthogonal de P sur $\mathcal{D}$) est le milieu de $[PP']$.

Si $H\left(\frac{x_P + x_{P'}}{2}; \frac{y_P + y_{P'}}{2}\right)$, alors $x_{P'} = 2x_H - x_P$ et $y_{P'} = 2y_H - y_P$.

Propriété 4. Aire d'un triangle ABC dans un repère orthonormé :

$$A = \frac{1}{2} |x_{\vec{AB}} \cdot y_{\vec{AC}} - y_{\vec{AB}} \cdot x_{\vec{AC}}|$$

où $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_{\vec{AB}} \\ y_{\vec{AB}} \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} x_{\vec{AC}} \\ y_{\vec{AC}} \end{pmatrix}$.

Exemple. $A(1;2), B(4;6), C(7;2)$.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$A = \frac{1}{2} |3 \times 0 - 4 \times 6| = \frac{1}{2} \times 24 = 12.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre milieu et projeté orthogonal. Le milieu de $[AP]$ est le point qui partage le segment en deux parties égales. Le projeté orthogonal de P sur une droite $\mathcal{D}$ est un point de $\mathcal{D}$ — ce n'est pas le milieu de $[AP]$ en général.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la valeur absolue dans le calcul de l'aire. Le déterminant $x_{AB} \cdot y_{AC} - y_{AB} \cdot x_{AC}$ peut être négatif, mais une aire est toujours positive.

ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas structurer la démarche. Dans un problème de synthèse, commencer par identifier les données (coordonnées des points, équation de la droite, etc.), les objectifs (nature d'un quadrilatère, aire, etc.) et les outils nécessaires avant de calculer.

MÉTHODE M1 — DÉTERMINER UNE ÉQUATION CARTÉSIENNE D'UNE DROITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) », « écrire l'équation de la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ », ou « montrer que la droite a pour équation $ax + by + c = 0$ ».

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les données :

- ▶ **Deux points** $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$: je calcule le coefficient directeur $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ (si $x_A \neq x_B$).
- ▶ **Un point et un vecteur directeur** $\vec{u}(-b; a)$: j'utilise $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$ avec le vecteur normal $\vec{n}(a; b)$.
- ▶ **Un point et un vecteur normal** $\vec{n}(a; b)$: j'écris $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$.

2. Je développe et réduis pour obtenir la forme $ax + by + c = 0$.

3. Je vérifie en substituant les coordonnées du ou des points connus.

Exemple rédigé. Exemple — À partir de deux points. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(2; 5)$ et $B(6; 3)$.

$$m = \frac{3 - 5}{6 - 2} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

$$y - 5 = -\frac{1}{2}(x - 2), \text{ soit } y = -\frac{1}{2}x + 6, \text{ d'où } x + 2y - 12 = 0.$$

$$6 + 2 \times 3 - 12 = 6 + 6 - 12 = 0. \checkmark$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Si $x_A = x_B$, la droite est verticale : son équation est $x = x_A$ (pas de coefficient directeur).
- ▶ **Piège 2.** Erreur de signe dans le passage de $y = mx + p$ à $ax + by + c = 0$: ne pas oublier que $y = mx + p$ donne $mx - y + p = 0$.
- ▶ **Piège 3.** Ne pas confondre les coordonnées du vecteur normal (a, b) avec la constante c .

Vérifier son résultat. Toujours substituer les coordonnées des points connus dans l'équation obtenue. Si un point connu ne vérifie pas l'équation, il y a une erreur de calcul.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Calculer le coefficient directeur.
Écrire l'équation réduite puis la forme cartésienne.
Vérifier avec le point B .

MÉTHODE M2 — UTILISER UN VECTEUR NORMAL À UNE DROITE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer un vecteur normal », « passer d'un vecteur normal à l'équation cartésienne », « trouver la droite perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par un point ».

La méthode pas à pas.

- Pour $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$:
 - ▶ Vecteur normal : $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.
 - ▶ Vecteur directeur : $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.
- Pour construire l'équation d'une droite à partir d'un vecteur normal $\vec{n}(a; b)$ et d'un point $A(x_0; y_0) : a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$.
- Pour la perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par P : le vecteur normal à $\mathcal{D}$ devient un vecteur directeur de la perpendiculaire.

Exemple rédigé. Exemple — Droite perpendiculaire. Soit $\mathcal{D} : 2x + 5y - 3 = 0$ et $P(1; -1)$. Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par P .

$\vec{n}_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}'$.

$\vec{n}_{\mathcal{D}'} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$ (ou $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$).

$\mathcal{D}' : 5(x - 1) - 2(y + 1) = 0$, soit $5x - 2y - 7 = 0$.

$5 \times 1 - 2 \times (-1) - 7 = 5 + 2 - 7 = 0$. ✓

Orthogonalité : $2 \times 5 + 5 \times (-2) = 10 - 10 = 0$. ✓

Le vecteur normal de $\mathcal{D}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}'$.
Le vecteur normal de $\mathcal{D}'$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

Vérification : P est sur $\mathcal{D}'$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Ne pas confondre vecteur normal et vecteur directeur : le vecteur normal est perpendiculaire à la droite.
- ▶ **Piège 2.** Inversion du signe : le vecteur directeur de $ax + by + c = 0$ est $(-b; a)$, avec un signe $-$ sur la première coordonnée.

Vérifier son résultat. Vérifier l'orthogonalité : le produit scalaire du vecteur directeur de $\mathcal{D}$ et du vecteur directeur de $\mathcal{D}'$ doit être nul.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — DÉTERMINER L'ÉQUATION D'UN CERCLE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer l'équation du cercle de centre Ω et de rayon r », « identifier le centre et le rayon d'un cercle dont l'équation est donnée sous forme développée », ou « montrer qu'un point appartient à un cercle ».

La méthode pas à pas.

- Si centre et rayon sont donnés : écrire directement $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.
- Si l'équation est sous forme développée $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$:
 - ▶ Regrouper les termes en x et compléter le carré : $x^2 + Ax = \left(x + \frac{A}{2}\right)^2 - \frac{A^2}{4}$.
 - ▶ Faire de même avec y : $y^2 + By = \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 - \frac{B^2}{4}$.
 - ▶ En déduire le centre $\Omega\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}\right)$ et le rayon $r = \sqrt{\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C}$.

Compléter le carré en x :
 $x^2 + 4x = (x + 2)^2 - 4$.
 Compléter le carré en y :
 $y^2 - 6y = (y - 3)^2 - 9$.

3. Vérifier que $r^2 > 0$ (sinon l'équation ne représente pas un cercle).

Exemple rédigé. Exemple — Forme développée vers centre et rayon. Identifier le cercle d'équation $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$.

$$x^2 + 4x = (x + 2)^2 - 4.$$

$$y^2 - 6y = (y - 3)^2 - 9.$$

L'équation devient : $(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 - 12 = 0$, soit $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$.

Le cercle a pour centre $\Omega(-2; 3)$ et rayon $r = 5$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Erreur de signe sur le centre : dans $(x + 2)^2$, le centre a pour abscisse -2 (et non $+2$).
- **Piège 2.** Confondre r et r^2 : le membre de droite est le carré du rayon.
- **Piège 3.** Oublier de vérifier que $r^2 > 0$.

Vérifier son résultat. Substituer les coordonnées du centre dans l'équation développée et vérifier que le résultat vaut $-r^2$. Par exemple : $(-2)^2 + 3^2 + 4 \times (-2) - 6 \times 3 - 12 = 4 + 9 - 8 - 18 - 12 = -25$, donc $r^2 = 25$. ✓

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — ÉTUDIER LA POSITION RELATIVE D'UNE DROITE ET D'UN CERCLE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer la position relative d'une droite et d'un cercle », « montrer qu'une droite est tangente à un cercle », ou « calculer les points d'intersection d'une droite et d'un cercle ».

La méthode pas à pas.

1. **Méthode 1 — Distance.** Calculer la distance d du centre Ω du cercle à la droite $\mathcal{D}$:

$$d = \frac{|ax_{\Omega} + by_{\Omega} + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Comparer d et r : si $d > r$ (extérieure), $d = r$ (tangente), $d < r$ (sécante).

2. **Méthode 2 — Substitution.** Exprimer y (ou x) à partir de l'équation de $\mathcal{D}$ et substituer dans l'équation du cercle. On obtient une équation du second degré ; son discriminant Δ détermine le nombre de solutions.

3. Si sécante ou tangente, résoudre pour trouver les coordonnées des points communs.

Exemple rédigé. Exemple — Par la distance. $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(1; 3)$ et de rayon $r = \sqrt{5}$. Droite $\mathcal{D} : 2x - y + 1 = 0$.

$$d = \frac{|2 \times 1 - 3 + 1|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{|0|}{\sqrt{5}} = 0.$$

$d = 0 < \sqrt{5} = r$: la droite passe par le centre du cercle, elle est sécante.

Exemple — Par substitution. $\mathcal{C} : (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 5$. Droite $\mathcal{D} : y = 2x - 3$.

$$(x - 2)^2 + (2x - 3 + 1)^2 = 5, \text{ soit } (x - 2)^2 + (2x - 2)^2 = 5.$$

$$x^2 - 4x + 4 + 4x^2 - 8x + 4 = 5, \text{ soit } 5x^2 - 12x + 3 = 0.$$

$$\Delta = 144 - 60 = 84 > 0 : \text{deux solutions, la droite est sécante.}$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Ne pas oublier la valeur absolue dans la formule de distance.
- **Piège 2.** Avec la méthode de substitution, bien développer les carrés avant de simplifier.
- **Piège 3.** Comparer d à r (le rayon), pas à r^2 .

Calcul de la distance.

Substituer $y = 2x - 3$
dans l'équation du cercle.

Vérifier son résultat. Si on trouve des points d'intersection, vérifier qu'ils appartiennent à la fois à la droite et au cercle en substituant dans les deux équations.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — RÉSOUDRE UN PROBLÈME GÉOMÉTRIQUE DANS UN REPÈRE ORTHONORMÉ

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer la nature d'un quadrilatère », « calculer l'aire d'un triangle », « trouver le projeté orthogonal d'un point sur une droite », ou « déterminer le symétrique d'un point par rapport à une droite ».

La méthode pas à pas.

1. Lire et organiser les données : placer les points, noter les coordonnées.
2. Identifier les outils nécessaires parmi :
 - ▶ Distance entre deux points, milieu d'un segment.
 - ▶ Équation d'une droite, vecteur directeur, vecteur normal.
 - ▶ Produit scalaire, orthogonalité.
 - ▶ Distance d'un point à une droite.
3. Exécuter le plan étape par étape, en justifiant chaque affirmation.
4. Conclure avec la réponse à la question posée.

Exemple rédigé. Exemple — Projeté orthogonal et symétrique. Soit $\mathcal{D} : 3x + 4y - 12 = 0$ et $P(7; 1)$. Déterminer le projeté orthogonal H de P sur $\mathcal{D}$, puis le symétrique P' de P par rapport à $\mathcal{D}$.

Un vecteur normal à $\mathcal{D}$ est $\vec{n}(3; 4)$, qui est un vecteur directeur de (PH) .

La perpendiculaire passe par $P(7; 1)$ et a pour vecteur normal $\vec{u}(-4; 3)$ (vecteur directeur de $\mathcal{D}$).

Équation : $-4(x - 7) + 3(y - 1) = 0$, soit $-4x + 3y + 25 = 0$, ou $4x - 3y - 25 = 0$.

$\begin{cases} 3x + 4y = 12 \\ 4x - 3y = 25 \end{cases}$. En multipliant : $9x + 12y = 36$ et $16x - 12y = 100$. Somme : $25x = 136$,

$$x = \frac{136}{25}. \text{ Puis } y = \frac{12 - 3 \times 136/25}{4} = \frac{-108}{100} = -\frac{27}{25}.$$

$$H\left(\frac{136}{25}; -\frac{27}{25}\right).$$

$$x_{P'} = 2 \times \frac{136}{25} - 7 = \frac{272 - 175}{25} = \frac{97}{25}. y_{P'} = 2 \times \left(-\frac{27}{25}\right) - 1 = \frac{-54 - 25}{25} = -\frac{79}{25}.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Ne pas confondre le milieu d'un segment et le projeté orthogonal sur une droite.
- ▶ **Piège 2.** Oublier que le symétrique se calcule avec la formule $P' = 2H - P$, et non $P' = H - P$.
- ▶ **Piège 3.** Bien vérifier que H appartient à $\mathcal{D}$ à la fin du calcul.

Vérifier son résultat. Vérifier que H est sur $\mathcal{D}$, que $PH \perp \mathcal{D}$, et que H est le milieu de $[PP']$.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Écrire l'équation de la perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par P .

Résoudre le système.

Le symétrique : $P' = 2H - P$.

Exercice 1

Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) avec $A(1; 3)$ et $B(5; 7)$.

1SPE-GEOREP-EX-001
⌚ 8 min

Exercice 2

Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) avec $A(2; -1)$ et $B(2; 5)$.

1SPE-GEOREP-EX-002
⌚ 8 min

1SPE-GE0REP-EX-003
⌚ 10 min

Exercice 3 ◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(0;4)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1SPE-GE0REP-EX-004
⌚ 10 min

Exercice 4 ◆

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation $2x - y - 5 = 0$.

1. Le point $C(3;1)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?
2. Le point $D(0;2)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?
3. Déterminer l'ordonnée du point de $\mathcal{D}$ d'abscisse 4.

1SPE-GE0REP-EX-005
⌚ 10 min

Exercice 5 ◆◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(-2;3)$ et $B(4;-1)$.

1SPE-GE0REP-EX-006
⌚ 10 min

Exercice 6 ◆◆

1. Écrire l'équation cartésienne de la droite d'équation réduite $y = -3x + 7$.
2. Écrire l'équation réduite de la droite d'équation cartésienne $5x - 2y + 1 = 0$.

1SPE-GE0REP-EX-007
⌚ 12 min

Exercice 7 ◆◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $A(1;-2)$ et parallèle à la droite $\mathcal{D} : 3x + y - 5 = 0$.

1SPE-GE0REP-EX-008
⌚ 12 min

Exercice 8 ◆◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $A(3;5)$ et $B(7;5)$.

1SPE-GE0REP-EX-009
⌚ 15 min

Exercice 9 ◆◆◆

Soient les droites $\mathcal{D}_1 : x + 2y - 4 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 3x - y - 1 = 0$.

1. Déterminer le point d'intersection I de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.
2. Déterminer l'équation de la droite passant par I et par $P(2;0)$.

1SPE-GE0REP-EX-010
⌚ 15 min

Exercice 10 ◆◆◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $A(1;2)$ et perpendiculaire à la droite $\mathcal{D} : 4x - 3y + 6 = 0$.

1SPE-GE0REP-EX-011
⌚ 8 min

Exercice 11 ◆

Déterminer un vecteur normal et un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D} : 5x - 3y + 7 = 0$.

1SPE-GE0REP-EX-012
⌚ 10 min

Exercice 12 ◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $A(3;-2)$ et admettant $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ comme vecteur normal.

1SPE-GE0REP-EX-013
⌚ 10 min

Exercice 13 ◆

Les droites $\mathcal{D}_1 : 2x + 3y - 1 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 6x + 9y + 4 = 0$ sont-elles parallèles, perpendiculaires ou sécantes?

Exercice 14 ♦1SPE-GE0REP-EX-014
⌚ 10 min

Montrer que les droites $\mathcal{D}_1 : 3x - y + 2 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : x + 3y - 5 = 0$ sont perpendiculaires.

Exercice 15 ♦♦1SPE-GE0REP-EX-015
⌚ 12 min

Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D} : 2x - 5y + 3 = 0$ passant par $P(4; 1)$.

Exercice 16 ♦♦1SPE-GE0REP-EX-016
⌚ 12 min

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $A(1; 3)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.
En déduire un vecteur normal à cette droite.

Exercice 17 ♦♦1SPE-GE0REP-EX-017
⌚ 12 min

Déterminer l'équation de la médiatrice du segment $[AB]$ avec $A(1; 3)$ et $B(5; 7)$.

Exercice 18 ♦♦1SPE-GE0REP-EX-018
⌚ 15 min

Soit le triangle ABC avec $A(0; 0)$, $B(6; 0)$ et $C(2; 4)$. Déterminer l'équation de la hauteur issue de A .

Exercice 19 ♦♦♦1SPE-GE0REP-EX-019
⌚ 15 min

Soit la droite $\mathcal{D} : y = 2x - 1$.

1. Déterminer un vecteur normal à $\mathcal{D}$.
2. En déduire l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ parallèle à $\mathcal{D}$ passant par $P(3; 4)$.
3. Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}''$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par P .

Exercice 20 ♦♦♦1SPE-GE0REP-EX-020
⌚ 15 min

Soit $A(1; 2)$, $B(4; 6)$, $C(8; 3)$. Montrer que le triangle ABC est rectangle et préciser en quel sommet.

Exercice 21 ♦1SPE-GE0REP-EX-021
⌚ 8 min

1. Écrire l'équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(2; -3)$ et de rayon 5.
2. Le point $A(2; 2)$ appartient-il à $\mathcal{C}$?

Exercice 22 ♦1SPE-GE0REP-EX-022
⌚ 10 min

Identifier le centre et le rayon du cercle d'équation $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 9$.

Exercice 23 ♦1SPE-GE0REP-EX-023
⌚ 12 min

Déterminer le centre et le rayon du cercle d'équation $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

Exercice 24 ♦1SPE-GE0REP-EX-024
⌚ 10 min

Déterminer l'équation du cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(1; 3)$ et $B(5; 7)$.

Exercice 25 ♦♦1SPE-GE0REP-EX-025
⌚ 12 min

L'équation $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$ représente-t-elle un cercle? Si oui, préciser son centre et son rayon.

1SPE-GE0REP-EX-026
⌚ 12 min

Exercice 26 ♦♦

L'équation $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 15 = 0$ représente-t-elle un cercle ? Justifier.

1SPE-GE0REP-EX-027
⌚ 15 min

Exercice 27 ♦♦

Déterminer l'équation du cercle C passant par $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $C(0;6)$.

1SPE-GE0REP-EX-028
⌚ 12 min

Exercice 28 ♦♦

Soit le cercle $C : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 18$. Déterminer si le point $P(3;1)$ est à l'intérieur, sur, ou à l'extérieur du cercle.

1SPE-GE0REP-EX-029
⌚ 15 min

Exercice 29 ♦♦♦

Déterminer la valeur de a pour que le cercle de centre $\Omega(a;0)$ passe par $A(1;2)$ et $B(3;-2)$.

1SPE-GE0REP-EX-030
⌚ 15 min

Exercice 30 ♦♦♦

Soit $A(0;0)$ et $B(6;2)$. Montrer que l'ensemble des points $M(x;y)$ tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

1SPE-GE0REP-EX-031
⌚ 10 min

Exercice 31 ♦

Déterminer la position relative des droites $\mathcal{D}_1 : 2x + y - 3 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 4x + 2y + 1 = 0$.

1SPE-GE0REP-EX-032
⌚ 12 min

Exercice 32 ♦

Déterminer le point d'intersection des droites $\mathcal{D}_1 : x + y - 2 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 2x - y - 1 = 0$.

1SPE-GE0REP-EX-033
⌚ 10 min

Exercice 33 ♦

Calculer la distance du point $P(1;2)$ à la droite $\mathcal{D} : 3x - 4y + 5 = 0$.

1SPE-GE0REP-EX-034
⌚ 12 min

Exercice 34 ♦

Soit le cercle C de centre $O(0;0)$ et de rayon 5, et la droite $\mathcal{D} : 3x + 4y - 15 = 0$.

Déterminer la position relative de $\mathcal{D}$ et C .

1SPE-GE0REP-EX-035
⌚ 15 min

Exercice 35 ♦♦

Déterminer les points d'intersection du cercle $C : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$ et de la droite $\mathcal{D} : y = 2x$.

1SPE-GE0REP-EX-036
⌚ 15 min

Exercice 36 ♦♦

Soit le cercle C de centre $\Omega(3;1)$ et de rayon 2, et la droite $\mathcal{D} : 3x + 4y - 5 = 0$.

1. Calculer la distance de Ω à $\mathcal{D}$.
2. En déduire la position relative de $\mathcal{D}$ et C .

1SPE-GE0REP-EX-037
⌚ 15 min

Exercice 37 ♦♦

Déterminer les valeurs de c pour que la droite $\mathcal{D} : x - 2y + c = 0$ soit tangente au cercle de centre $\Omega(2;-1)$ et de rayon $\sqrt{5}$.

1SPE-GE0REP-EX-038
⌚ 15 min

Exercice 38 ♦♦

Déterminer l'équation de la tangente au cercle $C : (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ au point $A(2;5)$.

Exercice 39 ◆◆◆1SPE-GE0REP-EX-039
⌚ 20 minDéterminer les points d'intersection des cercles $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ et $C_2 : (x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 4$.**Exercice 40** ◆◆◆1SPE-GE0REP-EX-040
⌚ 20 minDéterminer les équations des droites passant par l'origine et tangentes au cercle $C : (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 1$.**Exercice 41** ◆1SPE-GE0REP-EX-041
⌚ 12 minCalculer l'aire du triangle ABC avec $A(1;1)$, $B(5;1)$ et $C(3;5)$.**Exercice 42** ◆1SPE-GE0REP-EX-042
⌚ 12 minSoit $A(0;0)$, $B(4;0)$, $C(5;3)$, $D(1;3)$. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.**Exercice 43** ◆◆1SPE-GE0REP-EX-043
⌚ 15 minDéterminer le projeté orthogonal du point $P(4;5)$ sur la droite $\mathcal{D} : 3x + 4y - 6 = 0$.**Exercice 44** ◆◆1SPE-GE0REP-EX-044
⌚ 15 minDéterminer le symétrique du point $P(3;7)$ par rapport à la droite $\mathcal{D} : x - y + 2 = 0$.**Exercice 45** ◆◆1SPE-GE0REP-EX-045
⌚ 15 minSoit $A(0;2)$, $B(3;0)$, $C(5;3)$, $D(2;5)$. Déterminer la nature du quadrilatère $ABCD$.**Exercice 46** ◆◆1SPE-GE0REP-EX-046
⌚ 15 minSoit $A(-1;1)$, $B(3;3)$, $C(5;-1)$, $D(1;-3)$. Montrer que $ABCD$ est un rectangle.**Exercice 47** ◆◆◆1SPE-GE0REP-EX-047
⌚ 20 minSoit le triangle ABC avec $A(0;0)$, $B(6;0)$ et $C(2;4)$. Déterminer les coordonnées de l'orthocentre H .**Exercice 48** ◆◆◆1SPE-GE0REP-EX-048
⌚ 20 minDéterminer l'équation du cercle circonscrit au triangle ABC avec $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $C(0;6)$.**Exercice 49** ◆◆◆1SPE-GE0REP-EX-049
⌚ 20 minDéterminer l'ensemble des points $M(x;y)$ équidistants du point $A(1;0)$ et de la droite $\mathcal{D} : x = -1$.**Exercice 50** ◆◆◆1SPE-GE0REP-EX-050
⌚ 25 minDéterminer le point de la droite $\mathcal{D} : 2x + y - 10 = 0$ le plus proche de l'origine O .**Coup de pouce 1.** Calcule le coefficient directeur $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, puis utilise $y - y_A = m(x - x_A)$.**Coup de pouce 1.** Compare les abscisses de A et B . Si elles sont égales, la droite est verticale.**Coup de pouce 1.** Le vecteur directeur $\vec{u}(-b;a)$ donne un vecteur normal $\vec{n}(a;b)$. Utilise $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$.**Coup de pouce 1.** Pour vérifier qu'un point est sur une droite, substitue ses coordonnées dans l'équation et vérifie si tu obtiens 0.**Coup de pouce 1.** Pour $ax + by + c = 0$, le vecteur normal est $(a;b)$ et le vecteur directeur est $(-b;a)$.**Coup de pouce 1.** Utilise $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$ avec $\vec{n}(a;b)$.

Coup de pouce 1. Deux droites sont parallèles si leurs vecteurs normaux sont colinéaires (c'est-à-dire proportionnels).

Coup de pouce 1. Calcule $a_1a_2 + b_1b_2$. Si c'est 0, les droites sont perpendiculaires.

Coup de pouce 1. L'équation d'un cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon r est $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

Coup de pouce 1. Écris $(x + 1)^2$ sous la forme $(x - (-1))^2$ pour lire l'abscisse du centre.

Coup de pouce 1. Complète le carré : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$.

Coup de pouce 1. Le centre du cercle de diamètre $[AB]$ est le milieu de $[AB]$ et le rayon est $AB/2$.

Coup de pouce 1. Calcule $a_1b_2 - a_2b_1$. Si c'est 0, les droites sont parallèles.

Coup de pouce 1. Résous le système formé par les deux équations.

Coup de pouce 1. Utilise la formule $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Coup de pouce 1. Calcule la distance du centre du cercle à la droite et compare-la au rayon.

Coup de pouce 1. L'aire d'un triangle est $\frac{1}{2} |x_{AB}y_{AC} - y_{AB}x_{AC}|$.

Coup de pouce 1. Pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, vérifie que $\vec{AB} = \vec{DC}$.

Temps 7 — TD contextualisé : Zone de couverture d'une antenne relais

Contexte. Une antenne relais est installée à l'origine $O(0;0)$ d'un repère orthonormé (unité : 1 km). Sa zone de couverture est un disque de rayon 5 km. Une route rectiligne a pour équation $3x - 4y - 10 = 0$.

Exercice 51

Partie A — La route traverse-t-elle la zone de couverture ?

1. Écrire l'équation du cercle $\mathcal{C}$ délimitant la zone de couverture.
2. Calculer la distance du point O à la droite $\mathcal{D} : 3x - 4y - 10 = 0$.
3. En déduire si la route traverse, touche ou évite la zone de couverture.

Partie B — Points d'entrée et de sortie

4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$.
5. Calculer la longueur du tronçon de route couvert par l'antenne.

Partie C — Question ouverte

6. L'opérateur souhaite que la couverture s'étende à au moins 8 km le long de la route. Quel rayon minimal doit avoir la zone de couverture ? Justifier.

Temps 7 — TD fil rouge : Le câble et la zone interdite

Situation. Un ingénieur cartographe travaille sur un plan quadrillé (repère orthonormé, unité : 100 m). Un câble rectiligne relie deux pylônes $A(1;7)$ et $B(9;1)$. Une zone circulaire interdite a pour centre $\Omega(5;2)$ et pour rayon 3.

Exercice 52

Partie A — Équation de la droite (AB)

[C1]

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.
2. Déterminer le coefficient directeur de la droite (AB) .

3. En déduire une équation cartésienne de (AB) .
4. Vérifier que A et B vérifient cette équation.

Partie B — Équation du cercle**[C3]**

5. Écrire l'équation du cercle C délimitant la zone interdite.

Partie C — Le câble traverse-t-il la zone ?**[C4]**

6. Calculer la distance du centre Ω à la droite (AB) .
7. Comparer cette distance au rayon r . Conclure.
8. Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection du câble et de la frontière de la zone.

Partie D — Longueur du tronçon interdit**[C5]**

9. Calculer la longueur exacte du tronçon de câble situé dans la zone interdite.
10. L'ingénieur envisage de déplacer le pylône B en $B'(9; y')$ pour que le câble soit tangent à la zone. Déterminer la ou les valeurs possibles de y' .

QCM d'auto-évaluation — Géométrie repérée

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Équation cartésienne d'une droite

1. [Q1] La droite passant par $A(1;3)$ et $B(3;7)$ a pour équation :
 - A. $2x - y + 1 = 0$
 - B. $x - 2y + 5 = 0$
 - C. $2x + y - 5 = 0$
 - D. $x + 2y - 7 = 0$
2. [Q2] Le point $P(2; -1)$ appartient à la droite $3x + 2y - 4 = 0$.
 - A. Vrai
 - B. Faux
 - C. On ne peut pas savoir
 - D. Seulement si le repère est orthonormé
3. [Q3] La droite d'équation $x = 5$ est :
 - A. horizontale
 - B. verticale
 - C. de coefficient directeur 5
 - D. de coefficient directeur $\frac{1}{5}$

C2 — Vecteur normal à une droite

4. [Q4] Un vecteur normal à la droite $4x - 3y + 2 = 0$ est :
 - A. $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

- B. $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$
- C. $\vec{n} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$
- D. $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

5. [Q5] Un vecteur directeur de la droite $2x + 5y - 1 = 0$ est :

- A. $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$
- B. $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$
- C. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$
- D. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$

6. [Q6] Les droites $\mathcal{D}_1 : 2x - y + 3 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : x + 2y - 1 = 0$ sont :

- A. parallèles
- B. confondues
- C. perpendiculaires
- D. sécantes non perpendiculaires

C3 — Équation du cercle

7. [Q7] L'équation $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$ représente un cercle de :

- A. centre $(3; -1)$ et rayon 16
- B. centre $(3; 1)$ et rayon 4
- C. centre $(3; -1)$ et rayon 4
- D. centre $(-3; 1)$ et rayon 4

8. [Q8] Le cercle de centre $(0; 0)$ et de rayon 3 a pour équation :

- A. $x^2 + y^2 = 3$
- B. $x^2 + y^2 = 9$
- C. $(x + 3)^2 + (y + 3)^2 = 0$
- D. $x + y = 3$

9. [Q9] L'équation $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ représente :

- A. un cercle de centre $(1; -2)$ et de rayon 3
- B. un cercle de centre $(-1; 2)$ et de rayon 9
- C. un cercle de centre $(1; -2)$ et de rayon 9
- D. aucun cercle

C4 — Positions relatives

10. [Q10] La distance du point $P(1; 2)$ à la droite $3x + 4y - 7 = 0$ est :

- A. $\frac{4}{5}$
- B. $\frac{4}{7}$
- C. $\frac{5}{5}$

D. 0

11. [Q11] Si la distance du centre d'un cercle de rayon 5 à une droite est 5, alors :

- A. la droite est sécante au cercle
- B. la droite est extérieure au cercle
- C. la droite est tangente au cercle
- D. on ne peut pas conclure

12. [Q12] Les droites $\mathcal{D}_1 : 3x - y + 2 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 6x - 2y + 4 = 0$ sont :

- A. strictement parallèles
- B. sécantes
- C. perpendiculaires
- D. confondues

C5 — Problèmes dans un repère13. [Q13] L'aire du triangle de sommets $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $C(0;6)$ est :

- A. 24
- B. 12
- C. 10
- D. 48

14. [Q14] Le projeté orthogonal de P sur une droite $\mathcal{D}$ est :

- A. le milieu de P et du pied de la perpendiculaire
- B. le point de $\mathcal{D}$ le plus proche de P
- C. le symétrique de P par rapport à $\mathcal{D}$
- D. l'intersection de $\mathcal{D}$ avec l'axe des abscisses

15. [Q15] Si $ABCD$ est un parallélogramme et $AC = BD$, alors $ABCD$ est :

- A. un losange
- B. un rectangle
- C. un carré
- D. un trapèze

Exercice 1 — Équation cartésienne (4 pts)

1. $\vec{AB} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$

2. $m = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$

3. $y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 1)$, soit $2y - 6 = -(x - 1) = -x + 1$, d'où $x + 2y - 7 = 0$.

4. $A : 1 + 6 - 7 = 0 \checkmark$. $B : 5 + 2 - 7 = 0 \checkmark$.

Exercice 2 — Vecteur normal (4 pts)

1. $\vec{n}(1;2)$ est normal et $\vec{u}(-2;1)$ est directeur. $\vec{n} \cdot \vec{u} = -2 + 2 = 0 \checkmark$.

2. $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $M(3;4)$: le vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $(-2;1)$, normal de $\mathcal{D}'$.

$-2(x - 3) + 1(y - 4) = 0$, soit $-2x + y + 2 = 0$, ou $2x - y - 2 = 0$.

$M : 6 - 4 - 2 = 0 \checkmark$.

3. $a_1 a_2 + b_1 b_2 = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$: perpendiculaires $\checkmark$.

Exercice 3 — Cercle (4 pts)

- $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$.
- $(7 - 3)^2 + (-1 + 1)^2 = 16 + 0 = 16 = r^2$. P est sur C .
- $(3 - 3)^2 + (3 + 1)^2 = 0 + 16 = 16 = r^2$. Q est sur C .
- Développement : $x^2 - 6x + 9 + y^2 + 2y + 1 = 16$, soit $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$.
Retour : $(x^2 - 6x) = (x - 3)^2 - 9$, $(y^2 + 2y) = (y + 1)^2 - 1$. $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$. ✓.

Exercice 4 — Position relative (4 pts)

- $d(\Omega, (AB)) = \frac{|3 + 2(-1) - 7|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{|-6|}{\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$.
- $\frac{6\sqrt{5}}{5} \approx 2,68 < 4 = r$: la droite est sécante au cercle.
- On substitue $x = 7 - 2y$ dans $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$:
 $(4 - 2y)^2 + (y + 1)^2 = 16$, soit $16 - 16y + 4y^2 + y^2 + 2y + 1 = 16$, d'où $5y^2 - 14y + 1 = 0$.
 $\Delta = 196 - 20 = 176 = 16 \times 11$. $y = \frac{14 \pm 4\sqrt{11}}{10} = \frac{7 \pm 2\sqrt{11}}{5}$.
 $x = 7 - 2y = \frac{21 \mp 4\sqrt{11}}{5}$.
Points : $\left(\frac{21 - 4\sqrt{11}}{5}; \frac{7 + 2\sqrt{11}}{5}\right)$ et $\left(\frac{21 + 4\sqrt{11}}{5}; \frac{7 - 2\sqrt{11}}{5}\right)$.

Exercice 5 — Problème (4 pts)

- $\vec{AB}(4; -2)$, $\vec{A\Omega}(2; -4)$.
 $A = \frac{1}{2}|4 \times (-4) - (-2) \times 2| = \frac{1}{2} \times 12 = 6$.
- Perpendiculaire à (AB) passant par Ω : $2x - y + c = 0$. En $\Omega(3; -1)$: $6 + 1 + c = 0$, $c = -7$.
 $\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 2x - y = 7 \end{cases} \Rightarrow 5x = 21, x = \frac{21}{5}, y = \frac{7}{5}$.
 $H\left(\frac{21}{5}; \frac{7}{5}\right)$.
- La hauteur relative à $[AB]$ est $d(\Omega, (AB)) = \frac{6\sqrt{5}}{5}$.
Vérification : $A = \frac{1}{2} \times AB \times h$. $AB = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$. $h = \frac{2 \times 6}{2\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$. ✓.

Évaluation 1SPE-GEOREP-EV-A 55 min**Exercice 1**

4 points — C1

On considère les points $A(1; 3)$ et $B(5; 1)$ dans un repère orthonormé.

- Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.
- Déterminer le coefficient directeur de la droite (AB) .
- En déduire une équation cartésienne de la droite (AB) .
- Vérifier que les points A et B appartiennent à cette droite.

Exercice 2

4 points — C2

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $x + 2y - 7 = 0$.

1. Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.
2. Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $M(3;4)$.
3. Vérifier que $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont bien perpendiculaires.

Exercice 3

4 points — C3

Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(3; -1)$ et de rayon 4.

1. Écrire l'équation de $\mathcal{C}$.
2. Le point $P(7; -1)$ est-il sur $\mathcal{C}$?
3. Le point $Q(3; 3)$ est-il sur $\mathcal{C}$?
4. Développer l'équation de $\mathcal{C}$ et vérifier que l'on retrouve le centre et le rayon en complétant les carrés.

Exercice 4

4 points — C4

On reprend la droite $(AB) : x + 2y - 7 = 0$ et le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(3; -1)$ et de rayon 4.

1. Calculer la distance de Ω à la droite (AB) .
2. En déduire la position relative de la droite (AB) et du cercle $\mathcal{C}$.
3. Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection.

Exercice 5

4 points — C5

Avec les mêmes points $A(1; 3)$, $B(5; 1)$ et $\Omega(3; -1)$:

1. Calculer l'aire du triangle $AB\Omega$.
2. Déterminer le projeté orthogonal de Ω sur la droite (AB) .
3. En déduire la hauteur du triangle $AB\Omega$ relative au côté $[AB]$.

Exercice 1 — Équation cartésienne (4 pts)

1. $\vec{AB} \begin{pmatrix} 6-2 \\ -1-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$.
2. $m = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$.
3. $y - 5 = -\frac{3}{2}(x - 2)$, soit $2y - 10 = -3x + 6$, d'où $3x + 2y - 16 = 0$.
4. $A : 6 + 10 - 16 = 0 \checkmark$. $B : 18 - 2 - 16 = 0 \checkmark$.

Exercice 2 — Vecteur normal (4 pts)

1. $\vec{n}(3; 2)$ normal, $\vec{u}(-2; 3)$ directeur. $\vec{n} \cdot \vec{u} = -6 + 6 = 0 \checkmark$.
2. $\mathcal{D}'$: vecteur normal $(-2; 3)$ (directeur de $\mathcal{D}$), passant par $M(1; 2)$:
 $-2(x - 1) + 3(y - 2) = 0$, soit $2x - 3y + 4 = 0$.
 $M : 2 - 6 + 4 = 0 \checkmark$.
3. $3 \times 2 + 2 \times (-3) = 6 - 6 = 0 \checkmark$.

Exercice 3 — Cercle (4 pts)

1. $(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 9$.
2. $(7 - 4)^2 + (1 - 1)^2 = 9 + 0 = 9$. $P \in \mathcal{C}$.
3. $(4 - 4)^2 + (4 - 1)^2 = 0 + 9 = 9$. $Q \in \mathcal{C}$.
4. $x^2 - 8x + 16 + y^2 - 2y + 1 = 9$, soit $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 8 = 0$.

Retour : $(x-4)^2 - 16 + (y-1)^2 - 1 + 8 = 0$, soit $(x-4)^2 + (y-1)^2 = 9$. ✓.

Exercice 4 — Position relative (4 pts)

$$1. d = \frac{|12 + 2 - 16|}{\sqrt{9 + 4}} = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13} \approx 0,55.$$

2. $d \approx 0,55 < 3 = r$: la droite est sécante.

3. On pose $y = \frac{16-3x}{2}$ dans $(x-4)^2 + (y-1)^2 = 9$:

$$(x-4)^2 + \left(\frac{14-3x}{2}\right)^2 = 9.$$

$$4(x-4)^2 + (14-3x)^2 = 36.$$

$$4x^2 - 32x + 64 + 9x^2 - 84x + 196 = 36, \text{ soit } 13x^2 - 116x + 224 = 0.$$

$$\Delta = 13456 - 11648 = 1808. \sqrt{1808} = 4\sqrt{113}.$$

$$x = \frac{116 \pm 4\sqrt{113}}{26} = \frac{58 \pm 2\sqrt{113}}{13}.$$

Exercice 5 — Problème (4 pts)

1. $\vec{AB}(4; -6)$, $\vec{A\Omega}(2; -4)$.

$$A = \frac{1}{2}|4 \times (-4) - (-6) \times 2| = \frac{1}{2}|-16 + 12| = \frac{4}{2} = 2.$$

2. Perpendiculaire : $2x - 3y + c = 0$. En $\Omega(4; 1)$: $8 - 3 + c = 0$, $c = -5$.

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 2x - 3y = 5 \end{cases} \quad . \quad 9x + 6y = 48 \text{ et } 4x - 6y = 10. \quad 13x = 58, x = \frac{58}{13}, y = \frac{17}{13}.$$

$$H\left(\frac{58}{13}; \frac{17}{13}\right).$$

$$3. h = d(\Omega, (AB)) = \frac{2\sqrt{13}}{13}.$$

$$\text{Vérification : } AB = \sqrt{16 + 36} = 2\sqrt{13}. A = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{13} \times \frac{2\sqrt{13}}{13} = \frac{1}{2} \times \frac{4 \times 13}{13} = 2 \quad \checkmark.$$

Évaluation 1SPE-GEOREP-EV-B 55 min

Exercice 1

4 points — C1

On considère les points $A(2; 5)$ et $B(6; -1)$ dans un repère orthonormé.

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.
2. Déterminer le coefficient directeur de la droite (AB) .
3. En déduire une équation cartésienne de la droite (AB) .
4. Vérifier que les points A et B appartiennent à cette droite.

Exercice 2

4 points — C2

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $3x + 2y - 16 = 0$.

1. Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.
2. Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $M(1; 2)$.
3. Vérifier que $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont bien perpendiculaires.

Exercice 3

4 points — C3

Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(4; 1)$ et de rayon 3.

1. Écrire l'équation de C .
2. Le point $P(7;1)$ est-il sur C ?
3. Le point $Q(4;4)$ est-il sur C ?
4. Développer l'équation de C et vérifier que l'on retrouve le centre et le rayon en complétant les carrés.

Exercice 4

4 points — C4

On reprend la droite $(AB) : 3x + 2y - 16 = 0$ et le cercle C de centre $\Omega(4;1)$ et de rayon 3.

1. Calculer la distance de Ω à la droite (AB) .
2. En déduire la position relative de la droite (AB) et du cercle C .
3. Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection.

Exercice 5

4 points — C5

Avec les mêmes points $A(2;5)$, $B(6;-1)$ et $\Omega(4;1)$:

1. Calculer l'aire du triangle $AB\Omega$.
2. Déterminer le projeté orthogonal de Ω sur la droite (AB) .
3. En déduire la hauteur du triangle $AB\Omega$ relative au côté $[AB]$.

Rappel — Repérage dans le plan

Coordonnées d'un point. Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, tout point M est repéré par ses coordonnées $(x; y)$.

Distance entre deux points. $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ (repère orthonormé).

Milieu d'un segment. Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Exercice 53

Calculer la distance entre les points suivants.

1. $A(2;1)$ et $B(5;5)$
2. $C(-1;3)$ et $D(2;-1)$

Corrigé

1. $AB = \sqrt{(5-2)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.
2. $CD = \sqrt{(2+1)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{9+16} = 5$.

Exercice 54

Déterminer les coordonnées du milieu de $[AB]$ dans chaque cas.

1. $A(2;6)$ et $B(8;2)$
2. $A(-3;1)$ et $B(5;7)$

Corrigé

1. $I\left(\frac{2+8}{2}; \frac{6+2}{2}\right) = I(5;4)$.
2. $I\left(\frac{-3+5}{2}; \frac{1+7}{2}\right) = I(1;4)$.

1SPE-GEOREP-FR-R1-EX1
⌚ 5 min

1SPE-GEOREP-FR-R1-EX1

1SPE-GEOREP-FR-R1-EX2
⌚ 5 min

1SPE-GEOREP-FR-R1-EX2

Rappel — Vecteurs et coordonnées

Coordonnées d'un vecteur. $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Colinéarité. $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ sont colinéaires $\Leftrightarrow xy' - x'y = 0$.

1SPE-GE0REP-FR-R2-EX1
⌚ 5 min

Exercice 55

1. Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ avec $A(1; 4)$ et $B(3; -2)$.
2. Les vecteurs $\vec{u}(3; 6)$ et $\vec{v}(1; 2)$ sont-ils colinéaires ?
3. Les vecteurs $\vec{u}(2; 5)$ et $\vec{v}(3; -1)$ sont-ils colinéaires ?

1SPE-GE0REP-FR-R2-EX1

Corrigé

1. $\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 - 1 \\ -2 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$.
2. $3 \times 2 - 6 \times 1 = 0$: oui, colinéaires.
3. $2 \times (-1) - 5 \times 3 = -17 \neq 0$: non, pas colinéaires.

Rappel — Produit scalaire

$$\vec{u}(x; y) \cdot \vec{v}(x'; y') = xx' + yy'.$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

1SPE-GE0REP-FR-R3-EX1
⌚ 5 min

Exercice 56

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\vec{u}(4; -1)$ et $\vec{v}(2; 3)$.
2. Les vecteurs $\vec{u}(5; 2)$ et $\vec{v}(-2; 5)$ sont-ils orthogonaux ?
3. Déterminer a tel que $\vec{u}(3; a)$ et $\vec{v}(2; -6)$ soient orthogonaux.

1SPE-GE0REP-FR-R3-EX1

Corrigé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 2 + (-1) \times 3 = 8 - 3 = 5$.
2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times (-2) + 2 \times 5 = -10 + 10 = 0$: oui, orthogonaux.
3. $3 \times 2 + a \times (-6) = 0$, soit $6 - 6a = 0$, $a = 1$.

Rappel — Discriminant et racines

Pour $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$: $\Delta = b^2 - 4ac$.

$\Delta > 0$: deux racines $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. $\Delta = 0$: une racine double. $\Delta < 0$: pas de solution réelle.

1SPE-GE0REP-FR-R4-EX1
⌚ 8 min

Exercice 57

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $2x^2 + 3x + 5 = 0$
3. $x^2 - 6x + 9 = 0$

1SPE-GE0REP-FR-R4-EX1

Corrigé

1. $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$. $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$, $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. $S = \{2; 3\}$.

2. $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0$. Pas de solution réelle.
3. $\Delta = 36 - 36 = 0$. Racine double $x = \frac{6}{2} = 3$. $S = \{3\}$.

Rappel — Systèmes linéaires

Substitution : exprimer une inconnue en fonction de l'autre, puis remplacer.

Combinaison : multiplier les équations pour éliminer une inconnue par addition.

Exercice 58

Résoudre les systèmes suivants.

- $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$
- $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

Corrigé

- Somme des deux équations : $3x = 12$, $x = 4$. Puis $y = 7 - 4 = 3$. Solution : $(4; 3)$.
- De la deuxième : $x = y + 1$. En substituant : $3(y + 1) + 2y = 12$, $5y = 9$, $y = \frac{9}{5}$, $x = \frac{14}{5}$.

Exercice 59

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(2; 1)$ et $B(6; 3)$.

Corrigé

$$m = \frac{3 - 1}{6 - 2} = \frac{1}{2}.$$

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 2), \text{ soit } y = \frac{x}{2}, \text{ d'où } x - 2y = 0.$$

Vérification : $A : 2 - 2 = 0 \checkmark$. $B : 6 - 6 = 0 \checkmark$.

Exercice 60

Le point $M(4; -3)$ appartient-il à la droite $\mathcal{D} : 2x + 3y + 1 = 0$?

Coup de pouce 1. Substitue les coordonnées de M dans $2x + 3y + 1$ et vérifie si tu obtiens 0.

Corrigé

$$2 \times 4 + 3 \times (-3) + 1 = 8 - 9 + 1 = 0. \text{ Donc } M \in \mathcal{D}.$$

Exercice 61

Déterminer l'équation cartésienne de la droite verticale passant par $A(-3; 7)$.

Corrigé

Une droite verticale a pour équation $x = x_A$, soit $x = -3$, ou $x + 3 = 0$.

Exercice 62

Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de $\mathcal{D} : 7x - 2y + 3 = 0$.

1SPE-GEOREP-FR-R5-EX1

⌚ 8 min

1SPE-GEOREP-FR-R5-EX1

1SPE-GEOREP-RE-C1-EX1

⌚ 8 min

1SPE-GEOREP-RE-C1-EX1

Coefficient directeur :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

1SPE-GEOREP-RE-C1-EX2

⌚ 8 min

1SPE-GEOREP-RE-C1-EX2

1SPE-GEOREP-RE-C1-EX3

⌚ 10 min

1SPE-GEOREP-RE-C1-EX3

1SPE-GEOREP-RE-C2-EX1

⌚ 8 min

1SPE-GE0REP-RE-C2-EX1

Corrigé

Normal : $\vec{n}(7; -2)$. Directeur : $\vec{u}(2; 7)$.

Vérification : $7 \times 2 + (-2) \times 7 = 0 \checkmark$.

1SPE-GE0REP-RE-C2-EX2

⌚ 10 min

Exercice 63

Déterminer l'équation de la droite de vecteur normal $\vec{n}(3; -5)$ passant par $A(2; 1)$.

Coup de pouce 1. Utilise $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$ avec $(a; b) = (3; -5)$.

1SPE-GE0REP-RE-C2-EX2

Corrigé

$$3(x - 2) - 5(y - 1) = 0, \text{ soit } 3x - 5y - 1 = 0.$$

1SPE-GE0REP-RE-C2-EX3

⌚ 10 min

Exercice 64

Les droites $\mathcal{D}_1 : 4x + y - 3 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : x - 4y + 1 = 0$ sont-elles perpendiculaires ?

1SPE-GE0REP-RE-C2-EX3

Corrigé

$$a_1 a_2 + b_1 b_2 = 4 \times 1 + 1 \times (-4) = 0. \text{ Donc } \mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2.$$

1SPE-GE0REP-RE-C3-EX1

⌚ 8 min

Exercice 65

Écrire l'équation du cercle de centre $\Omega(1; -4)$ et de rayon 3.

1SPE-GE0REP-RE-C3-EX1

Corrigé

$$(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 9.$$

1SPE-GE0REP-RE-C3-EX2

⌚ 10 min

Exercice 66

Identifier le centre et le rayon du cercle $x^2 + y^2 + 8x - 2y - 8 = 0$.

Coup de pouce 1. Complète le carré : $x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16$.

1SPE-GE0REP-RE-C3-EX2

Corrigé

$$x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16 \text{ et } y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1.$$

$$(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 25. \text{ Centre } (-4; 1), \text{ rayon } 5.$$

1SPE-GE0REP-RE-C3-EX3

⌚ 8 min

Exercice 67

Le point $P(5; 0)$ est-il sur le cercle $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 25$?

1SPE-GE0REP-RE-C3-EX3

Corrigé

$$(5 - 2)^2 + (0 - 4)^2 = 9 + 16 = 25. \text{ Donc } P \text{ est sur le cercle.}$$

1SPE-GE0REP-RE-C4-EX1

⌚ 8 min

Exercice 68

Calculer la distance du point $P(3; 4)$ à la droite $\mathcal{D} : 4x - 3y + 2 = 0$.

1SPE-GE0REP-RE-C4-EX1

Corrigé

$$d = \frac{|12 - 12 + 2|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{2}{5}.$$

Exercice 69

1SPE-GEOREP-RE-C4-EX2
⌚ 10 min

Le cercle de centre $O(0;0)$ et de rayon 3 et la droite $\mathcal{D} : 4x + 3y - 15 = 0$ ont-ils des points communs?

Coup de pouce 1. Calcule $d(O, \mathcal{D})$ et compare avec $r = 3$.

Corrigé

1SPE-GEOREP-RE-C4-EX2

$$d = \frac{|0 + 0 - 15|}{5} = 3 = r. \text{ La droite est tangente au cercle : un seul point commun.}$$

Exercice 70

1SPE-GEOREP-RE-C4-EX3
⌚ 10 min

Les droites $\mathcal{D}_1 : x + 3y - 2 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 2x + 6y + 1 = 0$ sont-elles parallèles?

Corrigé

1SPE-GEOREP-RE-C4-EX3

$a_1b_2 - a_2b_1 = 1 \times 6 - 2 \times 3 = 0$. Les droites sont parallèles.

$$\frac{c_2}{c_1} = \frac{1}{-2} \neq 2 : \text{strictement parallèles (non confondues).}$$

Exercice 71

1SPE-GEOREP-RE-C5-EX1
⌚ 10 min

Calculer l'aire du triangle ABC avec $A(0;0)$, $B(3;0)$ et $C(1;4)$.

Corrigé

1SPE-GEOREP-RE-C5-EX1

$\vec{AB}(3;0)$, $\vec{AC}(1;4)$.

$$A = \frac{1}{2}|3 \times 4 - 0 \times 1| = \frac{12}{2} = 6.$$

Exercice 72

1SPE-GEOREP-RE-C5-EX2
⌚ 10 min

Montrer que le quadrilatère $ABCD$ avec $A(0;0)$, $B(2;3)$, $C(5;5)$, $D(3;2)$ est un parallélogramme.

Coup de pouce 1. Vérifie que $\vec{AB} = \vec{DC}$.

Corrigé

1SPE-GEOREP-RE-C5-EX2

$\vec{AB}(2;3)$, $\vec{DC}(5-3;5-2) = (2;3)$.

$\vec{AB} = \vec{DC}$, donc $ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice 73

1SPE-GEOREP-RE-C5-EX3
⌚ 12 min

Déterminer le projeté orthogonal de $P(5;3)$ sur la droite $\mathcal{D} : x + y - 2 = 0$.

Corrigé

1SPE-GEOREP-RE-C5-EX3

Perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $P : x - y + c = 0$. En $P : 5 - 3 + c = 0$, $c = -2$.

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 2 \end{cases} \quad . \quad 2x = 4, x = 2, y = 0.$$

Le projeté est $H(2;0)$.

Corrigé

1SPE-GEOREP-EX-001

Le coefficient directeur est $m = \frac{7-3}{5-1} = \frac{4}{4} = 1$.

L'équation réduite est $y - 3 = 1(x - 1)$, soit $y = x + 2$.

Calculer le coefficient directeur.

L'équation cartésienne est $x - y + 2 = 0$.

Vérification : $A : 1 - 3 + 2 = 0 \checkmark$. $B : 5 - 7 + 2 = 0 \checkmark$.

1SPE-GEOREP-EX-002

Les deux points ont la même abscisse : la droite est verticale.

Corrigé

On a $x_A = x_B = 2$ donc la droite (AB) est verticale.

Son équation cartésienne est $x - 2 = 0$, soit $x = 2$.

1SPE-GEOREP-EX-003

Si $\vec{u}(3;2)$ est directeur, alors $\vec{n}(2;-3)$ est normal.

Corrigé

Le vecteur directeur est $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, donc un vecteur normal est $\vec{n}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

L'équation est $2(x - 0) - 3(y - 4) = 0$, soit $2x - 3y + 12 = 0$.

Vérification : $A(0;4) : 2 \times 0 - 3 \times 4 + 12 = 0 \checkmark$.

1SPE-GEOREP-EX-004

On substitue les coordonnées dans l'équation.

Corrigé

Question 1. $2 \times 3 - 1 - 5 = 6 - 1 - 5 = 0$. Donc $C \in \mathcal{D}$.

Question 2. $2 \times 0 - 2 - 5 = -7 \neq 0$. Donc $D \notin \mathcal{D}$.

Question 3. On pose $x = 4 : 2 \times 4 - y - 5 = 0$, soit $y = 3$.

1SPE-GEOREP-EX-005

Coefficient directeur puis équation réduite.

Corrigé

$$m = \frac{-1 - 3}{4 - (-2)} = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}.$$

$$y - 3 = -\frac{2}{3}(x + 2) = -\frac{2}{3}x - \frac{4}{3}.$$

$$y = -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3}.$$

En multipliant par 3 : $3y = -2x + 5$, soit $2x + 3y - 5 = 0$.

Vérification : $A : 2(-2) + 3(3) - 5 = -4 + 9 - 5 = 0 \checkmark$. $B : 2(4) + 3(-1) - 5 = 8 - 3 - 5 = 0 \checkmark$.

1SPE-GEOREP-EX-006

Corrigé

Question 1. $y = -3x + 7$ s'écrit $3x + y - 7 = 0$.

Question 2. $5x - 2y + 1 = 0$ donne $2y = 5x + 1$, soit $y = \frac{5}{2}x + \frac{1}{2}$.

1SPE-GEOREP-EX-007

Deux droites parallèles ont le même vecteur directeur, donc les mêmes coefficients a et b .

Corrigé

La droite cherchée a pour équation $3x + y + c = 0$.

$A(1; -2)$ est sur cette droite : $3 \times 1 + (-2) + c = 0$, soit $c = -1$.

L'équation est $3x + y - 1 = 0$.

1SPE-GEOREP-EX-008

Les deux points ont la même ordonnée : la droite est horizontale.

Corrigé

$y_A = y_B = 5$, donc la droite (AB) est horizontale d'équation $y - 5 = 0$.

1SPE-GEOREP-EX-009

Corrigé

Question 1. On résout le système : $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$.

De la deuxième : $y = 3x - 1$. En substituant : $x + 2(3x - 1) = 4$, soit $7x = 6$, $x = \frac{6}{7}$, $y = \frac{11}{7}$.

Le point d'intersection est $I\left(\frac{6}{7}; \frac{11}{7}\right)$.

Question 2. Droite passant par I et $P(2;0)$.

$$m = \frac{0 - 11/7}{2 - 6/7} = \frac{-11/7}{8/7} = -\frac{11}{8}.$$

$$y - 0 = -\frac{11}{8}(x - 2), \text{ soit } 11x + 8y - 22 = 0.$$

$$\text{Vérification : } I : 11 \times \frac{6}{7} + 8 \times \frac{11}{7} - 22 = \frac{66 + 88}{7} - 22 = \frac{154}{7} - 22 = 22 - 22 = 0 \checkmark.$$

Corrigé

Un vecteur normal de $\mathcal{D}$ est $\vec{n}(4; -3)$. Le vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $\vec{u}(3; 4)$.

La perpendiculaire a pour vecteur normal $\vec{u}(3; 4)$.

$$\text{Équation : } 3(x - 1) + 4(y - 2) = 0, \text{ soit } \boxed{3x + 4y - 11 = 0}.$$

$$\text{Vérification : } 3 \times 1 + 4 \times 2 - 11 = 3 + 8 - 11 = 0 \checkmark.$$

$$\text{Orthogonalité : } 4 \times 3 + (-3) \times 4 = 12 - 12 = 0 \checkmark.$$

1SPE-GE0REP-EX-010

La perpendiculaire à $\mathcal{D}$ a pour vecteur directeur le vecteur normal de $\mathcal{D}$.

Corrigé

$$\text{Un vecteur normal est } \vec{n}\left(\begin{matrix} 5 \\ -3 \end{matrix}\right).$$

$$\text{Un vecteur directeur est } \vec{u}\left(\begin{matrix} 3 \\ 5 \end{matrix}\right).$$

$$\text{Vérification : } \vec{n} \cdot \vec{u} = 5 \times 3 + (-3) \times 5 = 0 \checkmark.$$

1SPE-GE0REP-EX-011

Pour $ax + by + c = 0$, le vecteur normal est $(a; b)$ et le vecteur directeur est $(-b; a)$.

Corrigé

$$1(x - 3) + 4(y + 2) = 0, \text{ soit } x + 4y + 5 = 0.$$

$$\text{Vérification : } 3 + 4 \times (-2) + 5 = 3 - 8 + 5 = 0 \checkmark.$$

1SPE-GE0REP-EX-012

On utilise la formule $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$.

Corrigé

$$\vec{n}_1(2; 3) \text{ et } \vec{n}_2(6; 9) = 3\vec{n}_1.$$

Les vecteurs normaux sont colinéaires, donc les droites sont **parallèles**.

$$\text{Elles ne sont pas confondues car } \frac{c_2}{c_1} = \frac{4}{-1} = -4 \neq 3.$$

1SPE-GE0REP-EX-013

On compare les vecteurs normaux.

Corrigé

$$a_1a_2 + b_1b_2 = 3 \times 1 + (-1) \times 3 = 3 - 3 = 0.$$

$$\text{Donc } \mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2.$$

1SPE-GE0REP-EX-014

Deux droites sont perpendiculaires si $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$.

Corrigé

Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $\vec{u}(5; 2)$.

$$\mathcal{D}' : 5(x - 4) + 2(y - 1) = 0, \text{ soit } \boxed{5x + 2y - 22 = 0}.$$

$$\text{Vérification : } 5 \times 4 + 2 \times 1 - 22 = 20 + 2 - 22 = 0 \checkmark.$$

$$\text{Orthogonalité : } 2 \times 5 + (-5) \times 2 = 10 - 10 = 0 \checkmark.$$

1SPE-GE0REP-EX-015

Le vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $(5; 2)$, qui est le vecteur normal de $\mathcal{D}'$.

1SPE-GEOREP-EX-016

On peut utiliser la formule : $M(x; y)$ est sur la droite ssi $\vec{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

Corrigé

$\vec{AM} \begin{pmatrix} x-1 \\ y-3 \end{pmatrix}$ colinéaire à $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$:

$$(x-1)(-1) - (y-3)(2) = 0, \text{ soit } -x + 1 - 2y + 6 = 0, \text{ d'où } \boxed{x + 2y - 7 = 0}.$$

Un vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$$\text{Vérification : } \vec{n} \cdot \vec{u} = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0 \checkmark.$$

1SPE-GEOREP-EX-017

La médiatrice passe par le milieu de $[AB]$ et est perpendiculaire à (AB) .

Corrigé

Milieu : $I \left(\frac{1+5}{2}; \frac{3+7}{2} \right) = I(3; 5)$.

$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la médiatrice.

$$\text{Équation : } 4(x-3) + 4(y-5) = 0, \text{ soit } 4x + 4y - 32 = 0, \text{ ou } \boxed{x + y - 8 = 0}.$$

$$\text{Vérification : } I(3; 5) : 3 + 5 - 8 = 0 \checkmark.$$

1SPE-GEOREP-EX-018

La hauteur issue de A est perpendiculaire à (BC) .

Corrigé

$$\vec{BC} \begin{pmatrix} 2-6 \\ 4-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$\vec{BC}$ est un vecteur normal à la hauteur issue de A .

$$\text{Équation : } -4(x-0) + 4(y-0) = 0, \text{ soit } -4x + 4y = 0, \text{ ou } \boxed{x - y = 0}.$$

$$\text{Vérification : } A(0; 0) : 0 - 0 = 0 \checkmark.$$

1SPE-GEOREP-EX-019

Corrigé

Question 1. $\mathcal{D} : 2x - y - 1 = 0$. Un vecteur normal est $\vec{n}(2; -1)$.

Question 2. $\mathcal{D}'$ parallèle à $\mathcal{D} : 2x - y + c = 0$. En $P(3; 4) : 6 - 4 + c = 0, c = -2$.

$$\boxed{\mathcal{D}' : 2x - y - 2 = 0}.$$

Question 3. $\mathcal{D}''$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$: le vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $(1; 2)$, qui est normal à $\mathcal{D}''$.

$$1(x-3) + 2(y-4) = 0, \text{ soit } \boxed{x + 2y - 11 = 0}.$$

$$\text{Vérification : } 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0 \checkmark.$$

1SPE-GEOREP-EX-020

On calcule les produits scalaires de vecteurs issus de chaque sommet.

Corrigé

$$\vec{BA} \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}, \vec{BC} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = (-3)(4) + (-4)(-3) = -12 + 12 = 0.$$

Donc $\vec{BA} \perp \vec{BC}$, le triangle ABC est **rectangle en B**.

1SPE-GEOREP-EX-021

Corrigé

Question 1. $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$.

Question 2. $(2-2)^2 + (2+3)^2 = 0 + 25 = 25$. Donc $A \in \mathcal{C}$.

1SPE-GEOREP-EX-022

$$(x+1)^2 = (x-(-1))^2.$$

Corrigé

Le centre est $\Omega(-1; 4)$ et le rayon est $r = \sqrt{9} = 3$.

Corrigé

1SPE-GEOREP-EX-023

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4 \text{ et } y^2 + 6y = (y + 3)^2 - 9.$$

L'équation devient $(x - 2)^2 - 4 + (y + 3)^2 - 9 - 3 = 0$, soit $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$.

Le centre est $\Omega(2; -3)$ et le rayon est $r = 4$.

On complète les carrés.

Corrigé

1SPE-GEOREP-EX-024

Milieu : $I(3; 5)$.

$$AB = \sqrt{(5 - 1)^2 + (7 - 3)^2} = \sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2}.$$

$$\text{Rayon : } r = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}, \text{ donc } r^2 = 8.$$

$$\text{Équation : } (x - 3)^2 + (y - 5)^2 = 8.$$

Le centre est le milieu de $[AB]$, le rayon est $AB/2$.

Corrigé

1SPE-GEOREP-EX-025

$$A = 2, B = -8, C = 8.$$

$$\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C = 1 + 16 - 8 = 9 > 0 : \text{c'est un cercle.}$$

Centre : $\Omega(-1; 4)$, rayon $r = 3$.

Corrigé

1SPE-GEOREP-EX-026

$$A = -6, B = 2, C = 15.$$

$$\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C = 9 + 1 - 15 = -5 < 0.$$

L'équation n'a pas de solution : elle ne représente **aucun cercle**.

Corrigé

1SPE-GEOREP-EX-027

$$A(0; 0) : C = 0.$$

$$B(4; 0) : 16 + 4A = 0, \text{ soit } A = -4.$$

$$C(0; 6) : 36 + 6B = 0, \text{ soit } B = -6.$$

$$\text{L'équation est } x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0.$$

$$\text{Centre : } \Omega(2; 3), \text{ rayon } r = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}.$$

On pose $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ et on substitue les trois points.

Corrigé

1SPE-GEOREP-EX-028

$$(3 - 1)^2 + (1 + 2)^2 = 4 + 9 = 13.$$

$13 < 18 = r^2$, donc $\Omega P < r$: le point P est à l'intérieur du cercle.

Corrigé

1SPE-GEOREP-EX-029

$$\Omega A^2 = (1 - a)^2 + 4 \text{ et } \Omega B^2 = (3 - a)^2 + 4.$$

$$\Omega A = \Omega B \iff (1 - a)^2 = (3 - a)^2.$$

$$1 - 2a + a^2 = 9 - 6a + a^2, \text{ soit } 4a = 8, \boxed{a = 2}.$$

Le cercle a pour centre $\Omega(2; 0)$ et rayon $r = \sqrt{5}$.

$\Omega A = \Omega B$ car A et B sont sur le cercle.

Corrigé

1SPE-GEOREP-EX-030

$$\vec{MA} \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}, \vec{MB} \begin{pmatrix} 6 - x \\ 2 - y \end{pmatrix}.$$

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -x(6-x) + (-y)(2-y) = x^2 - 6x + y^2 - 2y.$$

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \iff x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0.$$

En complétant : $(x-3)^2 - 9 + (y-1)^2 - 1 = 0$, soit $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 10$.

C'est le cercle de centre $I(3;1)$ (milieu de $[AB]$) et de rayon $r = \sqrt{10}$, soit le cercle de diamètre $[AB]$.

1SPE-GEOREP-EX-031

Corrigé

On calcule le déterminant $a_1b_2 - a_2b_1$.

$$a_1b_2 - a_2b_1 = 2 \times 2 - 4 \times 1 = 0.$$

Les droites sont parallèles. $\mathcal{D}_2 = 2\mathcal{D}_1$ donnerait $c_2 = 2 \times (-3) = -6 \neq 1$, elles sont strictement parallèles.

1SPE-GEOREP-EX-032

Corrigé

$$a_1b_2 - a_2b_1 = 1 \times (-1) - 2 \times 1 = -3 \neq 0 : \text{droites sécantes.}$$

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \end{cases} . \text{Somme : } 3x = 3, x = 1, y = 1.$$

Point d'intersection : $\boxed{(1;1)}$.

1SPE-GEOREP-EX-033

Corrigé

$$d = \frac{|3 \times 1 - 4 \times 2 + 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|3 - 8 + 5|}{5} = \frac{0}{5} = 0.$$

Le point P est **sur** la droite $\mathcal{D}$.

1SPE-GEOREP-EX-034

Corrigé

$$d(O, \mathcal{D}) = \frac{|3 \times 0 + 4 \times 0 - 15|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{15}{5} = 3.$$

$d = 3 < 5 = r$: la droite est **sécante** au cercle (deux points d'intersection).

1SPE-GEOREP-EX-035

Corrigé

Méthode par substitution.

On substitue $y = 2x$ dans $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$:

$$(x-1)^2 + (2x-2)^2 = 5, \text{ soit } (x-1)^2 + 4(x-1)^2 = 5, \text{ d'où } 5(x-1)^2 = 5, (x-1)^2 = 1.$$

$$x-1 = \pm 1, \text{ soit } x = 0 \text{ ou } x = 2.$$

Pour $x = 0$: $y = 0$. Pour $x = 2$: $y = 4$.

Les points d'intersection sont $\boxed{(0;0)}$ et $\boxed{(2;4)}$.

1SPE-GEOREP-EX-036

Corrigé

$$\text{Question 1. } d = \frac{|9 + 4 - 5|}{5} = \frac{8}{5}.$$

$$\text{Question 2. } d = \frac{8}{5} = 1,6 < 2 = r : \text{ la droite est } \textbf{sécante} \text{ au cercle.}$$

1SPE-GEOREP-EX-037

Corrigé

Tangence $\iff d(\Omega, \mathcal{D}) = r$.

$$d = \frac{|2 - 2(-1) + c|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{|4 + c|}{\sqrt{5}}.$$

$$d = \sqrt{5} \iff |4 + c| = 5.$$

$$4 + c = 5 \text{ ou } 4 + c = -5, \text{ soit } \boxed{c = 1} \text{ ou } \boxed{c = -9}.$$

Corrigé

Vérifions que A est sur C : $(2-2)^2 + (5-3)^2 = 0 + 4 = 4 \checkmark$.

$\vec{\Omega A} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ est normal à la tangente.

Tangente : $0(x-2) + 2(y-5) = 0$, soit $y = 5$.

1SPE-GEOREP-EX-038

La tangente en A est perpendiculaire au rayon $[\Omega A]$.

Corrigé

C_2 développée : $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 = 0$.

C_1 : $x^2 + y^2 - 25 = 0$.

Soustraction : $-8x - 6y + 46 = 0$, soit $4x + 3y - 23 = 0$, d'où $y = \frac{23-4x}{3}$.

Substitution dans C_1 : $x^2 + \frac{(23-4x)^2}{9} = 25$.

$9x^2 + 529 - 184x + 16x^2 = 225$, soit $25x^2 - 184x + 304 = 0$.

$\Delta = 184^2 - 4 \times 25 \times 304 = 33856 - 30400 = 3456 = 576 \times 6$.

$\sqrt{\Delta} = 24\sqrt{6}$.

$x = \frac{184 \pm 24\sqrt{6}}{50} = \frac{92 \pm 12\sqrt{6}}{25}$.

Les ordonnées se déduisent de $y = \frac{23-4x}{3}$.

1SPE-GEOREP-EX-039

On soustrait les deux équations développées pour obtenir la droite radicale.

Corrigé

$d(\Omega, \mathcal{D}) = \frac{|3m-4|}{\sqrt{m^2+1}} = 1$.

$(3m-4)^2 = m^2 + 1$, soit $9m^2 - 24m + 16 = m^2 + 1$, d'où $8m^2 - 24m + 15 = 0$.

$\Delta = 576 - 480 = 96$, $\sqrt{\Delta} = 4\sqrt{6}$.

$m = \frac{24 \pm 4\sqrt{6}}{16} = \frac{6 \pm \sqrt{6}}{4}$.

Les deux tangentes ont pour équations $y = \frac{6+\sqrt{6}}{4}x$ et $y = \frac{6-\sqrt{6}}{4}x$.

1SPE-GEOREP-EX-040

Une droite passant par O a pour équation $y = mx$, soit $mx - y = 0$.

Corrigé

$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

$A = \frac{1}{2}|4 \times 4 - 0 \times 2| = \frac{1}{2} \times 16 = 8$ unités d'aire.

1SPE-GEOREP-EX-041

Corrigé

$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{DC} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$\vec{AB} = \vec{DC}$, donc $ABCD$ est un **parallélogramme**.

1SPE-GEOREP-EX-042

Corrigé

Perpendiculaire : $4x - 3y + c = 0$. En P : $16 - 15 + c = 0$, $c = -1$.

$\begin{cases} 3x + 4y = 6 \\ 4x - 3y = 1 \end{cases}$. On multiplie : $9x + 12y = 18$ et $16x - 12y = 4$.

1SPE-GEOREP-EX-043

La perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par P a pour vecteur normal le vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

$$25x = 22, x = \frac{22}{25}, y = \frac{6 - 3 \times 22/25}{4} = \frac{84/25}{4} = \frac{21}{25}.$$

$$H\left(\frac{22}{25}; \frac{21}{25}\right).$$

1SPE-GEOREP-EX-044

Corrigé

Perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $P : x + y + c = 0$. En $P : 10 + c = 0, c = -10$.

$$\begin{cases} x - y = -2 \\ x + y = 10 \end{cases} \text{ Somme : } 2x = 8, x = 4, y = 6. \text{ Donc } H(4; 6).$$

$$P' = 2H - P : x_{P'} = 8 - 3 = 5, y_{P'} = 12 - 7 = 5.$$

Le symétrique est $\boxed{P'(5; 5)}$.

1SPE-GEOREP-EX-045

Corrigé

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{DC} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}. \vec{AB} = \vec{DC} : \text{parallélogramme.}$$

$$AB = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}, BC = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}. \text{ Deux côtés consécutifs égaux : losange.}$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 3 \times 2 + (-2) \times 3 = 0 : \text{angle droit en } B, \text{ donc rectangle.}$$

$ABCD$ est à la fois un losange et un rectangle : c'est un **carré**.

1SPE-GEOREP-EX-046

Corrigé

$$\text{Milieu de } [AC] : \left(\frac{-1 + 5}{2}; \frac{1 - 1}{2} \right) = (2; 0).$$

$$\text{Milieu de } [BD] : \left(\frac{3 + 1}{2}; \frac{3 - 3}{2} \right) = (2; 0).$$

Même milieu : $ABCD$ est un parallélogramme.

$$AC = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40}, BD = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40}.$$

$AC = BD$: parallélogramme à diagonales égales, c'est un **rectangle**.

1SPE-GEOREP-EX-047

L'orthocentre est l'intersection de deux hauteurs.

Hauteur issue de A (perpendiculaire à (BC)) : $\vec{BC}(-4; 4)$ normal, $-4x + 4y = 0$, soit $x - y = 0$.

Hauteur issue de B (perpendiculaire à (AC)) : $\vec{AC}(2; 4)$ normal, $2(x - 6) + 4y = 0$, soit $x + 2y - 6 = 0$.

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x + 2y = 6 \end{cases} \text{ De la première : } x = y. \text{ Puis } 3y = 6, y = 2, x = 2.$$

L'orthocentre est $\boxed{H(2; 2)}$.

1SPE-GEOREP-EX-048

Corrigé

On pose $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$.

$$A(0; 0) : C = 0. B(4; 0) : 16 + 4A = 0, A = -4. C(0; 6) : 36 + 6B = 0, B = -6.$$

$$\text{Équation : } x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0, \text{ soit } (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 13.$$

Centre $\Omega(2; 3)$, rayon $r = \sqrt{13}$.

1SPE-GEOREP-EX-049

Corrigé

$$MA^2 = (x - 1)^2 + y^2 \text{ et } d(M, \mathcal{D})^2 = (x + 1)^2.$$

CHAPITRE 9

Probabilités conditionnelles et indépendance

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer une probabilité conditionnelle $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$.
- ▶ C2 — Je sais construire et lire un arbre pondéré.
- ▶ C3 — Je sais appliquer la formule des probabilités totales.
- ▶ C4 — Je sais déterminer si deux événements sont indépendants.
- ▶ C5 — Je sais résoudre un problème contextualisé de probabilités conditionnelles.

Un test de dépistage détecte correctement 95

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

Temps 2 — Diagnostic d'entree

(15–20 min, sans calculatrice)

Reponds a chaque question sur ta copie. L'objectif est de reperer ce que tu maitrises, pas de tout reussir.

R1 — Probabilites de base

- On donne $P(A) = \frac{3}{10}$, $P(B) = \frac{2}{5}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$. Calcule $P(A \cup B)$.
- Calcule $P(\bar{A})$ si $P(A) = \frac{3}{10}$.

R2 — Fractions et pourcentages

- Convertis $\frac{3}{20}$ en pourcentage.
- Ecris 45 % sous forme d'une fraction irreductible.

R3 — Arbres de denombrement

- On choisit d'abord une couleur parmi 2, puis une taille parmi 3. Combien d'issues possibles?

R4 — Calcul litteral

- Resous l'equation $3x + 7 = 22$.

R5 — Tableaux de donnees

- Dans un lycee, 120 eleves pratiquent un sport et 80 n'en pratiquent pas. Quel est l'effectif total?
- Quelle est la frequence des sportifs dans cet etablissement?

Grille de decodage

Questions	Prerequis teste	Si tu as echoue...	Fiche a lire
1 et 2	R1 — Probabilites de base	...avant de commencer C1, C3	Fiche R1
3 et 4	R2 — Fractions et pourcentages	...avant de commencer C1, C5	Fiche R2
5	R3 — Arbres de denombrement	...avant de commencer C2	Fiche R3
6	R4 — Calcul litteral	...avant de commencer C4, C5	Fiche R4
7 et 8	R5 — Tableaux de donnees	...avant de commencer C1, C5	Fiche R5

Si tu as reussi toutes les questions sans difficulte, tu peux demarrer directement le Temps 3.

9.1 Probabilité conditionnelle

DÉFINITION 1

Soit A et B deux evenements d'un univers Ω , avec $P(A) > 0$.

La **probabilite conditionnelle de B sachant A** , notee $P_A(B)$, est le nombre :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

On lit : « probabilite de B sachant que A est realise ».

Exemple. Dans un lycee de 500 eleves, 200 sont en Premiere, et parmi ceux-ci 80 suivent la specialite Maths.

On note A : « l'élève est en Première » et B : « l'élève suit Maths ».

$$P(A) = \frac{200}{500} = \frac{2}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{80}{500} = \frac{4}{25}.$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{4}{25}}{\frac{2}{5}} = \frac{4}{25} \times \frac{5}{2} = \frac{2}{5}.$$

Parmi les élèves de Première, $\frac{2}{5}$ suivent Maths.

Contre-exemple. Attention : $P_A(B) \neq P_B(A)$ en général !

Ici, $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ nécessite de connaître $P(B)$ (la proportion de tous les élèves qui font Maths, pas seulement ceux de Première).

Propriété 1. Si $P(A) > 0$, alors :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

C'est la **formule de multiplication** (ou formule des probabilités composées).

Exemple. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note A : « la carte est un cœur » et B : « la carte est un roi ».

$$P(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}.$$

Sachant que la carte est un cœur, la probabilité que ce soit le roi de cœur est $P_A(B) = \frac{1}{8}$.

$$\text{Donc } P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{32}.$$

Propriété 2. Si $P(A) > 0$, alors la fonction $B \mapsto P_A(B)$ vérifie les axiomes d'une probabilité :

- ▶ $P_A(\Omega) = 1$;
- ▶ Pour tout événement B , $0 \leq P_A(B) \leq 1$;
- ▶ $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B)$.

9.2 Arbre pondéré

DÉFINITION 1

Un **arbre pondéré** (ou arbre de probabilités) est un arbre dont chaque branche porte une probabilité, et qui modélise une expérience aléatoire en deux ou plusieurs étapes.

Règles de construction :

1. Chaque nœud représente un événement ou un sous-événement.
2. La probabilité portée par une branche est la **probabilité conditionnelle** correspondante.
3. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.

Propriété 1. Règle du produit le long d'un chemin :

La probabilité d'un chemin (de la racine à une feuille) est égale au **produit** des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin.

Par exemple, le chemin « A puis B sachant A » a pour probabilité :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

Exemple. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire une boule, puis sans remise, une seconde.

Première étape : $P(R_1) = \frac{3}{5}, P(V_1) = \frac{2}{5}.$

Deuxième étape sachant R_1 : $P_{R_1}(R_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, P_{R_1}(V_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$

Deuxième étape sachant V_1 : $P_{V_1}(R_2) = \frac{3}{4}, P_{V_1}(V_2) = \frac{1}{4}.$

Le chemin « rouge puis vert » a pour probabilité $P(R_1 \cap V_2) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}.$

Propriété 2. Somme des feuilles :

La somme des probabilités de toutes les feuilles (tous les chemins) vaut 1. Ceci sert de vérification.

Exemple. Avec l'urne précédente :

$$\begin{aligned} P(R_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap V_2) + P(V_1 \cap R_2) + P(V_1 \cap V_2) &= \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{6}{20} + \frac{2}{20} \\ &= \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = 1. \checkmark \end{aligned}$$

9.3 Probabilités totales

DÉFINITION 1

Une **partition** de l'univers Ω est une famille d'événements $B_1, B_2, \dots, B_n$ tels que :

- ▶ les B_i sont deux à deux incompatibles : $B_i \cap B_j = \emptyset$ pour $i \neq j$;
- ▶ leur réunion couvre Ω : $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$.

Le cas le plus courant est la partition $\{B, \bar{B}\}$.

THÉORÈME 1

(Formule des probabilités totales)

Si $B_1, B_2, \dots, B_n$ forment une partition de Ω avec $P(B_i) > 0$ pour tout i , alors pour tout événement A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \times P_{B_i}(A) = P(B_1) P_{B_1}(A) + P(B_2) P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n) P_{B_n}(A).$$

Cas usuel avec la partition $\{B, \bar{B}\}$:

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

Démonstration. **Démonstration (exigible au baccalauréat).**

Comme $\{B, \bar{B}\}$ est une partition de Ω , on a :

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}),$$

et les événements $A \cap B$ et $A \cap \bar{B}$ sont incompatibles.

Par additivité de la probabilité :

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}).$$

Or, par définition de la probabilité conditionnelle :

$$P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A) \quad \text{et} \quad P(A \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

D'où :

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A). \quad \square$$

Exemple. Une usine a deux chaînes de production. La chaîne 1 produit 60 % des pièces et la chaîne 2 produit 40 %. Le taux de pièces defectueuses est de 3 % pour la chaîne 1 et de 5 % pour la chaîne 2.

On note C_1 : « la pièce vient de la chaîne 1 », C_2 : « la pièce vient de la chaîne 2 », et D : « la pièce est defectueuse ».

$\{C_1, C_2\}$ est une partition de Ω .

$$P(D) = P(C_1) \times P_{C_1}(D) + P(C_2) \times P_{C_2}(D) = \frac{60}{100} \times \frac{3}{100} + \frac{40}{100} \times \frac{5}{100} = \frac{18}{1000} + \frac{20}{1000} = \frac{38}{1000} = \frac{19}{500}.$$

La probabilité qu'une pièce soit defectueuse est $\frac{19}{500} = 3,8\%$.

9.4 Indépendance de deux événements

DÉFINITION 1

Deux événements A et B sont **indépendants** si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

Propriété 1. Si $P(A) > 0$, alors A et B sont indépendants si et seulement si :

$$P_A(B) = P(B).$$

Autrement dit, la réalisation de A ne modifie pas la probabilité de B .

Exemple. On lance un dé équilibré à six faces. On note A : « le résultat est pair » et B : « le résultat est supérieur ou égal à 5 ».

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad A \cap B = \{6\} \text{ donc } P(A \cap B) = \frac{1}{6}.$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B).$$

Les événements A et B sont indépendants.

Contre-exemple. Indépendance $\neq$ incompatibilité !

Deux événements incompatibles ($A \cap B = \emptyset$) ont $P(A \cap B) = 0$. Ils ne sont indépendants que si $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$.

Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants.

Propriété 2. Si A et B sont indépendants, alors :

- ▶ A et $\bar{B}$ sont indépendants ;
- ▶ $\bar{A}$ et B sont indépendants ;
- ▶ $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants.

Exemple. On tire une carte dans un jeu de 52. On note A : « la carte est rouge » ($P(A) = \frac{1}{2}$) et B : « la carte est un as » ($P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$).

$$P(A \cap B) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26} \text{ (deux as rouges).}$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{26}. \text{ Donc } A \text{ et } B \text{ sont indépendants.}$$

$$\text{Vérification : } P(A \cap \bar{B}) = \frac{24}{52} = \frac{12}{26} \text{ et } P(A) \times P(\bar{B}) = \frac{1}{2} \times \frac{12}{13} = \frac{12}{26}. \checkmark$$

9.5 Problèmes contextuels

Propriété 1. Pour résoudre un problème de probabilités conditionnelles :

1. **Identifier les événements** et les nommer avec des lettres.
2. **Extraire les données** de l'énoncé : probabilités, pourcentages, effectifs.
3. **Construire un arbre pondéré** ou un tableau à double entrée.
4. **Appliquer les formules** : probabilité conditionnelle, probabilités totales, indépendance.
5. **Conclure** en revenant au contexte (phrase-réponse).

Exemple. (Test médical)

Un test de dépistage a les caractéristiques suivantes :

- ▶ **Sensibilité** : si la personne est malade, le test est positif dans 95 % des cas.
- ▶ **Spécificité** : si la personne est saine, le test est négatif dans 97 % des cas.
- ▶ **Prévalence** : 1 % de la population est malade.

On note M : « la personne est malade » et T : « le test est positif ».

$$\text{Données : } P(M) = \frac{1}{100}, P_M(T) = \frac{95}{100}, P_{\bar{M}}(\bar{T}) = \frac{97}{100} \text{ donc } P_{\bar{M}}(T) = \frac{3}{100}.$$

Probabilités totales :

$$P(T) = P(M) \times P_M(T) + P(\bar{M}) \times P_{\bar{M}}(T) = \frac{1}{100} \times \frac{95}{100} + \frac{99}{100} \times \frac{3}{100} = \frac{95}{10000} + \frac{297}{10000} = \frac{392}{10000} = \frac{49}{1250}.$$

Valeur prédictive positive :

$$P_{T(M)} = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{P(M) \times P_M(T)}{P(T)} = \frac{\frac{95}{10000}}{\frac{392}{10000}} = \frac{95}{392} \approx 0,242.$$

Resultat surprenant : un test positif ne signifie une maladie réelle que dans environ 24 % des cas !

Exemple. (Contrôle qualité)

Trois machines M_1, M_2, M_3 produisent respectivement 50 %, 30 % et 20 % de la production totale. Les taux de défaut sont respectivement 2 %, 3 % et 5 %.

On prélève une pièce au hasard. On note D : « la pièce est défectueuse ».

Par la formule des probabilités totales :

$$P(D) = 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,03 + 0,2 \times 0,05 = 0,01 + 0,009 + 0,01 = 0,029.$$

La pièce est défectueuse : d'où vient-elle probablement ?

$$P_D(M_3) = \frac{P(M_3) \times P_{M_3}(D)}{P(D)} = \frac{0,2 \times 0,05}{0,029} = \frac{0,01}{0,029} \approx 0,345.$$

MÉTHODE M1 — CALCULER UNE PROBABILITÉ CONDITIONNELLE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer « la probabilité de B sachant A », ou lorsqu'on connaît $P(A \cap B)$ et $P(A)$ et qu'on cherche $P_A(B)$.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les événements A et B à partir de l'énoncé.
2. Je détermine $P(A)$ et $P(A \cap B)$ (par lecture directe, arbre ou tableau).
3. Je vérifie que $P(A) > 0$ (condition d'existence).
4. J'applique la formule : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.
5. Je simplifie la fraction si possible.

Exemple rédigé. Dans un groupe de 200 élèves, 120 sont des filles. Parmi les filles, 48 portent des lunettes. On tire un élève au hasard. Calculer la probabilité de porter des lunettes sachant que l'élève est une fille.

A : « l'élève est une fille », B : « l'élève porte des lunettes ».

$$P(A) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{48}{200} = \frac{6}{25}.$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{6}{25}}{\frac{3}{5}} = \frac{6}{25} \times \frac{5}{3} = \frac{2}{5}.$$

Parmi les filles, $\frac{2}{5} = 40\%$ portent des lunettes.

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$: l'ordre compte !
- **Piège 2.** Confondre $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$ dans la formule.
- **Piège 3.** Oublier de vérifier que $P(A) > 0$.

Vérifier son résultat. Vérifier que $0 \leq P_A(B) \leq 1$. Si le résultat dépasse 1 ou est négatif, il y a une erreur. On peut aussi vérifier que $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — CONSTRUIRE ET EXPLOITER UN ARBRE PONDERÉ

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour toute expérience en deux étapes ou plus, lorsqu'on connaît des probabilités conditionnelles et qu'on cherche des probabilités d'intersections.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie la première étape et ses issues. Je place les probabilités sur les premières branches.
2. Pour chaque issue de la première étape, j'identifie les issues de la deuxième étape et je place les **probabilités conditionnelles** correspondantes.
3. Je vérifie : à chaque nœud, la somme des branches vaut 1.
4. Pour calculer la probabilité d'un chemin, je **multiplie** les probabilités le long du chemin.
5. La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent.

Exemple rédigé. Un sac contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire une boule, puis sans remise une seconde. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

Identifier les événements.

Lire les probabilités.

Appliquer la formule.

$$P(R_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}, \quad P(B_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

$$\text{Sachant } R_1 : P_{R_1}(R_2) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, \quad P_{R_1}(B_2) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Sachant } B_1 : P_{B_1}(R_2) = \frac{4}{9}, \quad P_{B_1}(B_2) = \frac{5}{9}.$$

$$P(\text{diff.}) = P(R_1 \cap B_2) + P(B_1 \cap R_2) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{4}{9} = \frac{4}{15} + \frac{12}{45} = \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{8}{15}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Placer $P(A \cap B)$ sur une branche au lieu de $P_A(B)$.
- **Piège 2.** Additionner au lieu de multiplier le long d'un chemin.
- **Piège 3.** Oublier de vérifier la somme des branches à chaque noeud.

Vérifier son résultat. La somme de toutes les feuilles doit valoir 1.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

Première branche.

Branches conditionnelles.

Chemins « couleurs différentes ».

MÉTHODE M3 — APPLIQUER LA FORMULE DES PROBABILITÉS TOTALES

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'on cherche $P(A)$ et que l'on connaît les probabilités conditionnelles $P_{B_i}(A)$ pour une partition $\{B_1, \dots, B_n\}$ de l'univers.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie une partition de l'univers : des événements $B_1, \dots, B_n$ incompatibles et exhaustifs.
2. Je repère les valeurs de $P(B_i)$ et $P_{B_i}(A)$ pour chaque i .
3. J'applique la formule :

$$P(A) = P(B_1) \times P_{B_1}(A) + P(B_2) \times P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n) \times P_{B_n}(A).$$

4. Si la partition est $\{B, \bar{B}\}$, la formule se réduit à :

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

Exemple rédigé. 60 % des habitants d'une ville utilisent les transports en commun (T). Parmi ceux-ci, 80 % arrivent à l'heure (H). Parmi ceux qui n'utilisent pas les transports en commun, 70 % arrivent à l'heure.

$$P(T) = \frac{3}{5}, \quad P(\bar{T}) = \frac{2}{5}, \quad P_T(H) = \frac{4}{5}, \quad P_{\bar{T}}(H) = \frac{7}{10}.$$

$$P(H) = P(T) \times P_T(H) + P(\bar{T}) \times P_{\bar{T}}(H) = \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{12}{25} + \frac{14}{50} = \frac{24}{50} + \frac{14}{50} = \frac{38}{50} = \frac{19}{25}.$$

La probabilité d'arriver à l'heure est $\frac{19}{25} = 76\%$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier un terme de la partition (par exemple oublier $P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A)$).
- **Piège 2.** Ne pas vérifier que les B_i forment bien une partition.
- **Piège 3.** Confondre $P(A)$ et $P_B(A)$.

Vérifier son résultat. On peut vérifier en calculant aussi $P(\bar{A})$ par probabilités totales et en vérifiant que $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

Partition $\{T, \bar{T}\}$.

Probabilités totales.

MÉTHODE M4 — DETERMINER SI DEUX ÉVÉNEMENTS SONT INDÉPENDANTS

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande si deux événements sont indépendants, ou lorsque l'on veut savoir si la réalisation de l'un influence la probabilité de l'autre.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les événements A et B .
2. Je calcule $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$ (par arbre, tableau ou formule).
3. Je calcule le produit $P(A) \times P(B)$.
4. Je compare : si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, les événements sont indépendants. Sinon, ils ne le sont pas.
5. **Méthode alternative** (si $P(A) > 0$) : je compare $P_A(B)$ et $P(B)$. Égalité $\Leftrightarrow$ indépendance.

Exemple rédigé. On lance deux dés équilibrés. A : « le premier de donne 6 », B : « la somme vaut 7 ».

$$P(A) = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad A \cap B = \{(6, 1)\} \text{ donc } P(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = P(A \cap B).$$

Les événements A et B sont indépendants.

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre indépendance et incompatibilité. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants.
- **Piège 2.** Affirmer l'indépendance sans calcul, « parce que ça paraît logique ».
- **Piège 3.** Oublier de conclure par une phrase.

Vérifier son résultat. Si A et B sont indépendants, vérifier aussi que $P_A(B) = P(B)$ (ou inversement).

S'entraîner. (renvois exercices M4)

Calculer $P(A)$, $P(B)$,
 $P(A \cap B)$.
Comparer.

MÉTHODE M5 — RESOUDRE UN PROBLÈME CONTEXTUALISÉ DE PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour tout problème en contexte réel (test médical, contrôle qualité, jeu de hasard, génétique) faisant intervenir des probabilités conditionnelles.

La méthode pas à pas.

1. Lire l'énoncé et identifier les événements (les nommer avec des lettres).
2. Extraire les données : les probabilités données, en distinguant $P(A)$, $P_A(B)$, $P(A \cap B)$, etc.
3. Choisir un outil : arbre pondéré (souvent le plus adapté) ou tableau à double entrée.
4. Compléter l'outil avec toutes les probabilités déduites.
5. Répondre aux questions en utilisant les formules :

► probabilité conditionnelle : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$;

► probabilités totales : $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$;

► indépendance : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$?

6. Conclure par une phrase en revenant au contexte.

Exemple rédigé. Dans une région, 30 % de la population est vaccinée (V). Parmi les vaccinés, 2 % tombent malades (M). Parmi les non-vaccinés, 15 % tombent malades. Quelle est la probabilité qu'une personne malade soit vaccinée ?

$$P(V) = \frac{3}{10}, \quad P_V(M) = \frac{1}{50}, \quad P_{\bar{V}}(M) = \frac{3}{20}.$$

Données.

$$P(M) = \frac{3}{10} \times \frac{1}{50} + \frac{7}{10} \times \frac{3}{20} = \frac{3}{500} + \frac{21}{200} = \frac{6}{1000} + \frac{105}{1000} = \frac{111}{1000}.$$

$$P_M(V) = \frac{P(V \cap M)}{P(M)} = \frac{\frac{3}{1000}}{\frac{111}{1000}} = \frac{3}{111} \times \frac{1000}{111} = \frac{6}{111} = \frac{2}{37}.$$

Environ 5,4 % des malades sont vaccinés.

Les pièges.

- **Piège 1.** Mal identifier les événements (confondre sensibilité et VPP).
- **Piège 2.** Confondre pourcentages et probabilités (30 % s'écrit 0,3 ou $\frac{3}{10}$).
- **Piège 3.** Oublier de revenir au contexte dans la conclusion.

Vérifier son résultat. Vérifier que la somme des feuilles de l'arbre vaut 1. Vérifier que $P_M(V) + P_M(\bar{V}) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Probabilités totales.

Probabilité conditionnelle
inversee.

Exercice 1

On donne $P(A) = \frac{3}{10}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$.

1. Calculer $P_A(B)$.
2. Calculer $P_A(\bar{B})$.

1SPE-PROBCOND-EX-001
⌚ 8 min

Exercice 2

On donne $P(B) = \frac{2}{5}$ et $P(A \cap B) = \frac{3}{20}$.

1. Calculer $P_B(A)$.
2. En déduire $P_B(\bar{A})$.

1SPE-PROBCOND-EX-002
⌚ 8 min

Exercice 3

Dans un lycée de 200 élèves, 120 sont des filles et 45 filles pratiquent un sport.

On tire un élève au hasard. On note F : « l'élève est une fille » et S : « l'élève est sportif ».

1. Donner $P(F)$ et $P(F \cap S)$.
2. Calculer $P_F(S)$. Interpréter.

1SPE-PROBCOND-EX-003
⌚ 10 min

Exercice 4

On donne $P(A) = \frac{1}{4}$ et $P_A(B) = \frac{3}{5}$.

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. Si de plus $P(B) = \frac{1}{2}$, calculer $P_B(A)$.

1SPE-PROBCOND-EX-004
⌚ 10 min

Exercice 5

On donne $P(A) = \frac{7}{10}$ et $P(A \cap B) = \frac{7}{20}$. Calculer $P_A(B)$.

1SPE-PROBCOND-EX-005
⌚ 8 min

1SPE-PROBCOND-EX-006

12 min

Exercice 6

Dans un club de 100 membres, on relève les données suivantes :

	Sport	Pas sport	Total
Hommes	36	24	60
Femmes	20	20	40
Total	56	44	100

On note H : « la personne est un homme » et S : « la personne fait du sport ».

1. Calculer $P_H(S)$ et $P_F(S)$.
2. Comparer et interpréter.

1SPE-PROBCOND-EX-007

12 min

Exercice 7

On donne $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{3}{10}$ et $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$.

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. En déduire $P_A(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$.

1SPE-PROBCOND-EX-008

10 min

Exercice 8

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note C : « la carte est un cœur » et F : « la carte est une figure (roi, dame, valet) ».

1. Donner $P(C)$, $P(F)$ et $P(C \cap F)$.
2. Calculer $P_C(F)$. Interpréter.
3. Calculer $P_F(C)$.

1SPE-PROBCOND-EX-009

15 min

Exercice 9

On donne $P(A) = p$ (inconnue), $P_A(B) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ et $P_B(A) = \frac{1}{4}$.

1. Exprimer $P(A \cap B)$ en fonction de p .
2. En utilisant $P_B(A) = \frac{1}{4}$, déterminer la valeur de p .
3. Vérifier la cohérence des résultats.

1SPE-PROBCOND-EX-010

15 min

Exercice 10

On donne $P(A) = \frac{3}{5}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ et $P(A \cup B) = \frac{4}{5}$.

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.
3. Calculer $P_{\overline{A}}(B)$.
4. Comparer $P_A(B)$ et $P_{\overline{A}}(B)$. Interpréter.

1SPE-PROBCOND-EX-011

10 min

Exercice 11

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire une boule, on note sa couleur, puis sans remise on tire une deuxième boule.

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge.

Exercice 121SPE-PROBCOND-EX-012
⌚ 10 min

Un joueur lance un dé truqué : il obtient « pile » avec la probabilité $\frac{1}{3}$ et « face » avec la probabilité $\frac{2}{3}$.
S'il obtient pile, il gagne un lot avec la probabilité $\frac{3}{4}$. S'il obtient face, il gagne un lot avec la probabilité $\frac{1}{4}$.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(\text{pile} \cap \text{lot})$ et $P(\text{face} \cap \text{lot})$.
3. Vérifier que la somme de toutes les feuilles vaut 1.

Exercice 131SPE-PROBCOND-EX-013
⌚ 10 min

Un sac contient des jetons rouges, bleus et noirs en proportions $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{6}$. Si le jeton est rouge, on gagne avec probabilité $\frac{1}{5}$. S'il est bleu, on gagne avec probabilité $\frac{2}{5}$. S'il est noir, on gagne avec probabilité $\frac{3}{5}$.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité de gagner.

Exercice 141SPE-PROBCOND-EX-014
⌚ 8 min

On donne $P(A) = \frac{2}{5}$, $P_A(B) = \frac{3}{4}$ et $P_{\bar{A}}(B) = \frac{1}{3}$.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap B)$.

Exercice 151SPE-PROBCOND-EX-015
⌚ 10 min

Un élève revise ses cours avec probabilité $\frac{3}{5}$. S'il a revu, il réussit l'examen avec probabilité $\frac{9}{10}$.
S'il n'a pas revu, il réussit avec probabilité $\frac{7}{10}$.

1. Construire l'arbre pondéré de la situation.
2. Calculer la probabilité de chaque chemin.
3. Vérifier que la somme des feuilles vaut 1.

Exercice 161SPE-PROBCOND-EX-016
⌚ 12 min

Un sac contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. On tire deux boules successivement sans remise.

1. Construire l'arbre pondéré complet.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule bleue.

1SPE-PROBCOND-EX-017
⌚ 12 min

Exercice 17 ♦♦

On lance deux fois une pièce truquée : $P(\text{pile}) = \frac{2}{3}$ et $P(\text{face}) = \frac{1}{3}$.

1. Construire l'arbre pondéré (les deux lancers sont indépendants).
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux piles.
3. Calculer la probabilité d'obtenir exactement une pile.

1SPE-PROBCOND-EX-018
⌚ 15 min

Exercice 18 ♦♦

On dispose de trois urnes identiques. L'urne U_1 contient 2 boules rouges et 1 bleue. L'urne U_2 contient 1 rouge et 2 bleues. L'urne U_3 contient 3 rouges. On choisit une urne au hasard (équiprobabilité) puis on tire une boule.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge.

1SPE-PROBCOND-EX-019
⌚ 15 min

Exercice 19 ♦♦♦

Un sac contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire trois boules successivement sans remise.

1. Construire l'arbre pondéré pour les trois premiers niveaux (branche rouge uniquement au deuxième et troisième niveau).
2. Calculer la probabilité d'obtenir trois boules rouges.
3. Sans arbre complet, déterminer la probabilité d'obtenir 0 boule rouge.

1SPE-PROBCOND-EX-020
⌚ 15 min

Exercice 20 ♦♦♦

On connaît les probabilités des quatre feuilles d'un arbre à deux niveaux :

$$P(A \cap B) = \frac{3}{20}, \quad P(A \cap \bar{B}) = \frac{1}{20}, \quad P(\bar{A} \cap B) = \frac{1}{4}, \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{11}{20}.$$

1. Vérifier que la somme de ces quatre probabilités vaut 1.
2. Reconstituer l'arbre pondéré complet : déterminer $P(A)$, $P_A(B)$, $P_{\bar{A}}(B)$.

1SPE-PROBCOND-EX-021
⌚ 10 min

Exercice 21 ♦

On donne $P(B) = \frac{2}{5}$, $P_B(A) = \frac{3}{4}$ et $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{3}$.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(A)$ par la formule des probabilités totales.

1SPE-PROBCOND-EX-022
⌚ 10 min

Exercice 22 ♦

30 % des élèves d'un lycée sont inscrits en section musique (M). Parmi ceux de la section musique, 80 % assistent au concert (T). Parmi les autres, 20 % assistent au concert.

1. Calculer $P(T)$ par la formule des probabilités totales.
2. Interpréter le résultat.

1SPE-PROBCOND-EX-023
⌚ 12 min

Exercice 23 ♦

Une usine dispose de trois chaînes : C_1 (50 %), C_2 (30 %), C_3 (20 %). Les taux de défaut sont respectivement 2 %, 3 % et 5 %.

1. Vérifier que $\{C_1, C_2, C_3\}$ est une partition.
2. Calculer $P(D)$ ou D est « pièce défectueuse ».

Exercice 24 ♦

1SPE-PROBCOND-EX-024
⌚ 10 min

Un élève revise un chapitre avec probabilité $\frac{1}{3}$. S'il a revu, il réussit le contrôle avec probabilité $\frac{9}{10}$. Sinon, il réussit avec probabilité $\frac{1}{2}$.

Calculer la probabilité de réussir le contrôle.

Exercice 25 ♦

1SPE-PROBCOND-EX-025
⌚ 10 min

On donne $P(A) = \frac{7}{10}$, $P_A(B) = \frac{4}{7}$ et $P_{\bar{A}}(B) = \frac{2}{3}$. Calculer $P(B)$.

Exercice 26 ♦♦

1SPE-PROBCOND-EX-026
⌚ 15 min

Un test de dépistage a une sensibilité de 98 % et une spécificité de 96 %. La prévalence de la maladie est de 0,5 %.

On note M : « malade » et T : « test positif ».

1. Donner $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\bar{M}}(T)$.
2. Calculer $P(T)$.
3. Calculer la valeur prédictive positive $P_T(M)$.
4. Interpréter : le test est-il fiable pour un dépistage de masse ?

Exercice 27 ♦♦

1SPE-PROBCOND-EX-027
⌚ 12 min

Une boulangerie a deux fournisseurs de farine. Le fournisseur F_1 fournit 40 % de la farine avec un taux de non-conformité de 5 %. Le fournisseur F_2 fournit 60 % avec un taux de non-conformité de 3 %.

1. Calculer la probabilité qu'un sac de farine pris au hasard soit non conforme.
2. Un sac est non conforme. Calculer la probabilité qu'il vienne de F_1 .

Exercice 28 ♦♦

1SPE-PROBCOND-EX-028
⌚ 15 min

1. Rédiger la démonstration de la formule des probabilités totales dans le cas de la partition $\{B, \bar{B}\}$.
2. **Application.** On donne $P(B) = \frac{3}{8}$, $P_B(A) = \frac{2}{3}$ et $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{4}$. Calculer $P(A)$.

Exercice 29 ♦♦♦

1SPE-PROBCOND-EX-029
⌚ 15 min

On donne $P_B(A) = \frac{1}{2}$, $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{5}$ et $P(A) = \frac{3}{10}$.

Déterminer $P(B)$.

Exercice 30 ♦♦♦

1SPE-PROBCOND-EX-030
⌚ 15 min

Un entrepôt reçoit des composants de quatre lots : L_1 (25 %), L_2 (35 %), L_3 (25 %), L_4 (15 %). Les taux de défaut sont respectivement 1 %, 2 %, 3 % et 5 %.

1. Calculer la probabilité qu'un composant soit défectueux.
2. Un composant est défectueux. De quel lot a-t-il le plus de chances de provenir ?

1SPE-PROBCOND-EX-031

8 min

Exercice 31

On donne $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$.

Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier.

1SPE-PROBCOND-EX-032

8 min

Exercice 32

On donne $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{1}{3}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$.

Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier.

1SPE-PROBCOND-EX-033

10 min

Exercice 33

On donne $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{6}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$.

1. Montrer que A et B sont indépendants.
2. En déduire que $\bar{A}$ et B sont aussi indépendants.

1SPE-PROBCOND-EX-034

10 min

Exercice 34

On lance un dé équilibré à six faces. On note A : « le résultat est pair » et B : « le résultat est supérieur ou égal à 5 ».

1. Déterminer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.
2. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

1SPE-PROBCOND-EX-035

8 min

Exercice 35

Deux événements A et B sont incompatibles avec $P(A) = \frac{1}{4}$ et $P(B) = \frac{1}{3}$.

A et B peuvent-ils être indépendants ? Justifier.

1SPE-PROBCOND-EX-036

12 min

Exercice 36

On tire une carte dans un jeu de 52 cartes. A : « la carte est rouge », B : « la carte est un as ».

1. Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$.
2. Les événements sont-ils indépendants ?
3. $\bar{A}$ et B sont-ils indépendants ? Justifier sans refaire tout le calcul.

1SPE-PROBCOND-EX-037

12 min

Exercice 37

Dans un lycée de 300 élèves :

	Maths	Pas Maths	Total
Sportif	60	90	150
Non sportif	40	110	150
Total	100	200	300

S : « sportif », M : « fait Maths ». Les événements S et M sont-ils indépendants ?

1SPE-PROBCOND-EX-038

12 min

Exercice 38

A et B sont deux événements indépendants avec $P(A) = \frac{1}{2}$ et $P(B) = \frac{3}{10}$.

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. Calculer $P(A \cup B)$.
3. Calculer $P_A(B)$. Commenter.

Exercice 39

1SPE-PROBCOND-EX-039
⌚ 15 min

A et B sont indépendants. On donne $P(A) = \frac{1}{3}$ et $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$.

1. Exprimer $P(A \cup B)$ en fonction de $P(A)$ et $P(B)$ en utilisant l'indépendance.
2. En déduire $P(B)$.
3. Vérifier en calculant directement $P(A \cap B)$ et $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Exercice 40

1SPE-PROBCOND-EX-040
⌚ 15 min

On répète 3 fois de manière indépendante une expérience de probabilité de succès $\frac{2}{3}$.

1. Calculer la probabilité d'obtenir 3 succès.
2. Calculer la probabilité d'obtenir au moins un succès.
3. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 succès.

Exercice 41

1SPE-PROBCOND-EX-041
⌚ 12 min

Un test de dépistage a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 97 %. La prévalence de la maladie est de 1 %.

1. Définir les événements M et T et donner les probabilités extraites de l'énoncé.
2. Construire l'arbre pondéré.
3. Calculer $P(T)$.
4. Calculer $P_T(M)$. Interpréter.

Exercice 42

1SPE-PROBCOND-EX-042
⌚ 12 min

Une usine produit des ampoules sur deux lignes : la ligne A (60 %, défaut 4 %) et la ligne B (40 %, défaut 7 %).

1. Calculer la probabilité qu'une ampoule soit défectueuse.
2. Une ampoule est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle vienne de la ligne B .

Exercice 43

1SPE-PROBCOND-EX-043
⌚ 10 min

Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules bleues. On tire deux boules avec remise.

1. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.
3. Les tirages sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 44

1SPE-PROBCOND-EX-044
⌚ 12 min

En génétique, un gène a deux allèles : A (dominant) et a (récessif). Les deux parents sont porteurs sains (Aa).

Pour chaque enfant, les allèles sont transmis indépendamment.

1. Construire l'arbre des possibilités pour un enfant.
2. Calculer $P(aa)$ (enfant malade), $P(Aa)$ (porteur sain), $P(AA)$ (sain non porteur).
3. Un enfant n'est pas malade. Calculer la probabilité qu'il soit porteur sain.

1SPE-PROBCOND-EX-045
⌚ 10 min

Exercice 45 ◆

La probabilité de pluie aujourd'hui est $\frac{2}{5}$. Si aujourd'hui il pleut, la probabilité de pluie demain est $\frac{7}{10}$. Si aujourd'hui il fait soleil, la probabilité de pluie demain est $\frac{3}{10}$.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité qu'il pleuve demain.

1SPE-PROBCOND-EX-046
⌚ 15 min

Exercice 46 ◆◆

Un lot de 100 pièces contient 5 pièces défectueuses. On prélève 2 pièces sans remise.

1. Calculer la probabilité que les deux pièces soient défectueuses.
2. Calculer la probabilité qu'au moins une pièce soit défectueuse.
3. Comparer avec le cas d'un tirage avec remise.

1SPE-PROBCOND-EX-047
⌚ 15 min

Exercice 47 ◆◆

Un test antidopage a une sensibilité de 99 % et une spécificité de 95 %. On estime que 5 % des sportifs sont dopés.

1. Construire l'arbre pondéré. Définir les événements.
2. Calculer la probabilité d'un test positif.
3. Calculer $P_T(D)$: probabilité d'être réellement dopé sachant que le test est positif.
4. Un sportif positif doit-il être automatiquement sanctionné ? Argumenter.

1SPE-PROBCOND-EX-048
⌚ 15 min

Exercice 48 ◆◆

Une compagnie d'assurance classe ses conducteurs en « prudents » (80 %) et « à risque » (20 %). La probabilité d'accident est de 5 % pour un prudent et de 25 % pour un conducteur à risque.

1. Calculer la probabilité qu'un conducteur ait un accident.
2. Un conducteur a eu un accident. Calculer la probabilité qu'il soit « à risque ».
3. Commenter le résultat.

1SPE-PROBCOND-EX-049
⌚ 20 min

Exercice 49 ◆◆◆

On effectue un double test de dépistage. Le premier test a une sensibilité de 90 % et une spécificité de 90 %. Si le premier test est positif, on effectue un second test (sensibilité 95 %, spécificité 95 %). La prévalence est de 2 %.

1. Calculer la probabilité d'un premier test positif.
2. Calculer $P_T(M)$ pour le premier test seul.
3. Calculer la probabilité que les deux tests soient positifs.
4. Calculer la probabilité d'être malade sachant que les deux tests sont positifs. Comparer avec la question 2.

Exercice 50



1SPE-PROBCOND-EX-050

20 min

Un test a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 90 %. On note p la prévalence de la maladie.

1. Exprimer la valeur prédictive positive $P_T(M)$ en fonction de p .
2. Déterminer la valeur minimale de p pour que $P_T(M) \geq \frac{1}{2}$.
3. Interpréter : à partir de quelle prévalence un test positif est-il « plus probable que non » ?

Coup de pouce 1. Écris la formule $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ puis remplace par les valeurs données.

Coup de pouce 2. Attention à l'ordre : c'est $P_B(A)$, donc on divise par $P(B)$, pas par $P(A)$.

Coup de pouce 3. Commence par calculer les probabilités à partir des effectifs : divise chaque effectif par le total.

Coup de pouce 4. Pour la question 1, utilise la formule de multiplication : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

Coup de pouce 11. Pour chaque branche conditionnelle, pense à retirer la boule déjà tirée de l'urne.

Coup de pouce 12. Multiplie les probabilités le long d'un chemin (règle du produit).

Coup de pouce 13. Construis d'abord les trois branches principales avec les proportions des jetons.

Coup de pouce 14. Place $P_A(B)$ sur la branche issue de A et non $P(A \cap B)$.

Coup de pouce 21. Identifie la partition $(B \text{ et } \bar{B})$ puis applique $P(A) = P(B) P_B(A) + P(\bar{B}) P_{\bar{B}}(A)$.

Coup de pouce 22. Traduis les pourcentages en fractions avant de calculer.

Coup de pouce 23. Vérifie que les trois chaînes forment bien une partition (somme des proportions = 1).

Coup de pouce 24. C'est le cas usuel avec la partition $\{R, \bar{R}\}$. Applique directement la formule.

Coup de pouce 31. Compare $P(A \cap B)$ avec le produit $P(A) \times P(B)$. Égalité = indépendance.

Coup de pouce 32. Calcule $P(A) \times P(B)$ et compare avec $P(A \cap B)$.

Coup de pouce 41. Commence par identifier $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\bar{M}}(T)$ à partir de l'énoncé.

Coup de pouce 42. Pour la question 2, utilise $P_D(B) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)}$.

Coup de pouce 43. Avec remise, les tirages sont indépendants : les probabilités ne changent pas.

Coup de pouce 44. Chaque parent transmet un allèle : construis un arbre à deux branches (A ou a) pour chaque parent.

TD — Dépistage et valeur prédictive

Durée estimée : 50 minutes. Capacités : C1, C2, C3, C5.

Un laboratoire évalue un test de dépistage pour une maladie rare. Le test a une **sensibilité** de 90 % (il détecte 90 % des malades) et une **spécificité** de 95 % (il identifie correctement 95 % des personnes saines).

On note M l'événement « la personne est malade » et T l'événement « le test est positif ».

Partie A — Maladie rare (prévalence 2 %)

Dans la population générale, 2 % des personnes sont atteintes.

1. Traduire les données de l'énoncé en probabilités : $P(M)$, $P_M(T)$, $P_{\bar{M}}(T)$.
2. Construire un arbre pondéré complet à deux niveaux.
3. Calculer $P(T)$ à l'aide de la formule des probabilités totales.
4. Calculer la **valeur prédictive positive** $P_T(M)$. Interpréter le résultat.
5. Expliquer pourquoi, malgré la bonne qualité du test, un résultat positif n'est pas synonyme de maladie certaine.

Partie B — Maladie fréquente (prevalence 20 %)

On suppose maintenant que la prevalence est de 20 %.

6. Recalculer $P(T)$ et $P_T(M)$ avec cette nouvelle prevalence.
7. Comparer avec la partie A et commenter l'influence de la prevalence.

Partie C — Synthèse

8. Resumer dans un tableau les valeurs de $P_T(M)$ pour les prevalences 2 % et 20 %.
9. Un depistage systematique de la population generale est-il pertinent pour une maladie rare? Argumenter.

TD fil rouge — Controle qualite multi-fournisseurs

Duree estimee : 50 minutes. Capacites : C1 a C5.

Une entreprise d'électronique s'approvisionne aupres de trois fournisseurs F_1 , F_2 et F_3 .

- ▶ F_1 fournit 50 % des composants, avec un taux de defect de 4 %.
- ▶ F_2 fournit 30 % des composants, avec un taux de defect de 6 %.
- ▶ F_3 fournit 20 % des composants, avec un taux de defect de 10 %.

On preleve un composant au hasard. On note D : « le composant est defectueux ».

Partie A — Modelisation (C1, C2)

1. Traduire les donnees en probabilites : $P(F_1)$, $P(F_2)$, $P(F_3)$, $P_{F_1}(D)$, $P_{F_2}(D)$, $P_{F_3}(D)$.
2. Construire l'arbre pondere complet. Verifier que la somme des branches a chaque noeud vaut 1.
3. Calculer $P(F_2 \cap D)$.

Partie B — Probabilites totales (C3)

4. Justifier que $\{F_1, F_2, F_3\}$ est une partition de l'univers.
5. Calculer $P(D)$ a l'aide de la formule des probabilites totales.
6. Interpreter : quel est le pourcentage global de composants defectueux?

Partie C — Diagnostic (C1, C5)

7. Un composant est defectueux. Calculer $P_D(F_1)$ et $P_D(F_3)$. Comparer.
8. Le fournisseur F_3 est-il le plus « responsable » des defauts? Argumenter.

Partie D — Independance (C4)

9. Les evenements F_1 et D sont-ils independants? Justifier par le calcul.
10. Interpreter : le fait qu'un composant vienne de F_1 influence-t-il la probabilite qu'il soit defectueux?

QCM d'auto-evaluation — Probabilites conditionnelles

Pour chaque question, une seule reponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Probabilité conditionnelle

1. [Q1] On donne $P(A) = \frac{1}{2}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$. Que vaut $P_A(B)$?

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{1}{6}$
- D. $\frac{2}{3}$

2. [Q2] $P_A(B) = \frac{3}{5}$ signifie :

- A. La probabilité de A sachant B est $\frac{3}{5}$.
- B. La probabilité de $A \cap B$ est $\frac{3}{5}$.
- C. La probabilité de B sachant que A est réalisée est $\frac{3}{5}$.
- D. La probabilité de $A \cup B$ est $\frac{3}{5}$.

3. [Q3] Si $P(A) = \frac{2}{5}$ et $P_A(B) = \frac{3}{4}$, que vaut $P(A \cap B)$?

- A. $\frac{3}{20}$
- B. $\frac{3}{10}$
- C. $\frac{23}{20}$
- D. $\frac{6}{5}$

4. [Q4] On donne $P_A(B) = \frac{2}{3}$. Que vaut $P_A(\bar{B})$?

- A. $\frac{2}{3}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. On ne peut pas savoir.
- D. 0

C2 — Arbre pondéré

5. [Q5] Dans un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin s'obtient en :

- A. additionnant les probabilités des branches du chemin.
- B. multipliant les probabilités des branches du chemin.
- C. prenant la plus grande probabilité du chemin.
- D. divisant les probabilités des branches du chemin.

6. [Q6] A chaque nœud d'un arbre pondéré, la somme des probabilités des branches vaut :

- A. 0
- B. la probabilité du nœud parent.
- C. 1
- D. le nombre de branches.

7. [Q7] Sur un arbre, les probabilités inscrites sur les branches issues d'un noeud A sont :
- A. Des probabilités $P(B), P(\bar{B})$.
 - B. Des probabilités conditionnelles $P_A(B), P_A(\bar{B})$.
 - C. Des probabilités d'intersection $P(A \cap B), P(A \cap \bar{B})$.
 - D. Des fréquences observées.

C3 — Formule des probabilités totales

8. [Q8] Si $P(B) = \frac{1}{3}$, $P_B(A) = \frac{1}{2}$ et $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{4}$, alors $P(A)$ vaut :
- A. $\frac{1}{3}$
 - B. $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$
 - C. $\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$
 - D. $\frac{1}{6} + \frac{2}{12} = \frac{1}{3}$
9. [Q9] Pour appliquer la formule des probabilités totales avec $\{B_1, B_2, B_3\}$, il faut que :
- A. Les B_i soient indépendants.
 - B. Les B_i forment une partition de Ω .
 - C. Les B_i soient équiprobables.
 - D. $P(B_i) > \frac{1}{2}$ pour tout i .
10. [Q10] La formule des probabilités totales pour la partition $\{B, \bar{B}\}$ s'écrit :
- A. $P(A) = P(B) + P(\bar{B})$
 - B. $P(A) = P(A \cap B) \times P(A \cap \bar{B})$
 - C. $P(A) = P(B) P_B(A) + P(\bar{B}) P_{\bar{B}}(A)$
 - D. $P(A) = P(B) P(A) + P(\bar{B}) P(A)$
11. [Q11] Laquelle de ces étapes fait partie de la démonstration de la formule des probabilités totales ?
- A. $A = A \cup B$
 - B. $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$ avec événements incompatibles
 - C. $P(A) = P(B) \times P(A)$
 - D. A et B sont indépendants

C4 — Indépendance

12. [Q12] A et B sont indépendants si et seulement si :
- A. $P(A \cap B) = 0$
 - B. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
 - C. $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
 - D. $P(A \cup B) = P(A) \times P(B)$
13. [Q13] Si A et B sont incompatibles avec $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, alors :
- A. A et B sont indépendants.
 - B. A et B ne sont pas indépendants.
 - C. On ne peut pas conclure.

D. $P_A(B) = 1$.

14. [Q14] Si A et B sont indépendants, alors $\bar{A}$ et B sont :
- A. incompatibles.
 - B. indépendants.
 - C. de même probabilité.
 - D. sans lien.

C5 — Problèmes contextualisés

15. [Q15] La sensibilité d'un test est :
- A. $P(M|T^+)$ (probabilité d'être malade sachant test positif).
 - B. $P(T^+|M)$ (probabilité d'un test positif sachant qu'on est malade).
 - C. $P(T^-|\bar{M})$ (probabilité d'un test négatif sachant qu'on est sain).
 - D. $P(M)$ (prévalence de la maladie).
16. [Q16] La valeur prédictive positive (VPP) est :
- A. $P(T^+|M)$
 - B. $P(M|T^+)$
 - C. $P(T^+)$
 - D. $P(\bar{M}|T^-)$
17. [Q17] Un test a une sensibilité de 99 % et la prévalence est de 0,1 %. La VPP sera :
- A. Proche de 99 %.
 - B. Proche de 50 %.
 - C. Probablement faible (bien inférieure à 50 %).
 - D. Exactement 0,1 %.
18. [Q18] Dans un problème de contrôle qualité avec 3 machines, on utilise :
- A. L'indépendance.
 - B. La formule de Bayes (probabilités totales + conditionnelle inversée).
 - C. Uniquement des probabilités simples.
 - D. Le théorème des valeurs intermédiaires.

Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-A-corrige 55 min

Exercice 1 — Corrigé

1. Arbre : $P(R) = \frac{3}{5}$, $P(V) = \frac{2}{5}$. Sachant R : $P_R(G) = \frac{1}{2}$, $P_R(\bar{G}) = \frac{1}{2}$. Sachant V : $P_V(G) = \frac{1}{4}$, $P_V(\bar{G}) = \frac{3}{4}$.
2. $P(R \cap G) = P(R) \times P_R(G) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$.
3. $P(G) = P(R \cap G) + P(V \cap G) = \frac{3}{10} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$.
4. $P_G(R) = \frac{P(R \cap G)}{P(G)} = \frac{3/10}{2/5} = \frac{3}{10} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{4}$.

Exercice 2 — Corrigé

- $P(M) = \frac{3}{100}, P_M(T) = \frac{9}{10}, P_{\overline{M}}(T) = 1 - \frac{96}{100} = \frac{1}{25}.$
- $P(T) = P(M) P_M(T) + P(\overline{M}) P_{\overline{M}}(T) = \frac{3}{100} \times \frac{9}{10} + \frac{97}{100} \times \frac{1}{25}.$
 $= \frac{27}{1000} + \frac{97}{2500} = \frac{270}{10000} + \frac{388}{10000} = \frac{658}{10000} = \frac{329}{5000}.$
- $P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{27/1000}{329/5000} = \frac{27}{329} \times \frac{5000}{1000} = \frac{135}{329} \approx 41,0\%.$

4. La VPP est d'environ 41 % : un test positif ne signifie la maladie que dans moins d'un cas sur deux. Le test est utile pour orienter le diagnostic mais nécessite une confirmation. La prévalence de 3 % est encore trop faible pour que le test soit déterminant à lui seul.

Exercice 3 — Corrigé

- $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10} = P(A \cap B).$ Donc A et B sont indépendants.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{5+2-1}{10} = \frac{3}{5}.$
- $P(\overline{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{1}{10}.$
- $P(\overline{A}) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10} = P(\overline{A} \cap B).$ Donc $\overline{A}$ et B sont indépendants.

Exercice 4 — Corrigé

- Arbre : $P(J) = \frac{1}{5}, P(S) = \frac{4}{5}.$ Sachant $J : P_J(A) = \frac{1}{10}.$ Sachant $S : P_S(A) = \frac{1}{40}.$
- $P(A) = P(J) P_J(A) + P(S) P_S(A) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{10} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{40} = \frac{1}{50} + \frac{1}{50} = \frac{2}{50} = \frac{1}{25}.$
- $P_A(J) = \frac{P(J \cap A)}{P(A)} = \frac{1/50}{1/25} = \frac{1}{50} \times 25 = \frac{1}{2}.$

Un conducteur accidenté a une chance sur deux d'être jeune, alors que les jeunes ne représentent que 20 % des assurés.

Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-A 55 min

Exercice 1

(5 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, représenter.

Un sac contient 3 jetons rouges et 2 jetons verts. On tire un jeton au hasard. Si le jeton est rouge, on gagne avec probabilité $\frac{1}{2}$. Si le jeton est vert, on gagne avec probabilité $\frac{1}{4}$.

- Construire l'arbre pondéré de cette expérience. (1,5 pt — représenter)
- Calculer $P(R \cap G)$ ou G désigne « gagner ». (1 pt — calculer)
- Calculer la probabilité de gagner. (1,5 pt — calculer)
- Sachant qu'on a gagné, quelle est la probabilité d'avoir tiré un jeton rouge ? (1 pt — raisonner)

Exercice 2**(6 points)****Capacités C3, C5**

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un test de dépistage a une sensibilité de 90 % et une spécificité de 96 %. La prévalence de la maladie est de 3 %. On note M : « malade » et T : « test positif ».

1. Donner les valeurs de $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\overline{M}}(T)$. (1,5 pt — modéliser)
2. Calculer $P(T)$ par la formule des probabilités totales. (2 pts — calculer)
3. Calculer la valeur prédictive positive $P_T(M)$. (1,5 pt — calculer)
4. Le test est-il fiable pour un diagnostic individuel ? Argumenter. (1 pt — communiquer)

Exercice 3**(4 points)****Capacité C4**

Compétences évaluées : raisonner, calculer.

On donne $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{5}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$.

1. Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier. (2 pts — raisonner)
2. Calculer $P(A \cup B)$. (1 pt — calculer)
3. Montrer que $\overline{A}$ et B sont aussi indépendants. (1 pt — raisonner)

Exercice 4**(5 points)****Capacités C3, C5**

Compétences évaluées : modéliser, calculer, raisonner.

Une compagnie d'assurance distingue les conducteurs « jeunes » (20 %) et « seniors » (80 %). La probabilité d'accident est $\frac{1}{10}$ pour un jeune et $\frac{1}{40}$ pour un senior.

1. Construire un arbre pondéré. (1 pt — représenter)
2. Calculer la probabilité qu'un conducteur ait un accident. (2 pts — calculer)
3. Un conducteur a eu un accident. Calculer la probabilité qu'il soit jeune. (2 pts — raisonner)

Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-B-corrige 55 min**Exercice 1 — Corrige**

1. Arbre : $P(B) = \frac{2}{5}$, $P(N) = \frac{3}{5}$. Sachant B : $P_B(G) = \frac{3}{4}$, $P_B(\overline{G}) = \frac{1}{4}$. Sachant N : $P_N(G) = \frac{1}{3}$, $P_N(\overline{G}) = \frac{2}{3}$.

$$2. P(B \cap G) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}.$$

$$3. P(G) = P(B \cap G) + P(N \cap G) = \frac{3}{10} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{10} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{1}{2}.$$

$$4. P_G(B) = \frac{P(B \cap G)}{P(G)} = \frac{3/10}{1/2} = \frac{3}{5}.$$

Exercice 2 — Corrigé

- $P(M) = \frac{1}{50}, P_M(T) = \frac{19}{20}, P_{\bar{M}}(T) = 1 - \frac{95}{100} = \frac{1}{20}.$
- $P(T) = \frac{1}{50} \times \frac{19}{20} + \frac{49}{50} \times \frac{1}{20} = \frac{19}{1000} + \frac{49}{1000} = \frac{68}{1000} = \frac{17}{250}.$
- $P_T(M) = \frac{19/1000}{17/250} = \frac{19}{1000} \times \frac{250}{17} = \frac{19}{68} \approx 27,9\%.$

4. La VPP est faible (environ 28 %) : un test positif ne correspond à la maladie que dans 1 cas sur 3,6 environ. Cela s'explique par la faible prévalence (2 %) qui génère beaucoup de faux positifs.

Exercice 3 — Corrigé

- $P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{8} = P(A \cap B).$ Donc A et B sont indépendants.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{3}{8} - \frac{1}{8} = \frac{8+9-3}{24} = \frac{14}{24} = \frac{7}{12}.$
- $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/8}{1/3} = \frac{3}{8} = P(B).$ L'égalité $P_A(B) = P(B)$ confirme l'indépendance.

Exercice 4 — Corrigé

- Arbre : $P(F_1) = \frac{7}{10}, P(F_2) = \frac{3}{10}.$ Sachant $F_1 : P_{F_1}(D) = \frac{1}{50}.$ Sachant $F_2 : P_{F_2}(D) = \frac{3}{50}.$
- $P(D) = \frac{7}{10} \times \frac{1}{50} + \frac{3}{10} \times \frac{3}{50} = \frac{7}{500} + \frac{9}{500} = \frac{16}{500} = \frac{4}{125} = 3,2\%.$
- $P_D(F_2) = \frac{P(F_2 \cap D)}{P(D)} = \frac{9/500}{4/125} = \frac{9}{500} \times \frac{125}{4} = \frac{9}{16} = 56,25\%.$

Plus de la moitié des pièces défectueuses viennent de F_2 , alors que F_2 ne fournit que 30 % des pièces.

Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-B 55 min

Exercice 1

(5 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, représenter.

Un sac contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire une boule au hasard. Si elle est blanche, on gagne avec probabilité $\frac{3}{4}$. Si elle est noire, on gagne avec probabilité $\frac{1}{3}$.

- Construire l'arbre pondéré de cette expérience. (1,5 pt — représenter)
- Calculer $P(B \cap G)$ où G désigne « gagner ». (1 pt — calculer)
- Calculer la probabilité de gagner. (1,5 pt — calculer)
- Sachant qu'on a gagné, quelle est la probabilité d'avoir tiré une boule blanche ? (1 pt — raisonner)

Exercice 2

(6 points)

Capacités C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un test de dépistage a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 95 %. La prévalence est de 2 %. On note M : « malade » et T : « test positif ».

1. Donner les valeurs de $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\overline{M}}(T)$. (1,5 pt — modéliser)
2. Calculer $P(T)$ par la formule des probabilités totales. (2 pts — calculer)
3. Calculer la valeur prédictive positive $P_T(M)$. (1,5 pt — calculer)
4. Commenter le résultat. (1 pt — communiquer)

Exercice 3**(4 points)****Capacité C4**

Compétences évaluées : raisonner, calculer.

On donne $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{8}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$.

1. Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier. (2 pts — raisonner)
2. Calculer $P(A \cup B)$. (1 pt — calculer)
3. Calculer $P_A(B)$. Comparer avec $P(B)$ et commenter. (1 pt — raisonner)

Exercice 4**(5 points)****Capacités C3, C5**

Compétences évaluées : modéliser, calculer, raisonner.

Une usine a deux fournisseurs. Le fournisseur F_1 fournit 70 % des pièces avec un taux de défaut de 2 %. Le fournisseur F_2 fournit 30 % avec un taux de défaut de 6 %.

1. Construire un arbre pondéré. (1 pt — représenter)
2. Calculer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse. (2 pts — calculer)
3. Une pièce est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle vienne de F_2 . (2 pts — raisonner)

Rappel — Probabilités de base

Vocabulaire : un univers Ω est l'ensemble de toutes les issues possibles. Un événement est une partie de Ω .

Formules fondamentales :

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Exercice 51

On donne $P(A) = \frac{3}{8}$ et $P(B) = \frac{1}{4}$ avec $A \cap B = \emptyset$.

1. Calculer $P(\overline{A})$.
2. Calculer $P(A \cup B)$.

Corrigé

1. $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.
2. Comme $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$.

1SPE-PROBCOND-FR-R1-EX1
⌚ 5 min

1SPE-PROBCOND-FR-R1-EX1

Rappel — Fractions et pourcentages

Conversion : $\frac{a}{b} = \frac{a \times 100}{b} \%$ et $p\% = \frac{p}{100}$.

1SPE-PROBCOND-FR-R2-EX1
⌚ 5 min

Exercice 52

1. Convertir $\frac{7}{20}$ en pourcentage.
2. Ecrire 12,5 % sous forme de fraction irréductible.
3. Calculer $\frac{3}{8} + \frac{5}{12}$.

1SPE-PROBCOND-FR-R2-EX1

Corrigé

1. $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 35\%$.
2. $12,5\% = \frac{12,5}{100} = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$.
3. $\frac{3}{8} + \frac{5}{12} = \frac{9}{24} + \frac{10}{24} = \frac{19}{24}$.

Rappel — Arbres de dénombrement

Un **arbre de dénombrement** représente les issues possibles d'une expérience à plusieurs étapes. Le nombre total d'issues est le produit du nombre de choix à chaque étape.

1SPE-PROBCOND-FR-R3-EX1
⌚ 5 min

Exercice 53

Un menu propose 3 entrées, 4 plats et 2 desserts.

1. Combien de menus différents peut-on composer ?
2. Si l'on ne prend ni entrée ni dessert, combien de choix reste-t-il ?

1SPE-PROBCOND-FR-R3-EX1

Corrigé

1. $3 \times 4 \times 2 = 24$ menus différents.
2. Il reste 4 choix (le plat uniquement).

Rappel — Calcul littéral

1SPE-PROBCOND-FR-R4-EX1
⌚ 5 min

Exercice 54

1. Résoudre $5x - 3 = 2x + 9$.
2. Résoudre $\frac{x}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$.

1SPE-PROBCOND-FR-R4-EX1

Corrigé

1. $5x - 3 = 2x + 9 \Leftrightarrow 3x = 12 \Leftrightarrow x = 4$.
2. $\frac{x}{3} = \frac{7}{12} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12} - \frac{3}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$, donc $x = 1$.

Rappel — Tableaux de données

Un **tableau à double entrée** croise deux critères. La **fréquence** d'une catégorie est le rapport de son effectif au total.

Exercice 55

1SPE-PROBCOND-FR-R5-EX1
⌚ 5 min

	Bus	Velo	Total
Garçons	30	20	50
Filles	40	10	50
Total	70	30	100

1. Quelle est la fréquence des cyclistes ?
2. Quelle est la fréquence des filles parmi les cyclistes ?

Corrigé

1SPE-PROBCOND-FR-R5-EX1

1. Fréquence des cyclistes : $\frac{30}{100} = \frac{3}{10} = 30\%$.
2. Parmi les cyclistes : $\frac{10}{30} = \frac{1}{3} \approx 33,3\%$.

Exercice 56

1SPE-PROBCOND-RE-C1-EX1
⌚ 8 min

On donne $P(A) = \frac{2}{5}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$.

1. Écrire la formule de $P_A(B)$.
2. Calculer $P_A(B)$.
3. Calculer $P_A(\bar{B})$.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-RE-C1-EX1
Formule de la probabilité conditionnelle.

Question 1. $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

Question 2. $P_A(B) = \frac{1/5}{2/5} = \frac{1}{5} \times \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$.

Question 3. $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Exercice 57

1SPE-PROBCOND-RE-C2-EX1
⌚ 8 min

Un sac contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule, puis sans remise une deuxième.

1. Donner $P(R_1)$ et $P(B_1)$.
2. Sachant R_1 , donner $P_{R_1}(R_2)$ et $P_{R_1}(B_2)$. Vérifier qu'elles somment à 1.
3. Calculer $P(R_1 \cap R_2)$.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-RE-C2-EX1

1. $P(R_1) = \frac{2}{5}$, $P(B_1) = \frac{3}{5}$.

2. Sachant R_1 , il reste 1 rouge et 3 bleues dans 4 boules : $P_{R_1}(R_2) = \frac{1}{4}$, $P_{R_1}(B_2) = \frac{3}{4}$. Somme : $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ ✓.

3. $P(R_1 \cap R_2) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$.

Exercice 58

1SPE-PROBCOND-RE-C3-EX1
⌚ 8 min

$P(B) = \frac{1}{4}$, $P_B(A) = \frac{2}{3}$, $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{3}$.

1. Calculer $P(\bar{B})$.

2. Calculer $P(B) \times P_B(A)$.
3. Calculer $P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A)$.
4. En déduire $P(A)$.

1SPE-PROBCOND-RE-C3-EX1

Corrigé

1. $P(\bar{B}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
2. $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.
3. $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.
4. $P(A) = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$.

1SPE-PROBCOND-RE-C4-EX1
⌚ 8 min

Exercice 59 ♦

On donne $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$.

1. Calculer $P(A) \times P(B)$.
2. Comparer avec $P(A \cap B)$.
3. Conclure : A et B sont-ils indépendants ?

1SPE-PROBCOND-RE-C4-EX1

Corrigé

1. $P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.
2. $P(A) \times P(B) = \frac{1}{4} = P(A \cap B)$.
3. Comme $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, les événements A et B sont indépendants.

1SPE-PROBCOND-RE-C5-EX1
⌚ 10 min

Exercice 60 ♦

Dans un village, 40 % des habitants possèdent un chien (C). Parmi les propriétaires de chien, 30 % ont aussi un chat (H). Parmi ceux sans chien, 50 % ont un chat.

1. Identifier les événements et écrire les probabilités.
2. Calculer $P(H)$ par la formule des probabilités totales.
3. Calculer $P_H(C)$: sachant qu'une personne a un chat, quelle est la probabilité qu'elle ait aussi un chien ?

1SPE-PROBCOND-RE-C5-EX1

Corrigé

1. $P(C) = \frac{2}{5}$, $P_C(H) = \frac{3}{10}$, $P_{\bar{C}}(H) = \frac{1}{2}$.
2. $P(H) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{10} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{6}{50} + \frac{15}{50} = \frac{21}{50} = 42\%$.
3. $P_H(C) = \frac{P(C \cap H)}{P(H)} = \frac{6/50}{21/50} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7} \approx 28,6\%$.

1SPE-PROBCOND-EX-001

Corrigé

1. On applique la formule : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{3}{10}} = \frac{1}{3}$.
2. $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-002

$$1. P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{20} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{8}.$$

$$2. P_B(\bar{A}) = 1 - P_B(A) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}.$$

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-003

$$1. P(F) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5} \text{ et } P(F \cap S) = \frac{45}{200} = \frac{9}{40}.$$

$$2. P_F(S) = \frac{P(F \cap S)}{P(F)} = \frac{\frac{9}{40}}{\frac{3}{5}} = \frac{9}{40} \times \frac{5}{3} = \frac{3}{8}.$$

Parmi les filles, $\frac{3}{8} = 37,5\%$ pratiquent un sport.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-004

$$1. P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{20}.$$

$$2. P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{20} \times 2 = \frac{3}{10}.$$

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-005

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{7}{20}}{\frac{7}{10}} = \frac{7}{20} \times \frac{10}{7} = \frac{1}{2}.$$

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-006

$$1. P_H(S) = \frac{P(H \cap S)}{P(H)} = \frac{36/100}{60/100} = \frac{36}{60} = \frac{3}{5} = 60\%.$$

$$P_F(S) = \frac{P(F \cap S)}{P(F)} = \frac{20/100}{40/100} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2} = 50\%.$$

2. Les hommes sont proportionnellement plus sportifs (60 %) que les femmes (50 %).

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-007

$$1. P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{2}{5} + \frac{3}{10} - \frac{1}{2} = \frac{4}{10} + \frac{3}{10} - \frac{5}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$

$$2. P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{2}.$$

$$3. P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{10}} = \frac{1}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{2}{3}.$$

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-008

$$1. P(C) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}, P(F) = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}, P(C \cap F) = \frac{3}{32} \text{ (roi, dame, valet de coeur).}$$

$$2. P_C(F) = \frac{P(C \cap F)}{P(C)} = \frac{\frac{3}{32}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{32} \times 4 = \frac{3}{8}.$$

Parmi les coeurs, $\frac{3}{8}$ sont des figures.

$$3. P_F(C) = \frac{P(C \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{3}{32}}{\frac{3}{8}} = \frac{3}{32} \times \frac{8}{3} = \frac{1}{4}.$$

1SPE-PROBCOND-EX-009

Corrigé

$$1. P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = p \times \frac{1}{3} = \frac{p}{3}.$$

$$2. P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{p}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2p}{3}.$$

$$\text{On a } P_B(A) = \frac{1}{4}, \text{ donc } \frac{2p}{3} = \frac{1}{4}, \text{ soit } p = \frac{3}{8}.$$

$$3. \text{Verification : } P(A \cap B) = \frac{3/8}{3} = \frac{1}{8}. P_A(B) = \frac{1/8}{3/8} = \frac{1}{3} \checkmark. P_B(A) = \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4} \checkmark.$$

1SPE-PROBCOND-EX-010

Corrigé

$$1. P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{3}{5} + \frac{1}{2} - \frac{4}{5} = \frac{6}{10} + \frac{5}{10} - \frac{8}{10} = \frac{3}{10}.$$

$$2. P_A(B) = \frac{3/10}{3/5} = \frac{1}{2} \text{ et } P_B(A) = \frac{3/10}{1/2} = \frac{3}{5}.$$

$$3. P(\bar{A}) = \frac{2}{5}. P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} - \frac{3}{10} = \frac{1}{5}.$$

$$P_{\bar{A}}(B) = \frac{1/5}{2/5} = \frac{1}{2}.$$

$$4. P_A(B) = P_{\bar{A}}(B) = \frac{1}{2}. \text{ La réalisation de } A \text{ ne modifie pas la probabilité de } B.$$

1SPE-PROBCOND-EX-011

Corrigé

$$1. \text{Arbre : } P(R_1) = \frac{3}{5}, P(V_1) = \frac{2}{5}. \text{ Sachant } R_1 : P(R_2) = \frac{1}{2}, P(V_2) = \frac{1}{2}. \text{ Sachant } V_1 : P(R_2) = \frac{3}{4}, P(V_2) = \frac{1}{4}.$$

$$2. P(R_1 \cap R_2) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}.$$

$$3. P(\text{au moins 1 rouge}) = 1 - P(V_1 \cap V_2) = 1 - \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}.$$

1SPE-PROBCOND-EX-012

Corrigé

$$1. \text{Branches : pile } (\frac{1}{3}) \text{ puis lot } (\frac{3}{4}) \text{ ou pas } (\frac{1}{4}); \text{ face } (\frac{2}{3}) \text{ puis lot } (\frac{1}{4}) \text{ ou pas } (\frac{3}{4}).$$

$$2. P(\text{pile} \cap \text{lot}) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}. P(\text{face} \cap \text{lot}) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}.$$

$$3. \frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = 1 \checkmark.$$

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-013

1. Arbre a trois branches principales (R, B, N) puis chacune se divise en gagner/perdre.

$$2. P(G) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{10} + \frac{2}{15} + \frac{1}{10} = \frac{3}{30} + \frac{4}{30} + \frac{3}{30} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}.$$

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-014

1. Branches : $A \left(\frac{2}{5}\right)$ puis $B \left(\frac{3}{4}\right)$ ou $\bar{B} \left(\frac{1}{4}\right)$; $\bar{A} \left(\frac{3}{5}\right)$ puis $B \left(\frac{1}{3}\right)$ ou $\bar{B} \left(\frac{2}{3}\right)$.

$$2. P(A \cap B) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}. P(\bar{A} \cap B) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}.$$

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-015

$$1-2. P(S \cap R) = \frac{3}{5} \times \frac{9}{10} = \frac{27}{50}. P(S \cap \bar{R}) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{10} = \frac{3}{50}. P(\bar{S} \cap R) = \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{14}{50}. P(\bar{S} \cap \bar{R}) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{10} = \frac{6}{50}.$$

$$3. \frac{27}{50} + \frac{3}{50} + \frac{14}{50} + \frac{6}{50} = \frac{50}{50} = 1 \checkmark.$$

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-016

1. Arbre construit avec $P(R_1) = \frac{4}{7}$, $P(B_1) = \frac{3}{7}$ et les conditionnelles sans remise.

$$2. P(\text{meme}) = \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} + \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} = \frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3}{7}.$$

$$3. P(\text{au moins 1 bleue}) = 1 - P(R_1 \cap R_2) = 1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}.$$

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-017

1. Arbre : deux niveaux, chaque niveau P $\left(\frac{2}{3}\right)$ ou F $\left(\frac{1}{3}\right)$.

$$2. P(PP) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}.$$

$$3. P(1 \text{ pile}) = P(PF) + P(FP) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}.$$

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-018

1. Trois branches équiprobables $\left(\frac{1}{3}\right)$, puis R ou B pour chaque urne.

$$2. P(R) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times 1 = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{3}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-019

$$2. P(3R) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{60}{336} = \frac{5}{28}.$$

$$3. P(0R) = P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{6}{336} = \frac{1}{56}.$$

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-020

$$1. \frac{3}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{4} + \frac{11}{20} = \frac{3}{20} + \frac{1}{20} + \frac{5}{20} + \frac{11}{20} = \frac{20}{20} = 1 \checkmark.$$

$$2. P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) = \frac{3}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{5}.$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{3/20}{1/5} = \frac{3}{4}.$$

$$P(\bar{A}) = \frac{4}{5}. P_{\bar{A}}(B) = \frac{1/4}{4/5} = \frac{5}{16}.$$

1SPE-PROBCOND-EX-021

Corrigé

$$2. P(A) = P(B) P_B(A) + P(\bar{B}) P_{\bar{B}}(A) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{10} + \frac{1}{5} = \frac{1}{2}.$$

1SPE-PROBCOND-EX-022

Corrigé

$$1. P(T) = P(M) P_M(T) + P(\bar{M}) P_{\bar{M}}(T) = \frac{3}{10} \times \frac{4}{5} + \frac{7}{10} \times \frac{1}{5} = \frac{12}{50} + \frac{7}{50} = \frac{19}{50}.$$

2. 38 % des élèves assistent au concert.

1SPE-PROBCOND-EX-023

Corrigé

1. $C_1 \cup C_2 \cup C_3 = \Omega$ et les chaînes sont disjointes : c'est une partition.

$$2. P(D) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{50} + \frac{3}{10} \times \frac{3}{100} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{20} = \frac{1}{100} + \frac{9}{1000} + \frac{1}{100} = \frac{29}{1000} = 2,9 \%.$$

1SPE-PROBCOND-EX-024

Corrigé

$$P(S) = P(R) P_R(S) + P(\bar{R}) P_{\bar{R}}(S) = \frac{1}{3} \times \frac{9}{10} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10} + \frac{1}{3} = \frac{9}{30} + \frac{10}{30} = \frac{19}{30}.$$

1SPE-PROBCOND-EX-025

Corrigé

$$P(B) = P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B) = \frac{7}{10} \times \frac{4}{7} + \frac{3}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}.$$

1SPE-PROBCOND-EX-026

Corrigé

$$1. P(M) = \frac{5}{1000}, P_M(T) = \frac{98}{100}, P_{\bar{M}}(T) = 1 - \frac{96}{100} = \frac{4}{100}.$$

$$2. P(T) = \frac{5}{1000} \times \frac{98}{100} + \frac{995}{1000} \times \frac{4}{100} = \frac{490}{100000} + \frac{3980}{100000} = \frac{4470}{100000} = \frac{447}{10000}.$$

$$3. P_T(M) = \frac{490/100000}{447/10000} = \frac{49}{447} \approx 11 \%.$$

4. Malgré la bonne sensibilité, un test positif ne signifie la maladie que dans 11 % des cas, à cause de la faible prévalence.

1SPE-PROBCOND-EX-027

Corrigé

$$1. P(C) = \frac{4}{10} \times \frac{1}{20} + \frac{6}{10} \times \frac{3}{100} = \frac{1}{50} + \frac{9}{500} = \frac{19}{500} = 3,8 \%.$$

$$2. P_C(F_1) = \frac{P(F_1 \cap C)}{P(C)} = \frac{1/50}{19/500} = \frac{10}{19} \approx 52,6 \%.$$

1SPE-PROBCOND-EX-028

Corrigé

1. *Démonstration.* $\{B, \bar{B}\}$ est une partition, donc $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$ avec événements incompatibles. Par additivité : $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) = P(B) P_B(A) + P(\bar{B}) P_{\bar{B}}(A)$. $\square$

$$2. P(A) = \frac{3}{8} \times \frac{2}{3} + \frac{5}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{5}{32} = \frac{8}{32} + \frac{5}{32} = \frac{13}{32}.$$

1SPE-PROBCOND-EX-029

Corrigé

Par probabilités totales : $P(A) = P(B) P_B(A) + P(\bar{B}) P_{\bar{B}}(A)$.

$$\frac{3}{10} = p \times \frac{1}{2} + (1 - p) \times \frac{1}{5} = \frac{p}{2} + \frac{1}{5} - \frac{p}{5} = \frac{3p}{10} + \frac{1}{5}.$$

$$\frac{3}{10} - \frac{1}{5} = \frac{3p}{10}, \text{ donc } \frac{1}{10} = \frac{3p}{10}, \text{ d'où } p = \frac{1}{3}.$$

1SPE-PROBCOND-EX-030

Corrigé

$$1. P(D) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{100} + \frac{7}{20} \times \frac{2}{100} + \frac{1}{4} \times \frac{3}{100} + \frac{3}{20} \times \frac{5}{100} = \frac{5+14+15+15}{2000} = \frac{49}{2000}.$$

2. $P_D(L_2) = \frac{14/2000}{49/2000} = \frac{14}{49} = \frac{2}{7}$, $P_D(L_3) = \frac{15}{49}$, $P_D(L_4) = \frac{15}{49}$. Les lots L_3 et L_4 sont les plus probables.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-031

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} = P(A \cap B).$$

Donc A et B sont indépendants.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-032

$$P(A) \times P(B) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15}. \text{ Or } P(A \cap B) = \frac{1}{5} = \frac{3}{15}.$$

$\frac{2}{15} \neq \frac{3}{15}$, donc A et B ne sont pas indépendants.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-033

1. $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12} = P(A \cap B)$. Donc A et B sont indépendants.

2. Si A et B sont indépendants, alors $\bar{A}$ et B le sont aussi (propriété du cours). Vérification : $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$ et $P(\bar{A}) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$. ✓

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-034

1. $A = \{2, 4, 6\}$, $P(A) = \frac{1}{2}$. $B = \{5, 6\}$, $P(B) = \frac{1}{3}$. $A \cap B = \{6\}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$.

2. $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B)$. Les événements sont indépendants.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-035

A et B sont incompatibles, donc $P(A \cap B) = 0$. Or $P(A) \times P(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12} \neq 0$.

Donc A et B ne sont pas indépendants. Des événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-036

1. $P(A) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$, $P(A \cap B) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26}$.

2. $P(A) \times P(B) = \frac{1}{26} = P(A \cap B)$. Indépendants.

3. Par propriété, si A et B sont indépendants, $\bar{A}$ et B le sont aussi.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-037

$$P(S) = \frac{1}{2}, P(M) = \frac{1}{3}, P(S \cap M) = \frac{60}{300} = \frac{1}{5}.$$

$$P(S) \times P(M) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{5} = P(S \cap M).$$

S et M ne sont pas indépendants : faire du sport et faire Maths sont liés.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-038

1. $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{10} = \frac{3}{20}$ (car indépendants).

2. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{3}{10} - \frac{3}{20} = \frac{10+6-3}{20} = \frac{13}{20}$.

3. $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{3/20}{1/2} = \frac{3}{10} = P(B)$. Normal : l'indépendance signifie que $P_A(B) = P(B)$.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-039

1. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$ (indépendance).

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + P(B) - \frac{1}{3}P(B) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}P(B).$$

$$2. \frac{2}{3}P(B) = \frac{1}{6}, \text{ donc } P(B) = \frac{1}{4}.$$

$$3. P(A \cap B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}. P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{4+3-1}{12} = \frac{1}{2} \checkmark.$$

1SPE-PROBCOND-EX-040

Corrigé

$$1. P(3S) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}.$$

$$2. P(\text{au moins } 1) = 1 - P(0S) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^3 = 1 - \frac{1}{27} = \frac{26}{27}.$$

$$3. P(2S) = \binom{3}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) = 3 \times \frac{4}{9} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9}.$$

1SPE-PROBCOND-EX-041

Corrigé

$$1. M : \text{malade}, T : \text{test positif}. P(M) = \frac{1}{100}, P_M(T) = \frac{19}{20}, P_{\overline{M}}(T) = \frac{3}{100}.$$

$$3. P(T) = \frac{1}{100} \times \frac{19}{20} + \frac{99}{100} \times \frac{3}{100} = \frac{19}{2000} + \frac{297}{10000} = \frac{95+297}{10000} = \frac{392}{10000} = \frac{49}{1250}.$$

4. $P_T(M) = \frac{19/2000}{49/1250} = \frac{95}{392} \approx 24,2\%$. Un test positif ne correspond à une maladie réelle que dans 1 cas sur 4.

1SPE-PROBCOND-EX-042

Corrigé

$$1. P(D) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{25} + \frac{2}{5} \times \frac{7}{100} = \frac{12}{500} + \frac{14}{500} = \frac{26}{500} = \frac{13}{250}.$$

$$2. P_D(B) = \frac{14/500}{13/250} = \frac{14}{500} \times \frac{250}{13} = \frac{7}{13} \approx 53,8\%.$$

1SPE-PROBCOND-EX-043

Corrigé

$$1. P(2R) = \frac{6}{10} \times \frac{6}{10} = \frac{9}{25}.$$

$$2. P(\text{diff}) = P(RB) + P(BR) = 2 \times \frac{6}{10} \times \frac{4}{10} = \frac{12}{25}.$$

3. Oui, les tirages sont indépendants car il y a remise : la composition de l'urne est identique à chaque tirage.

1SPE-PROBCOND-EX-044

Corrigé

$$2. P(aa) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, P(Aa) = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, P(AA) = \frac{1}{4}.$$

$$3. P(\text{porteur}|\text{non malade}) = \frac{P(Aa)}{P(Aa)+P(AA)} = \frac{1/2}{1/2+1/4} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}.$$

1SPE-PROBCOND-EX-045

Corrigé

$$2. P(\text{pluie demain}) = \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} + \frac{3}{5} \times \frac{3}{10} = \frac{14}{50} + \frac{9}{50} = \frac{23}{50} = 46\%.$$

1SPE-PROBCOND-EX-046

Corrigé

$$1. P(2D) = \frac{5}{100} \times \frac{4}{99} = \frac{20}{9900} = \frac{1}{495}.$$

$$2. P(\text{au moins } 1D) = 1 - P(0D) = 1 - \frac{95}{100} \times \frac{94}{99} = 1 - \frac{8930}{9900} = \frac{970}{9900} = \frac{97}{990} \approx 9,8\%.$$

$$3. \text{ Avec remise : } P(\text{au moins } 1D) = 1 - (0,95)^2 = 1 - 0,9025 = 0,0975 \approx 9,75\%. \text{ Très proche.}$$

1SPE-PROBCOND-EX-047

Corrigé

$$2. P(T) = \frac{5}{100} \times \frac{99}{100} + \frac{95}{100} \times \frac{5}{100} = \frac{495+475}{10000} = \frac{970}{10000} = \frac{97}{1000}.$$

$$3. P_T(D) = \frac{495/10000}{97/1000} = \frac{495}{970} = \frac{99}{194} \approx 51\%.$$

4. Environ 1 test positif sur 2 correspond a un vrai dope. La sanction ne devrait pas etre automatique ; un second test de confirmation est recommande.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-048

$$1. P(A) = \frac{4}{5} \times \frac{1}{20} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{4}{100} + \frac{5}{100} = \frac{9}{100}.$$

$$2. P_A(R) = \frac{P(R \cap A)}{P(A)} = \frac{1/20}{9/100} = \frac{100}{180} = \frac{5}{9} \approx 55,6 \%.$$

3. Plus de la moitié des accidentés sont des conducteurs a risque, alors qu'ils ne representent que 20 % de la population.

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-049

$$1. P(T_1) = \frac{2}{100} \times \frac{9}{10} + \frac{98}{100} \times \frac{1}{10} = \frac{18+98}{1000} = \frac{116}{1000} = \frac{29}{250}.$$

$$2. P_{T_1}(M) = \frac{18/1000}{29/250} = \frac{18}{1000} \times \frac{250}{29} = \frac{9}{58} \approx 15,5 \%.$$

$$3. P(T_1^+ \cap T_2^+) = \frac{2}{100} \times \frac{9}{10} \times \frac{19}{20} + \frac{98}{100} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{20} = \frac{342+98}{20000} = \frac{440}{20000} = \frac{11}{500}.$$

4. $P(M|T_1^+ \cap T_2^+) = \frac{342/20000}{11/500} = \frac{342}{440} = \frac{171}{220} \approx 77,7 \%$. Le double test ameliore considerablement la VPP (15,5 % $\rightarrow$ 77,7 %).

Corrigé

1SPE-PROBCOND-EX-050

$$1. P_T(M) = \frac{p \times \frac{95}{100}}{p \times \frac{95}{100} + (1-p) \times \frac{10}{100}} = \frac{95p}{95p + 10(1-p)} = \frac{95p}{85p + 10}.$$

$$2. P_T(M) \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{95p}{85p+10} \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow 190p \geq 85p + 10 \Leftrightarrow 105p \geq 10 \Leftrightarrow p \geq \frac{2}{21}.$$

3. La prevalence doit etre d'au moins $\frac{2}{21} \approx 9,5 \%$ pour qu'un test positif corresponde a plus d'une chance sur deux d'etre malade.

CHAPITRE 10

Variables aléatoires

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète finie (tableau de loi).
- ▶ **C2** — Je sais calculer l'espérance $E(X)$, la variance $V(X)$ et l'écart type $\sigma(X)$ d'une variable aléatoire.
- ▶ **C3** — Je sais reconnaître et utiliser la loi de Bernoulli $B(p)$ et la loi binomiale $B(n,p)$, et calculer les coefficients binomiaux.
- ▶ **C4** — Je sais calculer $E(X)=np$ et $V(X)=np(1-p)$ pour X suivant $B(n,p)$. Je sais démontrer $E(X)=np$.
- ▶ **C5** — Je sais résoudre des problèmes contextualisés (jeux, décisions, assurances) à l'aide de variables aléatoires.

Un assureur propose un contrat couvrant la casse d'un smartphone. La prime annuelle est de 50 euros. En cas de casse, l'assureur rembourse 300 euros. Si la probabilité de casse est de $1/10$, ce contrat est-il avantageux pour l'assuré ? Pour l'assureur ? Un problème de décision qui se ramène à l'étude de l'espérance d'une variable aléatoire.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 11 h ♦♦♦ 9 h

Contrat du chapitre

Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète finie (tableau de loi).
- C2 Calculer l'espérance $E(X)$, la variance $V(X)$ et l'écart type $\sigma(X)$ d'une variable aléatoire.
- C3 Reconnaître et utiliser la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ et la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, et calculer les coefficients binomiaux.
- C4 Calculer $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$ pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Démontrer que $E(X) = np$.
- C5 Résoudre des problèmes contextualisés (jeux, décisions, assurances) à l'aide de variables aléatoires.

Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Probabilités de base** — expérience aléatoire, univers, événements, probabilité d'un événement.
- R2 **Probabilités conditionnelles** — formule des probabilités totales, indépendance.
- R3 **Combinatoire de base** — dénombrements, nombre de cas favorables.
- R4 **Suites et sommes** — notation $\sum$, suites arithmétiques et géométriques.
- R5 **Puissances** — règles de calcul, puissances entières.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

Temps de travail estimé

- Parcours ♦ (Consolidation) : environ **14 h**.
- Parcours ♦♦ (Maîtrise) : environ **11 h**.
- Parcours ♦♦♦ (Approfondissement) : environ **9 h**.

Situation d'accroche — L'assurance smartphone

Un assureur propose un contrat couvrant la casse d'un smartphone. La prime annuelle est de 50 euros. En cas de casse, l'assureur rembourse 300 euros. On estime que la probabilité de casse dans l'année est $\frac{1}{10}$.

- Si l'on note X le gain de l'assuré (remboursement moins prime), quelles sont les valeurs possibles de X ?
- Quelle est la probabilité de chaque valeur ?
- En moyenne, sur un grand nombre d'assurés, ce contrat est-il avantageux pour l'assuré ? Pour l'assureur ?

On a $X = 250$ (cas de casse : $300 - 50$) avec probabilité $\frac{1}{10}$ et $X = -50$ (pas de casse : -50) avec probabilité $\frac{9}{10}$. L'espérance $E(X) = 250 \times \frac{1}{10} + (-50) \times \frac{9}{10} = 25 - 45 = -20$. En moyenne, l'assuré perd 20 euros par an : le contrat est avantageux pour l'assureur.

Cette situation sera entièrement traitée au Temps 7 (TD fil rouge), une fois les capacités C1 à C5 acquises.

Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

R1 — Probabilités de base

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
2. Quelle est la probabilité de *ne pas* obtenir un 6 en lançant un dé équilibré ?

R2 — Probabilités conditionnelles

3. Un sac contient 40 % de billes rouges et 60 % de billes bleues. La probabilité qu'une bille rouge soit rayée est 0,3 et celle qu'une bille bleue soit rayée est 0,1. Quelle est la probabilité qu'une bille tirée au hasard soit rayée ?

R3 — Combinatoire de base

4. De combien de façons peut-on choisir 2 élèves parmi 5 (sans tenir compte de l'ordre) ?

R4 — Suites et sommes

5. Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 10$.
6. Calculer $\sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^k$.

R5 — Puissances

7. Calculer $\left(\frac{2}{3}\right)^3$.
8. On lance 3 fois une pièce équilibrée. En admettant l'indépendance des lancers, quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois Pile ?
9. Calculer $5!$ (factorielle 5).
10. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire successivement 2 boules *sans remise*. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules rouges ?

Grille de décodage

Reporte tes résultats dans ce tableau, puis suis les conseils de remédiation avant de commencer le cours.

Questions	Prérequis testé	Si tu as échoué...	Fiche à lire
1 et 2	R1 — Probabilités de base	...avant de commencer C1	Fiche R1
3	R2 — Probabilités conditionnelles	...avant de commencer C1, C3	Fiche R2
4	R3 — Combinatoire de base	...avant de commencer C3	Fiche R3
5 et 6	R4 — Suites et sommes	...avant de commencer C2, C4	Fiche R4
7, 8, 9 et 10	R5 — Puissances	...avant de commencer C3, C4	Fiche R5

Si tu as réussi toutes les questions sans difficulté, tu peux démarrer directement le Temps 3.

10.1 Loi de probabilité d'une variable discrète

DÉFINITION 1

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Une **variable aléatoire** X est une fonction qui associe à chaque issue ω de Ω un nombre réel $X(\omega)$.

L'ensemble des valeurs prises par X est noté $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$.

Exemple. On lance un dé équilibré à 6 faces. On définit X comme le nombre obtenu. Alors $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Si l'on définit Y comme le gain dans un jeu où l'on gagne 2 euros si le résultat est pair et on perd 1 euro sinon, alors $Y(\Omega) = \{-1, 2\}$.

DÉFINITION 2

La **loi de probabilité** de X est la donnée de chaque valeur x_i prise par X et de la probabilité correspondante $P(X = x_i)$.

On la représente par un **tableau de loi** :

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_r
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_r

avec $p_i \geq 0$ pour tout i et $\sum_{i=1}^r p_i = 1$.

Exemple. On lance un dé équilibré. Soit X le résultat obtenu. La loi de X est :

x_i	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Vérification : $6 \times \frac{1}{6} = 1$. ✓

Exemple. On lance deux pièces équilibrées. Soit X le nombre de Pile obtenus.

L'univers est $\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$ avec chaque issue de probabilité $\frac{1}{4}$.

$X(PP) = 2, X(PF) = X(FP) = 1, X(FF) = 0$.

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Vérification : $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$. ✓

Propriété. Pour tout événement de la forme $\{X \leq a\}$ ou $\{X \geq a\}$, on a :

$$P(X \leq a) = \sum_{x_i \leq a} P(X = x_i), \quad P(X \geq a) = \sum_{x_i \geq a} P(X = x_i).$$

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

Après avoir construit un tableau de loi, toujours additionner toutes les probabilités. Si la somme n'est pas 1, c'est qu'une valeur est manquante ou qu'un calcul est erroné.

Vérification systématique :

La somme de toutes les probabilités du tableau de loi doit être égale à 1. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur dans le calcul.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $P(X = x_i)$ et $P(X \leq x_i)$.

$P(X = 3)$ est la probabilité que X prenne exactement la valeur 3. $P(X \leq 3)$ est la probabilité que X prenne une valeur inférieure ou égale à 3 : c'est la somme $P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots$ pour tous les $x_i \leq 3$.

Construction d'un tableau de loi :

1. Lister toutes les issues de l'univers.
2. Calculer $X(\omega)$ pour chaque issue.
3. Regrouper les issues donnant la même valeur.
4. Sommer les probabilités de chaque groupe.
5. Vérifier : somme = 1.

10.2 Espérance, variance et écart type

DÉFINITION 1

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_r$ avec les probabilités $p_1, p_2, \dots, p_r$. L'**espérance** de X est le nombre réel :

$$E(X) = \sum_{i=1}^r x_i p_i = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_r p_r.$$

L'espérance représente la **valeur moyenne** de X sur un grand nombre de répétitions de l'expérience (loi des grands nombres).

Exemple. On lance un dé équilibré. Soit X le résultat.

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3,5.$$

En moyenne, sur un grand nombre de lancers, le résultat moyen est 3,5.

DÉFINITION 2

La **variance** de X mesure la dispersion des valeurs de X autour de son espérance :

$$V(X) = \sum_{i=1}^r (x_i - E(X))^2 p_i = E[(X - E(X))^2].$$

Formule de König-Huygens (souvent plus pratique pour le calcul) :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2, \quad \text{où } E(X^2) = \sum_{i=1}^r x_i^2 p_i.$$

DÉFINITION 3

L'**écart type** de X est :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Il est exprimé dans la même unité que X et mesure l'écart moyen des valeurs par rapport à l'espérance.

Exemple. Reprenons le dé équilibré. $E(X) = \frac{7}{2}$.

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} + 3^2 \times \frac{1}{6} + 4^2 \times \frac{1}{6} + 5^2 \times \frac{1}{6} + 6^2 \times \frac{1}{6} = \frac{91}{6}.$$

$$V(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182}{12} - \frac{147}{12} = \frac{35}{12}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1,71.$$

Propriété . Pour toute variable aléatoire X et tous réels a, b :

- ▶ $E(aX + b) = aE(X) + b$ (linéarité de l'espérance).
- ▶ $V(aX + b) = a^2V(X)$ (la constante b ne change pas la dispersion).
- ▶ $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$.

Interprétation :

$E(X)$ = centre de la distribution.

$V(X)$ = mesure de l'étalement.

$\sigma(X)$ = même unité que X .

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $E(X^2)$ et $[E(X)]^2$.

$E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$: on met chaque valeur au carré *avant* de pondérer.

$[E(X)]^2$: on calcule d'abord l'espérance, *puis* on met au carré.

En général, $E(X^2) \neq [E(X)]^2$. La variance est leur différence : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \geq 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la racine carrée pour l'écart type.

$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, pas $V(X)$. L'écart type a la même unité que X , tandis que la variance est en unités au carré.

10.3 Bernoulli et loi binomiale

DÉFINITION 1

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues :

- ▶ le **succès** S , de probabilité p ;
- ▶ l'**échec** $\bar{S}$, de probabilité $q = 1 - p$.

La variable aléatoire X qui vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec suit la **loi de Bernoulli** de paramètre p , notée $X \sim \mathcal{B}(p)$.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$1 - p$	p

Exemple. On lance une pièce truquée qui donne Pile avec probabilité $\frac{2}{3}$. Si l'on définit le succès comme « obtenir Pile », alors $X \sim \mathcal{B}(\frac{2}{3})$: $P(X = 1) = \frac{2}{3}$, $P(X = 0) = \frac{1}{3}$.

DÉFINITION 2

Un **schéma de Bernoulli** consiste en la répétition de n épreuves de Bernoulli **identiques et indépendantes**, de même paramètre p .

La variable aléatoire X qui compte le nombre total de succès suit la **loi binomiale** de paramètres n et p , notée $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

X prend les valeurs $0, 1, 2, \dots, n$ et :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad \text{pour } k \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

DÉFINITION 3

Le **coefficient binomial** $\binom{n}{k}$ (lire « k parmi n ») est le nombre de façons de choisir k éléments parmi n , sans tenir compte de l'ordre :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}.$$

Propriétés :

► $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.

► Symétrie : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

► Triangle de Pascal : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Example. $\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{120}{2 \times 6} = 10.$

$$\binom{5}{3} = \binom{5}{2} = 10 \text{ (symétrie).}$$

Exemple. On lance 4 fois un dé équilibré. Soit X le nombre de 6 obtenus. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{6}$, et les lancers sont indépendants. Donc $X \sim \mathcal{B}(4, \frac{1}{6})$.

$$P(X=2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 6 \times \frac{1}{36} \times \frac{25}{36} = \frac{150}{1296} = \frac{25}{216}.$$

Triangle de Pascal

(premières lignes) :

$n = 0$				1			
$n = 1$			1			1	
$n = 2$	1			2			1
$n = 3$	1	3				3	1
$n = 4$	1	4	6	4			1
$n = 5$	1	5	10	10	5		

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la condition d'indépendance.

La loi binomiale s'applique uniquement si les épreuves sont *indépendantes*. Par exemple, un tirage *sans remise* dans une urne ne donne pas une loi binomiale (sauf si la population est très grande).

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre p^k et p^{n-k} dans $P(X = k)$.

L'exposant de p est k (nombre de succès) et l'exposant de $(1 - p)$ est $n - k$ (nombre d'échecs).
Vérification : la somme des exposants est $k + (n - k) = n$.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur de calcul du coefficient binomial.

Toujours simplifier en utilisant la forme $\binom{n}{k} = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1)}{k!}$ plutôt que de calculer $n!$ en entier. Exemple : $\binom{10}{3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3!} = \frac{720}{6} = 120$.

POUR ALLER PLUS LOIN

Formule du binôme de Newton.

Pour tous réels a, b et tout entier $n \geq 0$:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

En posant $a = p$ et $b = 1 - p$, on obtient :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1.$$

Cela confirme que la somme des probabilités de la loi binomiale vaut bien 1.

10.4 Espérance et variance de la loi binomiale

Propriété. Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Alors :

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

Exemple. Soit $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$. Alors :

$$E(X) = 10 \times \frac{1}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}, \quad V(X) = 10 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{30}{16} = \frac{15}{8}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{15}{8}} \approx 1,37.$$

En moyenne, on obtient 2,5 succès sur 10 épreuves.

Exemple. Pour la loi de Bernoulli $X \sim \mathcal{B}(p)$ (cas $n = 1$) :

$$E(X) = 1 \times p + 0 \times (1-p) = p, \quad V(X) = p(1-p).$$

On retrouve $E(X) = np = 1 \times p = p$ et $V(X) = np(1-p) = p(1-p)$.

Application :
Connaissant $E(X)$ et $V(X)$, on peut retrouver n et p :
 $p = 1 - \frac{V(X)}{E(X)}$ et
 $n = \frac{E(X)}{p}.$

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre np et n/p .

$E(X) = np$ est un *produit*, pas un quotient. Si $n = 20$ et $p = \frac{1}{5}$, alors $E(X) = 20 \times \frac{1}{5} = 4$, et non $20 / \frac{1}{5} = 100$.

ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $V(X) = npq$ avec $q = p$.

Dans la formule $V(X) = npq$, le paramètre q est $q = 1 - p$ (probabilité d'échec), et non $q = p$.

Si $p = \frac{1}{3}$, alors $q = \frac{2}{3}$.

POUR ALLER PLUS LOIN

Démonstration de $E(X) = np$ pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Méthode par linéarité de l'espérance.

On décompose X en somme de n variables de Bernoulli indépendantes :

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n,$$

où chaque X_i vaut 1 si la i -ème épreuve est un succès, 0 sinon. Chaque $X_i \sim \mathcal{B}(p)$.
Par linéarité de l'espérance :

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = \underbrace{p + p + \dots + p}_{n \text{ termes}} = np.$$

Méthode par calcul direct.

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Le terme $k = 0$ est nul. Pour $k \geq 1$, on utilise l'identité $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$:

$$E(X) = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}.$$

En posant $j = k - 1$:

$$E(X) = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{(n-1)-j} = np \cdot (p + 1 - p)^{n-1} = np \cdot 1 = np.$$

Identité utilisée : $k \binom{n}{k} = k \times \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \times \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \binom{n-1}{k-1}.$

10.5 Problèmes contextuels

DÉFINITION 1

Dans un jeu de hasard, le **gain algébrique** G d'un joueur est la différence entre ce qu'il reçoit et ce qu'il a payé pour jouer (la mise). Le gain peut être négatif (perte).

Un jeu est dit **équitable** si $E(G) = 0$: en moyenne, le joueur ne gagne ni ne perd.

Un jeu est dit **favorable au joueur** si $E(G) > 0$ et **défavorable** si $E(G) < 0$.

Exemple. On lance un dé équilibré. Si le résultat est 6, on gagne 10 euros ; sinon, on perd 2 euros. La mise est incluse dans les montants.

G prend les valeurs 10 (avec probabilité $\frac{1}{6}$) et -2 (avec probabilité $\frac{5}{6}$).

$$E(G) = 10 \times \frac{1}{6} + (-2) \times \frac{5}{6} = \frac{10}{6} - \frac{10}{6} = 0.$$

Le jeu est équitable.

Propriété. Dans un problème de **contrôle qualité**, si l'on prélève n pièces indépendamment dans une production dont le taux de défaut est p , le nombre X de pièces défectueuses suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ (à condition que la production soit assez grande pour considérer les tirages comme indépendants).

Exemple. Une machine produit 5 % de pièces défectueuses. On prélève 20 pièces au hasard.

$X \sim \mathcal{B}(20, 0,05)$. On a $E(X) = 20 \times 0,05 = 1$ et $\sigma(X) = \sqrt{20 \times 0,05 \times 0,95} \approx 0,97$.

En moyenne, on s'attend à 1 pièce défectueuse dans l'échantillon.

Propriété. Dans un problème d'assurance, l'assureur fixe une prime c et verse une indemnité I en cas de sinistre (de probabilité p). Le bénéfice de l'assureur par contrat est une variable aléatoire B :

- ▶ $B = c$ si pas de sinistre (probabilité $1 - p$).
- ▶ $B = c - I$ si sinistre (probabilité p).

$$E(B) = c - pI.$$

Le contrat est rentable pour l'assureur si $E(B) > 0$, c'est-à-dire $c > pI$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la mise dans le gain algébrique.

Si un joueur paie 3 euros pour jouer et peut gagner 10 euros, son gain est $10 - 3 = 7$ (et non 10). S'il ne gagne rien, son gain est $0 - 3 = -3$ (et non 0).

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre gain et probabilité.

L'espérance n'est pas une probabilité : $E(G) = -2$ signifie qu'en moyenne on perd 2 euros par partie, pas que la probabilité de perdre est 2.

ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas définir clairement la variable aléatoire.

Avant tout calcul, écrire « Soit X la variable aléatoire qui représente... ». Un exercice où X n'est pas défini est incomplet.

MÉTHODE M1 — CONSTRUIRE LE TABLEAU DE LOI D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est-à-dire de dresser le tableau donnant chaque valeur et sa probabilité.

La méthode pas à pas.

1. Je liste toutes les issues de l'univers Ω et leurs probabilités.
2. Pour chaque issue ω , je calcule la valeur $X(\omega)$.
3. Je regroupe les issues qui donnent la même valeur de X .
4. Pour chaque valeur x_i , je somme les probabilités des issues correspondantes : $P(X = x_i)$.
5. Je présente le résultat dans un tableau de loi.
6. Je vérifie que la somme de toutes les probabilités vaut 1.

Exemple rédigé. On lance deux pièces équilibrées. Soit X le nombre de Pile obtenus.

$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$, chaque issue a probabilité $\frac{1}{4}$.

$X(PP) = 2, X(PF) = 1, X(FP) = 1, X(FF) = 0$.

$P(X = 0) = \frac{1}{4}, P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, P(X = 2) = \frac{1}{4}$.

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Méthode pour un problème contextualisé :

1. Définir clairement la variable aléatoire X .
2. Lister ses valeurs et leurs probabilités.
3. Construire le tableau de loi.
4. Calculer $E(X)$ pour conclure.
5. Interpréter dans le contexte.

Lister les issues.

Calculer $X(\omega)$.

Regrouper et sommer.

Tableau de loi.

Vérification.

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1 \checkmark$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier une issue de l'univers (par exemple oublier FP et ne compter que PF pour $X = 1$).
- **Piège 2.** Ne pas regrouper toutes les issues donnant la même valeur de X .
- **Piège 3.** Ne pas vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

Vérifier son résultat. Additionner toutes les probabilités du tableau : le total doit être exactement 1. Si ce n'est pas le cas, une valeur a été oubliée ou un calcul est erroné.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 — CALCULER ESPÉRANCE, VARIANCE ET ÉCART TYPE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer $E(X)$, $V(X)$ ou $\sigma(X)$, ou de déterminer si un jeu est équitable.

La méthode pas à pas.

1. J'écris le tableau de loi de X : valeurs x_i et probabilités p_i .
2. Je calcule $E(X) = \sum_i x_i p_i$.
3. Je calcule $E(X^2) = \sum_i x_i^2 p_i$.
4. J'applique la formule de König-Huygens : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
5. Je calcule $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
6. J'interprète dans le contexte du problème.

Exemple rédigé. Un sac contient 3 boules numérotées 1, 2, 5. On tire une boule au hasard. Soit X le numéro obtenu.

Tableau de loi.

x_i	1	2	5
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

Calcul de $E(X)$.

Calcul de $E(X^2)$.

Variance et écart type.

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} + 5 \times \frac{1}{3} = \frac{8}{3}.$$

$$E(X^2) = 1 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{3} + 25 \times \frac{1}{3} = \frac{30}{3} = 10.$$

$$V(X) = 10 - \left(\frac{8}{3}\right)^2 = 10 - \frac{64}{9} = \frac{90-64}{9} = \frac{26}{9}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{26}{9}} = \frac{\sqrt{26}}{3} \approx 1,70.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre $E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$ et $[E(X)]^2 = (\sum x_i p_i)^2$.
- **Piège 2.** Oublier la racine carrée : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, pas $V(X)$.
- **Piège 3.** Écrire $V(X) = [E(X)]^2 - E(X^2)$ (inversion) : c'est $E(X^2) - [E(X)]^2$.

Vérifier son résultat. $V(X)$ doit être positif ou nul. Si vous obtenez un nombre négatif, il y a une erreur de calcul (probablement une inversion dans la formule de König-Huygens).

S'entraîner. (renvois exercices M2)

MÉTHODE M3 — RECONNAÎTRE ET UTILISER UNE LOI BINOMIALE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'on répète une même expérience à deux issues (succès/échec) de façon indépendante et que l'on compte le nombre de succès.

La méthode pas à pas.

1. Je vérifie les trois conditions du schéma de Bernoulli :
 - ▶ Deux issues seulement (succès de probabilité p , échec de probabilité $1 - p$).
 - ▶ Les épreuves sont **identiques** (même p à chaque fois).
 - ▶ Les épreuves sont **indépendantes**.
2. J'identifie n (nombre de répétitions) et p (probabilité du succès).
3. Je pose X le nombre de succès : $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.
4. Pour calculer $P(X = k)$, j'applique : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
5. Je calcule le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ (triangle de Pascal ou formule).

Exemple rédigé. On lance 5 fois une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 Pile ?

Succès = Pile, $p = \frac{1}{2}$, $n = 5$ lancers indépendants.

X = nombre de Pile.

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$$

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{120}{6 \times 2} = 10 \checkmark. \text{ Somme des exposants : } 3 + 2 = 5 \checkmark.$$

Vérifier les conditions.

$$X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2}).$$

Calcul de $P(X = 3)$.

Vérification rapide.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Appliquer la loi binomiale sans vérifier l'indépendance (tirage sans remise, par exemple).
- ▶ **Piège 2.** Inverser les exposants : p^k (succès) et $(1 - p)^{n-k}$ (échecs), pas l'inverse.
- ▶ **Piège 3.** Oublier le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ dans la formule.

Vérifier son résultat. La somme des exposants de p et de $(1 - p)$ doit être n . Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ est un entier positif.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

MÉTHODE M4 — UTILISER LES FORMULES $E(X) = np$ ET $V(X) = np(1 - p)$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ et que l'on doit calculer son espérance, sa variance ou son écart type, ou retrouver n et p .

La méthode pas à pas.

1. Je vérifie que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.
2. J'applique directement : $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$, $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$.
3. Si l'on me donne $E(X)$ et $V(X)$ et qu'on me demande n et p :
 - ▶ $1 - p = \frac{V(X)}{E(X)}$, donc $p = 1 - \frac{V(X)}{E(X)}$.
 - ▶ $n = \frac{E(X)}{p}$.

Exemple rédigé. On sait que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $E(X) = 6$ et $V(X) = 4,2$. Trouver n et p .

$$1 - p = \frac{4,2}{6} = 0,7, \text{ donc } p = 0,3.$$

$$n = \frac{6}{0,3} = 20.$$

$$\text{Vérification : } E(X) = 20 \times 0,3 = 6 \checkmark \quad V(X) = 20 \times 0,3 \times 0,7 = 4,2 \checkmark.$$

$$V(X)/E(X) = 1 - p.$$

$$n = E(X)/p.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Appliquer $E(X) = np$ à une variable qui ne suit pas une loi binomiale.
- ▶ **Piège 2.** Écrire $V(X) = np^2$ au lieu de $np(1-p)$.
- ▶ **Piège 3.** Confondre np et n/p .

Vérifier son résultat. Toujours vérifier que n est un entier naturel et que $0 < p < 1$. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur ou l'hypothèse de loi binomiale est incorrecte.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 — RÉSOUDRE UN PROBLÈME CONTEXTUALISÉ AVEC UNE VARIABLE ALÉATOIRE

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour les problèmes de jeux de hasard, d'assurance, de contrôle qualité ou de décision, où il faut modéliser une situation par une variable aléatoire et conclure grâce à l'espérance.

La méthode pas à pas.

1. Je lis l'énoncé et j'identifie l'expérience aléatoire.
2. Je définis clairement la variable aléatoire X (par exemple : X = gain algébrique du joueur).
3. Je détermine toutes les valeurs possibles de X .
4. Je calcule la probabilité de chaque valeur (arbre, tableau, dénombrement).
5. Je construis le tableau de loi et je vérifie $\sum p_i = 1$.
6. Je calcule $E(X)$ et j'interprète dans le contexte :
 - ▶ Jeu : $E(X) > 0$ favorable, $E(X) = 0$ équitable, $E(X) < 0$ défavorable.
 - ▶ Assurance : $E(B) > 0$ rentable pour l'assureur.
 - ▶ Qualité : $E(X)$ donne le nombre moyen de défauts.

Exemple rédigé. Un joueur paie 2 euros pour lancer un dé. S'il obtient 6, il reçoit 10 euros. Sinon, il ne reçoit rien. Le jeu est-il favorable ?

Soit X le gain algébrique du joueur.

Si 6 : $X = 10 - 2 = 8$ avec $P = \frac{1}{6}$. Sinon : $X = 0 - 2 = -2$ avec $P = \frac{5}{6}$.

$$E(X) = 8 \times \frac{1}{6} + (-2) \times \frac{5}{6} = \frac{8-10}{6} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3} \approx -0,33.$$

$E(X) < 0$: le jeu est défavorable au joueur. En moyenne, il perd environ 0,33 euro par partie.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de soustraire la mise dans le gain algébrique.
- ▶ **Piège 2.** Ne pas définir X explicitement au début de la résolution.
- ▶ **Piège 3.** Conclure sur le résultat d'une seule partie au lieu de raisonner « en moyenne ».

Vérifier son résultat. Vérifier la cohérence de $E(X)$ avec le contexte : si la mise est élevée et les gains rares, $E(X)$ doit être négatif (jeu défavorable au joueur).

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Définir X .
Valeurs et probabilités.
Espérance.
Conclusion.

Exercice 1

On lance un dé équilibré à 6 faces. Soit X la variable aléatoire égale au résultat obtenu.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Dresser le tableau de loi de X .
3. Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

4. Calculer $P(X \leq 3)$ et $P(X \geq 5)$.

Exercice 2

1SPE-VARALEA-EX-002
⌚ 10 min

On lance deux pièces équilibrées. Soit X le nombre de Pile obtenus.

1. Lister les quatre issues de l'univers Ω .
2. Déterminer la loi de probabilité de X .
3. Calculer $P(X \geq 1)$.

Exercice 3

1SPE-VARALEA-EX-003
⌚ 12 min

Une urne contient 3 boules rouges, 2 boules bleues et 1 boule verte. On tire une boule au hasard. On gagne 1 euro si elle est rouge, 3 euros si elle est bleue et 5 euros si elle est verte. Soit X le gain.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Dresser le tableau de loi de X .
3. Calculer $P(X \geq 3)$.

Exercice 4

1SPE-VARALEA-EX-004
⌚ 12 min

On lance deux dés équilibrés et on note S leur somme. On définit X par : $X = 1$ si $S \geq 10$ et $X = 0$ sinon.

1. Combien d'issues parmi les 36 donnent $S = 10$? $S = 11$? $S = 12$?
2. En déduire $P(X = 1)$ et $P(X = 0)$.
3. Dresser le tableau de loi de X .

Exercice 5

1SPE-VARALEA-EX-005
⌚ 15 min

On lance trois pièces équilibrées. Soit X le nombre de Pile obtenus.

1. Lister les 8 issues de l'univers.
2. Déterminer la loi de X .
3. Calculer $P(X \leq 1)$ et $P(X \geq 2)$.
4. Vérifier que $P(X \leq 1) + P(X \geq 2) = 1$.

Exercice 6

1SPE-VARALEA-EX-006
⌚ 10 min

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau incomplet suivant :

x_i	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	0,2	0,3	?	0,1

1. Déterminer la valeur manquante $P(X = 3)$.
2. Calculer $P(X \leq 2)$.

Exercice 7

1SPE-VARALEA-EX-007
⌚ 15 min

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. On tire 2 boules au hasard *sans remise*. Soit X le nombre de boules rouges obtenues.

1. Quelles sont les valeurs possibles de X ?

- Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ et $P(X = 2)$ à l'aide des coefficients binomiaux.
- Dresser le tableau de loi de X et vérifier.

1SPE-VARALEA-EX-008
⌚ 15 min

Exercice 8 ♦♦♦

On lance deux dés équilibrés. Soit X le maximum des deux résultats.

- Montrer que $P(X \leq k) = \left(\frac{k}{6}\right)^2$ pour $k \in \{1, \dots, 6\}$.
- En déduire $P(X = k)$ pour chaque k .
- Dresser le tableau de loi de X .

1SPE-VARALEA-EX-009
⌚ 10 min

Exercice 9 ♦

On lance une pièce truquée pour laquelle la probabilité d'obtenir Pile est $\frac{2}{3}$. On pose $X = 1$ si l'on obtient Pile et $X = 0$ sinon.

- Dresser le tableau de loi de X .
- Quelle loi classique reconnaît-on ?

1SPE-VARALEA-EX-010
⌚ 15 min

Exercice 10 ♦♦

À la roulette, il y a 37 cases numérotées de 0 à 36. Un joueur mise 1 euro sur un numéro.

- ▶ Si le numéro sort, il reçoit 36 euros (gain net : 35 euros).
- ▶ Sinon, il perd sa mise.

Soit X le gain algébrique du joueur.

- Quelles sont les valeurs de X et leurs probabilités ?
- Dresser le tableau de loi de X .

1SPE-VARALEA-EX-011
⌚ 10 min

Exercice 11 ♦

On lance un dé équilibré. Soit X le résultat.

- Calculer $E(X)$.
- Interpréter cette valeur.

1SPE-VARALEA-EX-012
⌚ 12 min

Exercice 12 ♦

Reprendre l'exercice 003 (urne : gain 1, 3 ou 5 euros). Calculer $E(X)$. En moyenne, combien gagne-t-on par tirage ?

1SPE-VARALEA-EX-013
⌚ 12 min

Exercice 13 ♦

Soit X une variable aléatoire de loi :

x_i	-2	0	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

- Calculer $E(X)$.
- Calculer $V(X)$ par la formule de König-Huygens.
- Calculer $\sigma(X)$.

Exercice 14 ♦♦

1SPE-VARALEA-EX-014

⌚ 15 min

On lance un dé équilibré. Soit X le résultat.

1. Calculer $E(X^2)$.
2. En déduire $V(X)$ et $\sigma(X)$.
3. On pose $Y = 2X - 1$. Calculer $E(Y)$ et $V(Y)$ en utilisant les propriétés de linéarité.

Exercice 15 ♦

1SPE-VARALEA-EX-015

⌚ 10 min

On lance une pièce équilibrée. Soit $X = 1$ si Pile et $X = 0$ si Face.

1. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
2. On pose $Y = 10X - 5$. Calculer $E(Y)$. Pour quelle valeur de la mise m le jeu « on gagne 10 euros si Pile, on perd m si Face » est-il équitable?

Exercice 16 ♦♦

1SPE-VARALEA-EX-016

⌚ 15 min

Reprendre l'exercice 010 (roulette, mise 1 euro sur un numéro).

1. Calculer $E(X)$.
2. Le jeu est-il équitable? Favorable au joueur? À la banque?
3. Sur 370 parties, combien le joueur perd-il en moyenne?

Exercice 17 ♦♦

1SPE-VARALEA-EX-017

⌚ 15 min

On lance deux pièces équilibrées. Soit X le nombre de Pile.

1. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
2. Retrouver ces résultats en utilisant $X = X_1 + X_2$ où $X_i \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$.

Exercice 18 ♦♦♦

1SPE-VARALEA-EX-018

⌚ 15 min

Reprendre l'exercice 008 ($X = \text{maximum de deux dés}$).

1. Calculer $E(X)$.
2. Calculer $V(X)$.
3. En moyenne, le maximum est-il plus proche de 4 ou de 5?

Exercice 19 ♦

1SPE-VARALEA-EX-019

⌚ 10 min

Dans un jeu, on gagne 5 euros avec probabilité $\frac{1}{3}$ et on perd 1 euro avec probabilité $\frac{2}{3}$.

1. Calculer l'espérance du gain.
2. Le jeu est-il favorable au joueur?

Exercice 20 ♦♦♦

1SPE-VARALEA-EX-020

⌚ 20 min

Soit X une variable aléatoire telle que $E(X) = 3$ et $V(X) = 2$. On pose $Y = 2X + 1$.

1. Calculer $E(Y)$.
2. Calculer $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.

3. Si $Z = -X + 5$, calculer $E(Z)$ et $V(Z)$.

1SPE-VARALEA-EX-021
⌚ 10 min

Exercice 21 ♦

Calculer les coefficients binomiaux suivants.

1. $\binom{6}{2}$
2. $\binom{6}{4}$
3. $\binom{6}{0}$
4. $\binom{6}{6}$
5. Vérifier que $\binom{6}{2} = \binom{6}{4}$ (propriété de symétrie).

1SPE-VARALEA-EX-022
⌚ 12 min

Exercice 22 ♦

On lance 5 fois une pièce équilibrée. Soit X le nombre de Pile.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$.
2. Calculer $P(X = 3)$.
3. Calculer $P(X = 0)$ et $P(X = 5)$.

1SPE-VARALEA-EX-023
⌚ 12 min

Exercice 23 ♦

On lance 4 fois un dé. Soit X le nombre de 6 obtenus. On a $X \sim \mathcal{B}(4, \frac{1}{6})$.

1. Calculer $P(X = 0)$.
2. Calculer $P(X = 2)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$.

1SPE-VARALEA-EX-024
⌚ 15 min

Exercice 24 ♦♦

Un QCM contient 10 questions avec 4 propositions chacune (une seule correcte). Un élève répond au hasard. Soit X le nombre de bonnes réponses.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$.
2. Calculer $P(X = 0)$.
3. Calculer $P(X = 5)$.
4. La note est $2X$. Quelle note moyenne obtient-on en répondant au hasard ?

1SPE-VARALEA-EX-025
⌚ 10 min

Exercice 25 ♦

Construire les lignes $n = 0$ à $n = 5$ du triangle de Pascal.

1. Écrire les 6 premières lignes.
2. Vérifier la relation $\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2}$.

1SPE-VARALEA-EX-026
⌚ 15 min

Exercice 26 ♦♦

Une machine produit 5 % de pièces défectueuses. On prélève 10 pièces au hasard. Soit X le nombre de pièces défectueuses.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(10, 0,05)$.
2. Calculer $P(X = 0)$ (aucune pièce défectueuse).

3. Calculer $P(X = 1)$.
4. En déduire $P(X \leq 1)$. Interpréter.

Exercice 27 ♦♦1SPE-VARALEA-EX-027
⌚ 15 minSoit $X \sim \mathcal{B}(8, \frac{1}{3})$.

1. Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$, $P(X = 3)$.
2. Calculer $P(X \leq 2)$.
3. Calculer $P(X \geq 3)$.

Exercice 28 ♦♦♦1SPE-VARALEA-EX-028
⌚ 20 min

1. Démontrer la formule de Pascal : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ pour $1 \leq k \leq n-1$.
2. Démontrer que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.
3. En déduire que la somme des probabilités d'une loi $\mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$ vaut 1.

Exercice 29 ♦1SPE-VARALEA-EX-029
⌚ 10 minSoit $X \sim \mathcal{B}(0,3)$ (loi de Bernoulli).

1. Dresser le tableau de loi de X .
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 30 ♦♦1SPE-VARALEA-EX-030
⌚ 15 minSoit $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{2})$.

1. Dresser le tableau de loi complet de X .
2. Représenter graphiquement cette loi (diagramme en bâtons).
3. Vérifier que $E(X) = np$.

Exercice 31 ♦1SPE-VARALEA-EX-031
⌚ 10 minSoit $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$.

1. Calculer $E(X)$.
2. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 32 ♦1SPE-VARALEA-EX-032
⌚ 10 minSoit $X \sim \mathcal{B}(20, 0,2)$. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.**Exercice 33** ♦♦1SPE-VARALEA-EX-033
⌚ 15 minOn sait que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $E(X) = 6$ et $V(X) = 4,2$. Déterminer n et p .**Exercice 34** ♦♦1SPE-VARALEA-EX-034
⌚ 15 minOn sait que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $E(X) = 8$ et $V(X) = 6,4$. Déterminer n et p .**Exercice 35** ♦♦♦1SPE-VARALEA-EX-035
⌚ 20 min

1. Démontrer que pour $1 \leq k \leq n : k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.
2. En utilisant cette identité, démontrer que si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$.
3. Application : vérifier pour $X \sim \mathcal{B}(4, \frac{1}{3})$.

1SPE-VARALEA-EX-036
⌚ 10 min

Exercice 36 ♦

On lance 100 fois une pièce équilibrée. Soit X le nombre de Pile.

1. Quelle est la loi de X ?
2. Combien de Pile attend-on en moyenne?
3. Calculer $\sigma(X)$.

1SPE-VARALEA-EX-037
⌚ 15 min

Exercice 37 ♦♦

Soit $X \sim \mathcal{B}(50, 0,4)$ et $Y \sim \mathcal{B}(100, 0,2)$.

1. Calculer $E(X)$ et $E(Y)$.
2. Calculer $V(X)$ et $V(Y)$.
3. Comparer les dispersions. Laquelle des deux variables est la plus concentrée autour de son espérance?

1SPE-VARALEA-EX-038
⌚ 20 min

Exercice 38 ♦♦♦

1. Démontrer que pour $X \sim \mathcal{B}(n, p) : E[X(X-1)] = n(n-1)p^2$.
2. En déduire $E(X^2) = n(n-1)p^2 + np$.
3. Montrer que $V(X) = np(1-p)$.
4. Vérifier pour $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{3})$.

1SPE-VARALEA-EX-039
⌚ 10 min

Exercice 39 ♦

Soit $X \sim \mathcal{B}(\frac{2}{5})$ (loi de Bernoulli).

1. Vérifier que $E(X) = p$ en utilisant la formule np avec $n = 1$.
2. Vérifier que $V(X) = p(1-p)$.

1SPE-VARALEA-EX-040
⌚ 15 min

Exercice 40 ♦♦

Un contrôle qualité porte sur 50 pièces. Le taux de défaut est 10 %. Soit X le nombre de pièces défectueuses.

1. Quelle loi suit X ?
2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
3. En moyenne, combien de pièces défectueuses trouve-t-on?

1SPE-VARALEA-EX-041
⌚ 12 min

Exercice 41 ♦

Un joueur paie 2 euros pour lancer un dé. S'il obtient un 6, il reçoit 7 euros. Sinon, il ne reçoit rien. Soit G le gain algébrique.

1. Dresser le tableau de loi de G .
2. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable au joueur?

Exercice 42 ◆

1SPE-VARALEA-EX-042

⌚ 12 min

Un assureur propose un contrat : prime annuelle 40 euros, remboursement 500 euros en cas de sinistre. La probabilité de sinistre est $\frac{1}{20}$.

1. Soit B le bénéfice de l'assureur par contrat. Dresser le tableau de loi de B .
2. Calculer $E(B)$. Le contrat est-il rentable pour l'assureur ?

Exercice 43 ◆◆

1SPE-VARALEA-EX-043

⌚ 15 min

On lance deux dés. Si l'on obtient un double (deux résultats identiques), on gagne 18 euros. Sinon, on ne gagne rien.

1. Calculer la probabilité d'obtenir un double.
2. Soit m la mise. Exprimer $E(G)$ en fonction de m où G est le gain algébrique.
3. Quelle mise rend le jeu équitable ?

Exercice 44 ◆◆

1SPE-VARALEA-EX-044

⌚ 15 min

Un lot contient 3 % de pièces défectueuses. On prélève 5 pièces. Le lot est refusé si au moins une pièce est défectueuse.

1. Quelle loi suit le nombre X de pièces défectueuses ?
2. Calculer la probabilité que le lot soit accepté.
3. Calculer la probabilité que le lot soit refusé.

Exercice 45 ◆

1SPE-VARALEA-EX-045

⌚ 12 min

On lance une pièce équilibrée. Si Pile, on gagne 3 euros. Si Face, on perd 2 euros.

1. Dresser le tableau de loi du gain G .
2. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable ?
3. Après 100 parties, quel gain total moyen espère-t-on ?

Exercice 46 ◆◆◆

1SPE-VARALEA-EX-046

⌚ 20 min

On paie 5 euros pour lancer 3 dés. Pour chaque 6 obtenu, on reçoit 10 euros. Soit X le nombre de 6 et $G = 10X - 5$ le gain algébrique.

1. Quelle est la loi de X ?
2. Dresser le tableau de loi de G .
3. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il équitable ?
4. Calculer $V(G)$ et $\sigma(G)$.

Exercice 47 ◆◆

1SPE-VARALEA-EX-047

⌚ 15 min

Un assureur couvre un risque automobile. En cas de sinistre (probabilité $\frac{1}{50}$), il verse 5 000 euros.

1. Quelle prime annuelle minimale doit-il fixer pour que le contrat soit rentable en moyenne ?
2. S'il fixe la prime à 150 euros et vend 1 000 contrats, quel est son bénéfice moyen ?

Exercice 48 ◆◆◆

1SPE-VARALEA-EX-048

⌚ 20 min

Un entrepreneur hésite à investir 10 000 euros dans un projet. Avec probabilité 0,6, le projet réussit et rapporte 8 000 euros de bénéfice. Avec probabilité 0,4, il échoue et l'investissement est perdu.

1. Définir la variable aléatoire G (gain algébrique) et dresser sa loi.
2. Calculer $E(G)$. L'investissement est-il intéressant en moyenne ?
3. Calculer $\sigma(G)$. Commenter le risque.
4. Si l'entrepreneur peut répartir son investissement sur 5 projets indépendants identiques (2 000 euros chacun, gain proportionnel), est-ce une meilleure stratégie ?

1SPE-VARALEA-EX-049
⌚ 15 min

Exercice 49

Un vaccin a une efficacité de 90 %. On vaccine 8 personnes. Soit X le nombre de personnes effectivement protégées.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(8, 0,9)$.
2. Calculer $P(X = 8)$ (toutes protégées).
3. Calculer $E(X)$.

1SPE-VARALEA-EX-050
⌚ 20 min

Exercice 50

On dispose de deux urnes. L'urne A contient 3 boules rouges et 2 bleues. L'urne B contient 1 boule rouge et 4 bleues. On choisit une urne au hasard (probabilité $\frac{1}{2}$ chacune), puis on tire une boule.

Le joueur paie 1 euro. S'il tire une boule rouge, il reçoit 4 euros. Sinon, il ne reçoit rien.

1. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge (formule des probabilités totales).
2. Dresser le tableau de loi du gain algébrique G .
3. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable ?
4. Le joueur peut-il choisir l'urne ? Si oui, laquelle choisir ?

Coup de pouce 1. Pour chaque face du dé, la probabilité est $\frac{1}{6}$. Pour $P(X \leq 3)$, additionne les probabilités des valeurs 1, 2 et 3.

Coup de pouce 1. Liste les issues PP, PF, FP, FF . Compte combien donnent $X = 0, X = 1$ et $X = 2$.

Coup de pouce 1. Il y a $2^3 = 8$ issues possibles. Pour $X = 1$, repère les issues avec exactement un P parmi trois positions.

Coup de pouce 1. Utilise la formule $\binom{n}{k}$ pour dénombrer. Le nombre total de tirages est $\binom{5}{2} = 10$.

Coup de pouce 1. L'espérance est la moyenne pondérée : multiplie chaque valeur par sa probabilité et additionne.

Coup de pouce 1. Pour $V(X)$, calcule d'abord $E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$, puis applique $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

Coup de pouce 1. Pour $E(X^2)$, calcule $1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} + \dots + 6^2 \times \frac{1}{6}$.

Coup de pouce 1. Tu peux aussi utiliser $X = X_1 + X_2$ avec $X_i \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$ et la linéarité de E .

Coup de pouce 1. Utilise $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ avec $n = 5, p = \frac{1}{2}, k = 3$.

Coup de pouce 1. Chaque question est une épreuve de Bernoulli ($p = \frac{1}{4}$). Le coefficient $\binom{10}{5}$ se lit dans le triangle de Pascal ou se calcule.

Coup de pouce 1. Pour $P(X = 0)$, tous les n tirages sont des échecs : $(1-p)^n$.

Coup de pouce 1. Applique directement $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$.

Coup de pouce 1. Utilise $1-p = \frac{V(X)}{E(X)}$ pour trouver p , puis $n = \frac{E(X)}{p}$.

Coup de pouce 1. Le gain algébrique = somme reçue - mise. Si le joueur ne reçoit rien, $G = 0 - 2 = -2$.

Coup de pouce 1. Un double : $(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)$, soit 6 issues sur 36.

Coup de pouce 1. Le gain est +3 si Pile et -2 si Face. Multiplie chaque gain par $\frac{1}{2}$ et additionne.

Coup de pouce 1. Condition de rentabilité : $E(B) = c - pI \geq 0$, donc $c \geq pI$.

Coup de pouce 1. Utilise la formule des probabilités totales : $P(R) = P(R|A)P(A) + P(R|B)P(B)$.

TD contextualisé — Le jeu du stand forain

Mise en situation

À une fête foraine, un stand propose le jeu suivant. On lance deux dés équilibrés et on paie 2 euros pour jouer.

- ▶ Si l'on obtient un double 6, on gagne 50 euros.
- ▶ Si l'on obtient exactement un seul 6 (parmi les deux dés), on gagne 5 euros.
- ▶ Sinon, on ne gagne rien.

Partie A — Construction de la loi du gain

Exercice 51

1SPE-VARALEA-TD-CTX-A
⌚ 15 min

1. Parmi les 36 issues équiprobables du lancer de deux dés, combien donnent un double 6? Combien donnent exactement un seul 6? Combien ne donnent aucun 6?
2. On note G le gain algébrique du joueur (gain reçu moins mise). Quelles sont les valeurs possibles de G ?
3. Construire le tableau de loi de G . Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
4. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable au joueur?
5. Si 100 personnes jouent, quel bénéfice moyen le forain peut-il espérer?

Partie B — Modification des règles

Exercice 52

1SPE-VARALEA-TD-CTX-B
⌚ 15 min

1. Le forain veut rendre le jeu équitable. Quelle mise m doit-il fixer pour que $E(G) = 0$?
2. Le forain veut garder la mise à 2 euros mais modifier le gain en cas de double 6. Quel montant M rend le jeu équitable?
3. Calculer la variance et l'écart type de G avec les règles initiales. Interpréter.

TD fil rouge — L'assurance smartphone

Rappel de la situation

Un assureur propose un contrat annuel couvrant la casse d'un smartphone.

- ▶ Prime annuelle : 50 euros.
- ▶ Remboursement en cas de casse : 300 euros.
- ▶ Probabilité de casse dans l'année : $p = \frac{1}{10}$.

Partie A — Du point de vue de l'assuré

Exercice 53

1SPE-VARALEA-TD-FR-A
⌚ 15 min

1. Soit X le gain de l'assuré (remboursement éventuel moins la prime). Quelles sont les valeurs possibles de X ?
2. Déterminer la loi de probabilité de X (tableau de loi).

3. Calculer $E(X)$. Interpréter : le contrat est-il avantageux pour l'assuré ?
4. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$. Que signifie un écart type élevé pour l'assuré ?

Partie B — Du point de vue de l'assureur (1000 contrats)

1SPE-VARALEA-TD-FR-B
⌚ 20 min

Exercice 54 ◆◆

L'assureur vend 1000 contrats identiques. On note Y le nombre de sinistres parmi les 1000 assurés.

1. Justifier que $Y \sim \mathcal{B}(1000, \frac{1}{10})$.
2. Calculer $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.
3. Le bénéfice total de l'assureur est $B = 1000 \times 50 - 300 \times Y$. Calculer $E(B)$.
4. Interpréter : combien l'assureur espère-t-il gagner en moyenne ?
5. Pour que l'assureur ait un bénéfice positif, il faut $B > 0$, soit $Y < \frac{50\,000}{300} \approx 166,7$. Commenter : est-ce probable ?
6. Quelle prime minimale c doit-il fixer pour que $E(B) \geq 0$? Retrouver la condition $c \geq pl$.

Partie C — Approfondissement

1SPE-VARALEA-TD-FR-C
⌚ 10 min

Exercice 55 ◆◆◆

1. L'assureur envisage de couvrir aussi le vol (probabilité $\frac{1}{20}$, indépendant de la casse, indemnité 200 euros). Soit Z le nombre total d'indemnisations parmi 1000 contrats. Z suit-elle une loi binomiale ? Justifier.
2. Proposer un modèle simplifié et calculer la prime minimale pour que le contrat reste rentable.

QCM d'auto-évaluation — Variables aléatoires

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

C1 — Loi de probabilité d'une variable aléatoire

1. [Q1] On lance un dé équilibré. Soit X le résultat. Quelle est $P(X = 3)$?
 A. $\frac{1}{3}$
 B. $\frac{1}{6}$
 C. $\frac{3}{6}$
 D. $\frac{1}{2}$
2. [Q2] La somme des probabilités d'un tableau de loi vaut toujours :
 A. 0
 B. $\frac{1}{2}$
 C. 1
 D. Le nombre de valeurs prises par X
3. [Q3] On lance deux pièces. Soit X le nombre de Pile. Quelle est $P(X = 1)$?
 A. $\frac{1}{4}$
 B. $\frac{1}{2}$

- C. $\frac{1}{3}$
- D. $\frac{3}{4}$

C2 — Espérance, variance, écart type

4. [Q4] On lance un dé équilibré. Quelle est l'espérance $E(X)$ du résultat ?
 - A. 3
 - B. 3,5
 - C. 4
 - D. 6
5. [Q5] Si $V(X) = 9$, alors $\sigma(X)$ vaut :
 - A. 81
 - B. 9
 - C. 3
 - D. 4,5
6. [Q6] Si $E(X) = 4$ et $V(X) = 5$, quelle est la valeur de $E(X^2)$?
 - A. 21
 - B. 9
 - C. 16
 - D. 20

C3 — Loi de Bernoulli et loi binomiale

7. [Q7] $X \sim \mathcal{B}(p)$ est une loi de Bernoulli. Combien de valeurs X peut-elle prendre ?
 - A. 1
 - B. 2
 - C. p
 - D. Une infinité
8. [Q8] $\binom{7}{3}$ vaut :
 - A. 21
 - B. 35
 - C. 42
 - D. 7
9. [Q9] $X \sim \mathcal{B}(6, \frac{1}{3})$. Quelle est $P(X = 0)$?
 - A. $(\frac{1}{3})^6$
 - B. $(\frac{2}{3})^6$
 - C. 0
 - D. 1

C4 — $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$

10. [Q10] $X \sim \mathcal{B}(20, 0,3)$. Quelle est $E(X)$?

- A. 20
- B. 6
- C. 0,3
- D. 14

11. [Q11] $X \sim \mathcal{B}(50, 0,4)$. Quelle est $V(X)$?

- A. 20
- B. 12
- C. 8
- D. 30

12. [Q12] On sait que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $E(X) = 10$ et $V(X) = 8$. Quelle est la valeur de p ?

- A. 0,8
- B. 0,2
- C. 0,5
- D. 0,1

C5 — Problèmes contextualisés

13. [Q13] Un joueur paie 3 euros et reçoit 15 euros s'il obtient un 6 au dé. Quel est son gain algébrique s'il obtient un 6 ?

- A. 15 euros
- B. 12 euros
- C. 3 euros
- D. 18 euros

14. [Q14] Un jeu a un gain moyen $E(G) = -0,5$ euro. Le jeu est :

- A. Équitable
- B. Favorable au joueur
- C. Défavorable au joueur
- D. Impossible à déterminer

15. [Q15] Un assureur fixe une prime $c = 60$ euros pour couvrir un sinistre de 1 000 euros avec probabilité $\frac{1}{25}$. Son bénéfice moyen par contrat est :

- A. 60 euros
- B. 20 euros
- C. -40 euros
- D. 40 euros

Correction et diagnostics

Question	Capacité	Réponse	Distracteurs — erreur type
Q1	C1	B	A : confusion $P(X = 3) = 1/3$ (divisé par le résultat). C : $P(X \leq 3)$ confondu. D : confusion dé/pièce.
Q2	C1	C	A : somme nulle (confusion avec espérance). B : confusion. D : confusion avec le cardinal.
Q3	C1	B	A : une seule issue comptée (PF ou FP). C : confusion avec 3 issues. D : $P(X \geq 1)$.
Q4	C2	B	A : médiane confondue avec espérance. C : confusion. D : valeur max.
Q5	C2	C	A : V^2 au lieu de $\sqrt{V}$. B : $\sigma = V$. D : $V/2$.
Q6	C2	A	B : $E(X) + V(X)$. C : $[E(X)]^2$. D : $E(X) \times V(X)$.
Q7	C3	B	A : une seule valeur. C : p valeurs. D : confusion avec continue.
Q8	C3	B	A : $\binom{7}{2}$ confondu. C : 7×6 . D : 7.
Q9	C3	B	A : p^n au lieu de $(1-p)^n$. C : impossible. D : confusion.
Q10	C4	B	A : n seul. C : p seul. D : $n(1-p)$.
Q11	C4	B	A : np . C : np^2 . D : $n(1-p)$.
Q12	C4	B	A : $V/E = 1-p$ mal utilisé. C : sans justification. D : erreur de calcul.
Q13	C5	B	A : oubli de la mise. C : mise seule. D : addition mise+gain.
Q14	C5	C	A : confusion $E = 0$. B : signe inversé. D : pas assez d'info (faux).
Q15	C5	B	A : prime seule. C : prime – sinistre sans p . D : $c - pl$ mal calculé.

Réponses correctes

Q1	B	Q2	C	Q3	B	Q4	B
Q5	C	Q6	A	Q7	B	Q8	B
Q9	B	Q10	B	Q11	B	Q12	B
Q13	B	Q14	C	Q15	B		

Score : /15 Capacités à retravailler : C1 [☐Q1 ☐Q2 ☐Q3] C2 [☐Q4 ☐Q5 ☐Q6] C3 [☐Q7 ☐Q8 ☐Q9] C4 [☐Q10 ☐Q11 ☐Q12] C5 [☐Q13 ☐Q14 ☐Q15]

Corrigé

1SPE-VARALEA-EV-A

Exercice 1

(8 points) — C1, C2

Barème indicatif : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 1 pt

Question 1 — Tableau de loi.

x_i	1	3	10
$P(X = x_i)$	$\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

8 boules au total, équiprobabilité.

Vérification : $\frac{1}{2} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$. ✓

Question 2 — Espérance.

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{3}{8} + 10 \times \frac{1}{8} = \frac{4+9+10}{8} = \frac{23}{8} = 2,875.$$

$$E(X) = \sum x_i p_i.$$

En moyenne, le gain par tirage est de 2,875 euros.

Question 3 — $E(X^2)$.

$$E(X^2) = 1 \times \frac{1}{2} + 9 \times \frac{3}{8} + 100 \times \frac{1}{8} = \frac{4+27+100}{8} = \frac{131}{8}.$$

Question 4 — Variance et écart type.

$$V(X) = \frac{131}{8} - \left(\frac{23}{8}\right)^2 = \frac{131}{8} - \frac{529}{64} = \frac{1048-529}{64} = \frac{519}{64} \approx 8,11.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{519}{64}} \approx 2,85.$$

Question 5 — Gain algébrique.

$$E(G) = E(X) - 3 = \frac{23}{8} - 3 = -\frac{1}{8} = -0,125.$$

$E(G) < 0$: le jeu est défavorable au joueur.

Exercice 2

(7 points) — C3, C4

Question 1. Chaque tir est une épreuve de Bernoulli (succès = atteindre, $p = \frac{1}{3}$). Les 6 tirs sont indépendants. X compte le nombre de succès : $X \sim \mathcal{B}(6, \frac{1}{3})$.

Question 2. $P(X = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^6 = \frac{64}{729} \approx 0,088.$

Question 3. $P(X = 2) = \binom{6}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^4 = 15 \times \frac{1}{9} \times \frac{16}{81} = \frac{240}{729} = \frac{80}{243} \approx 0,329.$

Question 4. $E(X) = 6 \times \frac{1}{3} = 2.$ $V(X) = 6 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \approx 1,33.$

Question 5. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{64}{729} = \frac{665}{729} \approx 0,912.$

Exercice 3

(5 points) — C5

Question 1. Doubles : $(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)$, soit 6 sur 36 : $P = \frac{1}{6}.$

Question 2. $G = 15 - 3 = 12$ si double $(\frac{1}{6})$, $G = -3$ sinon $(\frac{5}{6}).$

g_i	-3	12
$P(G = g_i)$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

Question 3. $E(G) = 12 \times \frac{1}{6} + (-3) \times \frac{5}{6} = 2 - \frac{5}{2} = -\frac{1}{2}.$

$E(G) = -0,5 < 0$: le jeu est défavorable au joueur.

Évaluation 1SPE-VARALEA-EV-A 55 min

Exercice 1

(8 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules bleues et 1 boule verte. On tire une boule au hasard. Le gain associé est : 1 euro si rouge, 3 euros si bleue, 10 euros si verte. Soit X le gain.

1. Dresser le tableau de loi de X . (2 pts — calculer)
2. Calculer $E(X)$. Interpréter. (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer $E(X^2)$. (1 pt — calculer)
4. En déduire $V(X)$ et $\sigma(X)$. (2 pts — calculer)
5. Le joueur paie 3 euros pour jouer. Soit $G = X - 3$ son gain algébrique. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable? (1 pt — raisonner)

Exercice 2

(7 points)

Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner.

Un tireur atteint sa cible avec une probabilité $\frac{1}{3}$ à chaque tir. Il effectue 6 tirs indépendants. Soit X le nombre de cibles atteintes.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(6, \frac{1}{3})$. (1 pt — raisonner)
2. Calculer $P(X = 0)$ (aucune cible atteinte). (1 pt — calculer)
3. Calculer $P(X = 2)$. (2 pts — calculer)
4. Calculer $E(X)$ et $V(X)$ à l'aide des formules du cours. (2 pts — calculer)
5. En déduire $P(X \geq 1)$. (1 pt — calculer)

Exercice 3**(5 points)****Capacité C5**

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

On lance deux dés. Si l'on obtient un double (deux résultats identiques), on reçoit 15 euros. La mise est de 3 euros.

1. Calculer la probabilité d'obtenir un double. (1 pt — calculer)
2. Définir la variable aléatoire G (gain algébrique) et dresser son tableau de loi. (2 pts — modéliser)
3. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il équitable? Favorable? Défavorable? (2 pts — calculer, communiquer)

Corrigé

1SPE-VARALEA-EV-B

Exercice 1**(8 points) — C1, C2**

Question 1 — Tableau de loi.

x_i	2	5	8
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

Question 2 — Espérance.

$$E(X) = 2 \times \frac{1}{2} + 5 \times \frac{3}{10} + 8 \times \frac{1}{5} = 1 + \frac{3}{2} + \frac{8}{5} = \frac{10+15+16}{10} = \frac{41}{10} = 4,1.$$

En moyenne, on obtient 4,1 points par tirage.

Question 3 — Variance et écart type.

$$E(X^2) = 4 \times \frac{1}{2} + 25 \times \frac{3}{10} + 64 \times \frac{1}{5} = 2 + \frac{15}{2} + \frac{64}{5} = \frac{20+75+128}{10} = \frac{223}{10}.$$

$$V(X) = \frac{223}{10} - \left(\frac{41}{10}\right)^2 = \frac{2230-1681}{100} = \frac{549}{100} = 5,49.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{5,49} \approx 2,34.$$

Question 4.

$$E(Y) = 2E(X) - 3 = 2 \times 4,1 - 3 = 5,2.$$

$$V(Y) = 4V(X) = 4 \times 5,49 = 21,96.$$

Exercice 2**(7 points) — C3, C4**

Question 1. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli ($p = \frac{1}{4}$), les 5 lancers sont indépendants : $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{4})$.

Question 2. $P(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{243}{1024} \approx 0,237.$

Question 3. $P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{64} \times \frac{9}{16} = \frac{90}{1024} = \frac{45}{512} \approx 0,088.$

Question 4. $E(X) = 5 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{4} = 1,25.$

$V(X) = 5 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{16} \approx 0,94. \sigma(X) = \sqrt{\frac{15}{16}} \approx 0,97.$

Question 5. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{243}{1024} = \frac{781}{1024} \approx 0,763.$

Exercice 3

(5 points) — C5

Question 1. Pas de sinistre : $B = 80$. Sinistre : $B = 80 - 2000 = -1920$.

Question 2.

b_i	-1920	80
$P(B = b_i)$	$\frac{1}{50}$	$\frac{49}{50}$

Question 3. $E(B) = 80 - 2000 \times \frac{1}{50} = 80 - 40 = 40$ euros.

$E(B) > 0$: le contrat est rentable pour l'assureur.

Question 4. Bénéfice total moyen : $500 \times 40 = 20\,000$ euros.

Évaluation 1SPE-VARALEA-EV-B 55 min

Exercice 1

(8 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

Un sac contient 5 bonbons rouges (2 points chacun), 3 bonbons jaunes (5 points) et 2 bonbons verts (8 points). On tire un bonbon au hasard. Soit X le nombre de points.

1. Dresser le tableau de loi de X . (2 pts — calculer)
2. Calculer $E(X)$. Interpréter. (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$. (3 pts — calculer)
4. On pose $Y = 2X - 3$. Calculer $E(Y)$ et $V(Y)$. (1 pt — calculer)

Exercice 2

(7 points)

Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner.

Un joueur de basket réussit un lancer franc avec probabilité $\frac{1}{4}$. Il effectue 5 lancers indépendants. Soit X le nombre de lancers réussis.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{4})$. (1 pt — raisonner)
2. Calculer $P(X = 0)$. (1 pt — calculer)
3. Calculer $P(X = 3)$. (2 pts — calculer)
4. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$. (2 pts — calculer)
5. Calculer $P(X \geq 1)$. (1 pt — calculer)

Exercice 3

(5 points)

Capacité C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un assureur propose un contrat annuel : prime de 80 euros. En cas de sinistre (probabilité $\frac{1}{50}$), il verse 2 000 euros.

1. Soit B le bénéfice de l'assureur par contrat. Quelles sont les valeurs de B ? (1 pt — modéliser)
2. Dresser le tableau de loi de B . (1 pt — calculer)
3. Calculer $E(B)$. Le contrat est-il rentable? (2 pts — calculer, communiquer)
4. Pour 500 contrats, quel bénéfice total moyen l'assureur espère-t-il? (1 pt — calculer)

Rappel — Probabilités de base

Expérience aléatoire : expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat.

Univers Ω : ensemble de toutes les issues possibles.

Événement : sous-ensemble de Ω . La probabilité d'un événement A vérifie $0 \leq P(A) \leq 1$ et $P(\Omega) = 1$.

Équiprobabilité : si toutes les issues sont également probables, $P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.

Exercice 56

On lance un dé équilibré à 6 faces.

1. Quel est l'univers Ω ?
2. Calculer $P(\text{obtenir un nombre pair})$.
3. Calculer $P(\text{obtenir un nombre supérieur à 4})$.

Corrigé

1SPE-VARALEA-FR-R1-EX1
⌚ 5 min

1. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 2. Nombres pairs : $\{2, 4, 6\}$, donc $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. 3. Supérieurs à 4 : $\{5, 6\}$, donc $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

1SPE-VARALEA-FR-R1-EX1

Rappel — Probabilités conditionnelles

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ si } P(B) > 0.$$

Formule des probabilités totales : si $B_1, \dots, B_n$ forment une partition de Ω : $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$.

Indépendance : A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Exercice 57

Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire deux boules successivement sans remise.

1. Calculer la probabilité que la première boule soit rouge.
2. Sachant que la première est rouge, calculer la probabilité que la deuxième soit rouge.

Corrigé

1SPE-VARALEA-FR-R2-EX1
⌚ 5 min

1. $P(R_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$. 2. $P(R_2|R_1) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

1SPE-VARALEA-FR-R2-EX1

Rappel — Combinatoire de base

Nombre de façons de choisir k éléments parmi n (sans ordre) : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Rappel : $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$ et $0! = 1$.

1SPE-VARALEA-FR-R3-EX1
⌚ 5 min

Exercice 58

1. Calculer $\binom{4}{2}$ et $\binom{5}{3}$.
2. De combien de façons peut-on choisir 3 élèves parmi 7 ?

1SPE-VARALEA-FR-R3-EX1

Corrigé

$$1. \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6. \quad \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = 10. \quad 2. \binom{7}{3} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3!} = \frac{210}{6} = 35.$$

Rappel — Suites et sommes

Somme des entiers : $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Notation sigma : $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

Somme géométrique : $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ si $q \neq 1$.

1SPE-VARALEA-FR-R4-EX1
⌚ 5 min

Exercice 59

1. Calculer $\sum_{k=1}^5 k$.
2. Calculer $\sum_{k=0}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^k$.

1SPE-VARALEA-FR-R4-EX1

Corrigé

$$1. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. \quad 2. 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{16+8+4+2+1}{16} = \frac{31}{16}.$$

Rappel — Puissances

Règles :

- ▶ $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- ▶ $(a^m)^n = a^{mn}$
- ▶ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
- ▶ $a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$)

1SPE-VARALEA-FR-R5-EX1
⌚ 5 min

Exercice 60

Calculer :

1. $\left(\frac{1}{2}\right)^4$
2. $\left(\frac{3}{4}\right)^2$
3. $2^3 \times 2^4$
4. $\left(\frac{2}{3}\right)^0$

1SPE-VARALEA-FR-R5-EX1

Corrigé

$$1. \frac{1}{16}. \quad 2. \frac{9}{16}. \quad 3. 2^7 = 128. \quad 4. 1.$$

Exercice 61

1SPE-VARALEA-RE-C1-EX1
⌚ 10 min

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Soit X le nombre de points associé : 1 pour un As, 7 pour un 7, 8 pour un 8, 9 pour un 9, 10 pour un 10, Valet, Dame, Roi.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Combien de cartes donnent chaque valeur?
3. Dresser le tableau de loi de X .

Corrigé

1SPE-VARALEA-RE-C1-EX1

1. $X \in \{1, 7, 8, 9, 10\}$. 2. 4 As, 4 sept, 4 huit, 4 neuf, 16 figures/dix. 3.

x_i	1	7	8	9	10
$P(X = x_i)$	$\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{16}{32} = \frac{1}{2}$

Vérification : $4 \times \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. ✓

Exercice 62

1SPE-VARALEA-RE-C2-EX1
⌚ 10 min

Soit X la variable aléatoire de loi :

x_i	0	1	4
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

1. Calculer $E(X)$ pas à pas.
2. Calculer $E(X^2)$.
3. En déduire $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Corrigé

1SPE-VARALEA-RE-C2-EX1

1. $E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$. 2. $E(X^2) = 0 + 1 \times \frac{1}{2} + 16 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + 4 = \frac{9}{2}$. 3. $V(X) = \frac{9}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{2} - \frac{9}{4} = \frac{9}{4}$. $\sigma(X) = \frac{3}{2} = 1,5$.

Exercice 63

1SPE-VARALEA-RE-C3-EX1
⌚ 10 min

On tire 3 fois à pile ou face (pièce équilibrée). Soit X le nombre de Pile.

1. Vérifier que $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{2})$.
2. Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ et $P(X = 3)$ en utilisant la formule $P(X = k) = \binom{3}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^3$.
3. Vérifier que $\sum P(X = k) = 1$.

Corrigé

1SPE-VARALEA-RE-C3-EX1

1. 3 épreuves de Bernoulli indépendantes, $p = \frac{1}{2}$: $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{2})$. 2. $P(X = 0) = \frac{1}{8}$, $P(X = 1) = \frac{3}{8}$, $P(X = 2) = \frac{3}{8}$, $P(X = 3) = \frac{1}{8}$. 3. $\frac{1+3+3+1}{8} = 1$. ✓

Exercice 64

1SPE-VARALEA-RE-C4-EX1
⌚ 10 min

Soit $X \sim \mathcal{B}(12, \frac{1}{4})$.

1. Calculer $E(X)$ à l'aide de la formule np .
2. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.
3. Retrouver n et p à partir de $E(X)$ et $V(X)$.

1SPE-VARALEA-RE-C4-EX1

Corrigé

1. $E(X) = 12 \times \frac{1}{4} = 3$. 2. $V(X) = 12 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{4} = 2,25$. $\sigma(X) = \frac{3}{2} = 1,5$. 3. $1 - p = \frac{9/4}{3} = \frac{3}{4}$, donc $p = \frac{1}{4}$. $n = \frac{3}{1/4} = 12$. ✓

1SPE-VARALEA-RE-C5-EX1

10 min

Exercice 65

Un jeu consiste à tirer une boule dans une urne contenant 5 boules : 2 gagnantes et 3 perdantes. La mise est 1 euro. Si la boule est gagnante, on reçoit 3 euros.

1. Définir la variable aléatoire G (gain algébrique) et ses valeurs.
2. Dresser le tableau de loi de G .
3. Calculer $E(G)$ et conclure.

1SPE-VARALEA-RE-C5-EX1

Corrigé

1. $G = 3 - 1 = 2$ (boule gagnante) ou $G = 0 - 1 = -1$ (boule perdante).

g_i	-1	2
$P(G = g_i)$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$

3. $E(G) = 2 \times \frac{2}{5} + (-1) \times \frac{3}{5} = \frac{4-3}{5} = \frac{1}{5} = 0,2$. Le jeu est favorable au joueur.

1SPE-VARALEA-EX-001

Corrigé

1. X prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. Le dé est équilibré, donc chaque face a la probabilité $\frac{1}{6}$.

x_i	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

3. $\frac{1}{6} \times 6 = 1$. ✓
4. $P(X \leq 3) = 3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.
 $P(X \geq 5) = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

1SPE-VARALEA-EX-002

Corrigé

1. $\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$, chaque issue a probabilité $\frac{1}{4}$.
2. $X(PP) = 2$, $X(PF) = X(FP) = 1$, $X(FF) = 0$.

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

3. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

1SPE-VARALEA-EX-003

Corrigé

1. X prend les valeurs 1, 3 et 5.
2. Il y a 6 boules au total.

x_i	1	3	5
$P(X = x_i)$	$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$	$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Vérification : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1. \checkmark$

3. $P(X \geq 3) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} = \frac{1}{2}.$

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-004

1. $S = 10 : (4, 6), (5, 5), (6, 4)$ soit 3 issues. $S = 11 : (5, 6), (6, 5)$ soit 2 issues. $S = 12 : (6, 6)$ soit 1 issue.

2. $P(X = 1) = P(S \geq 10) = \frac{3+2+1}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$

$P(X = 0) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$

3.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-005

1. $\Omega = \{PPP, PPF, PFP, FPP, PFF, FPF, FFP, FFF\}.$

2. $X(PPP) = 3, X(PPF) = X(PFP) = X(FPP) = 2, X(PFF) = X(FPF) = X(FFP) = 1, X(FFF) = 0.$

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

3. $P(X \leq 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}. \quad P(X \geq 2) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}.$

4. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \checkmark$

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-006

1. La somme des probabilités vaut 1 :

$$P(X = 3) = 1 - 0,2 - 0,3 - 0,1 = 0,4.$$

2. $P(X \leq 2) = P(X = 1) + P(X = 2) = 0,2 + 0,3 = 0,5.$

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-007

1. $X \in \{0, 1, 2\}.$

2. Il y a $\binom{5}{2} = 10$ tirages possibles.

$$P(X = 0) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{1}{10}.$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{10}.$$

3.

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$

$$\frac{1}{10} + \frac{6}{10} + \frac{3}{10} = 1. \checkmark$$

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-008

1. $\{X \leq k\}$ signifie que les deux dés donnent au plus k . Chaque dé a k faces favorables sur 6, donc

$$P(X \leq k) = \frac{k}{6} \times \frac{k}{6} = \frac{k^2}{36}.$$

$$2. P(X = k) = P(X \leq k) - P(X \leq k-1) = \frac{k^2}{36} - \frac{(k-1)^2}{36} = \frac{2k-1}{36}.$$

3.

k	1	2	3	4	5	6
$P(X = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

Vérification : $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36$, donc $\sum = 1$. ✓

1SPE-VARALEA-EX-009

Corrigé

1.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

2. X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{2}{3}$: $X \sim \mathcal{B}(\frac{2}{3})$.

1SPE-VARALEA-EX-010

Corrigé

1. Si le numéro sort : $X = 36 - 1 = 35$ avec $P = \frac{1}{37}$.

Si le numéro ne sort pas : $X = -1$ avec $P = \frac{36}{37}$.

2.

x_i	-1	35
$P(X = x_i)$	$\frac{36}{37}$	$\frac{1}{37}$

1SPE-VARALEA-EX-011

Corrigé

$$1. E(X) = \sum_{k=1}^6 k \times \frac{1}{6} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}.$$

2. En moyenne, sur un grand nombre de lancers, le résultat moyen est 3,5.

1SPE-VARALEA-EX-012

Corrigé

Rappel de la loi : $P(X = 1) = \frac{3}{6}$, $P(X = 3) = \frac{2}{6}$, $P(X = 5) = \frac{1}{6}$.

$$E(X) = 1 \times \frac{3}{6} + 3 \times \frac{2}{6} + 5 \times \frac{1}{6} = \frac{3+6+5}{6} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3} \approx 2,33.$$

En moyenne, on gagne $\frac{7}{3} \approx 2,33$ euros par tirage.

1SPE-VARALEA-EX-013

Corrigé

$$1. E(X) = (-2) \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{4} = -\frac{1}{2} + 0 + \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$2. E(X^2) = 4 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{2} + 9 \times \frac{1}{4} = 1 + 0 + \frac{9}{4} = \frac{13}{4}.$$

$$V(X) = \frac{13}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{13}{4} - \frac{1}{16} = \frac{52-1}{16} = \frac{51}{16}.$$

$$3. \sigma(X) = \sqrt{\frac{51}{16}} = \frac{\sqrt{51}}{4} \approx 1,79.$$

1SPE-VARALEA-EX-014

Corrigé

$$1. E(X^2) = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6}.$$

$$2. V(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182-147}{12} = \frac{35}{12}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1,71.$$

$$3. E(Y) = 2E(X) - 1 = 7 - 1 = 6. \quad V(Y) = 2^2 V(X) = 4 \times \frac{35}{12} = \frac{35}{3}.$$

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-015

$$1. E(X) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

2. $E(Y) = 10 \times \frac{1}{2} - 5 = 0$. Le jeu est équitable si la mise est $m = 5$ euros (car $Y = 10 - 5 = 5$ si Pile, $Y = 0 - 5 = -5$ si Face, et $E(Y) = 0$).

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-016

$$1. E(X) = 35 \times \frac{1}{37} + (-1) \times \frac{36}{37} = \frac{35-36}{37} = -\frac{1}{37} \approx -0,027.$$

2. $E(X) < 0$: le jeu est défavorable au joueur, favorable à la banque.

3. Sur 370 parties : perte moyenne = $370 \times \frac{1}{37} = 10$ euros.

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-017

$$1. E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 1.$$

$$E(X^2) = 0 + 1 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}.$$

$$V(X) = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}. \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71.$$

$$2. X = X_1 + X_2 \text{ avec } X_i \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2}), E(X_i) = \frac{1}{2}, V(X_i) = \frac{1}{4}.$$

$$E(X) = 2 \times \frac{1}{2} = 1. \quad V(X) = 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ (par indépendance). } \checkmark$$

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-018

$$1. E(X) = \frac{1 \times 1 + 2 \times 3 + 3 \times 5 + 4 \times 7 + 5 \times 9 + 6 \times 11}{36} = \frac{1+6+15+28+45+66}{36} = \frac{161}{36} \approx 4,47.$$

$$2. E(X^2) = \frac{1 \times 1 + 12 \times 45 + 112 \times 225 + 396}{36} = \frac{791}{36}.$$

$$V(X) = \frac{791}{36} - \left(\frac{161}{36}\right)^2 = \frac{791}{36} - \frac{25921}{1296} = \frac{28476-25921}{1296} = \frac{2555}{1296} \approx 1,97.$$

3. $E(X) \approx 4,47$: le maximum est en moyenne plus proche de 4,5, donc légèrement plus proche de 4 que de 5.

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-019

$$1. E(X) = 5 \times \frac{1}{3} + (-1) \times \frac{2}{3} = \frac{5-2}{3} = 1.$$

2. $E(X) = 1 > 0$: le jeu est favorable au joueur. En moyenne, il gagne 1 euro par partie.

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-020

$$1. E(Y) = 2E(X) + 1 = 2 \times 3 + 1 = 7.$$

$$2. V(Y) = 2^2 V(X) = 4 \times 2 = 8. \quad \sigma(Y) = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2,83.$$

$$3. E(Z) = -E(X) + 5 = -3 + 5 = 2. \quad V(Z) = (-1)^2 V(X) = 2.$$

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-021

$$1. \binom{6}{2} = \frac{6!}{2!4!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15.$$

$$2. \binom{6}{4} = \frac{6!}{4!2!} = 15.$$

3. $\binom{6}{0} = 1$.

4. $\binom{6}{6} = 1$.

5. $\binom{6}{2} = \binom{6}{6-2} = \binom{6}{4} = 15.$ ✓

Corrigé

1. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli ($p = \frac{1}{2}$), les 5 lancers sont indépendants, X compte le nombre de succès : $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$.

$$2. P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$$

$$\mathbf{3.} P(X = 0) = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}. \quad P(X = 5) = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}.$$

Corrigé

$$1. P(X = 0) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296}.$$

$$2. P(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 6 \times \frac{1}{36} \times \frac{25}{36} = \frac{150}{1296} = \frac{25}{216}.$$

3. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296}$.

Corrigé

1. Chaque question est une épreuve de Bernoulli ($p = \frac{1}{4}$), les 10 réponses sont indépendantes.
 $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$.

$$2. P(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^{10} = \frac{59049}{1048576} \approx 0,056.$$

$$\mathbf{3.} P(X = 5) = \binom{10}{5} \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 = 252 \times \frac{243}{1048576} = \frac{61236}{1048576} \approx 0,058.$$

4. $E(\text{note}) = 2E(X) = 2 \times 10 \times \frac{1}{4} = 5$ sur 20.

Corrigé

1.

$$\begin{array}{ccccccc} n=0: & & & & & & 1 \\ n=1: & & & & & 1 & \\ n=2: & 1 & & & 2 & & 1 \\ n=3: & 1 & 3 & & & 3 & 1 \\ n=4: & 1 & 4 & 6 & & 4 & 1 \\ n=5: & 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \end{array}$$

2. $\binom{3}{1} + \binom{3}{2} = 3 + 3 = 6 = \binom{4}{2}$. ✓

Corrigé

1. La production est supposée assez grande pour que les tirages soient indépendants. Chaque pièce est défectueuse avec $p = 0,05$. Donc $X \sim \mathcal{B}(10, 0,05)$.

2. $P(X = 0) = (0,95)^{10} \approx 0,599$.

3. $P(X = 1) = \binom{10}{1}(0,05)(0,95)^9 = 10 \times 0,05 \times (0,95)^9 \approx 0,315$.

4. $P(X \leq 1) \approx 0,599 + 0,315 = 0,914$. Il y a environ 91,4 % de chances d'avoir au plus une pièce défectueuse dans l'échantillon.

Corrigé

- $P(X = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^8 = \frac{256}{6561} \approx 0,039.$
 $P(X = 1) = 8 \times \frac{1}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^7 = \frac{8 \times 128}{6561} = \frac{1024}{6561} \approx 0,156.$
 $P(X = 2) = 28 \times \frac{1}{9} \times \frac{64}{729} = \frac{1792}{6561} \approx 0,273.$
 $P(X = 3) = 56 \times \frac{1}{27} \times \frac{32}{243} = \frac{1792}{6561} \approx 0,273.$
- $P(X \leq 2) = \frac{256+1024+1792}{6561} = \frac{3072}{6561} \approx 0,468.$
- $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) \approx 0,532.$

Corrigé

- $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!}.$
 $= \frac{(n-1)! \cdot k + (n-1)! \cdot (n-k)}{k!(n-k)!} = \frac{(n-1)! \cdot n}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$
- Par la formule du binôme de Newton avec $a = b = 1$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k \cdot 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n.$
- Pour $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$: $\sum_{k=0}^n P(X = k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \frac{2^n}{2^n} = 1. \checkmark$

Corrigé

1.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	0,7	0,3

$$2. E(X) = 0,3. \quad V(X) = 0,3 \times 0,7 = 0,21.$$

Corrigé

1.

k	0	1	2	3
$P(X = k)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

2. Diagramme en bâtons : un bâton de hauteur $\frac{1}{8}$ en $k = 0$ et $k = 3$, de hauteur $\frac{3}{8}$ en $k = 1$ et $k = 2$.

$$3. E(X) = 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{3}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = \frac{0+3+6+3}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}.$$

$$np = 3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}. \checkmark$$

Corrigé

- $E(X) = np = 10 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{2}.$
- $V(X) = np(1-p) = 10 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{30}{16} = \frac{15}{8}.$
 $\sigma(X) = \sqrt{\frac{15}{8}} \approx 1,37.$

Corrigé

$$E(X) = 20 \times 0,2 = 4. \quad V(X) = 20 \times 0,2 \times 0,8 = 3,2. \quad \sigma(X) = \sqrt{3,2} \approx 1,79.$$

Corrigé

$$1-p = V(X)/E(X).$$

$$1 - p = \frac{V(X)}{E(X)} = \frac{4,2}{6} = 0,7, \text{ donc } p = 0,3.$$

$$n = \frac{E(X)}{p} = \frac{6}{0,3} = 20.$$

$$\text{Vérification : } E(X) = 20 \times 0,3 = 6 \checkmark \quad V(X) = 20 \times 0,3 \times 0,7 = 4,2 \checkmark.$$

1SPE-VARALEA-EX-034

Corrigé

$$1 - p = \frac{6,4}{8} = 0,8, \text{ donc } p = 0,2.$$

$$n = \frac{8}{0,2} = 40.$$

$$\text{Vérification : } 40 \times 0,2 = 8 \checkmark \quad 40 \times 0,2 \times 0,8 = 6,4 \checkmark.$$

1SPE-VARALEA-EX-035

Corrigé

$$1. k \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

$$2. E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{(n-1)-j} = np(p+1-p)^{n-1} = np.$$

$$3. E(X) = \sum_{k=0}^4 k \binom{4}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{4-k} \\ = 0 + 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{8}{27} \times 4 \dots$$

$$\text{Par la formule : } E(X) = 4 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}. \checkmark$$

1SPE-VARALEA-EX-036

Corrigé

$$1. X \sim \mathcal{B}(100, \frac{1}{2}).$$

$$2. E(X) = 100 \times \frac{1}{2} = 50.$$

$$3. V(X) = 100 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 25, \text{ donc } \sigma(X) = 5.$$

1SPE-VARALEA-EX-037

Corrigé

$$1. E(X) = 50 \times 0,4 = 20. \quad E(Y) = 100 \times 0,2 = 20. \text{ Mêmes espérances.}$$

$$2. V(X) = 50 \times 0,4 \times 0,6 = 12. \quad V(Y) = 100 \times 0,2 \times 0,8 = 16.$$

$$3. \sigma(X) = \sqrt{12} \approx 3,46 \text{ et } \sigma(Y) = 4. X \text{ est plus concentrée } (\sigma \text{ plus petit}).$$

1SPE-VARALEA-EX-038

Corrigé

$$1. E[X(X-1)] = \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

$$\text{En utilisant } k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2}, \text{ on obtient :}$$

$$E[X(X-1)] = n(n-1)p^2 \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} p^j (1-p)^{(n-2)-j} = n(n-1)p^2.$$

$$2. E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X) = n(n-1)p^2 + np.$$

$$3. V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np[(n-1)p + 1 - np] = np(1-p).$$

$$4. V(X) = 5 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{9} \approx 1,11. \checkmark$$

1SPE-VARALEA-EX-039

Corrigé

$$1. E(X) = np = 1 \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5} = p. \checkmark$$

$$2. V(X) = np(1-p) = 1 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25}. \checkmark$$

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-040

- $X \sim \mathcal{B}(50, 0,1)$.
- $E(X) = 50 \times 0,1 = 5$. $V(X) = 50 \times 0,1 \times 0,9 = 4,5$. $\sigma(X) = \sqrt{4,5} \approx 2,12$.
- En moyenne, on trouve 5 pièces défectueuses.

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-041

- $G = 7 - 2 = 5$ si 6 (prob. $\frac{1}{6}$), $G = 0 - 2 = -2$ sinon (prob. $\frac{5}{6}$).

g_i	-2	5
$P(G = g_i)$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$2. E(G) = 5 \times \frac{1}{6} + (-2) \times \frac{5}{6} = \frac{5-10}{6} = -\frac{5}{6} \approx -0,83.$$

$E(G) < 0$: le jeu est défavorable au joueur.

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-042

- Pas de sinistre : $B = 40$ (prob. $\frac{19}{20}$). Sinistre : $B = 40 - 500 = -460$ (prob. $\frac{1}{20}$).

b_i	-460	40
$P(B = b_i)$	$\frac{1}{20}$	$\frac{19}{20}$

2. $E(B) = 40 - 500 \times \frac{1}{20} = 40 - 25 = 15$. Le contrat est rentable : l'assureur gagne en moyenne 15 euros par contrat.

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-043

- Doubles : $(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)$, soit 6 sur 36 : $P = \frac{1}{6}$.
- $E(G) = (18 - m) \times \frac{1}{6} + (-m) \times \frac{5}{6} = \frac{18-m-5m}{6} = \frac{18-6m}{6} = 3 - m$.
- $E(G) = 0 \Leftrightarrow 3 - m = 0 \Leftrightarrow m = 3$ euros.

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-044

- $X \sim \mathcal{B}(5, 0,03)$.
- $P(\text{accepté}) = P(X = 0) = (0,97)^5 \approx 0,859$.
- $P(\text{refusé}) = 1 - (0,97)^5 \approx 0,141$, soit environ 14,1 %.

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-045

1.

g_i	-2	3
$P(G = g_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$$2. E(G) = 3 \times \frac{1}{2} + (-2) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \text{ Jeu favorable } (E(G) > 0).$$

3. Gain total moyen : $100 \times \frac{1}{2} = 50$ euros.

Corrigé

1SPE-VARALEA-EX-046

- $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{6})$.

2.

k	0	1	2	3
$G = 10k - 5$	-5	5	15	25
P	$\frac{125}{216}$	$\frac{75}{216}$	$\frac{15}{216}$	$\frac{1}{216}$

3. $E(G) = 10E(X) - 5 = 10 \times \frac{1}{2} - 5 = 0$. Le jeu est équitable.

4. $V(G) = 100V(X) = 100 \times \frac{5}{12} = \frac{500}{12} = \frac{125}{3} \approx 41,7$. $\sigma(G) \approx 6,45$ euros.

1SPE-VARALEA-EX-047

Corrigé

1. $E(B) = c - 5000 \times \frac{1}{50} = c - 100 \geq 0 \Leftrightarrow c \geq 100$ euros.

2. Bénéfice moyen = $1000 \times 150 - 5000 \times 1000 \times \frac{1}{50} = 150\,000 - 100\,000 = 50\,000$ euros.

1SPE-VARALEA-EX-048

Corrigé

1. $G = 8000$ si succès ($p = 0,6$), $G = -10000$ si échec ($p = 0,4$).

2. $E(G) = 8000 \times 0,6 + (-10000) \times 0,4 = 4800 - 4000 = 800$ euros. L'investissement est intéressant en moyenne.

3. $E(G^2) = 64\,000\,000 \times 0,6 + 100\,000\,000 \times 0,4 = 38\,400\,000 + 40\,000\,000 = 78\,400\,000$.

$V(G) = 78\,400\,000 - 640\,000 = 77\,760\,000$. $\sigma(G) \approx 8\,818$ euros. Le risque est élevé.

4. Avec 5 projets à 2000 euros : gain par projet = 1600 (succès) ou -2000 (échec). $E = 5 \times 160 = 800$ euros (même espérance). Mais $\sigma \approx 3946$ euros (divisé par $\sqrt{5}$ environ) : le risque est réduit par la diversification.

1SPE-VARALEA-EX-049

Corrigé

1. Chaque vaccination est une épreuve de Bernoulli ($p = 0,9$), les 8 sont indépendantes : $X \sim \mathcal{B}(8, 0,9)$.

2. $P(X = 8) = (0,9)^8 \approx 0,430$.

3. $E(X) = 8 \times 0,9 = 7,2$ personnes protégées en moyenne.

1SPE-VARALEA-EX-050

Corrigé

1. $P(R) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$.

2. $G = 4 - 1 = 3$ si rouge ($P = \frac{2}{5}$), $G = -1$ si bleue ($P = \frac{3}{5}$).

g_i	-1	3
$P(G = g_i)$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$

3. $E(G) = 3 \times \frac{2}{5} + (-1) \times \frac{3}{5} = \frac{6-3}{5} = \frac{3}{5} = 0,6$. Le jeu est favorable ($E(G) > 0$).

4. Urne A : $E_A = 3 \times \frac{3}{5} + (-1) \times \frac{2}{5} = \frac{7}{5} = 1,4$. Urne B : $E_B = 3 \times \frac{1}{5} + (-1) \times \frac{4}{5} = -\frac{1}{5}$. Choisir l'urne A.

Formulaire

Dérivées des fonctions de référence

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Ensemble de dérivabilité
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
x^3	$3x^2$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$

Règles de dérivation

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$$

$$(ku)' = ku'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Second degré

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et $\Delta = b^2 - 4ac$.

$$\text{Sommet : } x_S = -\frac{b}{2a}, \quad f(x_S) = -\frac{\Delta}{4a}$$

$$\Delta > 0 : \quad x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 0 : \quad x_0 = -\frac{b}{2a}$$

$$\Delta < 0 : \quad \text{pas de racine réelle}$$

Forme factorisée ($\Delta > 0$) : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Forme canonique : $f(x) = a(x - x_S)^2 + f(x_S)$.

Suites arithmétiques et géométriques

	Suite arithmétique	Suite géométrique
Définition	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \cdot u_n$
Terme général	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \cdot q^n$
Somme des termes	$S = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}$	$S = u_0 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$

Fonction exponentielle

$$\begin{aligned}
 e^0 &= 1 & e^{a+b} &= e^a \cdot e^b \\
 e^{-a} &= \frac{1}{e^a} & e^{a-b} &= \frac{e^a}{e^b} \\
 (e^a)^n &= e^{na} & (e^x)' &= e^x \\
 (e^u)' &= u' e^u
 \end{aligned}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R} : e^x > 0$.

Trigonométrie — Valeurs remarquables

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Identité fondamentale : $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

Probabilités

Probabilité conditionnelle :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0.$$

Formule des probabilités totales (partition $A_1, \dots, A_n$) :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P_{A_i}(B).$$

Indépendance : A et B sont indépendants si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Coefficients binomiaux

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

Formule de Pascal :

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Loi binomiale $X \sim \mathcal{B}(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p).$$

Mémo Python

Ce mémo regroupe les instructions Python utilisées dans les exercices d'algorithmique du manuel.

Types et opérations de base

```
x = 3          # affectation d'un entier
y = 2.5        # nombre à virgule flottante
s = "texte"    # chaîne de caractères
x + y          # addition
x * y          # multiplication
x ** 2         # puissance (x²)
x // 3         # quotient entier
x % 3          # reste de la division euclidienne
```

Affichage

```
print(x)        # affiche la valeur de x
print("Résultat :", x) # affiche du texte suivi de la valeur
print(f"x vaut {x}") # f-string (mise en forme)
```

Structures conditionnelles

```
if condition:
    instruction_1
elif autre_condition:
    instruction_2
else:
    instruction_3
```

Boucles

```
# Boucle for : répéter un nombre connu de fois
for i in range(n):          # i parcourt 0, 1, ..., n-1
    instruction

for i in range(a, b):       # i parcourt a, a+1, ..., b-1

# Boucle while : répéter tant qu'une condition est vraie
while condition:
    instruction
```

Fonctions

```
def nom_fonction(parametre_1, parametre_2):
    """Description de la fonction."""
```

```

    resultat = parametre_1 + parametre_2
    return resultat

# Appel
valeur = nom_fonction(3, 5)

```

Listes

```

L = [1, 4, 9, 16]          # définition d'une liste
L[0]                      # premier élément (indice 0)
len(L)                    # nombre d'éléments
L.append(25)               # ajouter un élément en fin de liste

# Construction par compréhension
carres = [i**2 for i in range(1, 11)]

```

Modules utilisés dans le manuel

```

import math
math.sqrt(2)              # racine carrée
math.pi                   # valeur de pi
math.exp(1)               # exponentielle
math.log(x)               # logarithme népérien
math.factorial(n)         # factorielle

import random
random.random()            # nombre aléatoire dans [0, 1[
random.randint(a, b)       # entier aléatoire dans [a, b]

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(x, y)             # tracer une courbe
plt.scatter(x, y)          # nuage de points
plt.xlabel("x")            # légende axe des abscisses
plt.ylabel("y")           # légende axe des ordonnées
plt.title("Titre")        # titre du graphique
plt.grid()                 # afficher la grille
plt.show()                # afficher la figure

```