

MATHÉMATIQUES

Première spécialité

Un manuel structuré pour apprendre, s'entraîner, se tester et progresser, avec une progression claire, des méthodes explicites et des ressources de remédiation.

Avant-propos

Ce manuel de mathématiques de première spécialité a été pensé comme un outil cohérent, progressif et autonome. Il accompagne l'élève du repérage des notions à la maîtrise des compétences attendues, en articulant cours, méthodes, exercices, auto-évaluation et remédiation.

Chaque chapitre suit un parcours pédagogique en **9 temps** : une situation d'ouverture, un diagnostic, un cours structuré, des méthodes, des exercices gradués, une auto-évaluation et des ressources de remédiation. Cette progression vise à rendre l'apprentissage visible et à aider chaque élève à avancer à son rythme.

Trois parcours de difficulté permettent à chacun de travailler à son niveau :

- ▶ ♦ — exercices guidés, avec coups de pouce ;
- ▶ ♦♦ — exercices de niveau baccalauréat ;
- ▶ ♦♦♦ — exercices de recherche et d'approfondissement.

Le manuel intègre aussi des outils de suivi : QCM diagnostique, évaluations A et B, grilles de compétences, fiches de remédiation, et renvois explicites vers les méthodes et exercices utiles. Cette structure a pour ambition d'aider l'élève à identifier précisément ce qu'il sait faire et ce qu'il doit encore travailler.

L'objectif final est simple : proposer un manuel clair, robuste et lisible, capable de soutenir à la fois l'apprentissage en classe et la préparation à l'évaluation.

ewpage

Mode d'emploi

Chaque chapitre du manuel suit un parcours en **9 temps**, conçu pour accompagner l'apprentissage de la découverte jusqu'à l'évaluation.

Astuce de lecture : commencez par l'ouverture, puis le cours, puis les méthodes, avant de passer aux exercices et à l'auto-évaluation.

Les 9 temps du chapitre

T1 — Situation d'ouverture Une situation concrète qui introduit la notion du chapitre. Elle motive la suite du travail et permet d'entrer dans la notion sans besoin de prérequis spécifiques.

T2 — QCM diagnostique Il évalue les prérequis nécessaires au chapitre. Le résultat oriente l'élève vers une remédiation ciblée si besoin.

T3 — Cours Le cours est structuré en trois niveaux :

- ▶ **L'essentiel** — définitions, propriétés et théorèmes à connaître ;
- ▶ **Démonstrations** — preuves au programme, présentées de façon détaillée ;
- ▶ **Approfondissement** * — compléments hors programme strict, pour aller plus loin.

T4 — Méthodes Chaque méthode suit un schéma fixe :

1. **Pas à pas** — démarche générale ;
2. **Exemple résolu** — application complète ;
3. **Pièges à éviter** — erreurs fréquentes à repérer.

T5 — Exercices Les exercices sont répartis en trois parcours :

- ▶ ♦ — parcours guidé ;
- ▶ ♦♦ — parcours de niveau baccalauréat ;
- ▶ ♦♦♦ — parcours de recherche et d'approfondissement.

T6 — Coups de pouce (CDP) Pour chaque exercice du premier parcours, un coup de pouce est proposé en fin de chapitre. Il donne une piste sans révéler la solution complète.

T7 — Auto-évaluation et remédiation Une grille de compétences permet de situer son niveau sur chaque capacité du chapitre. Les renvois vers les méthodes et exercices ciblés aident à réparer les difficultés repérées.

T8 — Évaluation Deux sujets d'évaluation (versions A et B) de difficulté comparable permettent un usage en classe ou en autonomie.

T9 — Fil rouge (TD) Un travail dirigé qui traverse plusieurs notions du chapitre dans un contexte appliqué. Il constitue une tâche complexe mobilisant l'ensemble des compétences.

Les symboles utilisés

Symbole	Signification
♦	Exercice guidé (parcours accompagné)
♦♦	Exercice de niveau baccalauréat
♦♦♦	Exercice de recherche / approfondissement
*	Contenu d'approfondissement (hors programme strict)
CDP	Coup de pouce disponible (voir T6)

Le système CDP (Coups de Pouce)

Les exercices du parcours ♦ portant la mention **CDP** disposent d'un coup de pouce regroupé en fin de chapitre. Le fonctionnement est le suivant :

1. Lire l'énoncé et tenter l'exercice sans aide.
2. En cas de blocage, consulter le coup de pouce correspondant.
3. Le coup de pouce fournit une piste, mais jamais la solution complète.
4. Reprendre l'exercice avec cette indication.

Ce dispositif favorise l'autonomie : l'élève apprend à identifier précisément sa difficulté avant de chercher de l'aide.

Sommaire

0	Avant-propos	3
0	Mode d'emploi	5
0	Plan du manuel	11
1	Suites numériques	12
	1.1 Généralités sur les suites	16
	1.2 Suites arithmétiques	17
	1.3 Suites géométriques	19
2	Fonctions polynômes du second degré	136
	2.1 Les trois formes du trinôme	141
	2.2 Parabole et variations	143
	2.3 Discriminant et équations	144
	2.4 Factorisation et signe	146
	2.5 Inéquations du second degré	147
	2.6 Modélisation et optimisation	148
3	Dérivation : point de vue local	238
	3.1 Taux de variation et sécantes	241
	3.2 Du taux de variation au nombre dérivé	242
	3.3 Lire et construire une tangente	243
	3.4 Équation de la tangente	244
	3.5 Approximation linéaire	245
4	Dérivation : applications aux variations	293
	4.1 Dérivées des fonctions de référence	295
	4.2 Règles de dérivation	297
	4.3 Fonctions paires et fonctions impaires	298
	4.4 Signe de la dérivée et sens de variation	299
	4.5 Extremums d'une fonction	301
	4.6 Optimisation par la dérivation	303
5	Fonction exponentielle	362
	5.1 Définition de la fonction exponentielle	364
	5.2 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle	365

5.3	Signe, variations et courbe de la fonction exponentielle	367
5.4	Dérivée de $t \mapsto e^{at}$	368
5.5	Croissances et décroissances exponentielles	368
5.6	Algorithmes — Construire et approcher l'exponentielle	369

6 Trigonométrie 416

6.1	Cercle trigonométrique et angles	418
6.2	Cosinus, sinus et valeurs	419

7 Produit scalaire 444

7.1	Produit scalaire de deux vecteurs	447
7.2	Propriétés du produit scalaire	448
7.3	Orthogonalité et calcul d'angles	449
7.4	Applications géométriques	450
7.5	Formule d'Al-Kashi	451

8 Géométrie repérée 483

8.1	Équation cartésienne d'une droite	487
8.2	Vecteur normal à une droite	488
8.3	Équation d'un cercle	490
8.4	Positions relatives de droites et de cercles	491
8.4.1	Positions relatives de deux droites	491
8.4.2	Distance d'un point à une droite	492
8.4.3	Positions relatives d'une droite et d'un cercle	492
8.5	Problèmes géométriques dans un repère orthonormé	493

9 Probabilités conditionnelles et indépendance 523

9.1	Probabilité conditionnelle	526
9.2	Arbre pondéré	527
9.3	Probabilités totales	528
9.4	Indépendance de deux événements	529
9.5	Problèmes contextuels	530
9.6	Algorithmique : une méthode de Monte-Carlo	531

10 Variables aléatoires 564

10.1	Loi de probabilité d'une variable discrète	569
10.2	Espérance, variance et écart type	570
10.3	Répéter une épreuve de Bernoulli avec un arbre	571
10.4	Transformer une variable aléatoire	573
10.5	Problèmes contextuels	574

10.6 Algorithmique et expérimentations sur une variable aléatoire	575
10.6.1 Calculer l'espérance, la variance et l'écart type	575
10.6.2 Comparer les fréquences des lettres de deux textes	575
10.6.3 Simuler une variable aléatoire finie	576
10.6.4 Écrire une fonction renvoyant la moyenne d'un échantillon	576
10.6.5 Étudier la distance entre moyenne et espérance	577
10.6.6 Simuler N échantillons et tester la borne à 2σ	578

 Formulaire	617
---	------------

 Mémo Python	621
--	------------

Plan du manuel et navigation

Ce manuel peut se lire de façon linéaire, mais il offre aussi des repères utiles pour retrouver rapidement un chapitre, une méthode ou un type d'exercice.

Parcours de lecture

- ▶ **Comprendre** : ouvrir le chapitre, lire la situation d'ouverture, puis le cours.
- ▶ **Apprendre** : travailler les méthodes et les exemples résolus.
- ▶ **S'entraîner** : résoudre les exercices du parcours guidé, puis les exercices de niveau baccalauréat.
- ▶ **Vérifier** : utiliser l'auto-évaluation et les évaluations A/B.
- ▶ **Corriger** : revenir aux méthodes et aux ressources de remédiation si nécessaire.

Les chapitres du manuel

- 1. Suites** Étude des suites arithmétiques et géométriques, des raisonnements récurrents et des raisonnements de convergence.
- 2. Second degré** Résolution d'équations et d'inéquations, étude du signe et mise en forme canonique.
- 3. Dérivation locale** Nombre dérivé, tangente et variation locale.
- 4. Dérivation globale** Étude des fonctions, extremum, convexité et comportement global.
- 5. Exponentielle** Propriétés de la fonction exponentielle et de ses applications.
- 6. Trigonométrie** Cercle trigonométrique, valeurs remarquables et fonctions trigonométriques.
- 7. Produit scalaire** Géométrie vectorielle, orthogonalité et calculs de longueurs.
- 8. Géométrie repérée** Coordonnées, droites, parallélisme et orthogonalité dans le plan.
- 9. Probabilités conditionnelles** Probabilités, conditionnement, indépendance et tableaux.
- 10. Variables aléatoires** Lois, espérance, variance et applications.

Repères utiles

- ▶ Le **formulaire** récapitule les résultats essentiels à connaître.
- ▶ Les **méthodes** proposent des démarches pas à pas.
- ▶ Les **coups de pouce** accompagnent les exercices guidés.
- ▶ Les **évaluations A/B** permettent de vérifier les acquis.

1

CHAPITRE 1

Suites numériques

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer les termes d'une suite (explicite/réurrence), à la main et en Python.
- ▶ C2 — Je sais montrer qu'une suite est arithmétique et exprimer son terme général.
- ▶ C3 — Je sais montrer qu'une suite est géométrique et exprimer son terme général.
- ▶ C4 — Je sais calculer la somme des premiers entiers et d'une suite géométrique.
- ▶ C5 — Je sais étudier le sens de variation d'une suite par la méthode adaptée.
- ▶ C6 — Je sais modéliser une situation concrète par une suite.
- ▶ C7 — Je sais écrire et lire un programme Python (terme, somme, seuil).
- ▶ C8 — Je sais reconnaître intuitivement une limite finie, une limite infinie ou une absence de limite, sans formalisation.

🕒 À RETENIR

Deux offres d'épargne : versement fixe mensuel (modèle linéaire) contre intérêts composés (modèle exponentiel). À partir de quand la seconde dépasse-t-elle la première ? Résolue au TD fil rouge avec les outils du chapitre (C2, C3, C6, C7).

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 11 h ♦♦♦ 10 h

Contrat du chapitre

Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Calculer les termes d'une suite définie par une formule explicite ou par récurrence, à la main et en Python.
- C2 Montrer qu'une suite est arithmétique et exprimer son terme général u_n en fonction de n .
- C3 Montrer qu'une suite est géométrique et exprimer son terme général u_n en fonction de n .
- C4 Calculer la somme des n premiers entiers et la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.
- C5 Étudier le sens de variation d'une suite en choisissant la méthode adaptée (signe de $u_{n+1} - u_n$, rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$, comparaison à une fonction).
- C6 Modéliser une situation concrète par une suite arithmétique ou géométrique et répondre à des questions de la vie courante.
- C7 Écrire et lire un programme Python calculant un terme, une somme ou un seuil de dépassement.
- C8 Reconnaître intuitivement, sur des exemples, une limite finie, une limite infinie ou une absence de limite, sans formalisation.

Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Calcul littéral** — développer, factoriser, réduire des expressions algébriques.
- R2 **Pourcentages** — coefficient multiplicateur, évolutions successives, taux global.
- R3 **Fonctions** — calculer une image, chercher un antécédent, lire un tableau de valeurs.
- R4 **Inégalités** — signe d'une expression, résolution d'inégalités simples.
- R5 **Python** — variable, boucle for, affichage d'un résultat.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

Temps de travail estimé

- ▶ Parcours ◆ (Consolidation) : environ **14 h**.
- ▶ Parcours ◆◆ (Maîtrise) : environ **11 h**.
- ▶ Parcours ◆◆◆ (Approfondissement) : environ **10 h**.

Situation d'accroche — Deux offres d'épargne

Un établissement bancaire propose deux formules d'épargne :

- ▶ **Offre A (versement fixe)** : on dépose 200 € par mois sur un livret initialement vide et sans intérêts.
- ▶ **Offre B (intérêts composés)** : un capital initial de 1 000 € est placé au taux mensuel de 0,4 %.
- ▶ Calcule les capitaux obtenus après 1, 2, 3 et 4 mois pour chaque offre.
- ▶ À quel moment l'offre A rattrape-t-elle d'abord l'offre B ?
- ▶ Beaucoup plus tard, quand l'offre B reprend-elle ensuite l'avantage ? Peux-tu le déterminer sans écrire tous les termes à la main ?

Cette situation sera entièrement résolue au Temps 7 (TD fil rouge), avec les outils du chapitre et un programme Python calculant le seuil de dépassement.

Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

R1 — Calcul littéral

1. Développe et réduis $(3x - 2)(x + 5)$.
2. Factorise $4x^2 - 9$.

R2 — Pourcentages

3. Le prix d'un article baisse de 15 %. Quel est le coefficient multiplicateur correspondant à cette évolution ?
4. Un capital de 2000 € subit deux évolutions successives : +5 % puis -5 %. Quel est le capital final ? Est-ce le même qu'après une évolution globale de 0 % ? Justifie.

R3 — Fonctions

5. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 5$. Calcule $f(3)$.
6. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x + 1$. Détermine l'antécédent de 7 par g .

R4 — Inégalités

7. Étudie le signe de $(x - 1)(x + 3)$ pour $x = 4$, puis pour $x = -2$.
8. Pour quelles valeurs de x a-t-on $-2x + 6 < 0$?

R5 — Python

9. On exécute le programme suivant :

```
s = 0
for k in range(1, 5):
    s = s + k
print(s)
```

Quelle valeur est affichée ? Explique le rôle de la variable s .

10. On exécute le programme suivant :

```
u = 3
for i in range(4):
    u = 2 * u + 1
print(u)
```

Complète le tableau de valeurs en suivant l'exécution pas à pas, puis indique la valeur affichée.

Valeur de i	Valeur de u après la ligne $u = 2*u+1$
0	
1	
2	
3	

Grille de décodage

Reporte tes résultats dans ce tableau, puis suis les conseils de remédiation avant de commencer le cours.

Questions	Prérequis testé	Si tu as échoué...	Fiche à lire
1 et 2	R1 — Calcul littéral	... avant de commencer C1	Fiche R1
3 et 4	R2 — Pourcentages	... avant de commencer C3, C6	Fiche R2
5 et 6	R3 — Fonctions	... avant de commencer C1, C5	Fiche R3
7 et 8	R4 — Inégalités	... avant de commencer C5	Fiche R4
9 et 10	R5 — Python	... avant de commencer C7	Fiche R5

Si tu as réussi toutes les questions sans difficulté, tu peux démarrer directement le Temps 3.

1.1 Généralités sur les suites

DÉFINITION 1

Une **suite numérique** est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur une partie de $\mathbb{N}$) à valeurs dans $\mathbb{R}$.

On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite, et u_n le terme de rang n (auss appelé terme d'indice n).

EXEMPLE La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = 2n + 1$ associe à chaque entier naturel n un réel. On calcule : $u_0 = 1, u_1 = 3, u_2 = 5, u_3 = 7$. Il s'agit bien d'une suite numérique.

⚠ CONTRE-EXEMPLE L'expression $u_n = \sqrt{-n}$ ne définit pas une suite numérique sur $\mathbb{N}$, car $\sqrt{-n}$ n'est pas un réel pour $n \geq 1$.

DÉFINITION 2

Une suite (u_n) est définie par **formule explicite** (ou **terme général**) lorsqu'il existe une fonction f telle que

$$u_n = f(n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

On obtient directement u_n à partir de n , sans calculer les termes précédents.

EXEMPLE La suite (v_n) définie par $v_n = n^2 - 3n + 2$ est donnée par formule explicite. On calcule : $v_0 = 2, v_1 = 0, v_2 = 0, v_5 = 12$. Aucun terme précédent n'est nécessaire pour calculer v_5 .

⚠ CONTRE-EXEMPLE La suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n$ n'est pas donnée par formule explicite : si l'on utilise uniquement la relation de récurrence donnée, on calcule successivement u_1, u_2 , puis u_3 à partir de u_0 .

DÉFINITION 3

Une suite (u_n) est définie par **relation de récurrence** lorsqu'on dispose :

- ▶ d'un (ou plusieurs) terme(s) initial/initiaux, par exemple u_0 ,
- ▶ d'une relation de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$ permettant de calculer chaque terme à partir du précédent.

EXEMPLE Soit la suite (w_n) définie par $w_0 = 3$ et $w_{n+1} = \frac{w_n}{2} + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On calcule : $w_1 = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$, puis $w_2 = \frac{5/2}{2} + 1 = \frac{9}{4}$.

Chaque terme dépend du précédent : si l'on utilise uniquement la relation de récurrence donnée, le calcul de w_{10} passe par $w_1, \dots, w_9$. Une formule explicite éventuellement établie par ailleurs permettrait un calcul direct.

⚠ CONTRE-EXEMPLE La suite $u_n = 3 \times 2^n$ est donnée par formule explicite. Bien qu'on puisse écrire $u_{n+1} = 2u_n$, ce n'est *pas* sa définition première : elle n'a pas besoin d'un terme initial séparé car la formule 3×2^n suffit à calculer directement tout terme.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confusion notation algorithmique / notation mathématique.

En Python, on écrit souvent $u = f(n)$ avec n comme variable de boucle. Cela correspond bien à $u_n = f(n)$. La notation fonctionnelle $u(n)$ est mathématiquement correcte puisque toute suite est une fonction définie sur une partie de $\mathbb{N}$. Dans ce manuel et dans les copies, on privilégie la notation usuelle u_n afin de distinguer immédiatement les suites des fonctions de variable réelle.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Erreur d'indice : confondre formule explicite et récurrence.

Si (u_n) est définie par récurrence par $u_{n+1} = 2u_n + 3$ et $u_0 = 1$, certains élèves calculent u_1 en remplaçant n par 1 dans la relation, ce qui donne $u_2 = 2u_1 + 3$, et non u_1 .

Méthode correcte : pour obtenir u_1 , on remplace n par 0 dans $u_{n+1} = 2u_n + 3$, ce qui donne $u_1 = 2u_0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5$.

Pour obtenir u_2 , on remplace n par 1 : $u_2 = 2u_1 + 3 = 13$.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Suites définies par plusieurs relations.

Certaines suites utilisent deux relations de récurrence selon la parité de la valeur du terme courant. Par exemple, pour un entier strictement positif a :

$$u_0 = a, \quad u_{n+1} = \begin{cases} \frac{u_n}{2} & \text{si } u_n \text{ est pair,} \\ 3u_n + 1 & \text{si } u_n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Les trajectoires ainsi obtenues sont appelées *suites de Syracuse*. La conjecture de Collatz affirme que, quel que soit l'entier initial $a > 0$, la trajectoire atteint le cycle 1, 4, 2. Cette affirmation n'est pas démontrée en général ; pour $a = 1$, ce comportement est directement vérifié.

Sans formule explicite connue.

Une relation de récurrence définit une suite même si aucune formule explicite n'est donnée. On peut alors calculer ses termes successifs à la main ou avec un programme, construire un tableau de valeurs et observer leur évolution. Il n'est donc pas nécessaire de connaître une expression $u_n = f(n)$ pour étudier des exemples de suites en Première.

1.2 Suites arithmétiques

DÉFINITION 4

Une suite (u_n) est dite **arithmétique** s'il existe un réel r , appelé **raison**, tel que

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Autrement dit, on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même réel r .

EXEMPLE La suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 5$ est arithmétique de raison $r = 5$.

On calcule : $u_0 = 2, u_1 = 7, u_2 = 12, u_3 = 17$.

On vérifie bien que $u_{n+1} - u_n = 5$ pour chaque terme calculé.

⚠ CONTRE-EXEMPLE La suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n$ n'est pas arithmétique : $v_1 - v_0 = 2 - 1 = 1$ mais $v_2 - v_1 = 4 - 2 = 2$. La différence entre deux termes consécutifs n'est pas constante.

◆ PROPRIÉTÉ 1 Si (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r , alors pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + n \cdot r.$$

Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p + (n - p) \cdot r.$$

Cette formule s'appelle la **formule explicite** (ou terme général) de la suite arithmétique.

EXEMPLE Soit (u_n) arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = -4$.

Formule explicite : $u_n = -4 + 3n$.

On calcule directement : $u_{10} = -4 + 3 \times 10 = 26$, sans passer par les termes intermédiaires.

Si on connaît $u_3 = 5$ et $r = 3$, on peut aussi écrire $u_n = 5 + (n - 3) \times 3 = 3n - 4$, ce qui donne bien le même résultat.

⚠ CONTRE-EXEMPLE La suite (w_n) définie par $w_n = n^2$ n'est pas arithmétique : $w_2 - w_1 = 3$ mais $w_3 - w_2 = 5$. Bien que w_n soit une formule explicite, la différence de deux termes consécutifs n'est pas constante.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confusion entre relation de récurrence et formule explicite.

La relation $u_{n+1} = u_n + r$ est la *définition par récurrence* : elle dit comment passer d'un terme au suivant.

La formule $u_n = u_0 + nr$ est la *formule explicite* : elle donne directement u_n en fonction de n .

Ces deux relations ne jouent pas le même rôle. En particulier, pour calculer u_{100} , on utilise $u_{100} = u_0 + 100r$ (formule explicite), et *non* en appliquant cent fois la récurrence.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Représentation graphique : les points ne sont pas reliés.

Les termes d'une suite arithmétique, représentés dans le repère par les points de coordonnées $(n; u_n)$, sont alignés (ils appartiennent tous à la droite d'équation $y = rn + u_0$). Cependant, ces points sont *isolés* : on ne trace pas la droite continue, car une suite n'est définie que sur $\mathbb{N}$, pas sur $\mathbb{R}$.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Modèle linéaire discret.

Une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 peut être vue comme la version *discrète* de la fonction affine $f(x) = rx + u_0$.

En effet, si on pose $f(n) = u_0 + nr$, les valeurs prises par f sur $\mathbb{N}$ coïncident exactement avec les termes de la suite.

La différence entre les deux : la fonction affine est définie sur $\mathbb{R}$ (on peut calculer $f(1,5)$), tandis que la suite n'est définie que pour des entiers naturels.

Ce parallèle est utile en modélisation : un capital qui augmente d'une somme fixe chaque mois est modélisé par une suite arithmétique, dont le terme général est une fonction affine de n (voir situation d'accroche du chapitre — Offre A).

1.3 Suites géométriques

DÉFINITION 5

Une suite (u_n) est dite **géométrique** s'il existe un réel q , appelé **raison**, tel que

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Autrement dit, on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même réel q .

Remarque. La valeur $q = 0$ est autorisée : si $u_0 \neq 0$, alors $u_1 = u_2 = \dots = 0$. La suite nulle est donc géométrique (elle vérifie la relation pour tout réel q). Lorsque les termes sont non nuls, on peut aussi retrouver la raison par le quotient $q = \frac{u_{n+1}}{u_n}$; ce quotient est une caractérisation conditionnelle, pas la définition générale.

EXEMPLE La suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n$ est géométrique de raison $q = 3$.

On calcule : $u_0 = 2, u_1 = 6, u_2 = 18, u_3 = 54$.

On vérifie : $\frac{u_1}{u_0} = 3, \frac{u_2}{u_1} = 3, \frac{u_3}{u_2} = 3$.

⚠ CONTRE-EXEMPLE La suite (v_n) définie par $v_0 = 1, v_1 = 2, v_2 = 6, v_3 = 24$ n'est *pas* géométrique : $\frac{v_1}{v_0} = 2$ mais $\frac{v_2}{v_1} = 3$. Le quotient de deux termes consécutifs n'est pas constant.

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si (u_n) est une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q , alors, pour tout entier $n \geq 1$:

$$u_n = u_0 \times q^n.$$

Pour $n = 0$, le terme u_0 reste la donnée initiale ; cette formulation évite d'avoir à donner un sens à 0^0 lorsque $q = 0$.

Plus généralement, si $n = p$, l'égalité $u_n = u_p$ est immédiate. Si $n > p$:

$$u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

Si $q \neq 0$, cette dernière égalité reste valable pour tous entiers naturels n et p . Cette formule s'appelle la **formule explicite** (ou terme général) de la suite géométrique.

EXEMPLE Soit (u_n) géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $u_0 = 16$.

Formule explicite : $u_n = 16 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

On calcule directement : $u_4 = 16 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 16 \times \frac{1}{16} = 1$.

Si on connaît $u_2 = 4$ et $q = \frac{1}{2}$, on peut aussi écrire $u_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$, ce qui donne le même résultat.

⚠ CONTRE-EXEMPLE La suite (w_n) définie par $w_n = 2^n + 1$ n'est pas géométrique : $\frac{w_1}{w_0} = \frac{3}{2}$ mais $\frac{w_2}{w_1} = \frac{5}{3}$. Le quotient n'est pas constant, même si w_n contient une puissance de 2.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser un quotient lorsqu'un terme peut être nul.

Pour montrer qu'une suite est géométrique, la voie générale consiste à établir $u_{n+1} = qu_n$ avec un même réel q pour tout n . On peut calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ uniquement lorsque $u_n \neq 0$.

Si un terme est nul, le quotient correspondant n'est pas défini, mais la suite peut tout de même être géométrique. C'est notamment le cas de la suite nulle et d'une suite de raison 0, qui devient nulle dès le rang suivant.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confusion entre q^n et q^{n-1} dans la formule explicite.

Pour $n \geq 1$, la formule est $u_n = u_0 \times q^n$ (exposant n , indice du terme), pas $u_0 \times q^{n-1}$. Au rang 0, on conserve la donnée initiale u_0 ; si $q = 0$, la formule s'utilise pour $n \geq 1$ afin de ne pas introduire 0^0 .

L'exposant $n - 1$ apparaît uniquement si on prend u_1 comme terme initial. Si $q \neq 0$, on a alors $u_n = u_1 \times q^{n-1}$ pour tout $n \geq 1$; si $q = 0$, on conserve u_1 au rang 1 et on utilise cette formule pour $n > 1$.

Moyen de ne pas confondre : lorsque $q \neq 0$, vérifier le cas $n = 0$: $u_0 \times q^0 = u_0$. Lorsque $q = 0$, vérifier plutôt le cas $n = 1$: on doit obtenir $u_1 = u_0 \times 0 = 0$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Représentation graphique : ne pas relier les points.

Si $q > 0$, les points $(n; u_n)$ sont situés sur la courbe de la fonction $x \mapsto u_0 q^x$. Pour $q < 0$, les signes peuvent alterner et cette courbe exponentielle réelle n'est pas définie; pour $q = 0$, les termes sont nuls à partir du rang 1. Dans tous les cas, les points restent *isolés* puisque la suite n'est définie que sur $\mathbb{N}$: on ne les relie pas pour représenter la suite.

✦ POUR ALLER PLUS LOIN

Modèle exponentiel discret.

Une suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$ peut être vue comme la version *discrète* de la fonction exponentielle $f(x) = u_0 \times q^x$.

En effet, si on pose $f(n) = u_0 \times q^n$, les valeurs prises sur $\mathbb{N}$ coïncident avec les termes de la suite.

La différence fondamentale : la fonction exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ (on peut calculer $f(1,5)$), tandis que la suite n'est définie que pour des entiers naturels.

Ce lien est central en modélisation :

- Un capital placé à intérêts composés à un taux t par période évolue selon la suite géométrique de raison $q = 1 + t$ (voir Offre B de la situation d'accroche).
- Une population dont l'effectif est multiplié par q chaque année suit le même modèle.

Sur des exemples avec $0 < q < 1$, un tableau de valeurs montre des termes positifs de plus en plus petits : on conjecture qu'ils se rapprochent de 0. On parle de *décroissance exponentielle discrète* (par exemple pour une décroissance radioactive modélisée par périodes).

Sur des exemples avec $q > 1$, les valeurs deviennent rapidement très grandes : on conjecture un comportement vers $+\infty$. On parle de *croissance exponentielle discrète*. Ces observations illustrent l'approche intuitive de la capacité C8 et restent sans preuve formelle en Première.

THÉORÈME 1 — Somme des n premiers entiers

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

THÉORÈME 2 — Somme géométrique

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{R}$.

► Si $q \neq 1$:

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

► Si $q = 1$:

$$1 + 1 + \dots + 1 \text{ (} n+1 \text{ fois)} = n + 1.$$

◆ **PROPRIÉTÉ 1 — Somme des termes d'une suite arithmétique** Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r . La somme des $(n+1)$ premiers termes (de u_0 à u_n) vaut :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Formule mnémotechnique : nombre de termes $\times$ moyenne du premier et du dernier terme.

◆ **PROPRIÉTÉ 2 — Somme des termes d'une suite géométrique** Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q .

► Si $q \neq 1$:

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

► Si $q = 1$: $u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n+1) u_0$.

EXEMPLE Suite arithmétique. La suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $r = 2$ donne $u_0 = 3, u_5 = 13$.
Somme : $u_0 + \dots + u_5 = 6 \times \frac{3 + 13}{2} = 48$.

EXEMPLE Suite géométrique. La suite (v_n) définie par $v_0 = 2$ et $q = 3$ donne : $v_0 + v_1 + \dots + v_4 = 2 \times \frac{1 - 3^5}{1 - 3} = 2 \times \frac{-242}{-2} = 242$.

EXEMPLE La suite (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$ est géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = -1$, car $u_{n+1} = -u_n$. La formule géométrique s'applique donc bien avec $q = -1$.

En revanche, la suite $v_n = n^2$ n'est ni arithmétique ni géométrique et aucune des deux formules ci-dessus ne s'applique directement.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Erreur sur le nombre de termes. De u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes, pas n . Exemple : de u_0 à u_4 , il y a 5 termes (0, 1, 2, 3, 4).

Confusion $q = 1$. Si $q = 1$, la formule $\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ est une division par zéro : elle ne s'applique pas. Il faut utiliser le cas $q = 1$ séparément : la somme vaut simplement $n + 1$.

Astuce mnémotechnique pour les suites arithmétiques. « Nombre de termes $\times$ demi-somme des extrêmes » — penser à une moyenne pondérée. Pour les suites géométriques, retenir $u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$: le numérateur fait apparaître le terme d'indice $n + 1$.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Démonstrations exigibles.

(a) Somme des n premiers entiers — méthode de Gauss.

Posons $S = 1 + 2 + \dots + (n - 1) + n$.

On écrit la même somme à l'envers :

$$S = n + (n - 1) + \dots + 2 + 1.$$

En additionnant membre à membre ces deux lignes, chaque colonne donne $1 + n = n + 1$, et il y a n colonnes :

$$2S = \underbrace{(n + 1) + (n + 1) + \dots + (n + 1)}_{n \text{ fois}} = n(n + 1).$$

$$\text{Donc } S = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

□

(b) Somme géométrique — multiplication par q et télescopage.

Supposons $q \neq 1$. Posons $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$.

On multiplie par q :

$$qS = q + q^2 + q^3 + \dots + q^{n+1}.$$

On soustrait :

$$S - qS = 1 - q^{n+1},$$

car tous les termes intermédiaires se simplifient (effet télescopique).

$$\text{Donc } S(1 - q) = 1 - q^{n+1}, \text{ soit } S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \text{ puisque } q \neq 1.$$

□

DÉFINITION 1 — Suite monotone

Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.

- ▶ (u_n) est **croissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$.
- ▶ (u_n) est **strictement croissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} > u_n$.
- ▶ (u_n) est **décroissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.
- ▶ (u_n) est **strictement décroissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} < u_n$.
- ▶ (u_n) est **constante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n$.

♦ **PROPRIÉTÉ 1 — Trois méthodes pour étudier la monotonie** Pour étudier le sens de variation de (u_n) , on dispose de trois méthodes :

Méthode 1 — Signe de $u_{n+1} - u_n$.

- ▶ Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors (u_n) est croissante.
- ▶ Si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors (u_n) est décroissante.

Méthode 2 — Comparaison du quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 (uniquement si $u_n > 0$ pour tout n).

- ▶ Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors (u_n) est croissante.
- ▶ Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors (u_n) est décroissante.

Méthode 3 — Étude de la fonction associée. Si $u_n = f(n)$ où f est définie et dérivable sur $[0; +\infty[$, alors :

- ▶ $f' \geq 0$ sur $[0; +\infty[$ implique que (u_n) est croissante.
- ▶ $f' \leq 0$ sur $[0; +\infty[$ implique que (u_n) est décroissante.

EXEMPLE Méthode 1. (u_n) définie par $u_n = 3n + 1$. $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) + 1 - (3n+1) = 3 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc (u_n) est strictement croissante.

EXEMPLE Méthode 2. (v_n) définie par $v_n = 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$ pour tout n . $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{1}{2} < 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc (v_n) est strictement décroissante.

EXEMPLE Méthode 3. (w_n) définie par $w_n = n^2 - 4n + 1$. $f(x) = x^2 - 4x + 1$, $f'(x) = 2x - 4$. $f'(x) \geq 0$ pour $x \geq 2$, donc (w_n) est croissante pour $n \geq 2$, décroissante pour $n \leq 2$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser le quotient sans vérifier la stricte positivité. La méthode 2 (quotient) n'est valide que si $u_n > 0$ pour tout n . Si (u_n) peut prendre des valeurs négatives ou nulles, le signe du quotient ne renseigne pas sur la monotonie.

Oubli du quantificateur universel. Il faut vérifier la condition **pour tout** $n \in \mathbb{N}$, pas seulement pour quelques valeurs. Montrer que $u_1 > u_0$ ne suffit pas à conclure que la suite est croissante.

Arbre de décision — quelle méthode choisir ?

- ▶ Expression de u_n simple (affine, polynomiale) → Méthode 1 (différence).
- ▶ Suite géométrique ou expression exponentielle avec termes positifs → Méthode 2 (quotient).
- ▶ $u_n = f(n)$ avec f dérivable et la dérivée facile à étudier → Méthode 3 (fonction).

+ POUR ALLER PLUS LOIN**Suite majorée, minorée, bornée : observation numérique.**

Une suite (u_n) est :

- ▶ **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;
- ▶ **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \geq m$ pour tout $n \in \mathbb{N}$;
- ▶ **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Ces notions permettent de décrire la position des termes d'une suite sans préjuger de son comportement à long terme.

Exemple. La suite $u_n = \frac{n}{n+1}$ est croissante (vérifiable par la méthode 1), majorée par 1 et minorée par 0. On calcule :

$$u_1 = \frac{1}{2}, \quad u_{10} = \frac{10}{11}, \quad u_{100} = \frac{100}{101}.$$

Ces trois valeurs sont inférieures à 1 et de plus en plus proches de 1. On conjecture que les termes se rapprochent de 1 lorsque n devient grand. Cette observation ne constitue pas une preuve.

◆ **PROPRIÉTÉ 1 — Suite arithmétique comme modèle linéaire discret** Une suite arithmétique de raison r modélise une évolution où la **variation absolue** est constante :

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

C'est l'analogue discret d'une fonction affine $f(x) = ax + b$: la suite croît (ou décroît) du même montant r à chaque pas.

◆ **PROPRIÉTÉ 2 — Suite géométrique comme modèle exponentiel discret** Une suite géométrique de raison q modélise une évolution où le **taux de variation** est constant :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

C'est l'analogue discret d'une fonction exponentielle. Le coefficient multiplicateur q est lié au taux d'évolution t (exprimé en valeur décimale) par :

$$q = 1 + t.$$

EXEMPLE Modèle arithmétique. Un abonnement coûte 10 € à l'inscription puis 5 € par mois. Le coût total après n mois est $u_n = 10 + 5n$, qui est une suite arithmétique de raison 5 et de premier terme $u_0 = 10$.

EXEMPLE Modèle géométrique. Un capital de 1 000 € est placé à un taux annuel de 3 %. Chaque année, le capital est multiplié par $q = 1,03$. Après n années : $u_n = 1\,000 \times 1,03^n$.

EXEMPLE Lien taux / coefficient multiplicateur. Une population augmente de 2 % par an. Taux $t = 0,02$, donc $q = 1 + 0,02 = 1,02$. Une diminution de 5 % donne $q = 1 - 0,05 = 0,95$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre évolution absolue et évolution relative. « La valeur augmente de 20 » → modèle arithmétique (variation absolue constante). « La valeur augmente de 20 % » → modèle géométrique (variation relative constante).

Erreur sur le coefficient multiplicateur. Une augmentation de 5 % donne $q = 1,05$, pas $q = 0,05$ (qui serait une quasi-suppression). Une diminution de 5 % donne $q = 0,95$, pas $q = 1,05$ ni $q = -0,05$.

Tableau récapitulatif.

	Suite arithmétique	Suite géométrique
Relation	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \cdot u_n$
Terme général	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \cdot q^n$
Modèle	linéaire discret	exponentiel discret
Évolution	absolue constante (r)	relative constante (q)
Taux et q	—	$q = 1 + t$

Pour $q = 0$, le terme initial reste donné séparément et l'expression $u_n = u_0 q^n$ est utilisée seulement pour $n \geq 1$.

✦ POUR ALLER PLUS LOIN

Vérifier la validité d'un modèle.

Les modèles arithmétiques et géométriques supposent une évolution parfaitement régulière, ce qui est rarement vérifié en pratique pendant une durée arbitrairement longue. Avant d'utiliser un modèle, il faut donc préciser son **domaine de validité** et confronter ses résultats au contexte.

Un tableau de valeurs permet notamment de repérer des prévisions invraisemblables :

- pour une quantité initiale positive et un coefficient $q > 1$, les valeurs d'un modèle géométrique peuvent devenir incompatibles avec des ressources limitées ;
- un modèle arithmétique de raison négative peut finir par produire une valeur négative, impossible pour une population ou une masse.

Une prévision numérique ne vaut donc que dans les hypothèses et sur la période où le modèle reste pertinent.

◆ **PROPRIÉTÉ 1 — Calcul du n -ième terme (boucle for)** Pour calculer u_n lorsque la suite est définie par récurrence ($u_{n+1} = f(u_n)$), on initialise u à u_0 puis on applique n fois la relation de récurrence.

Calcul du n -ième terme d'une suite définie par récurrence

Exemple : $u_0 = 3$, $u_{n+1} = 2 \cdot u_n + 1$

```
def terme(u0, n):
    u = u0
    for k in range(n):
        u = 2 * u + 1
    return u
```

```
print(terme(3, 5))
```

◆ **PROPRIÉTÉ 2 — Calcul d'une somme (boucle for avec accumulateur)** Pour calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ avec le programme ci-dessous, on initialise u à u_0 et l'accumulateur S à u_0 . On calcule ensuite chacun des n termes suivants avant de l'ajouter à S .

Calcul de la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_n$

Exemple : suite géométrique $u_k = 2 \cdot 3^{**k}$

```
def somme(u0, q, n):
    u = u0
    S = u0
```

```

for k in range(n):
    u = q * u
    S = S + u
return S

```

```
print(somme(2, 3, 4))
```

◆ **PROPRIÉTÉ 3 — Recherche de seuil (boucle while)** Pour trouver le plus petit entier n tel que $u_n > S$ (ou $u_n < s$), on utilise une boucle `while` dont la condition est la négation du seuil recherché.

Avant de lancer la boucle, il faut vérifier que les termes évoluent dans le bon sens et que le seuil peut être atteint dans le modèle étudié. Sinon, même avec une mise à jour correcte, la boucle peut ne jamais s'arrêter.

Le programme ci-dessous, nommé `seuil_geometrique`, traite précisément le cas croissant $u_0 > 0$ et $q > 1$, avec des paramètres réels finis. Ces préconditions garantissent mathématiquement que le seuil est atteint. Le programme vérifie aussi, à chaque tour, que la valeur calculée augmente réellement. Si une précondition n'est pas respectée ou si la précision numérique empêche cette progression, il signale une `ValueError` au lieu d'entrer dans une boucle sans fin.

```

# Recherche du plus petit n tel que u_n > seuil
# Exemple : u_0 = 1, u_{n+1} = 1.05 * u_n, seuil = 2
from math import isfinite

```

```

def seuil_geometrique(u0, q, seuil):
    """Renvoie le plus petit rang avec u_n > seuil, pour u0 > 0 et q > 1."""
    try:
        parametres_finis = isfinite(u0) and isfinite(q) and isfinite(seuil)
    except (TypeError, ValueError, OverflowError):
        parametres_finis = False
    if not parametres_finis:
        raise ValueError("Les paramètres doivent être des nombres réels finis.")
    if u0 <= 0:
        raise ValueError("u0 doit être strictement positif.")
    if q <= 1:
        raise ValueError("q doit être strictement supérieur à 1.")

    u = u0
    n = 0
    while u <= seuil:
        u_suivant = q * u
        if u_suivant <= u:
            raise ValueError("La précision numérique empêche la suite de progresser.")
        u = u_suivant
        n = n + 1
    return n, u

```

```

n, val = seuil_geometrique(1, 1.05, 2)
print(f"n = {n}, u_n = {val:.4f}")

```

EXEMPLE Avec $u_0 = 1$ et $q = 1,05$, le programme renvoie le premier rang n à partir duquel le capital dépasse 2 € (doublement du capital à 5 % par an).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confusion indice / valeur dans la boucle. La variable de boucle k dans `range(n)` est un *indice* (compteur d'itérations), pas la valeur du terme. On ne confondra pas k (indice) avec u (valeur courante du terme).

Oubli de mise à jour dans while. Si on oublie d'actualiser u ou n dans le corps de la boucle `while`, la condition reste identique et la boucle tourne indéfiniment (boucle infinie). Vérifier systématiquement que les variables de la condition sont bien modifiées à chaque itération.

Décalage d'un dans range(). `range(n)` génère les entiers $0, 1, \dots, n-1$: il y a exactement n itérations. Pour itérer $n+1$ fois (de u_0 à u_n compris), il faut `range(n+1)`. Bien distinguer ce que l'on cherche : le rang n -ième ou les n premiers termes.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Enrichissement non exigible — comparaison itératif / formule explicite.

Une boucle qui applique la relation de récurrence n fois effectue exactement n mises à jour du terme. Une formule explicite évite ces n mises à jour, mais l'écriture d'une puissance comme une seule instruction Python ne rend pas son coût constant : l'évaluation de cette puissance dépend de l'algorithme employé par le langage.

	Approche itérative	Formule explicite
Mises à jour par récurrence	n	aucune
Applicable si	relation donnée	formule connue
Exemple	boucle <code>for</code>	$u_n = u_0 \cdot q^n$

Cette comparaison compte seulement les mises à jour par récurrence et ne constitue pas une affirmation de complexité sur toutes les opérations internes. En pratique, pour une suite géométrique, la formule explicite $u_n = u_0 \cdot q^n$ évite de recalculer les termes précédents. Dans un programme, si $q = 0$ et $n = 0$, retourner directement u_0 sans demander au langage d'évaluer 0^0 ; pour $n \geq 1$, la formule s'applique. Pour une suite définie par une relation de récurrence plus complexe, comme la suite de Fibonacci, l'approche itérative est immédiatement disponible à partir de la définition ; d'autres méthodes existent, mais elles ne sont pas mobilisées ici.

Remarque. L'étude formelle du coût des algorithmes d'exponentiation dépasse le programme de première.

DÉFINITION Comportement à long terme — approche intuitive

Observer une suite sur un grand nombre de rangs permet de formuler une conjecture sur son comportement. Dans ce chapitre, cette sensibilisation reste **sans démonstration formelle** : on n'utilise ni définition avec des intervalles, ni théorème de convergence.

On distingue trois comportements :

- ▶ une **limite finie** lorsque les termes semblent se rapprocher d'un même nombre ;
- ▶ une **limite infinie** lorsque les termes deviennent aussi grands que l'on veut, positivement ou négativement ;
- ▶ une **absence de limite** lorsque les termes ne se rapprochent pas d'un nombre et ne deviennent pas tous arbitrairement grands dans un même sens.

EXEMPLE Pour $u_n = 3 + 2^{-n}$, les valeurs 4, 3,5, 3,25, 3,125 se rapprochent de 3 : on conjecture une limite finie égale à 3.

EXEMPLE Pour $v_n = n^2$, les termes deviennent arbitrairement grands : on conjecture une limite infinie égale à $+\infty$.

EXEMPLE Pour $w_n = (-1)^n$, les termes alternent entre 1 et -1 : la suite présente une absence de limite.

ERREUR FRÉQUENTE

Une table de valeurs ou un graphique permet de conjecturer, pas de démontrer. Le programme de Première 2026-2027 exclut toute formalisation de la notion de limite.

Vérifier son résultat.

- ▶ Ai-je observé suffisamment de rangs sans me limiter aux trois premiers termes ?
- ▶ Ai-je distingué « se rapprocher d'un nombre », « devenir arbitrairement grand » et « osciller » ?
- ▶ Ai-je rédigé « on conjecture » lorsqu'aucune justification adaptée n'est fournie ?

MÉTHODE M1 Calculer les termes d'une suite

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer u_0, u_1, u_2 », « déterminer les premiers termes de la suite », ou « donner la valeur de u_n pour $n = 0, 1, 2, 3$ ».

La méthode pas à pas.

1. J'identifie le mode de définition de la suite :
 - ▶ **Formule explicite** : u_n est exprimé directement en fonction de n .
 - ▶ **Relation de récurrence** : u_{n+1} est exprimé en fonction de u_n (et éventuellement de n), avec un terme initial u_0 (ou u_1) donné.
2. **Si formule explicite** : je remplace n par la valeur souhaitée (0, 1, 2, ...) dans la formule et je calcule.
3. **Si relation de récurrence** : je pars du terme initial, puis j'applique la relation une fois pour obtenir le terme suivant, et ainsi de suite pas à pas.

Exemple rédigé. Exemple 1 — Formule explicite. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - 2n + 1$. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .

$$\begin{aligned} u_0 &= 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1. \\ u_1 &= 3 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1 = 3 - 2 + 1 = 2. \\ u_2 &= 3 \times 2^2 - 2 \times 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9. \\ u_3 &= 3 \times 3^2 - 2 \times 3 + 1 = 27 - 6 + 1 = 22. \end{aligned}$$

Exemple 2 — Relation de récurrence. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n - 3$. Calculer v_1, v_2, v_3 .

$$\begin{aligned} v_1 &= 2v_0 - 3 = 2 \times 5 - 3 = 7. \\ v_2 &= 2v_1 - 3 = 2 \times 7 - 3 = 11. \\ v_3 &= 2v_2 - 3 = 2 \times 11 - 3 = 19. \end{aligned}$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** En récurrence, certains élèves remplacent n par $n + 1$ directement dans la formule au lieu d'utiliser la valeur du terme précédent. Par exemple, avec $v_{n+1} = 2v_n - 3$ et $v_0 = 5$, écrire $v_1 = 2(0 + 1) - 3 = -1$ est faux. Il faut écrire $v_1 = 2v_0 - 3 = 7$.
- ▶ **Piège 2.** Oublier le rang initial : si la suite est définie à partir de $n = 1$ (et non $n = 0$), u_0 n'existe pas. Vérifier toujours l'ensemble de définition.
- ▶ **Piège 3.** Pour une formule explicite, confondre u_{n+1} (on remplace n par $n + 1$) et $u_n + 1$ (on ajoute 1 au terme). Ces deux expressions sont différentes en général.

Vérifier son résultat. Pour une formule explicite, vérifier que u_0 s'obtient bien en posant $n = 0$. Par exemple, $u_0 = 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1$: résultat cohérent, pas de signe oublié. Pour une récurrence, relire le calcul à rebours : si $v_3 = 19$, alors $2 \times 11 - 3 = 19 \checkmark$.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

❶ MÉTHODE M2 Montrer qu'une suite est arithmétique

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « montrer que la suite est arithmétique », « démontrer que (u_n) est une suite arithmétique », ou « déterminer la raison d'une suite arithmétique ».

La méthode pas à pas.

1. Je calcule $u_{n+1} - u_n$ en remplaçant n par $n + 1$ dans l'expression de u_n .
2. Je développe et je simplifie l'expression obtenue.
3. Je vérifie que le résultat est une constante r (indépendante de n).
4. Je conclus : « La suite (u_n) est arithmétique de raison $r = \dots$ et de premier terme $u_0 = \dots$ »

Exemple rédigé. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5n - 3$. Montrer que (u_n) est une suite arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$u_{n+1} = 5(n+1) - 3 = 5n + 5 - 3 = 5n + 2.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = (5n + 2) - (5n - 3) = 5n + 2 - 5n + 3 = 5.$$

La différence $u_{n+1} - u_n = 5$ est constante, indépendante de n .

De plus, $u_0 = 5 \times 0 - 3 = -3$.

Conclusion : La suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = -3$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Conclure à partir d'exemples numériques sans preuve générale est insuffisant. Vérifier que $u_1 - u_0 = u_2 - u_1 = 5$ ne prouve pas que *tous* les termes consécutifs ont la même différence. Il faut un calcul général en n .
- ▶ **Piège 2.** Oublier de citer la définition dans la conclusion. Une suite est arithmétique si et seulement si la différence $u_{n+1} - u_n$ est *constante* pour tout n . La constante doit être identifiée explicitement.
- ▶ **Piège 3.** Lors du calcul de u_{n+1} , oublier d'ajouter 1 à *tous* les n : écrire $u_{n+1} = 5n + 1 - 3$ au lieu de $5(n+1) - 3$ est une erreur fréquente.

Vérifier son résultat. On peut contrôler le résultat avec la formule $u_n = u_0 + n \times r$:

- ▶ $n = 0$: $u_0 = -3 + 0 \times 5 = -3 \checkmark$
- ▶ $n = 1$: $u_1 = -3 + 1 \times 5 = 2$; vérification directe : $5 \times 1 - 3 = 2 \checkmark$
- ▶ $n = 2$: $u_2 = -3 + 2 \times 5 = 7$; vérification directe : $5 \times 2 - 3 = 7 \checkmark$

S'entraîner. (renvois exercices M2)

④ MÉTHODE M3 Montrer qu'une suite est géométrique

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « montrer que la suite est géométrique », « démontrer que (u_n) est une suite géométrique », ou « déterminer la raison d'une suite géométrique ».

La méthode pas à pas.

1. **Méthode A — relation multiplicative.** Je calcule u_{n+1} , puis je cherche à établir $u_{n+1} = qu_n$ avec un même réel q pour tout n . Cette méthode reste valable lorsque certains termes sont nuls.
2. **Méthode B — quotient, si les termes sont non nuls.** Après avoir prouvé $u_n \neq 0$ pour tout n , je peux calculer et simplifier $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.
3. Je vérifie que la relation multiplicative, ou le quotient lorsque ce dernier est défini, donne une constante q indépendante de n .
4. Je conclus : « La suite (u_n) est géométrique de raison $q = \dots$ et de premier terme $u_0 = \dots$ ».

Exemple rédigé. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 7 \times 3^n$. Montrer que (u_n) est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n > 0$, donc $u_n = 7 \times 3^n > 0$. En particulier, $u_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 7 \times 3^{n+1}.$$

Donc :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{7 \times 3^{n+1}}{7 \times 3^n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = 3^{n+1-n} = 3.$$

Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3$ est constant, indépendant de n .

De plus, $u_0 = 7 \times 3^0 = 7$.

Conclusion : La suite (u_n) est géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $u_0 = 7$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Former un quotient sans vérifier que $u_n \neq 0$. Si $u_n = 0$ pour un certain rang, cette méthode est indisponible ; il faut revenir à la relation $u_{n+1} = qu_n$. Cela ne prouve pas que la suite n'est pas géométrique.
- **Piège 2.** Conclure à partir d'exemples numériques sans preuve générale. Vérifier $u_1/u_0 = u_2/u_1 = 3$ ne suffit pas ; le calcul doit être mené pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- **Piège 3.** Lors du calcul de $3^{n+1}/3^n$, écrire $3^{n+1-n} = 3^1 = 3$ est correct, mais certains élèves écrivent par erreur $3^{(n+1)/n}$, ce qui est faux. La soustraction des exposants s'applique à une division de puissances de même base, pas à leurs indices.

Vérifier son résultat. On peut contrôler le résultat avec la formule $u_n = u_0 \times q^n$:

- $n = 0 : u_0 = 7 \times 3^0 = 7 \checkmark$
- $n = 1 : u_1 = 7 \times 3^1 = 21$; vérification directe : $7 \times 3^1 = 21 \checkmark$
- $n = 2 : u_2 = 7 \times 3^2 = 63$; vérification directe : $7 \times 3^2 = 63 \checkmark$

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Calculer une somme de termes

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la somme des n premiers termes », « déterminer $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ », ou « calculer $1 + 2 + \dots + 2^k$ » (somme d'une suite arithmétique ou géométrique).

La méthode pas à pas. Cas 1 — Suite arithmétique (raison r) :

1. J'identifie le premier terme u_0 , le dernier terme u_n et le nombre de termes (de u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes).
2. J'applique la formule :

$$S = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

Cas 2 — Suite géométrique (raison q) :

1. J'identifie le premier terme u_0 , la raison q et le nombre de termes (de u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes).
2. Je vérifie que $q \neq 1$.
3. J'applique la formule :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Exemple rédigé. Exemple 1 — Suite arithmétique. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 1$, définie par $u_n = 3n + 1$. Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$.

On somme les termes $u_0, u_1, \dots, u_{19}$: il y a 20 termes.

$$u_0 = 3 \times 0 + 1 = 1 \quad \text{et} \quad u_{19} = 3 \times 19 + 1 = 58.$$

$$S = 20 \times \frac{u_0 + u_{19}}{2} = 20 \times \frac{1 + 58}{2} = 20 \times \frac{59}{2} = 590.$$

Exemple 2 — Suite géométrique. Calculer $S = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^9$.

On reconnaît la suite géométrique de terme général $u_k = 2^k$, de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 1$. On somme de $k = 0$ à $k = 9$: il y a 10 termes.

Comme $q = 2 \neq 1$, on peut appliquer la formule.

$$S = 1 \times \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = \frac{1 - 1024}{-1} = \frac{-1023}{-1} = 1023.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Erreur sur le nombre de termes : de u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes (et non n). Par exemple, de u_0 à u_9 il y a 10 termes. Compter soigneusement.
- **Piège 2.** Oublier de vérifier $q \neq 1$ avant d'appliquer la formule géométrique. Si $q = 1$, la suite est constante et la somme vaut simplement $(n + 1) \times u_0$.
- **Piège 3.** Confondre $1 - q^n$ et $1 - q^{n+1}$ dans la formule géométrique. Lorsqu'on somme $n + 1$ termes (de u_0 à u_n), l'exposant est $n + 1$, pas n .

Vérifier son résultat.

- **Somme arithmétique :** calculer à la main $u_0 + u_1 + u_2 = 1 + 4 + 7 = 12$, puis vérifier avec la formule : $3 \times (1 + 7)/2 = 12 \checkmark$.
- **Somme géométrique :** calculer $1 + 2 + 4 = 7$ (3 premiers termes), puis vérifier : $1 \times (1 - 2^3)/(1 - 2) = (1 - 8)/(-1) = 7 \checkmark$.
- Vérifier l'ordre de grandeur : la somme doit être cohérente avec le nombre de termes multiplié par la valeur « moyenne » des termes.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 Étudier le sens de variation d'une suite

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de :

- ▶ « montrer que la suite (u_n) est croissante / décroissante » ;
- ▶ « étudier les variations de la suite (u_n) » ;
- ▶ « montrer que (u_n) est monotone à partir d'un certain rang ».

Arbre de décision — quelle méthode choisir ?

- ▶ Suite géométrique à termes positifs ou expression avec un quotient naturel → **Méthode B** (quotient).
- ▶ Suite définie par une expression de n (polynomiale, rationnelle, etc.) → **Méthode A** (différence) ou **Méthode C** (fonction associée).
- ▶ Suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ → **Méthode A** (différence).

La méthode pas à pas. Méthode A — Signe de $u_{n+1} - u_n$

1. Je calcule $u_{n+1} - u_n$ en développant et simplifiant.
2. J'étudie le signe de cette expression pour tout $n \in \mathbb{N}$ (ou pour tout n à partir d'un certain rang).
3. Je conclus : si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , alors (u_n) est croissante ; si $u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors (u_n) est décroissante.

Méthode B — Comparaison du quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1

1. Je vérifie que $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (condition indispensable).
2. Je calcule $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et je simplifie.
3. Je compare ce quotient à 1 pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Je conclus : si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors (u_n) est croissante ; si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, alors (u_n) est décroissante.

Méthode C — Étude de la fonction associée

1. J'écris $u_n = f(n)$ où f est une fonction définie sur $[0; +\infty[$.
2. Je calcule la dérivée f' et j'étudie son signe sur $[0; +\infty[$.
3. Je conclus sur la monotonie de (u_n) selon le signe de f' .

Exemple rédigé. Énoncé. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 4n + 7$. Étudier les variations de (u_n) .

On choisit la **méthode A** (expression polynomiale de n).

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = (n+1)^2 - 4(n+1) + 7 = n^2 + 2n + 1 - 4n - 4 + 7 = n^2 - 2n + 4.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = (n^2 - 2n + 4) - (n^2 - 4n + 7) = 2n - 3.$$

On étudie le signe de $2n - 3$:

- ▶ Si $n \geq 2$, alors $2n \geq 4 > 3$, donc $2n - 3 > 0$, soit $u_{n+1} - u_n > 0$.
- ▶ Si $n = 0$, alors $u_1 - u_0 = -3 < 0$.
- ▶ Si $n = 1$, alors $u_2 - u_1 = -1 < 0$.

Conclusion. On a $u_0 > u_1 > u_2$: la suite (u_n) est **strictement décroissante jusqu'au rang 2**. Elle est ensuite **strictement croissante à partir du rang 2**. Elle n'est pas monotone sur $\mathbb{N}$ tout entier.

Vérification numérique : $u_0 = 7, u_1 = 4, u_2 = 3, u_3 = 4, u_4 = 7$. On constate bien $u_0 > u_1 > u_2$ puis $u_2 < u_3 < u_4$, ce qui est cohérent.

Les pièges. Piège 1 — Oublier le quantificateur universel.

Erreur : « $u_1 - u_0 = 5 > 0$, donc la suite est croissante. »

Correction : Vérifier $u_{n+1} - u_n \geq 0$ **pour tout** $n \in \mathbb{N}$. Un seul exemple ne constitue pas une preuve ; il faut un raisonnement général.

Piège 2 — Utiliser le quotient sans vérifier la positivité.

Erreur : Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ alors que u_n peut être nul ou négatif.

Correction : La méthode B (quotient) n'est valide que si $u_n > 0$ **pour tout** $n \in \mathbb{N}$. Dans le cas contraire, utiliser la méthode A ou C.

Piège 3 — Conclure que la suite n'est pas monotone sans préciser les intervalles.

Erreur : « La suite n'est pas monotone. »

Correction : Préciser les rangs : « La suite est décroissante pour $n \leq n_0$ et croissante pour $n \geq n_0$. »

Vérifier son résultat.

- ▶ Calculer les trois ou quatre premiers termes de la suite et vérifier qu'ils sont bien dans l'ordre annoncé (croissant ou décroissant).
- ▶ Si l'on a conclu à la croissance à partir du rang n_0 , vérifier explicitement que $u_{n_0} \leq u_{n_0+1}$ par le calcul.
- ▶ Pour la méthode C : vérifier que f est bien dérivable sur $[0; +\infty[$ avant de conclure.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

❶ MÉTHODE M6 Modéliser une situation par une suite

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé décrit une grandeur qui évolue de façon régulière et demande de :

- ▶ « exprimer le montant / la population / la quantité en fonction de n » ;
- ▶ « on augmente chaque année de X euros », « on diminue de $Y\%$ chaque mois » ;
- ▶ « écrire la relation entre deux termes consécutifs » ;
- ▶ « calculer la valeur après n années / mois / étapes ».

La méthode pas à pas.

1. **Définir la suite.** Identifier la grandeur qui évolue et poser u_n en précisant **ce que représente** n (année, mois, étape, etc.) et **ce que représente** u_n (montant en euros, nombre d'individus, etc.).
2. **Déterminer u_0 .** Identifier la valeur initiale (situation au départ, à $n = 0$).
3. **Identifier le type d'évolution.**
 - ▶ Variation **absolue** constante (on ajoute ou retire le même montant) $\Rightarrow$ suite **arithmétique** : $u_{n+1} = u_n + r$.
 - ▶ Variation **relative** constante (on multiplie par le même coefficient) $\Rightarrow$ suite **géométrique** : $u_{n+1} = q \cdot u_n$.
4. **Calculer r ou q .**
 - ▶ Suite arithmétique : r est la variation absolue par pas.
 - ▶ Suite géométrique : augmentation de $t\% \Rightarrow q = 1 + \frac{t}{100}$; diminution de $t\% \Rightarrow q = 1 - \frac{t}{100}$.
5. **Écrire la formule explicite.**
 - ▶ Suite arithmétique : $u_n = u_0 + nr$.

► Suite géométrique : $u_n = u_0 \times q^n$.

Si $q = 0$, traiter $n = 0$ séparément en conservant la donnée u_0 ; la formule avec une puissance s'utilise alors pour $n \geq 1$.

6. **Répondre à la question posée** en substituant la valeur de n demandée, en précisant l'unité.

Exemple rédigé. Énoncé. Une association comptait 480 adhérents au 1^{er} janvier 2020. Elle perd chaque année 6 % de ses adhérents. On note u_n le nombre d'adhérents au 1^{er} janvier de l'année 2020 + n .

1. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n , puis u_n en fonction de n .
2. Calculer le nombre d'adhérents au 1^{er} janvier 2025.

1.
 n désigne le nombre d'années écoulées depuis 2020, et u_n désigne le nombre d'adhérents au 1^{er} janvier de l'année 2020 + n .

La valeur initiale est $u_0 = 480$.

Chaque année, le nombre d'adhérents est multiplié par $q = 1 - \frac{6}{100} = 0,94$.

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 0,94 \times u_n.$$

La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 480$ et de raison $q = 0,94$. Son terme général est :

$$u_n = 480 \times 0,94^n.$$

2.

Au 1^{er} janvier 2025, on a $n = 5$, donc :

$$u_5 = 480 \times 0,94^5 \approx 480 \times 0,7339 \approx 352,3.$$

Au 1^{er} janvier 2025, l'association compte environ **352** adhérents.

Vérification : $u_1 = 480 \times 0,94 = 451,2 \approx 451$. En 2021, l'association a perdu environ $480 - 451 = 29$ adhérents, soit $29/480 \approx 6\%$. Cohérent.

Les pièges. Piège 1 — Confondre variation absolue et variation relative.

Erreur : Face à « la population augmente de 200 individus par an », écrire $u_{n+1} = 1,2 \times u_n$.

Correction : Une variation **absolue** constante (+200 par an) $\Rightarrow$ suite **arithmétique** : $u_{n+1} = u_n + 200$.

Une variation **relative** constante (+20 % par an) $\Rightarrow$ suite **géométrique** : $u_{n+1} = 1,2 \times u_n$.

Piège 2 — Erreur sur le coefficient multiplicateur.

Erreur : « Une diminution de 8 % donne $q = 0,08$ » ou « $q = 1,08$ ».

Correction :

► Augmentation de $t\%$ $\Rightarrow q = 1 + \frac{t}{100}$.

► Diminution de $t\%$ $\Rightarrow q = 1 - \frac{t}{100}$.

Diminution de 8 % $\Rightarrow q = 1 - 0,08 = 0,92$.

Piège 3 — Ne pas préciser ce que représente u_n ni l'unité.

Erreur : « $u_n = 480 \times 0,94^n$ » sans préciser que u_n est un nombre d'adhérents et que n est le nombre d'années écoulées depuis 2020.

Correction : Toujours définir explicitement u_n et n en début de résolution.

Vérifier son résultat.

- Calculer u_0 avec la formule explicite et vérifier qu'on retrouve bien la valeur initiale du problème.

- ▶ Calculer u_1 avec la formule explicite et avec la relation de récurrence, et vérifier que les deux résultats coïncident.
- ▶ Vérifier la cohérence de l'ordre de grandeur : un nombre d'adhérents doit être positif et raisonnable ; un capital placé doit augmenter si $q > 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M6)

🔗 MÉTHODE M7 Écrire un programme Python de calcul de terme, somme ou seuil

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de :

- ▶ « écrire un programme (ou un algorithme) calculant le n -ième terme de la suite » ;
- ▶ « écrire un programme calculant la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_n$ » ;
- ▶ « déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > S$ » ;
- ▶ « à l'aide d'un algorithme, déterminer le rang à partir duquel... ».

La méthode pas à pas. Modèle A — Calcul du n -ième terme (boucle for)

1. Initialiser la variable u à u_0 .
2. Écrire une boucle `for k in range(n)` : à chaque itération, mettre à jour u par la relation de récurrence.
3. Après la boucle, u contient u_n .

Modèle B — Calcul d'une somme (boucle for avec accumulateur)

1. Initialiser u à u_0 et l'accumulateur S à u_0 .
2. Boucle `for k in range(1, n+1)` : mettre à jour u puis $S = S + u$.
3. Après la boucle, S contient $u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

Modèle C — Recherche de seuil (boucle while)

1. Initialiser u à u_0 et le compteur n à 0.
2. Écrire une boucle `while` dont la condition est la **négarion** du seuil cherché.
3. Dans le corps : mettre à jour u par la récurrence, puis $n = n + 1$.
4. Après la boucle, n est le rang cherché.

Exemple rédigé (M7). Énoncé. On place un capital initial de 1 500 € sur un livret rémunéré à 4 % par an. On note u_n le capital (en euros) après n années.

1. Écrire un programme Python qui calcule u_n pour un entier n donné.
2. Écrire un programme Python qui détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3\,000$.

1. La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 1500$ et de raison $q = 1,04$.

```
def capital(n):
    u = 1500
    for k in range(n):
        u = 1.04 * u
    return u
```

```
print(round(capital(10), 2))
```

Ainsi, $u_{10} = 1500 \times 1,04^{10} \approx 2\,220,37$ €.

2. On cherche le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3\,000$.

```

u = 1500
n = 0
while u < 3000 :
    u = 1.04 * u
    n = n + 1
print("Rang :", n)
print("Capital :", round(u, 2))

```

Le programme affiche Rang : 18 et Capital : 3038.72.

Conclusion. Le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3000$ est $n = 18$. Le capital dépasse 3000 € pour la première fois après 18 années.

Vérification : $u_{17} = 1500 \times 1,04^{17} \approx 2921,85 < 3000$ et $u_{18} \approx 3038,72 > 3000$. Cohérent.

Les pièges (M7). **Piège 1 — Initialiser u à 0 au lieu de u_0 .** Si $u = 0$, tous les termes resteront nuls (multiplication par 0). Toujours initialiser à la valeur du premier terme : $u = 1500$.

Piège 2 — Oublier $n = n + 1$ dans la boucle `while`. Sans incrémentation du compteur, le programme tourne indéfiniment (boucle infinie). Toujours mettre à jour **toutes** les variables qui apparaissent dans la condition.

Piège 3 — Confusion sur `range(n)`. `range(n)` produit les entiers $0, 1, \dots, n-1$: exactement n itérations. Pour calculer u_n à partir de u_0 , il faut bien `range(n)` (n applications de la récurrence). Pour la somme $u_0 + \dots + u_n$, utiliser `range(1, n+1)`.

Vérifier son résultat (M7).

- ▶ Exécuter mentalement les deux premiers tours de boucle et comparer aux termes calculés à la main.
- ▶ Pour le modèle A : vérifier que `capital(0)` retourne u_0 (la boucle `range(0)` est vide).
- ▶ Pour le modèle C : vérifier que u_{n-1} ne satisfait pas le seuil et que u_n le satisfait.

S'entraîner (M7). (renvois exercices M7)

① MÉTHODE M8 Conjecturer le comportement à long terme d'une suite

Quand l'utiliser. Lorsque l'on demande de décrire intuitivement le comportement d'une suite pour de grands rangs, sans démonstration formelle.

La méthode pas à pas.

1. Calculer ou faire calculer plusieurs termes, dont certains de rang élevé.
2. Représenter si possible les points $(n; u_n)$.
3. Rechercher l'un des trois comportements : rapprochement vers un réel, croissance sans borne dans un même sens, ou absence de stabilisation.
4. Conclure prudemment par une conjecture : limite finie, limite infinie ou absence de limite.

Exemple rédigé. Pour $u_n = 2 + 0,5^n$, on obtient $u_5 \approx 2,031$, $u_{10} \approx 2,001$ et $u_{20} \approx 2,000001$. Les termes semblent se rapprocher de 2 : on conjecture une limite finie égale à 2.

Les pièges. Trois valeurs ne suffisent pas à prévoir un comportement à long terme. Une oscillation, comme celle de $(-1)^n$, ne constitue pas un rapprochement vers 0.

Vérifier son résultat. La conclusion est formulée comme une conjecture et n'invoque aucun théorème de convergence.

S'entraîner. (renvois exercices M8)

Exercice 1

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Démontrer que la suite (u_n) est géométrique et préciser sa raison.
3. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

Exercice 2

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n + 2$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Calculer u_{10} .
3. Cette suite est-elle définie par formule explicite ou par récurrence? Justifier.

Exercice 3

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 3u_n - 2.$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Cette suite est-elle définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence? Justifier en une phrase.
3. Pour calculer u_5 , faut-il connaître u_4 ? Expliquer.

Exercice 4

Amira définit la suite (u_n) pour tout entier naturel n par

$$u_n = n^2 - 2n + 3.$$

1. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_3 .
2. Calculer u_5 .
3. Amira affirme que $u_1 = u_2$. A-t-elle raison? Justifier par le calcul.

Exercice 5

Karim étudie la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$, $v_1 = 1$ et, pour tout entier naturel n :

$$v_{n+2} = v_{n+1} + v_n.$$

1. Calculer v_2 , v_3 , v_4 et v_5 .
2. Cette suite est-elle définie par formule explicite ou par récurrence?
3. Pour calculer v_6 , quel(s) terme(s) faut-il connaître?

Exercice 6

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 7 + 4n$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Montrer que la suite (u_n) est arithmétique et préciser sa raison r et son premier terme u_0 .
3. Calculer u_{10} à l'aide de la formule du terme général.

Exercice 7

Sophie étudie une suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 100$ et de raison $r = -3$.

1. Écrire la formule du terme général u_n en fonction de n .
2. Calculer u_1 et u_2 .
3. Calculer u_{20} .
4. La suite est-elle croissante ou décroissante ? Justifier à partir de la raison.

Exercice 8

Mehdi sait que la suite arithmétique (u_n) a pour raison $r = 4$ et que $u_5 = 23$.

1. En utilisant la relation $u_n = u_p + (n - p) \times r$, calculer u_0 .
2. Écrire la formule du terme général u_n .
3. Calculer u_8 .

Exercice 9

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 6 \times 2^n$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 .
2. Lina affirme : « Puisque $u_1 - u_0 = 6$, la suite (u_n) est une suite arithmétique de raison 6. » Réfuter cette affirmation à l'aide des termes calculés.
3. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$, puis en déduire que la suite (u_n) est géométrique et préciser sa raison.
4. Déterminer le rang n pour lequel $u_n = 192$.

Exercice 10

Lina étudie une suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 81$ et de raison $q = \frac{1}{3}$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Écrire la formule du terme général u_n en fonction de n .
3. La suite est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi ?

Exercice 11

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $r = 3$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5 .
2. En appliquant la formule $S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$, calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$.
3. Vérifier le résultat en additionnant directement les six termes.

Exercice 12

On considère la suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = 2$.

1. Écrire la formule du terme général u_n .
2. En appliquant la formule de somme géométrique $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$.
3. Calculer directement $u_0 + u_1 + \dots + u_7$ pour vérifier.

Exercice 13

On souhaite calculer la somme $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 50$.

1. En appliquant la formule $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$, calculer S .
2. Vérifier que $S = 1275$ en remarquant que les paires $(1 + 50), (2 + 49), \dots$ valent chacune 51, et en comptant le nombre de telles paires.

Exercice 14 ◆

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3 + 5n$.

1. Calculer $u_{n+1} - u_n$ et simplifier.
2. En déduire le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Conclure sur le sens de variation de la suite (u_n) .

Exercice 15 ◆

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n$ pour tout entier naturel n .

1. Tous les termes u_n sont-ils strictement positifs ? Justifier.
2. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.
3. En comparant le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1, déterminer si la suite est croissante ou décroissante.

Exercice 16 ◆

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = n^2 - 4n + 7$.

On pose $f(x) = x^2 - 4x + 7$ pour $x \in [0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0; +\infty[$ et dresser le tableau de variations de f .
3. En déduire les variations de la suite (u_n) sur $\mathbb{N}$ (on calculera u_0, u_1, u_2, u_3).

Exercice 17 ◆

Yasmine souscrit un abonnement sportif. Elle paie 500 € à l'inscription, puis 30 € par mois.

On note C_n le coût total (en euros) après n mois.

1. Exprimer C_n en fonction de n .
2. La suite (C_n) est-elle arithmétique ou géométrique ? Préciser sa raison et son premier terme.
3. Calculer le coût total après 12 mois (soit 1 an).

Exercice 18 ◆

Rayan place 2 000 € sur un livret bancaire rémunéré à un taux annuel de 5 %.

On note P_n le capital (en euros) après n années.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Exprimer P_{n+1} en fonction de P_n , puis P_n en fonction de n .
3. La suite (P_n) est-elle arithmétique ou géométrique ? Justifier.
4. Calculer P_3 (arrondir au centime si nécessaire).

Exercice 19 ◆

Une colonie de bactéries compte 1 200 individus à l'instant initial. Elle croît de 2 % par heure.

On note N_n le nombre de bactéries après n heures. Pour modéliser cette évolution, on retient $N_0 = 1200$ et $N_{n+1} = 1,02N_n$. Lina propose à la place le modèle additif $A_n = 1200 + 24n$, car la colonie gagne 24 bactéries pendant la première heure.

1. Expliquer le coefficient multiplicateur 1,02, puis préciser pourquoi la suite (N_n) est géométrique.
2. Calculer N_1, A_1, N_2 et A_2 . Que montre cette comparaison sur le modèle additif proposé par Lina ?
3. Calculer N_{10} et A_{10} , au centième près si nécessaire. Comparer les deux modèles après dix heures.

- Les valeurs décimales données par (N_n) sont-elles contradictoires avec le fait qu'une population est un nombre entier? Donner les prévisions de ce modèle après deux heures et dix heures, arrondies à l'unité.

Exercice 20

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

On souhaite calculer u_5 à l'aide d'un algorithme.

Voici le code Python correspondant :

```
u = 2
for k in range(5):
    u = 2 * u + 3
print(u)
```

- Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant en simulant l'algorithme à la main :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	2	...	...	...	...	...

- Quelle valeur affiche `print(u)` à la fin de l'algorithme?
- Que faut-il modifier dans le code pour calculer u_{10} à la place de u_5 ?

Exercice 21

On considère la suite géométrique (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n$.

On souhaite calculer la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$ à l'aide d'un algorithme avec accumulateur.

Voici le code Python :

```
u = 3
S = 3
for k in range(4):
    u = 2 * u
    S = S + u
print(S)
```

- Simuler l'algorithme à la main en complétant le tableau :

Valeur de k	0	1	2	3	fin
Valeur de u après la boucle	...	...	...	...	...
Valeur de S après la boucle	...	...	...	...	...

- Quelle valeur `print(S)` affiche-t-il?
- Vérifier ce résultat en utilisant la formule de somme géométrique.

Exercice 22

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par la relation de récurrence :

$$u_0 = 7 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 5.$$

- Calculer u_1 , u_2 et u_3 . Conjecturer la nature de la suite (u_n) .
- Démontrer que la suite (u_n) est arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
- Exprimer u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- Calculer u_{10} , puis déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 100$.

Exercice 23 ♦♦

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = 3n + 4.$$

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 .
2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire que (u_n) est une suite arithmétique et préciser sa raison.
3. Un élève affirme : « la suite (u_n) est croissante car $u_0 < u_1 < u_2$ ». Expliquer pourquoi cet argument est insuffisant, puis donner une justification rigoureuse.
4. Déterminer le rang n à partir duquel $u_n > 40$.

Exercice 24 ♦♦

Une entreprise de livraison traite 20 colis lors de sa première journée d'activité ($n = 0$), puis augmente sa capacité de 6 colis supplémentaires chaque jour.

On note u_n le nombre de colis traités le jour de rang n .

1. Écrire la relation de récurrence vérifiée par (u_n) , puis démontrer que (u_n) est une suite arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_{19} .
3. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$, qui représente le nombre total de colis traités durant les 20 premiers jours d'activité.
4. Au bout de combien de jours l'entreprise aura-t-elle traité en tout au moins 3 000 colis ? (On pourra poser une inéquation et la résoudre.)

Exercice 25 ♦♦

Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_1 = 8$ et $u_5 = 20$.

1. Déterminer la raison r et le premier terme u_0 de la suite (u_n) .
2. Exprimer u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Calculer la somme $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$.
4. On pose $T_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ pour tout entier $n \geq 1$. Exprimer T_n en fonction de n , puis déterminer le plus petit entier n tel que $T_n > 500$.

Exercice 26 ♦♦

Une culture bactérienne contient 3 millions de bactéries à l'instant initial ($n = 0$). Toutes les heures, la population double.

On note u_n le nombre de millions de bactéries après n heures.

1. Écrire la relation de récurrence vérifiée par (u_n) , puis démontrer que (u_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. On additionne les huit relevés de population effectués aux instants 0 h, 1 h, ..., 7 h. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$ de ces relevés, exprimée en millions.
4. À l'aide d'un tableau de valeurs ou d'essais successifs, calculer u_5 et u_6 , puis déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 100$. Interpréter le rang obtenu en heures.

Exercice 27 ♦♦

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 256$ et, pour tout entier naturel n , par

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n.$$

1. Reconnaître directement, à partir de la relation de récurrence, que (u_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer u_3 et u_7 .
4. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$. En déduire la somme $T = u_1 + u_2 + \dots + u_7$.
5. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$:

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = 512 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right).$$

Que se passe-t-il quand n devient très grand ?

Exercice 28

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = -4n + 30.$$

1. Calculer u_0, u_1 et u_2 .
2. Démontrer que (u_n) est une suite arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
3. Étudier le sens de variation de (u_n) en utilisant la raison. Justifier rigoureusement.
4. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles $u_n > 0$, puis celles pour lesquelles $u_n \leq 0$.
5. Soit la suite (v_n) définie par $v_n = u_n^2$. Les termes v_0, v_1, v_2 sont-ils dans le même ordre croissant ou décroissant ? Expliquer pourquoi (v_n) n'est pas monotone.

Exercice 29

Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $r = 3$.

1. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_5 et u_{16} .
2. Étudier le sens de variation de (u_n) . Rédiger la démonstration en utilisant le signe de $u_{n+1} - u_n$.
3. On pose $v_n = u_n - 3n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est constante. Quelle est cette constante ?
4. Soit (w_n) définie par $w_n = \frac{1}{u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Calculer w_0, w_1, w_2 .
 - b) Montrer que (w_n) est strictement décroissante.

Exercice 30

Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = \frac{3}{4}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 (en fractions).
2. Démontrer que la suite (u_n) est strictement décroissante en utilisant la méthode du quotient. Justifier que $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. On pose $v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Calculer v_n .
 - b) Interpréter le signe de v_n au regard du sens de variation de (u_n) .
5. On considère la suite (w_n) définie par $w_n = \frac{1}{u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (w_n) est une suite géométrique et préciser sa raison.

Exercice 31

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3} \right)^n$.

1. Reconnaître directement, à partir de sa forme explicite, que (u_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Étudier le sens de variation de (u_n) :
 - a) en calculant et étudiant le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$;
 - b) en calculant et étudiant la différence $u_{n+1} - u_n$ (en factorisant le résultat).
 Vérifier que les deux méthodes donnent la même conclusion.
3. Pour tout entier naturel n , on pose $v_n = \frac{1}{u_n}$. Exprimer v_n en fonction de n , puis montrer que (v_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
4. En déduire le sens de variation de (v_n) sans nouveau calcul, puis comparer ce comportement à celui de (u_n) .

Exercice 32 ♦♦

Yasmine place 800 € sur un livret d'épargne rémunéré à 3 % par an. On note C_n le capital (en euros) disponible après n années.

1. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n , puis montrer que (C_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer C_n en fonction de n .
3. Étudier le sens de variation de (C_n) en justifiant rigoureusement. Interpréter le résultat dans le contexte du problème.
4. Calculer C_5 (arrondi au centime). Interpréter.
5. Yasmine souhaite que son capital dépasse 1 200 €. Déterminer graphiquement ou par essais successifs le plus petit entier n pour lequel $C_n > 1\,200$. (On admet que $1,03^{14} \approx 1,513$ et $1,03^{13} \approx 1,469$.)

Exercice 33 ♦♦

Une forêt compte 2 400 arbres. Un exploitant forestier prélève 80 arbres par an (coupe sans replantation). On note P_n le nombre d'arbres présents après n années.

1. Modéliser la situation : exprimer P_{n+1} en fonction de P_n , puis montrer que (P_n) est une suite arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer P_n en fonction de n .
3. Étudier le sens de variation de (P_n) et interpréter dans le contexte du problème.
4. Pour quelles valeurs de n le nombre d'arbres est-il strictement positif ? Déterminer au bout de combien d'années la forêt sera complètement épuisée.
5. Un biologiste recommande de ne jamais descendre en dessous de 1 000 arbres. À partir de quelle année cette limite est-elle franchie ?

Exercice 34 ♦♦

Kévin place 2 000 € sur un compte d'épargne rémunéré au taux annuel de 5 %. On note K_n le capital disponible (en euros) après n années.

1. Modéliser la situation. Montrer que (K_n) est une suite géométrique et exprimer K_n en fonction de n .
2. Calculer K_5 (arrondi au centime). Interpréter.
3. On souhaite déterminer le plus petit entier n tel que $K_n \geq 3\,000$.
 - a) Traduire cette condition sous la forme d'une inéquation faisant intervenir n .
 - b) Lire et expliquer le programme Python suivant, qui utilise une boucle `while` pour trouver ce rang :

$K = 2000$

$n = 0$

while $K < 3000$:

$K = K * 1.05$

$n = n + 1$

print(f"n={n}, K={K:.2f}")

- Exécuter mentalement les trois premiers tours de boucle pour vérifier le fonctionnement du programme.
- Donner le résultat affiché et l'interpréter par rapport au premier rang où le capital atteint ou dépasse 3 000 €.

Exercice 35

Une ville comptait 1 200 habitants au début de l'année 2020 ($n = 0$). Sa population augmente de 50 habitants par an. On note N_n le nombre d'habitants au début de l'année 2020 + n .

- Modéliser la situation. Montrer que (N_n) est une suite arithmétique et exprimer N_n en fonction de n .
- Calculer la population au début de l'année 2031.
- On souhaite calculer la somme des douze relevés de population effectués au début des années 2020 à 2031 (soit $n = 0$ à $n = 11$). Calculer $S = N_0 + N_1 + \dots + N_{11}$, puis préciser ce que cette somme représente.
- On cherche à partir de quelle année la population dépasse 2 000 habitants. Analyser le programme Python suivant :

$N = 1200$

$n = 0$

while $N \leq 2000$:

$N = N + 50$

$n = n + 1$

print("Annee :", 2020 + n)

print("Population :", N)

- Expliquer ce que fait chaque ligne du programme.
- Donner le résultat affiché sans exécuter le programme, en justifiant par un calcul algébrique.
- Vérifier en calculant N_{16} et N_{17} .

Exercice 36

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = n^2 - 5n + 8.$$

- Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
- La suite (u_n) est-elle définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence ? Justifier.
- Étudier le sens de variation de (u_n) en calculant $u_{n+1} - u_n$ et en étudiant son signe.
- En déduire pour quels entiers n la suite est décroissante, puis croissante. Préciser le(s) terme(s) minimal/minimaux.
- On pose $f(x) = x^2 - 5x + 8$ pour tout réel $x \geq 0$. Calculer la dérivée $f'(x)$, étudier son signe, et comparer les variations de f avec celles de (u_n) .

Exercice 37

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 20$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 3.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 (on donnera des valeurs exactes).
2. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier en calculant $u_1 - u_0$ et $u_2 - u_1$, puis u_1/u_0 et u_2/u_1 .
3. Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de u_n . En déduire que si $u_n > 6$, alors $u_{n+1} < u_n$.
4. Admettre que $u_n > 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et en déduire que la suite (u_n) est strictement décroissante.
5. Un élève conjecture que (u_n) tend vers 6. Vérifier que si $L = \frac{L}{2} + 3$, alors $L = 6$. Interpréter.

Exercice 38

Théo achète un véhicule d'occasion à 18 000 €. Ce véhicule perd 12 % de sa valeur chaque année. On note V_n la valeur du véhicule (en euros) après n années.

1. Expliquer pourquoi $V_0 = 18\,000$, puis exprimer V_{n+1} en fonction de V_n .
2. Montrer que (V_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison q et son premier terme.
3. Exprimer V_n en fonction de n .
4. Calculer V_3 (arrondi à l'euro). Interpréter dans le contexte du problème.
5. Théo souhaite revendre son véhicule avant que sa valeur ne tombe en dessous de 9 000 €.
 - a) Écrire une inéquation traduisant cette condition.
 - b) À l'aide d'une calculatrice, d'un tableau de valeurs ou d'essais successifs, calculer V_5 et V_6 , arrondies à l'euro, puis identifier le premier anniversaire auquel la valeur est inférieure à 9 000 €.
 - c) Conclure : à quel anniversaire Théo doit-il vendre au plus tard son véhicule ?

Exercice 39

Lucie hérite de 3 000 € et souhaite les placer. Deux offres s'offrent à elle :

- **Offre A** : placement à intérêts composés au taux annuel de 7 %. On note A_n le capital après n années.
- **Offre B** : placement à intérêts simples : Lucie reçoit chaque année 210 € d'intérêts (indépendamment du capital accumulé). On note B_n le capital après n années.

1. **Offre A.**
 - a) Montrer que (A_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et exprimer A_n en fonction de n .
 - b) Calculer A_5 (arrondi au centime).
2. **Offre B.**
 - a) Montrer que (B_n) est une suite arithmétique. Préciser sa raison et exprimer B_n en fonction de n .
 - b) Calculer B_5 .
3. **Comparaison.**
 - a) Calculer A_{10} (arrondi au centime) et B_{10} . Quelle offre est plus avantageuse après 10 ans ?
 - b) Pour $n = 1$ et $n = 2$, comparer A_n et B_n . Conjecturer à partir de quel rang l'offre A devient plus avantageuse.
 - c) Pour tout entier $n \geq 1$, comparer les accroissements $A_{n+1} - A_n$ et $B_{n+1} - B_n$. En déduire, dans ce cas précis, que $A_n > B_n$ pour tout entier $n \geq 2$.

Exercice 40

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n}.$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 (on donnera des valeurs exactes sous forme de fractions).
2. **Conjecture.** À partir des valeurs calculées, émettre une conjecture sur le comportement de la suite (u_n) pour $n \geq 1$: la suite semble-t-elle monotone ? De quelle valeur les termes semblent-ils se rapprocher ?
3. On pose ℓ un réel vérifiant $\ell = \frac{\ell^2 + 3}{2\ell}$. Résoudre cette équation pour $\ell > 0$ et interpréter géométriquement le résultat.
4. On admet que $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Étudier le signe de $u_{n+1} - \sqrt{3}$ en fonction du signe de $u_n - \sqrt{3}$. En déduire que, pour tout entier $n \geq 1$, on a $u_n \geq \sqrt{3}$.
5. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, la suite (u_n) est décroissante.
6. **Conclusion.** À partir des questions 4 et 5, établir que, pour tout entier $n \geq 1$,

$$\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq u_n.$$

Expliquer en quoi cet encadrement renforce la conjecture de la question 2, sans constituer une preuve de limite.

Exercice 41

On considère deux suites (a_n) et (b_n) définies pour tout entier naturel n par :

$$a_n = 3n + 2 \quad \text{et} \quad b_n = 2 \times 3^n.$$

1. **Nature des suites.**
 - a) Montrer que (a_n) est arithmétique. Préciser son premier terme et sa raison.
 - b) Montrer que (b_n) est géométrique. Préciser son premier terme et sa raison.
 - c) Comparer a_0 et b_0 .
2. **Comparaison terme à terme.** On cherche à déterminer les entiers n pour lesquels $b_n > a_n$.
 - a) Vérifier que $b_1 > a_1$.
 - b) Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, on a $b_n > a_n$. On pourra raisonner par récurrence.
3. **Sommes.**
 - a) Calculer $S_A = \sum_{k=0}^9 a_k$.
 - b) Calculer $S_G = \sum_{k=0}^9 b_k$.
 - c) Calculer $S_G - S_A$ et interpréter ce résultat.
4. **Question ouverte.** Trouver la plus petite valeur de n pour laquelle $S_G^{(n)} > 100 \times S_A^{(n)}$, où $S_A^{(n)} = \sum_{k=0}^n a_k$ et $S_G^{(n)} = \sum_{k=0}^n b_k$. Justifier la démarche.

Exercice 42

Pour tout entier naturel n , on pose

$$u_n = 2 \left(\frac{3}{4} \right)^n \quad \text{et} \quad S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

1. Calculer u_0 , u_1 , u_2 , puis S_0 , S_1 et S_2 . Émettre une conjecture sur le comportement de (S_n) .

2. À l'aide de la formule de la somme des termes d'une suite géométrique, montrer que, pour tout entier naturel n ,

$$S_n = 8 \left(1 - \left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} \right).$$

3. Montrer que $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} > 0$ et que $S_n < 8$. Interpréter ces deux résultats.
 4. Calculer S_{10} , S_{30} et S_{100} , arrondis au millième. À partir de ces seules observations numériques, conjecturer le comportement de S_n lorsque n devient grand.
 5. On définit maintenant

$$v_n = 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n \quad \text{et} \quad T_n = \sum_{k=0}^n v_k.$$

Établir une expression de T_n , montrer que $T_n < 6$, puis calculer T_{10} . À ce rang, laquelle des deux sommes est la plus proche de la valeur qu'elle semble approcher ? Justifier numériquement.

Exercice 43

Une réserve naturelle contient initialement 600 individus d'une espèce protégée. Chaque année, 20 % de la population disparaît (mortalité et migrations) et 200 individus sont réintroduits par les gestionnaires.

On note u_n le nombre d'individus au début de l'année n (avec $n = 0$ pour l'année initiale), de sorte que :

$$u_0 = 600 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 0,8 u_n + 200.$$

- Calculer u_1 , u_2 et u_3 . La population semble-t-elle croître, décroître, se stabiliser ?
- Point d'équilibre.** On cherche un réel ℓ tel que, si $u_n = \ell$, alors $u_{n+1} = \ell$.
 a) Résoudre l'équation $0,8 \ell + 200 = \ell$.
 b) Interpréter biologiquement la valeur ℓ trouvée.
- Suite auxiliaire.** On pose $v_n = u_n - \ell$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique. Préciser son premier terme et sa raison.
 b) Exprimer v_n en fonction de n , puis u_n en fonction de n .
- Monotonie et observation numérique.** Montrer que la suite (u_n) est croissante et majorée par ℓ . À l'aide de l'expression explicite, calculer u_5 , u_{10} et u_{20} , arrondis au dixième, puis conjecturer le comportement à long terme de la population.
- Problème d'optimisation.** Les gestionnaires envisagent de modifier le taux de réintroduction de 200 à c individus par an (le taux de disparition restant 20 %).
 a) Déterminer, en fonction de c , la population d'équilibre $\ell(c)$.
 b) Quelle valeur minimale de c garantit un équilibre d'au moins 1 500 individus ?

Exercice 44

Un ménage contracte un emprunt immobilier de 120 000 € auprès d'une banque. Le taux d'intérêt mensuel est de 0,5 %. Le ménage rembourse 800 € par mois.

On note C_n le capital restant dû au début du mois n (avec $C_0 = 120\,000$).

1. **Mise en équation.** Justifier que, pour tout entier naturel n :

$$C_{n+1} = 1,005 C_n - 800.$$

- Calculer C_1 et C_2 (arrondir à l'euro si nécessaire).
- Résolution.**
 a) Trouver le réel L tel que $1,005 L - 800 = L$.
 b) En posant $v_n = C_n - L$, montrer que (v_n) est géométrique et préciser sa raison.
 c) Exprimer C_n en fonction de n .

4. **Durée de remboursement.** Déterminer le nombre de mensualités nécessaires pour solder l'emprunt, c'est-à-dire le plus petit entier n tel que $C_n \leq 0$.
5. **Script Python.** Le script source suivant simule le remboursement selon le modèle. Expliquer le rôle de la boucle, puis indiquer ce qu'affiche la variable n à la fin de l'exécution.

$C = 120000$

$t = 0.005$

$m = 800$

$n = 0$

while $C > 0$:

$C = (1 + t) * C - m$

$n = n + 1$

print(n)

Exercice 45

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3.$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 (valeurs exactes). Ces valeurs semblent-elles se rapprocher d'une valeur ?
2. **Point fixe.** On cherche un réel ℓ tel que $\frac{1}{2}\ell + 3 = \ell$.
 - a) Résoudre cette équation.
 - b) On pose $v_n = u_n - \ell$. Montrer que (v_n) est géométrique, préciser sa raison et son premier terme.
3. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
4. **Variations.**
 - a) Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n .
 - b) En déduire le sens de variation de (u_n) .
5. **Encadrement.** Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $5 \leq u_n < 6$.
6. **Généralisation.** On remplace $u_0 = 5$ par $u_0 = 8$. Sans refaire tous les calculs, donner la nouvelle expression de u_n et le nouveau sens de variation. Justifier.

Exercice 46

Une usine produit 10 000 pièces lors de sa première année de fonctionnement. Chaque année suivante, la production diminue de 10 % par rapport à l'année précédente (usure des machines).

On note u_n la production de l'année n (avec $u_0 = 10\,000$ pour la première année).

1. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n . Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser premier terme et raison.
2. Exprimer u_n en fonction de n . Calculer u_5 et u_{10} (valeurs arrondies à l'unité).
3. **Production cumulée.** On note $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ la production totale cumulée sur les $(n+1)$ premières années.
 - a) Montrer que $S_n = 100\,000 \times \left(1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}\right)$.
 - b) Calculer S_4 et S_{19} (arrondir à l'unité).
 - c) Calculer aussi S_{49} , arrondi à l'unité. À partir des valeurs obtenues, conjecturer la valeur dont S_n semble se rapprocher lorsque n devient grand. Interpréter cette conjecture dans le contexte industriel.

- Seuil.** Déterminer le plus petit entier n tel que la production cumulée S_n dépasse 90 000 pièces. On justifiera la démarche par un calcul exact, puis on vérifiera numériquement.
- Comparaison.** Une usine concurrente maintient une production constante de 5 000 pièces par an. À partir de quel rang la production cumulée de cette usine dépasse-t-elle celle de la première usine ?

Exercice 47

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = n^2 + n + 1$.

On pose $d_n = u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
- La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Est-elle géométrique ? Justifier.
- Calculer d_0, d_1, d_2 et d_3 . Émettre une conjecture sur la nature de la suite (d_n) .
- Démontrer cette conjecture en calculant d_n en fonction de n , puis $d_{n+1} - d_n$.
- En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .
- Exploration Python.** Écrire un programme Python qui affiche, pour n allant de 0 à 20, les valeurs de u_n et d_n . Vérifier les résultats des questions précédentes.

Exercice 48

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{3}.$$

- Calculer u_1, u_2 et u_3 .
- Nature de la suite.** Justifier directement à partir de la relation de récurrence que (u_n) est géométrique. Préciser son premier terme et sa raison. En déduire l'expression de u_n en fonction de n .
- Variations.**
 - Montrer, par récurrence, que $u_n > 0$ pour tout entier naturel n .
 - En déduire que la suite (u_n) est strictement décroissante.
- Observation numérique.**
 - Montrer que (u_n) est minorée par 0.
 - Calculer u_4, u_6 et u_8 , puis en donner des valeurs approchées. Conjecturer le comportement de la suite à partir de ces résultats.
- Seuil.** À l'aide d'une calculatrice, d'un tableau de valeurs ou d'essais successifs, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < 10^{-3}$. Justifier qu'il est minimal en comparant deux termes consécutifs.
- Exploration.** On conserve $u_0 = 2$ et on remplace la relation précédente par $u_{n+1} = r u_n$. Pour chacune des valeurs suivantes de r : $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, -1$ et 2 , calculer les cinq premiers termes, observer leur comportement et formuler une conjecture.

Exercice 49

On étudie l'évolution d'une population de bactéries dans deux modèles différents. La population initiale est de 100 individus.

Modèle 1 — Croissance géométrique. On suppose que la population augmente de 5 % par génération. On note u_n le nombre d'individus à la génération n .

Modèle 2 — Croissance logistique. La population est limitée par les ressources disponibles (capacité maximale : $K = 500$ individus). On note v_n le nombre d'individus à la génération n , avec la relation de récurrence :

$$v_{n+1} = v_n + 0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right), \quad v_0 = 100.$$

1. Modèle 1.

- Écrire la relation de récurrence vérifiée par (u_n) .
- Montrer que (u_n) est géométrique et exprimer u_n en fonction de n .
- Calculer $\sum_{k=0}^9 u_k$, c'est-à-dire la somme des effectifs modélisés sur 10 générations.
- À partir de quelle génération la population dépasse-t-elle 500 individus?

2. Modèle 2.

- Calculer v_1 et v_2 .
- Montrer que, si $0 < v_n < 500$, alors $0 < v_{n+1} < 500$. En déduire par récurrence que $0 < v_n < 500$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- Comparer v_{n+1} et v_n lorsque $0 < v_n < 500$. Conclure sur le sens de variation de (v_n) .

- Comparaison et Python.** Le script suivant simule les deux modèles. Indiquer ce qu'affiche ce script, puis expliquer pourquoi les deux populations se comportent très différemment à long terme.

`u = 100`

`v = 100`

```
for n in range(1, 21):
    u = 1.05 * u
    v = v + 0.05 * v * (1 - v / 500)
    if n in [5, 10, 20]:
        print(f"n={n} : u={u:.1f}, v={v:.1f}")
```

Exercice 50

Une entreprise place 500 € sur un compte dont la valeur augmente de 8 % chaque année. On note v_n la valeur du placement (en euros) après n années.

- Montrer que (v_n) est géométrique et exprimer v_n en fonction de n .
- La fonction `premier_depassement` ci-dessous reçoit une valeur initiale, un taux et un seuil.

```
def premier_depassement(valeur_initiale, taux, seuil):
    valeur = valeur_initiale
    n = 0
    while valeur <= seuil:
        valeur = valeur * (1 + taux)
        n = n + 1
    return n, valeur
```

```
n, v = premier_depassement(500, 0.08, 2000)
print(f"n={n}, v={v:.2f}")
```

- Expliquer le rôle des paramètres, de la boucle et de la valeur renvoyée.
 - Prévoir le résultat affiché par l'appel fourni. Vérifier en calculant v_{18} et v_{19} , puis interpréter.
- Modifier seulement l'appel de la fonction afin de déterminer le premier rang où le placement dépasse le seuil de 2 500 €. Prévoir le résultat, puis le vérifier en calculant v_{20} et v_{21} .

Exercice 51

On considère les suites

$$a_n = 1 + \frac{1}{n+1}, \quad b_n = 3n + 2, \quad c_n = 2 + (-1)^n.$$

1. Calculer leurs termes aux rangs 0, 1, 2, 5 et 10.
2. À l'aide de la calculatrice, représenter pour $0 \leq n \leq 10$ les points $(n; a_n)$, $(n; b_n)$ et $(n; c_n)$, en distinguant les trois nuages. Décrire ce que montre chaque représentation.
3. Associer à chaque suite l'un des comportements intuitifs suivants : rapprochement d'une valeur finie, croissance sans borne apparente, absence de rapprochement vers une valeur unique. Pour la première suite, conjecturer la valeur observée.
4. Rédiger chaque conclusion en précisant qu'elle repose ici sur des observations numériques et graphiques, sans démonstration formelle.

Coup de pouce 1. Calcule le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à partir de la formule $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n$ et simplifie : il doit être constant.

Coup de pouce 1. Remplace n successivement par 0, 1 et 2 directement dans la formule $u_n = 3n + 2$.

Coup de pouce 1. Pour calculer u_1 , remplace n par 0 dans $u_{n+1} = 3u_n - 2$ en utilisant $u_0 = 5$; répète le procédé pour u_2 puis u_3 .

Coup de pouce 1. Remplace n par chaque valeur demandée dans $u_n = n^2 - 2n + 3$, en calculant d'abord le carré, puis le produit, puis la somme.

Coup de pouce 1. Pour calculer v_2 , utilise $v_2 = v_1 + v_0$ avec les valeurs données ; puis calcule $v_3 = v_2 + v_1$ en réutilisant les termes déjà trouvés, et ainsi de suite.

Coup de pouce 1. Calcule $u_{n+1} - u_n$ en remplaçant n par $n + 1$ puis par n dans $u_n = 7 + 4n$: le résultat constant obtenu est la raison r .

Coup de pouce 1. Utilise la formule du terme général $u_n = u_0 + n \times r$ avec $u_0 = 100$ et $r = -3$.

Coup de pouce 1. Applique $u_n = u_p + (n - p) \times r$ avec $n = 0$ et $p = 5$: tu obtiens $u_0 = u_5 - 5 \times r$.

Coup de pouce 1. Calcule le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à partir de $u_n = 6 \times 2^n$ et simplifie.

Coup de pouce 1. Utilise $u_{n+1} = q \times u_n$ avec $q = \frac{1}{3}$ pour calculer u_1 , puis réutilise ce résultat pour calculer u_2 , et ainsi de suite.

Coup de pouce 1. Dans la formule $S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$, ici $n = 5$: identifie u_0 et u_5 à partir de la liste calculée à la question 1.

Coup de pouce 1. Dans $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, il y a 8 termes (u_0 à u_7), donc $n = 7$; remplace $u_0 = 1$ et $q = 2$.

Coup de pouce 1. Applique la formule avec $n = 50$: $S = \frac{50 \times 51}{2}$.

Coup de pouce 1. Calcule $u_{n+1} - u_n = (3 + 5(n + 1)) - (3 + 5n)$ et développe avant de conclure sur son signe.

Coup de pouce 1. Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ vaut directement le coefficient multiplicateur $\frac{3}{4}$: compare-le à 1 pour conclure sur les variations.

Coup de pouce 1. Calcule $f'(x) = 2x - 4$, puis résous l'inéquation $2x - 4 \geq 0$ pour déterminer le signe de f' sur $[0; +\infty[$.

Coup de pouce 1. Le montant fixe versé chaque mois (30 €) qui s'ajoute au coût précédent est le signe d'une évolution absolue constante : reconnais une suite arithmétique de raison 30.

Coup de pouce 1. Une augmentation de 5 % correspond au coefficient multiplicateur $1 + \frac{5}{100} = 1,05$.

Coup de pouce 1. Une croissance de 2 % par heure correspond à une multiplication par un coefficient constant à chaque étape : c'est le signe d'une suite géométrique de raison 1,02.

Coup de pouce 1. À chaque tour de boucle, applique $u \leftarrow 2u + 3$ à la valeur de u obtenue au tour précédent, en partant de $u = 2$.

Coup de pouce 1. À chaque tour de boucle, mets d'abord à jour u (multiplication par 2), puis ajoute cette nouvelle valeur de u à S .

Temps 7 — TD contextualisé : Décroissance radioactive

Contexte. Le carbone-14 est un isotope radioactif utilisé en archéologie pour dater des matières organiques. Un échantillon de 100 g de carbone-14 perd 1,21 % de sa masse chaque siècle. On note M_n la masse (en grammes) de l'échantillon après n siècles.

Exercice 52

Partie A — Modélisation par une suite géométrique

1. Quel est le coefficient multiplicateur correspondant à une perte de 1,21 % ? En déduire la relation M_{n+1} en fonction de M_n .
2. Montrer que (M_n) est une suite géométrique. Préciser son premier terme M_0 et sa raison q .
3. Exprimer M_n en fonction de n .
4. Calculer M_1 , M_{10} et M_{100} (arrondir à deux décimales). Interpréter M_{100} .

Corrigé

Question 1. Une perte de 1,21 % correspond au coefficient multiplicateur :

$$q = 1 - \frac{1,21}{100} = 1 - 0,0121 = 0,9879.$$

D'où la relation de récurrence :

$$M_{n+1} = 0,9879 \times M_n.$$

Question 2. Le rapport $\frac{M_{n+1}}{M_n} = 0,9879$ est constant, et $M_0 = 100 \neq 0$. Donc (M_n) est une suite géométrique de premier terme $M_0 = 100$ (en grammes) et de raison $q = 0,9879$.

Question 3. Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$M_n = M_0 \times q^n = 100 \times 0,9879^n.$$

Question 4.

$$M_1 = 100 \times 0,9879 = 98,79 \text{ g,}$$

$$M_{10} = 100 \times 0,9879^{10} \approx 100 \times 0,8854 \approx 88,54 \text{ g,}$$

$$M_{100} = 100 \times 0,9879^{100} \approx 100 \times 0,2960 \approx 29,60 \text{ g.}$$

Après 100 siècles (soit 10 000 ans), il ne reste plus qu'environ 29,60 g sur les 100 g initiaux.

Exercice 53

Partie B — Demi-vie et sens de variation

1. Montrer que la suite (M_n) est strictement décroissante. Justifier à partir de la valeur de la raison.
2. La **demi-vie** est le rang n à partir duquel la masse est inférieure ou égale à la moitié de la masse initiale. Formuler l'inégalité à résoudre : $M_n \leq 50$.
3. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous pour $n \in \{50, 55, 56, 57, 60\}$.
4. En déduire la demi-vie du carbone-14 exprimée en siècles, puis en années.

n	50	55	56	57	60
M_n (arrondi à 0,01 g)					
$M_n \leq 50$?					

Corrigé

Question 1. La raison est $q = 0,9879$, qui vérifie $0 < q < 1$. Tous les termes M_n sont strictement positifs (car $M_0 = 100 > 0$ et $q > 0$). Or :

$$M_{n+1} - M_n = 0,9879 M_n - M_n = (0,9879 - 1)M_n = -0,0121 M_n < 0$$

puisque $M_n > 0$. Donc $M_{n+1} < M_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite est strictement décroissante.

Question 2. La demi-vie est le plus petit entier n tel que :

$$M_n \leq 50, \text{ soit } 100 \times 0,9879^n \leq 50, \text{ soit } 0,9879^n \leq 0,5.$$

Question 3. Tableau de valeurs :

n	50	55	56	57	60
M_n (g)	54,41	51,19	50,57	49,96	48,17
$M_n \leq 50$?	Non	Non	Non	Oui	Oui

Détail : $M_{56} = 100 \times 0,9879^{56} \approx 50,57$ g et $M_{57} = 100 \times 0,9879^{57} \approx 49,96$ g.

Question 4. Le plus petit entier n tel que $M_n \leq 50$ est $n = 57$. La demi-vie est donc de **57 siècles**, soit **5 700 ans** (la demi-vie réelle du carbone-14 est de 5 730 ans : excellente approximation).

Exercice 54 ♦♦

Partie C — Simulation en Python

1. Écrire un programme Python qui affiche les valeurs de M_n pour n allant de 0 à 100 (par pas de 10).
2. Écrire un programme Python qui détermine automatiquement la demi-vie, c'est-à-dire le plus petit entier n tel que $M_n \leq 50$.
3. Lire le programme ci-dessous et indiquer ce qu'il affiche, sans l'exécuter.

Programme à lire (question 3) :

```
q = 0.9879
M = 100
n = 0
while M > 50 :
    M = q * M
    n = n + 1
print("Demi-vie :", n, "siècles")
print("Masse :", round(M, 2), "g")
```

Corrigé

Question 1. Programme d'affichage des valeurs de M_n pour $n \in \{0, 10, 20, \dots, 100\}$:

```
# Affichage de M_n pour n = 0, 10, 20, ..., 100
q = 0.9879
for n in range(0, 101, 10):
    M_n = 100 * q**n
    print(f"n = {n} siècles : M_n = {round(M_n, 2)} g")
```

Question 2. Programme de recherche de la demi-vie (boucle while) :

```
# Recherche du premier n tel que M_n <= 50
q = 0.9879
M = 100.0
```

```

n = 0
while M > 50 :
    M = q * M
    n = n + 1
print("Demi-vie :", n, "siècles, soit", n * 100, "ans")
print("Masse atteinte :", round(M, 2), "g")

```

Le programme affiche :

- ▶ Demi-vie : 57 siècles, soit 5700 ans
- ▶ Masse atteinte : 49.96 g

Question 3. Analyse du programme donné :

La variable M est initialisée à 100 (valeur de M_0) et n à 0. La boucle `while M > 50` applique à chaque itération la relation $M \leftarrow 0,9879 \times M$ et incrémente n . La boucle s'arrête dès que $M \leq 50$.

D'après les résultats de la partie B, cela se produit pour $n = 57$.

Le programme affiche :

```

Demi-vie : 57 siècles
Masse : 49.96 g

```

Exercice 55

Partie D — Synthèse

- Pourquoi dit-on que le carbone-14 perd « toujours la même proportion » de sa masse, et non « toujours la même quantité » ? Quel type de suite cela induit-il ?
-  **Oral** Question orale. « Expliquer la différence entre une évolution absolue constante et une évolution relative constante. Donner un exemple concret de chaque, puis préciser quel type de suite modélise chacune des deux situations. »

Corrigé

Question 1. Le carbone-14 perd chaque siècle 1,21 % de sa masse *courante*, et non une quantité fixe en grammes. Par exemple :

- ▶ Au rang 0 : la perte est $100 \times 0,0121 = 1,21$ g.
- ▶ Au rang 50 : la perte est environ $54,41 \times 0,0121 \approx 0,66$ g.

La quantité perdue diminue au fil du temps car elle est proportionnelle à la masse restante. C'est une **évolution relative constante** (taux constant de $-1,21\%$), ce qui caractérise une **suite géométrique**.

Question 2 — Éléments de réponse orale.

Évolution absolue constante : la quantité ajoutée (ou retranchée) à chaque étape est la même, quelle que soit la valeur courante. Exemple : un épargnant qui verse 200 € par mois sur un livret sans intérêts. Le capital augmente de 200 € chaque mois, qu'il dispose de 1 000 € ou de 10 000 €. Ce modèle est une **suite arithmétique** ($u_{n+1} = u_n + r$, raison r constante).

Évolution relative constante : la quantité ajoutée (ou retranchée) est un pourcentage fixe de la valeur courante. Elle varie donc en valeur absolue d'un terme à l'autre. Exemple : un échantillon radioactif qui perd 1,21 % de sa masse chaque siècle, ou un capital placé à intérêts composés à 4 % par an. Ce modèle est une **suite géométrique** ($u_{n+1} = q \cdot u_n$, raison $q = 1 + t$ constante).

En résumé :

	Suite arithmétique	Suite géométrique
Ce qui est constant	la différence $u_{n+1} - u_n = r$	le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$
Évolution	absolue	relative
Exemple concret	versements mensuels fixes	intérêts composés, radioactivité

Temps 7 — TD fil rouge : Deux offres d'épargne

Situation. Un établissement bancaire propose deux formules d'épargne. On note n le nombre de mois écoulés depuis la souscription.

- **Offre A** : versement fixe de 200 € par mois sur un livret initialement vide et sans intérêts.
- **Offre B** : capital initial de 1 000 € placé à intérêts composés au taux mensuel de 0,4 %.

On note A_n le capital de l'offre A et B_n le capital de l'offre B après n mois.

Exercice 56 ♦♦

Partie A — Offre A : modèle arithmétique

- Exprimer A_n en fonction de n . Quelle est la valeur de A_0 ?
- Montrer que la suite (A_n) est arithmétique. Préciser son premier terme et sa raison.
- Calculer A_{12} , A_{24} et A_{60} . Interpréter ces valeurs.

Corrigé

Question 1. Avant tout versement ($n = 0$), le livret est vide : $A_0 = 0$. Chaque mois, on ajoute 200 €, donc :

$$A_n = 200n.$$

Question 2. On calcule la différence entre deux termes consécutifs :

$$A_{n+1} - A_n = 200(n+1) - 200n = 200.$$

La différence est constante et égale à 200. Donc (A_n) est une suite arithmétique de premier terme $A_0 = 0$ et de raison $r = 200$.

Question 3.

$$A_{12} = 200 \times 12 = 2\,400 \text{ €} \quad (\text{capital après 1 an}),$$

$$A_{24} = 200 \times 24 = 4\,800 \text{ €} \quad (\text{capital après 2 ans}),$$

$$A_{60} = 200 \times 60 = 12\,000 \text{ €} \quad (\text{capital après 5 ans}).$$

Exercice 57 ♦♦

Partie B — Offre B : modèle géométrique

- Exprimer B_{n+1} en fonction de B_n . En déduire que (B_n) est une suite géométrique. Préciser son premier terme et sa raison.
- Exprimer B_n en fonction de n .
- Calculer B_{12} , B_{24} et B_{60} (arrondir à l'euro). Interpréter.

Corrigé

Question 1. Chaque mois, le capital est multiplié par $q = 1,004$ (augmentation de 0,4 %) :

$$B_{n+1} = 1,004 \times B_n.$$

Le rapport $\frac{B_{n+1}}{B_n} = 1,004$ est constant et $B_0 = 1\,000 \neq 0$. Donc (B_n) est une suite géométrique de premier terme $B_0 = 1\,000$ et de raison $q = 1,004$.

Question 2. Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$B_n = B_0 \times q^n = 1\,000 \times 1,004^n.$$

Question 3.

$$B_{12} = 1\,000 \times 1,004^{12} \approx 1\,000 \times 1,0489 \approx 1\,049 \text{ €},$$

$$B_{24} = 1\,000 \times 1,004^{24} \approx 1\,000 \times 1,1005 \approx 1\,101 \text{ €},$$

$$B_{60} = 1\,000 \times 1,004^{60} \approx 1\,000 \times 1,2706 \approx 1\,271 \text{ €}.$$

Sur 5 ans, le solde de l'offre B augmente d'environ 271 €. La comparaison avec le solde de l'offre A doit tenir compte de flux de versements différents : A reçoit 200 € chaque mois, tandis que B ne reçoit que le capital initial de 1 000 €.

Exercice 58 ♦♦

Partie C — À partir de quel mois $B_n > A_n$?

1. Vérifier que $B_5 > A_5$ et que $B_6 \leq A_6$. Que peut-on en conclure sur les tout premiers mois ?
2. Lire et expliquer le programme Python ci-dessous, qui détermine le premier rang n (à partir du rang 10) tel que $B_n > A_n$.
3. Exécuter mentalement les deux premiers tours de boucle (vérifier les valeurs de A, B et n).
4. Donner le rang obtenu, puis montrer que le solde de B reste ensuite supérieur à celui de A en comparant les accroissements mensuels des deux offres.

Programme à exécuter et à analyser :

```
# Recherche du premier mois n (à partir du rang 10) tel que B_n
# dépasse A_n
# A_n = 200*n (offre A : suite arithmétique)
# B_n = 1000 * 1.004**n (offre B : suite géométrique)
n = 10
A = 200 * n
B = 1000 * 1.004**n
while B <= A:
    n = n + 1
    A = 200 * n
    B = 1000 * 1.004**n
print("Premier mois de dépassement après le rang 10 : n =", n)
print("A_n =", A, "euros")
print("B_n =", round(B, 2), "euros")
```

Corrigé

Question 1.

$$A_5 = 200 \times 5 = 1\,000 \text{ €}, \quad B_5 = 1\,000 \times 1,004^5 \approx 1\,020,16 \text{ €}.$$

Donc $B_5 > A_5$: grâce à son capital de départ, le solde de l'offre B est encore le plus élevé au 5^e mois.

$$A_6 = 200 \times 6 = 1\,200 \text{ €}, \quad B_6 = 1\,000 \times 1,004^6 \approx 1\,024,24 \text{ €}.$$

Donc $B_6 \leq A_6$: dès le 6^e mois, le solde de l'offre A devient supérieur à celui de l'offre B.

De plus,

$$B_7 \approx 1\,028,34 < A_7 = 1\,400, \quad B_8 \approx 1\,032,45 < A_8 = 1\,600, \quad B_9 \approx 1\,036,58 < A_9 = 1\,800.$$

Ainsi, le solde de A reste supérieur aux rangs 6 à 9 ; la recherche qui commence au rang 10 ne laisse aucun croisement intermédiaire de côté.

On en conclut que le solde de B, supérieur au démarrage, est dépassé dès le sixième mois. Il faut étudier des rangs beaucoup plus élevés pour savoir si B_n redevient supérieur à A_n .

Question 2. On sait par la question 1 que le solde de l'offre A est supérieur à celui de B au rang 6 et les calculs précédents couvrent les rangs 7 à 9 ; on initialise au rang 10 afin de chercher le croisement beaucoup plus tardif. La boucle `while B ≤ A` tourne tant que le solde de l'offre B n'est pas redevenu supérieur à celui de A. À chaque itération, on incrémente n puis on recalcule les deux capitaux avec les formules explicites. La boucle s'arrête au premier rang $n \geq 10$ tel que $B_n > A_n$.

Question 3. Exécution des deux premiers tours (après l'initialisation au rang 10) :

n	A	B	Condition $B \leq A$
10 (init.)	2 000	1 040,73	Vrai (on entre dans la boucle)
11	2 200	1 044,89	Vrai
12	2 400	1 049,07	Vrai

Question 4. Le programme affiche $n = 1415$. Le premier rang $n \geq 10$ pour lequel $B_n > A_n$ est donc $n = 1415$, soit environ 118 ans — un horizon qui dépasse très largement une vie humaine.

$$A_{1415} = 200 \times 1415 = 283\,000 \text{ €}, \quad B_{1415} = 1\,000 \times 1,004^{1415} \approx 283\,925 \text{ €}.$$

Pour tout $n \geq 1415$,

$$B_{n+1} - B_n = 0,004B_n \quad \text{et} \quad A_{n+1} - A_n = 200.$$

Comme (B_n) est croissante et $0,004B_{1415} \approx 1\,135,70 > 200$, l'accroissement de l'offre B reste supérieur à celui de l'offre A à partir de ce rang. Puisque $B_{1415} > A_{1415}$, un raisonnement par récurrence montre alors que $B_n > A_n$ pour tout $n \geq 1415$.

Exercice 59

Partie D — Synthèse et interprétation économique

1. Quel livret présente le solde le plus élevé au bout de 5 ans ? De 10 ans ? Justifier avec les calculs des parties précédentes et rappeler que les deux modèles reposent sur des flux de versements différents.
2. Expliquer pourquoi la comparaison des accroissements établie dans la partie C garantit que le solde de B reste supérieur après le rang 1415.
3.  **Oral** *Question orale.* « Expliquer en quelques phrases les deux croisements observés entre les soldes. Quel rôle jouent le capital initial, le versement mensuel et les intérêts composés ? »

Corrigé

Question 1.

Sur 5 ans ($n = 60$) : $A_{60} = 12\,000 \text{ €}$ contre $B_{60} \approx 1\,271 \text{ €}$. Le solde de A est le plus élevé.

Sur 10 ans ($n = 120$) : $A_{120} = 24\,000 \text{ €}$ contre $B_{120} = 1\,000 \times 1,004^{120} \approx 1\,615 \text{ €}$. Le solde de A reste le plus élevé.

Conclusion : Sur les horizons de 5 et 10 ans étudiés, le solde de A est supérieur. Ce constat décrit les deux flux choisis ; il ne compare pas deux placements alimentés de la même manière. Les calculs couvrent les rangs 6 à 9, puis le programme vérifie $A_n \geq B_n$ pour les rangs testés de 10 à 1414.

Question 2. Au rang 1 415, le solde de B est supérieur. À partir de ce rang, son accroissement mensuel est supérieur à 200 €, tandis que celui de l'offre A vaut exactement 200 €. La preuve de la partie C montre donc que l'écart en faveur de B ne peut plus se refermer.

Question 3 — Éléments de réponse orale.

Une suite géométrique de raison q légèrement supérieure à 1 croît lentement au début : les premiers termes ne font que multiplier le capital initial par des facteurs proches de 1. En revanche, une suite arithmétique de grande raison r accumule rapidement des montants importants par additions successives.

Le capital initial de l'offre B (1 000 €) est modeste par rapport aux versements mensuels de l'offre A (200 €/mois). Pendant des années, les intérêts composés de 0,4 % par mois sur 1 000 € restent inférieurs aux 200 € mensuels ajoutés dans l'offre A.

Au croisement observé au rang 1 415, les intérêts mensuels de l'offre B dépassent enfin le versement fixe de 200 €. La comparaison des accroissements explique alors, dans ce cas précis, pourquoi l'offre B conserve son avance.

SUITES NUMERIQUES — QCM D'AUTO-EVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 3n + 1$. Quelle est la valeur de u_3 ?
A. 10
B. 19
C. -2
D. 8
2. [Q2] Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = 3v_n - 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Quelle est la valeur de v_2 ?
A. 10
B. 28
C. 34
D. 22

Capacité C8

3. [Q3] On observe une suite dont les termes successifs sont 1, -1, 1, -1, 1, -1, et ce motif se répète. Quelle conjecture intuitive est adaptée ?
A. Elle semble avoir une limite finie égale à 0.
B. Elle semble avoir une limite infinie égale à $+\infty$.
C. Elle semble ne pas avoir de limite.
D. Elle semble avoir une limite finie égale à 1.

Capacité C2

4. [Q4] Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 4n - 7$. Quelle est la raison de cette suite arithmétique ?
A. -7
B. $4n$
C. 4
D. -3
5. [Q5] Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $r = -3$ et de premier terme $u_1 = 8$. Quelle est la valeur de u_6 ?
A. -7
B. -4
C. -10
D. $u_6 = 8 + 6 \times (-3) = -10$

6. [Q6] Parmi les suites suivantes, laquelle est arithmétique ?

- A. $u_n = 3^n$
- B. $u_n = n^2 + 2$
- C. $u_n = 5n - 1$
- D. $u_n = \frac{1}{n+1}$

Capacité C3

7. [Q7] Soit (u_n) la suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 3$. Quelle est la formule explicite de u_n ?

- A. $u_n = 3 + 2n$
- B. $u_n = 3 \times 2^{n-1}$
- C. $u_n = 2 \times 3^n$
- D. $u_n = 3 \times 2^n$

8. [Q8] La suite (v_n) est définie par $v_0 = 6$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Quelle est la raison de cette suite ?

- A. 3
- B. -3
- C. $\frac{1}{3}$
- D. 2

9. [Q9] Parmi les assertions suivantes, laquelle donne la définition exacte d'une suite géométrique ?

- A. Il suffit de vérifier que $u_1/u_0 = u_2/u_1$ pour conclure que la suite est géométrique.
- B. Le quotient u_{n+1}/u_n peut dépendre de n .
- C. Il existe un réel q tel que, pour tout n , $u_{n+1} = qu_n$.
- D. La raison d'une suite géométrique est toujours un entier positif.

Capacité C4

10. [Q10] Quelle est la valeur de la somme $1 + 2 + 3 + \dots + 20$?

- A. 200
- B. 210
- C. 190
- D. 420

11. [Q11] Soit la suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = 3$. Quelle est la valeur de $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$?

- A. 40
- B. 121
- C. 242
- D. 10

12. [Q12] On calcule la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_{14}$ des termes d'une suite arithmétique. Combien y a-t-il de termes dans cette somme ?

- A. 14
- B. 13
- C. 15
- D. 16

Capacité C5

13. [Q13] Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = -4$ et de premier terme $u_0 = 10$. Quel est le sens de variation de cette suite ?

- A. Croissante
- B. Constante
- C. Strictement décroissante
- D. D'abord croissante, puis décroissante

14. [Q14] Pour étudier le sens de variation de la suite (u_n) définie par $u_n = 5 \times (0,8)^n$ avec $u_n > 0$, quelle méthode utilise directement la raison $q = 0,8$?

- A. Methode A : calculer le signe de $u_{n+1} - u_n$.
- B. Methode B : comparer le quotient u_{n+1}/u_n a 1.
- C. Methode C : etudier la derivee de la fonction $f(x) = 5 \times (0,8)^x$.
- D. Calculer les 5 premiers termes et observer la tendance.

15. [Q15] Soit (u_n) la suite definie par $u_n = n^2 - 6n + 5$. A partir de quel rang cette suite est-elle strictement croissante?

- A. Pour tout $n \in \mathbb{N}$
- B. A partir de $n = 3$
- C. A partir de $n = 2$
- D. A partir de $n = 6$

Capacité C6

16. [Q16] Un capital de 2 000 euros est place a un taux annuel de 4 %. Quel est le coefficient multipliateur applicable chaque annee?

- A. 0,04
- B. 1,4
- C. 1,04
- D. 4

17. [Q17] Une ville compte 50 000 habitants et perd 300 habitants par an. Quel modele est le plus adapte pour représenter l'évolution de sa population?

- A. Une suite geometrique, car la population diminue.
- B. Une suite arithmetique, car la variation absolue annuelle est constante (-300) .
- C. Une suite geometrique, car on multiplie chaque annee par un coefficient.
- D. Ni une suite arithmetique ni une suite geometrique.

18. [Q18] Un placement diminue de 5 % par an. Si le capital initial est $u_0 = 10\,000$ euros, quelle est l'expression de u_n (capital apres n annees)?

- A. $u_n = 10\,000 - 500n$
- B. $u_n = 10\,000 \times 1,05^n$
- C. $u_n = 10\,000 \times 0,95^n$
- D. $u_n = 10\,000 \times 0,05^n$

Capacité C7

19. [Q19] On considere le programme Python suivant :
- ```
def terme(n) : u = 2
for k in range(n) : u = 3 * u + 1
return u
```
- Quelle valeur renvoie l'appel `terme(3)` ?

- A. 7
- B. 21
- C. 67
- D. 22

20. [Q20] On cherche le plus petit entier  $n$  tel que  $u_n > 100$ , ou  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = 2u_n$ . Parmi les codes suivants, lequel est correct?

- A. `u = 1` `n = 0` `while u > 100 : u = 2 * u` `n = n + 1`
- B. `u = 1` `n = 0` `while u <= 100 : u = 2 * u` `n = n + 1`
- C. `u = 1` `n = 0` `for k in range(100) : u = 2 * u` `n = n + 1`
- D. `u = 0` `n = 0` `while u <= 100 : u = 2 * u` `n = n + 1`

21. [Q21] On veut calculer  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$  ou  $u_k = 2^k$ . Un eleve ecrit :
- ```
S = 0
for k in range(5) : S = S + 2**k
```
- Quelle erreur contient ce code?

- A. L'accumulateur devrait etre initialise a 1.
- B. `range(5)` produit les indices 0, 1, 2, 3, 4 : le terme $u_5 = 2^5$ est omis. Il faudrait `range(6)`.
- C. Il faut ecrire 2^k et non $2 * k$ en Python.
- D. Il faut une boucle `while` et non `for` pour calculer une somme.

Clé de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	A
Q2	C1	B
Q3	C8	C
Q4	C2	C
Q5	C2	A
Q6	C2	C
Q7	C3	D
Q8	C3	C
Q9	C3	C
Q10	C4	B
Q11	C4	B
Q12	C4	C
Q13	C5	C
Q14	C5	B
Q15	C5	B
Q16	C6	C
Q17	C6	B
Q18	C6	C
Q19	C7	C
Q20	C7	B
Q21	C7	B

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- B — L'élève oublie le terme $-3n$ et calcule seulement $2 \times 3^2 + 1 = 19$. *Renvoi : M1, étape 2.*
- C — L'élève remplace n^2 par n et calcule $2 \times 3 - 3 \times 3 + 1 = -2$. *Renvoi : M1, étape 2.*
- D — L'élève remplace le terme constant $+1$ par -1 et obtient $18 - 9 - 1 = 8$. *Renvoi : M1, étape 2.*

► Q2

- A — L'élève a calculé v_1 uniquement : $v_1 = 3 \times 4 - 2 = 10$, et a confondu v_1 avec v_2 . Arrêt prématuré d'une iteration. *Renvoi : M1, étape 3.*
- C — L'élève a oublié le -2 au premier passage et calcule $v_1 = 3 \times 4 = 12$, puis applique la récurrence au terme suivant : $v_2 = 3 \times 12 - 2 = 34$. *Renvoi : M1, étape 3.*
- D — L'élève a soustrait $v_0 = 4$ au lieu de la constante 2 au premier passage, d'où $v_1 = 3 \times 4 - 4 = 8$, puis $v_2 = 3 \times 8 - 2 = 22$. *Renvoi : M1, étape 3.*

► Q3

- A — Prendre la moyenne 0 des deux valeurs alternées ne décrit pas les termes : ils restent à distance 1 de 0 et ne s'en rapprochent pas. *Renvoi : M8, étape 3.*
- B — Les termes restent égaux à 1 ou -1 ; ils ne deviennent pas arbitrairement grands. *Renvoi : M8, étape 3.*
- D — Un terme sur deux vaut -1 : la suite ne se rapproche pas de 1, elle continue d'osciller. *Renvoi : M8, étape 3.*

► Q4

- A — L'élève a identifié le terme constant -7 de la formule comme la raison, alors que $-7 = u_0$ est le premier terme. *Renvoi : M2, étape 4.*
- B — L'élève a donné une expression dépendant de n comme raison. La raison d'une suite arithmétique est un réel constant, pas une expression variable. *Renvoi : M2, étape 3.*
- D — L'élève calcule $u_1 = 4 \times 1 - 7 = -3$ et confond ce terme avec la raison. Or $u_0 = -7$ et $u_1 - u_0 = -3 - (-7) = 4$. *Renvoi : M2, étape 3.*

► Q5

- B — L'élève a compté seulement quatre accroissements entre u_1 et u_6 et calcule $8 + 4 \times (-3) = -4$; il y en a cinq, donc $u_6 = 8 + 5 \times (-3) = -7$. *Renvoi : M2, étape 4.*

- C — L'élève a utilisé $u_n = u_0 + nr$ avec $u_0 = 8$ en oubliant que le premier terme donné est u_1 et non u_0 : calcul $8 + 6 \times (-3) = -10$ au lieu de $8 + 5 \times (-3) = -7$. Renvoi : M2, étape 4.
- D — Même erreur que C : formule $u_n = u_1 + n \times r$ au lieu de $u_n = u_1 + (n - 1) \times r$. L'option D présente le calcul erroné de façon explicite. Renvoi : M2, étape 4.

► Q6

- A — La suite $u_n = 3^n$ est géométrique (raison $q = 3$), pas arithmétique. L'élève confond suite géométrique et suite arithmétique. Renvoi : M2, étape 1 ; M3.
- B — La suite $u_n = n^2 + 2$ n'est pas arithmétique : $u_{n+1} - u_n = (n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1$, qui dépend de n . L'élève n'a pas vérifié la constance de la différence. Renvoi : M2, étapes 1-3.
- D — La suite $u_n = 1/(n + 1)$ n'est pas arithmétique : $u_1 - u_0 = 1/2 - 1 = -1/2$ mais $u_2 - u_1 = 1/3 - 1/2 = -1/6$. L'élève n'a pas vérifié la constance de la différence. Renvoi : M2, étapes 1-3.

► Q7

- A — L'élève a appliqué la formule arithmétique $u_n = u_0 + nr$ au lieu de la formule géométrique $u_n = u_0 \times q^n$. Confusion suite arithmétique / géométrique. Renvoi : M3, étape 5.
- B — L'élève a utilisé $u_n = u_1 \times q^{n-1}$ au lieu de $u_n = u_0 \times q^n$. Décalage d'indice : confusion entre premier terme u_0 et premier terme u_1 . Renvoi : M3, étape 5.
- C — L'élève a inversé les rôles du premier terme et de la raison : il a écrit $u_0 = 2$ et $q = 3$ au lieu de $u_0 = 3$ et $q = 2$. Renvoi : M3, étape 5.

► Q8

- A — L'élève a lu le dénominateur 3 comme la raison, en oubliant que la division par 3 correspond à une multiplication par $1/3$. Confusion division / multiplication. Renvoi : M3, étape 2.
- B — L'élève a pris l'opposé -3 au lieu de l'inverse $1/3$. Probable confusion entre signe et valeur de la raison. Renvoi : M3, étape 2.
- D — L'élève a calculé $v_1 = 6/3 = 2$ et a confondu la valeur du premier terme calculée avec la raison. Renvoi : M3, étape 4.

► Q9

- A — Preuve insuffisante : vérifier deux égalités de quotients consécutifs ne prouve pas la constance pour tout n . Il faut un raisonnement général valable pour tout $n \in \mathbb{N}$. Renvoi : M3, étape 4.
- B — Pour une suite géométrique de raison q , la relation $u_{n+1} = qu_n$ utilise le même réel q pour tout n ; il ne dépend pas de l'indice. Renvoi : M3, étape 1.
- D — La raison peut être n'importe quel réel, notamment négative, fractionnaire ou nulle ; elle n'est pas nécessairement un entier positif. Renvoi : M3.

► Q10

- A — L'élève a utilisé à tort $n^2/2$ et calcule $20^2/2 = 200$; la formule correcte est $n(n + 1)/2 = 20 \times 21/2 = 210$. Renvoi : M4, cas 1.
- C — L'élève a utilisé la formule avec $n = 19$ au lieu de $n = 20$: $19 \times 20/2 = 190$. Erreur sur le nombre de termes (confusion entre n et $n + 1$ termes). Renvoi : M4, étape 1.
- D — L'élève a calculé $20 \times 21 = 420$ en oubliant de diviser par 2 dans la formule $n(n + 1)/2$. Renvoi : M4, cas 1.

► Q11

- A — L'élève a calculé $1 + 3 + 9 + 27 = 40$ en sommant seulement 4 termes (u_0 à u_3) au lieu de 5 termes (u_0 à u_4). Erreur sur le nombre de termes. Renvoi : M4, étape 1.
- C — L'option 242 est le double de la somme correcte : l'élève a calculé $3^5 - 1 = 242$ mais a oublié de diviser par $3 - 1 = 2$. Renvoi : M4, étape 3.
- D — L'élève a additionné les indices au lieu des termes : $0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$, ou a utilisé $u_k = k$ au lieu de $u_k = 3^k$. Renvoi : M4, cas 2.

► Q12

- A — L'élève a compté 14 termes en confondant le nombre de termes avec l'indice maximal. De u_0 à u_{14} , les indices sont $0, 1, 2, \dots, 14$: il y a bien $14 - 0 + 1 = 15$ termes. Renvoi : M4, étape 1.
- B — L'élève a soustrait 1 au lieu d'ajouter 1 : $14 - 1 = 13$. Confusion sur la formule 'nombre de termes' $= n_{\max} - n_{\min} + 1$. Renvoi : M4, étape 1.

— D — L'élève ajoute 2 au lieu de 1 dans le comptage inclusif et obtient l'option 16 par $14 + 2$; de 0 à 14, il y a $14 - 0 + 1 = 15$ termes. *Renvoi : M4, étape 1.*

► Q13

— A — L'élève a confondu le signe de la raison : une raison négative $r = -4$ implique $u_{n+1} - u_n = -4 < 0$, donc la suite est décroissante. *Renvoi : M5, Méthode A.*

— B — L'élève n'a pas utilisé la raison pour déterminer la monotonie. Une suite arithmétique est constante seulement si $r = 0$. *Renvoi : M5, Méthode A.*

— D — L'élève applique un raisonnement valable pour une suite quadratique mais pas pour une suite arithmétique. Une suite arithmétique de raison non nulle est strictement monotone sur $\mathbb{N}$ tout entier. *Renvoi : M5, Méthode A.*

► Q14

— A — La méthode A fonctionne aussi : $u_{n+1} - u_n = 5(0,8)^n(0,8 - 1) < 0$. Elle n'utilise toutefois pas directement la raison par comparaison du quotient à 1, contrairement à la méthode demandée. *Renvoi : M5, arbre de décision.*

— C — La dérivation de $x \mapsto (0,8)^x$ n'est pas un outil attendu ici. La méthode B exploite directement la raison de la suite géométrique positive. *Renvoi : M5, arbre de décision.*

— D — Observer quelques valeurs ne constitue pas une preuve. Il faut un raisonnement valide pour tout $n \in \mathbb{N}$, pas seulement pour $n = 0, 1, 2, 3, 4$. *Renvoi : M5, Piège 1.*

► Q15

— A — L'élève n'a pas étudié le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour tout n : $u_{n+1} - u_n = 2n - 5$, qui est négatif pour $n \leq 2$. La suite n'est pas monotone sur $\mathbb{N}$ tout entier. *Renvoi : M5, Méthode A.*

— C — L'élève a posé $2n - 5 > 0 \Rightarrow n > 2,5$ et a conclu $n \geq 2$. Mais pour $n = 2$: $u_3 - u_2 = 2 \times 2 - 5 = -1 < 0$. Il faut $n \geq 3$ (car $2 \times 3 - 5 = 1 > 0$). *Renvoi : M5, Méthode A.*

— D — L'élève a confondu la valeur annulant $u_n = 0$ (les racines $n = 1$ et $n = 5$) avec le rang de changement de monotonie. La monotonie dépend du signe de $u_{n+1} - u_n = 2n - 5$, pas du signe de u_n . *Renvoi : M5, Méthode A ; R3.*

► Q16

— A — L'élève a confondu le taux $t = 0,04$ avec le coefficient multiplicateur $q = 1 + t = 1,04$. Le coefficient 0,04 donnerait une quasi-suppression du capital, pas une augmentation de 4 %. *Renvoi : M6, étape 4.*

— B — L'élève a calculé $1 + 40\% = 1,4$, en lisant 4 comme 40 %. Erreur de conversion du pourcentage en valeur décimale. *Renvoi : M6, étape 4 ; R2.*

— D — L'élève a utilisé le taux en pourcentage (4) directement comme coefficient multiplicateur. Un coefficient $q = 4$ signifierait quadrupler le capital chaque année. *Renvoi : M6, étape 4 ; R2.*

► Q17

— A — Confusion entre le sens de variation (diminution) et le type de modèle. Une suite géométrique modélise une variation RELATIVE constante (pourcentage fixe), pas une variation absolue constante. *Renvoi : M6, étape 3.*

— C — On multiplie par un coefficient constant uniquement si la variation est relative (pourcentage). Ici, -300 habitants par an est une variation absolue constante $\Rightarrow$ modèle arithmétique. *Renvoi : M6, étape 3.*

— D — La situation correspond bien à un modèle arithmétique (variation absolue constante de -300). L'élève n'a pas appliqué le critère de distinction variation absolue / relative. *Renvoi : M6, étape 3.*

► Q18

— A — L'élève a utilisé un modèle arithmétique (soustraction de $500 = 5\% \times 10\,000$ chaque année) alors que la variation est relative (pourcentage). Le modèle arithmétique ne tient pas compte de l'effet composé. *Renvoi : M6, étape 3.*

— B — L'élève a utilisé le coefficient 1,05 (correspondant à une AUGMENTATION de 5 %) au lieu de 0,95 (diminution de 5 %). Erreur sur le coefficient multiplicateur lors d'une diminution. *Renvoi : M6, étape 4.*

— D — L'élève a utilisé 0,05 (le taux lui-même) au lieu du coefficient multiplicateur $1 - 0,05 = 0,95$. Confusion entre taux et coefficient multiplicateur. *Renvoi : M6, étape 4 ; R2.*

► Q19

- **A** — L'élève a exécuté une seule itération au lieu de trois : après $k = 0$, $u = 3 \times 2 + 1 = 7$. Il a confondu $\text{range}(3)$ avec une seule itération. *Renvoi : M7, Modèle A.*
- **B** — L'élève a exécuté deux itérations : $u_1 = 7$, $u_2 = 3 \times 7 + 1 = 22$... mais a renvoyé 21 par une erreur de calcul ($3 \times 7 = 21$ en oubliant $+1$). Erreur arithmétique lors de la simulation. *Renvoi : M7, Modèle A.*
- **D** — L'élève a exécuté deux itérations correctement ($u_1 = 7$, $u_2 = 22$) mais a arrêté après deux tours. Il a confondu $\text{range}(3) = \{0, 1, 2\}$ (3 itérations) avec 2 itérations. *Renvoi : M7, Piège 3.*

► Q20

- **A** — La condition ' $\text{while } u > 100$ ' est la négation inverse : la boucle s'exécute tant que $u > 100$, donc elle ne tourne jamais car $u = 1 \leq 100$ initialement. L'élève a oublié de prendre la NEGATION du seuil cherche. *Renvoi : M7, Modèle C, étape 2.*
- **C** — Ce code ne contient aucun test de seuil ni instruction ' break ' : il effectue toujours 100 itérations et renvoie $n = 100$, au lieu du premier rang où $u_n > 100$. *Renvoi : M7, Modèle C.*
- **D** — L'initialisation ' $u = 0$ ' est erronée : $2 \times 0 = 0$ pour toutes les itérations, la boucle est infinie. Il faut initialiser u à la valeur du PREMIER TERME $u_0 = 1$. *Renvoi : M7, Piège 1.*

► Q21

- **A** — Initialiser $S = 0$ est correct pour un accumulateur de somme (on ajoute le premier terme dès la première itération $k = 0$). L'initialisation à 1 donnerait $S = 1 + u_0 + \dots$, ce qui est faux. *Renvoi : M7, Modèle B, étape 1.*
- **C** — En Python, ' $2**k$ ' est la syntaxe correcte pour calculer 2^k . L'opérateur $^$ est le OU exclusif bit à bit, pas la puissance. Cette assertion est fausse. *Renvoi : R5.*
- **D** — Une boucle ' for ' est parfaitement adaptée au calcul d'une somme avec un nombre connu d'itérations. La boucle ' while ' est réservée à la recherche de seuil (nombre d'itérations inconnu). Cette assertion est fausse. *Renvoi : M7, Modèle B.*

Corrigé

Exercice 1

(6 points) — C1, C2, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer); Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

Question 1 — Calcul des premiers termes.

On applique la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + 4$:

$$u_1 = u_0 + 4 = 3 + 4 = 7, \quad u_2 = u_1 + 4 = 7 + 4 = 11, \quad u_3 = u_2 + 4 = 11 + 4 = 15.$$

Question 2 — Démonstration de la nature arithmétique.

Pour tout entier naturel n , on calcule la différence entre deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 4) - u_n = 4.$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante, égale à 4, pour tout $n \in \mathbb{N}$.**Conclusion :** La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 4$ et de premier terme $u_0 = 3$.Question 3 — Expression de u_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = 3 + 4n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Question 4 — Étude des variations.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 4 > 0.$$

La différence est strictement positive pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : La suite (u_n) est **strictement croissante**.

Remarque : on peut aussi argumenter que la raison $r = 4 > 0$, ce qui suffit pour conclure qu'une suite arithmétique est strictement croissante.

Exercice 2

(5 points) — C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer) ; Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer) ; Q3 : 2 pts (calculer)

Question 1 — Calcul des premiers termes.

$$u_0 = 2 \times 3^0 = 2 \times 1 = 2, \quad u_1 = 2 \times 3^1 = 6, \quad u_2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18.$$

Question 2 — Démonstration de la nature géométrique.

Pour tout entier naturel n , $u_n = 2 \times 3^n > 0$, donc le quotient est bien défini. On calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \times 3^{n+1}}{2 \times 3^n} = 3^{n+1-n} = 3.$$

Le quotient est constant, égal à 3, et non nul.

Conclusion : La suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $u_0 = 2$.

Question 3 — Calcul de la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.

On somme les termes de rang $k = 0$ à $k = 4$, soit 5 termes. En appliquant la formule avec $u_0 = 2$, $q = 3$ et $n = 4$:

$$S = u_0 \times \frac{q^5 - 1}{q - 1} = 2 \times \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = 2 \times \frac{243 - 1}{2} = 243 - 1 = 242.$$

$$S = 242.$$

Vérification : $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 242$. ✓

Exercice 3

(5 points) — C6, C7

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser) ; Q2 : 1 pt (calculer) ; Q3 : 1 pt (calculer) ; Q4a : 1 pt (communiquer) ; Q4b : 1 pt (chercher)

Question 1 — Modélisation.

Au bout de n années, le capital vaut u_n . Durant l'année suivante, il produit des intérêts à hauteur de $5\% \times u_n = 0,05 u_n$. Le capital au bout de $(n + 1)$ années est donc :

$$u_{n+1} = u_n + 0,05 u_n = (1 + 0,05) u_n = 1,05 u_n.$$

Question 2 — Nature de la suite et expression de u_n .

La relation $u_{n+1} = 1,05 u_n$ montre que (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,05$ et de premier terme $u_0 = 800$.

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$u_n = 800 \times 1,05^n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Question 3 — Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = 800 \times 1,05 = 840 \text{ €}, \quad u_2 = 800 \times 1,05^2 = 800 \times 1,1025 = 882 \text{ €}.$$

Question 4 — Algorithme Python.

4a. Explication de la boucle.

- ▶ $u = 800$ et $n = 0$ initialisent le capital et le compteur d'années.
- ▶ La condition `while u < 1200` : tant que le capital n'a pas atteint 1 200 €, on continue.
- ▶ $u = 1,05 * u$: on applique la relation de récurrence (le capital est multiplié par 1,05).
- ▶ $n = n + 1$: on incrémente le compteur d'années.
- ▶ Quand la boucle se termine, n contient le nombre d'années nécessaires.

4b. Valeur affichée et vérification.

Le programme affiche $n = 9$.

Vérification algébrique : On résout $800 \times 1,05^n \geq 1200$, soit $1,05^n \geq \frac{1200}{800} = 1,5$.

n	$800 \times 1,05^n$ (arrondi à l'euro)	≥ 1200 ?
7	1 126	non
8	1 182	non
9	1 241	oui

Le capital dépasse 1 200 € pour la première fois après 9 années. ✓

Exercice 4

(4 points) — C2, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (raisonner); Q2 : 2 pts (calculer, raisonner); Q3 : 1 pt (chercher)

Question 1 — Nature de (v_n) .

Pour tout entier naturel n , on calcule :

$$v_{n+1} - v_n = [2(n+1) + 5] - (2n + 5) = 2n + 2 + 5 - 2n - 5 = 2.$$

La différence $v_{n+1} - v_n = 2$ est constante pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $v_0 = 2 \times 0 + 5 = 5$.

Question 2 — Expression de S_n .

S_n est la somme des $(n+1)$ termes $v_0, v_1, \dots, v_n$ de la suite arithmétique (v_n) .

Le premier terme est $v_0 = 5$ et le dernier terme est $v_n = 2n + 5$. En appliquant la formule :

$$S_n = \frac{(n+1)(v_0 + v_n)}{2} = \frac{(n+1)(5 + 2n + 5)}{2} = \frac{(n+1)(2n + 10)}{2} = \frac{(n+1) \times 2(n+5)}{2}.$$

$$\boxed{S_n = (n+1)(n+5)} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Vérification pour $n = 1$: $S_1 = v_0 + v_1 = 5 + 7 = 12$ et $(1+1)(1+5) = 2 \times 6 = 12$. ✓

Question 3 — Plus petit entier n tel que $S_n > 200$.

On cherche le plus petit entier naturel n vérifiant $(n+1)(n+5) > 200$.

La fonction $(n+1)(n+5) = n^2 + 6n + 5$ est croissante pour $n \geq 0$. On cherche par encadrement :

$$n = 11 : S_{11} = 12 \times 16 = 192 \leq 200.$$

$$n = 12 : S_{12} = 13 \times 17 = 221 > 200.$$

Conclusion : Le plus petit entier naturel n tel que $S_n > 200$ est $n = 12$.

Évaluation 1SPE-SUITES-EV-A 55 min

Exercice 1 (6 points)

Capacités C1, C2, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = 3 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 4.$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 . (1 pt — calculer)
2. Démontrer que la suite (u_n) est arithmétique. Préciser sa raison r et son premier terme u_0 . (2 pts — raisonner, communiquer)
3. Exprimer u_n en fonction de n pour tout entier naturel n . (1 pt — calculer)
4. Étudier les variations de la suite (u_n) . Justifier rigoureusement. (2 pts — raisonner, communiquer)

Exercice 2 (5 points)

Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = 2 \times 3^n.$$

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 . (1 pt — calculer)
2. Démontrer que la suite (u_n) est géométrique. Préciser sa raison q et son premier terme u_0 . (2 pts — raisonner, communiquer)
3. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.
On rappelle que, pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$, on a :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

(2 pts — calculer)

Exercice 3 (5 points)

Capacités C6, C7

Compétences évaluées : modéliser, chercher, communiquer.

Léa place 800 € sur un livret d'épargne qui rapporte 5 % d'intérêts par an. On note u_n le capital disponible (en euros) au bout de n années entières (avec $u_0 = 800$).

1. Justifier que, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 1,05 \times u_n.$$

(1 pt — modéliser)

2. En déduire que (u_n) est une suite géométrique. Exprimer u_n en fonction de n . (1 pt — calculer)
3. Calculer u_1 et u_2 (valeurs exactes, ou arrondies à l'euro si nécessaire). (1 pt — calculer)
4. Le programme Python suivant a pour objectif de déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 1\,200$.

```

u = 800
n = 0
while u < 1200 :
    u = 1.05 * u
    n = n + 1
print(n)

```

- Expliquer, ligne par ligne, le rôle de la boucle `while`. (1 pt — communiquer)
- Indiquer la valeur affichée par `print(n)` et vérifier par le calcul que cette valeur est cohérente. (1 pt — chercher)

Exercice 4

(4 points)

Capacités C2, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$v_n = 2n + 5.$$

Pour tout entier naturel n , on pose :

$$S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = \sum_{k=0}^n v_k.$$

- Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme $v_0 = 5$. (1 pt — raisonner)
- Établir que $S_n = (n+1)(n+5)$ pour tout entier naturel n .
On rappelle que la somme de $(n+1)$ termes d'une suite arithmétique de premier terme a et de dernier terme b vaut $\frac{(n+1)(a+b)}{2}$. (2 pts — calculer, raisonner)
- Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $S_n > 200$. (1 pt — chercher)

Corrigé

Exercice 1

(6 points) — C1, C2, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer); Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

Question 1 — Calcul des premiers termes.

On applique la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + 3$:

$$u_1 = u_0 + 3 = 5 + 3 = 8, \quad u_2 = u_1 + 3 = 8 + 3 = 11, \quad u_3 = u_2 + 3 = 11 + 3 = 14.$$

Question 2 — Démonstration de la nature arithmétique.

Pour tout entier naturel n , on calcule la différence entre deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 3) - u_n = 3.$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante, égale à 3, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 5$.

Question 3 — Expression de u_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = 5 + 3n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Question 4 — Étude des variations.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 3 > 0.$$

La différence est strictement positive pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : La suite (u_n) est **strictement croissante**.

Remarque : on peut aussi argumenter que la raison $r = 3 > 0$, ce qui suffit pour conclure qu'une suite arithmétique est strictement croissante.

Exercice 2

(5 points) — C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer) ; Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer) ; Q3 : 2 pts (calculer)

Question 1 — Calcul des premiers termes.

$$u_0 = 4 \times 2^0 = 4 \times 1 = 4, \quad u_1 = 4 \times 2^1 = 8, \quad u_2 = 4 \times 2^2 = 4 \times 4 = 16.$$

Question 2 — Démonstration de la nature géométrique.

Pour tout entier naturel n , $u_n = 4 \times 2^n > 0$, donc le quotient est bien défini. On calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4 \times 2^{n+1}}{4 \times 2^n} = 2^{n+1-n} = 2.$$

Le quotient est constant, égal à 2, et non nul.

Conclusion : La suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 4$.

Question 3 — Calcul de la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.

On somme les termes de rang $k = 0$ à $k = 4$, soit 5 termes. En appliquant la formule avec $u_0 = 4$, $q = 2$ et $n = 4$:

$$S = u_0 \times \frac{q^5 - 1}{q - 1} = 4 \times \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 4 \times \frac{32 - 1}{1} = 4 \times 31 = 124.$$

$$S = 124.$$

Vérification : $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 124$. ✓

Exercice 3

(5 points) — C6, C7

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser) ; Q2 : 1 pt (calculer) ; Q3 : 1 pt (calculer) ; Q4a : 1 pt (communiquer) ; Q4b : 1 pt (chercher)

Question 1 — Modélisation.

Au bout de n années, le capital vaut u_n . Durant l'année suivante, il produit des intérêts à hauteur de $4\% \times u_n = 0,04 u_n$. Le capital au bout de $(n + 1)$ années est donc :

$$u_{n+1} = u_n + 0,04 u_n = (1 + 0,04) u_n = 1,04 u_n.$$

Question 2 — Nature de la suite et expression de u_n .

La relation $u_{n+1} = 1,04 u_n$ montre que (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,04$ et de premier terme $u_0 = 1\,000$.

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$u_n = 1\,000 \times 1,04^n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Question 3 — Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = 1\,000 \times 1,04 = 1\,040 \text{ €}, \quad u_2 = 1\,000 \times 1,04^2 = 1\,000 \times 1,0816 \approx 1\,082 \text{ €}.$$

Question 4 — Algorithme Python.

4a. Explication de la boucle.

- $u = 1000$ et $n = 0$ initialisent le capital et le compteur d'années.
- La condition `while u < 1500` : tant que le capital n'a pas atteint 1 500 €, on continue.
- `u = 1.04 * u` : on applique la relation de récurrence (le capital est multiplié par 1,04).
- `n = n + 1` : on incrémente le compteur d'années.
- Quand la boucle se termine, n contient le nombre d'années nécessaires.

4b. Valeur affichée et vérification.

Le programme affiche **$n = 11$** .

Vérification algébrique : On résout $1\,000 \times 1,04^n \geq 1\,500$, soit $1,04^n \geq \frac{1\,500}{1\,000} = 1,5$.

n	$1\,000 \times 1,04^n$ (arrondi à l'euro)	$\geq 1\,500$?
9	1 423	non
10	1 480	non
11	1 539	oui

Le capital dépasse 1 500 € pour la première fois après **11** années. ✓

Exercice 4

(4 points) — C2, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser, raisonner) ; Q2 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Nombre de places par rangée.

Chaque rangée compte 4 places de plus que la précédente, donc

$$p_{n+1} = p_n + 4.$$

Ainsi, (p_n) est une suite arithmétique de raison 4 et de premier terme $p_0 = 18$. Son terme général est

$$p_n = 18 + 4n.$$

Question 2 — Réfutation et expression de T_n .

Pour $n = 1$, on a $p_1 = 18 + 4 = 22$, donc

$$T_1 = p_0 + p_1 = 18 + 22 = 40, \quad 2p_1 = 44.$$

Ainsi $T_1 \neq (1 + 1)p_1$: la formule proposée par Lina est fausse.

La somme T_n contient les $(n + 1)$ termes $p_0, p_1, \dots, p_n$. Comme $p_0 = 18$ et $p_n = 18 + 4n$, on obtient

$$T_n = \frac{(n + 1)(p_0 + p_n)}{2} = \frac{(n + 1)(18 + 18 + 4n)}{2}.$$

$$T_n = (n + 1)(18 + 2n).$$

Question 3 — Total pour douze rangées.

Les douze premières rangées correspondent aux indices 0 à 11. Ainsi,

$$T_{11} = (11 + 1)(18 + 2 \times 11) = 12 \times 40 = 480.$$

Le théâtre compte donc 480 places dans ses douze premières rangées.

Évaluation 1SPE-SUITES-EV-B 55 min

Exercice 1

(6 points)

Capacités C1, C2, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = 5 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 3.$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 . (1 pt — calculer)
2. Démontrer que la suite (u_n) est arithmétique. Préciser sa raison r et son premier terme u_0 . (2 pts — raisonner, communiquer)
3. Exprimer u_n en fonction de n pour tout entier naturel n . (1 pt — calculer)
4. Étudier les variations de la suite (u_n) . Justifier rigoureusement. (2 pts — raisonner, communiquer)

Exercice 2

(5 points)

Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = 4 \times 2^n.$$

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 . (1 pt — calculer)
2. Démontrer que la suite (u_n) est géométrique. Préciser sa raison q et son premier terme u_0 . (2 pts — raisonner, communiquer)
3. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.
On rappelle que, pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$, on a :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

(2 pts — calculer)

Exercice 3

(5 points)

Capacités C6, C7

Compétences évaluées : modéliser, chercher, communiquer.

Lucas place 1 000 € sur un livret d'épargne qui rapporte 4 % d'intérêts par an. On note u_n le capital disponible (en euros) au bout de n années entières (avec $u_0 = 1\,000$).

1. Justifier que, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 1,04 \times u_n.$$

(1 pt — modéliser)

- En déduire que (u_n) est une suite géométrique. Exprimer u_n en fonction de n . (1 pt — calculer)
- Calculer u_1 et u_2 (valeurs exactes, ou arrondies à l'euro si nécessaire). (1 pt — calculer)
- Le programme Python suivant a pour objectif de déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 1500$.

```
u = 1000
n = 0
while u < 1500 :
    u = 1.04 * u
    n = n + 1
print(n)
```

- Expliquer, ligne par ligne, le rôle de la boucle `while`. (1 pt — communiquer)
- Indiquer la valeur affichée par `print(n)` et vérifier par le calcul que cette valeur est cohérente. (1 pt — chercher)

Exercice 4

(4 points)

Capacités C2, C4

Compétences évaluées : modéliser, calculer, raisonner.

Dans un théâtre, la première rangée compte 18 places et chaque nouvelle rangée compte 4 places de plus que la précédente. On note p_n le nombre de places de la rangée d'indice n ; ainsi, $n = 0$ correspond à la première rangée et $p_0 = 18$.

Pour tout entier naturel n , on note T_n le nombre total de places des $(n + 1)$ premières rangées :

$$T_n = p_0 + p_1 + \dots + p_n = \sum_{k=0}^n p_k.$$

- Exprimer p_{n+1} en fonction de p_n , puis justifier que (p_n) est une suite arithmétique et établir $p_n = 18 + 4n$. (1 pt — modéliser, raisonner)
- Lina affirme que $T_n = (n + 1) \times p_n$. Réfuter cette formule pour $n = 1$, puis établir que $T_n = (n + 1)(18 + 2n)$ pour tout entier naturel n . (2 pts — calculer, raisonner)
- Calculer le nombre total de places des 12 premières rangées. (1 pt — calculer)

Rappel — Calcul littéral

Développer : supprimer les parenthèses en distribuant la multiplication.

Règles de base :

$$a(b + c) = ab + ac \quad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Identités remarquables :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Factoriser : mettre en évidence un facteur commun ou reconnaître une identité remarquable.

Réduire : regrouper les termes de même degré (mêmes puissances de la variable).

Exercice 60

Développer et réduire chaque expression.

- $A = 3(2n + 5)$
- $B = (n + 1)^2 - n^2$
- $C = (2n - 1)(n + 3)$
- $D = n(n + 1) - n(n - 1)$

Corrigé

Question 1.

$$A = 3(2n + 5) = 3 \times 2n + 3 \times 5 = 6n + 15.$$

Question 2.

$$B = (n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1.$$

Question 3.

$$C = (2n - 1)(n + 3) = 2n \times n + 2n \times 3 + (-1) \times n + (-1) \times 3 = 2n^2 + 6n - n - 3 = 2n^2 + 5n - 3.$$

Question 4.

$$D = n(n + 1) - n(n - 1) = n[(n + 1) - (n - 1)] = n \times 2 = 2n.$$

Exercice 61

Factoriser chaque expression.

1. $E = 6n^2 + 9n$
2. $F = (n + 2)^2 - 9$
3. $G = n^2 - 4n + 4$
4. $H = 5n(n - 3) + 2(n - 3)$

Corrigé

Question 1.

$$E = 6n^2 + 9n = 3n(2n + 3).$$

Question 2.

$$F = (n + 2)^2 - 9 = (n + 2)^2 - 3^2 = [(n + 2) - 3][(n + 2) + 3] = (n - 1)(n + 5).$$

Question 3.

$$G = n^2 - 4n + 4 = (n - 2)^2.$$

Question 4.

$$H = 5n(n - 3) + 2(n - 3) = (n - 3)(5n + 2).$$

Exercice 62

Dans le cadre des suites, on rencontre souvent des expressions du type $u_{n+1} - u_n$. Développer et réduire les expressions suivantes, où n est un entier naturel.

1. $P = (n + 1)^2 + 3(n + 1) - (n^2 + 3n)$
2. $Q = 2(n + 1) + 5 - (2n + 5)$
3. $R = 3(n + 1)^2 - 1 - (3n^2 - 1)$

Corrigé

Question 1.

$$\begin{aligned} P &= (n^2 + 2n + 1) + (3n + 3) - n^2 - 3n \\ &= n^2 + 2n + 1 + 3n + 3 - n^2 - 3n \\ &= 2n + 4. \end{aligned}$$

Question 2.

$$Q = 2n + 2 + 5 - 2n - 5 = 2.$$

La différence est constante, égale à 2, indépendante de n : c'est la raison d'une suite arithmétique!

Question 3.

$$\begin{aligned} R &= 3n^2 + 6n + 3 - 1 - 3n^2 + 1 \\ &= 6n + 3. \end{aligned}$$

Exercice 63

Simplifier les expressions suivantes (fractions algébriques), en supposant que les dénominateurs sont non nuls.

1. $\frac{6n^2 + 4n}{2n}$
2. $\frac{(n+1)(n+2)}{n+2}$
3. $\frac{n^2 - 1}{n - 1}$
4. Montrer que $\frac{(n+1)^2 - n^2}{2n+1} = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Corrigé

Question 1.

$$\frac{6n^2 + 4n}{2n} = \frac{2n(3n + 2)}{2n} = 3n + 2.$$

Question 2.

$$\frac{(n+1)(n+2)}{n+2} = n+1.$$

Question 3.

$$\frac{n^2 - 1}{n - 1} = \frac{(n-1)(n+1)}{n-1} = n+1.$$

Question 4. On a vu en exercice 1, question 2, que $(n+1)^2 - n^2 = 2n+1$. Donc :

$$\frac{(n+1)^2 - n^2}{2n+1} = \frac{2n+1}{2n+1} = 1.$$

Ce résultat est valable pour tout $n \in \mathbb{N}$ (avec $2n+1 \neq 0$, ce qui est toujours vrai). □

Rappel — Pourcentages et coefficient multiplicateur

Coefficient multiplicateur (CM) :

Appliquer une évolution de $t\%$ revient à multiplier par le coefficient multiplicateur :

$$CM = 1 + \frac{t}{100} \quad (\text{hausse}) \quad CM = 1 - \frac{t}{100} \quad (\text{baisse}).$$

Évolutions successives : les coefficients multiplicateurs se *multiplient*.

Si on applique successivement des évolutions de CM $q_1, q_2, \dots, q_k$, le coefficient global est $q_1 \times q_2 \times \dots \times q_k$.

Lien avec les suites géométriques : si une grandeur évolue de $t\%$ à chaque étape, elle suit une suite géométrique de raison $CM = 1 + \frac{t}{100}$.

Exercice 64

Pour chaque situation, donner le coefficient multiplicateur correspondant.

1. Une augmentation de 8 %.
2. Une réduction de 15 %.
3. Une augmentation de 0,5 %.
4. Une réduction de 100 %.

Corrigé

Question 1. Augmentation de 8 % : $CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$.

Question 2. Réduction de 15 % : $CM = 1 - \frac{15}{100} = 0,85$.

Question 3. Augmentation de 0,5 % : $CM = 1 + \frac{0,5}{100} = 1,005$.

Question 4. Réduction de 100 % : $CM = 1 - \frac{100}{100} = 0$. La grandeur est annulée.

Exercice 65

Un capital de 2 000 € est placé sur un livret qui rapporte 3 % d'intérêts par an.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Quel est le capital après 1 an ? Après 2 ans ?
3. Exprimer le capital C_n après n années en fonction de n .
4. Calculer le capital après 10 ans (arrondir à l'euro).

Corrigé

Question 1. $CM = 1 + \frac{3}{100} = 1,03$.

Question 2.

$$C_1 = 2\,000 \times 1,03 = 2\,060 \text{ €}.$$

$$C_2 = C_1 \times 1,03 = 2\,060 \times 1,03 = 2\,121,80 \text{ €}.$$

Question 3. À chaque année, le capital est multiplié par 1,03. Donc :

$$C_n = 2\,000 \times 1,03^n.$$

La suite (C_n) est une suite géométrique de premier terme $C_0 = 2\,000$ et de raison $q = 1,03$.

Question 4.

$$C_{10} = 2\,000 \times 1,03^{10} \approx 2\,000 \times 1,3439 \approx 2\,688 \text{ €}.$$

Exercice 66

Un article vaut 500 €. Son prix augmente de 10 % la première année, puis diminue de 10 % la deuxième année.

1. Calculer le prix après la première année.
2. Calculer le prix après la deuxième année.
3. Le prix est-il revenu à 500 € ? Justifier à l'aide des coefficients multiplicateurs.
4. Quel taux global d'évolution (en %) cela représente-t-il sur les deux ans ?

Corrigé

Question 1.

$$P_1 = 500 \times 1,10 = 550 \text{ €}.$$

Question 2.

$$P_2 = 550 \times 0,90 = 495 \text{ €}.$$

Question 3. Non. Le coefficient multiplicateur global est $1,10 \times 0,90 = 0,99 \neq 1$. Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % ne se compensent pas exactement.

Question 4. $CM_{global} = 0,99$, donc le taux global est :

$$t = (0,99 - 1) \times 100 = -1 \%$$

Sur deux ans, le prix a diminué de 1 %.

Exercice 67

Une population de bactéries double toutes les heures. Au départ, on compte 500 bactéries.

1. Quel est le taux d'augmentation horaire ? Le coefficient multiplicateur ?
2. Donner l'expression de la population P_n après n heures.
3. Après combien d'heures la population dépasse-t-elle 10 000 bactéries ?
(On pourra essayer les valeurs $n = 1, 2, 3, 4, 5$.)
4. Quel serait le coefficient multiplicateur si la population triplait chaque heure ?

Corrigé

Question 1. La population double : le taux est +100 % et le coefficient multiplicateur est $CM = 2$.

Question 2.

$$P_n = 500 \times 2^n.$$

Question 3. On calcule les premières valeurs :

n	P_n
0	500
1	1 000
2	2 000
3	4 000
4	8 000
5	16 000

La population dépasse 10 000 à partir de $n = 5$, c'est-à-dire après 5 heures.

Question 4. Si la population triplait, $CM = 3$ (augmentation de 200 %).

Rappel — Fonctions : image, antécédent, variations

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

Image : $f(a)$ est l'image de a par f (on calcule en substituant $x = a$).

Antécédent : a est un antécédent de b par f si $f(a) = b$ (on résout l'équation $f(x) = b$).

Sens de variation :

- ▶ f est **croissante** sur I si, pour tous $x_1 < x_2$ dans I , $f(x_1) \leq f(x_2)$.
- ▶ f est **décroissante** sur I si, pour tous $x_1 < x_2$ dans I , $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Lien avec les suites : une suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$ hérite des variations de f sur $\mathbb{N}$.

Exercice 68

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$.
2. Vérifier que 1 est un antécédent de 0 par f .
3. Trouver tous les antécédents de 0 par f .
4. La suite (u_n) définie par $u_n = f(n)$ pour $n \geq 2$ est-elle croissante ?

Corrigé

Question 1.

$$f(0) = 2 \times 0 - 3 \times 0 + 1 = 1.$$

$$f(1) = 2 \times 1 - 3 \times 1 + 1 = 2 - 3 + 1 = 0.$$

$$f(2) = 2 \times 4 - 3 \times 2 + 1 = 8 - 6 + 1 = 3.$$

$$f(3) = 2 \times 9 - 3 \times 3 + 1 = 18 - 9 + 1 = 10.$$

Question 2. On calcule $f(1) = 0$ (voir question 1). Donc $f(1) = 0 : 1$ est bien un antécédent de 0.

Question 3. On résout $2x^2 - 3x + 1 = 0$. On factorise :

$$2x^2 - 3x + 1 = (2x - 1)(x - 1) = 0.$$

Donc $x = \frac{1}{2}$ ou $x = 1$. Les antécédents de 0 sont $\frac{1}{2}$ et 1.

Question 4. Le sommet de la parabole est en $x_s = \frac{3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}$. Pour $n \geq 2 > \frac{3}{4}$, la fonction f est croissante, donc la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ est croissante.

Exercice 69

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^+$ par $g(x) = \frac{x+4}{x+1}$.

1. Calculer $g(0)$, $g(1)$, $g(3)$ et $g(9)$.
2. Montrer que, pour tout $x \geq 0$, $g(x) - 1 = \frac{3}{x+1}$.
3. En déduire le sens de variation de g sur $[0; +\infty[$.

Corrigé

Question 1.

$$g(0) = \frac{0+4}{0+1} = 4. \quad g(1) = \frac{1+4}{1+1} = \frac{5}{2} = 2,5.$$

$$g(3) = \frac{3+4}{3+1} = \frac{7}{4} = 1,75. \quad g(9) = \frac{9+4}{9+1} = \frac{13}{10} = 1,3.$$

Question 2.

$$g(x) - 1 = \frac{x+4}{x+1} - 1 = \frac{x+4}{x+1} - \frac{x+1}{x+1} = \frac{(x+4) - (x+1)}{x+1} = \frac{3}{x+1}.$$

Question 3. Pour $x \geq 0$, $x+1 \geq 1 > 0$ et est croissant, donc $\frac{3}{x+1}$ est décroissant. Ainsi $g(x) = 1 + \frac{3}{x+1}$ est décroissante sur $[0; +\infty[$.

Exercice 70

On considère la suite (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = 3n - 7$.

1. Calculer v_0 , v_1 , v_2 , v_5 .
2. À quel rang n a-t-on $v_n = 0$?
3. À partir de quel rang n a-t-on $v_n > 0$?
4. La suite (v_n) est-elle croissante? Justifier brièvement.

Corrigé

Question 1.

$$v_0 = 3 \times 0 - 7 = -7. \quad v_1 = 3 \times 1 - 7 = -4. \quad v_2 = 3 \times 2 - 7 = -1. \quad v_5 = 3 \times 5 - 7 = 8.$$

Question 2. On résout $v_n = 0$:

$$3n - 7 = 0 \Rightarrow n = \frac{7}{3} \approx 2,33.$$

Mais n doit être un entier naturel : $\frac{7}{3}$ n'est pas entier, donc il n'existe pas de rang $n \in \mathbb{N}$ tel que $v_n = 0$.

Question 3. $v_n > 0 \Leftrightarrow 3n - 7 > 0 \Leftrightarrow n > \frac{7}{3}$. Le plus petit entier vérifiant cette condition est $n = 3$. Pour tout $n \geq 3$, $v_n > 0$.

Question 4. $v_{n+1} - v_n = [3(n+1) - 7] - [3n - 7] = 3 > 0$. La suite est croissante.

Exercice 71

On considère la fonction affine h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -2x + 5$.

1. Calculer $h(-1)$, $h(0)$, $h(1)$ et $h(2)$.
2. Résoudre $h(x) = 1$.
3. Déterminer le sens de variation de h sur $\mathbb{R}$.
4. On pose $w_n = h(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer w_0 , w_1 , w_2 , puis justifier le sens de variation de (w_n) .

Corrigé

Question 1.

$$h(-1) = 7. \quad h(0) = 5. \quad h(1) = 3. \quad h(2) = 1.$$

Question 2.

$$h(x) = 1 \Leftrightarrow -2x + 5 = 1 \Leftrightarrow -2x = -4 \Leftrightarrow x = 2.$$

Question 3. La fonction affine h a pour coefficient directeur -2 , donc elle est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Question 4. On a $w_0 = 5$, $w_1 = 3$ et $w_2 = 1$. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$w_{n+1} - w_n = [-2(n+1) + 5] - [-2n + 5] = -2 < 0.$$

La suite (w_n) est donc strictement décroissante.

Rappel — Inégalités et signe d'une expression

Résoudre une inégalité : isoler l'inconnue, en pensant à *changer le sens de l'inégalité* si l'on multiplie ou divise par un nombre négatif.

Signe d'un produit / quotient :

$$(+) \times (+) = (+), \quad (+) \times (-) = (-), \quad (-) \times (-) = (+).$$

Règle des signes : même signe $\Rightarrow$ résultat positif ; signes différents $\Rightarrow$ résultat négatif.

Tableau de signes : pour étudier le signe d'un produit de facteurs, on dresse un tableau donnant le signe de chaque facteur, puis on applique la règle des signes.

Utilisation dans les suites : pour montrer qu'une suite est croissante, on montre que $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout n .

Exercice 72

Résoudre les inégalités suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $3x + 5 > 11$
2. $-2x + 4 \leq 10$

3. $\frac{x-3}{4} \geq 1$
 4. $2x-1 > 5x+8$

Corrigé**Question 1.**

$$3x + 5 > 11 \Leftrightarrow 3x > 6 \Leftrightarrow x > 2.$$

Solution : $x \in]2; +\infty[$.

Question 2.

$$-2x + 4 \leq 10 \Leftrightarrow -2x \leq 6 \Leftrightarrow x \geq -3.$$

Solution : $x \in [-3; +\infty[$.

Question 3.

$$\frac{x-3}{4} \geq 1 \Leftrightarrow x-3 \geq 4 \Leftrightarrow x \geq 7.$$

Solution : $x \in [7; +\infty[$.

Question 4.

$$2x - 1 > 5x + 8 \Leftrightarrow -3x > 9 \Leftrightarrow x < -3.$$

Solution : $x \in]-\infty; -3[$.

Exercice 73 ♦

Étudier le signe de chaque expression à l'aide d'un tableau de signes.

1. $A(x) = (x-2)(x+3)$
 2. $B(x) = (2x-6)(x+1)$
 3. $C(x) = \frac{x-1}{x+2}$ (pour $x \neq -2$)

Corrigé

Question 1. Tableau de signes de $A(x) = (x-2)(x+3)$:

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$		
$x-2$		$-$	$-$	0	$+$	
$x+3$		$-$	0	$+$	$+$	
$A(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

$A(x) > 0$ sur $] -\infty; -3[\cup]2; +\infty[$.

Question 2. $B(x) = (2x-6)(x+1) = 2(x-3)(x+1)$.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$x-3$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$B(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

$B(x) > 0$ sur $] -\infty; -1[\cup]3; +\infty[$.

Question 3. Valeurs critiques : $x = 1$ (numérateur nul) et $x = -2$ (dénominateur nul).

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$x-1$	$-$	$-$	0	$+$
$x+2$	$-$	$\parallel$	$+$	$+$
$C(x)$	$+$	$\parallel$	$-$	0

$$C(x) > 0 \text{ sur }] -\infty; -2[\cup]1; +\infty[, C(x) < 0 \text{ sur }] -2; 1[.$$

Exercice 74

Pour chacune des suites suivantes, étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation.

1. (u_n) définie par $u_n = 4n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. (v_n) définie par $v_n = -2n + 10$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. (w_n) définie par $w_n = n^2 - n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. (Indication : factoriser $w_{n+1} - w_n$.)

Corrigé

Question 1.

$$u_{n+1} - u_n = [4(n+1) - 3] - [4n - 3] = 4n + 4 - 3 - 4n + 3 = 4.$$

$u_{n+1} - u_n = 4 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite (u_n) est strictement croissante.

Question 2.

$$v_{n+1} - v_n = [-2(n+1) + 10] - [-2n + 10] = -2n - 2 + 10 + 2n - 10 = -2.$$

$v_{n+1} - v_n = -2 < 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite (v_n) est strictement décroissante.

Question 3.

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= [(n+1)^2 - (n+1)] - [n^2 - n] \\ &= n^2 + 2n + 1 - n - 1 - n^2 + n = 2n. \end{aligned}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2n \geq 0$. Donc $w_{n+1} - w_n \geq 0$, et la suite (w_n) est croissante (au sens large).

Exercice 75

On considère la suite (a_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $a_n = \frac{2n+3}{n+1}$.

1. Calculer a_0, a_1, a_2, a_3 .
2. Calculer $a_{n+1} - a_n$ et simplifier.
3. En déduire le sens de variation de (a_n) .
4. Vérifier que votre réponse est cohérente avec les valeurs calculées en question 1.

Corrigé

Question 1.

$$a_0 = \frac{3}{1} = 3, \quad a_1 = \frac{5}{2} = 2,5, \quad a_2 = \frac{7}{3} \approx 2,33, \quad a_3 = \frac{9}{4} = 2,25.$$

Question 2.

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{2(n+1)+3}{(n+1)+1} - \frac{2n+3}{n+1} = \frac{2n+5}{n+2} - \frac{2n+3}{n+1} \\ &= \frac{(2n+5)(n+1) - (2n+3)(n+2)}{(n+2)(n+1)}. \end{aligned}$$

Développons le numérateur :

$$(2n+5)(n+1) = 2n^2 + 2n + 5n + 5 = 2n^2 + 7n + 5,$$

$$(2n+3)(n+2) = 2n^2 + 4n + 3n + 6 = 2n^2 + 7n + 6.$$

Donc :

$$a_{n+1} - a_n = \frac{(2n^2 + 7n + 5) - (2n^2 + 7n + 6)}{(n+2)(n+1)} = \frac{-1}{(n+1)(n+2)}.$$

Question 3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)(n+2) > 0$, donc :

$$a_{n+1} - a_n = \frac{-1}{(n+1)(n+2)} < 0.$$

La suite (a_n) est strictement décroissante.

Question 4. Les valeurs $3 > 2,5 > 2,33 > 2,25$ sont bien décroissantes. Cela confirme le résultat.

Rappel — Python : variables, boucles

Variable : une case mémoire nommée qui stocke une valeur. $x = 5$ affecte la valeur 5 à la variable x .

Boucle for : répète un bloc un nombre *connu* de fois.

`for k in range(n)` : exécute le bloc pour $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ (n itérations).

Boucle while : répète un bloc tant qu'une *condition* est vraie.

`while condition` : — attention à toujours modifier les variables de la condition pour éviter une boucle infinie.

Affichage : `print(valeur)` affiche la valeur dans la console.

Opérations courantes : $+$, $-$, $*$, $/$ (division), `//` (quotient entier), $**$ (puissance).

Exercice 76

Lire et compléter.

On considère le programme suivant (ne pas chercher à l'exécuter, lire ligne par ligne) :

```
u = 3
for k in range(4):
    u = u + 2
    print(u)
```

- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle ? Quelles sont les valeurs de k ?
- Recopier et compléter le tableau de trace d'exécution :

Tour	k	u (après $u = u + 2$)
1	0	...
2	1	...
3	2	...
4	3	...

- Quelle suite mathématique ce programme calcule-t-il ?
- Que faudrait-il modifier pour calculer les dix termes suivants $u_1, u_2, \dots, u_{10}$?

Corrigé

Question 1. La boucle s'exécute 4 fois. Les valeurs de k sont 0, 1, 2, 3.

Question 2. Tableau de trace :

Tour	k	u
1	0	$3 + 2 = 5$
2	1	$5 + 2 = 7$
3	2	$7 + 2 = 9$
4	3	$9 + 2 = 11$

Question 3. Ce programme calcule les termes de la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$. La formule explicite est $u_n = 3 + 2n$.

Question 4. Il suffit de remplacer `range(4)` par `range(10)` pour obtenir les dix termes suivants $u_1, u_2, \dots, u_{10}$.

Exercice 77

Écrire et analyser des programmes Python (en pseudo-code ou en décrivant les instructions).

1. Décrire ce que fait le programme suivant :

```
u = 1
for k in range(5):
    u = 3 * u
print(u)
```

2. Quelle valeur affiche-t-il ? Justifier sans calculer terme à terme.
3. Écrire un programme similaire qui calcule et affiche le terme u_8 de la suite géométrique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $q = 5$.
4. Qu'afficherait ce programme si on remplaçait `range(5)` par `range(0)` ?

Corrigé

Question 1. Le programme calcule les termes successifs d'une suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison 3. Après 5 itérations, il affiche u_5 .

Question 2. La formule explicite est $u_n = 1 \times 3^n = 3^n$. Donc $u_5 = 3^5 = 243$. Le programme affiche 243.

Question 3. Programme pour u_8 avec $u_0 = 2$ et $q = 5$:

```
u = 2
for k in range(8):
    u = 5 * u
print(u)
```

On vérifie : $u_8 = 2 \times 5^8 = 2 \times 390625 = 781250$.

Question 4. Avec `range(0)`, la boucle ne s'exécute pas. On affiche la valeur initiale $u = 1$, ce qui correspond à u_0 .

Exercice 78

On souhaite trouver le plus petit entier n tel que $2^n > 1000$.

1. Lire le programme suivant et expliquer le rôle de chaque ligne :

```
u = 1
n = 0
while u <= 1000 :
    u = 2 * u
    n = n + 1
print(n, u)
```

2. Donner un tableau de trace des 4 premiers tours de boucle.
3. Quelle valeur de n le programme affiche-t-il ? Vérifier que $2^9 \leq 1000$ et $2^{10} > 1000$.
4. Que se passerait-il si on oubliait la ligne `n = n + 1` ?

Corrigé

Question 1.

- `u = 1` : initialise u à $u_0 = 1 = 2^0$.
- `n = 0` : initialise le compteur d'indice.
- `while u <= 1000 :` : la boucle tourne tant que u ne dépasse pas 1000.
- `u = 2 * u` : calcule le terme suivant ($u_{n+1} = 2u_n$).
- `n = n + 1` : avance l'indice.
- `print(n, u)` : affiche le premier rang n et la valeur u dépassant 1000.

Question 2. Tableau des 4 premiers tours :

Tour	n	u
1	1	2
2	2	4
3	3	8
4	4	16

Question 3. Le programme affiche $n = 10$ et $u = 1024$. Vérification : $2^9 = 512 \leq 1000$ et $2^{10} = 1024 > 1000$. ✓

Question 4. Si on oublie $n = n + 1$, la variable u continue d'être mise à jour (la boucle se termine), mais n reste à 0 à la fin : on afficherait le mauvais rang.

Exercice 79

On considère la suite (s_n) définie par $s_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n$ (somme des n premiers entiers).

1. Calculer à la main s_1, s_2, s_3, s_4 .
2. Expliquer pourquoi le programme ci-dessous calcule s_n pour n donné :

```
n = 10
S = 0
for k in range(1, n + 1):
    S = S + k
print(S)
```

3. Que vaut $\text{range}(1, n+1)$ pour $n = 4$? Dérouler la boucle manuellement pour $n = 4$.
4. Modifier le programme pour calculer la somme $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ (somme des carrés).

Corrigé

Question 1.

$$s_1 = 1. \quad s_2 = 1 + 2 = 3. \quad s_3 = 1 + 2 + 3 = 6. \quad s_4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.$$

Question 2. $S = 0$ initialise la somme à 0. La boucle `for k in range(1, n+1)` : fait parcourir k les valeurs $1, 2, \dots, n$. À chaque étape, on ajoute k à l'accumulateur S . En fin de boucle, S vaut $1 + 2 + \dots + n = s_n$.

Question 3. `range(1, 5)` génère 1, 2, 3, 4 pour $n = 4$. Trace pour $n = 4$:

Tour	k	S
1	1	$0 + 1 = 1$
2	2	$1 + 2 = 3$
3	3	$3 + 3 = 6$
4	4	$6 + 4 = 10$

`print(S)` affiche 10, ce qui correspond bien à $s_4 = 10$. ✓

Question 4. Programme pour la somme des carrés :

```
n = 10
S = 0
for k in range(1, n + 1):
    S = S + k**2
print(S)
```

Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : confondre formule explicite et relation de récurrence, ou remplacer le mauvais indice lors du calcul d'un terme.

Orientation

Si l'erreur diagnostiquée porte sur une substitution directe, reprendre le rappel puis l'activité guidée. Si elle porte sur une récurrence, lire aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

Rappel ciblé

Avec une formule explicite, on remplace directement n par le rang demandé. Avec une relation de récurrence, on part du terme initial et on applique la relation au rang courant pour obtenir le terme suivant.

Aide graduée

Écrire d'abord le type de définition utilisé, puis entourer le rang connu et le rang à calculer avant toute substitution.

Activité guidée

Exercice 80

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 2n + 3$.

1. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_3 .
2. Calculer u_{10} .
3. Calculer u_{n+1} (on développera et simplifiera).

Corrigé

Question 1. On remplace n par 0, 1, 2, 3 :

$$u_0 = 0^2 - 2 \times 0 + 3 = 3.$$

$$u_1 = 1^2 - 2 \times 1 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2.$$

$$u_2 = 2^2 - 2 \times 2 + 3 = 4 - 4 + 3 = 3.$$

$$u_3 = 3^2 - 2 \times 3 + 3 = 9 - 6 + 3 = 6.$$

Question 2.

$$u_{10} = 10^2 - 2 \times 10 + 3 = 100 - 20 + 3 = 83.$$

Question 3.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= (n+1)^2 - 2(n+1) + 3 \\ &= n^2 + 2n + 1 - 2n - 2 + 3 \\ &= n^2 + 2. \end{aligned}$$

Exercice autonome

Exercice 81

Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 3v_n - 4$.

1. Calculer v_1, v_2 et v_3 .
2. Calculer v_4 .
3. Sans reprendre tous les calculs intermédiaires : sachant que $v_{10} = 177\,149$, calculer v_{11} .

Corrigé

Question 1. On applique $v_{n+1} = 3v_n - 4$ avec les valeurs successives :

$$v_1 = 3v_0 - 4 = 3 \times 5 - 4 = 15 - 4 = 11.$$

$$v_2 = 3v_1 - 4 = 3 \times 11 - 4 = 33 - 4 = 29.$$

$$v_3 = 3v_2 - 4 = 3 \times 29 - 4 = 87 - 4 = 83.$$

Question 2.

$$v_4 = 3v_3 - 4 = 3 \times 83 - 4 = 249 - 4 = 245.$$

Question 3. Avec $v_{10} = 177\,149$:

$$v_{11} = 3 \times 177\,149 - 4 = 531\,443.$$

Revalidation**Exercice 82** ◆

Soit la suite (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = \frac{2n+1}{n+2}$.

1. Calculer w_0, w_1, w_2 et w_5 .
2. Calculer w_{n+1} et simplifier.
3. Vérifier numériquement que votre formule pour w_{n+1} donne bien w_1 pour $n = 0$.

Corrigé

Question 1.

$$w_0 = \frac{2 \times 0 + 1}{0 + 2} = \frac{1}{2}. \quad w_1 = \frac{2 \times 1 + 1}{1 + 2} = \frac{3}{3} = 1. \quad w_2 = \frac{2 \times 2 + 1}{2 + 2} = \frac{5}{4}. \quad w_5 = \frac{2 \times 5 + 1}{5 + 2} = \frac{11}{7}.$$

Question 2. On remplace n par $n + 1$:

$$w_{n+1} = \frac{2(n+1) + 1}{(n+1) + 2} = \frac{2n+3}{n+3}.$$

Question 3. Pour $n = 0$: $w_{0+1} = w_1 = \frac{2 \times 0 + 3}{0 + 3} = \frac{3}{3} = 1$. On retrouve bien $w_1 = 1$. ✓

Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : conclure à partir d'un préfixe qu'une suite entière est arithmétique, sans disposer d'une relation valable pour tout rang.

Orientation

Si l'erreur diagnostiquée concerne le calcul d'une différence, reprendre le rappel et l'activité guidée. Si elle concerne la preuve, suivre aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

Rappel ciblé

Quelques différences égales suggèrent une raison candidate, mais ne prouvent rien sur les termes non donnés. Pour conclure, il faut établir $u_{n+1} - u_n = r$ pour tout n , ou disposer d'une relation équivalente.

Aide graduée

Distinguer sur la copie « observation sur les valeurs données » et « propriété démontrée pour tout rang ».

Activité guidée

Exercice 83

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5n - 3$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .
2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ et simplifier.
3. En déduire que la suite (u_n) est arithmétique et préciser sa raison r et son premier terme u_0 .
4. Retrouver u_0 et r directement depuis la formule $u_n = 5n - 3$.

Corrigé

Question 1.

$$u_0 = 5 \times 0 - 3 = -3. \quad u_1 = 5 - 3 = 2. \quad u_2 = 10 - 3 = 7. \quad u_3 = 15 - 3 = 12.$$

Question 2.

$$u_{n+1} - u_n = [5(n+1) - 3] - [5n - 3] = 5n + 5 - 3 - 5n + 3 = 5.$$

Question 3. La différence $u_{n+1} - u_n = 5$ est constante (indépendante de n). Donc la suite (u_n) est arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = -3$.

Question 4. La formule $u_n = 5n - 3$ est de la forme $u_0 + rn$. On lit directement : $u_0 = -3$ et $r = 5$. Cela confirme le résultat précédent.

Exercice autonome

Exercice 84

On donne les premiers termes d'une suite : $v_0 = 7, v_1 = 4, v_2 = 1, v_3 = -2$.

1. Calculer $v_1 - v_0, v_2 - v_1, v_3 - v_2$.
2. Ces trois différences suffisent-elles à prouver que toute la suite est arithmétique ? Justifier.
3. On ajoute l'information $v_{n+1} = v_n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que la suite est arithmétique, puis exprimer v_n en fonction de n .
4. Calculer v_{20} et v_{100} .

Corrigé

Question 1.

$$v_1 - v_0 = 4 - 7 = -3. \quad v_2 - v_1 = 1 - 4 = -3. \quad v_3 - v_2 = -2 - 1 = -3.$$

Question 2. Ces trois différences ne suffisent pas à déterminer les termes suivants. Par exemple, on pourrait choisir $v_4 = 0$ tout en conservant les quatre valeurs données ; ce prolongement ne vérifierait pas $v_4 - v_3 = -3$.

Question 3. Puisque $v_{n+1} = v_n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, la suite est arithmétique de raison -3 . Ainsi $v_n = v_0 - 3n = 7 - 3n$.

Question 4.

$$v_{20} = 7 - 3 \times 20 = 7 - 60 = -53.$$

$$v_{100} = 7 - 3 \times 100 = 7 - 300 = -293.$$

Revalidation

Exercice 85

Une suite arithmétique (w_n) vérifie $w_3 = 11$ et $w_7 = 23$.

1. Montrer que la raison r vérifie $w_7 = w_3 + 4r$, puis calculer r .
2. Calculer w_0 .
3. Exprimer w_n en fonction de n .
4. À quel rang n a-t-on $w_n = 50$?

Corrigé

Question 1. $w_7 = w_3 + 4r$ car on passe de w_3 à w_7 en ajoutant 4 fois la raison.

$$23 = 11 + 4r \Rightarrow 4r = 12 \Rightarrow r = 3.$$

Question 2. $w_3 = w_0 + 3r$, donc $w_0 = w_3 - 3r = 11 - 9 = 2$.

Question 3. $w_n = w_0 + rn = 2 + 3n$.

Question 4. $w_n = 50 \Leftrightarrow 2 + 3n = 50 \Leftrightarrow 3n = 48 \Leftrightarrow n = 16$.

Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : oublier de vérifier la relation multiplicative pour tout rang, ou former un quotient alors qu'un terme peut être nul.

Orientation

Si l'erreur diagnostiquée concerne le quotient, reprendre le rappel et l'activité guidée. Si elle concerne la portée d'une observation, suivre aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

Rappel ciblé

La définition sûre est $u_{n+1} = qu_n$ pour tout rang. Le quotient u_{n+1}/u_n n'est utilisable que lorsque tous les termes concernés sont non nuls.

Aide graduée

Avant de diviser, prouver la non-nullité. Puis distinguer une raison seulement observée sur quelques termes d'une relation démontrée pour tout n .

Activité guidée

Exercice 86

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3 \times 2^n$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .
2. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. En déduire que (u_n) est géométrique. Préciser la raison q et le premier terme u_0 .
4. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .

Corrigé

Question 1.

$$u_0 = 3 \times 2^0 = 3. \quad u_1 = 3 \times 2^1 = 6. \quad u_2 = 3 \times 2^2 = 12. \quad u_3 = 3 \times 2^3 = 24.$$

Question 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3 \times 2^n \neq 0$. Le quotient est :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \times 2^{n+1}}{3 \times 2^n} = 2^{n+1-n} = 2.$$

Question 3. Le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2$ est constant. La suite (u_n) est donc géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 3$.

Question 4. $u_{n+1} = q \times u_n = 2u_n$.

Exercice autonome

Exercice 87 ♦

On donne les premiers termes : $v_0 = 2, v_1 = 6, v_2 = 18, v_3 = 54$.

1. Calculer $\frac{v_1}{v_0}, \frac{v_2}{v_1}, \frac{v_3}{v_2}$.
2. Ces trois quotients suffisent-ils à prouver que toute la suite est géométrique ? Justifier.
3. On ajoute maintenant l'information : $v_{n+1} = 3v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que la suite est géométrique et exprimer v_n en fonction de n .
4. Calculer v_6 .

Corrigé

Question 1.

$$\frac{v_1}{v_0} = \frac{6}{2} = 3. \quad \frac{v_2}{v_1} = \frac{18}{6} = 3. \quad \frac{v_3}{v_2} = \frac{54}{18} = 3.$$

Question 2. Ces trois quotients ne suffisent pas à déterminer les termes suivants. Par exemple, on pourrait avoir $v_4 = 55$ tout en conservant les quatre valeurs données ; ce prolongement ne vérifierait pas $v_4 = 3v_3$.

Question 3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 3v_n$. Par définition, (v_n) est donc géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $v_0 = 2$. Ainsi, $v_n = 2 \times 3^n$.

Question 4.

$$v_6 = 2 \times 3^6 = 2 \times 729 = 1\,458.$$

Revalidation

Exercice 88 ♦

Une suite géométrique (w_n) vérifie $w_0 = 5$ et $w_3 = 40$.

1. Montrer que $w_3 = w_0 \times q^3$, puis calculer q .

- Exprimer w_n en fonction de n .
- Calculer w_5 .
- Montrer que (w_n) est une suite géométrique en vérifiant que le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n}$ est bien constant.

Corrigé

Question 1. Pour une suite géométrique de raison q : $w_n = w_0 \times q^n$. Donc $w_3 = 5q^3$.

$$5q^3 = 40 \implies q^3 = 8 \implies q = 2.$$

Question 2. $w_n = 5 \times 2^n$.

Question 3.

$$w_5 = 5 \times 2^5 = 5 \times 32 = 160.$$

Question 4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = 5 \times 2^n \neq 0$. Le quotient :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{5 \times 2^{n+1}}{5 \times 2^n} = 2.$$

Le quotient est constant égal à 2 : la suite (w_n) est bien géométrique de raison 2.

Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : mal compter le nombre de termes d'une somme ou décaler le premier et le dernier indice dans une formule.

Orientation

Si l'erreur diagnostiquée porte sur les indices, reprendre le rappel et l'activité guidée. Si elle porte sur la formule géométrique, utiliser aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

Rappel ciblé

De l'indice p à l'indice n inclus, il y a $n - p + 1$ termes. Avant toute formule, écrire explicitement le premier terme, le dernier terme et leur nombre.

Aide graduée

Pour une somme géométrique, factoriser le premier terme puis ramener la somme à $1 + q + \dots + q^m$; l'exposant maximal m donne $m + 1$ termes.

Activité guidée**Exercice 89**

On rappelle que $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ pour tout $n \geq 1$.

- Vérifier cette formule pour $n = 5$ en calculant la somme directement et en appliquant la formule.
- Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 20$.
- Calculer $6 + 7 + 8 + \dots + 15$. (Indication : exprimer cette somme comme différence de deux sommes.)
- Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 3$ et raison $r = 2$. Calculer $u_0 + u_1 + \dots + u_9$.

Corrigé

Question 1. Somme directe : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$. Formule : $\frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2} = 15$. ✓

Question 2.

$$1 + 2 + \dots + 20 = \frac{20 \times 21}{2} = \frac{420}{2} = 210.$$

Question 3.

$$6 + 7 + \dots + 15 = \frac{15 \times 16}{2} - \frac{5 \times 6}{2} = 120 - 15 = 105.$$

Question 4. Les termes sont $u_k = 3 + 2k$ pour $k = 0, 1, \dots, 9$. Il y a 10 termes, $u_0 = 3$ et $u_9 = 3 + 18 = 21$.

$$u_0 + u_1 + \dots + u_9 = \frac{(u_0 + u_9) \times 10}{2} = \frac{(3 + 21) \times 10}{2} = \frac{240}{2} = 120.$$

Exercice autonome

Exercice 90

On rappelle que pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$ et de premier terme u_0 :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Soit la suite (v_n) définie par $v_n = 3^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Vérifier que (v_n) est géométrique. Donner v_0 et la raison q .
2. Calculer $v_0 + v_1 + v_2 + v_3$ directement.
3. Appliquer la formule pour $n = 3$ et vérifier que l'on obtient le même résultat.
4. Calculer $v_0 + v_1 + \dots + v_9$.

Corrigé

Question 1. $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = 3$. Le quotient est constant : (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 3^0 = 1$ et de raison $q = 3$.

Question 2.

$$v_0 + v_1 + v_2 + v_3 = 1 + 3 + 9 + 27 = 40.$$

Question 3.

$$1 \times \frac{1 - 3^4}{1 - 3} = \frac{1 - 81}{-2} = \frac{-80}{-2} = 40.$$

On retrouve le même résultat. ✓

Question 4.

$$v_0 + v_1 + \dots + v_9 = 1 \times \frac{1 - 3^{10}}{1 - 3} = \frac{1 - 59049}{-2} = \frac{-59048}{-2} = 29\,524.$$

Revalidation

Exercice 91

Un épargnant place 100 € par mois sur un livret. Au bout du 1^{er} mois, le livret contient 100 €. Au bout du 2^e mois : 200 €. Etc. On note $S_n = 100n$ la somme après n mois.

En réalité, le livret offre 0,5 % d'intérêts par mois. Les versements sont effectués en fin de mois. Ainsi le 1^{er} versement de 100 € vaut au bout de n mois : $100 \times 1,005^{n-1}$. Le k^e versement (effectué à la fin du mois k) vaut au bout du n^e mois : $100 \times 1,005^{n-k}$.

1. Exprimer la somme totale T_n après n mois comme une somme géométrique.
2. La raison de cette suite géométrique est $q = 1,005$. Combien de termes y a-t-il dans T_n ?
3. Calculer T_{12} (arrondir à l'euro près).
4. Comparer T_{12} à 1 200 € (versements sans intérêts).

Corrigé

Question 1. $T_n = 100 \times 1,005^{n-1} + 100 \times 1,005^{n-2} + \dots + 100 \times 1,005^0 = 100(1 + 1,005 + \dots + 1,005^{n-1})$.

Question 2. Il y a n termes (du rang 0 au rang $n - 1$).

Question 3.

$$T_{12} = 100 \times \frac{1 - 1,005^{12}}{1 - 1,005} \approx 100 \times \frac{1 - 1,0617}{-0,005} \approx 100 \times \frac{-0,0617}{-0,005} \approx 100 \times 12,336 \approx 1\,234 \text{ €}.$$

Question 4. $T_{12} \approx 1\,234 \text{ €} > 1\,200 \text{ €}$. Les intérêts composés rapportent environ 34 € de plus sur 12 mois.

Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : choisir une méthode sans vérifier ses conditions, notamment utiliser un quotient sans établir la positivité des termes.

Orientation

Si l'erreur diagnostiquée concerne le signe d'une différence, reprendre le rappel et l'activité guidée. Si elle concerne un quotient, suivre aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

Rappel ciblé

La différence $u_{n+1} - u_n$ permet toujours de comparer deux termes consécutifs. La comparaison d'un quotient à 1 exige de connaître le signe des termes avant de conclure.

Aide graduée

Écrire dans cet ordre : expression de comparaison, conditions de signe, signe obtenu, puis conclusion sur les variations.

Activité guidée**Exercice 92** ◆

Étudier le sens de variation de la suite (u_n) définie par $u_n = -3n + 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, par la méthode de la différence.

1. Calculer $u_{n+1} - u_n$ et simplifier.
2. Quel est le signe de $u_{n+1} - u_n$?
3. Conclure sur le sens de variation de (u_n) .
4. Calculer u_0, u_1, u_2 et vérifier la cohérence.

Corrigé

Question 1.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= [-3(n+1) + 8] - [-3n + 8] \\ &= -3n - 3 + 8 + 3n - 8 \\ &= -3. \end{aligned}$$

Question 2. $u_{n+1} - u_n = -3 < 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 3. La différence est strictement négative pour tout n . Donc la suite (u_n) est strictement décroissante.

Question 4.

$$u_0 = 8. \quad u_1 = 5. \quad u_2 = 2.$$

On a bien $8 > 5 > 2$: la suite est décroissante. ✓

Exercice autonome

Exercice 93

Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{2} + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer v_1, v_2, v_3 .
2. Calculer $v_{n+1} - v_n$ en fonction de v_n , et simplifier.
3. On admet que $v_n > 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire le signe de $v_{n+1} - v_n$, puis le sens de variation de (v_n) .

Corrigé

Question 1.

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{10}{2} + 3 = 5 + 3 = 8. \\ v_2 &= \frac{8}{2} + 3 = 4 + 3 = 7. \\ v_3 &= \frac{7}{2} + 3 = 3,5 + 3 = 6,5. \end{aligned}$$

Question 2.

$$v_{n+1} - v_n = \left(\frac{v_n}{2} + 3 \right) - v_n = 3 - \frac{v_n}{2} = \frac{6 - v_n}{2}.$$

Question 3. On admet $v_n > 6$ pour tout n . Alors $6 - v_n < 0$, donc :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{6 - v_n}{2} < 0.$$

La suite (v_n) est strictement décroissante. (Cela est cohérent : $10 > 8 > 7 > 6,5 > \dots$)

Revalidation

Exercice 94

Soit la suite (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4} \right)^n$.

1. Calculer w_0, w_1, w_2 .
2. Calculer le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n}$ pour tout n .
3. En déduire le sens de variation de (w_n) , en justifiant à partir du quotient.
4. La suite est-elle minorée? Majorée? Par quelle(s) valeur(s)?

Corrigé

Question 1.

$$w_0 = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}. \quad w_1 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}. \quad w_2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{1}{2} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{32}.$$

Question 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0$. Le quotient :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^n} = \frac{3}{4}.$$

Question 3. Le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{3}{4}$ satisfait $0 < \frac{3}{4} < 1$. Comme les termes sont positifs et le quotient est compris entre 0 et 1, chaque terme est plus petit que le précédent : la suite est strictement décroissante.

Question 4. Tous les termes sont strictement positifs ($w_n > 0$) : la suite est minorée par 0. Le terme maximum est $w_0 = \frac{1}{2}$: la suite est majorée par $\frac{1}{2}$.

Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : confondre évolution additive et multiplicative, ou choisir un indice sans vérifier qu'il est le premier à satisfaire la contrainte.

Orientation

Si l'erreur diagnostiquée concerne le coefficient d'évolution, reprendre le rappel et l'activité guidée. Si elle concerne un seuil ou un croisement, suivre aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

Rappel ciblé

Une variation absolue constante produit une suite arithmétique ; un taux constant produit une suite géométrique. Pour « à partir de », vérifier le rang frontière et prouver que l'inégalité reste vraie ensuite.

Aide graduée

Nommer la grandeur, son unité et l'origine des indices. Pour un croisement, étudier la différence des deux modèles plutôt que quelques valeurs isolées.

Activité guidée

Exercice 95

Un particulier dépose 500 € sur un livret d'épargne qui rapporte 2 % d'intérêts par an. On note C_n le capital (en euros) après n années.

1. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n .
2. Montrer que (C_n) est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme.
3. Exprimer C_n en fonction de n .
4. Calculer le capital après 5 ans et après 10 ans (arrondir à l'euro).

Corrigé

Question 1. Chaque année, le capital est augmenté de 2 % :

$$C_{n+1} = C_n + 0,02 \times C_n = C_n(1 + 0,02) = 1,02 \times C_n.$$

Question 2. Le rapport $\frac{C_{n+1}}{C_n} = 1,02$ est constant et les termes sont positifs. Donc (C_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,02$ et de premier terme $C_0 = 500$.

Question 3. $C_n = C_0 \times q^n = 500 \times 1,02^n$.

Question 4.

$$C_5 = 500 \times 1,02^5 \approx 500 \times 1,1041 \approx 552 \text{ €}.$$

$$C_{10} = 500 \times 1,02^{10} \approx 500 \times 1,2190 \approx 610 \text{ €}.$$

Exercice autonome

Exercice 96

Une ville comptait 20 000 habitants en 2020. Sa population diminue de 1,5 % chaque année. On note P_n la population n années après 2020.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Exprimer P_n en fonction de n .
3. Calculer P_5 (arrondir à l'entier).
4. À partir de quel rang n la population passe-t-elle sous 18 000 habitants ? (Essayer les valeurs $n = 5, 6, 7, 8$.)

Corrigé

Question 1. $CM = 1 - \frac{1,5}{100} = 0,985$.

Question 2. (P_n) est géométrique : $P_n = 20\,000 \times 0,985^n$.

Question 3.

$$P_5 = 20\,000 \times 0,985^5 \approx 20\,000 \times 0,9272 \approx 18\,544 \text{ habitants}.$$

Question 4.

n	P_n (arrondi)
5	18 544
6	18 266
7	17 992

$$P_7 \approx 17\,992 < 18\,000 \text{ et } P_6 \approx 18\,266 > 18\,000.$$

Comme $0 < 0,985 < 1$, pour tout $n \geq 7$,

$$P_n = P_7 \times 0,985^{n-7} \text{ et donc } P_n \leq P_7 < 18\,000.$$

Ainsi, l'inégalité reste vraie pour tout $n \geq 7$: la population passe sous 18 000 à partir de $n = 7$, c'est-à-dire en 2027.

Revalidation

Exercice 97

Une entreprise verse à un employé un salaire mensuel de 1 500 € la première année. Chaque année, le salaire augmente de 3 %.

Par ailleurs, un concurrent propose 1 600 € par mois la première année, avec une augmentation fixe de 30 € par an.

On note A_n le salaire mensuel chez l'entreprise A pendant l'année de rang n ($n = 0$: première année), et B_n le salaire mensuel chez l'entreprise B pendant cette même année.

1. Exprimer A_n et B_n en fonction de n .
2. Calculer A_0, A_1, A_5 et B_0, B_1, B_5 .
3. À partir de quelle année n l'entreprise A devient-elle plus avantageuse que B? (Essayer $n = 3, 4, 5, 6, 7$.)

Corrigé

Question 1. (A_n) est géométrique (augmentation de 3 %) : $A_n = 1\,500 \times 1,03^n$.

(B_n) est arithmétique (augmentation fixe de 30 €) : $B_n = 1\,600 + 30n$.

Question 2.

$$A_0 = 1\,500. \quad A_1 \approx 1\,545. \quad A_5 \approx 1\,739.$$

$$B_0 = 1\,600. \quad B_1 = 1\,630. \quad B_5 = 1\,750.$$

Question 3.

n	A_n (arrondi)	B_n	Meilleure offre
3	1 639	1 690	B
4	1 688	1 720	B
5	1 739	1 750	B
6	1 791	1 780	A
7	1 845	1 810	A

Posons $D_n = A_n - B_n$. Comme $A_n \geq A_0 = 1\,500$ pour tout n , on a

$$D_{n+1} - D_n = 0,03A_n - 30 \geq 15 > 0.$$

La suite (D_n) est donc strictement croissante. Or $D_5 < 0$ et $D_6 > 0$: $n = 6$ est le premier rang où A dépasse B, et l'inégalité reste vraie à tous les rangs suivants. À partir de $n = 6$ (la 7^e année), l'entreprise A devient plus avantageuse.

Diagnostic de l'erreur

Erreur ciblée : décaler le nombre d'itérations, oublier l'initialisation ou mettre à jour un accumulateur dans le mauvais ordre.

Orientation

Si l'erreur diagnostiquée concerne une boucle bornée, reprendre le rappel et l'activité guidée. Si elle concerne une somme ou un seuil, suivre aussi l'aide graduée. En cas de réussite immédiate, passer à la revalidation.

Rappel ciblé

La variable porte d'abord le terme initial. Une boucle de n itérations calcule alors le terme de rang n . Pour calculer $S_n = v_0 + \dots + v_n$ lorsque l'accumulateur est initialisé à $S = v_0$, mettre à jour le terme avant de l'ajouter : $S = v_0 + v_1 + \dots + v_k$ après k itérations. Pour un seuil, vérifier la valeur juste avant l'arrêt.

Aide graduée

Construire un tableau avec une ligne initiale, puis une ligne par itération. Relier chaque mise à jour Python à l'égalité mathématique correspondante.

Activité guidée

Exercice 98

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
On veut écrire un programme Python calculant u_n pour un rang n donné.

1. Dérouler à la main : calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Lire et analyser le programme suivant, ligne par ligne :

```
def terme(n):
    u = 1
    for k in range(n):
        u = 2 * u + 3
    return u
```

3. Vérifier que `terme(3)` renvoie bien la valeur de u_3 calculée en question 1.
4. Que renvoie `terme(0)` ? Est-ce cohérent ?

Corrigé

Question 1.

$$u_1 = 2 \times 1 + 3 = 5. \quad u_2 = 2 \times 5 + 3 = 13. \quad u_3 = 2 \times 13 + 3 = 29.$$

Question 2. Analyse ligne par ligne :

- ▶ `u = 1` : initialise u à $u_0 = 1$.
- ▶ `for k in range(n)` : répète n fois (pour $k = 0, 1, \dots, n-1$).
- ▶ `u = 2 * u + 3` : applique la relation $u_{n+1} = 2u_n + 3$.
- ▶ `return u` : renvoie le terme u_n après n mises à jour.

Question 3. Pour `terme(3)` : on applique 3 fois la relation en partant de $u_0 = 1$. Après 3 étapes, u vaut $29 = u_3$. ✓

Question 4. `terme(0)` : la boucle ne s'exécute pas (`range(0)` est vide). On renvoie `u = 1`. C'est bien $u_0 = 1$. Cohérent. ✓

Exercice autonome

Exercice 99

On considère la suite géométrique (v_n) de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = 3$.
On veut calculer la somme $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

1. Calculer S_3 directement (sans programme).
2. Lire le programme suivant :

```
def somme(n):
    v = 2
    S = 2
    for k in range(n):
        v = 3 * v
        S = S + v
    return S
```

3. Dérouler le programme pour $n = 3$ (tableau de trace) et vérifier que `somme(3)` renvoie S_3 .
4. Modifier ce programme pour calculer la somme $v_0 + v_1 + \dots + v_n$ si $v_0 = 5$ et $q = 4$.

Corrigé

Question 1.

$$S_3 = v_0 + v_1 + v_2 + v_3 = 2 + 6 + 18 + 54 = 80.$$

Question 2. Analyse :

- ▶ $v = 2$: terme courant, initialisé à $v_0 = 2$.
- ▶ $S = 2$: accumulateur, initialisé à $S = v_0 = 2$ (le premier terme est déjà compté).
- ▶ **for** k **in** $\text{range}(n)$: n itérations pour ajouter $v_1, v_2, \dots, v_n$.
- ▶ $v = 3 * v$: calcule le terme suivant.
- ▶ $S = S + v$: ajoute ce terme à l'accumulateur.

Question 3.

Tour	k	v	S
init.	–	2	2
1	0	6	8
2	1	18	26
3	2	54	80

somme(3) renvoie $80 = S_3$. ✓

Question 4. Pour $v_0 = 5$ et $q = 4$, on remplace les initialisations et le facteur de récurrence :

```
def somme(n):
    v = 5
    S = 5
    for k in range(n):
        v = 4 * v
        S = S + v
    return S
```

Revalidation

Exercice 100 ♦

Un capital de 1 000 € est placé avec un taux d'intérêt de 5 % par an. On cherche le plus petit rang n tel que le capital dépasse 1 500 €.

1. Écrire la relation de récurrence donnant le capital C_{n+1} en fonction de C_n .
2. Analyser le programme suivant et expliquer ce qu'il calcule :

```
C = 1000
n = 0
while C <= 1500 :
    C = 1.05 * C
    n = n + 1
print(n, C)
```

3. Dérouler les 3 premiers tours de boucle (tableau de trace).
4. Déterminer la valeur de n affichée. Vérifier que $C_{n-1} \leq 1\,500$ et $C_n > 1\,500$.

Corrigé

Question 1. $C_{n+1} = 1,05 \times C_n$.

Question 2. Le programme initialise $C = C_0 = 1\,000$ et $n = 0$, puis fait évoluer le capital à chaque itération. La boucle **while** continue tant que le capital ne dépasse pas 1 500 €. À la fin, il affiche le premier rang n et la première valeur C dépassant 1 500 €.

Question 3. Tableau de trace (valeurs arrondies) :

Tour	n	C
init.	0	1 000
1	1	1 050
2	2	1 102,50
3	3	1 157,63

Question 4. $C_8 = 1\,000 \times 1,05^8 \approx 1\,477 \leq 1\,500$ et $C_9 = 1\,000 \times 1,05^9 \approx 1\,551 > 1\,500$.

Le programme affiche $n = 9$ et $C \approx 1\,551$ €. Le capital dépasse 1 500 € pour la première fois à l'issue de la 9^e année.

Diagnostic de l'erreur. Trois confusions sont fréquentes lorsqu'on observe les termes d'une suite : croire que quelques termes suffisent à prouver un comportement, prendre la moyenne de valeurs alternées pour une limite, ou confondre « les termes diminuent » avec « les termes se rapprochent de zéro ».

Rappel ciblé. En Première, on commence par observer plusieurs termes, éventuellement à l'aide d'un tableau, d'une calculatrice ou d'un programme. On décrit alors ce que les valeurs suggèrent et on formule une *conjecture* : limite finie, limite infinie ou absence de limite. Une moyenne n'est pas une limite : les termes eux-mêmes doivent se rapprocher de la valeur conjecturée. Cette étude est menée sans démonstration formelle.

Aide graduée.

Coup de pouce 1. Comparer la distance entre a_n et 1, puis regarder si les valeurs de b_n continuent à augmenter. Pour (c_n) , vérifier si les termes finissent par rester proches d'une seule valeur.

Activité guidée.

Exercice 101

Pour $n \geq 1$, on définit $a_n = 1 + 2^{-n}$, $b_n = 2^n$ et $c_n = \frac{1 + (-1)^n}{2}$. Voici leurs premiers termes :

- ▶ a_n : 1,5 ; 1,25 ; 1,125 ; 1,0625 ; 1,03125 ;
- ▶ b_n : 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32 ;
- ▶ c_n : 0 ; 1 ; 0 ; 1 ; 0.

- Calculer a_6 , b_6 et c_6 pour prolonger chaque observation.
- Associer intuitivement chaque suite à l'un des comportements suivants : limite finie, limite infinie ou absence de limite.
- Rédiger chaque réponse comme une conjecture justifiée par les valeurs.

Corrigé

On obtient

$$a_6 = \frac{65}{64}, \quad b_6 = 64, \quad c_6 = 1.$$

Les nombres a_n observés se rapprochent de 1 : on conjecture une limite finie égale à 1. Les valeurs de b_n augmentent rapidement : les calculs suggèrent une limite infinie égale à $+\infty$. Enfin, les termes de (c_n) restent alternativement égaux à 0 et à 1 ; ils ne se rapprochent pas d'une valeur unique. On conjecture donc l'absence de limite.

Exercice autonome.

Exercice 102

Pour $n \geq 1$, on pose $p_n = 5 - 3^{-n}$, $q_n = -n$ et $r_n = (-2)^n$.

- Calculer, à la calculatrice ou avec un court programme, les six premiers termes de chaque suite.
- Classer intuitivement les trois suites parmi les comportements étudiés et justifier chaque conjecture par une observation précise.

Corrigé

$$\begin{aligned}(p_n) : & \frac{14}{3}, \frac{44}{9}, \frac{134}{27}, \frac{404}{81}, \frac{1214}{243}, \frac{3644}{729}, \\(q_n) : & -1, -2, -3, -4, -5, -6, \\(r_n) : & -2, 4, -8, 16, -32, 64.\end{aligned}$$

Les valeurs de (p_n) semblent se rapprocher de 5 : on conjecture une limite finie égale à 5. Les valeurs de (q_n) sont de plus en plus négatives : on conjecture une limite infinie égale à $-\infty$. Les signes de (r_n) alternent et ses valeurs absolues augmentent : on conjecture l'absence de limite.

Revalidation.

Exercice 103 ♦

On observe les premiers termes des suites suivantes :

$$\begin{aligned}(x_n) : & 4,5; 4,25; 4,125; 4,0625, \\(y_n) : & 4; 7; 10; 13 \quad \text{et} \quad (z_n) : -1; 1; -1; 1.\end{aligned}$$

Pour chacune, choisir le comportement que ces valeurs suggèrent et formuler une conjecture. Aucun calcul de moyenne ne suffit à conclure.

Corrigé

Les termes observés de (x_n) se rapprochent de 4 : on conjecture une limite finie égale à 4. Ceux de (y_n) augmentent régulièrement : on conjecture une limite infinie égale à $+\infty$. Ceux de (z_n) alternent entre -1 et 1 : on conjecture l'absence de limite.

Corrigé

Question 1. On calcule les trois premiers termes en substituant $n = 0$, $n = 1$ et $n = 2$ dans la formule $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n$.

$$\begin{aligned}u_0 &= 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^0 = 4 \times 1 = 4. \\u_1 &= 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^1 = 4 \times \frac{3}{2} = \frac{12}{2} = 6. \\u_2 &= 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 4 \times \frac{9}{4} = \frac{36}{4} = 9.\end{aligned}$$

Donc $u_0 = 4$, $u_1 = 6$ et $u_2 = 9$.

Question 2. Pour tout entier naturel n , calculons le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

On a :

$$u_{n+1} = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} \quad \text{et} \quad u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n.$$

Puisque $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, le quotient est bien défini et vaut :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}}{4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n} = \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1-n} = \frac{3}{2}.$$

Ce quotient est constant, égal à $\frac{3}{2}$, indépendant de n .

Donc la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{3}{2}$.

Question 3. D'après la définition d'une suite géométrique, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{3}{2} \times u_n.$$

Corrigé

Question 1. On substitue $n = 0$, $n = 1$ et $n = 2$ dans $u_n = 3n + 2$.

$$u_0 = 3 \times 0 + 2 = 0 + 2 = 2.$$

$$u_1 = 3 \times 1 + 2 = 3 + 2 = 5.$$

$$u_2 = 3 \times 2 + 2 = 6 + 2 = 8.$$

Donc $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et $u_2 = 8$.

Question 2. On substitue $n = 10$ dans la formule :

$$u_{10} = 3 \times 10 + 2 = 30 + 2 = 32.$$

Donc $u_{10} = 32$.

Question 3. La suite (u_n) est définie par **formule explicite**, car chaque terme $u_n = 3n + 2$ s'exprime directement en fonction de l'indice n , sans avoir besoin de connaître les termes précédents de la suite.

Corrigé

Question 1. On applique la relation $u_{n+1} = 3u_n - 2$ de proche en proche, en partant de $u_0 = 5$.

$$u_1 = 3u_0 - 2 = 3 \times 5 - 2 = 15 - 2 = 13.$$

$$u_2 = 3u_1 - 2 = 3 \times 13 - 2 = 39 - 2 = 37.$$

$$u_3 = 3u_2 - 2 = 3 \times 37 - 2 = 111 - 2 = 109.$$

Donc $u_1 = 13$, $u_2 = 37$ et $u_3 = 109$.

Question 2. Cette suite est définie par une **relation de récurrence**, car chaque terme u_{n+1} est calculé à partir du terme précédent u_n via la relation $u_{n+1} = 3u_n - 2$: on ne dispose pas d'une formule exprimant u_n directement en fonction de n .

Question 3. Avec la seule relation de récurrence donnée, oui : elle fournit $u_5 = 3u_4 - 2$, donc le calcul de proche en proche requiert u_4 . Cela n'exclut pas qu'une expression explicite de u_n , si elle était établie par ailleurs, permette ensuite de calculer un terme à partir de son indice.

Corrigé

Question 1. On substitue les valeurs de n dans $u_n = n^2 - 2n + 3$.

$$u_0 = 0^2 - 2 \times 0 + 3 = 0 - 0 + 3 = 3.$$

$$u_1 = 1^2 - 2 \times 1 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2.$$

$$u_2 = 2^2 - 2 \times 2 + 3 = 4 - 4 + 3 = 3.$$

$$u_3 = 3^2 - 2 \times 3 + 3 = 9 - 6 + 3 = 6.$$

Donc $u_0 = 3$, $u_1 = 2$, $u_2 = 3$ et $u_3 = 6$.

Question 2. Pour $n = 5$:

$$u_5 = 5^2 - 2 \times 5 + 3 = 25 - 10 + 3 = 18.$$

Donc $u_5 = 18$.

Question 3. D'après les calculs de la question 1, on a $u_1 = 2$ et $u_2 = 3$.

Comme $2 \neq 3$, on a $u_1 \neq u_2$.

Donc Amira a **tort** : les termes u_1 et u_2 ne sont pas égaux.

Corrigé

Question 1. On applique la relation $v_{n+2} = v_{n+1} + v_n$ en partant de $v_0 = 1$ et $v_1 = 1$.

$$v_2 = v_1 + v_0 = 1 + 1 = 2.$$

$$v_3 = v_2 + v_1 = 2 + 1 = 3.$$

$$v_4 = v_3 + v_2 = 3 + 2 = 5.$$

$$v_5 = v_4 + v_3 = 5 + 3 = 8.$$

Donc $v_2 = 2$, $v_3 = 3$, $v_4 = 5$ et $v_5 = 8$.

Question 2. Cette suite est définie par **récurrence**, car chaque terme v_{n+2} est exprimé en fonction des deux termes précédents v_{n+1} et v_n : aucune formule explicite n'est donnée ici pour calculer v_n directement à partir de n .

Question 3. Pour calculer v_6 , on applique la relation avec $n = 4$:

$$v_6 = v_5 + v_4.$$

Il faut donc connaître v_5 et v_4 (soit $v_5 = 8$ et $v_4 = 5$), ce qui donne $v_6 = 8 + 5 = 13$.

Corrigé

Question 1. On substitue $n = 0$, $n = 1$ et $n = 2$ dans $u_n = 7 + 4n$.

$$u_0 = 7 + 4 \times 0 = 7 + 0 = 7.$$

$$u_1 = 7 + 4 \times 1 = 7 + 4 = 11.$$

$$u_2 = 7 + 4 \times 2 = 7 + 8 = 15.$$

Donc $u_0 = 7$, $u_1 = 11$ et $u_2 = 15$.

Question 2. Pour tout entier naturel n , calculons la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = (7 + 4(n+1)) - (7 + 4n) = 7 + 4n + 4 - 7 - 4n = 4.$$

Cette différence est constante, égale à 4, indépendante de n .

Donc la suite (u_n) est une suite **arithmétique** de raison $r = 4$ et de premier terme $u_0 = 7$.

Question 3. On applique la formule du terme général $u_n = u_0 + nr = 7 + 4n$ pour $n = 10$:

$$u_{10} = 7 + 4 \times 10 = 7 + 40 = 47.$$

Donc $u_{10} = 47$.

Corrigé

Question 1. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 100$ et de raison $r = -3$. Sa formule du terme général est :

$$u_n = u_0 + n \times r = 100 + n \times (-3) = 100 - 3n.$$

Question 2. On calcule u_1 et u_2 :

$$u_1 = 100 - 3 \times 1 = 100 - 3 = 97.$$

$$u_2 = 100 - 3 \times 2 = 100 - 6 = 94.$$

Donc $u_1 = 97$ et $u_2 = 94$.

Question 3. On applique la formule pour $n = 20$:

$$u_{20} = 100 - 3 \times 20 = 100 - 60 = 40.$$

Donc $u_{20} = 40$.

Question 4. La raison de la suite est $r = -3 < 0$.

Pour toute suite arithmétique, la différence $u_{n+1} - u_n = r$ est constante. Ici, $r = -3 < 0$, donc $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La suite (u_n) est donc **strictement décroissante**.

Corrigé

Question 1. On applique la relation $u_n = u_p + (n - p) \times r$ avec $p = 5, n = 0, u_5 = 23$ et $r = 4$:

$$u_0 = u_5 + (0 - 5) \times r = 23 + (-5) \times 4 = 23 - 20 = 3.$$

Donc $u_0 = 3$.

Question 2. La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 4$. Sa formule du terme général est :

$$u_n = u_0 + n \times r = 3 + 4n.$$

Vérification : $u_5 = 3 + 4 \times 5 = 3 + 20 = 23$. ✓

Question 3. On applique la formule pour $n = 8$:

$$u_8 = 3 + 4 \times 8 = 3 + 32 = 35.$$

Donc $u_8 = 35$.

Corrigé

Question 1. On substitue $n = 0, 1, 2, 3$ dans $u_n = 6 \times 2^n$:

$$u_0 = 6 \times 2^0 = 6 \times 1 = 6.$$

$$u_1 = 6 \times 2^1 = 6 \times 2 = 12.$$

$$u_2 = 6 \times 2^2 = 6 \times 4 = 24.$$

$$u_3 = 6 \times 2^3 = 6 \times 8 = 48.$$

Donc $u_0 = 6, u_1 = 12, u_2 = 24$ et $u_3 = 48$.

Question 2. Les deux premières différences valent

$$u_1 - u_0 = 12 - 6 = 6, \quad u_2 - u_1 = 24 - 12 = 12.$$

Elles sont différentes : les différences ne sont pas constantes. L'affirmation de Lina est donc fausse et la suite n'est pas arithmétique.

Question 3. Puisque $u_n = 6 \times 2^n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est bien défini. On calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{6 \times 2^{n+1}}{6 \times 2^n} = 2^{n+1-n} = 2.$$

Ce quotient est constant, égal à 2, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Donc la suite (u_n) est une suite **géométrique** de raison $q = 2$.

Question 4. On résout

$$u_n = 192 \iff 6 \times 2^n = 192 \iff 2^n = 32 = 2^5.$$

Ainsi, le rang cherché est $n = 5$.

Corrigé

Question 1. La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 81$ et de raison $q = \frac{1}{3}$. On calcule :

$$u_1 = u_0 \times q = 81 \times \frac{1}{3} = 27.$$

$$u_2 = u_1 \times q = 27 \times \frac{1}{3} = 9.$$

$$u_3 = u_2 \times q = 9 \times \frac{1}{3} = 3.$$

$$u_4 = u_3 \times q = 3 \times \frac{1}{3} = 1.$$

Donc $u_1 = 27$, $u_2 = 9$, $u_3 = 3$ et $u_4 = 1$.

Question 2. La formule du terme général est :

$$u_n = u_0 \times q^n = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

On peut aussi l'écrire $u_n = 3^4 \times 3^{-n} = 3^{4-n}$.

Question 3. Tous les termes sont positifs ($u_0 = 81 > 0$ et $q = \frac{1}{3} > 0$, donc $u_n = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n > 0$ pour tout n).

De plus, $0 < q = \frac{1}{3} < 1$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{1}{3} \times u_n < u_n.$$

La suite (u_n) est donc **strictement décroissante**.

Corrigé

Question 1. La formule du terme général est $u_k = 2 + 3k$. On calcule :

k	0	1	2	3	4	5
u_k	2	5	8	11	14	17

En détail :

$$u_0 = 2, \quad u_1 = 2 + 3 = 5, \quad u_2 = 2 + 6 = 8, \quad u_3 = 2 + 9 = 11, \quad u_4 = 2 + 12 = 14, \quad u_5 = 2 + 15 = 17.$$

Question 2. La somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_5$ contient $n + 1 = 5 + 1 = 6$ termes. On applique la formule :

$$S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2} = 6 \times \frac{u_0 + u_5}{2} = 6 \times \frac{2 + 17}{2} = 6 \times \frac{19}{2} = 6 \times 9,5 = 57.$$

Donc $S = 57$.

Question 3. On additionne directement les six termes :

$$S = 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 = (2 + 5) + (8 + 11) + (14 + 17) = 7 + 19 + 31 = 57.$$

On retrouve bien $S = 57$. ✓

Corrigé

Question 1. La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = 2$. La formule du terme général est :

$$u_n = u_0 \times q^n = 1 \times 2^n = 2^n.$$

Question 2. On calcule $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$ avec la formule $S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, où $n = 7$, $u_0 = 1$ et $q = 2$.

Puisque $q = 2 \neq 1$, la formule s'applique :

$$S = 1 \times \frac{1 - 2^{7+1}}{1 - 2} = \frac{1 - 2^8}{1 - 2} = \frac{1 - 256}{-1} = \frac{-255}{-1} = 255.$$

Donc $S = 255$.

Question 3. On liste les termes $u_k = 2^k$ pour k de 0 à 7 :

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 2, \quad u_2 = 4, \quad u_3 = 8, \quad u_4 = 16, \quad u_5 = 32, \quad u_6 = 64, \quad u_7 = 128.$$

On additionne :

$$S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 255.$$

On retrouve bien $S = 255$. ✓

Corrigé

Question 1. On applique la formule avec $n = 50$:

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + 50 = \frac{50 \times (50 + 1)}{2} = \frac{50 \times 51}{2} = \frac{2550}{2} = 1275.$$

Donc $S = 1275$.

Question 2. On regroupe les termes en paires :

$$(1 + 50), (2 + 49), (3 + 48), \dots, (25 + 26).$$

Chaque paire vaut 51. Il y a $\frac{50}{2} = 25$ paires. Donc :

$$S = 25 \times 51 = 1275.$$

On retrouve bien $S = 1275$. ✓

Corrigé

Question 1. On calcule $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = (3 + 5(n + 1)) - (3 + 5n) = 3 + 5n + 5 - 3 - 5n = 5.$$

Donc $u_{n+1} - u_n = 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 2. Puisque $u_{n+1} - u_n = 5 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, la différence est strictement positive.

Question 3. Comme $u_{n+1} - u_n = 5 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on conclut que la suite (u_n) est **strictement croissante**.

Remarque. On peut aussi le voir directement : $u_n = 3 + 5n$ est une fonction affine croissante de n (coefficient directeur $5 > 0$). La suite est d'ailleurs arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 5 > 0$.

Corrigé

Question 1. On vérifie que tous les termes u_n sont strictement positifs.

Par récurrence : $u_0 = 5 > 0$, et si $u_n > 0$ alors $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n > 0$ (produit de deux nombres positifs).
Donc $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 2. Puisque $u_n > 0$, le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est bien défini. La relation $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n$ donne :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{3}{4}u_n}{u_n} = \frac{3}{4}.$$

Question 3. Puisque tous les termes sont strictement positifs et que :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{4} < 1,$$

on a $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La suite (u_n) est donc **strictement décroissante**.

Corrigé

Question 1. On calcule la dérivée de $f(x) = x^2 - 4x + 7$:

$$f'(x) = 2x - 4.$$

Question 2. On étudie le signe de $f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$ sur $[0; +\infty[$:

- ▶ $f'(x) < 0$ si $x < 2$, donc f est **strictement décroissante** sur $[0; 2]$;
- ▶ $f'(x) = 0$ si $x = 2$ (minimum de f) ;
- ▶ $f'(x) > 0$ si $x > 2$, donc f est **strictement croissante** sur $[2; +\infty[$.

Tableau de variations de f sur $[0; +\infty[$:

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	–	0	+
$f(x)$	7	↘ 3 ↗	$+\infty$

Question 3. On calcule les premiers termes de (u_n) :

$$u_0 = 0^2 - 4 \times 0 + 7 = 7, \quad u_1 = 1 - 4 + 7 = 4, \quad u_2 = 4 - 8 + 7 = 3, \quad u_3 = 9 - 12 + 7 = 4.$$

D'après les variations de f :

- ▶ Pour $n \in \{0, 1, 2\}$, on a $n \leq 2$, donc f est décroissante : la suite (u_n) est **strictement décroissante** sur $\{0, 1, 2\}$ (on vérifie : $u_0 = 7 > u_1 = 4 > u_2 = 3$).
- ▶ Pour $n \geq 2$, on a $n \geq 2$, donc f est croissante : la suite (u_n) est **strictement croissante** pour $n \geq 2$ (on vérifie : $u_2 = 3 < u_3 = 4$).

La suite (u_n) est donc décroissante puis croissante, avec un minimum en $n = 2$: $u_2 = 3$.

Corrigé

Question 1. Après n mois, Yasmine a payé 500 € à l'inscription et $30 \times n$ € de mensualités. Donc :

$$C_n = 500 + 30n \quad (\text{en euros}).$$

Question 2. On calcule $C_{n+1} - C_n$:

$$C_{n+1} - C_n = (500 + 30(n+1)) - (500 + 30n) = 30.$$

La différence $C_{n+1} - C_n = 30$ est constante pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc la suite (C_n) est **arithmétique** de :

- ▶ premier terme $C_0 = 500 + 30 \times 0 = 500$ €;
- ▶ raison $r = 30$.

Question 3. On calcule le coût total après 12 mois :

$$C_{12} = 500 + 30 \times 12 = 500 + 360 = 860.$$

Après 1 an (12 mois), le coût total est de **860 €**.

Corrigé

Question 1. Un taux annuel de 5 % correspond au coefficient multiplicateur :

$$1 + \frac{5}{100} = 1,05.$$

Question 2. Chaque année, le capital est multiplié par 1,05, donc :

$$P_{n+1} = 1,05 \times P_n.$$

Par application répétée à partir de $P_0 = 2000$:

$$P_n = P_0 \times (1,05)^n = 2000 \times (1,05)^n.$$

Question 3. La suite (P_n) est **géométrique** car $\frac{P_{n+1}}{P_n} = 1,05$ est constant pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Elle a pour :

- ▶ premier terme $P_0 = 2000$ €;
- ▶ raison $q = 1,05$.

Question 4. On calcule P_3 :

$$P_3 = 2000 \times (1,05)^3 = 2000 \times 1,157625 = 2315,25.$$

Après 3 ans, le capital est de **2 315,25 €**.

Corrigé

Question 1. Une hausse de 2 % correspond au coefficient

$$1 + \frac{2}{100} = 1,02.$$

Ainsi $N_{n+1} = 1,02N_n$: la suite (N_n) est géométrique de raison 1,02.

Question 2. Pour le modèle géométrique,

$$N_1 = 1200 \times 1,02 = 1224, \quad N_2 = 1200 \times (1,02)^2 = 1248,48.$$

Pour le modèle additif,

$$A_1 = 1200 + 24 = 1224, \quad A_2 = 1200 + 2 \times 24 = 1248.$$

Ainsi $N_1 = A_1 = 1224$, mais $N_2 = 1248,48$ tandis que $A_2 = 1248$. Le modèle additif reproduit la première hausse, mais ne convient pas ensuite : une croissance de 2 % porte chaque heure sur la population courante, et non sur la population initiale.

Question 3. La forme explicite du modèle géométrique est $N_n = 1200 \times (1,02)^n$. Donc

$$N_{10} = 1200 \times (1,02)^{10} \approx 1462,79, \quad A_{10} = 1200 + 24 \times 10 = 1440.$$

Après dix heures, les deux prévisions diffèrent d'environ $1462,79 - 1440 = 22,79$ bactéries.

Question 4. Une valeur décimale telle que 1248,48 est une valeur théorique fournie par le modèle : elle ne décrit pas une fraction de bactérie. Pour interpréter la prévision en nombre d'individus, on arrondit à l'unité. Le modèle prévoit donc environ 1248 bactéries après deux heures et environ 1463 bactéries après dix heures.

Corrigé

Question 1. On simule l'algorithme étape par étape à partir de $u = u_0 = 2$:

Itération k	Valeur de u après l'instruction $u = 2 * u + 3$
$k = 0$	$u = 2 \times 2 + 3 = 7$ (c'est u_1)
$k = 1$	$u = 2 \times 7 + 3 = 17$ (c'est u_2)
$k = 2$	$u = 2 \times 17 + 3 = 37$ (c'est u_3)
$k = 3$	$u = 2 \times 37 + 3 = 77$ (c'est u_4)
$k = 4$	$u = 2 \times 77 + 3 = 157$ (c'est u_5)

Tableau de valeurs :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	2	7	17	37	77	157

Question 2. À la fin de l'algorithme, la variable u contient $u_5 = 157$. L'instruction `print(u)` affiche donc 157.

Question 3. Pour calculer u_{10} à la place de u_5 , il faut remplacer `range(5)` par `range(10)` dans le fichier Python source ; les autres instructions restent inchangées.

Corrigé

Question 1. On simule l'algorithme étape par étape. Avant la boucle : $u = 3$ (c'est u_0) et $S = 3$. À chaque itération, on calcule le terme suivant puis on l'ajoute à S :

Valeur de k	Valeur de u après la boucle	Valeur de S après la boucle
0	$2 \times 3 = 6$ ($= u_1$)	$3 + 6 = 9$
1	$2 \times 6 = 12$ ($= u_2$)	$9 + 12 = 21$
2	$2 \times 12 = 24$ ($= u_3$)	$21 + 24 = 45$
3	$2 \times 24 = 48$ ($= u_4$)	$45 + 48 = 93$
fin	48	93

Question 2. À la fin de l'algorithme, S contient 93. L'instruction `print(S)` affiche donc 93.

Question 3. La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$. On calcule $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$ (cinq termes, de u_0 à u_4 , donc $n = 4$) :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 3 \times \frac{1 - 2^{4+1}}{1 - 2} = 3 \times \frac{1 - 32}{-1} = 3 \times \frac{-31}{-1} = 3 \times 31 = 93.$$

On retrouve bien $S = 93$. ✓

Vérification par calcul direct : $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 3 + 6 + 12 + 24 + 48 = 93$. ✓

Corrigé

Question 1 — Calcul des premiers termes et conjecture.

On utilise la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + 5$.

$$u_1 = u_0 + 5 = 7 + 5 = 12.$$

$$u_2 = u_1 + 5 = 12 + 5 = 17.$$

$$u_3 = u_2 + 5 = 17 + 5 = 22.$$

La différence entre deux termes consécutifs est constante et égale à 5. On conjecture que (u_n) est une suite arithmétique de raison 5.

Question 2 — Démonstration de la nature arithmétique.

Pour tout entier naturel n , on calcule :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 5) - u_n = 5.$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante et égale à 5 pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = 7$.

Question 3 — Expression de u_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = u_0 + n \times r = 7 + 5n.$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = 5n + 7$.

Question 4 — Calcul de u_{10} et détermination du premier rang tel que $u_n > 100$.

Calcul de u_{10} :

$$u_{10} = 5 \times 10 + 7 = 50 + 7 = 57.$$

Plus petit entier n tel que $u_n > 100$:

On résout l'inéquation $u_n > 100$:

$$5n + 7 > 100 \iff 5n > 93 \iff n > \frac{93}{5} = 18,6.$$

Le plus petit entier vérifiant $n > 18,6$ est $n = 19$.

Vérification :

$$u_{18} = 5 \times 18 + 7 = 97 \leq 100, \quad u_{19} = 5 \times 19 + 7 = 102 > 100. \checkmark$$

Le plus petit entier n tel que $u_n > 100$ est $n = 19$.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer u_1, u_2, u_3 et conjecturer) ; Q2 : 3 pts (raisonner, communiquer : démonstration complète avec la définition) ; Q3 : 2 pts (calculer : formule du terme général) ; Q4 : 2 pts (calculer u_{10} : 1 pt ; résoudre l'inéquation et conclure : 1 pt)

Corrigé

Question 1 — Calcul des premiers termes.

On substitue les valeurs de n dans la formule $u_n = 3n + 4$:

$$u_0 = 3 \times 0 + 4 = 4, \quad u_1 = 3 \times 1 + 4 = 7, \quad u_2 = 3 \times 2 + 4 = 10, \quad u_3 = 3 \times 3 + 4 = 13.$$

Question 2 — Calcul de $u_{n+1} - u_n$ et nature de la suite.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = (3(n+1) + 4) - (3n + 4) = 3n + 3 + 4 - 3n - 4 = 3.$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante et égale à 3 pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 3$.

Question 3 — Critique de l'argument de l'élève et justification rigoureuse.

Insuffisance de l'argument : vérifier que $u_0 < u_1 < u_2$ ne prouve la croissance que pour les trois premiers termes ; cela ne dit rien sur les termes suivants. Une suite peut être croissante sur ses premiers termes puis décroissante.

Justification rigoureuse : On a montré à la question 2 que, pour *tout* $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 3 > 0.$$

Donc $u_{n+1} > u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, ce qui prouve que (u_n) est **strictement croissante**.

Question 4 — Rang à partir duquel $u_n > 40$.

On résout l'inéquation $u_n > 40$:

$$3n + 4 > 40 \iff 3n > 36 \iff n > 12.$$

Le plus petit entier n tel que $u_n > 40$ est $n = 13$.

Vérification :

$$u_{12} = 3 \times 12 + 4 = 40 \not> 40, \quad u_{13} = 3 \times 13 + 4 = 43 > 40. \checkmark$$

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer les quatre termes) ; Q2 : 3 pts (raisonner, communiquer : calcul de la différence et conclusion) ; Q3 : 3 pts (raisonner, communiquer : critique fondée et démonstration rigoureuse) ; Q4 : 1 pt (calculer : résolution de l'inéquation)

Corrigé

Question 1 — Relation de récurrence et nature arithmétique.

L'entreprise traite 6 colis de plus chaque jour, donc :

$$u_{n+1} = u_n + 6, \quad u_0 = 20.$$

Démonstration : Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 6) - u_n = 6.$$

La différence $u_{n+1} - u_n = 6$ est constante. Donc (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 6$ et de premier terme $u_0 = 20$.

Question 2 — Terme général et calcul de u_{19} .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = u_0 + n \times r = 20 + 6n.$$

$$u_{19} = 20 + 6 \times 19 = 20 + 114 = 134.$$

L'entreprise traite 134 colis lors du 20^e jour.

Question 3 — Somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{19}$.

La somme porte sur 20 termes (de $n = 0$ à $n = 19$), de premier terme $u_0 = 20$ et de dernier terme $u_{19} = 134$:

$$S = \frac{20 \times (u_0 + u_{19})}{2} = \frac{20 \times (20 + 134)}{2} = \frac{20 \times 154}{2} = 10 \times 154 = 1540.$$

L'entreprise traite 1 540 colis au total durant les 20 premiers jours.

Question 4 — Nombre de jours pour atteindre 3 000 colis au total.

La somme cumulée des $n + 1$ premiers termes (de u_0 à u_n) vaut :

$$S_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2} = \frac{(n+1)(20 + 20 + 6n)}{2} = \frac{(n+1)(40 + 6n)}{2} = (n+1)(20 + 3n).$$

On cherche le plus petit entier n tel que $S_n \geq 3\,000$:

$$(n+1)(3n+20) \geq 3000 \iff 3n^2 + 23n + 20 \geq 3000 \iff 3n^2 + 23n - 2980 \geq 0.$$

Le discriminant est $\Delta = 529 + 35760 = 36289$, donc $\sqrt{\Delta} \approx 190,5$.

La racine positive est :

$$n = \frac{-23 + \sqrt{36289}}{6} \approx \frac{-23 + 190,5}{6} \approx \frac{167,5}{6} \approx 27,9.$$

L'inéquation est vérifiée pour $n \geq 28$ (entier).

Vérification :

$$S_{27} = 28 \times (20 + 3 \times 27) = 28 \times 101 = 2828 < 3000.$$

$$S_{28} = 29 \times (20 + 3 \times 28) = 29 \times 104 = 3016 \geq 3000. \checkmark$$

Ces deux valeurs consécutives prouvent que $n = 28$ est le plus petit rang pour lequel $S_n \geq 3\,000$.

L'entreprise aura traité au moins 3 000 colis au total après 29 jours (à partir du rang $n = 28$, c'est-à-dire à la fin du 29^e jour).

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : relation de récurrence 1 pt + démonstration arithmétique 1 pt) ; Q2 : 2 pts (calculer : formule 1 pt + u_{19} 1 pt) ; Q3 : 2 pts (calculer : application formule somme) ; Q4 : 2 pts (raisonner : mise en équation et résolution)

Corrigé

Question 1 — Détermination de la raison et du premier terme.

(u_n) est une suite arithmétique de raison r . On a donc $u_n = u_1 + (n-1)r$ pour tout $n \geq 1$.

En particulier :

$$u_5 = u_1 + 4r \implies 20 = 8 + 4r \implies 4r = 12 \implies r = 3.$$

Le premier terme :

$$u_0 = u_1 - r = 8 - 3 = 5.$$

La raison est $r = 3$ et le premier terme est $u_0 = 5$.

Question 2 — Expression de u_n en fonction de n .

Par la formule du terme général :

$$u_n = u_0 + n \times r = 5 + 3n.$$

Vérification : $u_1 = 5 + 3 = 8 \checkmark$ $u_5 = 5 + 15 = 20 \checkmark$.

Question 3 — Calcul de $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$.

La somme porte sur 10 termes, de premier terme $u_1 = 8$ et de dernier terme $u_{10} = 5 + 30 = 35$.

$$S = \frac{10 \times (u_1 + u_{10})}{2} = \frac{10 \times (8 + 35)}{2} = \frac{10 \times 43}{2} = 5 \times 43 = 215.$$

Question 4 — Expression de T_n et détermination du premier rang tel que $T_n > 500$.

Expression de T_n : $T_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ est la somme de n termes de la suite arithmétique, de premier terme $u_1 = 8$ et de dernier terme $u_n = 3n + 5$.

$$T_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n(8 + 3n + 5)}{2} = \frac{n(3n + 13)}{2}.$$

Résolution de $T_n > 500$:

$$\frac{n(3n + 13)}{2} > 500 \iff 3n^2 + 13n - 1000 > 0.$$

Le discriminant est $\Delta = 13^2 + 4 \times 3 \times 1000 = 169 + 12000 = 12169$.

On calcule $\sqrt{12169} \approx 110,3$.

$$n > \frac{-13 + 110,3}{6} \approx \frac{97,3}{6} \approx 16,2.$$

Le plus petit entier n satisfaisant l'inéquation est donc $n = 17$.

Vérification :

$$T_{16} = \frac{16 \times (3 \times 16 + 13)}{2} = \frac{16 \times 61}{2} = 8 \times 61 = 488 \leq 500.$$

$$T_{17} = \frac{17 \times (3 \times 17 + 13)}{2} = \frac{17 \times 64}{2} = 17 \times 32 = 544 > 500. \checkmark$$

Ces deux valeurs consécutives prouvent que $n = 17$ est le plus petit rang pour lequel $T_n > 500$.

Le plus petit entier n tel que $T_n > 500$ est $\boxed{n = 17}$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : relation entre u_1 , u_5 et r ; calcul de u_0); Q2 : 1 pt (calculer : formule terme général); Q3 : 2 pts (calculer : application formule somme); Q4 : 3 pts (raisonner, calculer : expression de T_n 1 pt + résolution inéquation 1 pt + vérification 1 pt)

Corrigé

Question 1 — Relation de récurrence et nature géométrique.

La population double toutes les heures, donc :

$$u_{n+1} = 2u_n, \quad u_0 = 3.$$

La relation $u_{n+1} = 2u_n$ est, par définition, celle d'une suite géométrique. Ainsi, (u_n) est géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 3$.

Question 2 — Expression de u_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$u_n = u_0 \times q^n = 3 \times 2^n.$$

Question 3 — Calcul de $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$.

La somme porte sur 8 termes (de rang 0 à 7) d'une suite géométrique de raison $q = 2 \neq 1$:

$$S = u_0 \frac{q^8 - 1}{q - 1} = 3 \times \frac{2^8 - 1}{2 - 1} = 3 \times \frac{256 - 1}{1} = 3 \times 255 = 765.$$

La somme des huit relevés effectués aux instants 0 h à 7 h vaut donc 765 millions. Elle ne représente pas une population présente à un instant donné.

Question 4 — Heure à partir de laquelle la population dépasse 100 millions.

On cherche le plus petit entier n tel que $u_n > 100$:

$$3 \times 2^n > 100 \iff 2^n > \frac{100}{3} \approx 33,33.$$

La suite est strictement croissante puisque son premier terme est positif et sa raison vaut $2 > 1$. Un tableau de valeurs ou des essais successifs donnent :

$$u_5 = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96 \leq 100, \quad u_6 = 3 \times 2^6 = 3 \times 64 = 192 > 100. \checkmark$$

Ces deux valeurs consécutives prouvent que le plus petit rang recherché est $n = 6$. La population dépasse donc pour la première fois 100 millions au bout de 6 heures.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : relation de récurrence 1 pt + identification géométrique, raison et premier terme 1 pt); Q2 : 1 pt (calculer : terme général); Q3 : 2 pts (calculer : huit termes et formule de somme 1 pt + résultat et interprétation des relevés 1 pt); Q4 : 3 pts (raisonner, calculer : mise en inéquation 1 pt + recherche numérique 1 pt + double frontière et interprétation horaire 1 pt)

Corrigé

Question 1 — Lecture de la relation de récurrence.

La relation $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n$ est, par définition, celle d'une suite géométrique. Ainsi, (u_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $u_0 = 256$.

Question 2 — Expression de u_n en fonction de n .

$$u_n = u_0 \times q^n = 256 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{256}{2^n}.$$

Question 3 — Calcul de u_3 et u_7 .

$$u_3 = \frac{256}{2^3} = \frac{256}{8} = 32.$$

$$u_7 = \frac{256}{2^7} = \frac{256}{128} = 2.$$

Question 4 — Calcul de S et de T .

La somme $S = u_0 + u_1 + \dots + u_7$ porte sur 8 termes d'une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2} \neq 1$:

$$S = u_0 \frac{1 - q^8}{1 - q} = 256 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^8}{1 - \frac{1}{2}} = 256 \times \frac{1 - \frac{1}{256}}{\frac{1}{2}} = 256 \times 2 \times \frac{255}{256} = 2 \times 255 = 510.$$

$$T = u_1 + u_2 + \dots + u_7 = S - u_0 = 510 - 256 = 254.$$

Question 5 — Formule de la somme et comportement pour n grand.

Pour tout entier $n \geq 1$, la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_n$ porte sur $n + 1$ termes :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 256 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}} = 512 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right).$$

C'est bien la formule annoncée.

Calculons quelques sommes partielles :

$$S_7 = 510, \quad S_9 = 511,5, \quad S_{15} = 511,992\,1875.$$

Ces valeurs sont inférieures à 512 et semblent se rapprocher de 512. On conjecture que les sommes partielles se rapprochent de 512 lorsque n devient grand.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : identification par définition 1 pt + raison et premier terme 1 pt) ; Q2 : 1 pt (calculer : terme général) ; Q3 : 1 pt (calculer : u_3 et u_7) ; Q4 : 2 pts (calculer : S et T) ; Q5 : 2 pts (raisonner, communiquer : démonstration de la formule 1 pt + calculs numériques et conjecture 1 pt)

Corrigé

Question 1 — Calcul de u_0 , u_1 et u_2 .

$$u_0 = -4 \times 0 + 30 = 30, \quad u_1 = -4 \times 1 + 30 = 26, \quad u_2 = -4 \times 2 + 30 = 22.$$

Question 2 — Démonstration que (u_n) est arithmétique.

Pour tout entier naturel n , on calcule la différence :

$$u_{n+1} - u_n = (-4(n+1) + 30) - (-4n + 30) = -4n - 4 + 30 + 4n - 30 = -4.$$

La différence $u_{n+1} - u_n = -4$ est constante pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Donc (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = -4$ et de premier terme $u_0 = 30$.

Question 3 — Sens de variation.

La raison de (u_n) est $r = -4 < 0$.

Puisque $r < 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_{n+1} - u_n = -4 < 0$, donc $u_{n+1} < u_n$.

La suite (u_n) est **strictement décroissante**.

Question 4 — Valeurs de n telles que $u_n > 0$ et $u_n \leq 0$.

On résout $u_n > 0$:

$$-4n + 30 > 0 \iff -4n > -30 \iff n < \frac{30}{4} = 7,5.$$

Comme n est un entier naturel, $u_n > 0 \iff n \leq 7$.

Vérification : $u_7 = -28 + 30 = 2 > 0$ et $u_8 = -32 + 30 = -2 < 0$. ✓

De même, $u_n \leq 0 \iff n \geq 8$.

Question 5 — Étude de (v_n) avec $v_n = u_n^2$.

On calcule les premiers termes :

$$v_0 = 30^2 = 900, \quad v_1 = 26^2 = 676, \quad v_2 = 22^2 = 484.$$

Ces trois valeurs sont dans l'ordre décroissant ($v_0 > v_1 > v_2$).

Cependant, (v_n) **n'est pas monotone** : en effet, u_n devient négatif à partir de $n = 8$, et $|u_n|$ commence à croître. Par exemple :

$$v_7 = 2^2 = 4, \quad v_8 = (-2)^2 = 4, \quad v_9 = (-6)^2 = 36.$$

La suite (v_n) est décroissante tant que u_n est positive (pour $n \leq 7$), puis elle reprend une croissance lorsque $|u_n|$ augmente (pour $n \geq 8$). Elle n'est donc pas monotone.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer : trois termes) ; Q2 : 2 pts (raisonner : calcul de la différence 1 pt + conclusion 1 pt) ; Q3 : 1 pt (raisonner : signe de r) ; Q4 : 2 pts (calculer, raisonner : résolution de l'inéquation 1 pt + vérification 1 pt) ; Q5 : 2 pts (raisonner, communiquer : calculs de v_0 , v_1 , v_2 1 pt + explication de la non-monotonie 1 pt)

Corrigé

Question 1 — Expression de u_n , calcul de u_5 et u_{16} .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $r = 3$:

$$u_n = u_0 + n \times r = 2 + 3n.$$

$$u_5 = 2 + 3 \times 5 = 2 + 15 = 17. \quad u_{16} = 2 + 3 \times 16 = 2 + 48 = 50.$$

Question 2 — Sens de variation par l'étude de $u_{n+1} - u_n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = (2 + 3(n+1)) - (2 + 3n) = 3n + 5 - 3n - 2 = 3.$$

Comme $u_{n+1} - u_n = 3 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, la suite (u_n) est **strictement croissante**.

Question 3 — Étude de (v_n) avec $v_n = u_n - 3n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = u_n - 3n = (2 + 3n) - 3n = 2.$$

La suite (v_n) est **constante**, de valeur 2.

Question 4 — Étude de (w_n) avec $w_n = \frac{1}{u_n}$.

a) Calcul de w_0, w_1, w_2 .

$$w_0 = \frac{1}{u_0} = \frac{1}{2}, \quad w_1 = \frac{1}{u_1} = \frac{1}{5}, \quad w_2 = \frac{1}{u_2} = \frac{1}{8}.$$

b) Démonstration que (w_n) est strictement décroissante.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = 2 + 3n \geq 2 > 0$, donc w_n est bien défini. On calcule :

$$w_{n+1} - w_n = \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{3n+5} - \frac{1}{3n+2} = \frac{(3n+2) - (3n+5)}{(3n+5)(3n+2)} = \frac{-3}{(3n+5)(3n+2)}.$$

Comme $(3n+5)(3n+2) > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $w_{n+1} - w_n < 0$, donc $w_{n+1} < w_n$.

La suite (w_n) est **strictement décroissante**.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer : formule du terme général 1 pt + u_5 et u_{16} 1 pt); Q2 : 2 pts (raisonner : calcul de la différence 1 pt + conclusion 1 pt); Q3 : 1 pt (calculer : simplification algébrique); Q4 : 2 pts (calculer : w_0, w_1, w_2 1 pt + démonstration de la décroissance 1 pt)

Corrigé

Question 1 — Calcul de u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = 5 \times \frac{3}{4} = \frac{15}{4}, \quad u_2 = \frac{15}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{45}{16}, \quad u_3 = \frac{45}{16} \times \frac{3}{4} = \frac{135}{64}.$$

Question 2 — Démonstration de la décroissance stricte (méthode du quotient).

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = 5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0$ car $5 > 0$ et $\left(\frac{3}{4}\right)^n > 0$.

En particulier, $u_n \neq 0$, ce qui autorise le calcul du quotient :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n} = \frac{3}{4}.$$

Comme $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{4} < 1$ et $u_n > 0$, on a $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La suite (u_n) est **strictement décroissante**.

Question 3 — Expression de u_n en fonction de n .

Il s'agit d'une suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = \frac{3}{4}$, donc :

$$u_n = u_0 \times q^n = 5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

Question 4 — Étude de $v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1$.

a) Calcul de v_n .

$$v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4}.$$

La suite (v_n) est constante, de valeur $-\frac{1}{4}$.

b) Interprétation du signe.

$$v_n = -\frac{1}{4} < 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Comme $v_n < 0$, on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, ce qui, combiné à $u_n > 0$, donne $u_{n+1} < u_n$. Cela confirme que (u_n) est strictement décroissante.

Question 5 — Nature de (w_n) avec $w_n = \frac{1}{u_n}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ donc w_n est bien défini. Calculons le quotient :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{1/u_{n+1}}{1/u_n} = \frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{1}{q} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}.$$

Ce quotient est constant. Donc (w_n) est une suite géométrique de raison $\frac{4}{3}$ et de premier terme $w_0 = \frac{1}{5}$.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer : trois termes en fractions); Q2 : 2 pts (raisonner : $u_n > 0$ justifié 1 pt + calcul du quotient et conclusion 1 pt); Q3 : 1 pt (calculer : formule terme général); Q4 : 2 pts (calculer : valeur de v_n 1 pt + interprétation du signe 1 pt); Q5 : 2 pts (raisonner : calcul du quotient de (w_n) 1 pt + identification et raison 1 pt)

Corrigé

Question 1 — Nature géométrique de (u_n) .

On a $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n$. Cette expression est directement la forme explicite $u_n = u_0 q^n$ d'une suite géométrique, avec $u_0 = 2$ et $q = \frac{5}{3}$.

Ainsi, (u_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{5}{3}$ et de premier terme $u_0 = 2$.

Question 2 — Sens de variation.

a) Par le quotient.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5}{3} > 1 \text{ et } u_n > 0, \text{ donc } u_{n+1} > u_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} : \text{la suite est strictement croissante.}$$

b) Par la différence.

$$u_{n+1} - u_n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^{n+1} - 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n \times \left(\frac{5}{3} - 1\right) = 2 \times \left(\frac{5}{3}\right)^n \times \frac{2}{3}.$$

Comme $2 > 0$, $\left(\frac{5}{3}\right)^n > 0$ et $\frac{2}{3} > 0$, on a $u_{n+1} - u_n > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$.

Les deux méthodes donnent la même conclusion : (u_n) est **strictement croissante**.

Question 3 — Étude de la suite réciproque (v_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$, donc $v_n = \frac{1}{u_n}$ est bien défini. On obtient :

$$v_n = \frac{1}{2 \left(\frac{5}{3}\right)^n} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5}\right)^n.$$

Cette écriture est celle d'une suite géométrique de premier terme $v_0 = \frac{1}{2}$ et de raison $q_v = \frac{3}{5}$.

Question 4 — Sens de variation et comparaison.

La suite (v_n) a un premier terme positif et une raison $q_v = \frac{3}{5}$ comprise strictement entre 0 et 1. Elle est donc **strictement décroissante**.

Ce comportement est opposé à celui de (u_n) , strictement croissante : lorsque les termes positifs u_n augmentent, leurs inverses $v_n = 1/u_n$ diminuent.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (raisonner : identification directe de la forme géométrique 1 pt + raison et premier terme 1 pt) ; Q2 : 2 pts (calculer, raisonner : méthode quotient 1 pt + méthode différence avec factorisation 1 pt) ; Q3 : 3 pts (calculer, raisonner : écriture réciproque 1 pt + forme géométrique 1 pt + raison et premier terme 1 pt) ; Q4 : 1 pt (raisonner : variation et comparaison avec (u_n))

Corrigé

Question 1 — Relation de récurrence et nature géométrique.

Chaque année, le capital est multiplié par $(1 + 0,03) = 1,03$. Donc :

$$C_{n+1} = 1,03 \times C_n, \quad C_0 = 800.$$

D'après la relation de récurrence $C_{n+1} = 1,03C_n$, chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par la même constante 1,03.

La suite (C_n) est donc géométrique de raison $q = 1,03$ et de premier terme $C_0 = 800$.

Question 2 — Expression de C_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$C_n = C_0 \times q^n = 800 \times 1,03^n.$$

Question 3 — Sens de variation.

La raison est $q = 1,03 > 1$ et $C_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc $C_{n+1} = 1,03 \times C_n > C_n$.

La suite (C_n) est **strictement croissante** : le capital augmente chaque année. C'est cohérent avec le fait que les intérêts s'ajoutent au capital (intérêts composés).

Question 4 — Calcul de C_5 .

$$C_5 = 800 \times 1,03^5 \approx 800 \times 1,15927 \approx 927,42 \text{ €}.$$

Après 5 ans, Yasmine dispose d'environ 927,42 €, soit un gain de 127,42 € par rapport au capital initial.

Question 5 — Détermination du plus petit n tel que $C_n > 1200$.

On cherche le plus petit entier n tel que :

$$800 \times 1,03^n > 1200 \iff 1,03^n > \frac{1200}{800} = 1,5.$$

Par essais successifs, en utilisant les valeurs données :

$$1,03^{13} \approx 1,469 < 1,5 \Rightarrow C_{13} \approx 800 \times 1,469 = 1\,175,20 < 1\,200.$$

$$1,03^{14} \approx 1,513 > 1,5 \Rightarrow C_{14} \approx 800 \times 1,513 = 1\,210,40 > 1\,200. \checkmark$$

Ainsi $C_{13} < 1\,200 < C_{14}$. Le plus petit entier n tel que $C_n > 1\,200$ est $n = 14$.

Yasmine doit attendre 14 ans pour que son capital dépasse 1 200 €.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, raisonner : relation de récurrence 1 pt + démonstration géométrique 1 pt); Q2 : 1 pt (calculer : terme général); Q3 : 2 pts (raisonner, communiquer : conclusion sur q 1 pt + interprétation 1 pt); Q4 : 1 pt (calculer : C_5 arrondi); Q5 : 2 pts (raisonner, calculer : inéquation 1 pt + résolution par essais et conclusion 1 pt)

Corrigé

Question 1 — Modélisation et nature arithmétique.

Chaque année, l'exploitant prélève 80 arbres. Donc :

$$P_{n+1} = P_n - 80, \quad P_0 = 2\,400.$$

Démonstration : Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$P_{n+1} - P_n = (P_n - 80) - P_n = -80.$$

Cette différence est constante, donc (P_n) est une suite arithmétique de raison $r = -80$ et de premier terme $P_0 = 2\,400$.

Question 2 — Expression de P_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$P_n = P_0 + n \times r = 2\,400 - 80n.$$

Vérification : $P_1 = 2\,400 - 80 = 2\,320 \checkmark$.

Question 3 — Sens de variation.

La raison est $r = -80 < 0$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_{n+1} - P_n = -80 < 0$, ce qui signifie $P_{n+1} < P_n$.

La suite (P_n) est **strictement décroissante** : la forêt perd des arbres chaque année, ce qui est cohérent avec l'exploitation sans replantation.

Question 4 — Valeurs de n pour lesquelles $P_n > 0$; épuisement de la forêt.

On résout $P_n > 0$:

$$2\,400 - 80n > 0 \Leftrightarrow 80n < 2\,400 \Leftrightarrow n < 30.$$

Donc $P_n > 0$ pour $n \in \{0, 1, \dots, 29\}$.

Vérification : $P_{29} = 2\,400 - 80 \times 29 = 2\,400 - 2\,320 = 80 > 0$ et $P_{30} = 2\,400 - 2\,400 = 0 \checkmark$

La forêt est complètement épuisée à l'année $n = 30$, soit 30 ans après le début de l'exploitation.

Question 5 — Année à partir de laquelle la limite de 1 000 arbres est franchie.

On cherche le plus petit entier n tel que $P_n < 1\,000$:

$$2\,400 - 80n < 1\,000 \Leftrightarrow -80n < -1\,400 \Leftrightarrow n > \frac{1\,400}{80} = 17,5.$$

Le plus petit entier satisfaisant cette condition est $n = 18$.

Vérification : $P_{17} = 2\,400 - 80 \times 17 = 2\,400 - 1\,360 = 1\,040 \geq 1\,000$ et $P_{18} = 2\,400 - 80 \times 18 = 2\,400 - 1\,440 = 960 < 1\,000 \checkmark$

À partir de l'année $n = 18$, le nombre d'arbres est inférieur à 1 000. Le biologiste recommanderait d'arrêter l'exploitation avant cette date.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, raisonner : relation de récurrence 1 pt + démonstration arithmétique 1 pt) ; Q2 : 1 pt (calculer : terme général) ; Q3 : 2 pts (raisonner, communiquer : signe de r 1 pt + interprétation 1 pt) ; Q4 : 2 pts (calculer, raisonner : résolution de l'inéquation 1 pt + vérification et conclusion 1 pt) ; Q5 : 1 pt (calculer : résolution et vérification)

Corrigé

Question 1 — Modélisation, nature géométrique et terme général.

Chaque année, le capital est multiplié par $(1 + 0,05) = 1,05$. Donc :

$$K_{n+1} = 1,05 \times K_n, \quad K_0 = 2000.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $K_n > 0$, ce qui autorise le calcul du quotient :

$$\frac{K_{n+1}}{K_n} = 1,05.$$

(K_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,05$ et de premier terme $K_0 = 2000$, d'où :

$$K_n = 2000 \times 1,05^n.$$

Question 2 — Calcul de K_5 .

$$K_5 = 2000 \times 1,05^5 \approx 2000 \times 1,27628 \approx 2552,56 \text{ €}.$$

Après 5 ans, Kévin dispose d'environ 2 552,56 €, soit un gain de 552,56 €.

Question 3 — Détermination du plus petit n tel que $K_n \geq 3000$.

a) Inéquation.

$$K_n \geq 3000 \iff 2000 \times 1,05^n \geq 3000 \iff 1,05^n \geq 1,5.$$

b) Lecture du programme Python.

La variable K contient le capital courant et n son rang. À chaque tour, le programme multiplie K par 1.05, puis augmente n de 1. La boucle simule ainsi l'évolution du capital année par année et s'arrête dès que K atteint ou dépasse 3000.

c) Trois premiers tours de boucle.

- ▶ Tour 1 : $K = 2000 \times 1,05 = 2100$, $n = 1$. Condition : $2100 < 3000$ ✓, on continue.
- ▶ Tour 2 : $K = 2100 \times 1,05 = 2205$, $n = 2$. Condition : $2205 < 3000$ ✓, on continue.
- ▶ Tour 3 : $K = 2205 \times 1,05 = 2315,25$, $n = 3$. Condition : $2315,25 < 3000$ ✓, on continue.

d) Résultat affiché.

Par essais successifs : $1,05^8 \approx 1,4775$ ($K_8 \approx 2955,00 < 3000$) et $1,05^9 \approx 1,5513$ ($K_9 \approx 3102,66 \geq 3000$).

Le programme affiche $n=9$, $K=3102.66$.

Il faut donc **9 ans** pour que le capital de Kévin atteigne ou dépasse 3000 €.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, raisonner : relation de récurrence 1 pt + terme général 1 pt) ; Q2 : 1 pt (calculer : K_5 arrondi) ; Q3a : 1 pt (raisonner : mise en inéquation) ; Q3b : 2 pts (programmer, communiquer : lecture et explication du programme) ; Q3c : 1 pt (calculer : trois tours de boucle) ; Q3d : 1 pt (calculer : résultat et interprétation)

Corrigé

Question 1 — Modélisation et nature arithmétique.

La population augmente de 50 habitants par an, donc :

$$N_{n+1} = N_n + 50, \quad N_0 = 1200.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $N_{n+1} - N_n = 50$.

(N_n) est une suite arithmétique de raison $r = 50$ et de premier terme $N_0 = 1\,200$, d'où :

$$N_n = 1\,200 + 50n.$$

Question 2 — Population au début de l'année 2031.

L'année 2031 correspond à $n = 2031 - 2020 = 11$.

$$N_{11} = 1\,200 + 50 \times 11 = 1\,200 + 550 = 1\,750 \text{ habitants.}$$

Question 3 — Somme des douze relevés de population.

La somme porte sur 12 termes (de rang 0 à 11), de premier terme $N_0 = 1\,200$ et de dernier terme $N_{11} = 1\,750$.

$$S = \frac{12 \times (N_0 + N_{11})}{2} = \frac{12 \times (1\,200 + 1\,750)}{2} = \frac{12 \times 2\,950}{2} = 6 \times 2\,950 = 17\,700.$$

La somme des douze relevés vaut 17 700. Elle ne représente ni la population présente à une date donnée ni un nombre d'habitants distincts : une même personne peut être comptée dans plusieurs relevés annuels.

Question 4 — Analyse du programme Python.

a) Explication ligne par ligne.

- $N = 1200$: initialisation de la population à 1 200 (valeur de N_0).
- $n = 0$: initialisation du compteur d'années à 0.
- $\text{while } N \leq 2000$: on répète la boucle tant que la population n'a pas encore strictement dépassé 2 000.
- $N = N + 50$: on augmente la population de 50 (passage à l'année suivante).
- $n = n + 1$: on incrémente le compteur d'années.
- $\text{print}(\text{"Annee :"}, 2020 + n)$: on affiche l'année calendaire.
- $\text{print}(\text{"Population :"}, N)$: on affiche la population atteinte.

b) Résultat sans exécution.

On cherche le plus petit entier n tel que $N_n > 2\,000$:

$$1\,200 + 50n > 2\,000 \iff 50n > 800 \iff n > 16.$$

Le plus petit entier n vérifiant cette condition est $n = 17$.

Le programme affiche Année : 2037 puis Population : 2050.

c) Vérification.

$$N_{16} = 1\,200 + 50 \times 16 = 2\,000 \quad (\text{la boucle continue encore}).$$

$$N_{17} = 1\,200 + 50 \times 17 = 2\,050 > 2\,000 \quad (\text{la boucle s'arrête}). \checkmark$$

La ville dépassera 2 000 habitants au début de l'année 2037.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, raisonner : relation de récurrence 1 pt + terme général 1 pt); Q2 : 1 pt (calculer : N_{11} avec identification du rang); Q3 : 2 pts (calculer : somme 1 pt + interprétation 1 pt); Q4a : 2 pts (programmer, communiquer : explication ligne par ligne); Q4b : 2 pts (raisonner, calculer : résolution algébrique et résultat); Q4c : 1 pt (calculer : vérification N_{16} et N_{17})

Corrigé

Question 1 — Calcul de u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .

$$\begin{aligned}
u_0 &= 0^2 - 5 \times 0 + 8 = 8, \\
u_1 &= 1^2 - 5 \times 1 + 8 = 1 - 5 + 8 = 4, \\
u_2 &= 2^2 - 5 \times 2 + 8 = 4 - 10 + 8 = 2, \\
u_3 &= 3^2 - 5 \times 3 + 8 = 9 - 15 + 8 = 2, \\
u_4 &= 4^2 - 5 \times 4 + 8 = 16 - 20 + 8 = 4.
\end{aligned}$$

Question 2 — Formule explicite ou récurrence ?

La suite est définie par une **formule explicite** : $u_n = n^2 - 5n + 8$ exprime directement u_n en fonction de n , sans faire intervenir les termes précédents. Il n'est pas nécessaire de calculer u_{n-1} pour obtenir u_n .

Question 3 — Étude de $u_{n+1} - u_n$.

$$u_{n+1} - u_n = ((n+1)^2 - 5(n+1) + 8) - (n^2 - 5n + 8).$$

En développant :

$$u_{n+1} - u_n = n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 + 8 - n^2 + 5n - 8 = 2n - 4.$$

Donc $u_{n+1} - u_n = 2n - 4 = 2(n - 2)$.

Étude du signe :

- ▶ Si $n < 2$ (c'est-à-dire $n \in \{0, 1\}$) : $2(n - 2) < 0$, donc $u_{n+1} < u_n$: la suite est **décroissante**.
- ▶ Si $n = 2$: $2(n - 2) = 0$, donc $u_3 = u_2 = 2$.
- ▶ Si $n > 2$ (c'est-à-dire $n \geq 3$) : $2(n - 2) > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$: la suite est **croissante**.

Question 4 — Conclusion sur les variations et terme(s) minimal/minimaux.

La suite (u_n) est :

- ▶ **strictement décroissante** pour $n \in \{0, 1\}$: $u_0 = 8 > u_1 = 4 > u_2 = 2$;
- ▶ les termes $u_2 = u_3 = 2$ sont égaux : la suite est « stationnaire » entre $n = 2$ et $n = 3$;
- ▶ **strictement croissante** pour $n \geq 3$: $u_3 = 2 < u_4 = 4 < \dots$

Le **minimum** est atteint pour $n = 2$ et $n = 3$: $u_2 = u_3 = 2$.

Question 5 — Comparaison avec la fonction $f(x) = x^2 - 5x + 8$.

La dérivée est $f'(x) = 2x - 5$.

$$f'(x) = 0 \iff x = \frac{5}{2} = 2,5.$$

f est décroissante sur $[0; 2,5]$ et croissante sur $[2,5; +\infty[$, avec un minimum en $x = 2,5$.

La suite (u_n) , qui correspond à f restreinte aux entiers, suit la même tendance : décroissante pour $n \leq 2$, croissante pour $n \geq 3$. Le minimum continu de f est en $x = 2,5$, et les deux entiers encadrant ce point ($n = 2$ et $n = 3$) donnent la même valeur minimale $u_2 = u_3 = 2$.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer : cinq termes); Q2 : 1 pt (raisonner, communiquer : identification formule explicite); Q3 : 3 pts (calculer, raisonner : développement 1 pt + simplification 1 pt + étude du signe 1 pt); Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer : tableau de variations 1 pt + identification des minimums 1 pt); Q5 : 1 pt (calculer, communiquer : calcul de f' et comparaison)

Corrigé

Question 1 — Calcul de u_1, u_2, u_3 et u_4 .

$$u_1 = \frac{u_0}{2} + 3 = \frac{20}{2} + 3 = 10 + 3 = 13.$$

$$\begin{aligned}u_2 &= \frac{u_1}{2} + 3 = \frac{13}{2} + 3 = \frac{13}{2} + \frac{6}{2} = \frac{19}{2}. \\u_3 &= \frac{u_2}{2} + 3 = \frac{19}{4} + 3 = \frac{19}{4} + \frac{12}{4} = \frac{31}{4}. \\u_4 &= \frac{u_3}{2} + 3 = \frac{31}{8} + 3 = \frac{31}{8} + \frac{24}{8} = \frac{55}{8}.\end{aligned}$$

Question 2 — La suite est-elle arithmétique ? Géométrique ?

Différences :

$$u_1 - u_0 = 13 - 20 = -7, \quad u_2 - u_1 = \frac{19}{2} - 13 = \frac{19 - 26}{2} = -\frac{7}{2}.$$

Les deux différences sont différentes ($-7 \neq -\frac{7}{2}$) : (u_n) n'est pas arithmétique.

Quotients :

$$\frac{u_1}{u_0} = \frac{13}{20}, \quad \frac{u_2}{u_1} = \frac{19/2}{13} = \frac{19}{26}.$$

Les deux quotients sont différents ($\frac{13}{20} \neq \frac{19}{26}$) : (u_n) n'est pas géométrique.

Question 3 — Expression de $u_{n+1} - u_n$; déduction.

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{u_n}{2} + 3\right) - u_n = 3 - \frac{u_n}{2} = \frac{6 - u_n}{2}.$$

Si $u_n > 6$, alors $6 - u_n < 0$, donc $u_{n+1} - u_n = \frac{6 - u_n}{2} < 0$, ce qui signifie $u_{n+1} < u_n$.

Question 4 — Décroissance stricte de (u_n) .

On admet que $u_n > 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

D'après la question précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 6 \Rightarrow u_{n+1} - u_n < 0 \Rightarrow u_{n+1} < u_n$.

Donc la suite (u_n) est **strictement décroissante**.

Question 5 — Point fixe et conjecture.

On résout l'équation du point fixe $L = \frac{L}{2} + 3$:

$$L - \frac{L}{2} = 3 \Leftrightarrow \frac{L}{2} = 3 \Leftrightarrow L = 6.$$

La valeur 6 est l'unique point fixe : si un terme vaut 6, le suivant vaut encore 6. Les valeurs 20, 13, 9,5, 7,75 et 6,875 se rapprochent de 6 ; ce constat est compatible avec la conjecture de l'élève, sans la démontrer.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer : quatre termes exacts en fractions) ; Q2 : 2 pts (raisonner : calcul des différences 1 pt + calcul des quotients 1 pt) ; Q3 : 2 pts (calculer, raisonner : calcul de $u_{n+1} - u_n$ 1 pt + déduction avec $u_n > 6$ 1 pt) ; Q4 : 1 pt (raisonner : conclusion par hypothèse admise) ; Q5 : 1 pt (calculer, communiquer : résolution du point fixe 0,5 pt + interprétation et conjecture 0,5 pt)

Corrigé

Question 1 — Valeur initiale et relation de récurrence.

À l'achat ($n = 0$), la valeur du véhicule est son prix d'achat : $V_0 = 18\,000$ €.

Chaque année, le véhicule perd 12 % de sa valeur, donc il conserve $100\% - 12\% = 88\%$ de sa valeur :

$$V_{n+1} = 0,88 \times V_n.$$

Question 2 — Nature géométrique.

La relation obtenue à la question 1 s'écrit, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$V_{n+1} = 0,88 \times V_n.$$

Ainsi, par définition, (V_n) est une suite géométrique de raison $q = 0,88$ et de premier terme $V_0 = 18\,000$.

Question 3 — Expression de V_n en fonction de n .

$$V_n = V_0 \times q^n = 18\,000 \times 0,88^n.$$

Question 4 — Calcul de V_3 .

$$V_3 = 18\,000 \times 0,88^3 = 18\,000 \times 0,681\,472 = 12\,266,496 \text{ €} \approx 12\,266 \text{ €}.$$

Après 3 ans, le véhicule de Théo vaut environ 12 266 €, soit une perte de 5 734 € par rapport au prix d'achat.

Question 5 — Recherche numérique du seuil de revente.

a) *Inéquation.*

On cherche n tel que $V_n < 9\,000$:

$$18\,000 \times 0,88^n < 9\,000 \iff 0,88^n < \frac{9\,000}{18\,000} = 0,5.$$

b) *Recherche par calculatrice, tableau de valeurs ou essais successifs.*

Comme $0 < 0,88 < 1$ et $V_0 > 0$, la suite (V_n) est strictement décroissante. Il suffit donc de repérer deux valeurs consécutives qui encadrent le seuil :

$$V_5 = 18\,000 \times 0,88^5 = 9\,499,174 \dots \text{ €} \approx 9\,499 \text{ €} > 9\,000 \text{ €}.$$

$$V_6 = 18\,000 \times 0,88^6 = 8\,359,274 \dots \text{ €} \approx 8\,359 \text{ €} < 9\,000 \text{ €} \checkmark$$

Chaque montant est arrondi à l'euro le plus proche. Après 5 années, la valeur est encore supérieure au seuil ; après 6 années, elle lui est inférieure. Le premier anniversaire auquel la valeur passe sous 9 000 € est donc le 6^e anniversaire.

c) *Conclusion.*

Théo doit revendre son véhicule **au plus tard au 5^e anniversaire**, donc avant d'achever la sixième année. À cette date, $V_5 \approx 9\,499 \text{ €}$ est encore supérieure à 9 000 € ; après 6 années, il est trop tard.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser : relation de récurrence) ; Q2 : 2 pts (raisonner : reconnaissance de la relation géométrique 1 pt + raison et premier terme 1 pt) ; Q3 : 1 pt (calculer : terme général) ; Q4 : 1 pt (calculer : V_3 arrondi et interprétation) ; Q5a : 1 pt (raisonner : mise en inéquation) ; Q5b : 2 pts (calculer, raisonner : décroissance 1 pt + calcul et comparaison de V_5 , V_6 1 pt) ; Q5c : 1 pt (communiquer : dernier anniversaire compatible avec le seuil)

Corrigé

Question 1 — Offre A.

a) *Nature géométrique et terme général.*

Chaque année, le capital est multiplié par $(1 + 0,07) = 1,07$, donc $A_{n+1} = 1,07 \times A_n$ avec $A_0 = 3\,000$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n > 0$, donc :

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = 1,07.$$

(A_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,07$ et de premier terme $A_0 = 3\,000$, d'où :

$$A_n = 3\,000 \times 1,07^n.$$

b) Calcul de A_5 .

$$A_5 = 3\,000 \times 1,07^5 \approx 3\,000 \times 1,40255 \approx 4\,207,66 \text{ €}.$$

Question 2 — Offre B.

a) Nature arithmétique et terme général.

Chaque année, le capital augmente de 210 € (intérêts fixes), donc $B_{n+1} = B_n + 210$ avec $B_0 = 3\,000$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$B_{n+1} - B_n = 210.$$

(B_n) est une suite arithmétique de raison $r = 210$ et de premier terme $B_0 = 3\,000$, d'où :

$$B_n = 3\,000 + 210n.$$

b) Calcul de B_5 .

$$B_5 = 3\,000 + 210 \times 5 = 3\,000 + 1\,050 = 4\,050 \text{ €}.$$

Question 3 — Comparaison.

a) À $n = 10$.

$$A_{10} = 3\,000 \times 1,07^{10} \approx 3\,000 \times 1,96715 \approx 5\,901,45 \text{ €}.$$

$$B_{10} = 3\,000 + 210 \times 10 = 3\,000 + 2\,100 = 5\,100 \text{ €}.$$

Comme $5\,901,45 > 5\,100$, l'offre A est plus avantageuse après 10 ans.

b) Pour $n = 1$ et $n = 2$.

$$A_1 = 3\,000 \times 1,07 = 3\,210 \text{ €}, \quad B_1 = 3\,000 + 210 = 3\,210 \text{ €}.$$

Pour $n = 1$, $A_1 = B_1 = 3\,210 \text{ €}$: les deux offres sont **équivalentes**.

$$A_2 = 3\,000 \times 1,07^2 \approx 3\,434,70 \text{ €}, \quad B_2 = 3\,000 + 420 = 3\,420 \text{ €}.$$

Pour $n = 2$, $A_2 > B_2$: l'offre A devient plus avantageuse. On conjecture que l'offre A est plus avantageuse pour tout $n \geq 2$.

c) Comparaison des accroissements dans ce cas précis.

Pour tout entier $n \geq 1$, la suite (A_n) est croissante, donc $A_n \geq A_1 = 3\,210$. Par conséquent,

$$A_{n+1} - A_n = 0,07A_n \quad \text{et} \quad 0,07A_n \geq 224,70 > 210 = B_{n+1} - B_n.$$

Posons $D_n = A_n - B_n$. L'inégalité précédente donne, pour tout $n \geq 1$,

$$A_{n+1} - B_{n+1} > A_n - B_n,$$

donc (D_n) est strictement croissante à partir du rang 1. Or $D_1 = 0$; ainsi $D_n > 0$ pour tout entier $n \geq 2$, c'est-à-dire $A_n > B_n$ pour tout entier $n \geq 2$.

Barème indicatif : Q1a : 2 pts (raisonner, calculer : démonstration géométrique 1 pt + terme général 1 pt); Q1b : 1 pt (calculer : A_5); Q2a : 2 pts (raisonner, calculer : démonstration arithmétique 1 pt + terme général 1 pt); Q2b : 1 pt (calculer : B_5); Q3a : 2 pts (calculer, communiquer : A_{10} et B_{10} 1 pt + comparaison et conclusion 1 pt); Q3b : 2 pts (calculer : A_1, B_1, A_2, B_2 1 pt + conjecture 1 pt); Q3c : 1 pt (raisonner : comparaison des accroissements et conclusion)

Corrigé

1. Calcul des premiers termes.

On applique la relation $u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n}$:

$$u_1 = \frac{1^2 + 3}{2 \times 1} = \frac{4}{2} = 2 \quad ; \quad u_2 = \frac{2^2 + 3}{2 \times 2} = \frac{7}{4} \quad ; \quad u_3 = \frac{\left(\frac{7}{4}\right)^2 + 3}{2 \times \frac{7}{4}} = \frac{\frac{49}{16} + 3}{\frac{7}{2}} = \frac{\frac{97}{16}}{\frac{7}{2}} = \frac{97}{56}.$$

2. Conjecture.

On observe : $u_1 = 2 \approx 2,000$, $u_2 = 1,750$, $u_3 \approx 1,732$. Les valeurs semblent se rapprocher de $\sqrt{3} \approx 1,732$ tout en décroissant pour $n \geq 1$. On conjecture que ce comportement se poursuit.

3. Point fixe et interprétation géométrique.

L'équation $\ell = \frac{\ell^2 + 3}{2\ell}$ (avec $\ell > 0$) donne $2\ell^2 = \ell^2 + 3$, soit $\ell^2 = 3$, donc $\ell = \sqrt{3}$.

Interprétation. Dans un repère, $\sqrt{3}$ est l'abscisse de l'intersection positive de la courbe de $f(x) = \frac{x^2 + 3}{2x}$ avec la droite $y = x$. L'itération de Héron fournit ici des valeurs cohérentes avec la conjecture d'un rapprochement vers ce point fixe, sans la prouver.

4. Signe de $u_{n+1} - \sqrt{3}$.

Pour $u_n > 0$:

$$u_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n} - \sqrt{3} = \frac{u_n^2 + 3 - 2\sqrt{3}u_n}{2u_n} = \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2u_n}.$$

Ce quotient est un carré divisé par $2u_n > 0$, donc $u_{n+1} - \sqrt{3} \geq 0$, avec égalité ssi $u_n = \sqrt{3}$.

Initialisation pour $n = 1$: $u_1 = 2 > \sqrt{3}$ donc $u_1 \geq \sqrt{3}$.

Pour $n \geq 1$, par récurrence immédiate : $u_n > 0$ et le calcul ci-dessus montre $u_{n+1} \geq \sqrt{3}$.

Donc **pour tout entier** $n \geq 1$, $u_n \geq \sqrt{3}$.

5. Décroissance pour $n \geq 1$.

Pour $n \geq 1$, on a $u_n \geq \sqrt{3} > 0$ d'après la question 4, donc $u_n^2 \geq 3$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2 + 3}{2u_n} - u_n = \frac{u_n^2 + 3 - 2u_n^2}{2u_n} = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0.$$

Donc $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.

6. Conclusion.

La question 4 donne $u_{n+1} \geq \sqrt{3}$ et la question 5 donne $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout entier $n \geq 1$. Ainsi,

$$\boxed{\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq u_n.}$$

Les termes restent donc au-dessus de $\sqrt{3}$ et la suite est décroissante. Ces propriétés sont compatibles avec la conjecture de la question 2, sans établir formellement une limite.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 1 pt.

Corrigé

1. Nature des suites.

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $a_{n+1} - a_n = [3(n+1) + 2] - [3n + 2] = 3$. La différence est constante, donc (a_n) est **arithmétique** de premier terme $a_0 = 2$ et de raison $r = 3$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2 \times 3^{n+1}}{2 \times 3^n} = 3$. Le rapport est constant (non nul), donc (b_n) est **géométrique** de premier terme $b_0 = 2$ et de raison $q = 3$.

c) $a_0 = 3 \times 0 + 2 = 2$ et $b_0 = 2 \times 3^0 = 2$. On a $a_0 = b_0 = 2$.

2. Comparaison terme à terme.

a) $b_1 = 2 \times 3 = 6$ et $a_1 = 3 + 2 = 5$. Donc $b_1 = 6 > 5 = a_1$. ✓

b) Montrons par récurrence que $\mathcal{P}(n)$: « $b_n > a_n$ » est vraie pour tout $n \geq 1$.

Initialisation : $\mathcal{P}(1)$ vérifiée ci-dessus.

Hérédité : Supposons $b_n > a_n$ pour un certain $n \geq 1$.

$$b_{n+1} - a_{n+1} = 3b_n - (3n + 5) = 3b_n - a_n - 3 > 3a_n - a_n - 3 = 2a_n - 3 = 2(3n + 2) - 3 = 6n + 1 > 0$$

car $n \geq 1 \geq 0$. Donc $b_{n+1} > a_{n+1}$.

Conclusion : Pour tout entier $n \geq 1$, $b_n > a_n$.

3. Sommes.

a) (a_n) est arithmétique à 10 termes ($k = 0$ à 9), de premier terme $a_0 = 2$ et de dernier terme $a_9 = 3 \times 9 + 2 = 29$:

$$S_A = \sum_{k=0}^9 a_k = \frac{10 \times (a_0 + a_9)}{2} = \frac{10 \times (2 + 29)}{2} = 5 \times 31 = 155.$$

b) (b_k) est géométrique de raison 3, premier terme 2, 10 termes :

$$S_G = \sum_{k=0}^9 b_k = 2 \times \frac{3^{10} - 1}{3 - 1} = 3^{10} - 1 = 59\,049 - 1 = 59\,048.$$

c) $S_G - S_A = 59\,048 - 155 = 58\,893$.

La somme cumulée de la suite géométrique dépasse de loin celle de la suite arithmétique, illustrant la croissance bien plus rapide des progressions géométriques.

4. Question ouverte.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$S_A^{(n)} = \sum_{k=0}^n (3k + 2) = \frac{(n+1)(3n+4)}{2} \quad \text{et} \quad S_G^{(n)} = \sum_{k=0}^n 2 \times 3^k = 3^{n+1} - 1.$$

On cherche le plus petit n tel que $3^{n+1} - 1 > 100 \times \frac{(n+1)(3n+4)}{2}$.

Vérification numérique (obtenue par la relation algébrique ou un algorithme) :

n	$S_G^{(n)}$	$100 \times S_A^{(n)}$	inégalité vérifiée ?
0	2	200	non
1	8	700	non
2	26	1 500	non
3	80	2 600	non
4	242	4 000	non
5	728	5 700	non
6	2 186	7 700	non
7	6 560	10 000	non
8	19 682	12 600	oui

Ainsi, aucun rang de 0 à 7 ne convient, tandis que le rang 8 convient. La plus petite valeur est

$n = 8$.

Corrigé

1. Premiers termes et premières sommes.

$$u_0 = 2, \quad u_1 = \frac{3}{2}, \quad u_2 = \frac{9}{8}.$$

$$S_0 = 2, \quad S_1 = 2 + \frac{3}{2} = \frac{7}{2}, \quad S_2 = \frac{7}{2} + \frac{9}{8} = \frac{37}{8}.$$

Ces valeurs augmentent tout en semblant se rapprocher d'une valeur finie.

2. Expression de S_n .

Les termes additionnés sont ceux d'une suite géométrique de premier terme 2 et de raison $\frac{3}{4}$. Comme $\frac{3}{4} \neq 1$, la formule de somme donne

$$S_n = 2 \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{4}} = 8 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right).$$

3. Variation et majoration.

Par définition des sommes,

$$S_{n+1} - S_n = u_{n+1} > 0.$$

La suite (S_n) est donc strictement croissante. De plus, $\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} > 0$, donc

$$S_n = 8 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) < 8.$$

Les sommes augmentent à chaque nouveau terme, tout en restant inférieures à 8.

4. Observation numérique.

$$S_{10} \approx 7,662, \quad S_{30} \approx 7,999, \quad S_{100} \approx 8,000.$$

Les calculs suggèrent que les valeurs se rapprochent de 8. On conjecture ce comportement à partir des observations numériques, **sans preuve formelle de limite**.

5. Transfert à une autre somme géométrique.

Les termes (v_n) forment une suite géométrique de premier terme 3 et de raison $\frac{1}{2}$. Ainsi

$$T_n = 3 \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 6 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right).$$

Comme $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} > 0$, on a $T_n < 6$. Au rang 10,

$$T_{10} = 6 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{11}\right) \approx 5,997.$$

On compare les écarts aux valeurs observées :

$$8 - S_{10} \approx 0,338 \quad \text{et} \quad 6 - T_{10} \approx 0,003.$$

Au rang 10, T_{10} est donc plus proche de 6 que S_{10} ne l'est de 8.

Corrigé

1. Calcul des premiers termes.

$$u_1 = 0,8 \times 600 + 200 = 480 + 200 = 680 \quad ; \quad u_2 = 0,8 \times 680 + 200 = 744 \quad ; \quad u_3 = 0,8 \times 744 + 200 = 795,2.$$

La population **croît** et semble se stabiliser autour de 1 000 individus.

2. Point d'équilibre.

$$\text{a) } 0,8\ell + 200 = \ell \Rightarrow 200 = 0,2\ell \Rightarrow \ell = 1\,000.$$

b) Si la population atteint 1 000 individus, les 200 réintroductions compensent exactement les 20 % de disparitions ($0,2 \times 1\,000 = 200$). La population est alors stable.

3. Suite auxiliaire.

a) On pose $v_n = u_n - 1\,000$. Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1\,000 = (0,8u_n + 200) - 1\,000 = 0,8u_n - 800 = 0,8(u_n - 1\,000) = 0,8v_n.$$

(v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = u_0 - 1\,000 = 600 - 1\,000 = -400$ et de raison $q = 0,8 = \frac{4}{5}$.

b)

$$v_n = -400 \times \left(\frac{4}{5}\right)^n \quad \text{d'où} \quad u_n = 1\,000 - 400 \times \left(\frac{4}{5}\right)^n.$$

4. Monotonie et comportement à long terme.

$$u_{n+1} - u_n = 0,8u_n + 200 - u_n = 200 - 0,2u_n.$$

Montrons par récurrence que $u_n < 1\,000$ pour tout $n \in \mathbb{N}$:

► $u_0 = 600 < 1\,000$. ✓

► Si $u_n < 1\,000$, alors $u_{n+1} = 0,8u_n + 200 < 0,8 \times 1\,000 + 200 = 1\,000$. ✓

Donc $u_n < 1\,000$ pour tout n , ce qui entraîne $u_{n+1} - u_n = 200 - 0,2u_n > 200 - 0,2 \times 1\,000 = 0$.

La suite (u_n) est donc **strictement croissante** et **majorée par 1 000**.

À l'aide de $u_n = 1\,000 - 400 \left(\frac{4}{5}\right)^n$, on obtient :

$$u_5 = 868,928 \approx 868,9, \quad u_{10} \approx 957,1, \quad u_{20} \approx 995,4.$$

Ces valeurs restent inférieures à 1 000 et semblent s'en rapprocher. On conjecture que la population se stabilise à long terme autour de 1 000 individus.

5. Problème d'optimisation.

a) Avec un apport de c individus par an, le point fixe vérifie $0,8\ell(c) + c = \ell(c)$, soit $0,2\ell(c) = c$, d'où $\ell(c) = 5c$.

b) On veut $\ell(c) \geq 1\,500$, soit $5c \geq 1\,500$, donc $c \geq 300$.

La valeur minimale de réintroduction est $\boxed{c = 300}$ individus par an.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 1,5 pt.

Corrigé

1. Mise en équation.

Au début du mois n , le capital dû est C_n . Les intérêts du mois s'élèvent à $0,5\% \times C_n = 0,005C_n$. Après paiement de la mensualité de 800 € :

$$C_{n+1} = C_n + 0,005C_n - 800 = 1,005C_n - 800.$$

2. Calcul de C_1 et C_2 .

$$C_1 = 1,005 \times 120\,000 - 800 = 120\,600 - 800 = 119\,800 \text{ €}.$$

$$C_2 = 1,005 \times 119\,800 - 800 = 120\,399 - 800 = 119\,599 \text{ €}.$$

3. Résolution.

a) $1,005L - 800 = L \Rightarrow 0,005L = 800 \Rightarrow L = 160\,000$.

b) On pose $v_n = C_n - 160\,000$. Alors :

$$v_{n+1} = C_{n+1} - 160\,000 = (1,005C_n - 800) - 160\,000 = 1,005(C_n - 160\,000) = 1,005v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison $q = 1,005$ et de premier terme $v_0 = 120\,000 - 160\,000 = -40\,000$.

c) $v_n = -40\,000 \times 1,005^n$, donc :

$$C_n = 160\,000 - 40\,000 \times 1,005^n.$$

4. Durée de remboursement.

$$C_n \leq 0 \Leftrightarrow 160\,000 - 40\,000 \times 1,005^n \leq 0 \Leftrightarrow 1,005^n \geq 4.$$

Comme $1,005 > 1$, la suite de terme général $1,005^n$ est strictement croissante. Une table de valeurs, la calculatrice ou le script donnent :

$$1,005^{277} \approx 3,981 < 4, \quad 1,005^{278} \approx 4,001 > 4.$$

Ces deux valeurs consécutives prouvent que le plus petit entier vérifiant l'inégalité est $n = 278$.

Le ménage rembourse l'emprunt en **278 mensualités**, soit environ 23 ans et 2 mois.

Les capitaux frontières confirment ce rang :

$$C_{277} \approx 757,46 \text{ €} > 0, \quad C_{278} \approx -38,75 \text{ €} \leq 0.$$

Dans le modèle, une mensualité entière de 800 € rend donc le solde négatif à la 278^e itération. En pratique, après les intérêts du dernier mois, la dernière mensualité serait ajustée à environ 761,25 € afin de ramener exactement le capital à zéro.

5. Script Python.

Le script source simule le remboursement mois par mois, en appliquant $C \leftarrow 1,005 \times C - 800$ et en incrémentant n tant que $C > 0$.

À la fin de l'exécution, la variable n affiche **278**, confirmant le calcul algébrique.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser : relation de récurrence); Q2 : 1 pt (calculer : C_1 et C_2); Q3 : 3 pts (raisonner : point fixe 1 pt + suite géométrique 1 pt + expression de C_n 1 pt); Q4 : 3 pts (raisonner, calculer : inéquation 1 pt + recherche numérique 1 pt + double frontière et dernière échéance 1 pt); Q5 : 2 pts (algorithmique : rôle de la boucle 1 pt + sortie 1 pt)

Corrigé

1. Calcul des premiers termes.

$$u_1 = \frac{1}{2} \times 5 + 3 = \frac{5}{2} + 3 = \frac{11}{2} = 5,5.$$

$$u_2 = \frac{1}{2} \times \frac{11}{2} + 3 = \frac{11}{4} + 3 = \frac{23}{4} = 5,75.$$

$$u_3 = \frac{1}{2} \times \frac{23}{4} + 3 = \frac{23}{8} + 3 = \frac{47}{8} = 5,875.$$

Les valeurs 5; 5,5; 5,75; 5,875 semblent croître et se rapprocher de 6. On conjecture que les termes de la suite se rapprochent de 6.

2. Point fixe.

a) On résout $\frac{1}{2} \ell + 3 = \ell$:

$$3 = \ell - \frac{1}{2} \ell = \frac{1}{2} \ell \Rightarrow \ell = 6.$$

b) On pose $v_n = u_n - 6$. Calculons v_{n+1} :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \left(\frac{1}{2} u_n + 3 \right) - 6 = \frac{1}{2} u_n - 3 = \frac{1}{2} (u_n - 6) = \frac{1}{2} v_n.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n$.

La suite (v_n) est donc **géométrique** de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 6 = 5 - 6 = -1$.

3. Expression explicite.

$$v_n = v_0 \times q^n = -1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Donc :

$$u_n = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Vérification : $u_0 = 6 - 1 = 5 \checkmark$ $u_1 = 6 - \frac{1}{2} = \frac{11}{2} \checkmark$

4. Variations.

a) On calcule $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \left[6 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] - \left[6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}.$$

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} > 0$, donc $u_{n+1} - u_n > 0$.

La suite (u_n) est **strictement croissante**.

5. Encadrement par récurrence.

On montre que $5 \leq u_n < 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : $u_0 = 5$, donc $5 \leq u_0 = 5 < 6$. $\checkmark$

Hérédité : Supposons $5 \leq u_n < 6$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

- Minoration : $u_n \geq 5 \Rightarrow \frac{1}{2}u_n \geq \frac{5}{2} \Rightarrow u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 \geq \frac{5}{2} + 3 = \frac{11}{2} > 5$. Donc $u_{n+1} \geq 5$. $\checkmark$
- Majoration : $u_n < 6 \Rightarrow \frac{1}{2}u_n < 3 \Rightarrow u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3 < 3 + 3 = 6$. $\checkmark$

Conclusion : Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $5 \leq u_n < 6$.

6. Généralisation avec $u_0 = 8$.

Le point fixe reste $\ell = 6$. En posant $w_n = u_n - 6$, on obtient de même $w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n$, donc (w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $w_0 = 8 - 6 = 2$.

Ainsi :

$$u_n = 6 + 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 6 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

Variations :

$$u_{n+1} - u_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La suite est **strictement décroissante**. Ses premiers termes restent au-dessus de 6 et s'en rapprochent ; on conjecture ce comportement à partir de l'expression explicite. On conjecture que ses termes se rapprochent de 6.

Corrigé

1. Nature de la suite (u_n) .

Chaque année, la production est réduite de 10 % : $u_{n+1} = u_n - 0,1u_n = 0,9u_n$.

La suite (u_n) est **géométrique** de premier terme $u_0 = 10\,000$ et de raison $q = \frac{9}{10} = 0,9$.

2. Expression de u_n , calcul de u_5 et u_{10} .

$$u_n = 10\,000 \times \left(\frac{9}{10}\right)^n.$$

$$u_5 = 10\,000 \times (0,9)^5 = 10\,000 \times 0,59049 \approx 5\,905 \text{ pièces.}$$

$$u_{10} = 10\,000 \times (0,9)^{10} = 10\,000 \times 0,34868 \approx 3\,487 \text{ pièces.}$$

La sixième année, la production vaut environ 59 % de celle de la première année; la onzième année, elle n'en représente plus qu'environ 35 %.

3. Production cumulée S_n .

a) La suite (u_k) est géométrique de premier terme $u_0 = 10\,000$ et de raison $q = \frac{9}{10} \neq 1$. On applique la formule de somme d'une suite géométrique :

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 10\,000 \times \frac{1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}}{1 - \frac{9}{10}} = 10\,000 \times \frac{1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}}{\frac{1}{10}}.$$

$$S_n = 100\,000 \times \left[1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}\right].$$

b) Calcul de S_4 et S_{19} :

$$S_4 = 100\,000 \times [1 - (0,9)^5] = 100\,000 \times (1 - 0,59049) = 100\,000 \times 0,40951 \approx 40\,951 \text{ pièces.}$$

$$S_{19} = 100\,000 \times [1 - (0,9)^{20}] = 100\,000 \times (1 - 0,12158) \approx 87\,842 \text{ pièces.}$$

c) Calculons une valeur à un rang plus élevé :

$$S_{49} = 100\,000 [1 - (0,9)^{50}] \approx 99\,485 \text{ pièces.}$$

Pour tout entier naturel n , on a $(0,9)^{n+1} > 0$, donc $S_n < 100\,000$. Les valeurs $S_4 \approx 40\,951$, $S_{19} \approx 87\,842$ et $S_{49} \approx 99\,485$ semblent se rapprocher de 100 000. On conjecture que S_n se rapproche de 100 000 lorsque n devient grand. Dans le modèle, ce nombre représente une valeur plafond suggérée pour la production cumulée.

4. Seuil : $S_n > 90\,000$.

$$\begin{aligned} S_n > 90\,000 &\Leftrightarrow 100\,000 \times \left[1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}\right] > 90\,000 \Leftrightarrow 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1} > 0,9 \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1} < 0,1. \end{aligned}$$

Une table de valeurs ou des essais successifs donnent :

$$S_{20} = 100\,000 [1 - (0,9)^{21}] \approx 89\,058 < 90\,000,$$

$$S_{21} = 100\,000 [1 - (0,9)^{22}] \approx 90\,152 > 90\,000.$$

La suite (S_n) est strictement croissante puisque $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} > 0$. Ces deux valeurs consécutives prouvent donc que le plus petit entier recherché est $n = 21$, au terme de la 22^e année.

5. Comparaison avec l'usine concurrente.

L'usine concurrente produit 5 000 pièces par an. Sa production cumulée sur $(n + 1)$ années est :

$$T_n = 5\,000 \times (n + 1).$$

On cherche le plus petit n tel que $T_n > S_n$, c'est-à-dire :

$$5\,000(n+1) > 100\,000[1 - (0,9)^{n+1}].$$

Cette inégalité n'admet pas de solution explicite simple. On procède numériquement :

n	S_n	T_n
0	10 000	5 000
10	65 132	55 000
20	89 058	105 000

Entre $n = 10$ et $n = 20$, T_n dépasse S_n . Posons $D_n = T_n - S_n$. Un tableau complet jusqu'au premier changement de signe donne notamment :

- ▶ $n = 14$: $S_{14} \approx 79\,411$ et $T_{14} = 75\,000$ ($T < S$).
- ▶ $n = 15$: $D_{15} = T_{15} - S_{15} \approx -1\,470 < 0$;
- ▶ $n = 16$: $D_{16} = T_{16} - S_{16} \approx 1\,677 > 0$. ✓

Pour justifier qu'il s'agit du premier dépassement, on remarque que

$$D_{n+1} - D_n = 5\,000 - u_{n+1}.$$

Pour $0 \leq n \leq 5$, on a $u_{n+1} \geq u_6 = 5\,314,41 > 5\,000$: la suite (D_n) décroît à partir de $D_0 = -5\,000$ et reste négative. Pour $n \geq 6$, on a $u_{n+1} \leq u_7 = 4\,782,969 < 5\,000$: (D_n) est alors strictement croissante. Comme $D_{15} < 0 < D_{16}$, le premier dépassement a lieu au rang $n = 16$, au terme de la 17^e année, et il se maintient ensuite.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser : relation et nature géométrique) ; Q2 : 1 pt (calculer : terme général et valeurs) ; Q3 : 4 pts (calculer, raisonner : somme 2 pts + valeurs 1 pt + conjecture contextualisée 1 pt) ; Q4 : 2 pts (raisonner, calculer : transformation exacte 1 pt + double frontière et rang 1 pt) ; Q5 : 2 pts (raisonner : modèle concurrent 1 pt + premier changement de signe et stabilité du dépassement 1 pt)

Corrigé

1. Calcul des premiers termes.

$$u_0 = 0^2 + 0 + 1 = 1, \quad u_1 = 1 + 1 + 1 = 3, \quad u_2 = 4 + 2 + 1 = 7, \quad u_3 = 9 + 3 + 1 = 13, \quad u_4 = 16 + 4 + 1 = 21.$$

2. Nature de la suite (u_n) .

Arithmétique ? On calcule $u_1 - u_0 = 3 - 1 = 2$ et $u_2 - u_1 = 7 - 3 = 4$. Ces différences sont inégales, donc (u_n) n'est pas arithmétique.

Géométrique ? On calcule $\frac{u_1}{u_0} = \frac{3}{1} = 3$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{7}{3}$. Ces rapports sont inégaux, donc (u_n) n'est pas géométrique.

3. Calcul des d_n et conjecture.

$$\begin{aligned} d_0 &= u_1 - u_0 = 3 - 1 = 2, & d_1 &= u_2 - u_1 = 7 - 3 = 4, \\ d_2 &= u_3 - u_2 = 13 - 7 = 6, & d_3 &= u_4 - u_3 = 21 - 13 = 8. \end{aligned}$$

On observe que $d_0 = 2, d_1 = 4, d_2 = 6, d_3 = 8$: les d_n augmentent de 2 à chaque fois.

Conjecture : (d_n) est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme $d_0 = 2$.

4. Démonstration.

Calcul de d_n en fonction de n :

$$\begin{aligned} d_n &= u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 + (n+1) + 1] - [n^2 + n + 1] \\ &= n^2 + 2n + 1 + n + 1 + 1 - n^2 - n - 1 \\ &= 2n + 2. \end{aligned}$$

Calcul de $d_{n+1} - d_n$:

$$d_{n+1} - d_n = [2(n+1) + 2] - [2n + 2] = 2n + 2 + 2 - 2n - 2 = 2.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $d_{n+1} - d_n = 2$ (constante). La suite (d_n) est donc **arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $d_0 = 2$** .

On retrouve bien : $d_n = d_0 + n \times 2 = 2 + 2n = 2(n+1)$, ce qui est cohérent avec le calcul direct.

5. Sens de variation de (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $d_n = u_{n+1} - u_n = 2n + 2 = 2(n+1)$.

Comme $n \geq 0$, on a $n+1 \geq 1 > 0$, donc $d_n = 2(n+1) > 0$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} > u_n$: la suite (u_n) est **strictement croissante**.

6. Programme Python.

```
for n in range(21):
    u_n = n*2 + n + 1
    d_n = 2 * n + 2
    print(f"n={n}, u_n={u_n}, d_n={d_n}")
```

Ce programme affiche pour chaque entier n de 0 à 20 les valeurs de u_n et d_n . On observe que les valeurs de d_n sont 2, 4, 6, ..., 42 (progression arithmétique de raison 2) et que les u_n sont strictement croissants.

Extrait des premières lignes attendues :

n	u_n	d_n
0	1	2
1	3	4
2	7	6
3	13	8
4	21	10
5	31	12

Ces valeurs confirment les résultats des questions précédentes : différences successives d_n forment une progression arithmétique, et u_n est strictement croissant.

Corrigé

1. Calcul des premiers termes.

$$u_1 = \frac{u_0}{3} = \frac{2}{3}, \quad u_2 = \frac{u_1}{3} = \frac{2}{9}, \quad u_3 = \frac{u_2}{3} = \frac{2}{27}.$$

2. Nature de la suite.

Pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n.$$

Ainsi, par définition, la suite (u_n) est **géométrique** de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $q = \frac{1}{3}$.

$$u_n = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

$$\text{Vérification : } u_0 = 2 \times 1 = 2 \quad \checkmark \quad u_1 = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \quad \checkmark$$

3. Variations.

a) Positivité par récurrence.

Initialisation : $u_0 = 2 > 0$. $\checkmark$

Hérédité : Supposons $u_n > 0$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{3} > 0 \quad (\text{quotient de deux réels positifs}).$$

✓

Conclusion : Par le principe de récurrence, $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b) Décroissance.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'après la question précédente, $u_n > 0$. On a :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{3} < u_n \quad \text{car } \frac{1}{3} < 1 \text{ et } u_n > 0.$$

Donc $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite (u_n) est **strictement décroissante**.

4. Observation numérique.

a) Minoration.

D'après la question 3a, $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite (u_n) est donc minorée par 0.

b) Valeurs et conjecture.

$$u_4 = \frac{2}{81} \approx 2,469 \times 10^{-2}, \quad u_6 = \frac{2}{729} \approx 2,743 \times 10^{-3}, \quad u_8 = \frac{2}{6561} \approx 3,048 \times 10^{-4}.$$

Les termes sont positifs, décroissent et deviennent très petits. Ces valeurs suggèrent un rapprochement vers 0. On conjecture que la suite se rapproche de 0 lorsque n devient grand.

5. Seuil : $u_n < 10^{-3}$.

Un tableau de valeurs permet de repérer le franchissement. On vérifie les deux termes consécutifs qui l'encadrent :

- ▶ $u_6 = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{2}{729} \approx 2,74 \times 10^{-3} > 10^{-3}.$ ×
- ▶ $u_7 = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^7 = \frac{2}{2187} \approx 9,15 \times 10^{-4} < 10^{-3}.$ ✓

Le plus petit entier vérifiant la condition est donc $n = 7$.

6. Exploration.

r	u_0	u_1	u_2	u_3	u_4	observation
$\frac{1}{2}$	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	positifs et de plus en plus petits
$-\frac{1}{2}$	2	-1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	signes alternés, valeurs absolues plus petites
1	2	2	2	2	2	constante
-1	2	-2	2	-2	2	oscillante
2	2	4	8	16	32	croissante

On conjecture, à partir de ces cinq expériences finies, que les deux premières suites se rapprochent de 0, contrairement aux trois autres. Ces observations ne constituent pas un résultat général sur toutes les valeurs de r .

Cas particulier $r = 0$. Pour $n = 0$, on conserve la donnée initiale u_0 ; pour $n \geq 1$, on a $u_n = u_0 \times r^n$, donc tous ces termes sont nuls. Cette séparation évite d'écrire une puissance d'exposant nul à partir d'une base nulle.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 2 pts.

Corrigé

1. Modèle 1 — Croissance géométrique.

a) Relation de récurrence.

La population augmente de 5 % par génération :

$$u_{n+1} = u_n + 0,05 u_n = 1,05 u_n.$$

b) Nature de (u_n) et expression explicite.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1,05 u_n$. Par définition, la suite (u_n) est **géométrique** de premier terme $u_0 = 100$ et de raison $q = 1,05$.

$$u_n = 100 \times (1,05)^n.$$

c) Somme $\sum_{k=0}^9 u_k$.

La suite géométrique a 10 termes (de $k = 0$ à $k = 9$), de premier terme $u_0 = 100$ et de raison $q = 1,05 \neq 1$:

$$\sum_{k=0}^9 u_k = u_0 \times \frac{q^{10} - 1}{q - 1} = 100 \times \frac{(1,05)^{10} - 1}{0,05}.$$

Numériquement : $(1,05)^{10} \approx 1,6289$, donc :

$$\sum_{k=0}^9 u_k \approx 100 \times \frac{0,6289}{0,05} \approx 100 \times 12,578 \approx 1\,257,8 \text{ individus.}$$

La somme des effectifs modélisés sur 10 générations est d'environ **1 258** individus.

d) Seuil : $u_n > 500$.

Comme $u_0 > 0$ et $1,05 > 1$, la suite (u_n) est strictement croissante. Une calculatrice ou un tableau de valeurs donne les deux termes consécutifs :

$$u_{32} = 100 \times (1,05)^{32} \approx 476,5 < 500, \quad u_{33} = 100 \times (1,05)^{33} \approx 500,3 > 500.$$

Le plus petit entier vérifiant l'inégalité est donc $n = 33$.

La population dépasse 500 individus à partir de la **génération** $n = 33$.

2. Modèle 2 — Croissance logistique.

a) Calcul de v_1 et v_2 .

$$v_1 = v_0 + 0,05 \times v_0 \times \left(1 - \frac{v_0}{500}\right) = 100 + 0,05 \times 100 \times \left(1 - \frac{100}{500}\right) = 100 + 5 \times \frac{4}{5} = 100 + 4 = 104.$$

$$v_2 = 104 + 0,05 \times 104 \times \left(1 - \frac{104}{500}\right) = 104 + 5,2 \times \frac{396}{500}.$$

Comme $5,2 \times 0,792 = 4,1184$, on obtient

$$v_2 = 104 + 4,1184 = 108,1184 \approx 108,1.$$

b) Invariance de l'encadrement $0 < v_n < 500$ par récurrence.

Initialisation : $v_0 = 100$, donc $0 < v_0 = 100 < 500$. ✓

Hérédité : Supposons $0 < v_n < 500$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

$$\text{On a } v_{n+1} = v_n + 0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right).$$

Minoration : Comme $0 < v_n < 500$, on a $1 - \frac{v_n}{500} > 0$, donc $0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right) > 0$, d'où $v_{n+1} > v_n > 0$.

Majoration : On calcule :

$$\begin{aligned}
 v_{n+1} - 500 &= v_n - 500 + 0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right) \\
 &= (v_n - 500) + \frac{0,05 v_n (500 - v_n)}{500} \\
 &= (v_n - 500) \left[1 - \frac{0,05 v_n}{500}\right] \\
 &= (v_n - 500) \left(1 - \frac{v_n}{10\,000}\right).
 \end{aligned}$$

Comme $0 < v_n < 500$, on a :

- $v_n - 500 < 0$,
- $1 - \frac{v_n}{10\,000} > 1 - \frac{500}{10\,000} = \frac{19}{20} > 0$.

Donc $v_{n+1} - 500 = (v_n - 500) \left(1 - \frac{v_n}{10\,000}\right) < 0$, ce qui donne $v_{n+1} < 500$. ✓

Conclusion : Par le principe de récurrence, $0 < v_n < 500$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

c) Sens de variation de (v_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} - v_n = 0,05 v_n \left(1 - \frac{v_n}{500}\right).$$

D'après la question b), $v_n > 0$ et $1 - \frac{v_n}{500} > 0$ (car $v_n < 500$).

Donc $v_{n+1} - v_n > 0$: la suite (v_n) est **strictement croissante**.

3. Comparaison et analyse du script Python.

Le script simule les deux modèles sur 20 générations. Les valeurs affichées sont :

n	u_n (géométrique)	v_n (logistique)
5	127,6	121,2
10	162,9	145,3
20	265,3	201,1

(Valeurs approximatives, calculées par le script.)

Observations et conjectures à long terme :

- **Modèle 1** (u_n) : les valeurs calculées augmentent de plus en plus. On conjecture que les effectifs croissent sans borne. Ce modèle ignore les contraintes de ressources.
- **Modèle 2** (v_n) : on a prouvé que les valeurs sont croissantes et restent inférieures à 500 ; les valeurs simulées semblent se rapprocher de 500. On conjecture que la population se stabilise autour de la capacité d'accueil. Ce modèle est plus réaliste biologiquement.

Les deux populations se comportent de façon similaire au début (faibles effectifs, le facteur logistique est proche de 1), mais leurs valeurs s'écartent progressivement : le modèle géométrique continue d'augmenter tandis que le modèle logistique semble se stabiliser.

Barème indicatif : Q1 : 4 pts ; Q2 : 5 pts ; Q3 : 3 pts.

Corrigé

1. Expression de v_n .

(v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 500$ et de raison $q = 1,08$, donc :

$$v_n = 500 \times 1,08^n.$$

2. Analyse de la fonction.

Les paramètres `valeur_initiale`, `taux` et `seuil` permettent d'utiliser la même fonction pour plusieurs situations. La variable `valeur` contient le terme courant et `n` son rang. Tant que le seuil n'est pas strictement dépassé, la boucle calcule le terme suivant. La fonction renvoie le premier rang convenable et la valeur correspondante.

Pour l'appel fourni, on vérifie la frontière :

$$v_{18} = 500 \times 1,08^{18} \approx 1\,998,01 \text{ €}, \quad v_{19} = 500 \times 1,08^{19} \approx 2\,157,85 \text{ €}.$$

On a bien $v_{18} \leq 2\,000 < v_{19}$, donc le programme affiche $n=19$, $v=2157.85$. Il faut attendre 19 ans pour que le placement dépasse 2 000 €.

3. Adaptation au seuil de 2 500 €.

On remplace l'appel par `premier_depassement(500, 0.08, 2500)`. Or

$$v_{20} \approx 2\,330,48 \text{ €} \leq 2\,500 \text{ €} \quad \text{et} \quad v_{21} \approx 2\,516,92 \text{ €} > 2\,500 \text{ €}.$$

La fonction renvoie donc le rang 21 et la valeur approchée 2 516,92 € : le seuil de 2 500 € est dépassé pour la première fois après 21 ans.

Corrigé

n	0	1	2	5	10
a_n	2	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{7}{6}$	$\frac{12}{11}$
b_n	2	5	8	17	32
c_n	3	1	3	1	3

La représentation des points $(n; a_n)$ montre des ordonnées décroissantes qui semblent se rapprocher de 1 : on conjecture un rapprochement vers la valeur finie 1.

Les points $(n; b_n)$ sont alignés et leurs ordonnées augmentent de 3 à chaque rang : on conjecture une croissance sans borne apparente.

Les points $(n; c_n)$ alternent entre les droites d'ordonnées 3 et 1 : on conjecture l'absence de rapprochement vers une valeur unique.

Ces conclusions relèvent ici d'observations numériques et graphiques, **sans démonstration formelle**.

Fonctions polynômes du

CHAPITRE 2

second degré

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais reconnaître un polynôme du second degré et passer d'une forme à une autre.
- ▶ C2 — Je sais déterminer le sommet, l'axe de symétrie et dresser le tableau de variations.
- ▶ C3 — Je sais calculer le discriminant et résoudre une équation du second degré.
- ▶ C4 — Je sais factoriser un trinôme et étudier son signe.
- ▶ C5 — Je sais résoudre une inéquation du second degré.
- ▶ C6 — Je sais modéliser un problème concret par un polynôme du second degré et trouver un optimum.

À RETENIR

Un artisan fabrique des boîtes en carton en découpant des carres aux coins d'une feuille rectangulaire. Quel côté de carre maximise le volume de la boîte ? Un problème d'optimisation qui se ramène à l'étude d'un polynôme du second degré.

◆ Corrigés

Temps estimés : ◆ 12 h ◆◆ 10 h ◆◆◆ 8 h

Contrat du chapitre

Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Reconnaître un polynôme du second degré et passer d'une forme à l'autre (développée, canonique, factorisée).
- C2 Représenter une parabole, identifier son sommet et son axe de symétrie, et dresser le tableau de variations.
- C3 Calculer le discriminant et résoudre une équation du second degré en distinguant les trois cas selon le signe de Δ .
- C4 Factoriser un trinôme et étudier le signe d'une expression du second degré à l'aide d'un tableau de signes.
- C5 Résoudre une inéquation du second degré en ramenant à l'étude du signe d'un trinôme.
- C6 Modéliser une situation concrète par un polynôme du second degré et déterminer un extremum (optimisation).

Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Identités remarquables** — développer et factoriser $(a + b)^2$, $(a - b)^2$, $(a + b)(a - b)$.
- R2 **Équations du premier degré** — résoudre $ax + b = 0$, mettre en évidence un facteur commun.
- R3 **Produit nul** — utiliser la règle « un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul ».
- R4 **Fonctions** — calculer une image, chercher un antécédent, lire un tableau de valeurs ; connaître la fonction carré $x \mapsto x^2$.
- R5 **Tableaux de signes** — dresser le tableau de signes d'une expression affine, d'un produit ou d'un quotient.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

Temps de travail estimé

- Parcours ♦ (Consolidation) : environ 12 h.
- Parcours ♦♦ (Maîtrise) : environ 10 h.
- Parcours ♦♦♦ (Approfondissement) : environ 8 h.

Situation d'accroche — La boîte en carton

On découpe quatre carrés identiques de côté x (en cm) aux coins d'une feuille de carton rectangulaire de dimensions 30 cm $\times$ 20 cm, puis on relève les bords pour former une boîte ouverte.

- Exprime le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
- Quelles valeurs de x sont admissibles ?
- Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal ?

On obtient $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$, qui se développe en un polynôme de degré 3. En pratique, on étudie souvent la version simplifiée $V(x) \approx 4x^3 - 100x^2 + 600x$ sur $]0 ; 10[$, et on cherche le maximum. Les outils de ce chapitre — forme canonique, discriminant, tableau de variations — permettent de résoudre ce type de problème d'optimisation.

Cette situation sera entièrement traitée au Temps 7 (TD fil rouge), une fois les capacités C1 à C6 acquises.

Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

R1 — Identités remarquables

1. Développe et réduis $(x + 3)^2$.
2. Développe et réduis $(2x - 1)^2$.
3. Factorise $x^2 - 25$.

R2 — Équations du premier degré

4. Résous l'équation $3x - 6 = 0$.

R3 — Produit nul

5. Résous l'équation $(x - 1)(x + 4) = 0$.

R4 — Images, antécédents et fonction carré

6. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$. Calcule $f(-2)$.
7. La fonction carré g est définie par $g(x) = x^2$ pour $x \geq 0$. Quel est l'antécédent de 9 par g ?

R5 — Tableaux de signes

8. Étudie le signe de $(x - 2)(x + 3)$ pour $x = 0$, $x = -4$ et $x = 3$.
9. Pour quelles valeurs de x a-t-on $-x + 5 < 0$?
10. Dresse le tableau de signes complet de $(x - 1)(x - 4)$ sur $\mathbb{R}$.

Grille de décodage

Reporte tes résultats dans ce tableau, puis suis les conseils de remédiation avant de commencer le cours.

Questions	Prérequis testé	Si tu as échoué...	Fiche à lire
1, 2 et 3	R1 — Identités remarquables	...avant de commencer C1, C3	Fiche R1
4	R2 — Équations du premier degré	...avant de commencer C3, C5	Fiche R2
5	R3 — Produit nul	...avant de commencer C3, C4	Fiche R3
6 et 7	R4 — Fonctions et fonction carré	...avant de commencer C1, C2	Fiche R4
8, 9 et 10	R5 — Tableaux de signes	...avant de commencer C4, C5	Fiche R5

Si tu as réussi toutes les questions sans difficulté, tu peux démarrer directement le Temps 3.

2.1 Les trois formes du trinôme

DÉFINITION 1

Un **polynôme du second degré** (ou **trinôme du second degré**) est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

où a, b, c sont des réels avec $a \neq 0$.

Cette écriture s'appelle la **forme développée** (ou **forme standard**).

EXEMPLE $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$ est un polynôme du second degré avec $a = 2, b = -5, c = 3$.

On calcule : $f(0) = 3, f(1) = 2 - 5 + 3 = 0, f(2) = 8 - 10 + 3 = 1$.

⚠ CONTRE-EXEMPLE $g(x) = 3x + 7$ n'est pas un polynôme du second degré : le coefficient de x^2 est nul ($a = 0$).

$h(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ n'est pas du second degré : le degré est 3.

DÉFINITION 2

La **forme canonique** d'un polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$ est

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta,$$

où

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a},$$

avec $\Delta = b^2 - 4ac$.

Le point $S(\alpha; \beta)$ est le **sommet** de la parabole représentant f .

EXEMPLE Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$.

On a $a = 2, b = -8, c = 5$, donc $\alpha = -\frac{-8}{2 \times 2} = 2$.

$\beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 5 = 8 - 16 + 5 = -3$.

Forme canonique : $f(x) = 2(x - 2)^2 - 3$.

Le sommet est $S(2; -3)$.

DÉFINITION 3

Lorsque $\Delta > 0$, le polynôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ admet deux racines réelles distinctes x_1 et x_2 (voir C3) et peut s'écrire sous **forme factorisée** :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Lorsque $\Delta = 0$, il admet une racine double x_0 et $f(x) = a(x - x_0)^2$.

Lorsque $\Delta < 0$, il n'existe pas de forme factorisée dans $\mathbb{R}$.

EXEMPLE Soit $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$.

On calcule $\Delta = 36 - 32 = 4 > 0$, donc $x_1 = \frac{6-2}{4} = 1$ et $x_2 = \frac{6+2}{4} = 2$.

Forme factorisée : $f(x) = 2(x - 1)(x - 2)$.

Vérification : $2(x - 1)(x - 2) = 2(x^2 - 3x + 2) = 2x^2 - 6x + 4$. ✓

⚠ CONTRE-EXEMPLE $f(x) = x^2 + x + 1$: on calcule $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Ce trinôme n'admet pas de forme factorisée réelle.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oubli du coefficient directeur a dans la forme canonique ou factorisée.

On écrit souvent $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$ en oubliant le facteur a devant. La forme correcte est $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$. De même, la forme factorisée est $a(x - x_1)(x - x_2)$, pas $(x - x_1)(x - x_2)$.

Vérification rapide : développer la forme canonique ou factorisée et vérifier qu'on retrouve $ax^2 + bx + c$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confusion entre α (coordonnée du sommet) et les racines x_1, x_2 .

$\alpha = -\frac{b}{2a}$ est l'abscisse du sommet. Les racines x_1 et x_2 sont les solutions de $f(x) = 0$. Ces trois valeurs sont en général différentes. Seule coïncidence possible : si $\Delta = 0$, alors $x_0 = \alpha$ (la racine double est l'abscisse du sommet).

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Obtenir la forme canonique par complétion du carré.

On part de $f(x) = ax^2 + bx + c$. On met a en facteur sur les deux premiers termes :

$$f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c.$$

On complète le carré à l'intérieur de la parenthèse en ajoutant et soustrayant $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$:

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c.$$

Comme $\alpha = -\frac{b}{2a}$, on a $x + \frac{b}{2a} = x - \alpha$, et

$$\beta = c - \frac{b^2}{4a} = \frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}.$$

On retrouve bien $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.

Application numérique. $f(x) = 3x^2 + 6x - 1$.

$$f(x) = 3(x^2 + 2x) - 1 = 3[(x + 1)^2 - 1] - 1 = 3(x + 1)^2 - 3 - 1 = 3(x + 1)^2 - 4.$$

Sommet : $S(-1; -4)$.

2.2 Parabole et variations

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ ($a \neq 0$) un polynôme du second degré écrit sous forme canonique.

La courbe représentative de f est une **parabole** d'axe de symétrie la droite d'équation $x = \alpha$ et de **sommet** $S(\alpha; \beta)$.

- ▶ Si $a > 0$, la parabole est **tournée vers le haut** (« sourit »); f admet un **minimum** en α , égal à β .
- ▶ Si $a < 0$, la parabole est **tournée vers le bas** (« pleure »); f admet un **maximum** en α , égal à β .

◆ **PROPRIÉTÉ 2 — Tableau de variations** Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) de sommet $S(\alpha; \beta)$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$.

Si $a > 0$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$		$\searrow \beta \nearrow$	

f est décroissante sur $] -\infty; \alpha]$ puis croissante sur $[\alpha; +\infty[$.

Si $a < 0$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$		$\nearrow \beta \searrow$	

f est croissante sur $] -\infty; \alpha]$ puis décroissante sur $[\alpha; +\infty[$.

EXEMPLE Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$.

$$a = 2 > 0, \alpha = -\frac{-8}{4} = 2, \beta = f(2) = 8 - 16 + 3 = -5.$$

La parabole est tournée vers le haut, de sommet $S(2; -5)$. f admet un minimum de -5 en $x = 2$.

Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$		$\searrow -5 \nearrow$	

EXEMPLE Soit $g(x) = -x^2 + 4x + 1$.

$$a = -1 < 0, \alpha = -\frac{4}{-2} = 2, \beta = g(2) = -4 + 8 + 1 = 5.$$

La parabole est tournée vers le bas, de sommet $S(2; 5)$. g admet un maximum de 5 en $x = 2$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Inverser le sens de variation quand $a < 0$.

Lorsque $a < 0$, f est croissante avant le sommet et décroissante après. De nombreux élèves recopient le tableau de variations du cas $a > 0$ sans tenir compte du signe de a .

Méthode de contrôle : calculer f en un point à gauche et à droite du sommet et vérifier l'ordre des valeurs. Par exemple, pour $g(x) = -x^2 + 4x + 1$: $g(0) = 1 < g(2) = 5$ (croissant avant le sommet), $g(2) = 5 > g(3) = -9 + 12 + 1 = 4$ (décroissant après le sommet). Les flèches du tableau doivent le refléter.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre abscisse du sommet et valeur du minimum/maximum.

Le minimum (ou maximum) est $\beta = f(\alpha)$, c'est une valeur de f . L'abscisse du sommet est α .
On dit « f admet un minimum égal à β atteint en $x = \alpha$ », pas « le minimum est α ».

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Position relative de deux paraboles.

Étudier la position relative des paraboles représentant f et g revient à étudier le signe de $h = f - g$.

Si $f(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$ et $g(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$, alors

$$h(x) = f(x) - g(x) = (a_1 - a_2)x^2 + (b_1 - b_2)x + (c_1 - c_2).$$

On distingue plusieurs cas selon le degré de h (si $a_1 = a_2$, h est de degré 1 ou constant) et selon le signe de Δ_h .

Exemple. $f(x) = x^2 - 2x + 3$ et $g(x) = -x^2 + 4$.

$$h(x) = 2x^2 - 2x - 1. \Delta_h = 4 + 8 = 12 > 0.$$

Les racines sont $x_1 = \frac{2 - 2\sqrt{3}}{4} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}$ et $x_2 = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$.

Sur $]x_1; x_2[$, $h(x) < 0$ donc $f(x) < g(x)$: la parabole de f est en dessous de celle de g .

2.3 Discriminant et équations

DÉFINITION 4

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un polynôme du second degré ($a \neq 0$). On appelle **discriminant** de f le réel

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

THÉORÈME 1

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

► Si $\Delta > 0$: l'équation $f(x) = 0$ admet **deux racines réelles distinctes**

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

► Si $\Delta = 0$: l'équation $f(x) = 0$ admet **une racine double**

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \alpha.$$

► Si $\Delta < 0$: l'équation $f(x) = 0$ n'admet **aucune racine réelle**.

EXEMPLE Résoudre $2x^2 - 5x + 2 = 0$.

$$a = 2, b = -5, c = 2; \Delta = 25 - 16 = 9 > 0, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 3.$$

$$x_1 = \frac{5 - 3}{4} = \frac{1}{2} \text{ et } x_2 = \frac{5 + 3}{4} = 2.$$

L'ensemble des solutions est $\left\{\frac{1}{2}; 2\right\}$.

EXEMPLE Résoudre $x^2 - 4x + 4 = 0$.

$$\Delta = 16 - 16 = 0, \text{ donc racine double : } x_0 = \frac{4}{2} = 2.$$

L'ensemble des solutions est $\{2\}$.

EXEMPLE Résoudre $x^2 + x + 1 = 0$.

$$\Delta = 1 - 4 = -3 < 0 : \text{l'équation n'a pas de solution réelle.}$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le signe $-b$ dans la formule des racines.

La formule est $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Si $b = -5$, alors $-b = +5$. Ne pas écrire $\frac{b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$: cela donne des racines fausses.

Vérification : remplacer x_1 et x_2 dans $f(x)$ pour s'assurer qu'on obtient bien 0.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Diviser uniquement le numérateur partiel par $2a$.

On écrit parfois $\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2} \times a$ ou $\frac{-b}{2a} + \sqrt{\Delta}$, ce qui est incorrect. Toute l'expression $-b \pm \sqrt{\Delta}$ doit être divisée par $2a$.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Démonstration exigible : déduction des formules des racines par mise sous forme canonique.

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$. On met f sous forme canonique (voir C1) :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

Résoudre $f(x) = 0$ revient à résoudre :

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a}.$$

Cas 1 : $\Delta < 0$. Le membre gauche est ≥ 0 (carré), le membre droit $\frac{\Delta}{4a}$ et a ont signes opposés si $a > 0$ (car $\Delta < 0$). Plus précisément, $\frac{\Delta}{4a} < 0$ si $a > 0$. L'équation est impossible : pas de solution réelle.

Cas 2 : $\Delta = 0$. On obtient $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, soit $x = -\frac{b}{2a} = \alpha$. Racine double.

Cas 3 : $\Delta > 0$. On divise par a :

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

En prenant la racine carrée (en tenant compte des deux signes) :

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

D'où $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, ce qui donne les deux racines x_1 et x_2 . □

2.4 Factorisation et signe

◆ **PROPRIÉTÉ 3 — Factorisation selon le signe de Δ** Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, alors f possède deux racines réelles $x_1 < x_2$ et

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

- Si $\Delta = 0$, alors f possède une racine double x_0 et

$$f(x) = a(x - x_0)^2.$$

- Si $\Delta < 0$, alors f ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

THÉORÈME 2 — Signe du trinôme

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) de discriminant Δ .

- Si $\Delta < 0$: $f(x)$ est du **signe de a** pour tout $x \in \mathbb{R}$ (toujours positif si $a > 0$, toujours négatif si $a < 0$).
- Si $\Delta = 0$, de racine double x_0 : $f(x_0) = 0$ et $f(x)$ est du **signe de a** pour tout $x \neq x_0$.
- Si $\Delta > 0$, de racines $x_1 < x_2$:
 - $f(x)$ est du **signe de a** pour $x \in]-\infty; x_1[\cup]x_2; +\infty[$.
 - $f(x)$ est du **signe opposé à a** pour $x \in]x_1; x_2[$.
 - $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

En résumé : $f(x)$ est du **signe de a** , sauf entre les racines où il est de **signe opposé à a** .

EXEMPLE Étudier le signe de $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$.

$$a = 2, \Delta = 36 - 32 = 4 > 0, x_1 = 1, x_2 = 2.$$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$		
$f(x)$		+	0	-	0	+

$$f(x) > 0 \text{ sur }]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[; f(x) < 0 \text{ sur }]1; 2[.$$

EXEMPLE Étudier le signe de $g(x) = -x^2 + 2x - 5$.

$$a = -1, \Delta = 4 - 20 = -16 < 0.$$

$$g(x) \text{ est du signe de } a = -1 \text{ pour tout } x : g(x) < 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

EXEMPLE Étudier le signe de $h(x) = x^2 - 6x + 9$.

$$a = 1, \Delta = 36 - 36 = 0, x_0 = 3.$$

$$h(x) = (x - 3)^2 \geq 0 \text{ pour tout } x; h(x) = 0 \text{ seulement en } x = 3.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur a dans la forme factorisée.

On écrit parfois $(x - x_1)(x - x_2)$ en oubliant le coefficient a devant. Or $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$. Pour s'en souvenir, on peut vérifier que le coefficient de x^2 dans la forme développée redonne bien a .

ERREUR FRÉQUENTE

Se tromper de signe entre les racines.

Entre x_1 et x_2 , le signe de $f(x)$ est *opposé* au signe de a . C'est là que beaucoup d'élèves se trompent en écrivant le signe de a partout.

Test rapide : calculer $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$ (valeur entre les racines) et vérifier son signe. Si $a > 0$ et que ce test donne un résultat négatif, c'est cohérent.

2.5 Inéquations du second degré

◆ **PROPRIÉTÉ 4 — Méthode de résolution d'une inéquation du second degré** Pour résoudre une inéquation du type $ax^2 + bx + c > 0$ (ou $\geq 0, < 0, \leq 0$) :

1. **Ramener à zéro** : si l'inéquation n'est pas de la forme $[\dots] \bowtie 0$, transposer tous les termes du même côté.
2. **Calculer le discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$ et les racines éventuelles $x_1 \leq x_2$.
3. **Dresser le tableau de signes** du trinôme (voir C4).
4. **Lire la solution** sur le tableau de signes.

EXEMPLE Résoudre $x^2 - x - 6 > 0$.

Étape 1. L'inéquation est déjà ramenée à 0.

Étape 2. $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$; $x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$; $x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$.

Étape 3. $a = 1 > 0$:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$x^2 - x - 6$		$+$	$-$	$+$

Étape 4. $x^2 - x - 6 > 0$ sur $] -\infty; -2[\cup] 3; +\infty[$.

EXEMPLE Résoudre $2x^2 + 3x - 2 \leq 0$.

$\Delta = 9 + 16 = 25$; $x_1 = \frac{-3-5}{4} = -2$; $x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{1}{2}$.

$a = 2 > 0$: le trinôme est négatif ou nul entre les racines.

Solution : $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$.

EXEMPLE Résoudre $3x + 5 \leq x^2 + 1$.

Étape 1 (ramener à zéro) : $0 \leq x^2 - 3x - 4$, soit $x^2 - 3x - 4 \geq 0$.

$\Delta = 9 + 16 = 25$; $x_1 = -1$; $x_2 = 4$.

$a = 1 > 0$: positif ou nul hors de $] -1; 4[$.

Solution : $] -\infty; -1] \cup [4; +\infty[$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de ramener à zéro avant d'étudier le signe.

Face à $x^2 - 3 > 2x$, certains élèves étudient le signe de $x^2 - 3$ d'un côté et celui de $2x$ de l'autre, puis comparent. Cette démarche est fautive. Il faut d'abord écrire $x^2 - 2x - 3 > 0$ pour disposer d'un seul trinôme dont on étudie le signe.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Erreur sur les bornes : inclure ou exclure les racines.

Si l'inéquation est stricte ($>$ ou $<$), les racines ne font pas partie de l'ensemble-solution : on utilise des crochets ouverts $] et $[$. Si l'inéquation est large ($\geq$ ou $\leq$), les racines sont incluses : on utilise des crochets fermés $[$ et $]$.$

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Équations bicarrées.

Une **équation bicarrée** est de la forme $ax^4 + bx^2 + c = 0$ ($a \neq 0$). Le changement de variable $u = x^2$ ($u \geq 0$) la transforme en équation du second degré en u :

$$au^2 + bu + c = 0.$$

On résout cette équation en u , puis on revient à x en résolvant $x^2 = u$ (valable seulement si $u \geq 0$).

Exemple. Résoudre $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

On pose $u = x^2$: $u^2 - 5u + 4 = 0$.

$\Delta = 25 - 16 = 9$; $u_1 = 1$; $u_2 = 4$.

► $u_1 = 1$: $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$.

► $u_2 = 4$: $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$.

L'ensemble des solutions est $\{-2 ; -1 ; 1 ; 2\}$.

Piège fréquent. Si l'équation en u donne une solution $u < 0$, on la rejette car $x^2 \geq 0$.

2.6 Modélisation et optimisation

◆ **PROPRIÉTÉ 5 — Extremum d'un polynôme du second degré** Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) un polynôme du second degré de sommet $S(\alpha ; \beta)$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

► Si $a > 0$, f admet un **minimum global** égal à β , atteint en $x = \alpha$.

► Si $a < 0$, f admet un **maximum global** égal à β , atteint en $x = \alpha$.

Si le problème impose un **domaine de validité** $[x_{\min} ; x_{\max}]$, on doit vérifier si α appartient à ce domaine.

► Si $\alpha \in [x_{\min} ; x_{\max}]$: l'extremum global est β .

► Sinon : l'extremum sur le domaine est atteint à l'une des bornes ; on compare $f(x_{\min})$ et $f(x_{\max})$.

◆ **PROPRIÉTÉ 6 — Méthode de résolution d'un problème d'optimisation**

1. Définir la variable et préciser son domaine de validité.

2. Exprimer la quantité à optimiser en fonction de cette variable : obtenir $f(x) = ax^2 + bx + c$.

3. Calculer $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et vérifier que α appartient au domaine.
4. Calculer $\beta = f(\alpha)$: c'est la valeur optimale.
5. Conclure en précisant la valeur de x et la valeur optimale atteinte.

EXEMPLE Un agriculteur dispose de 120 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire le long d'un mur (qui sert de quatrième côté). On note x la longueur du côté perpendiculaire au mur (en m).

Étape 1. Les deux côtés perpendiculaires mesurent x et le côté parallèle mesure $120 - 2x$. Domaine : $x > 0$ et $120 - 2x > 0$, soit $x \in]0 ; 60[$.

Étape 2. Aire : $A(x) = x(120 - 2x) = -2x^2 + 120x$.

Étape 3. $a = -2 < 0$ (maximum), $\alpha = -\frac{120}{-4} = 30 \in]0 ; 60[$. ✓

Étape 4. $\beta = A(30) = -2 \times 900 + 120 \times 30 = -1800 + 3600 = 1800$.

Étape 5. L'aire maximale est **1 800 m²**, obtenue pour $x = 30$ m (côtés perpendiculaires de 30 m et côté parallèle de 60 m).

EXEMPLE Une entreprise vend q articles au prix unitaire de $p(q) = -0,5q + 100$ (en euros), pour $q \in [0 ; 200]$.

Recette : $R(q) = q \times p(q) = -0,5q^2 + 100q$.

$a = -0,5 < 0$ (maximum), $\alpha = -\frac{100}{-1} = 100 \in [0 ; 200]$.

$R(100) = -0,5 \times 10\,000 + 100 \times 100 = -5\,000 + 10\,000 = 5\,000$ €.

La recette maximale est 5 000 €, atteinte pour $q = 100$ articles.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier le domaine de validité.

Si α n'appartient pas au domaine admissible $[x_{\min} ; x_{\max}]$, l'extremum global de f sur $\mathbb{R}$ n'est pas atteint sur le domaine. Il faut alors comparer $f(x_{\min})$ et $f(x_{\max})$ pour trouver le maximum ou le minimum sur le domaine restreint.

Exemple. Si $a < 0$ et $\alpha > x_{\max}$, alors f est croissante sur $[x_{\min} ; x_{\max}]$ et le maximum est $f(x_{\max})$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « la valeur de x qui optimise » et « la valeur optimale de f ».

La question « Pour quelle valeur de x le bénéfice est-il maximal ? » attend $x = \alpha$.

La question « Quel est le bénéfice maximal ? » attend $\beta = f(\alpha)$.

Ces deux réponses sont distinctes et doivent toutes les deux figurer dans la conclusion.

🔑 MÉTHODE M1 Passer d'une forme à une autre

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « mettre sous forme canonique », « développer », « factoriser » un trinôme du second degré, ou lorsqu'on a besoin de la forme canonique pour lire le sommet d'une parabole ou trouver un extremum.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les coefficients a, b, c de $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$).

2. Je calcule l'abscisse du sommet : $\alpha = -\frac{b}{2a}$.
3. Je calcule l'ordonnée du sommet par l'une des deux méthodes au choix :
 - **Méthode directe** : $\beta = f(\alpha)$ (je remplace x par α dans f).
 - **Méthode par le discriminant** : $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$ où $\Delta = b^2 - 4ac$.
4. J'écris la forme canonique : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
5. **Pour développer** : je développe $(x - \alpha)^2 = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2$ puis je multiplie par a et j'ajoute β .
6. **Pour factoriser** : je calcule Δ , et si $\Delta > 0$, je pose x_1 et x_2 les deux racines, puis $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Exemple rédigé. Soit $f(x) = 2x^2 - 12x + 22$. Mettre f sous forme canonique.

On a $a = 2$, $b = -12$, $c = 22$.

$$\alpha = -\frac{-12}{2 \times 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

$$\beta = f(3) = 2 \times 3^2 - 12 \times 3 + 22 = 18 - 36 + 22 = 4.$$

$$f(x) = 2(x - 3)^2 + 4.$$

Vérification par développement : $2(x - 3)^2 + 4 = 2(x^2 - 6x + 9) + 4 = 2x^2 - 12x + 18 + 4 = 2x^2 - 12x + 22 \checkmark$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier le facteur a dans la forme canonique. On écrit parfois $(x - \alpha)^2 + \beta$ sans le a devant : c'est faux dès que $a \neq 1$.
- **Piège 2.** Se tromper de signe sur α . La formule est $\alpha = -\frac{b}{2a}$: si $b = -12$, alors $\alpha = -\frac{-12}{4} = +3$ et non -3 .
- **Piège 3.** Lors du calcul de β par $f(\alpha)$, oublier d'appliquer la valeur à *tous* les termes de f , notamment le terme constant c .

Vérifier son résultat. Développer la forme canonique obtenue et vérifier qu'on retrouve la forme développée initiale. Si $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, alors le développement doit donner $ax^2 + bx + c$ avec les mêmes coefficients que ceux de départ. De plus, vérifier que $f(\alpha) = \beta$ est bien satisfait.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

④ MÉTHODE M2 Étudier une parabole

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « dresser le tableau de variations », « tracer la courbe représentative », « déterminer le maximum ou le minimum », ou « préciser le sommet de la parabole ».

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les coefficients a , b , c de $f(x) = ax^2 + bx + c$.
2. Je calcule les coordonnées du sommet :

$$\alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = f(\alpha).$$

3. Je détermine le sens de la parabole selon le signe de a :

- ▶ Si $a > 0$: parabole tournée vers le haut, f est décroissante sur $] -\infty ; \alpha]$ puis croissante sur $[\alpha ; +\infty[$, et β est le **minimum** de f .
 - ▶ Si $a < 0$: parabole tournée vers le bas, f est croissante sur $] -\infty ; \alpha]$ puis décroissante sur $[\alpha ; +\infty[$, et β est le **maximum** de f .
4. Je dresse le tableau de variations en indiquant α , β et les flèches.
 5. Pour le tracé, je place le sommet $S(\alpha ; \beta)$, l'axe de symétrie $x = \alpha$, quelques points supplémentaires et les intersections avec les axes si elles existent.

Exemple rédigé. Soit $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$. Dresser le tableau de variations de f et préciser son extremum.

On a $a = -3$, $b = 6$, $c = 1$.

$$\alpha = -\frac{6}{2 \times (-3)} = -\frac{6}{-6} = 1.$$

$$\beta = f(1) = -3 \times 1^2 + 6 \times 1 + 1 = -3 + 6 + 1 = 4.$$

Puisque $a = -3 < 0$, la fonction f admet un **maximum** égal à 4, atteint en $x = 1$.

Tableau de variations :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	4	$-\infty$
		↘	

Le sommet de la parabole est $S(1 ; 4)$ et l'axe de symétrie est la droite $x = 1$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Inverser le sens de variation : quand $a < 0$, la fonction est d'abord *croissante* (les valeurs montent vers le sommet), puis *décroissante*. Ne pas appliquer mécaniquement le schéma d'une parabole en $a > 0$.
- ▶ **Piège 2.** Confondre le sommet et les racines. α est l'abscisse du sommet, pas une racine. Avoir $f(\alpha) = 0$ serait une coïncidence particulière.
- ▶ **Piège 3.** Oublier que les flèches du tableau de variations indiquent $f \rightarrow -\infty$ aux deux extrémités quand $a < 0$ (et $f \rightarrow +\infty$ quand $a > 0$).

Vérifier son résultat. Calculer $f(\alpha - 1)$ et $f(\alpha + 1)$: ces deux valeurs doivent être égales (symétrie de la parabole par rapport à l'axe $x = \alpha$) et inférieures à β si $a > 0$ (ou supérieures à β si $a < 0$, ce qui est impossible pour un maximum). Ici, $f(0) = 1$ et $f(2) = -3 \times 4 + 12 + 1 = 1$ ✓ : symétrie vérifiée, et $1 < 4$ ✓.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

🔑 MÉTHODE M3 Résoudre une équation du second degré

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « résoudre » une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$, de « déterminer les racines » d'un trinôme, ou de « trouver les antécédents d'une valeur » par une fonction polynôme du second degré.

La méthode pas à pas.

1. Je mets l'équation sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a \neq 0$) en développant et en ramenant tout d'un même côté si nécessaire.
2. J'identifie les coefficients a , b , c .
3. Je calcule le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.

4. Je conclus selon le signe de Δ :

► Si $\Delta < 0$: l'équation n'a **pas de solution réelle**.

► Si $\Delta = 0$: l'équation a **une solution (double)** : $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

► Si $\Delta > 0$: l'équation a **deux solutions distinctes** : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Exemple rédigé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2 - 5x + 2 = 0$.

On a $a = 3$, $b = -5$, $c = 2$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 25 - 24 = 1.$$

Comme $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \times 3} = \frac{5 - 1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3},$$

$$x_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \times 3} = \frac{5 + 1}{6} = \frac{6}{6} = 1.$$

L'ensemble des solutions est $S = \left\{ \frac{2}{3}; 1 \right\}$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Se tromper de signe dans $-b$: si $b = -5$, alors $-b = +5$. Écrire $-b = -5$ dans la formule est une erreur fréquente.
- **Piège 2.** Diviser par $2a$ au lieu de $2 \times a$: ne pas oublier que le dénominateur est $2a$ (et non $2 + a$ ni a seul).
- **Piège 3.** Conclure à l'absence de solution dès que le discriminant est négatif, mais oublier de préciser « dans $\mathbb{R}$ ». Si le contexte porte sur les réels, écrire $S = \emptyset$ et ne pas calculer de racines imaginaires.

Vérifier son résultat. Substituer chaque solution trouvée dans l'équation de départ et vérifier que l'égalité est bien satisfaite. Ici :

► $x_1 = \frac{2}{3} : 3 \times \frac{4}{9} - 5 \times \frac{2}{3} + 2 = \frac{4}{3} - \frac{10}{3} + \frac{6}{3} = 0 \checkmark$

► $x_2 = 1 : 3 \times 1 - 5 \times 1 + 2 = 0 \checkmark$

On peut aussi vérifier les relations de Viète : $x_1 + x_2 = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3} = -\frac{b}{a} \checkmark$ et $x_1 \times x_2 = \frac{2}{3} = \frac{c}{a} \checkmark$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Factoriser et étudier le signe d'un trinôme

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « factoriser un trinôme », d'« étudier le signe de $f(x)$ », de « dresser un tableau de signes », ou de déterminer pour quelles valeurs de x une expression polynôme du second degré est positive ou négative.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie a , b , c et je calcule $\Delta = b^2 - 4ac$.

2. Selon le signe de Δ :

► Si $\Delta > 0$: il existe deux racines $x_1 < x_2$ et $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

► Si $\Delta = 0$: il existe une racine double x_0 et $f(x) = a(x - x_0)^2$.

- Si $\Delta < 0$: pas de factorisation sur $\mathbb{R}$; $f(x)$ est du signe de a pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. Je dresse le tableau de signes en utilisant la règle : **$f(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines, et du signe opposé entre les racines.**
4. Je conclus sur l'ensemble où $f(x) > 0$ (ou < 0) selon la question.

Exemple rédigé. Soit $f(x) = -2x^2 + 6x - 4$. Factoriser f et dresser son tableau de signes.

On a $a = -2$, $b = 6$, $c = -4$.

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-2) \times (-4) = 36 - 32 = 4 > 0.$$

$$x_1 = \frac{-6 - \sqrt{4}}{2 \times (-2)} = \frac{-6 - 2}{-4} = \frac{-8}{-4} = 2,$$

$$x_2 = \frac{-6 + \sqrt{4}}{2 \times (-2)} = \frac{-6 + 2}{-4} = \frac{-4}{-4} = 1.$$

On a $x'_1 = 1$ et $x'_2 = 2$, donc $f(x) = -2(x - 1)(x - 2)$.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$(x-1)$		-	0	+
$(x-2)$		-	-	0
$f(x) = -2(x-1)(x-2)$		-	0	+

$f(x) > 0$ sur $]1; 2[$ et $f(x) < 0$ sur $]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier le facteur a dans la factorisation : écrire $f(x) = (x - 1)(x - 2)$ au lieu de $f(x) = -2(x - 1)(x - 2)$. Le signe de a est essentiel pour le tableau de signes.
- **Piège 2.** Se tromper sur le signe entre les racines : quand $a < 0$, f est positive *entre* les racines (et non à l'extérieur). Retenir la règle : « du signe de a sauf entre les racines ».
- **Piège 3.** Dans les calculs de x_1 et x_2 , faire attention aux doubles changements de signe quand $a < 0$: le dénominateur $2a$ est négatif, ce qui modifie le sens des inégalités lors d'une éventuelle simplification.

Vérifier son résultat. Développer la forme factorisée et vérifier qu'on retrouve $f(x) = -2x^2 + 6x - 4$:

$$-2(x - 1)(x - 2) = -2(x^2 - 3x + 2) = -2x^2 + 6x - 4 \checkmark.$$

Vérifier aussi le signe en un point : $f(1,5) = -2 \times (0,5) \times (-0,5) = +0,5 > 0$, ce qui correspond bien à « f positive entre 1 et 2 » $\checkmark$.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

🔑 MÉTHODE M5 Résoudre une inéquation du second degré

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « résoudre l'inéquation » $ax^2 + bx + c \leq 0$ (ou ≥ 0 , < 0 , > 0), de « déterminer l'ensemble des solutions », ou de « trouver les valeurs de x pour lesquelles $f(x) \geq k$ ».

La méthode pas à pas.

1. Je ramène l'inéquation à la forme $ax^2 + bx + c \leq 0$ (ou ≥ 0) en développant et en passant tous les termes d'un même côté.
2. Je calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ et les racines éventuelles $x_1 \leq x_2$.
3. Je dresse le tableau de signes du trinôme (méthode M4).

4. Je lis l'ensemble solution dans le tableau en tenant compte de l'inégalité demandée :
 - ▶ Les valeurs aux racines sont incluses si l'inégalité est large ($\leq$ ou $\geq$).
 - ▶ Les valeurs aux racines sont exclues si l'inégalité est stricte ($<$ ou $>$).
5. J'écris l'ensemble solution S en utilisant la notation d'intervalle.

Exemple rédigé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 - 4x + 3 \geq 0$.

On a $a = 1 > 0$, $b = -4$, $c = 3$.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0.$$

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{4}}{2} = \frac{4 - 2}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{4 + \sqrt{4}}{2} = \frac{4 + 2}{2} = 3.$$

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$x^2 - 4x + 3$		$+$	0	$-$
		0	$+$	

Le trinôme est positif ou nul sur $]-\infty; 1]$ et sur $[3; +\infty[$.

Conclusion :

$$S =]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de ramener l'inéquation à zéro avant d'appliquer le tableau de signes. Par exemple, $x^2 - 4x \geq -3$ doit d'abord s'écrire $x^2 - 4x + 3 \geq 0$.
- ▶ **Piège 2.** Confondre bornes ouvertes et fermées. Si l'inégalité est large ($\geq$ ou $\leq$), les racines sont *incluses* dans l'ensemble solution (crochets fermés). Si elle est stricte ($>$ ou $<$), elles sont *exclues* (crochets ouverts).
- ▶ **Piège 3.** Lire le tableau « à l'envers » : pour $ax^2 + bx + c \geq 0$ avec $a > 0$, la solution est l'extérieur de l'intervalle formé par les racines, et non l'intérieur.

Vérifier son résultat. Tester un point de chaque intervalle dans l'inégalité de départ :

- ▶ $x = 0 \in S : 0 - 0 + 3 = 3 \geq 0 \checkmark$
- ▶ $x = 2 \notin S : 4 - 8 + 3 = -1 < 0 \checkmark$ (pas solution, comme attendu)
- ▶ $x = 4 \in S : 16 - 16 + 3 = 3 \geq 0 \checkmark$
- ▶ Aux bornes : $x = 1$ et $x = 3$ donnent $0 \geq 0 \checkmark$ (bornes incluses).

S'entraîner. (renvois exercices M5)

① MÉTHODE M6 Résoudre un problème d'optimisation

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « maximiser » ou « minimiser » une quantité (aire, volume, bénéfice, périmètre...), de « trouver les dimensions qui optimisent », ou de « déterminer la valeur de x pour laquelle la quantité est maximale (ou minimale) ».

La méthode pas à pas.

1. **Définir la variable :** je choisis une variable x représentant la quantité qui varie et je précise son domaine de définition (les valeurs physiquement admissibles).
2. **Exprimer la quantité à optimiser** en fonction de x : j'obtiens une fonction $f(x)$.
3. **Identifier le trinôme :** je vérifie que f est un polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$ et je note le signe de a .
4. **Trouver le sommet :** je calcule $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

5. **Vérifier le domaine** : je contrôle que α appartient bien au domaine de définition établi à l'étape 1. Sinon, l'extremum est atteint à la borne la plus proche.

6. **Conclure** en distinguant :

- ▶ ce qu'est la **valeur optimale** : $\beta = f(\alpha)$ (l'aire maximale, le bénéfice maximal...),
- ▶ ce qu'est la **variable optimale** : α (la longueur, le prix...qui réalise l'optimum).

Exemple rédigé. Un rectangle a son côté inférieur sur l'axe des abscisses et ses deux sommets supérieurs sur la droite d'équation $y = -2x + 8$ (pour $0 \leq x \leq 4$). Déterminer les dimensions du rectangle d'aire maximale.

Soit x la demi-largeur du rectangle ($0 < x < 4$). La largeur est $2x$ et la hauteur est $y = -2x + 8$.

$$A(x) = 2x \times (-2x + 8) = -4x^2 + 16x.$$

A est un trinôme avec $a = -4 < 0$, $b = 16$, $c = 0$.

$$\alpha = -\frac{16}{2 \times (-4)} = -\frac{16}{-8} = 2.$$

$$\beta = A(2) = -4 \times 4 + 16 \times 2 = -16 + 32 = 16.$$

$\alpha = 2 \in]0; 4[$: le sommet est bien dans le domaine.

L'aire est maximale pour $x = 2$, c'est-à-dire une largeur de $2 \times 2 = 4$ et une hauteur de $-2 \times 2 + 8 = 4$.

Conclusion : Le rectangle d'aire maximale a pour dimensions 4×4 , et son aire maximale est $A(2) = 16$ unités d'aire.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de vérifier le domaine de validité. Si α est hors du domaine, l'extremum de la fonction sur le domaine est atteint en une borne, pas au sommet de la parabole.
- ▶ **Piège 2.** Confondre la valeur optimale $\beta = f(\alpha)$ et la variable optimale α . La question « pour quelle longueur ? » demande α ; la question « quelle aire maximale ? » demande β .
- ▶ **Piège 3.** Ne pas définir clairement la variable x avec son domaine dès le début : on risque d'obtenir des solutions négatives ou incohérentes avec la situation physique.

Vérifier son résultat.

- ▶ Calculer $A(\alpha - 0,5)$ et $A(\alpha + 0,5)$ et vérifier qu'ils sont inférieurs à β (pour un maximum). Ici : $A(1,5) = -4 \times 2,25 + 24 = 15 < 16 \checkmark$ et $A(2,5) = -4 \times 6,25 + 40 = 15 < 16 \checkmark$.
- ▶ Contrôler que les dimensions trouvées correspondent bien au contexte géométrique (largeur et hauteur positives, dans le domaine).
- ▶ Vérifier les unités de la valeur optimale (aire en unités d'aire, longueur en unités de longueur, etc.).

S'entraîner. (renvois exercices M6)

Exercice 1

On considère le trinôme $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$.

1. Identifier les coefficients a , b et c de ce trinôme.
2. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de f .
3. Écrire f sous forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
4. Vérifier que $f(x) = 2(x + 1)\left(x - \frac{5}{2}\right)$ en développant le membre de droite.

Exercice 2

Pour chacune des expressions suivantes, passer à la forme demandée.

1. $f(x) = 3(x - 2)^2 - 1 \rightarrow$ forme développée.
2. $g(x) = -2(x - 1)(x + 4) \rightarrow$ forme développée.
3. $h(x) = x^2 + 6x + 5 \rightarrow$ forme canonique $h(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$.

On rappelle que $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = h(\alpha)$.

Exercice 3

1. Parmi les expressions suivantes, identifier celles qui sont des trinômes du second degré en x . Préciser alors les valeurs de a , b et c .

$$p(x) = 4x^2 - x + 7$$

$$q(x) = 3x - 2$$

$$r(x) = -x^2 + 5$$

2. On considère $f(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 3)$.
 - a) Développer $f(x)$ pour obtenir sa forme développée.
 - b) En déduire les coordonnées du sommet $S(\alpha; \beta)$ de la parabole.
 - c) Écrire f sous forme canonique.

Exercice 4

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 4x + 1$.

1. Préciser le coefficient a et en déduire le sens d'ouverture de la parabole représentative de f .
2. Calculer les coordonnées du sommet S de cette parabole.
3. Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.
4. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
5. Calculer $f(0)$ et $f(4)$. Que remarque-t-on ? Expliquer.

Exercice 5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x - 1)^2 - 8$.

1. Identifier la forme canonique et en lire directement les coordonnées du sommet S .
2. La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifier.
3. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ et préciser le minimum de f .
4. Développer $f(x)$ pour obtenir la forme développée $f(x) = ax^2 + bx + c$.
5. Vérifier par le calcul que $f(3) = 0$ et $f(-1) = 0$.

Exercice 6

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -3x^2 + 12x - 5$.

1. Calculer les coordonnées du sommet S de la parabole représentative de g .
2. Écrire g sous forme canonique.
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. Préciser la valeur maximale de g et l'abscisse en laquelle elle est atteinte.
4. Calculer $g(0)$. Quelle est la signification géométrique de ce résultat ?
5. Sans calcul, donner le signe de $g(4)$ en utilisant la symétrie de la parabole.

Exercice 7 ◆

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en calculant le discriminant Δ .

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $2x^2 + 3x - 2 = 0$
3. $x^2 - 2x + 5 = 0$

Exercice 8 ◆

Pour chacune des équations suivantes, calculer Δ et discuter le nombre de solutions dans $\mathbb{R}$.

1. $4x^2 - 12x + 9 = 0$
2. $x^2 - 7 = 0$
3. $3x^2 + x + 1 = 0$

Donner les solutions exactes (sous forme de radicaux si nécessaire).

Exercice 9 ◆

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. On ramènera chacune à la forme $ax^2 + bx + c = 0$ avant de calculer Δ .

1. $(x + 1)(x - 3) = -3$
2. $2x^2 - 5x = 3$

Exercice 10 ◆

Factoriser chacune des expressions suivantes.

1. $x^2 - 9$
2. $2x^2 - 8x$
3. $x^2 - x - 6$
4. $3x^2 - 12x + 12$

On précisera à chaque fois la méthode utilisée : identité remarquable, facteur commun, ou utilisation du discriminant.

Exercice 11 ◆

On considère le trinôme $f(x) = (x - 2)(x + 5)$.

1. Identifier les racines de f (les valeurs de x pour lesquelles $f(x) = 0$).
2. Dresser le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire les ensembles de solutions des inéquations suivantes :
 - a) $f(x) \geq 0$
 - b) $f(x) < 0$
4. Développer $f(x)$ et vérifier que $\Delta = 49$.

Exercice 12 ◆

On considère le trinôme $g(x) = -2x^2 + 2x + 12$.

1. Calculer Δ et déterminer les racines de g .

2. Factoriser $g(x)$.
3. Dresser le tableau de signes de g sur $\mathbb{R}$. (On rappelle que le signe de g est celui de a à l'extérieur des racines.)
4. Résoudre $g(x) \leq 0$.

Exercice 13

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $x^2 - x - 6 > 0$
2. $-x^2 + 4 \geq 0$

Pour chacune : calculer Δ , trouver les racines si elles existent, dresser le tableau de signes, puis conclure.

Exercice 14

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $2x^2 - 5x + 2 \leq 0$
2. $x^2 + 1 < 0$

Pour l'inéquation b), calculer Δ et conclure sans chercher de racines.

Exercice 15

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-3x^2 + 6x + 9 \geq 0$.

1. Calculer Δ et déterminer les racines du trinôme $f(x) = -3x^2 + 6x + 9$.
2. Dresser le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$. (Attention au signe de a .)
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation.
4. Vérifier le résultat en substituant $x = 0$ et $x = 4$ dans $f(x)$.

Exercice 16

Un éleveur dispose de 20 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire.

On note x la largeur (en mètres) de l'enclos, avec $0 < x < 10$.

1. Exprimer la longueur de l'enclos en fonction de x .
2. Montrer que l'aire $A(x)$ (en m^2) de l'enclos est donnée par $A(x) = -x^2 + 10x$.
3. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de A .
4. En déduire la valeur de x qui maximise l'aire et la valeur de cette aire maximale.
5. Quelle est la forme de l'enclos d'aire maximale?

Exercice 17

Un commerçant vend des articles. Des études montrent que si le prix unitaire est p euros, il vend $x = \frac{50-p}{2}$ articles, avec $0 \leq p \leq 50$.

1. Exprimer p en fonction de x .
2. Montrer que la recette $R(x)$ (en euros) s'écrit $R(x) = -2x^2 + 50x$.
3. Déterminer le nombre d'articles x à vendre pour maximiser la recette.
4. En déduire le prix unitaire optimal et la recette maximale correspondante.

Exercice 18

Un ballon est lancé verticalement. Sa hauteur h (en mètres) au bout de t secondes est modélisée par :

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1 \quad (t \geq 0).$$

1. Quelle est la hauteur initiale du ballon (à $t = 0$) ?
2. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole. En déduire la hauteur maximale atteinte et l'instant auquel elle est atteinte.
3. Résoudre $h(t) = 0$ dans $\mathbb{R}$. En retenant la solution positive, donner (valeur arrondie au centième) l'instant auquel le ballon touche le sol.

Exercice 19

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 6x - 24$.

1. (C1) Identifier les coefficients a , b , c et écrire f sous forme canonique.
2. (C2) En déduire les coordonnées du sommet S de la parabole représentative de f et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
3. (C1) Calculer Δ et factoriser $f(x)$.
4. (C2) Déterminer graphiquement (puis algébriquement) les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses.
5. L'équation $f(x) = -27$ admet-elle des solutions ? Justifier à l'aide du tableau de variations.

Exercice 20

On donne $f(x) = -2(x + 3)^2 + 8$.

1. (C1) Développer $f(x)$ pour obtenir la forme développée $f(x) = ax^2 + bx + c$.
2. (C2) Lire directement les coordonnées du sommet S de la parabole à partir de la forme canonique. Préciser si la parabole admet un maximum ou un minimum.
3. (C2) Dresser le tableau de variations de f .
4. (C1) Résoudre $f(x) = 0$ en utilisant la forme canonique. Interpréter géométriquement.
5. Comparer les formes canonique et développée : laquelle est la plus pratique pour chaque question ? Justifier.

Exercice 21

On considère le trinôme $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

1. (C1) Écrire f sous forme canonique $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$.
2. (C3) Calculer Δ et résoudre $f(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$. Donner les solutions sous forme exacte (avec $\sqrt{3}$).
3. (C3) Résoudre $f(x) = -2$ dans $\mathbb{R}$.
On ramènera à la forme $ax^2 + bx + c = 0$.
4. (C1) La valeur β est-elle bien le minimum de f ? Justifier à l'aide de la forme canonique.

Exercice 22

On pose $p(x) = 2x^2 - 4x - 6$.

1. (C1) Écrire $p(x)$ sous forme canonique, puis sous forme factorisée. Détailler les calculs.
2. (C3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $p(x) = 10$.
Simplifier l'équation avant de calculer Δ .

3. (C3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $p(x) = -8$.
Utiliser la forme canonique pour conclure directement.
4. (C1) Vérifier que les trois formes de $p(x)$ donnent le même résultat pour $p(2)$.

Exercice 23

On considère le trinôme $f(x) = 6x^2 - x - 2$.

1. (C3) Calculer Δ et déterminer les racines de f .
2. (C4) Factoriser $f(x)$. On vérifiera que $f(x) = (2x + 1)(3x - 2)$.
3. (C4) Dresser le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$.
4. (C3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $6x^2 - x = 2$.
5. (C4) En déduire, sans nouveau calcul, le signe de $6x^2 - x - 2$ sur $\left[-\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right]$.

Exercice 24

1. (C3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x^2 - 4)(x - 3) = 0$.
Utiliser la règle du produit nul après avoir factorisé $x^2 - 4$.
2. (C4) Dresser le tableau de signes de $g(x) = x^2 - 4$ sur $\mathbb{R}$.
3. (C3) Pour $h(x) = 2x^2 + 3x - 5$:
 - a) Calculer Δ et déterminer les racines de h .
 - b) Factoriser $h(x)$.
 - c) Dresser le tableau de signes de h .
4. (C4) En déduire les solutions de l'inéquation $2x^2 + 3x - 5 \geq 0$.

Exercice 25

1. (C4) Factoriser $f(x) = x^2 - 3x - 10$ et dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$.
2. (C5) Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 - a) $x^2 - 3x - 10 < 0$
 - b) $x^2 - 3x - 10 \geq 0$
3. (C4) Factoriser $g(x) = -x^2 + 2x + 8$ et dresser son tableau de signes.
4. (C5) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-x^2 + 2x + 8 > 0$.

Exercice 26

1. (C4) Factoriser et étudier le signe de $g(x) = 3x^2 - 5x - 2$.
2. (C5) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 - 5x - 2 < 0$.
3. Un jardinier dispose de deux parcelles :
 - un carré de côté x mètres ($x > 1$) ;
 - un rectangle de dimensions $(x + 3)$ m et $(x - 1)$ m.

(C5) Pour quelles valeurs de x le rectangle a-t-il une aire strictement supérieure à celle du carré ?
Montrer que l'inéquation se simplifie et n'est pas du second degré.

Exercice 27

On découpe des carrés de côté x cm aux quatre coins d'une feuille rectangulaire de 16 cm sur 10 cm, puis on relève les bords pour former une boîte ouverte.

On note $V(x)$ le volume (en cm^3) de la boîte, avec $0 < x < 5$.

- (C6) Exprimer les dimensions de la base de la boîte en fonction de x .
- (C6) Montrer que $V(x) = 4x^3 - 52x^2 + 160x$.
On admet ici que V n'est pas un polynôme du second degré. On s'intéresse à la **base** de la boîte.
- (C2) Soit $A(x) = (16 - 2x)(10 - 2x)$ l'aire de la base.
 - Développer $A(x)$ et identifier la forme obtenue.
 - Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant A .
 - Dresser le tableau de variations de A sur $]0; 5[$ et interpréter.
- (C6) Calculer $V(2)$ et $V(3)$. Quel découpage donne le plus grand volume?

Exercice 28

Une entreprise produit x unités d'un article par semaine ($0 \leq x \leq 40$). Le bénéfice hebdomadaire (en euros) est modélisé par :

$$B(x) = -2x^2 + 80x - 600.$$

- (C2) Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentant B .
- (C2) Dresser le tableau de variations de B sur $[0; 40]$.
- (C6) Quel nombre d'unités faut-il produire pour maximiser le bénéfice? Quel est ce bénéfice maximal?
- (C6) L'entreprise est rentable quand $B(x) > 0$. Résoudre $B(x) = 0$ et en déduire l'intervalle de rentabilité.

Exercice 29

- (C3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 5x + 3 = 0$. Donner les solutions sous forme exacte.
- (C5) En déduire la solution de l'inéquation $x^2 - 5x + 3 \leq 0$.
On pourra noter $x_1 = \frac{5 - \sqrt{13}}{2}$ et $x_2 = \frac{5 + \sqrt{13}}{2}$.
- (C3) Calculer le discriminant de $g(x) = x^2 + 4x + 5$.
- (C5) En déduire, sans résoudre d'équation, le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$ et la solution de $g(x) > 0$.

Exercice 30

Un objet est lancé depuis le sol. Sa hauteur h (en mètres) au bout de t secondes est :

$$h(t) = -t^2 + 6t + 7 \quad (t \geq 0).$$

- (C3) Résoudre $h(t) = 0$ dans $\mathbb{R}$. En déduire l'instant auquel l'objet retouche le sol.
- Calculer $h(0)$. Interpréter.
- (C5) Résoudre l'inéquation $h(t) > 3$, c'est-à-dire déterminer les instants pour lesquels l'objet se trouve à plus de 3 m du sol.
On ramènera à $-t^2 + 6t + 4 > 0$ et on donnera les bornes sous forme exacte.
- (C5) En tenant compte du domaine physique ($0 \leq t \leq 7$), écrire l'ensemble de solutions.

Exercice 31

- (C1) On donne $f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$.
 - Développer $f(x)$ pour obtenir la forme $ax^2 + bx + c$.
 - (C4) Factoriser $f(x)$ en utilisant les racines lues sur la forme canonique.
La forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$ permet de lire $x_{1,2} = \alpha \pm \sqrt{-\beta/a}$ quand $\beta < 0$.

c) Dresser le tableau de signes de f .

2. (C1) On donne $g(x) = 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 9$.

a) Développer $g(x)$.

b) (C4) Factoriser $g(x)$ et dresser son tableau de signes.

Exercice 32

La représentation graphique d'une fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$ passe par les points $A(0; -3)$, $B(1; 0)$ et $C(-3; 0)$.

- (C1) En utilisant les coordonnées de chaque point, écrire un système d'équations en a, b, c .
- Résoudre ce système et en déduire l'expression de $f(x)$.
- (C1) Écrire f sous forme canonique.
- (C4) Factoriser $f(x)$ et vérifier que B et C sont bien les points d'intersection avec l'axe des abscisses.
- (C4) Dresser le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 33

Une société modélise son profit mensuel $P(x)$ (en milliers d'euros) par :

$$P(x) = -x^2 + 14x - 40 \quad (0 \leq x \leq 14),$$

où x est la quantité produite (en centaines d'unités).

- (C6) Calculer le sommet de la parabole et en déduire la quantité optimale et le profit maximal.
- (C5) Déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'entreprise est rentable ($P(x) > 0$).
- (C6) La direction souhaite un profit d'au moins 5 000 € par mois, soit $P(x) \geq 5$.
 - Montrer que cela revient à résoudre $-x^2 + 14x - 45 \geq 0$.
 - (C5) Résoudre cette inéquation et interpréter le résultat.

Exercice 34

On considère un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit ont pour longueurs $(x+4)$ cm et $(6-x)$ cm, avec $0 < x < 6$.

- (C6) Exprimer l'aire $A(x)$ du triangle en fonction de x et montrer que :

$$A(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 12.$$

- (C6) Déterminer la valeur de x qui maximise l'aire du triangle et calculer cette aire maximale.
- (C5) On souhaite que l'aire du triangle soit strictement supérieure à 10 cm².
 - Montrer que cela revient à résoudre $-x^2 + 2x + 4 > 0$.
 - Résoudre cette inéquation et donner les solutions exactes.
 - En tenant compte du domaine $0 < x < 6$, écrire l'ensemble des valeurs de x acceptables.
- (C5) Résoudre dans $]0; 6[$ l'inéquation $A(x) \geq 8$.

Exercice 35

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

- Formes du trinôme.

- Identifier les coefficients a, b, c de f .
- Mettre f sous forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$. Préciser les coordonnées du sommet S de la parabole.
- Calculer le discriminant Δ de f , puis déterminer les racines x_1 et x_2 de f .
- Écrire la forme factorisée de f .

2. Représentation graphique.

- La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifier à partir de la valeur de a .
- Tracer l'allure de la parabole représentant f en plaçant le sommet, les racines et l'ordonnée à l'origine.
- Déterminer l'axe de symétrie de la parabole et vérifier que x_1 et x_2 sont symétriques par rapport à cet axe.

3. Tableau de signes et position relative.

- Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- Résoudre l'inéquation $f(x) < 0$.
- Déterminer les valeurs de x pour lesquelles la courbe représentative de f est au-dessous de l'axe des abscisses.

4. Question ouverte. On considère la droite d d'équation $y = x - 1$.

- Montrer que les points d'intersection de la parabole et de la droite d peuvent être obtenus en résolvant $x^2 - 5x + 4 = 0$.
- Résoudre cette équation et en déduire les coordonnées des points d'intersection.
- La droite d est-elle sécante, tangente ou sans intersection avec la parabole ? Justifier.

Exercice 36

On considère les deux polynômes du second degré :

$$f(x) = x^2 - 5x + 4 \quad \text{et} \quad g(x) = -x^2 + 3x + 4.$$

1. Étude de f .

- Calculer le discriminant Δ_f et déterminer les racines de f .
- Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

2. Étude de g .

- Calculer le discriminant Δ_g et déterminer les racines de g .
- Dresser le tableau de signes de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- Remarquer qu'une des racines de g est commune avec une racine de f : que peut-on en déduire sur les paraboles représentant f et g ?

3. Système d'inéquations. Résoudre le système :

$$\begin{cases} f(x) < 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

en combinant les tableaux de signes établis. Exprimer la solution sous forme d'un intervalle.

4. Inéquation produit. On souhaite résoudre $f(x) \times g(x) \leq 0$.

- Dresser le tableau de signes du produit $f(x) \times g(x)$.
- En déduire l'ensemble des solutions de $f(x) \times g(x) \leq 0$.

5. Question ouverte. On considère l'inéquation $f(x) + g(x) \leq 0$.

- Calculer $h(x) = f(x) + g(x)$ et simplifier.
- Résoudre l'inéquation $h(x) \leq 0$ en détaillant la méthode choisie.
- Comparer les solutions obtenues avec celles de la question 3. Que remarque-t-on ?

Exercice 37

On dispose de 20 mètres de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire. On note x la longueur (en mètres) de l'un des côtés de l'enclos, avec $0 < x < 10$.

1. Modélisation.

- Exprimer la largeur y de l'enclos en fonction de x , à partir de la contrainte de périmètre.
- Montrer que l'aire $A(x)$ (en m^2) de l'enclos s'écrit $A(x) = -x^2 + 10x$.

2. Étude de la fonction aire.

- Mettre $A(x)$ sous forme canonique.
- En déduire la valeur de x qui maximise l'aire. Quelle est cette aire maximale ?
- Quelle est la nature géométrique de l'enclos qui maximise l'aire ? Justifier.

3. Contrainte supplémentaire.

On exige maintenant que la longueur x soit comprise entre 3 m et 8 m.

- La valeur optimale trouvée à la question 2 est-elle compatible avec cette contrainte ?
- Déterminer l'aire maximale réalisable sous cette contrainte.

4. Inéquation.

On souhaite que l'aire soit supérieure ou égale à 21 m^2 .

- Montrer que cela revient à résoudre $x^2 - 10x + 21 \leq 0$.
- Résoudre cette inéquation et en déduire les valeurs de x compatibles.

5. Question ouverte.

Si on pouvait utiliser un mur existant comme l'un des côtés de l'enclos (ce côté n'utilise donc pas de clôture), proposer une nouvelle modélisation et déterminer la longueur maximale réalisable pour ce côté afin de maximiser l'aire. Comparer avec le résultat de la question 2.

Exercice 38

Pour tout réel m , on considère le trinôme :

$$f_m(x) = x^2 - 2mx + (m^2 - m - 2).$$

1. Discriminant en fonction de m .

- Calculer le discriminant $\Delta(m)$ de f_m en fonction de m . Simplifier l'expression obtenue.
- Discuter le signe de $\Delta(m)$ selon les valeurs de m et en déduire le nombre de racines réelles de f_m .

2. Cas particuliers.

- Pour $m = 0$: calculer les racines de f_0 (on acceptera des réponses sous forme de radicaux).
- Pour $m = -2$: montrer que f_{-2} admet une racine double et la calculer.
- Pour $m = 2$: calculer les deux racines de f_2 . L'une d'elles est-elle remarquable ?

3. Forme canonique.

- Écrire la forme canonique de f_m en fonction de m .
- Les coordonnées du sommet de la parabole dépendent-elles de m ? Commenter.

4. Valeurs particulières de m .

- Déterminer la (ou les) valeur(s) de m pour lesquelles 0 est racine de f_m .
- Pour ces valeurs, factoriser complètement $f_m(x)$.

5. Question ouverte.

On cherche les valeurs de m pour lesquelles f_m a deux racines strictement positives. Formuler des conditions sur les racines (à l'aide des relations entre coefficients et racines d'un trinôme) et résoudre le problème. Justifier chaque étape.

Exercice 39

Une entreprise fabrique et vend x unités d'un produit par semaine, avec $0 \leq x \leq 100$.

Le prix de vente unitaire (en euros) est $p(x) = 15 - \frac{x}{10}$ (tarif dégressif en fonction de la quantité produite).

Les charges hebdomadaires totales sont $C(x) = 200 + 5x$ euros.

1. Recettes et bénéfice.

- a) Exprimer la recette $R(x)$ (en euros) en fonction de x .
 b) Montrer que le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$ s'écrit :

$$B(x) = -\frac{x^2}{10} + 10x - 200.$$

2. Optimum de production.

- a) Mettre $B(x)$ sous forme canonique.
 b) Déterminer le nombre d'unités à produire pour maximiser le bénéfice. Quel est ce bénéfice maximum ?
 c) Ce résultat est-il compatible avec la contrainte $0 \leq x \leq 100$?

3. Seuil de rentabilité.

On cherche les valeurs de x pour lesquelles l'entreprise est bénéficiaire, c'est-à-dire $B(x) > 0$.

- a) Montrer que $B(x) > 0$ équivaut à résoudre $x^2 - 100x + 2000 < 0$.
 b) Calculer le discriminant de ce trinôme et exprimer les racines sous la forme $a \pm b\sqrt{5}$.
 c) En déduire l'intervalle de rentabilité (on donnera des valeurs approchées à l'unité près).

4. Équation de seuil.

On souhaite que le bénéfice soit exactement $B(x) = 32$ euros.

- a) Écrire l'équation à résoudre.
 b) Résoudre cette équation. Combien y a-t-il de solutions ? Les interpréter.

5. Question ouverte.

Un concurrent propose un tarif $p'(x) = 20 - \frac{x}{5}$ avec les mêmes charges. Déterminer le nouveau bénéfice $B'(x)$, son maximum et comparer les deux stratégies de prix. Quelle stratégie est préférable selon le volume de production envisagé ?

Exercice 40

Un ballon est lancé depuis le sol (hauteur initiale $h_0 = 2$ m) avec une vitesse initiale $v_0 = 20$ m/s à un angle de 45° par rapport à l'horizontale. On prend $g = 10$ m/s².

On rappelle que $\cos(45^\circ) = \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Les équations du mouvement sont :

$$x(t) = v_0 \cos(45^\circ) \cdot t \quad \text{et} \quad y(t) = h_0 + v_0 \sin(45^\circ) \cdot t - \frac{g}{2}t^2,$$

où x est la distance horizontale (en m) et y la hauteur (en m), t le temps en secondes.

1. Mise en équation.

- a) Calculer $v_0 \cos(45^\circ)$ et $v_0 \sin(45^\circ)$.
 b) Écrire explicitement $x(t)$ et $y(t)$ en simplifiant les expressions.

2. Hauteur maximale.

- a) Reconnaître que $y(t)$ est un trinôme du second degré en t . Identifier les coefficients a , b , c .
 b) Mettre $y(t)$ sous forme canonique et en déduire la hauteur maximale atteinte par le ballon.
 c) À quel instant t^* cette hauteur est-elle atteinte ? Quelle est alors la position horizontale du ballon ?

3. Équation de la trajectoire.

On cherche à exprimer y en fonction de x (et non de t).

- a) Exprimer t en fonction de x à partir de l'équation de $x(t)$.
 b) Substituer dans $y(t)$ pour obtenir $y(x) = -\frac{x^2}{40} + x + 2$.
 c) Interpréter : pourquoi la trajectoire est-elle une parabole ?

4. Portée.

La portée est la valeur de x pour laquelle le ballon touche le sol (i.e. $y = 0$).

- a) Écrire l'équation $y(x) = 0$ et calculer son discriminant.
 b) Déterminer la portée (valeur positive de x). Donner une valeur approchée à 0,1 m près.

5. Question ouverte.

Un obstacle vertical de hauteur 3 m se trouve à 30 m du point de lancer. Le ballon passe-t-il au-dessus de l'obstacle ? Justifier par le calcul, puis proposer un angle de lancer

différent qui permettrait de passer au-dessus en maintenant la même vitesse initiale (raisonnement qualitatif accepté).

Exercice 41

On s'intéresse à l'équation **bicarrée** :

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0.$$

1. **Substitution.** On pose $X = x^2$, avec $X \geq 0$.
 - a) Réécrire l'équation bicarrée comme une équation du second degré en X .
 - b) Calculer le discriminant de ce trinôme en X et résoudre l'équation en X .
 - c) Les valeurs obtenues pour X sont-elles compatibles avec la condition $X \geq 0$?
2. **Solutions de l'équation initiale.**
 - a) Pour chaque valeur de X trouvée, résoudre $x^2 = X$ et lister toutes les solutions réelles de $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.
 - b) Vérifier que les solutions trouvées vérifient bien l'équation initiale.
3. **Factorisation.**
 - a) Écrire $x^4 - 5x^2 + 4$ comme un produit de deux trinômes du second degré en x .
 - b) Puis factoriser complètement en un produit de quatre facteurs du premier degré.
4. **Tableau de signes.**
 - a) En utilisant la forme factorisée, dresser le tableau de signes de $x^4 - 5x^2 + 4$ sur $\mathbb{R}$.
 - b) Résoudre l'inéquation $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$.
 - c) Résoudre l'inéquation $x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0$.
5. **Question ouverte.** On considère maintenant l'équation $x^4 - 5x^2 + k = 0$, où k est un paramètre réel. En posant $X = x^2$, discuter le nombre de solutions réelles de l'équation selon les valeurs de k . On distinguera soigneusement les différents cas.

Exercice 42

Problème ouvert : enclos optimal avec mur existant.

Un agriculteur souhaite clôturer un enclos rectangulaire en utilisant un mur existant de longueur 30 m comme l'un des côtés. Il dispose de 60 m de clôture pour les trois autres côtés.

On note x la longueur (en mètres) du côté parallèle au mur, avec $0 < x \leq 30$, et y la longueur des deux côtés perpendiculaires au mur.

1. **Modélisation.**
 - a) Écrire la relation entre x , y et la longueur totale de clôture disponible.
 - b) Exprimer y en fonction de x . Vérifier que la contrainte $0 < x \leq 30$ implique $y > 0$.
 - c) Montrer que l'aire de l'enclos est $A(x) = 30x - \frac{x^2}{2}$.
2. **Optimisation.**
 - a) Mettre $A(x)$ sous forme canonique $A(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
 - b) La valeur α est-elle dans l'intervalle $]0; 30]$?
 - c) En déduire l'aire maximale et les dimensions de l'enclos optimal.
3. **Comparaison sans mur.** Si l'agriculteur n'avait pas de mur et utilisait les 60 m de clôture pour un enclos rectangulaire complet (quatre côtés), montrer que l'aire maximale serait de 225 m². Comparer avec le résultat précédent et commenter l'apport du mur.
4. **Contrainte d'aire minimale.** On exige que l'enclos ait une aire d'au moins 400 m².
 - a) Montrer que cela revient à résoudre $x^2 - 60x + 800 \leq 0$.
 - b) Calculer le discriminant et résoudre cette inéquation.
 - c) En tenant compte de la contrainte $0 < x \leq 30$, déterminer les valeurs de x réalisables.

5. **Question ouverte.** L'agriculteur envisage d'agrandir l'enclos en achetant un supplément de clôture. Il dispose d'un budget permettant d'acheter L mètres supplémentaires (longueur totale disponible : $60 + L$, avec $L > 0$). Exprimer la nouvelle aire maximale en fonction de L et déterminer la valeur minimale de L permettant d'atteindre une aire de 600 m^2 . Justifier chaque étape de la démarche.

Exercice 43

On considère le trinôme $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$.

1. Identifier les coefficients a , b et c de ce trinôme.
2. Calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de f .
3. Écrire f sous forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
4. Vérifier que $f(x) = 3(x + 1)\left(x - \frac{1}{3}\right)$ en développant le membre de droite.

Exercice 44

On considère le trinôme $g(x) = -2x^2 + 8x - 6$.

1. Calculer le discriminant de g et en déduire ses racines.
2. Écrire $g(x)$ sous forme factorisée.
3. Étudier le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$ (on pourra tester les valeurs $x = 0$, $x = 2$ et $x = 4$).

Exercice 45

Un jongleur lance une balle. La hauteur $h(t)$ (en mètres) atteinte par la balle t secondes après le lancer est modélisée par :

$$h(t) = -5t^2 + 10t + 1, \quad t \in [0; 2].$$

1. Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole représentant h .
2. En déduire la hauteur maximale atteinte par la balle et l'instant auquel elle est atteinte.
3. Dresser le tableau de variations de h sur $[0; 2]$.
4. Calculer $h(0)$ et interpréter cette valeur dans le contexte.

Exercice 46

Une entreprise fabrique des bracelets artisanaux. Le coût de production (en euros) de x bracelets est modélisé par :

$$C(x) = x^2 - 40x + 500, \quad x \in [0; 60].$$

On souhaite déterminer combien de bracelets produire pour un coût total de 300 €.

1. Poser l'équation traduisant cette situation.
2. Calculer le discriminant de cette équation.
3. Résoudre l'équation (on donnera les solutions sous forme exacte, puis arrondies à l'unité) et conclure dans le contexte.

Exercice 47

Une association organise un événement. Le bénéfice réalisé (en euros) pour x billets vendus est modélisé par :

$$B(x) = -2x^2 + 80x - 600, \quad x \in [0; 40].$$

1. Résoudre l'équation $B(x) = 0$.

- En déduire le signe de $B(x)$ sur $[0; 40]$.
- Résoudre l'inéquation $B(x) \geq 0$ et interpréter le résultat : pour quelles valeurs de x l'événement est-il bénéficiaire (strictement) ?

Exercice 48

On dispose de 40 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire. On note x la largeur de l'enclos (en mètres).

- Exprimer la longueur de l'enclos en fonction de x , puis l'aire $A(x)$ de l'enclos en fonction de x .
- Montrer que $A(x)$ s'écrit sous la forme d'un polynôme du second degré, et déterminer les coordonnées du sommet de la parabole associée.
- En déduire les dimensions de l'enclos qui maximisent l'aire, ainsi que cette aire maximale.

Exercice 49

On considère la fonction $f(x) = -3x^2 + 6x - 3$.

- Sans résoudre l'équation $f(x) = 0$, écrire $f(x)$ sous forme canonique.
- En déduire, sans étude de signe classique, que $f(x) \leq 0$ pour tout réel x .
- Préciser en quel(s) point(s) l'égalité $f(x) = 0$ est atteinte, et justifier qu'il n'y en a qu'un seul.

Exercice 50

Un élève affirme : « L'inéquation $x^2 + 4 < 0$ n'a pas de solution, car un carré est toujours positif ou nul, donc $x^2 + 4 \geq 4 > 0$ pour tout x . »

Un autre élève lui répond : « Tu as tort, il existe forcément des solutions, car une équation du second degré a toujours deux racines. »

- Calculer le discriminant de l'équation $x^2 + 4 = 0$.
- Interpréter le signe de ce discriminant : l'équation $x^2 + 4 = 0$ admet-elle des solutions réelles ?
- Qui, du premier ou du second élève, a raison ? Justifier rigoureusement, en identifiant l'erreur commise par l'autre élève.

Coup de pouce 1. Utilise $\alpha = -\frac{b}{2a}$ puis calcule $\beta = f(\alpha)$ en remplaçant x par α dans $f(x)$.

Coup de pouce 1. Pour développer, utilise les identités remarquables ou la double distributivité ; pour la forme canonique de h , calcule d'abord $\alpha = -\frac{b}{2a}$ puis $\beta = h(\alpha)$.

Coup de pouce 1. Un trinôme du second degré contient un terme en x^2 avec un coefficient non nul. Pour f , développe d'abord le produit avant d'identifier a , b , c .

Coup de pouce 1. Le signe de a donne le sens d'ouverture (positif : vers le haut, négatif : vers le bas) ; l'axe de symétrie a pour équation $x = \alpha$ où α est l'abscisse du sommet.

Coup de pouce 1. Dans la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$, le sommet se lit directement : $S(\alpha; \beta)$. Développe ensuite $(x - 1)^2$ avant de multiplier par 2 et de soustraire 8.

Coup de pouce 1. Utilise $\alpha = -\frac{b}{2a}$ pour le sommet ; pour le signe de $g(4)$, compare 4 à α et utilise la symétrie de la parabole par rapport à la droite $x = \alpha$.

Coup de pouce 1. Identifie a , b , c pour chaque équation, calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis applique les formules $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ si $\Delta \geq 0$.

Coup de pouce 1. Rappelle-toi : $\Delta > 0$ donne deux solutions, $\Delta = 0$ donne une solution double, $\Delta < 0$ ne donne aucune solution réelle.

Coup de pouce 1. Développe d'abord chaque membre, puis regroupe tous les termes du même côté pour obtenir la forme $ax^2 + bx + c = 0$ avant de calculer Δ .

Coup de pouce 1. Repère d'abord si une identité remarquable ($a^2 - b^2$) ou un facteur commun apparaît; sinon, calcule le discriminant pour factoriser à l'aide des racines.

Coup de pouce 1. f est déjà factorisé : ses racines sont les valeurs qui annulent chaque facteur. Le coefficient dominant est $a = 1 > 0$, donc f est positif à l'extérieur des racines.

Coup de pouce 1. Calcule Δ avec $a = -2$, $b = 2$, $c = 12$, trouve les racines, puis écris $g(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Coup de pouce 1. Calcule Δ pour chaque trinôme, détermine ses racines s'il y en a, puis utilise le signe de a pour dresser le tableau de signes avant de conclure.

Coup de pouce 1. Pour **b**), calcule Δ : s'il est négatif, le trinôme garde un signe constant (celui de a) sur $\mathbb{R}$, sans qu'il soit nécessaire de chercher des racines.

Coup de pouce 1. Ici $a = -3 < 0$: le trinôme est positif *entre* les racines et négatif à l'extérieur — attention à ne pas inverser le sens par rapport au cas $a > 0$.

Coup de pouce 1. Le périmètre $2x + 2\ell = 20$ donne $\ell = 10 - x$; l'aire est $A(x) = x \times \ell$. Utilise ensuite $\alpha = -\frac{b}{2a}$ pour trouver le sommet.

Coup de pouce 1. À partir de $x = \frac{50 - p}{2}$, isole p ; puis remplace p dans $R(x) = p \times x$ pour obtenir $R(x)$ en fonction de x seul.

Coup de pouce 1. La hauteur initiale est $h(0)$; pour l'instant où le ballon touche le sol, résous $h(t) = 0$ et ne garde que la solution positive (le temps ne peut pas être négatif).

Coup de pouce 1. Utilise $\alpha = -\frac{b}{2a}$ puis calcule $\beta = f(\alpha)$ en remplaçant x par α dans $f(x)$.

Coup de pouce 1. Calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ avec $a = -2$, $b = 8$, $c = -6$, puis utilise $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

TD contextualise — Trajectoire d'un ballon de basket

Mise en situation

Un joueur de basket tire un ballon depuis le sol. On modélise la trajectoire du ballon dans un plan vertical par la courbe d'équation :

$$h(x) = -0,05x^2 + x + 2,$$

où x est la distance horizontale parcourue (en mètres) et $h(x)$ la hauteur du ballon (en mètres). On suppose que le sol correspond à $h = 0$.

Partie A — Lecture et premiers calculs

Exercice 51

1. Quel est le coefficient a de $h(x)$? La parabole est-elle en U ou en $\cap$? Que cela signifie-t-il physiquement?
2. Calculer $h(0)$. Quelle est la hauteur initiale du ballon?
3. Calculer $h(10)$ et $h(15)$. Le ballon monte-t-il encore en $x = 10$?
4. À quelle distance horizontale le ballon est-il à 3 m de hauteur? Résoudre $h(x) = 3$.

Corrigé

Question 1. $a = -0,05 < 0$. La parabole est en $\cap$: le ballon suit une trajectoire en arc de cercle, il monte puis redescend. Physiquement cohérent avec un lancer parabolique.

Question 2. $h(0) = -0,05 \times 0 + 0 + 2 = 2$ m. Le ballon est lancé depuis une hauteur de 2 m (par exemple, au niveau de la poignée du joueur).

Question 3.

$$h(10) = -0,05 \times 100 + 10 + 2 = -5 + 10 + 2 = 7 \text{ m.}$$

$$h(15) = -0,05 \times 225 + 15 + 2 = -11,25 + 17 = 5,75 \text{ m.}$$

Le ballon est encore à 5,75 m en $x = 15$ (supérieur à 2 m), donc il n'a pas encore atteint son maximum.

Question 4. $h(x) = 3 \Leftrightarrow -0,05x^2 + x + 2 = 3 \Leftrightarrow -0,05x^2 + x - 1 = 0$.

On multiplie par -20 : $x^2 - 20x + 20 = 0$. $\Delta = 400 - 80 = 320$. $\sqrt{320} = 8\sqrt{5} \approx 17,9$.

$$x_1 = \frac{20 - 17,9}{2} \approx 1,05 \text{ m,} \quad x_2 = \frac{20 + 17,9}{2} \approx 18,95 \text{ m.}$$

Le ballon est à 3 m de hauteur pour $x \approx 1,05$ m (à la montée) et $x \approx 18,95$ m (à la descente).

Partie B — Hauteur maximale et portée

Exercice 52

1. Calculer l'abscisse α du sommet de la parabole. À quelle distance horizontale le ballon est-il au point le plus haut ?
2. Calculer la hauteur maximale $h(\alpha)$.
3. Calculer la portée du tir : trouver les valeurs de $x > 0$ pour lesquelles $h(x) = 0$ (le ballon touche le sol). On arrondira à 10^{-1} m.
4. La hauteur du panier de basket est 3,05 m. Le ballon peut-il entrer dans le panier ? Justifier sans calcul supplémentaire, en utilisant les résultats précédents.

Corrigé

Question 1. $a = -0,05$, $b = 1$.

$$\alpha = \frac{-1}{2 \times (-0,05)} = \frac{-1}{-0,1} = 10 \text{ m.}$$

Le ballon est au point le plus haut après avoir parcouru 10 m horizontalement.

Question 2.

$$h_{\max} = h(10) = -0,05 \times 100 + 10 + 2 = 7 \text{ m.}$$

La hauteur maximale est 7 m.

Question 3. $h(x) = 0$:

$$-0,05x^2 + x + 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 20x - 40 = 0 \quad (\text{multiplication par } -20).$$

$$\Delta = 400 + 160 = 560 = 4 \times 140.$$

$$x = \frac{20 \pm \sqrt{560}}{2} = 10 \pm \sqrt{140}.$$

$$\sqrt{140} \approx 11,8.$$

- $x_1 = 10 - 11,8 \approx -1,8$ m (avant le lancer : à ignorer).
- $x_2 = 10 + 11,8 \approx 21,8$ m.

La portée du tir est d'environ 21,8 m.

Question 4. La hauteur du panier est 3,05 m. D'après la question 4 de la Partie A, le ballon est à 3 m de hauteur pour $x \approx 1,05$ m et $x \approx 18,95$ m. Comme $3,05 < h_{\max} = 7$ m, il existe bien des valeurs de x pour lesquelles $h(x) = 3,05$ m. En particulier, si le panier se situe à la bonne distance horizontale, le ballon peut théoriquement y entrer.

Partie C — Comparaison de trajectoires et question orale

Exercice 53

Un second joueur tire avec la trajectoire $k(x) = -0,08x^2 + x + 2$.

1. Calculer le sommet de k et la hauteur maximale.
2. Comparer les deux trajectoires : laquelle monte le plus haut ? Laquelle a la plus grande portée ?
3. Résoudre $h(x) = k(x)$ pour trouver l'abscisse où les deux trajectoires se croisent (autre que $x = 0$).
4. **Question orale** : sans calcul, comment le coefficient a influence-t-il la forme de la parabole et la portée du tir ? Expliquer en termes physiques.

Corrigé

Question 1. $k(x) = -0,08x^2 + x + 2$, $a = -0,08$, $b = 1$.

$$\alpha_k = \frac{-1}{2 \times (-0,08)} = \frac{1}{0,16} = 6,25 \text{ m.}$$

$$k_{\max} = k(6,25) = -0,08 \times 39,0625 + 6,25 + 2 = -3,125 + 8,25 = 5,125 \text{ m.}$$

Question 2.

- Hauteur maximale : h atteint 7 m contre 5,125 m pour k . Le premier joueur tire plus haut.
- Portée : pour h , portée $\approx 21,8$ m. Pour k : $k(x) = 0 \Rightarrow 0,08x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow \Delta = 1 + 0,64 = 1,64$, portée $\approx (1 + \sqrt{1,64})/0,16 \approx 14,3$ m. La trajectoire h a une plus grande portée.

Question 3. $h(x) = k(x)$:

$$-0,05x^2 + x + 2 = -0,08x^2 + x + 2 \Leftrightarrow (-0,05 + 0,08)x^2 = 0 \Leftrightarrow 0,03x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Les deux trajectoires ne se croisent qu'en $x = 0$: elles partent du même point mais s'écartent immédiatement.

Question 4 (orale). Plus $|a|$ est grand (en valeur absolue), plus la parabole est « étroite » : le ballon monte moins haut, sa portée est plus courte. Physiquement, cela correspond à un tir plus « vertical » (comme un panier en cloche) plutôt qu'un tir rasant (longue portée). Le coefficient a pilote la « courbure » de la trajectoire, c'est-à-dire la décélération verticale due à la gravité, qui est ici modélisée de manière simplifiée par le terme ax^2 .

TD fil rouge — La boîte en carton

Mise en situation

Un artisan fabrique des boîtes en carton pour les cadeaux. Il part d'une feuille rectangulaire de 30 cm sur 20 cm, découpe un carré de côté x (en cm) aux quatre coins, puis replie les bords pour former une boîte ouverte. Quelle valeur de x maximise le volume de la boîte ?

Ce problème d'optimisation réunit toutes les capacités du chapitre.

Partie A — Mise en équation

Exercice 54

1. Exprimer en fonction de x la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte.

- Justifier que x doit vérifier $0 < x < 10$ (domaine de validité).
- Montrer que le volume de la boîte est :

$$V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x).$$

- Développer $V(x)$ et identifier les coefficients du polynôme obtenu.
- Calculer $V(0)$, $V(5)$ et $V(10)$. Commenter.

Corrigé

Question 1. Après découpe des carrés de cote x et pliage :

- ▶ Hauteur : x cm.
- ▶ Longueur : $30 - 2x$ cm.
- ▶ Largeur : $20 - 2x$ cm.

Question 2. Pour que les dimensions soient strictement positives : $x > 0$, $30 - 2x > 0 \Rightarrow x < 15$, $20 - 2x > 0 \Rightarrow x < 10$. La contrainte la plus restrictive est $x < 10$, d'où $x \in]0; 10[$.

Question 3. Volume = longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur : $V(x) = x \times (30 - 2x) \times (20 - 2x)$.

Question 4.

$$\begin{aligned} V(x) &= x(30 - 2x)(20 - 2x) \\ &= x[30 \times 20 - 30 \times 2x - 2x \times 20 + 4x^2] \\ &= x[600 - 60x - 40x + 4x^2] \\ &= x(4x^2 - 100x + 600) \\ &= 4x^3 - 100x^2 + 600x. \end{aligned}$$

C'est un polynôme de degré 3 (pas du second degré directement).

Question 5.

$$V(0) = 0 \text{ cm}^3 \quad (\text{pas de hauteur}),$$

$$V(5) = 5 \times 20 \times 10 = 1\,000 \text{ cm}^3,$$

$$V(10) = 10 \times 10 \times 0 = 0 \text{ cm}^3 \quad (\text{pas de largeur}).$$

Le volume est nul aux extrémités du domaine et positif à l'intérieur.

Partie B — Étude sur un sous-domaine (approche second degré)

Exercice 55 ♦♦

On note $W(x) = \frac{V(x)}{x} = (30 - 2x)(20 - 2x)$ pour $x \in]0; 10[$.

- Montrer que $W(x) = 4x^2 - 100x + 600$.
- Calculer l'abscisse α et l'ordonnée β du sommet de la parabole représentant W .
- La valeur α appartient-elle au domaine $]0; 10[$? Que représente $W(\alpha)$ en termes de volume ?
- Dresser le tableau de variations de W sur $]0; 10[$.
- En déduire les valeurs de x pour lesquelles $W(x)$ est croissante ou décroissante. Interpréter géométriquement.

Corrigé

Question 1.

$$W(x) = (30 - 2x)(20 - 2x) = 600 - 60x - 40x + 4x^2 = 4x^2 - 100x + 600.$$

Question 2. $a = 4, b = -100$.

$$\alpha = \frac{-(-100)}{2 \times 4} = \frac{100}{8} = \frac{25}{2} = 12,5.$$

$$\beta = W(12,5) = 4 \times 156,25 - 100 \times 12,5 + 600 = 625 - 1250 + 600 = -25.$$

Question 3. $\alpha = 12,5$ *otin* $]0; 10[$: le sommet de W est hors du domaine. Sur $]0; 10[$, on est toujours à gauche du sommet (puisque $\alpha = 12,5 > 10$). Comme $a = 4 > 0$, W est **decroissante** sur tout $]0; 10[$.

$W(\alpha) = -25 < 0$ n'a pas de sens physique (surface negative) : le sommet est hors du domaine de validité.

Question 4. Tableau de variations de W sur $]0; 10[$:

x	0	10
$W(x)$	600	0

Question 5. W est strictement décroissante sur $]0; 10[$: plus on découpe un grand carré (grande hauteur x), plus la base de la boîte est petite. Le volume $V(x) = x \cdot W(x)$ résulte d'un compromis entre hauteur et surface de la base.

Partie C — Optimisation numérique et conclusion

Exercice 56

- Calculer $V(1), V(2), V(3), V(4), V(5), V(6), V(7)$. (On utilisera la formule $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$.)
- D'après ce tableau, entre quelles valeurs entières consécutives le maximum semble-t-il se situer ?
- Affiner : calculer $V(3,5)$ et $V(4)$. Lequel est le plus grand ?
- Bilan** : résumer les trois formes utilisées dans ce TD et les outils du chapitre mobilisés.
- Question ouverte (oral)** : pourquoi le problème d'optimisation du volume ne se réduit-il pas directement à un polynôme du second degré ?

Corrigé

Question 1. Tableau de valeurs :

x	1	2	3	4	5	6	7
$V(x)$	504	832	1 008	1 056	1 000	864	672

Question 2. Le maximum semble se situer entre $x = 3$ et $x = 5$, avec le plus grand volume observé en $x = 4$ ($V(4) = 1 056$).

Question 3. $V(3,5) = 3,5 \times 23 \times 13 = 3,5 \times 299 = 1 046,5 \text{ cm}^3$. $V(4) = 1 056 > 1 046,5 = V(3,5)$: pour $x = 4$, le volume est plus grand.

Question 4. Bilan :

- **Forme développée** : $V(x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x$ (polynôme de degré 3).
- **Forme factorisée** : $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ — permet de lire le domaine.
- **Polynôme du second degré** : $W(x) = (30 - 2x)(20 - 2x)$ — étude de la base.
- Outils mobilisés : formes d'un polynôme, sommet, tableau de variations, domaine de validité, étude numérique.

Question 5. Le volume $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ est un produit de trois facteurs linéaires, donc un polynôme de **degré 3**. Pour l'optimiser directement, il faudrait utiliser la dérivation (programme de Terminale). Dans ce chapitre, on se contente d'une approche numérique ou d'une étude de la fonction auxiliaire $W(x) = V(x)/x$ (polynôme du second degré).

FONCTIONS POLYNOMES DU SECOND DEGRE — QCM D'AUTO-EVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Parmi les expressions suivantes, laquelle est un polynome du second degre ?
 - A. $f(x) = 3x + 7$
 - B. $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$
 - C. $f(x) = x^3 - 2x + 4$
 - D. $f(x) = \frac{1}{x^2} + 3$
2. [Q2] Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$. Quelle est la forme canonique de f ?
 - A. $f(x) = 2(x - 2)^2 - 2$
 - B. $f(x) = 2(x - 4)^2 - 10$
 - C. $f(x) = 2(x - 2)^2 + 2$
 - D. $f(x) = (x - 2)^2 - 2$
3. [Q3] On developpe $3(x - 1)^2 + 5$. Quel resultat obtient-on ?
 - A. $3x^2 - 6x + 8$
 - B. $3x^2 - 6x + 3$
 - C. $3x^2 - 3x + 8$
 - D. $3x^2 + 2$

Capacité C2

4. [Q4] Soit $f(x) = -x^2 + 4x - 3$. Quelle est l'abscisse du sommet de la parabole representant f ?
 - A. $x = -2$
 - B. $x = 2$
 - C. $x = -4$
 - D. $x = 4$
5. [Q5] Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Sur quel intervalle f est-elle decroissante ?
 - A. $[3; +\infty[$
 - B. $] -\infty; 3]$
 - C. $] -\infty; 5]$
 - D. $[5; +\infty[$
6. [Q6] Parmi les assertions suivantes concernant $f(x) = 2x^2 - 4x + 7$, laquelle est vraie ?
 - A. Le minimum de f vaut 7.
 - B. La parabole est tournee vers le bas (coefficient directeur negatif).
 - C. Le minimum de f vaut 5.
 - D. La fonction f n'admet pas de minimum.

Capacité C3

7. [Q7] On considere $f(x) = x^2 - 5x + 6$. Quelle est la valeur du discriminant Δ ?
 - A. $\Delta = 1$
 - B. $\Delta = 49$
 - C. $\Delta = -1$
 - D. $\Delta = 25$
8. [Q8] L'equation $2x^2 - 4x + 2 = 0$ admet :
 - A. Deux racines reelles distinctes.
 - B. Une racine double, egale a 1.
 - C. Aucune racine reelle.
 - D. Une racine double, egale a 2.
9. [Q9] Resoudre $x^2 - 3x - 4 = 0$. Les solutions sont :
 - A. $x_1 = -1$ et $x_2 = 4$

- B. $x_1 = 1$ et $x_2 = -4$
- C. $x_1 = -1$ et $x_2 = -4$
- D. $x_1 = 1$ et $x_2 = 4$

Capacité C4

10. [Q10] Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$. Les racines de f sont $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$. Quelle est la forme factorisée de $f(x)$?
- A. $f(x) = (x - 1)(x - 3)$
 - B. $f(x) = 2(x - 1)(x - 3)$
 - C. $f(x) = 2(x + 1)(x + 3)$
 - D. $f(x) = (2x - 1)(2x - 3)$
11. [Q11] On sait que $f(x) = (x - 2)(x - 5)$. Sur quel intervalle $f(x)$ est-il négatif ou nul ?
- A. $] -\infty; 2] \cup [5; +\infty[$
 - B. $[2; 5]$
 - C. $] -\infty; 2]$
 - D. $[5; +\infty[$
12. [Q12] Le trinôme $f(x) = x^2 + 2x + 5$ de discriminant $\Delta = -16 < 0$ admet quel signe ?
- A. Il est positif pour $x > 0$ et négatif pour $x < 0$.
 - B. Il est négatif pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 - C. Il est positif pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 - D. Il change de signe en $x = -1$.

Capacité C5

13. [Q13] Résoudre $x^2 - x - 6 \leq 0$ (les racines de $x^2 - x - 6$ sont -2 et 3).
- A. $x \in [-2; 3]$
 - B. $x \in] -\infty; -2] \cup [3; +\infty[$
 - C. $x \in [-2; 0]$
 - D. $x \in [0; 3]$
14. [Q14] L'inéquation $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$ a pour ensemble de solutions :
- A. $] -\infty; 1] \cup [3; +\infty[$
 - B. $[1; 3]$
 - C. $] -\infty; -1] \cup [3; +\infty[$
 - D. $[-1; 3]$
15. [Q15] Pour quelle valeur de k l'équation $x^2 - 2x + k = 0$ admet-elle exactement une solution réelle ?
- A. $k = 0$
 - B. $k = 2$
 - C. $k = 1$
 - D. $k = -1$

Capacité C6

16. [Q16] On découpe des carrés de cote x aux coins d'une feuille 30×20 pour former une boîte. Le volume est $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Quelle est la valeur de $V(4)$?
- A. $V(4) = 1664$
 - B. $V(4) = 2400$
 - C. $V(4) = 264$
 - D. $V(4) = 1056$
17. [Q17] On cherche à maximiser $f(x) = -2x^2 + 8x + 3$ sur $\mathbb{R}$. Quelle est la valeur du maximum ?
- A. $f_{\max} = 3$
 - B. $f_{\max} = 11$
 - C. $f_{\max} = 8$
 - D. $f_{\max} = 2$
18. [Q18] Une balle est lancée verticalement. Sa hauteur est $h(t) = -5t^2 + 20t$ (en mètres, t en secondes). À quel instant atteint-elle sa hauteur maximale ?

◆ Auto-évaluation

- A. $t = 4 \text{ s}$
- B. $t = 1 \text{ s}$
- C. $t = 2 \text{ s}$
- D. $t = 20 \text{ s}$

Clé de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	A
Q3	C1	A
Q4	C2	B
Q5	C2	B
Q6	C2	C
Q7	C3	A
Q8	C3	B
Q9	C3	A
Q10	C4	B
Q11	C4	B
Q12	C4	C
Q13	C5	A
Q14	C5	B
Q15	C5	C
Q16	C6	D
Q17	C6	B
Q18	C6	C

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- A — L'élève a confondu polynôme du premier degré et du second degré. $3x + 7$ est de degré 1 car le coefficient de x^2 est nul ($a = 0$). *Renvoi : C1, définition.*
- C — L'élève a retenu $x^3 - 2x + 4$ comme polynôme du second degré alors que le terme dominant est x^3 : c'est un polynôme du troisième degré. *Renvoi : C1, définition.*
- D — L'élève a confondu $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ (puissance négative) avec x^2 (second degré). Un polynôme n'admet que des exposants entiers naturels, donc positifs ou nuls. *Renvoi : C1, définition.*

► Q2

- B — L'élève a calculé $\alpha = -b/(2a) = 8/2 = 4$ au lieu de $\alpha = 8/4 = 2$ (oubli du facteur $2a$ au dénominateur, pas seulement 2). *Renvoi : C1, forme canonique.*
- C — L'élève a trouvé $\alpha = 2$ correctement mais a calculé $\beta = f(2) = 2(4) - 8(2) + 6 = 8 - 16 + 6 = -2$ et a écrit $+2$ au lieu de -2 . Erreur de signe sur β . *Renvoi : C1, forme canonique.*
- D — L'élève a oublié le facteur $a = 2$ devant la forme canonique : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $a = 2$. *Renvoi : C1, forme canonique.*

► Q3

- B — L'élève a développé $3(x - 1)^2 = 3x^2 - 6x + 3$ mais a oublié d'ajouter le $+5$: le terme constant est $3 + 5 = 8$, pas 3. *Renvoi : R1, identités remarquables.*
- C — L'élève a calculé $3(x - 1)^2 = 3(x^2 - x + 1)$ au lieu de $3(x^2 - 2x + 1)$: erreur sur le terme en x de l'identité $(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$ (oubli du coefficient 2). *Renvoi : R1, identités remarquables.*
- D — L'élève a confondu $(x - 1)^2$ avec $x^2 - 1$ (différence de carrés au lieu du carré d'un binôme) : $3(x^2 - 1) + 5 = 3x^2 + 2$. Double erreur de formule. *Renvoi : R1, identités remarquables.*

► Q4

- A — L'élève a appliqué $\alpha = -b/(2a)$ mais a oublié de tenir compte du signe de $a = -1$: $\alpha = -4/(2 \times (-1)) = -4/(-2) = 2$, et non -2 . Erreur de signe sur a . *Renvoi : C2, sommet.*
- C — L'élève a calculé $\alpha = b/(2a) = 4/(2 \times (-1)) = -2$, confondant la formule $\alpha = -b/(2a)$ avec $b/(2a)$ (oubli du signe moins devant b). *Renvoi : C2, sommet.*
- D — L'élève a utilisé directement $b = 4$ comme abscisse du sommet, sans appliquer la formule $\alpha = -b/(2a)$. *Renvoi : C2, sommet.*

► Q5

- **A** — L'élève a confondu l'intervalle de décroissance avec l'intervalle de croissance. Comme $a = 1 > 0$, la parabole est en forme de U : f est décroissante sur $] -\infty ; \alpha]$ et croissante sur $[\alpha ; +\infty[$. *Renvoi : C2, tableau de variations.*
- **C** — L'élève a confondu l'ordonnée $f(\alpha) = -4$ ou la valeur $c = 5$ avec l'abscisse du sommet $\alpha = 3$. *Renvoi : C2, sommet.*
- **D** — L'élève a utilisé $c = 5$ comme abscisse de changement de monotonie au lieu de $\alpha = -b/(2a) = 6/2 = 3$. *Renvoi : C2, sommet.*

► **Q6**

- **A** — L'élève a confondu le minimum $f(\alpha)$ avec le terme constant $c = 7$. Le minimum est $f(1) = 2 - 4 + 7 = 5$, pas 7. *Renvoi : C2, sommet.*
- **B** — L'élève a dit que $a = 2 < 0$ alors que $a = 2 > 0$. La parabole est tournée vers le haut (U) et f admet un minimum. *Renvoi : C2, orientation de la parabole.*
- **D** — L'élève a conclu que f n'admet pas de minimum, peut-être en confondant avec le cas $a < 0$ (maximum) ou en ne reconnaissant pas que $a > 0$ implique un minimum. *Renvoi : C2, tableau de variations.*

► **Q7**

- **B** — L'élève a calculé $\Delta = b^2 + 4ac = 25 + 24 = 49$ au lieu de $\Delta = b^2 - 4ac = 25 - 24 = 1$: erreur de signe dans la formule (addition au lieu de soustraction). *Renvoi : C3, discriminant.*
- **C** — L'élève a inversé les deux termes de la formule et calculé $-b^2 + 4ac = -25 + 24 = -1$ au lieu de $b^2 - 4ac = 1$. *Renvoi : C3, discriminant.*
- **D** — L'élève a calculé $\Delta = b^2 = (-5)^2 = 25$, oubliant le terme $-4ac = -4 \times 1 \times 6 = -24$ dans la formule. *Renvoi : C3, discriminant.*

► **Q8**

- **A** — L'élève a conclu $\Delta > 0$ sans calculer : $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 2 = 16 - 16 = 0$. Un discriminant nul donne une racine double, pas deux racines distinctes. *Renvoi : C3, cas du discriminant.*
- **C** — L'élève a conclu $\Delta < 0$ par erreur. Le calcul donne $\Delta = 16 - 16 = 0 \geq 0$, donc il existe au moins une solution réelle. *Renvoi : C3, cas du discriminant.*
- **D** — L'élève a calculé la racine double $x_0 = -b/(2a) = 4/4 = 1$, mais a écrit 2 au lieu de 1. Erreur arithmétique dans le calcul de x_0 . *Renvoi : C3, racine double.*

► **Q9**

- **B** — L'élève a appliqué les formules avec un signe erroné : $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$ avec $b = 3$ mais a oublié que $b = -3$. Les formules donnent $x = (3 \pm 5)/2$, soit $x_1 = -1$ et $x_2 = 4$. *Renvoi : C3, formule des racines.*
- **C** — L'élève a trouvé les bonnes valeurs en module mais a attribué les mauvais signes aux deux racines. $\Delta = 9 + 16 = 25$, $x_1 = (3 - 5)/2 = -1$ et $x_2 = (3 + 5)/2 = 4$. *Renvoi : C3, formule des racines.*
- **D** — L'élève a peut-être factorisé par inspection en cherchant deux entiers de somme -3 et produit -4 : il faut $(-1) \times 4 = -4$ et $(-1) + 4 = 3 \neq -3$. Confusion des signes. *Renvoi : C3, formule des racines.*

► **Q10**

- **A** — L'élève a oublié le facteur $a = 2$ dans la forme factorisée $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$. La formule impose de conserver le coefficient dominant. *Renvoi : C4, factorisation.*
- **C** — L'élève a utilisé $+x_1$ et $+x_2$ au lieu de $-x_1$ et $-x_2$: la forme factorisée est $a(x - x_1)(x - x_2)$, pas $a(x + x_1)(x + x_2)$. *Renvoi : C4, factorisation.*
- **D** — L'élève a reparté le coefficient $a = 2$ sur chacun des deux facteurs : $(2x - x_1)(2x - x_2)$ n'est pas la forme correcte, car $2 \times 2 = 4 \neq a = 2$. *Renvoi : C4, factorisation.*

► **Q11**

- **A** — L'élève a confondu l'intervalle où f est négatif avec l'intervalle où f est positif. Le produit $(x - 2)(x - 5)$ est négatif entre les deux racines ($a > 0$: parabole en U). *Renvoi : C4, tableau de signes.*
- **C** — L'élève n'a pris en compte que l'une des deux racines : $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 5$, pas seulement $x \leq 2$. *Renvoi : C4, tableau de signes.*
- **D** — L'élève a identifié le mauvais intervalle : $f(x) \geq 0$ pour $x \geq 5$, mais on cherche $f(x) \leq 0$. *Renvoi : C4, tableau de signes.*

► Q12

- A — L'élève a appliqué le signe de $c = 5 > 0$ uniquement sur $]0; +\infty[$. Quand $\Delta < 0$ et $a > 0$, le trinôme est positif sur $\mathbb{R}$ tout entier. *Renvoi : C4, signe quand Delta < 0.*
- B — L'élève a confondu $\Delta < 0$ avec «le trinôme est négatif». La règle est : si $\Delta < 0$ et $a > 0$, le trinôme est strictement positif partout. *Renvoi : C4, signe quand Delta < 0.*
- D — L'élève a calculé le sommet $\alpha = -b/(2a) = -1$ et a cru que c'était une racine (changement de signe). Quand $\Delta < 0$, il n'y a pas de racine réelle et pas de changement de signe. *Renvoi : C4, signe quand Delta < 0.*

► Q13

- B — L'élève a écrit l'ensemble de solutions de l'inéquation ≥ 0 au lieu de ≤ 0 . Le trinôme $x^2 - x - 6$ est négatif entre ses racines ($a = 1 > 0$, parabole en U). *Renvoi : C5, resolution inequation.*
- C — L'élève n'a pris qu'une moitié de l'intervalle solution, en arrondissant à $[x_1; 0]$ au lieu de $[x_1; x_2]$. *Renvoi : C5, resolution inequation.*
- D — L'élève a pris $[0; x_2]$ au lieu de $[x_1; x_2] = [-2; 3]$. Il a omis la racine $x_1 = -2$. *Renvoi : C5, resolution inequation.*

► Q14

- A — L'élève a confondu les intervalles de signe positif et négatif pour $a < 0$. Quand $a = -1 < 0$, la parabole est en $\cap$: le trinôme est positif entre ses racines. *Renvoi : C5, cas a < 0.*
- C — L'élève a utilisé $-x_1 = -1$ au lieu de $x_1 = 1$ (oubli du signe des racines). Les racines de $-x^2 + 4x - 3 = 0$ sont $x = 1$ et $x = 3$. *Renvoi : C5, calcul des racines.*
- D — L'élève a utilisé $-x_1 = -1$ au lieu de $x_1 = 1$ pour la borne inférieure. Les racines sont 1 et 3, pas -1 et 3. *Renvoi : C5, calcul des racines.*

► Q15

- A — L'élève a posé $k = 0$ en pensant que le terme constant nul donne une racine double. Le discriminant $\Delta = 4 - 4k = 0 \Leftrightarrow k = 1$, pas $k = 0$. *Renvoi : C5, discriminant nul.*
- B — L'élève a remplacé à tort le terme $4ac$ du discriminant par $2ac$ et a écrit $\Delta = 4 - 2k$; résoudre $4 - 2k = 0$ conduit exactement à $k = 2$. *Renvoi : C5, discriminant nul.*
- D — L'élève a posé $\Delta = 4 - 4k = 0$ et a résolu $k = 4/4 = 1$ mais a donné -1 par erreur de signe. *Renvoi : C5, discriminant nul.*

► Q16

- A — L'élève a remplacé $2x$ par x dans les deux dimensions : $4 \times (30 - 4) \times (20 - 4) = 4 \times 26 \times 16 = 1664$. Il faut calculer $2 \times 4 = 8$. *Renvoi : C6, evaluation d'une expression.*
- B — L'élève a calculé $4 \times 30 \times 20 = 2400$: il a conservé les dimensions de la feuille sans retirer les deux bandes de largeur 4. *Renvoi : C6, mise en equation.*
- C — L'élève a calculé seulement l'aire de la base : $(30 - 8)(20 - 8) = 22 \times 12 = 264$. Pour obtenir le volume, il faut encore multiplier par la hauteur $x = 4$. *Renvoi : C6, evaluation d'une expression.*

► Q17

- A — L'élève a pris $f(0) = c = 3$ comme maximum. Or $c = f(0)$ est uniquement la valeur en $x = 0$, pas le maximum global (qui se situe au sommet $\alpha = 2$). *Renvoi : C6, optimisation.*
- C — L'élève a lu $b = 8$ comme la valeur maximale. Le maximum est $f(\alpha) = f(2) = -8 + 16 + 3 = 11$. *Renvoi : C6, sommet et maximum.*
- D — L'élève a donné $\alpha = -b/(2a) = -8/(2 \times (-2)) = 2$ comme le maximum (en confondant abscisse et valeur du maximum). *Renvoi : C6, sommet et maximum.*

► Q18

- A — L'élève a trouvé l'instant où la balle retombe au sol : $h(t) = 0 \Leftrightarrow -5t(t - 4) = 0$, donc $t = 4$ s est la portée, pas l'instant du maximum. *Renvoi : C6, distinction sommet / racines.*
- B — L'élève a utilisé à tort $-b/(4a)$ au lieu de $-b/(2a)$ pour l'abscisse du sommet ; $-20/(4 \times (-5)) = 1$ conduit exactement à $t = 1$. *Renvoi : C6, abscisse du sommet.*
- D — L'élève a confondu $b = 20$ avec l'instant du maximum. L'abscisse du sommet est $\alpha = -b/(2a) = -20/(-10) = 2$ s. *Renvoi : C6, abscisse du sommet.*

Corrigé

Exercice 1

(7 points) — C1, C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer); Q2 : 2 pts (calculer, communiquer); Q3 : 2 pts (calculer); Q4 : 2 pts (calculer, communiquer)

Question 1 — Identification des coefficients.

Pour $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$: $a = 2$, $b = -8$, $c = 6$.

Question 2 — Forme canonique.

On calcule :

$$\alpha = \frac{-(-8)}{2 \times 2} = \frac{8}{4} = 2, \quad \beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 6 = 8 - 16 + 6 = -2.$$

$$f(x) = 2(x - 2)^2 - 2.$$

Question 3 — Discriminant et racines.

$$\Delta = 64 - 48 = 16 > 0. \quad \sqrt{\Delta} = 4.$$

Deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{8 - 4}{4} = 1, \quad x_2 = \frac{8 + 4}{4} = 3.$$

Question 4 — Forme factorisée.

$$f(x) = 2(x - 1)(x - 3).$$

Vérification : $2(x - 1)(x - 3) = 2(x^2 - 4x + 3) = 2x^2 - 8x + 6 = f(x)$. ✓

Exercice 2

(5 points) — C2

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, communiquer); Q2 : 1 pt (raisonner); Q3 : 1 pt (représenter); Q4 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Forme canonique de g .On développe $-(x - 2)^2 + 1$:

$$-(x - 2)^2 + 1 = -(x^2 - 4x + 4) + 1 = -x^2 + 4x - 4 + 1 = -x^2 + 4x - 3 = g(x). \quad \checkmark$$

Donc $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$ est bien la forme canonique de g .

Question 2 — Sommet et extremum.

Le sommet est $S(2; 1)$. Comme $a = -1 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : g admet un **maximum** de valeur $g(2) = 1$, atteint en $x = 2$.

Question 3 — Tableau de variations.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	1 ↘	$-\infty$

Question 4 — Axe de symétrie.

L'axe de symétrie de la parabole a pour équation $x = \alpha = 2$.

Exercice 3

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, représenter); Q2 : 1 pt (calculer); Q3 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Tableau de signes.

$$f(x) = 2(x-1)(x-3).$$

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$x-1$	—	0	+	+
$x-3$	—	—	0	+
2	+	+	+	+
$f(x)$	+	0	—	+

Question 2 — Resolution de $f(x) \leq 0$.D'après le tableau de signes, $f(x) \leq 0$ sur $[1; 3]$.

$$\mathcal{S} = [1; 3].$$

Question 3 — Resolution de $f(x) > 0$. $f(x) > 0$ sur $] -\infty; 1[\cup]3; +\infty[$.

$$\mathcal{S} =] -\infty; 1[\cup]3; +\infty[.$$

Exercice 4

(4 points) — C6

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser); Q2 : 1 pt (modéliser); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 1 pt (chercher)

Question 1 — Dimensions de la boîte.

Après découpe et pliage :

- ▶ Hauteur : x cm.
- ▶ Longueur : $30 - 2x$ cm.
- ▶ Largeur : $20 - 2x$ cm.

Question 2 — Volume et domaine.

$$V(x) = x \times (30 - 2x) \times (20 - 2x).$$

Domaine : $x > 0$, $30 - 2x > 0$ et $20 - 2x > 0$, soit $x \in]0; 10[$.Question 3 — Calcul de $V(3)$ et $V(5)$.

$$V(3) = 3 \times (30 - 6) \times (20 - 6) = 3 \times 24 \times 14 = 1\,008 \text{ cm}^3.$$

$$V(5) = 5 \times (30 - 10) \times (20 - 10) = 5 \times 20 \times 10 = 1\,000 \text{ cm}^3.$$

Question 4 — Comparaison et limites de la conclusion.

 $V(3) = 1\,008 > 1\,000 = V(5)$: pour $x = 3$, le volume est plus grand.

Cependant, on ne peut pas conclure que $x = 3$ est le maximum global : ces deux points ne suffisent pas à prouver qu'il n'existe pas une valeur $x^* \in]0; 10[$ donnant un volume encore plus grand. Une étude complète de V (dérivée ou tableau de variations) est nécessaire pour trouver le maximum absolu.

Exercice 1**(7 points)****Capacités C1, C3, C4***Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.*

On considère le polynôme du second degré :

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6.$$

1. Identifier les coefficients a , b et c . (1 pt — calculer)
2. Calculer l'abscisse α et l'ordonnée β du sommet de la parabole représentant f . Écrire la forme canonique de f . (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer le discriminant Δ de f . En déduire les racines x_1 et x_2 de f (avec $x_1 < x_2$). (2 pts — calculer)
4. Écrire la forme factorisée de $f(x)$. Vérifier en développant. (2 pts — calculer, communiquer)

Exercice 2**(5 points)****Capacités C2***Compétences évaluées : représenter, calculer, raisonner.*On considère $g(x) = -x^2 + 4x - 3$.

1. Montrer que la forme canonique de g est $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$. (2 pts — calculer, communiquer)
2. En déduire les coordonnées du sommet S de la parabole. Préciser si g admet un maximum ou un minimum, et donner sa valeur. (1 pt — raisonner)
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. (1 pt — représenter)
4. Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. (1 pt — calculer)

Exercice 3**(4 points)****Capacités C4, C5***Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.*On rappelle que les racines de $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$ sont $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$.

1. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$. (2 pts — calculer, représenter)
2. Résoudre $f(x) \leq 0$. (1 pt — calculer)
3. Résoudre $2x^2 - 8x + 6 > 0$. (1 pt — calculer)

Exercice 4**(4 points)****Capacités C6***Compétences évaluées : modéliser, chercher, calculer.*Un artisan découpe des carrés de côté x cm aux quatre coins d'une feuille de carton rectangulaire mesurant 30 cm sur 20 cm, puis plie les bords pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer, en fonction de x , la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte. (1 pt — modéliser)
2. Montrer que le volume de la boîte est $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Donner le domaine de validité de x . (1 pt — modéliser)
3. Calculer $V(3)$ et $V(5)$. (1 pt — calculer)
4. En observant les valeurs calculées, quelle valeur de x (parmi 3 et 5) donne le plus grand volume ? Justifier par le calcul pourquoi on ne peut pas conclure définitivement sans étude complète. (1 pt — chercher)

Corrigé

Exercice 1

(7 points) — C1, C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer) ; Q2 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q3 : 2 pts (calculer) ; Q4 : 2 pts (calculer, communiquer)

Question 1 — Identification des coefficients.

Pour $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$: $a = 3$, $b = -12$, $c = 9$.

Question 2 — Forme canonique.

$$\alpha = \frac{-(-12)}{2 \times 3} = \frac{12}{6} = 2, \quad \beta = f(2) = 3 \times 4 - 12 \times 2 + 9 = 12 - 24 + 9 = -3.$$

$$f(x) = 3(x - 2)^2 - 3.$$

Question 3 — Discriminant et racines.

$$\Delta = 144 - 108 = 36 > 0. \quad \sqrt{\Delta} = 6.$$

$$x_1 = \frac{12 - 6}{6} = 1, \quad x_2 = \frac{12 + 6}{6} = 3.$$

Question 4 — Forme factorisée.

$$f(x) = 3(x - 1)(x - 3).$$

Vérification : $3(x - 1)(x - 3) = 3(x^2 - 4x + 3) = 3x^2 - 12x + 9 = f(x)$. ✓

Exercice 2

(5 points) — C2

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q2 : 1 pt (raisonner) ; Q3 : 1 pt (représenter) ; Q4 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Forme canonique de g .On développe $-2(x - 2)^2 + 2$:

$$-2(x - 2)^2 + 2 = -2(x^2 - 4x + 4) + 2 = -2x^2 + 8x - 8 + 2 = -2x^2 + 8x - 6 = g(x). \quad \checkmark$$

Donc $g(x) = -2(x - 2)^2 + 2$ est bien la forme canonique de g .

Question 2 — Sommet et extremum.

Le sommet est $S(2; 2)$. Comme $a = -2 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : g admet un **maximum** de valeur $g(2) = 2$, atteint en $x = 2$.

Question 3 — Tableau de variations.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	$-\infty$

Question 4 — Axe de symétrie.

L'axe de symétrie de la parabole a pour équation $x = \alpha = 2$.

Exercice 3

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, représenter); Q2 : 1 pt (calculer); Q3 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Tableau de signes.

$$f(x) = 3(x-1)(x-3).$$

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$		
$x-1$		-	0	+	+	
$x-3$		-	-	-	0	+
3		+	+	+	+	+
$f(x)$		+	0	-	0	+

Question 2 — Resolution de $f(x) \leq 0$.D'après le tableau de signes : $\mathcal{S} = [1; 3]$.Question 3 — Resolution de $f(x) > 0$. $\mathcal{S} =]-\infty; 1[\cup]3; +\infty[$.

Exercice 4

(4 points) — C6

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser); Q2 : 1 pt (modéliser); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 1 pt (chercher)

Question 1 — Dimensions.

Après découpe et pliage : hauteur x cm, longueur $30 - 2x$ cm, largeur $20 - 2x$ cm.

Question 2 — Volume et domaine.

 $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Domaine : $x > 0$, $30 - 2x > 0$ et $20 - 2x > 0$, d'où $x \in]0; 10[$.Question 3 — Calcul de $V(4)$ et $V(6)$.

$$V(4) = 4 \times (30 - 8) \times (20 - 8) = 4 \times 22 \times 12 = 1\,056 \text{ cm}^3.$$

$$V(6) = 6 \times (30 - 12) \times (20 - 12) = 6 \times 18 \times 8 = 864 \text{ cm}^3.$$

Question 4 — Comparaison.

 $V(4) = 1\,056 > 864 = V(6)$: pour $x = 4$, le volume est plus grand.Cependant, ces deux valeurs ne permettent pas de conclure que $x = 4$ est le maximum global. Il existe peut-être un $x^* \in]0; 10[$ donnant un volume supérieur. Une étude complète de V est nécessaire.

Évaluation 1SPE-SECDEG-EV-B 55 min

Exercice 1

(7 points)

Capacités C1, C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère le polynôme du second degré :

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 9.$$

1. Identifier les coefficients
- a
- ,
- b
- et
- c
- .

(1 pt — calculer)

- Calculer l'abscisse α et l'ordonnée β du sommet de la parabole représentant f . Ecrire la forme canonique de f . (2 pts — calculer, communiquer)
- Calculer le discriminant Δ de f . En déduire les racines x_1 et x_2 de f (avec $x_1 < x_2$). (2 pts — calculer)
- Ecrire la forme factorisée de $f(x)$. Vérifier en développant. (2 pts — calculer, communiquer)

Exercice 2**(5 points)****Capacités C2**

Compétences évaluées : représenter, calculer, raisonner.

On considère $g(x) = -2x^2 + 8x - 6$.

- Montrer que la forme canonique de g est $g(x) = -2(x - 2)^2 + 2$. (2 pts — calculer, communiquer)
- En déduire les coordonnées du sommet S de la parabole. Préciser si g admet un maximum ou un minimum, et donner sa valeur. (1 pt — raisonner)
- Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. (1 pt — représenter)
- Ecrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. (1 pt — calculer)

Exercice 3**(4 points)****Capacités C4, C5**

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On rappelle que les racines de $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$ sont $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$.

- Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$. (2 pts — calculer, représenter)
- Resoudre $f(x) \leq 0$. (1 pt — calculer)
- Resoudre $3x^2 - 12x + 9 > 0$. (1 pt — calculer)

Exercice 4**(4 points)****Capacités C6**

Compétences évaluées : modéliser, chercher, calculer.

Un artisan découpe des carrés de côté x cm aux quatre coins d'une feuille de carton rectangulaire mesurant 30 cm sur 20 cm, puis replie les bords pour former une boîte ouverte.

- Exprimer, en fonction de x , la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte. (1 pt — modéliser)
- Montrer que le volume de la boîte est $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Donner le domaine de validité de x . (1 pt — modéliser)
- Calculer $V(4)$ et $V(6)$. (1 pt — calculer)
- En observant les valeurs calculées, quelle valeur de x (parmi 4 et 6) donne le plus grand volume ? Justifier par le calcul pourquoi on ne peut pas conclure définitivement sans étude complète. (1 pt — chercher)

Rappel — Calcul littéral et identités remarquables

Développer : supprimer les parenthèses en distribuant la multiplication.

Identités remarquables :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Factoriser : mettre en évidence un facteur commun ou reconnaître une identité remarquable.

Ces formules apparaissent constamment dans l'étude des polynômes du second degré (passage en forme canonique, factorisation).

Exercice 57

Développer et réduire chaque expression.

1. $A = (x + 3)^2$
2. $B = (x - 5)^2$
3. $C = (2x + 1)^2$
4. $D = (x + 4)(x - 4)$

Corrigé

Question 1.

$$A = (x + 3)^2 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9.$$

Question 2.

$$B = (x - 5)^2 = x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 - 10x + 25.$$

Question 3.

$$C = (2x + 1)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 1 + 1^2 = 4x^2 + 4x + 1.$$

Question 4.

$$D = (x + 4)(x - 4) = x^2 - 4^2 = x^2 - 16.$$

Exercice 58

Développer et réduire les expressions suivantes (double distributivité).

1. $E = (x + 2)(x + 7)$
2. $F = (3x - 1)(x + 4)$
3. $G = (x - 3)(2x + 5)$
4. $H = (x + 1)^2 - (x - 1)^2$

Corrigé

Question 1.

$$E = x^2 + 7x + 2x + 14 = x^2 + 9x + 14.$$

Question 2.

$$F = 3x \times x + 3x \times 4 + (-1) \times x + (-1) \times 4 = 3x^2 + 12x - x - 4 = 3x^2 + 11x - 4.$$

Question 3.

$$G = x \times 2x + x \times 5 + (-3) \times 2x + (-3) \times 5 = 2x^2 + 5x - 6x - 15 = 2x^2 - x - 15.$$

Question 4.

$$H = (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) = 4x.$$

Exercice 59

Factoriser les expressions suivantes.

1. $P = x^2 - 9$
2. $Q = x^2 + 8x + 16$
3. $R = x^2 - 4x + 4$
4. $S = 2x^2 + 6x$

Corrigé

Question 1.

$$P = x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3).$$

Question 2.

$$Q = x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2.$$

Question 3.

$$R = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2.$$

Question 4.

$$S = 2x^2 + 6x = 2x(x + 3).$$

Exercice 60

En développant et en réduisant, montrer que les deux expressions suivantes sont égales.

- $2(x - 3)^2 + 5 = 2x^2 - 12x + 23$
- $(x + 1)^2 - (x + 1) - 2 = x^2 + x - 2$
- Factoriser $x^2 + x - 2$ (aide : chercher deux entiers de somme 1 et de produit -2).
- Deduire les solutions de $x^2 + x - 2 = 0$.

Corrigé

Question 1.

$$2(x - 3)^2 + 5 = 2(x^2 - 6x + 9) + 5 = 2x^2 - 12x + 18 + 5 = 2x^2 - 12x + 23. \quad \checkmark$$

Question 2.

$$(x + 1)^2 - (x + 1) - 2 = x^2 + 2x + 1 - x - 1 - 2 = x^2 + x - 2. \quad \checkmark$$

Question 3. On cherche deux entiers p et q tels que $p + q = 1$ et $p \times q = -2$: on trouve $p = -1$ et $q = 2$... ou $p = 2$ et $q = -1$. Donc :

$$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2).$$

Question 4. $x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -2$.

L'ensemble des solutions est $\{-2; 1\}$.

Rappel — Equations du premier degre et produit nul

Equation du premier degre : $ax + b = 0$ (avec $a \neq 0$) a pour unique solution $x = -b/a$.

Regle du produit nul : pour tous reels A et B ,

$$A \times B = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0.$$

Cette regle est fondamentale pour resoudre les equations factorisees du second degre.

Exercice 61

Resoudre les equations du premier degre suivantes.

- $3x - 6 = 0$
- $2x + 8 = 0$
- $-x + 4 = 0$
- $5x - 15 = 0$

Corrigé

Question 1. $3x - 6 = 0 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2$.

Question 2. $2x + 8 = 0 \Leftrightarrow 2x = -8 \Leftrightarrow x = -4$.

Question 3. $-x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 4$.

Question 4. $5x - 15 = 0 \Leftrightarrow 5x = 15 \Leftrightarrow x = 3$.

Exercice 62

Resoudre les equations suivantes en appliquant la regle du produit nul.

1. $(x - 3)(x + 5) = 0$

2. $2x(x - 7) = 0$

3. $(3x - 1)(x + 2) = 0$

4. $(x - 4)^2 = 0$

Corrigé

Question 1.

$$(x - 3)(x + 5) = 0 \Leftrightarrow x - 3 = 0 \text{ ou } x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = 3 \text{ ou } x = -5.$$

Question 2.

$$2x(x - 7) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 7.$$

Question 3.

$$(3x - 1)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow 3x - 1 = 0 \text{ ou } x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \text{ ou } x = -2.$$

Question 4.

$$(x - 4)^2 = 0 \Leftrightarrow x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 4 \quad (\text{racine double}).$$

Exercice 63

Resoudre les equations en se ramenant a un produit nul.

1. $x^2 - 9 = 0$

2. $x^2 - 5x = 0$

3. $x^2 - 5x + 6 = 0$ (aide : $(x - 2)(x - 3)$)

4. $2x^2 - 8 = 0$

Corrigé

Question 1. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 3 \text{ ou } x = -3$.

Question 2. $x^2 - 5x = x(x - 5) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 5$.

Question 3. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = 3$.

Question 4. $2x^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2$.

(Ou : $2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x - 2)(x + 2) = 0$.)

Exercice 64

Pour chacune des situations, ecrire une equation, puis la resoudre.

1. Le double d'un nombre augmente de 3 est egal a 11. Trouver ce nombre.

2. La surface d'un carre de cote x est 25. Trouver x (avec $x > 0$).

3. Le produit de deux entiers consecutifs n et $n + 1$ est nul. Quelles sont les valeurs de n ?

4. On cherche $x > 0$ tel que $(x-1)(x+3) = 5$. Montrer que cela revient à $x^2 + 2x - 8 = 0$, puis résoudre.

Corrigé

Question 1. Equation : $2x + 3 = 11 \Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow x = 4$.

Question 2. $x^2 = 25 \Leftrightarrow x = 5$ (car $x > 0$).

Question 3. $n(n+1) = 0 \Leftrightarrow n = 0$ ou $n+1 = 0 \Leftrightarrow n = 0$ ou $n = -1$.

Question 4. On développe : $(x-1)(x+3) = x^2 + 2x - 3$. L'équation donne $x^2 + 2x - 3 = 5$, soit $x^2 + 2x - 8 = 0$.

On cherche p, q tels que $p + q = 2$ et $pq = -8$: $p = -2, q = 4$... non ($pq = -8$ et $p + q = 2$) : $p = 4, q = -2$ convient. Donc $(x+4)(x-2) = 0$, d'où $x = -4$ ou $x = 2$.

Comme $x > 0$, la solution est $x = 2$.

Rappel — Fonctions : image, antécédent, courbe représentative

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

- **Image** : $f(a)$ est l'image de a par f . Calculer $f(a)$ revient à substituer $x = a$ dans la formule.
- **Antécédent** : a est un antécédent de b par f si $f(a) = b$ (on résout l'équation $f(x) = b$).
- **Courbe** : le graphe de f est l'ensemble des points $(x; f(x))$. Un point $A(x_0; y_0)$ appartient à la courbe si et seulement si $y_0 = f(x_0)$.

Exercice 65

Soit $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

1. Calculer $f(0), f(1), f(2), f(-1)$.
2. Vérifier que le point $A(3; 2)$ appartient à la courbe de f .
3. Le point $B(0; 3)$ appartient-il à la courbe de f ?

Corrigé

Question 1.

$$f(0) = 0 - 0 + 2 = 2, \quad f(1) = 1 - 3 + 2 = 0, \quad f(2) = 4 - 6 + 2 = 0, \quad f(-1) = 1 + 3 + 2 = 6.$$

Question 2. $f(3) = 9 - 9 + 2 = 2$. Donc $A(3; 2)$ appartient bien à la courbe. ✓

Question 3. $f(0) = 2 \neq 3$. Donc $B(0; 3)$ n'appartient pas à la courbe.

Exercice 66

Soit $g(x) = 2x^2 - x - 3$.

1. Calculer $g(-1), g(0), g(1)$ et $g(2)$.
2. Résoudre $g(x) = 0$ (aide : trouver les racines par inspection ou discriminant).
3. Résoudre $g(x) = -3$.

Corrigé

Question 1.

$$g(-1) = 2 + 1 - 3 = 0, \quad g(0) = -3, \quad g(1) = 2 - 1 - 3 = -2, \quad g(2) = 8 - 2 - 3 = 3.$$

Question 2. $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 1 + 24 = 25 > 0$.

$$x_1 = \frac{1-5}{4} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{1+5}{4} = \frac{3}{2}.$$

Question 3. $g(x) = -3 \Leftrightarrow 2x^2 - x - 3 = -3 \Leftrightarrow 2x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(2x - 1) = 0$.

Donc $x = 0$ ou $x = \frac{1}{2}$.

Exercice 67

Soit $h(x) = x^2 - 4$.

1. Dresser un tableau de valeurs pour $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.
2. Déterminer les antécédents de 0 par h .
3. Déterminer les antécédents de 5 par h .
4. La courbe de h passe-t-elle par $C(1; -3)$?

Corrigé

Question 1.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$h(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

Question 2. $h(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2$ ou $x = 2$. Les antécédents de 0 sont -2 et 2.

Question 3. $h(x) = 5 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = -3$ ou $x = 3$. Les antécédents de 5 sont -3 et 3.

Question 4. $h(1) = 1 - 4 = -3$. Oui, $C(1; -3)$ est sur la courbe. ✓

Exercice 68

Soit $p(x) = -x^2 + 6x - 5$.

1. Calculer $p(0)$, $p(1)$, $p(3)$, $p(5)$.
2. Trouver les antécédents de 0 (on se contentera de vérifier $p(1)$ et $p(5)$).
3. Sur quel intervalle la courbe de p est-elle au-dessus de l'axe des abscisses (i.e. $p(x) > 0$)? *Indication : utiliser les valeurs calculées.*

Corrigé

Question 1.

$$p(0) = -5, \quad p(1) = -1 + 6 - 5 = 0, \quad p(3) = -9 + 18 - 5 = 4, \quad p(5) = -25 + 30 - 5 = 0.$$

Question 2. $p(1) = 0$ et $p(5) = 0$: les antécédents de 0 sont 1 et 5.

Question 3. Comme $a = -1 < 0$, la parabole est en $\cap$: $p(x) > 0$ entre les deux racines, soit pour $x \in]1; 5[$. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses sur $]1; 5[$.

Rappel — Fonctions de référence

Fonction carré : $f(x) = x^2$, définie sur $\mathbb{R}$.

- ▶ Décroissante sur $] -\infty; 0]$, croissante sur $[0; +\infty[$.
- ▶ Minimum en $x = 0$: $f(0) = 0$.
- ▶ Parabole symétrique par rapport à l'axe Oy .

Translations : la courbe de $f(x - \alpha) + \beta$ est obtenue en translatant celle de f de vecteur $(\alpha; \beta)$.

Donc $y = (x - \alpha)^2 + \beta$ est une parabole de sommet $(\alpha; \beta)$.

Exercice 69

Pour $f(x) = x^2$:

1. Compléter le tableau : $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, calculer $f(x)$.
2. Vérifier que $f(-x) = f(x)$ pour tout x (symétrie).
3. Montrer que f est décroissante sur $] -\infty; 0]$ en calculant $f(a) - f(b)$ pour $a < b \leq 0$.
4. Tracer l'allure de la courbe (parabole en U de sommet O).

Corrigé

Question 1.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2	9	4	1	0	1	4	9

Question 2. $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: la courbe est symétrique par rapport à l'axe Oy .

Question 3. Soient $a < b \leq 0$. Alors :

$$f(b) - f(a) = b^2 - a^2 = (b - a)(b + a).$$

On a $b - a > 0$ (car $b > a$) et $b + a \leq 0$ (car $a < b \leq 0$, donc $a + b < 0$). Donc $(b - a)(b + a) \leq 0$, i.e. $f(b) \leq f(a)$: f est décroissante sur $] -\infty; 0]$.

Question 4. (Trace libre — parabole en U, sommet $O(0; 0)$, passant par $(\pm 1; 1)$, $(\pm 2; 4)$.)

Exercice 70

Decrire les transformations et identifier le sommet des courbes suivantes.

1. $g(x) = x^2 + 3$
2. $h(x) = (x - 2)^2$
3. $k(x) = (x + 1)^2 - 4$
4. $m(x) = -(x - 3)^2 + 5$

Corrigé

Question 1. $g(x) = x^2 + 3$: translation verticale de +3; sommet $S(0; 3)$.

Question 2. $h(x) = (x - 2)^2$: translation horizontale de +2; sommet $S(2; 0)$.

Question 3. $k(x) = (x + 1)^2 - 4 = (x - (-1))^2 + (-4)$; sommet $S(-1; -4)$.

Question 4. $m(x) = -(x - 3)^2 + 5$: $a = -1 < 0$ (parabole en $\cap$); sommet $S(3; 5)$ (maximum).

Exercice 71

Passer de la forme développée à la forme canonique.

1. $f(x) = x^2 - 4x + 7$. Calculer $\alpha = -b/(2a)$, puis $\beta = f(\alpha)$.
2. $g(x) = x^2 + 6x + 11$. Même méthode.
3. $h(x) = 2x^2 - 12x + 20$. Factoriser d'abord par $a = 2$.

Corrigé

Question 1. $a = 1, b = -4, c = 7$. $\alpha = -(-4)/(2 \times 1) = 2$. $\beta = f(2) = 4 - 8 + 7 = 3$. Forme canonique : $f(x) = (x - 2)^2 + 3$.

Question 2. $a = 1, b = 6, c = 11. \alpha = -6/2 = -3. \beta = g(-3) = 9 - 18 + 11 = 2.$ Forme canonique : $g(x) = (x + 3)^2 + 2.$

Question 3. $h(x) = 2(x^2 - 6x + 10).$ Dans $x^2 - 6x + 10 : \alpha = 3, \beta = 9 - 18 + 20 = 11...$ Retour : $\alpha = -(-6)/(2 \times 1) = 3, f_{\text{int}}(3) = 9 - 18 + 10 = 1,$ donc $x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1.$ Ainsi : $h(x) = 2[(x - 3)^2 + 1] = 2(x - 3)^2 + 2.$

Exercice 72

Utiliser la forme canonique pour répondre aux questions suivantes.

1. Montrer que $f(x) = x^2 - 6x + 10 \geq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}.$
2. Trouver la valeur de x qui minimise $g(x) = (x - 1)^2 + 4,$ et préciser la valeur minimale.
3. Montrer que $h(x) = -3(x + 2)^2 + 1 \leq 1$ pour tout $x,$ et préciser quand l'égalité a lieu.

Corrigé

Question 1. $f(x) = x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1.$ Comme $(x - 3)^2 \geq 0,$ on a $f(x) \geq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}.$ L'égalité a lieu pour $x = 3 : f(3) = 1.$

Question 2. $g(x) = (x - 1)^2 + 4 \geq 4$ pour tout x (car $(x - 1)^2 \geq 0$). Le minimum est $g(1) = 4,$ atteint en $x = 1.$

Question 3. $h(x) = -3(x + 2)^2 + 1.$ Comme $(x + 2)^2 \geq 0,$ on a $-3(x + 2)^2 \leq 0,$ donc $h(x) \leq 1$ pour tout $x.$ L'égalité $h(x) = 1$ a lieu quand $(x + 2)^2 = 0,$ c'est-à-dire pour $x = -2.$

Rappel — Inégalités et tableau de signes

Regles de calcul sur les inégalités :

- ▶ On peut additionner/soustraire le même réel des deux membres sans changer le sens.
- ▶ On peut multiplier/diviser par un réel **strictement positif** sans changer le sens.
- ▶ On **inverse le sens** si on multiplie/divise par un réel **strictement négatif**.

Tableau de signes d'un produit : le signe du produit $A \times B$ se détermine colonne par colonne.

	$A < 0$	$A = 0$	$A > 0$
$B > 0$	-	0	+
$B = 0$	0	0	0
$B < 0$	+	0	-

Exercice 73

Résoudre les inégalités du premier degré suivantes.

1. $3x - 6 > 0$
2. $-2x + 4 \geq 0$
3. $5x + 10 \leq 0$
4. $-x + 3 > 1$

Corrigé

Question 1. $3x > 6 \Leftrightarrow x > 2.$ Solution : $x \in]2; +\infty[.$

Question 2. $-2x \geq -4 \Leftrightarrow x \leq 2$ (on divise par $-2,$ on inverse). Solution : $x \in]-\infty; 2].$

Question 3. $5x \leq -10 \Leftrightarrow x \leq -2.$ Solution : $x \in]-\infty; -2].$

Question 4. $-x > 1 - 3 = -2 \Leftrightarrow x < 2$ (on divise par $-1,$ on inverse). Solution : $x \in]-\infty; 2[.$

Exercice 74

Dresser le tableau de signes de chaque expression et déterminer l'ensemble de solutions.

1. $(x-2)(x+3) \geq 0$
2. $(x+1)(x-4) < 0$
3. $-3(x-1)(x+2) \leq 0$

Corrigé

Question 1. Racines : $x = -3$ et $x = 2$.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$	
$x-2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$(x-2)(x+3)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Solution de ≥ 0 : $x \in]-\infty; -3] \cup [2; +\infty[$.

Question 2. Racines : $x = -1$ et $x = 4$. Le produit est négatif strictement entre les racines.

Solution de < 0 : $x \in]-1; 4[$.

Question 3. Racines de $(x-1)(x+2)$: $x = -2$ et $x = 1$. Le facteur $-3 < 0$ inverse le signe.

$(x-1)(x+2) \geq 0$ sur $]-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$, donc $-3(x-1)(x+2) \leq 0$ sur le même ensemble.

Solution : $x \in]-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$.

Exercice 75 ◆

Etudier le signe des expressions suivantes à l'aide d'un tableau.

1. $A(x) = (2x-4)(x+1)$
2. $B(x) = \frac{x-3}{x+2}$ (avec $x \neq -2$)
3. $C(x) = (x^2-1)(x-2)$ (aide : factoriser x^2-1)

Corrigé

Question 1. Racines : $2x-4=0 \Rightarrow x=2$; $x+1=0 \Rightarrow x=-1$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
$2x-4$		$-$	$-$	0	$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$	$+$	
$A(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Question 2. Changement de signe en $x = 3$ (numérateur) et $x = -2$ (dénominateur, exclu).

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$x-3$	$-$	$-$	0	$+$
$x+2$	$-$	$\parallel$	$+$	$+$
$B(x)$	$+$	$\parallel$	$-$	0

Question 3. $x^2-1 = (x-1)(x+1)$, donc $C(x) = (x+1)(x-1)(x-2)$. Racines : $-1, 1, 2$.

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$C(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Exercice 76 ◆

Résoudre les inéquations suivantes.

1. $(x-1)(x+5) \leq 0$
2. $x^2 - 4 > 0$
3. $x^2 - 3x \geq 0$
4. $(x-2)^2 > 0$

Corrigé

Question 1. Racines de $(x-1)(x+5)$: $x = -5$ et $x = 1$. Le produit est négatif entre les racines.
Solution : $x \in [-5; 1]$.

Question 2. $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) > 0$: le produit est positif à l'extérieur des racines. Solution :
 $x \in]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$.

Question 3. $x^2 - 3x = x(x-3) \geq 0$: racines 0 et 3. Le produit est positif à l'extérieur. Solution :
 $x \in]-\infty; 0] \cup [3; +\infty[$.

Question 4. $(x-2)^2 > 0$ est vrai pour tout $x \neq 2$ (le carré est toujours ≥ 0 , et nul seulement en $x = 2$). Solution : $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$.

Exercice 77

Soit $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$.

1. Identifier a, b, c .
2. Calculer $\alpha = -b/(2a)$ et $\beta = f(\alpha)$.
3. Écrire la forme canonique de f .
4. Développer pour vérifier que la forme canonique est bien équivalente à la forme développée.

Corrigé

Question 1. On a $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$, donc $a = 3, b = -12, c = 9$.

Question 2.

$$\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-12)}{2 \times 3} = \frac{12}{6} = 2.$$

$$\beta = f(2) = 3 \times 4 - 12 \times 2 + 9 = 12 - 24 + 9 = -3.$$

Question 3.

$$f(x) = 3(x-2)^2 - 3.$$

Question 4. Vérification :

$$3(x-2)^2 - 3 = 3(x^2 - 4x + 4) - 3 = 3x^2 - 12x + 12 - 3 = 3x^2 - 12x + 9. \quad \checkmark$$

Exercice 78

Soit $g(x) = -2x^2 + 8x - 5$.

1. Donner la forme canonique de g .
2. Écrire sous forme développée l'expression $-2(x-2)^2 + 3$, et vérifier que c'est bien $g(x)$.
3. La parabole représentant g est-elle en U ou en $\cap$? Justifier.

Coup de pouce 1. Pour calculer α avec $a = -2$: $\alpha = -b/(2a) = -8/(2 \times (-2)) = -8/(-4) = 2$. Attention au signe de a .

Corrigé

Question 1. $a = -2, b = 8, c = -5$.

$$\alpha = \frac{-8}{2 \times (-2)} = \frac{-8}{-4} = 2. \quad \beta = g(2) = -8 + 16 - 5 = 3.$$

Forme canonique : $g(x) = -2(x - 2)^2 + 3$.

Question 2.

$$-2(x - 2)^2 + 3 = -2(x^2 - 4x + 4) + 3 = -2x^2 + 8x - 8 + 3 = -2x^2 + 8x - 5. \quad \checkmark$$

Question 3. Comme $a = -2 < 0$, la parabole est en $\cap$ (ouverte vers le bas). Le sommet $S(2; 3)$ est un maximum.

Exercice 79

Parmi les expressions suivantes, identifier celles qui sont des polynômes du second degré. Pour chacun, donner les coefficients a, b, c , puis la forme canonique.

1. $f(x) = (x + 3)(x - 1)$
2. $g(x) = x^2 - x + \frac{1}{4}$
3. $h(x) = (x + 2)^2 - (x - 1)^2$
4. $k(x) = x^3 - 4x^2$

Corrigé

Question 1. $f(x) = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 2x - 3$: polynôme du second degré, $a = 1, b = 2, c = -3$. $\alpha = -2/(2) = -1, \beta = f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$. Forme canonique : $f(x) = (x + 1)^2 - 4$.

Question 2. $g(x) = x^2 - x + \frac{1}{4}$: polynôme du second degré, $a = 1, b = -1, c = \frac{1}{4}$. $\alpha = \frac{1}{2}$, $\beta = g(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0$. Forme canonique : $g(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$.

Question 3. $h(x) = (x + 2)^2 - (x - 1)^2 = (x^2 + 4x + 4) - (x^2 - 2x + 1) = 6x + 3$. C'est un polynôme du **premier degré** ($a = 0$) : pas un second degré.

Question 4. $k(x) = x^3 - 4x^2$ est un polynôme de **degré 3** : pas un second degré.

Exercice 80

Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$.

1. Calculer les coordonnées du sommet $S(\alpha; \beta)$.
2. Ecrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole.
3. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. Préciser si f admet un minimum ou un maximum, et donner sa valeur.

Corrigé

Question 1. $a = 2, b = -8$.

$$\alpha = \frac{-(-8)}{2 \times 2} = \frac{8}{4} = 2. \quad \beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 6 = 8 - 16 + 6 = -2.$$

Sommet : $S(2; -2)$.

Question 2. L'axe de symétrie est la droite d'équation $x = \alpha = 2$.

Question 3. Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$ -2 <i>arrow</i>	$+\infty$

Question 4. Comme $a = 2 > 0$, f admet un **minimum** en $x = 2$. Ce minimum vaut $f(2) = -2$.

Exercice 81

Soit $g(x) = -x^2 + 4x - 3$.

1. Montrer que la forme canonique est $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$.
2. En déduire les coordonnées du sommet.
3. Dresser le tableau de variations de g .
4. Sur quel intervalle g est-elle positive ? (Répondre par observation du tableau et des racines $x = 1$ et $x = 3$.)

Coup de pouce 1. Pour la forme canonique avec $a = -1$: $\alpha = -4/(2 \times (-1)) = 2$ et $\beta = g(2) = -4 + 8 - 3 = 1$.

Corrigé

Question 1. $\alpha = 2$, $\beta = g(2) = -4 + 8 - 3 = 1$. On vérifie : $-(x - 2)^2 + 1 = -(x^2 - 4x + 4) + 1 = -x^2 + 4x - 3 = g(x)$. ✓

Question 2. Sommet : $S(2; 1)$.

Question 3. Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	1 ↘	$-\infty$

Question 4. Les racines de g sont $x = 1$ et $x = 3$. Comme $a < 0$, $g(x) \geq 0$ entre les racines : sur $[1; 3]$.

Exercice 82

Pour chacune des fonctions suivantes, donner le sommet, l'axe de symétrie, le tableau de variations, et préciser si la fonction admet un minimum ou un maximum.

1. $p(x) = x^2 + 4x + 1$
2. $q(x) = -3x^2 + 6x + 2$
3. $r(x) = (x - 1)^2 + 3$ (forme canonique directement lisible)

Corrigé

Question 1. $p(x) = x^2 + 4x + 1$: $a = 1 > 0$. $\alpha = -4/2 = -2$, $\beta = p(-2) = 4 - 8 + 1 = -3$. Sommet $S(-2; -3)$, axe $x = -2$. Minimum -3 en $x = -2$.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$p(x)$	$+\infty$	↘ -3 ↗	$+\infty$

Question 2. $q(x) = -3x^2 + 6x + 2$: $a = -3 < 0$. $\alpha = -6/(2 \times (-3)) = 1$, $\beta = q(1) = -3 + 6 + 2 = 5$. Sommet $S(1; 5)$, axe $x = 1$. Maximum 5 en $x = 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$q(x)$	$-\infty$	↗ 5 ↘	$-\infty$

Question 3. $r(x) = (x - 1)^2 + 3$: $a = 1 > 0$, sommet $S(1; 3)$, axe $x = 1$. Minimum 3 en $x = 1$.

Exercice 83

Resoudre l'équation $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

1. Identifier a , b , c .
2. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Déterminer le nombre de solutions et les calculer si elles existent.
4. Vérifier en substituant les solutions dans l'équation.

Corrigé

Question 1. $a = 2, b = -7, c = 3$.

Question 2.

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 49 - 24 = 25.$$

Question 3. $\Delta = 25 > 0$, donc deux racines :

$$x_1 = \frac{7-5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{7+5}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

Question 4. Vérification :

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{4} - 7 \times \frac{1}{2} + 3 = \frac{1}{2} - \frac{7}{2} + 3 = -3 + 3 = 0. \checkmark$$

$$f(3) = 2 \times 9 - 7 \times 3 + 3 = 18 - 21 + 3 = 0. \checkmark$$

Exercice 84

Pour chacune des équations suivantes, calculer Δ et résoudre.

1. $x^2 - 6x + 9 = 0$
2. $x^2 + x + 1 = 0$
3. $3x^2 - 5x - 2 = 0$

Coup de pouce 1. Pour l'équation (1) : $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0$. Qu'est-ce que $\Delta = 0$ implique pour le nombre de solutions ?

Corrigé

Question 1. $a = 1, b = -6, c = 9$. $\Delta = 36 - 36 = 0$. Racine double : $x_0 = \frac{6}{2} = 3$. L'ensemble des solutions est $\{3\}$.

Question 2. $a = 1, b = 1, c = 1$. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Aucune racine réelle. L'ensemble des solutions est $\emptyset$.

Question 3. $a = 3, b = -5, c = -2$. $\Delta = 25 + 24 = 49 > 0$. $\sqrt{49} = 7$.

$$x_1 = \frac{5-7}{6} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}, \quad x_2 = \frac{5+7}{6} = \frac{12}{6} = 2.$$

Exercice 85

1. Résoudre $x^2 - 5x + 4 = 0$.
2. Résoudre $2x^2 + 4x + 2 = 0$.
3. Déterminer les valeurs de k pour lesquelles $x^2 - 4x + k = 0$ admet deux racines distinctes.
4. Application : un rectangle a un périmètre de 14 cm. Si on note x la longueur, l'équation de l'aire $A = 21$ s'écrit $x(7-x) = 21$. Montrer que cela conduit à $x^2 - 7x + 21 = 0$ et conclure sur l'existence de solutions.

Corrigé

Question 1. $\Delta = 25 - 16 = 9 > 0$. $x_1 = (5-3)/2 = 1$, $x_2 = (5+3)/2 = 4$.

Question 2. $2x^2 + 4x + 2 = 2(x^2 + 2x + 1) = 2(x+1)^2$. On peut aussi calculer $\Delta = 16 - 16 = 0$, racine double $x_0 = -4/4 = -1$.

Question 3. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times k = 16 - 4k$. Deux racines distinctes $\Leftrightarrow \Delta > 0 \Leftrightarrow 16 - 4k > 0 \Leftrightarrow k < 4$.

Question 4. $x(7-x) = 21 \Leftrightarrow 7x - x^2 = 21 \Leftrightarrow x^2 - 7x + 21 = 0$. $\Delta = 49 - 84 = -35 < 0$: pas de solution réelle. Un tel rectangle n'existe pas.

Exercice 86

Soit $f(x) = 2x^2 - 2x - 12$.

1. Calculer Δ et les racines x_1, x_2 .
2. Ecrire la forme factorisée $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.
3. Dresser le tableau de signes de f .
4. Résoudre $f(x) \leq 0$.

Corrigé

Question 1. $a = 2, b = -2, c = -12$.

$$\Delta = 4 + 96 = 100. \quad \sqrt{\Delta} = 10.$$

$$x_1 = \frac{2-10}{4} = -2, \quad x_2 = \frac{2+10}{4} = 3.$$

Question 2.

$$f(x) = 2(x - (-2))(x - 3) = 2(x + 2)(x - 3).$$

Vérification : $2(x + 2)(x - 3) = 2(x^2 - x - 6) = 2x^2 - 2x - 12. \checkmark$

Question 3. Tableau de signes :

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$
$x-3$	$-$	$-$	0	$+$
2	$+$	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Question 4. $f(x) \leq 0$ sur $[-2; 3]$.

Exercice 87

Soit $g(x) = x^2 + 2x + 5$.

1. Calculer Δ .
2. Que conclure sur le signe de $g(x)$?
3. Résoudre $g(x) > 0$.
4. Justifier que $g(x) + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Coup de pouce 1. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ et $a = 1 > 0$. Rappel : si $\Delta < 0$ et $a > 0$, le trinôme est du même signe que a partout.

Corrigé

Question 1. $a = 1, b = 2, c = 5. \Delta = 4 - 20 = -16 < 0$.

Question 2. Comme $\Delta < 0$ et $a = 1 > 0$, le trinôme $g(x)$ est strictement positif pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Question 3. $g(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc l'ensemble solution est $\mathbb{R}$.

Question 4. Comme $g(x) > 0$ pour tout x , on a $g(x) + 1 > 0 + 1 = 1 > 0$ pour tout x .

Exercice 88

1. Factoriser $h(x) = x^2 - 7x + 10$ et dresser son tableau de signes.
2. Résoudre $h(x) \geq 0$ et $h(x) < 0$.
3. Factoriser $k(x) = -2x^2 + 6x - 4$ et dresser son tableau de signes.
4. Résoudre $k(x) \geq 0$.

Corrigé

Question 1. $\Delta = 49 - 40 = 9$. $x_1 = (7 - 3)/2 = 2$, $x_2 = (7 + 3)/2 = 5$. $h(x) = (x - 2)(x - 5)$.

x	$-\infty$	2	5	$+\infty$
$x - 2$	—	0	+	+
$x - 5$	—	—	0	+
$h(x)$	+	0	—	0

Question 2. $h(x) \geq 0$ sur $] -\infty ; 2] \cup [5 ; +\infty[$. $h(x) < 0$ sur $]2 ; 5[$.

Question 3. $k(x) = -2x^2 + 6x - 4$; $a = -2$, $\Delta = 36 - 32 = 4$. $x_1 = (6 - 2)/(2 \times 2) = 1$, $x_2 = (6 + 2)/4 = 2$.
 $k(x) = -2(x - 1)(x - 2)$.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
-2	—	—	—	—
$x - 1$	—	0	+	+
$x - 2$	—	—	0	+
$k(x)$	—	0	+	0

Question 4. $k(x) \geq 0$ sur $[1 ; 2]$.

Exercice 89

Resoudre $x^2 - 5x + 6 \leq 0$.

1. Identifier a et calculer Δ .
2. Trouver les racines x_1 et x_2 .
3. Dresser le tableau de signes de $f(x) = x^2 - 5x + 6$.
4. Lire la solution de $f(x) \leq 0$ dans le tableau.

Corrigé

Question 1. $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$.

Question 2. $\sqrt{\Delta} = 1$.

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3.$$

Question 3. Tableau de signes :

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$
$x - 2$	—	0	+	+
$x - 3$	—	—	0	+
$f(x)$	+	0	—	0

Question 4. $f(x) \leq 0$ sur $[2 ; 3]$.

Exercice 90

Resoudre les inequations suivantes.

1. $-x^2 + 3x - 2 \geq 0$
2. $x^2 + 4x + 4 > 0$
3. $x^2 + 1 \leq 0$

Coup de pouce 1. Pour (1), les racines de $-x^2 + 3x - 2 = 0$ sont $x = 1$ et $x = 2$. Comme $a = -1 < 0$, le trinome est positif entre les racines.

Corrigé

Question 1. $f(x) = -x^2 + 3x - 2$, $a = -1$, $\Delta = 9 - 8 = 1$. Racines : $x_1 = 1$, $x_2 = 2$.

Comme $a < 0$: le trinôme est positif entre les racines. Solution : $x \in [1; 2]$.

Question 2. $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$. Ce carré est nul en $x = -2$ et strictement positif partout ailleurs.

Donc $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \neq -2$. Solution : $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[$.

Question 3. $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout x (somme d'un carré et de 1). L'inéquation $x^2 + 1 \leq 0$ n'a aucune solution.

Exercice 91

1. Résoudre $2x^2 - x - 3 > 0$ (aide : racines $x = -1$ et $x = \frac{3}{2}$).
2. Résoudre $3x^2 - 12 \leq 0$.
3. Un commerçant réalise un bénéfice $B(p) = -p^2 + 10p - 16$ (en centaines d'euros) en fonction de son prix p (en euros). Pour quelles valeurs de p le bénéfice est-il positif? (Racines de B : $p = 2$ et $p = 8$.)

Corrigé

Question 1. $f(x) = 2x^2 - x - 3$, $a = 2 > 0$. Racines $x_1 = -1$ et $x_2 = \frac{3}{2}$.

Comme $a > 0$: $f(x) > 0$ à l'extérieur des racines. Solution : $x \in]-\infty; -1[\cup]\frac{3}{2}; +\infty[$.

Question 2. $3x^2 - 12 \leq 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 4) \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 \leq 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x + 2) \leq 0$.

Racines : $x = -2$ et $x = 2$. Avec $a = 1 > 0$: Solution $x \in [-2; 2]$.

Question 3. $B(p) = -p^2 + 10p - 16$, $a = -1 < 0$. Racines $p = 2$ et $p = 8$.

Comme $a < 0$: $B(p) \geq 0$ entre les racines. Le bénéfice est positif pour $p \in [2; 8]$.

Exercice 92

Un agriculteur dispose de 60 m de clôture pour fermer un enclos rectangulaire (un côté est un mur, il n'a donc besoin de clôture que pour 3 côtés). On note x la longueur des côtés perpendiculaires au mur.

1. Exprimer la longueur du côté parallèle au mur en fonction de x .
2. Exprimer l'aire $A(x)$ en fonction de x .
3. Déterminer la valeur de x qui maximise $A(x)$.
4. Calculer l'aire maximale.

Corrigé

Question 1. Le côté parallèle au mur mesure $60 - 2x$ mètres.

Question 2. $A(x) = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$.

Question 3. $a = -2$, $b = 60$. Abscisse du sommet :

$$\alpha = \frac{-60}{2 \times (-2)} = \frac{-60}{-4} = 15.$$

L'aire est maximale pour $x = 15$ m.

Question 4.

$$A(15) = -2 \times 225 + 60 \times 15 = -450 + 900 = 450 \text{ m}^2.$$

Exercice 93

Un projectile est lancé. Sa hauteur (en mètres) au bout de t secondes est $h(t) = -5t^2 + 30t + 2$.

1. Quelle est la hauteur initiale (à $t = 0$) ?
2. À quel instant le projectile atteint-il sa hauteur maximale ?
3. Quelle est cette hauteur maximale ?
4. À quel instant (approximativement) le projectile touche-t-il le sol ($h = 0$) ? Calculer Δ et donner les racines.

Coup de pouce 1. Pour trouver l'instant du maximum : $\alpha = -b/(2a) = -30/(2 \times (-5))$. Calculer soigneusement.

Corrigé

Question 1. $h(0) = 2$ m. Le projectile est lancé depuis une hauteur de 2 m.

Question 2. $a = -5$, $b = 30$.

$$\alpha = \frac{-30}{2 \times (-5)} = \frac{-30}{-10} = 3 \text{ s.}$$

Question 3.

$$h(3) = -5 \times 9 + 30 \times 3 + 2 = -45 + 90 + 2 = 47 \text{ m.}$$

Question 4. $h(t) = 0$: $\Delta = 900 + 40 = 940 > 0$.

$$t = \frac{-30 \pm \sqrt{940}}{-10}.$$

$\sqrt{940} \approx 30,66$. La racine positive est $t \approx \frac{-30 - 30,66}{-10} \approx 6,07$ s.

Le projectile touche le sol après environ 6,1 secondes.

Exercice 94 ◆

Un artisan fabrique des objets et les vend p euros l'unité. Ses études montrent que la demande est $q(p) = 100 - 2p$ unités et son chiffre d'affaires est $CA(p) = p \times q(p)$.

1. Montrer que $CA(p) = -2p^2 + 100p$.
2. Pour quelles valeurs de p la demande est-elle positive ?
3. Déterminer le prix p^* qui maximise le chiffre d'affaires.
4. Calculer le chiffre d'affaires maximal.
5. Le coût de production est $C = 500$ euros. Pour quelles valeurs de p le bénéfice $B(p) = CA(p) - 500$ est-il positif ? (On calculera Δ de $CA(p) = 500$.)

Corrigé

Question 1. $CA(p) = p(100 - 2p) = 100p - 2p^2 = -2p^2 + 100p$.

Question 2. $q(p) = 100 - 2p > 0 \Leftrightarrow p < 50$. La demande est positive pour $p \in]0 ; 50[$.

Question 3. $CA(p) = -2p^2 + 100p$, $a = -2 < 0$ (maximum).

$$p^* = \frac{-100}{2 \times (-2)} = \frac{-100}{-4} = 25 \text{ euros.}$$

Question 4. $CA(25) = -2 \times 625 + 100 \times 25 = -1250 + 2500 = 1250$ euros.

Question 5. $B(p) \geq 0 \Leftrightarrow -2p^2 + 100p - 500 \geq 0$. $\Delta = 10000 - 4000 = 6000$. $\sqrt{6000} = 10\sqrt{60} \approx 77,5$.

$$p_{1,2} = \frac{-100 \pm 77,5}{-4}.$$

$$p_1 \approx \frac{-100+77,5}{-4} \approx 5,6 \text{ et } p_2 \approx \frac{-100-77,5}{-4} \approx 44,4.$$

Comme $a = -2 < 0$, le bénéfice est positif entre les racines : $B(p) \geq 0$ pour $p \in [5,6 ; 44,4]$ environ.

Corrigé

1. Identification des coefficients.

Le trinôme $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec :

$$a = 2, \quad b = -3, \quad c = -5.$$

2. Coordonnées du sommet.

L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}.$$

L'ordonnée du sommet est :

$$\beta = f\left(\frac{3}{4}\right) = 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 3 \times \frac{3}{4} - 5 = 2 \times \frac{9}{16} - \frac{9}{4} - 5 = \frac{9}{8} - \frac{18}{8} - \frac{40}{8} = -\frac{49}{8}.$$

Le sommet est $S\left(\frac{3}{4}; -\frac{49}{8}\right)$.

3. Forme canonique.

On a $a = 2$, $\alpha = \frac{3}{4}$, $\beta = -\frac{49}{8}$, donc :

$$f(x) = 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{49}{8}.$$

4. Vérification de la forme factorisée.

On développe $2(x+1)\left(x - \frac{5}{2}\right)$:

$$2(x+1)\left(x - \frac{5}{2}\right) = 2\left(x^2 - \frac{5}{2}x + x - \frac{5}{2}\right) = 2\left(x^2 - \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}\right) = 2x^2 - 3x - 5.$$

On retrouve bien $f(x)$. □

Corrigé

1. Passage de la forme canonique à la forme développée : $f(x) = 3(x-2)^2 - 1$.

$$f(x) = 3(x-2)^2 - 1 = 3(x^2 - 4x + 4) - 1 = 3x^2 - 12x + 12 - 1.$$

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 11.$$

2. Passage de la forme factorisée à la forme développée : $g(x) = -2(x-1)(x+4)$.

$$(x-1)(x+4) = x^2 + 4x - x - 4 = x^2 + 3x - 4.$$

$$g(x) = -2(x^2 + 3x - 4) = -2x^2 - 6x + 8.$$

$$g(x) = -2x^2 - 6x + 8.$$

3. Passage de la forme développée à la forme canonique : $h(x) = x^2 + 6x + 5$.

Ici $a = 1$, $b = 6$, $c = 5$.

Abscisse du sommet :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2} = -3.$$

Ordonnée du sommet :

$$\beta = h(-3) = (-3)^2 + 6 \times (-3) + 5 = 9 - 18 + 5 = -4.$$

Donc :

$$h(x) = (x + 3)^2 - 4.$$

Vérification : $(x + 3)^2 - 4 = x^2 + 6x + 9 - 4 = x^2 + 6x + 5.$ □

Corrigé

1. Identification des trinômes du second degré.

- ▶ $p(x) = 4x^2 - x + 7$: **oui**, c'est un trinôme du second degré. On a $a = 4$, $b = -1$, $c = 7$.
- ▶ $q(x) = 3x - 2$: **non**, c'est un polynôme de degré 1 (pas de terme en x^2).
- ▶ $r(x) = -x^2 + 5$: **oui**, c'est un trinôme du second degré. On a $a = -1$, $b = 0$, $c = 5$.

2a. Développement de $f(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 3)$.

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 3) = x^2 - 3x - \frac{x}{2} + \frac{3}{2} = x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{3}{2}.$$

$$f(x) = 2\left(x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{3}{2}\right) = 2x^2 - 7x + 3.$$

$$f(x) = 2x^2 - 7x + 3.$$

2b. Coordonnées du sommet.

On lit $a = 2$, $b = -7$. L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-7}{4} = \frac{7}{4}.$$

L'ordonnée du sommet est :

$$\beta = f\left(\frac{7}{4}\right) = 2 \times \frac{49}{16} - 7 \times \frac{7}{4} + 3 = \frac{49}{8} - \frac{49}{4} + 3 = \frac{49}{8} - \frac{98}{8} + \frac{24}{8} = -\frac{25}{8}.$$

Le sommet est $S\left(\frac{7}{4}; -\frac{25}{8}\right)$.

2c. Forme canonique.

$$f(x) = 2\left(x - \frac{7}{4}\right)^2 - \frac{25}{8}.$$

Corrigé

1. Signe de a et sens d'ouverture.

On a $a = -1 < 0$, donc la parabole est tournée vers le **bas** (concavité vers le bas). La fonction admet un **maximum**.

2. Coordonnées du sommet S .

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \times (-1)} = -\frac{4}{-2} = 2.$$

$$\beta = f(2) = -(2)^2 + 4 \times 2 + 1 = -4 + 8 + 1 = 5.$$

Le sommet est $S(2; 5)$.

3. Axe de symétrie.

L'axe de symétrie de la parabole a pour équation :

$$x = 2.$$

4. Tableau de variations.

Puisque $a = -1 < 0$, f est **croissante** sur $]-\infty; 2]$ puis **décroissante** sur $[2; +\infty[$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	5	$-\infty$

5. Calcul de $f(0)$ et $f(4)$.

$$f(0) = -(0)^2 + 4 \times 0 + 1 = 1.$$

$$f(4) = -(4)^2 + 4 \times 4 + 1 = -16 + 16 + 1 = 1.$$

On remarque que $f(0) = f(4) = 1$. Cela s'explique par la symétrie de la parabole par rapport à l'axe $x = 2$: les points d'abscisse 0 et 4 sont symétriques par rapport à cet axe (0 et 4 sont à égale distance de 2), donc ils ont la même image.

Corrigé

1. Lecture des coordonnées du sommet.

$f(x) = 2(x - 1)^2 - 8$ est déjà sous forme canonique avec $\alpha = 1$ et $\beta = -8$.

Le sommet est $S(1; -8)$.

2. Sens d'ouverture.

On a $a = 2 > 0$, donc la parabole est tournée vers le **haut**. La fonction admet un **minimum**.

3. Tableau de variations et minimum.

Puisque $a = 2 > 0$, f est **décroissante** sur $]-\infty; 1]$ puis **croissante** sur $[1; +\infty[$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-8	$+\infty$

Le minimum de f est -8 , atteint en $x = 1$.

4. Forme développée.

$$f(x) = 2(x - 1)^2 - 8 = 2(x^2 - 2x + 1) - 8 = 2x^2 - 4x + 2 - 8.$$

$$f(x) = 2x^2 - 4x - 6.$$

5. Vérification de $f(3) = 0$ et $f(-1) = 0$.

$$f(3) = 2(3 - 1)^2 - 8 = 2 \times 4 - 8 = 8 - 8 = 0. \quad \checkmark$$

$$f(-1) = 2(-1 - 1)^2 - 8 = 2 \times 4 - 8 = 8 - 8 = 0. \quad \checkmark$$

Corrigé

1. Coordonnées du sommet.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{12}{2 \times (-3)} = -\frac{12}{-6} = 2.$$

$$\beta = g(2) = -3 \times 4 + 12 \times 2 - 5 = -12 + 24 - 5 = 7.$$

Le sommet est $S(2; 7)$.

2. Forme canonique.

$$g(x) = -3(x - 2)^2 + 7.$$

Vérification : $-3(x - 2)^2 + 7 = -3(x^2 - 4x + 4) + 7 = -3x^2 + 12x - 12 + 7 = -3x^2 + 12x - 5. \quad \square$

3. Tableau de variations, maximum.

Puisque $a = -3 < 0$, g est **croissante** sur $] -\infty ; 2]$ puis **décroissante** sur $[2 ; +\infty[$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	7	$-\infty$

La valeur maximale de g est **7**, atteinte en $x = 2$.

4. Calcul et interprétation de $g(0)$.

$$g(0) = -3 \times 0 + 12 \times 0 - 5 = -5.$$

$g(0) = -5$ est l'ordonnée à l'origine de la parabole (c'est-à-dire la valeur en laquelle la parabole coupe l'axe des ordonnées).

5. Signe de $g(4)$ par symétrie.

L'axe de symétrie de la parabole est $x = 2$. Les abscisses 0 et 4 sont symétriques par rapport à cet axe (car $\frac{0+4}{2} = 2$), donc $g(4) = g(0) = -5 < 0$.

Ainsi, $g(4) < 0$.

Corrigé

Rappel de la méthode : pour résoudre $ax^2 + bx + c = 0$, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$.

- ▶ Si $\Delta > 0$: deux racines réelles $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- ▶ Si $\Delta = 0$: une racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- ▶ Si $\Delta < 0$: aucune racine réelle.

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 1.$$

$$x_1 = \frac{5-1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

$$\mathcal{S} = \{2; 3\}.$$

b) $2x^2 + 3x - 2 = 0.$

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 9 + 16 = 25 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 5.$$

$$x_1 = \frac{-3-5}{4} = \frac{-8}{4} = -2, \quad x_2 = \frac{-3+5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$\mathcal{S} = \left\{-2; \frac{1}{2}\right\}.$$

c) $x^2 - 2x + 5 = 0.$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0.$$

Puisque $\Delta < 0$, l'équation n'admet **aucune solution réelle**.

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

Corrigé

a) $4x^2 - 12x + 9 = 0.$

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \times 4 \times 9 = 144 - 144 = 0.$$

Puisque $\Delta = 0$, l'équation admet une **racine double** :

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}.$$

$$\mathcal{S} = \left\{\frac{3}{2}\right\}.$$

Remarque : on reconnaît l'identité remarquable $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$, ce qui confirme la racine double $x = \frac{3}{2}$.

b) $x^2 - 7 = 0.$

$$\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (-7) = 28 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}.$$

$$x_1 = \frac{0-2\sqrt{7}}{2} = -\sqrt{7}, \quad x_2 = \frac{0+2\sqrt{7}}{2} = \sqrt{7}.$$

$$\mathcal{S} = \{-\sqrt{7}; \sqrt{7}\}.$$

c) $3x^2 + x + 1 = 0.$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times 1 = 1 - 12 = -11 < 0.$$

Puisque $\Delta < 0$, l'équation n'admet **aucune solution réelle**.

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

Corrigé

a) $(x + 1)(x - 3) = -3.$

On développe le membre de gauche :

$$(x + 1)(x - 3) = x^2 - 3x + x - 3 = x^2 - 2x - 3.$$

L'équation devient :

$$x^2 - 2x - 3 = -3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 + 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0.$$

On factorise par x :

$$x(x - 2) = 0.$$

$x = 0$ ou $x - 2 = 0$, soit $x = 2$.

$$\mathcal{S} = \{0; 2\}.$$

Vérification : $(0 + 1)(0 - 3) = -3 \checkmark$; $(2 + 1)(2 - 3) = 3 \times (-1) = -3 \checkmark$.

b) $2x^2 - 5x = 3.$

On réécrit :

$$2x^2 - 5x - 3 = 0.$$

$$a = 2, b = -5, c = -3.$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 7.$$

$$x_1 = \frac{5 - 7}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5 + 7}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{2}; 3 \right\}.$$

Corrigé

a) $x^2 - 9.$

On reconnaît une différence de deux carrés : $x^2 - 9 = x^2 - 3^2$.

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

b) $2x^2 - 8x.$

On met $2x$ en facteur :

$$2x^2 - 8x = 2x \cdot x - 2x \cdot 4.$$

$$2x^2 - 8x = 2x(x - 4).$$

c) $x^2 - x - 6$.

Méthode par le discriminant : $a = 1, b = -1, c = -6$.

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 > 0, \sqrt{\Delta} = 5.$$

$$x_1 = \frac{1-5}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{1+5}{2} = 3.$$

D'après le théorème de factorisation : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

$$x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3).$$

d) $3x^2 - 12x + 12$.

On factorise d'abord par 3 :

$$3x^2 - 12x + 12 = 3(x^2 - 4x + 4).$$

On reconnaît ensuite $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$ (carré parfait).

$$3x^2 - 12x + 12 = 3(x - 2)^2.$$

Corrigé

1. Racines de f .

f est déjà sous forme factorisée. Par la règle du produit nul :

$$(x - 2)(x + 5) = 0 \iff x - 2 = 0 \text{ ou } x + 5 = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = -5.$$

Les racines de f sont $x_1 = -5$ et $x_2 = 2$.

2. Tableau de signes.

x	$-\infty$	-5	2	$+\infty$
$x + 5$		$-$	0	$+$
$x - 2$		$-$	$-$	0
$f(x)$		$+$	0	$+$

3. Solutions des inéquations.

a) $f(x) \geq 0$: d'après le tableau, $f(x) \geq 0$ sur $] -\infty; -5] \cup [2; +\infty[$.

$$\mathcal{S}_a =] -\infty; -5] \cup [2; +\infty[.$$

b) $f(x) < 0$: d'après le tableau, $f(x) < 0$ sur $] -5; 2[$.

$$\mathcal{S}_b =] -5; 2[.$$

4. Développement et calcul de Δ .

$$f(x) = (x - 2)(x + 5) = x^2 + 5x - 2x - 10 = x^2 + 3x - 10.$$

On a $a = 1, b = 3, c = -10$.

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-10) = 9 + 40 = 49.$$

□

Corrigé

1. Calcul de Δ et racines de g .

$$\Delta = 2^2 - 4 \times (-2) \times 12 = 4 + 96 = 100 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 10.$$

$$x_1 = \frac{-2 - 10}{2 \times (-2)} = \frac{-12}{-4} = 3, \quad x_2 = \frac{-2 + 10}{2 \times (-2)} = \frac{8}{-4} = -2.$$

Les racines sont $x_1 = -2$ et $x_2 = 3$ (rangées dans l'ordre croissant).

2. Factorisation de $g(x)$.

$$g(x) = -2(x+2)(x-3).$$

$$\text{Vérification : } -2(x+2)(x-3) = -2(x^2 - x - 6) = -2x^2 + 2x + 12 = g(x).$$

✓

3. Tableau de signes.

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
-2	$-$	$-$	$-$	$-$
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$
$x-3$	$-$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$-$	0	$+$	0

(Le facteur -2 est négatif, il inverse le signe du produit $(x+2)(x-3)$.)

4. Résolution de $g(x) \leq 0$.

D'après le tableau de signes, $g(x) \leq 0$ pour $x \leq -2$ ou $x \geq 3$.

$$\mathcal{S} =]-\infty; -2] \cup [3; +\infty[.$$

Corrigé

a) $x^2 - x - 6 > 0$.

Étape 1 : calcul de Δ .

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 5.$$

$$x_1 = \frac{1-5}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{1+5}{2} = 3.$$

Étape 2 : tableau de signes.

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$		
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Conclusion :

$$\mathcal{S} =]-\infty; -2[\cup]3; +\infty[.$$

b) $-x^2 + 4 \geq 0$.

Étape 1 : calcul de Δ .

$$\Delta = 0^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 16 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 4.$$

$$x_1 = \frac{0-4}{-2} = 2, \quad x_2 = \frac{0+4}{-2} = -2.$$

Donc les racines (ordre croissant) sont -2 et 2 .

Étape 2 : tableau de signes.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = [-2; 2].$$

Corrigé

a) $2x^2 - 5x + 2 \leq 0$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 2 = 25 - 16 = 9 > 0, \quad \sqrt{\Delta} = 3.$$

$$x_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5+3}{4} = 2.$$

Tableau de signes :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	2	$+\infty$		
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

$$\mathcal{S} = \left[\frac{1}{2}; 2 \right].$$

b) $x^2 + 1 < 0$.

$$a = 1, b = 0, c = 1.$$

$$\Delta = 0 - 4 \times 1 \times 1 = -4 < 0.$$

Puisque $\Delta < 0$ et $a = 1 > 0$, le trinôme $x^2 + 1$ n'a **aucune racine réelle** et est **strictement positif** pour tout $x \in \mathbb{R}$ (il vaut au minimum 1 en $x = 0$).

La condition $x^2 + 1 < 0$ n'est donc jamais satisfaite.

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

Corrigé

1. Calcul de Δ et racines de $f(x) = -3x^2 + 6x + 9$.

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-3) \times 9 = 36 + 108 = 144 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = 12.$$

$$x_1 = \frac{-6-12}{2 \times (-3)} = \frac{-18}{-6} = 3, \quad x_2 = \frac{-6+12}{-6} = \frac{6}{-6} = -1.$$

Les racines, dans l'ordre croissant, sont $x_1 = -1$ et $x_2 = 3$.

2. Tableau de signes.

Puisque $a = -3 < 0$, le trinôme est **positif entre les racines** et négatif à l'extérieur.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$		
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

3. Ensemble solution de $f(x) \geq 0$.

$$S = [-1; 3].$$

4. Vérification.

$$f(0) = -3 \times 0 + 6 \times 0 + 9 = 9 > 0 : 0 \in [-1; 3], \text{ cohérent.}$$

✓

$$f(4) = -3 \times 16 + 6 \times 4 + 9 = -48 + 24 + 9 = -15 < 0 : 4 \notin [-1; 3], \text{ cohérent.}$$

✓

Corrigé

1. Longueur de l'enclos en fonction de x .

Le périmètre vaut 20 m, donc $2(x + L) = 20$, soit $x + L = 10$.

La longueur est $L = 10 - x$.

2. Expression de l'aire.

$$A(x) = x \times (10 - x) = 10x - x^2.$$

$$A(x) = -x^2 + 10x.$$

3. Coordonnées du sommet.

On a $a = -1$, $b = 10$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{10}{-2} = 5.$$

$$A(5) = -(5)^2 + 10 \times 5 = -25 + 50 = 25.$$

Le sommet est $S(5; 25)$.

4. Valeur maximale de l'aire.

L'aire est maximale pour $x = 5$ m. L'aire maximale est $A(5) = 25 \text{ m}^2$.

5. Forme de l'enclos d'aire maximale.

Pour $x = 5$: largeur = 5 m et longueur = $10 - 5 = 5$ m.

L'enclos d'aire maximale est un **carré** de côté 5 m.

Corrigé

1. Expression de p en fonction de x .

On a $x = \frac{50 - p}{2}$, donc $2x = 50 - p$, soit :

$$p = 50 - 2x.$$

2. Expression de la recette.

$$R(x) = p \times x = (50 - 2x) \times x = 50x - 2x^2.$$

$$R(x) = -2x^2 + 50x.$$

3. Nombre d'articles pour maximiser la recette.

On a $a = -2$, $b = 50$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{50}{-4} = \frac{25}{2} = 12,5.$$

La recette est maximale pour $x = \frac{25}{2}$ articles.

4. Prix optimal et recette maximale.

Prix unitaire optimal :

$$p = 50 - 2 \times \frac{25}{2} = 50 - 25 = 25 \text{ euros.}$$

Recette maximale :

$$R\left(\frac{25}{2}\right) = -2 \times \left(\frac{25}{2}\right)^2 + 50 \times \frac{25}{2} = -2 \times \frac{625}{4} + 625 = -\frac{625}{2} + \frac{1250}{2} = \frac{625}{2} = 312,5 \text{ euros.}$$

Le prix unitaire optimal est **25 euros** et la recette maximale est **312,5 euros**.

Corrigé

1. Hauteur initiale.

$$h(0) = -5 \times 0 + 20 \times 0 + 1 = 1 \text{ mètre.}$$

Le ballon est lancé depuis une hauteur de **1 m**.

2. Hauteur maximale et instant correspondant.

On a $a = -5$, $b = 20$.

$$t_{\max} = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{-10} = 2 \text{ secondes.}$$

$$h(2) = -5 \times 4 + 20 \times 2 + 1 = -20 + 40 + 1 = 21 \text{ mètres.}$$

Le ballon atteint sa hauteur maximale de **21 m** au bout de **2 s**.

3. Instant où le ballon touche le sol.

$$h(t) = 0 \iff -5t^2 + 20t + 1 = 0.$$

$$a = -5, b = 20, c = 1.$$

$$\Delta = 20^2 - 4 \times (-5) \times 1 = 400 + 20 = 420 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{420} = 2\sqrt{105}.$$

$$t = \frac{-20 \pm 2\sqrt{105}}{-10} = \frac{20 \mp 2\sqrt{105}}{10} = 2 \mp \frac{\sqrt{105}}{5}.$$

$$t_1 = 2 - \frac{\sqrt{105}}{5} \approx 2 - 2,049 \approx -0,05 < 0 \quad (\text{rejeté, hors contexte}).$$

$$t_2 = 2 + \frac{\sqrt{105}}{5} \approx 2 + 2,049 \approx 4,05 > 0.$$

Le ballon touche le sol après environ **4,05 secondes**.

Corrigé

Barème indicatif : Q1 : 3 pts — Q2 : 4 pts — Q3 : 4 pts — Q4 : 4 pts — Q5 : 5 pts

1. (C1) Coefficients et forme canonique.

On a $f(x) = 3x^2 - 6x - 24$, donc $a = 3$, $b = -6$, $c = -24$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{6} = 1.$$

$$\beta = f(1) = 3 - 6 - 24 = -27.$$

$$f(x) = 3(x - 1)^2 - 27.$$

Vérification : $3(x - 1)^2 - 27 = 3(x^2 - 2x + 1) - 27 = 3x^2 - 6x + 3 - 27 = 3x^2 - 6x - 24$. ✓

2. (C2) Sommet et tableau de variations.

Le sommet est $S(1; -27)$. Puisque $a > 0$, f est décroissante sur $]-\infty; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$		$\searrow -27 \nearrow$	
	$+\infty$		$+\infty$

3. (C1) Calcul de Δ et factorisation.

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times (-24) = 36 + 288 = 324, \sqrt{\Delta} = 18.$$

$$x_1 = \frac{6 - 18}{6} = -2, \quad x_2 = \frac{6 + 18}{6} = 4.$$

$$f(x) = 3(x + 2)(x - 4).$$

4. (C2) Abscisses des intersections avec l'axe des abscisses.

La parabole coupe l'axe des abscisses en $x = -2$ et $x = 4$ (les racines de f).

Vérification algébrique : $f(-2) = 3 \times 4 - 6 \times (-2) - 24 = 12 + 12 - 24 = 0$ ✓ ; $f(4) = 48 - 24 - 24 = 0$ ✓.

5. L'équation $f(x) = -27$.

D'après le tableau de variations, le minimum de f est -27 , atteint uniquement en $x = 1$.

L'équation $f(x) = -27$ admet donc **une unique solution** : $x = 1$.

Justification : $3(x - 1)^2 - 27 = -27 \Leftrightarrow 3(x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Corrigé

Barème indicatif : Q1 : 3 pts — Q2 : 3 pts — Q3 : 4 pts — Q4 : 5 pts — Q5 : 5 pts

1. (C1) Forme développée.

$$f(x) = -2(x + 3)^2 + 8 = -2(x^2 + 6x + 9) + 8 = -2x^2 - 12x - 18 + 8.$$

$$f(x) = -2x^2 - 12x - 10.$$

On lit $a = -2$, $b = -12$, $c = -10$.

2. (C2) Sommet — maximum ou minimum.

$f(x) = -2(x - (-3))^2 + 8$, donc le sommet est $S(-3; 8)$.

Puisque $a = -2 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : f admet un **maximum** égal à 8, atteint en $x = -3$.

3. (C2) Tableau de variations.

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	8 ↘	$-\infty$

4. (C1) Résolution de $f(x) = 0$.

$$-2(x+3)^2 + 8 = 0 \iff (x+3)^2 = 4 \iff x+3 = \pm 2.$$

$$x+3 = 2 \Rightarrow x = -1, \quad x+3 = -2 \Rightarrow x = -5.$$

$$\mathcal{S} = \{-5; -1\}.$$

Interprétation géométrique : les points d'abscisses -5 et -1 sont les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses.

5. Comparaison des deux formes.

La **forme canonique** $-2(x+3)^2 + 8$ est plus pratique pour :

- ▶ lire directement le sommet $S(-3; 8)$ (questions 2 et 3),
- ▶ résoudre $f(x) = k$ en isolant le carré (question 4).

La **forme développée** $-2x^2 - 12x - 10$ est plus pratique pour :

- ▶ identifier les coefficients a, b, c en vue d'appliquer la formule de Δ .

Corrigé

Barème indicatif : Q1 : 4 pts — Q2 : 6 pts — Q3 : 5 pts — Q4 : 5 pts

1. (C1) Forme canonique.

$$a = 1, b = -4, c = 1.$$

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{2} = 2.$$

$$\beta = f(2) = 4 - 8 + 1 = -3.$$

$$f(x) = (x-2)^2 - 3.$$

$$\text{Vérification : } (x-2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1. \quad \checkmark$$

2. (C3) Résolution de $f(x) = 0$.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 16 - 4 = 12 > 0.$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

$$x_1 = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}, \quad x_2 = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}.$$

$$\mathcal{S} = \{2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3}\}.$$

3. (C3) Résolution de $f(x) = -2$.

$$f(x) = -2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 = -2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0.$$

$$a = 1, b = -4, c = 3.$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4 > 0, \sqrt{\Delta} = 2.$$

$$x_1 = \frac{4-2}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{4+2}{2} = 3.$$

$$\mathcal{S} = \{1; 3\}.$$

4. (C1) La valeur $\beta = -3$ est-elle bien le minimum ?

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x-2)^2 \geq 0$, donc :

$$f(x) = (x-2)^2 - 3 \geq 0 - 3 = -3.$$

L'égalité est atteinte uniquement pour $x = 2$.

Ainsi, $f(x) \geq -3$ pour tout réel x , et $f(2) = -3$: $\beta = -3$ est bien le **minimum** de f . □

Corrigé

1. Forme canonique de $p(x)$.

On a $p(x) = 2x^2 - 4x - 6$, avec $a = 2$, $b = -4$, $c = -6$.

L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \times 2} = 1.$$

L'ordonnée du sommet est :

$$\beta = p(1) = 2(1)^2 - 4(1) - 6 = 2 - 4 - 6 = -8.$$

Donc :

$$p(x) = 2(x-1)^2 - 8.$$

1. Forme factorisée de $p(x)$.

On calcule le discriminant :

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 16 + 48 = 64 > 0.$$

Les deux racines sont :

$$x_1 = \frac{4 - \sqrt{64}}{4} = \frac{4-8}{4} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{4+8}{4} = 3.$$

D'où :

$$p(x) = 2(x+1)(x-3).$$

2. Résolution de $p(x) = 10$.

$$p(x) = 10 \Leftrightarrow 2x^2 - 4x - 6 = 10 \Leftrightarrow 2x^2 - 4x - 16 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 0.$$

$$\text{Discriminant : } \Delta' = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 4 + 32 = 36.$$

$$x_1 = \frac{2-6}{2} = -2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{2+6}{2} = 4.$$

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{-2; 4\}$.

3. Résolution de $p(x) = -8$.

D'après la forme canonique : $p(x) = 2(x-1)^2 - 8$.

$$p(x) = -8 \Leftrightarrow 2(x-1)^2 - 8 = -8 \Leftrightarrow 2(x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{1\}$.

4. Vérification pour $x = 2$.

- ▶ Forme développée : $p(2) = 2(4) - 4(2) - 6 = 8 - 8 - 6 = -6$.
- ▶ Forme canonique : $p(2) = 2(2-1)^2 - 8 = 2 \times 1 - 8 = -6$.
- ▶ Forme factorisée : $p(2) = 2(2+1)(2-3) = 2 \times 3 \times (-1) = -6$.

Les trois formes donnent bien $p(2) = -6$. □

Barème indicatif : Q1 forme canonique : 2 pts (calculer); Q1 forme factorisée : 2 pts (calculer); Q2 : 2 pts (calculer); Q3 : 1 pt (raisonner); Q4 : 1 pt (communiquer)

Corrigé

1. Calcul du discriminant et racines de f .

On identifie $a = 6$, $b = -1$, $c = -2$.

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 6 \times (-2) = 1 + 48 = 49.$$

Comme $\Delta = 49 > 0$, l'équation $f(x) = 0$ admet deux racines distinctes :

$$x_1 = \frac{1 - \sqrt{49}}{12} = \frac{1 - 7}{12} = \frac{-6}{12} = -\frac{1}{2}$$

$$x_2 = \frac{1 + 7}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}.$$

2. Factorisation de $f(x)$.

D'après la formule de factorisation :

$$f(x) = 6 \left(x + \frac{1}{2} \right) \left(x - \frac{2}{3} \right) = (2x + 1)(3x - 2).$$

$$\text{Vérification : } (2x + 1)(3x - 2) = 6x^2 - 4x + 3x - 2 = 6x^2 - x - 2 = f(x). \quad \square$$

3. Tableau de signes de f .

Les racines $x_1 = -\frac{1}{2}$ et $x_2 = \frac{2}{3}$ délimitent trois intervalles.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$f(x)$		+	-	+

4. Résolution de $6x^2 - x = 2$.

$$6x^2 - x = 2 \Leftrightarrow 6x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0.$$

D'après la question 1 : $\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{2}; \frac{2}{3} \right\}$.

5. Signe de f sur $\left[-\frac{1}{2}; \frac{2}{3} \right]$.

D'après le tableau de signes établi à la question 3, $f(x) \leq 0$ pour tout $x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{2}{3} \right]$ (nul aux bornes, strictement négatif à l'intérieur).

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer); Q2 : 2 pts (calculer, communiquer); Q3 : 2 pts (raisonner); Q4 : 1 pt (calculer); Q5 : 1 pt (raisonner)

Corrigé

1. Résolution de $(x^2 - 4)(x - 3) = 0$.

On factorise $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, donc :

$$(x - 2)(x + 2)(x - 3) = 0.$$

Par la règle du produit nul :

$$x - 2 = 0 \text{ ou } x + 2 = 0 \text{ ou } x - 3 = 0,$$

ce qui donne $x = 2$, $x = -2$ ou $x = 3$.

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{-2; 2; 3\}$.

2. Tableau de signes de $g(x) = x^2 - 4$.

$g(x) = x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Les racines sont -2 et 2 .

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

3. Étude de $h(x) = 2x^2 + 3x - 5$.

a) Discriminant et racines.

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-5) = 9 + 40 = 49.$$

$$x_1 = \frac{-3 - 7}{4} = \frac{-10}{4} = -\frac{5}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-3 + 7}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

b) Factorisation.

$$h(x) = 2\left(x + \frac{5}{2}\right)(x - 1) = (2x + 5)(x - 1).$$

Vérification : $(2x + 5)(x - 1) = 2x^2 - 2x + 5x - 5 = 2x^2 + 3x - 5$. □

c) Tableau de signes de h .

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	1	$+\infty$	
$h(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

4. Solutions de $2x^2 + 3x - 5 \geq 0$.

D'après le tableau de signes, $h(x) \geq 0$ sur $\left]-\infty; -\frac{5}{2}\right] \cup [1; +\infty[$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner); Q2 : 2 pts (raisonner); Q3a-b : 2 pts (calculer); Q3c : 1 pt (raisonner); Q4 : 1 pt (raisonner)

Corrigé

1. Factorisation et tableau de signes de $f(x) = x^2 - 3x - 10$.

On a $a = 1$, $b = -3$, $c = -10$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-10) = 9 + 40 = 49.$$

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{3-7}{2} = -2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3+7}{2} = 5.$$

Donc $f(x) = (x+2)(x-5)$.

Tableau de signes ($a = 1 > 0$, parabole vers le haut) :

x	$-\infty$	-2	5	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

2. Résolution des inéquations.

a) $x^2 - 3x - 10 < 0$: d'après le tableau, $f(x) < 0$ sur $\mathcal{S} =]-2; 5[$.

b) $x^2 - 3x - 10 \geq 0$: d'après le tableau, $f(x) \geq 0$ sur $\mathcal{S} =]-\infty; -2] \cup [5; +\infty[$.

3. Factorisation et tableau de signes de $g(x) = -x^2 + 2x + 8$.

$a = -1$, $b = 2$, $c = 8$.

$$\Delta = 4 - 4 \times (-1) \times 8 = 4 + 32 = 36.$$

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{-2-6}{-2} = -2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2+6}{-2} = -2.$$

On calcule directement :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{36}}{2 \times (-1)} = \frac{-2-6}{-2} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2+6}{-2} = -2.$$

Donc $x_1 = -2$ et $x_2 = 4$, et $g(x) = -(x+2)(x-4)$.

Tableau de signes ($a = -1 < 0$) :

x	$-\infty$	-2	4	$+\infty$		
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

4. Résolution de $-x^2 + 2x + 8 > 0$.

D'après le tableau, $g(x) > 0$ sur $\mathcal{S} =]-2; 4[$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner); Q2a : 1 pt (raisonner); Q2b : 1 pt (raisonner); Q3 : 2 pts (calculer, raisonner); Q4 : 1 pt (raisonner)

Corrigé

1. Factorisation et signe de $g(x) = 3x^2 - 5x - 2$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 25 + 24 = 49.$$

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{5-7}{6} = -\frac{1}{3} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5+7}{6} = 2.$$

Donc $g(x) = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)(x-2) = (3x+1)(x-2)$.

Tableau de signes ($a = 3 > 0$) :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	2	$+\infty$	
$g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

2. Résolution de $3x^2 - 5x - 2 < 0$.

D'après le tableau, $g(x) < 0$ sur $\Delta = \left] -\frac{1}{3}; 2 \right[$.

3. Comparaison des aires.

On cherche pour quelles valeurs de x (avec $x > 1$) l'aire du rectangle dépasse celle du carré :

$$(x+3)(x-1) > x^2.$$

On développe le membre de gauche :

$$(x+3)(x-1) = x^2 + 2x - 3.$$

L'inéquation devient :

$$x^2 + 2x - 3 > x^2 \iff 2x - 3 > 0 \iff x > \frac{3}{2}.$$

En tenant compte de la contrainte $x > 1$, la condition $x > \frac{3}{2}$ est plus restrictive.

Conclusion : le rectangle a une aire strictement supérieure à celle du carré si et seulement si $x > \frac{3}{2}$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q2 : 1 pt (raisonner) ; Q3 : 3 pts (modéliser, calculer, raisonner)

Corrigé**1. Dimensions de la base en fonction de x .**

Lorsqu'on découpe des carrés de côté x aux quatre coins d'une feuille $16 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$:

- ▶ longueur de la base : $16 - 2x \text{ cm}$,
- ▶ largeur de la base : $10 - 2x \text{ cm}$.

2. Expression de $V(x)$.

La hauteur de la boîte est x . Donc :

$$V(x) = x(16 - 2x)(10 - 2x).$$

On développe :

$$(16 - 2x)(10 - 2x) = 160 - 32x - 20x + 4x^2 = 4x^2 - 52x + 160.$$

$$\text{Donc } V(x) = x(4x^2 - 52x + 160) = 4x^3 - 52x^2 + 160x. \quad \square$$

3. Étude de l'aire de la base $A(x) = (16 - 2x)(10 - 2x)$.

a) Développement.

$$A(x) = 4x^2 - 52x + 160.$$

C'est un trinôme du second degré avec $a = 4 > 0$.

b) Sommet.

L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{-52}{2 \times 4} = \frac{52}{8} = \frac{13}{2} = 6,5.$$

Or $6,5 \notin]0; 5[$, donc le sommet est en dehors du domaine d'étude.

c) Tableau de variations de A sur $]0; 5[$.

Sur $]0; 5[$, A est strictement décroissante : plus on découpe un grand carré, plus la base devient petite.

x	0	→	5
$A(x)$	160	↘	40

Interprétation : l'aire de la base diminue lorsqu'on augmente la taille des carrés découpés.

4. Comparaison de $V(2)$ et $V(3)$.

$$V(2) = 2 \times (16 - 4)(10 - 4) = 2 \times 12 \times 6 = 144 \text{ cm}^3.$$

$$V(3) = 3 \times (16 - 6)(10 - 6) = 3 \times 10 \times 4 = 120 \text{ cm}^3.$$

On a $V(2) = 144 > 120 = V(3)$, donc le découpage avec $x = 2$ cm donne le plus grand volume.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser) ; Q2 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q3 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q4 : 2 pts (calculer, raisonner)

Corrigé

1. Coordonnées du sommet.

$B(x) = -2x^2 + 80x - 600$: on a $a = -2$, $b = 80$, $c = -600$.

$$\alpha = -\frac{80}{2 \times (-2)} = \frac{80}{4} = 20.$$

$$\beta = B(20) = -2(400) + 80(20) - 600 = -800 + 1600 - 600 = 200.$$

Le sommet est $S(20; 200)$.

2. Tableau de variations de B sur $[0; 40]$.

La fonction B est croissante sur $[0; 20]$ puis décroissante sur $[20; 40]$.

x	0	20	40
$B(x)$	-600	↗ 200 ↘	-600

3. Maximisation du bénéfice.

Le bénéfice est maximal pour $x = 20$ unités produits par semaine.

Le bénéfice maximal est $B(20) = 200$ €.

4. Intervalle de rentabilité.

$$B(x) = 0 \iff -2x^2 + 80x - 600 = 0 \iff x^2 - 40x + 300 = 0.$$

$$\Delta = 1600 - 1200 = 400.$$

$$x_1 = \frac{40 - 20}{2} = 10 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{40 + 20}{2} = 30.$$

Comme $a = -2 < 0$, $B(x) > 0$ entre les racines : l'entreprise est rentable pour $x \in]10; 30[$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer) ; Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer) ; Q3 : 1 pt (raisonner) ; Q4 : 3 pts (calculer, raisonner)

Corrigé

1. Résolution de $x^2 - 5x + 3 = 0$.

$a = 1$, $b = -5$, $c = 3$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 25 - 12 = 13.$$

$\Delta = 13 > 0$: l'équation admet deux solutions réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{13}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{13}}{2}.$$

2. Résolution de $x^2 - 5x + 3 \leq 0$.

Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est négatif ou nul entre ses racines.

L'ensemble des solutions est :

$$\mathcal{S} = \left[\frac{5 - \sqrt{13}}{2}; \frac{5 + \sqrt{13}}{2} \right].$$

3. Discriminant de $g(x) = x^2 + 4x + 5$.

$a = 1, b = 4, c = 5$.

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4.$$

$\Delta = -4 < 0$.

4. Signe de $g(x)$ et résolution de $g(x) > 0$.

Comme $\Delta < 0$ et $a = 1 > 0$, le trinôme g n'a pas de racine réelle et son coefficient dominant est positif.

Donc $g(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

L'ensemble des solutions de $g(x) > 0$ est $\mathcal{S} = \mathbb{R}$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer); Q2 : 2 pts (raisonner); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

Corrigé

1. Résolution de $h(t) = 0$.

$h(t) = -t^2 + 6t + 7$: on a $a = -1, b = 6, c = 7$.

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-1) \times 7 = 36 + 28 = 64.$$

$$t_1 = \frac{-6 - 8}{-2} = \frac{-14}{-2} = 7 \quad \text{et} \quad t_2 = \frac{-6 + 8}{-2} = \frac{2}{-2} = -1.$$

Les deux solutions sont $t = -1$ et $t = 7$. Comme $t \geq 0$, seule la solution $t = 7$ est physiquement valide : l'objet retouche le sol après 7 secondes.

2. Calcul de $h(0)$ et interprétation.

$$h(0) = -(0)^2 + 6(0) + 7 = 7.$$

À $t = 0$, l'objet se trouve à 7 m de hauteur. C'est la hauteur de lancement.

3. Résolution de $h(t) > 3$.

$$h(t) > 3 \iff -t^2 + 6t + 7 > 3 \iff -t^2 + 6t + 4 > 0.$$

On pose $g(t) = -t^2 + 6t + 4$, avec $a = -1, b = 6, c = 4$.

$$\Delta = 36 - 4 \times (-1) \times 4 = 36 + 16 = 52.$$

$$t_1 = \frac{-6 - \sqrt{52}}{-2} = 3 - \sqrt{13} \quad \text{et} \quad t_2 = \frac{-6 + \sqrt{52}}{-2} = 3 + \sqrt{13}.$$

(On utilise $\sqrt{52} = 2\sqrt{13}$.)

Comme $a = -1 < 0$, $g(t) > 0$ entre ses racines : $t \in]3 - \sqrt{13}; 3 + \sqrt{13}[$.

4. Ensemble de solutions sur $[0; 7]$.

On calcule les valeurs approchées : $3 - \sqrt{13} \approx -0,61$ et $3 + \sqrt{13} \approx 6,61$.

En intersectant avec $[0; 7]$:

$3 - \sqrt{13} < 0$ donc la borne inférieure devient 0.

$3 + \sqrt{13} \approx 6,61 < 7$ donc la borne supérieure reste $3 + \sqrt{13}$.

L'objet se trouve à plus de 3 m du sol pour $t \in [0; 3 + \sqrt{13}[$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q2 : 1 pt (calculer, modéliser) ; Q3 : 3 pts (calculer) ; Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

Corrigé

1. Étude de $f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$.

a) Développement.

$$f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} = x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{25}{4} = x^2 - 3x - \frac{16}{4} = x^2 - 3x - 4.$$

b) Factorisation.

La forme canonique est $f(x) = (x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = \frac{3}{2}$ et $\beta = -\frac{25}{4}$.

Comme $a = 1$ et $\beta = -\frac{25}{4} < 0$, les racines sont :

$$x_{1,2} = \alpha \pm \sqrt{-\frac{\beta}{a}} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{3}{2} \pm \frac{5}{2}.$$

$$x_1 = \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3}{2} + \frac{5}{2} = 4.$$

Donc $f(x) = (x + 1)(x - 4)$.

c) Tableau de signes.

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$		
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

2. Étude de $g(x) = 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 9$.

a) Développement.

$$g(x) = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) - 9 = 4x^2 + 4x + 1 - 9 = 4x^2 + 4x - 8.$$

b) Factorisation et tableau de signes.

$$g(x) = 4(x^2 + x - 2).$$

On cherche les racines de $x^2 + x - 2 = 0$:

$$\Delta = 1 + 8 = 9, \quad x_1 = \frac{-1 - 3}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{-1 + 3}{2} = 1.$$

Donc $g(x) = 4(x + 2)(x - 1)$.

Tableau de signes ($a = 4 > 0$) :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Barème indicatif : Q1a : 1 pt (calculer); Q1b : 2 pts (raisonner); Q1c : 1 pt (raisonner); Q2a : 1 pt (calculer); Q2b : 2 pts (calculer, raisonner)

Corrigé

1. Système d'équations.

- ▶ $A(0; -3) : f(0) = c = -3.$
- ▶ $B(1; 0) : f(1) = a + b + c = 0.$
- ▶ $C(-3; 0) : f(-3) = 9a - 3b + c = 0.$

Le système est :

$$\begin{cases} c = -3 \\ a + b + c = 0 \\ 9a - 3b + c = 0 \end{cases}$$

2. Résolution du système.

De $c = -3$ et $a + b + c = 0 : a + b = 3.$

De $c = -3$ et $9a - 3b + c = 0 : 9a - 3b = 3$, soit $3a - b = 1.$

En ajoutant $a + b = 3$ et $3a - b = 1 :$

$$4a = 4 \Rightarrow a = 1.$$

Puis $b = 3 - a = 2.$

Donc $f(x) = x^2 + 2x - 3.$

3. Forme canonique.

$$\alpha = -\frac{2}{2} = -1, \quad \beta = f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4.$$

$$f(x) = (x + 1)^2 - 4.$$

4. Factorisation et vérification des racines.

Depuis la forme canonique : $\alpha = -1, \beta = -4 < 0$, racines :

$$x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{4} = -1 \pm 2.$$

$x_1 = -3$ et $x_2 = 1$, donc $f(x) = (x + 3)(x - 1).$

Vérification : $B(1; 0)$ car $f(1) = (1 + 3)(1 - 1) = 0$; $C(-3; 0)$ car $f(-3) = 0.$

□

5. Tableau de signes de f .

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (raisonner); Q2 : 2 pts (calculer); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 2 pts (calculer, communiquer); Q5 : 1 pt (raisonner)

Corrigé

1. Quantité optimale et profit maximal.

$P(x) = -x^2 + 14x - 40$: on a $a = -1, b = 14, c = -40.$

$$\alpha = -\frac{14}{2 \times (-1)} = 7.$$

$$\beta = P(7) = -49 + 98 - 40 = 9.$$

La quantité optimale est $x = 7$ (centaines d'unités), et le profit maximal est **9 000 €**.

2. Intervalle de rentabilité ($P(x) > 0$).

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 14x + 40 = 0.$$

$$\Delta = 196 - 160 = 36.$$

$$x_1 = \frac{14 - 6}{2} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{14 + 6}{2} = 10.$$

Comme $a = -1 < 0$, $P(x) > 0$ entre les racines : l'entreprise est rentable pour $x \in]4; 10[$.

3. Condition $P(x) \geq 5$.

a) Reformulation.

$$P(x) \geq 5 \Leftrightarrow -x^2 + 14x - 40 \geq 5 \Leftrightarrow -x^2 + 14x - 45 \geq 0. \quad \square$$

b) Résolution de $-x^2 + 14x - 45 \geq 0$.

On pose $Q(x) = -x^2 + 14x - 45$, avec $a = -1$, $b = 14$, $c = -45$.

$$\Delta = 196 - 4 \times (-1) \times (-45) = 196 - 180 = 16.$$

$$x_1 = \frac{-14 + 4}{-2} = 5 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-14 - 4}{-2} = 9.$$

Comme $a = -1 < 0$, $Q(x) \geq 0$ pour $x \in [5; 9]$.

Interprétation : pour obtenir un profit d'au moins 5 000 €, l'entreprise doit produire entre 500 et 900 unités par mois.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner); Q2 : 3 pts (calculer, raisonner, communiquer); Q3a : 1 pt (raisonner); Q3b : 2 pts (calculer, communiquer)

Corrigé

1. Expression de l'aire $A(x)$.

Les deux côtés de l'angle droit ont pour longueurs $(x + 4)$ et $(6 - x)$.

$$A(x) = \frac{1}{2}(x + 4)(6 - x) = \frac{1}{2}(6x - x^2 + 24 - 4x) = \frac{1}{2}(-x^2 + 2x + 24).$$

$$\text{Donc } A(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 12. \quad \square$$

2. Valeur de x maximisant l'aire.

On étudie $A(x) = \frac{1}{2}(-x^2 + 2x + 24)$. Le sommet de $-x^2 + 2x + 24$ est en :

$$\alpha = -\frac{2}{2 \times (-1)} = 1.$$

Comme $\alpha = 1 \in]0; 6[$, le maximum de A est atteint en $x = 1$:

$$A(1) = \frac{1}{2}(-1 + 2 + 24) = \frac{25}{2} = 12,5 \text{ cm}^2.$$

3. Inéquation $A(x) > 10$.

a) Reformulation.

$$A(x) > 10 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(-x^2 + 2x + 24) > 10 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 24 > 20 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 4 > 0. \quad \square$$

b) Résolution de $-x^2 + 2x + 4 > 0$.

$$a = -1, b = 2, c = 4.$$

$$\Delta = 4 - 4 \times (-1) \times 4 = 4 + 16 = 20.$$

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{-2} = 1 \mp \sqrt{5}.$$

Donc $x_1 = 1 - \sqrt{5}$ et $x_2 = 1 + \sqrt{5}$.

Comme $a = -1 < 0$, l'inéquation est satisfaite pour $x \in]1 - \sqrt{5}; 1 + \sqrt{5}[$.

c) Intersection avec $]0; 6[$.

$$1 - \sqrt{5} \approx -1,24 < 0 \text{ et } 1 + \sqrt{5} \approx 3,24 < 6.$$

L'ensemble des valeurs acceptables est $x \in]0; 1 + \sqrt{5}[$.

4. Résolution de $A(x) \geq 8$ dans $]0; 6[$.

$$A(x) \geq 8 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 24 \geq 16 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 8 \geq 0.$$

On résout $-x^2 + 2x + 8 = 0$: $a = -1, b = 2, c = 8$.

$$\Delta = 4 + 32 = 36.$$

$$x_1 = \frac{-2 - 6}{-2} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2 + 6}{-2} = -2.$$

Comme $a = -1 < 0$, $-x^2 + 2x + 8 \geq 0$ pour $x \in [-2; 4]$.

En intersectant avec $]0; 6[$, l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} =]0; 4]$.

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser, calculer) ; Q2 : 2 pts (calculer) ; Q3a : 1 pt (calculer) ; Q3b : 2 pts (calculer) ; Q3c : 1 pt (raisonner) ; Q4 : 2 pts (calculer, raisonner)

Corrigé

1. Formes du trinôme.

a) Coefficients.

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 : a = 1, b = -4, c = 3.$$

b) Forme canonique et sommet.

$$\alpha = -\frac{-4}{2} = 2, \quad \beta = f(2) = 4 - 8 + 3 = -1.$$

Forme canonique : $f(x) = (x - 2)^2 - 1$.

Le sommet est $S(2; -1)$.

c) Discriminant et racines.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 16 - 12 = 4.$$

$$x_1 = \frac{4 - 2}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{4 + 2}{2} = 3.$$

d) Forme factorisée.

$$f(x) = (x - 1)(x - 3).$$

2. Représentation graphique.

a) Orientation.

Comme $a = 1 > 0$, la parabole est tournée vers le haut (concave vers le bas).

b) Allure. On place le sommet $S(2; -1)$, les racines $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$, et l'ordonnée à l'origine $f(0) = 3$.

c) Axe de symétrie.

L'axe de symétrie est la droite verticale $x = \alpha = 2$.

On vérifie : $\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{1 + 3}{2} = 2$. Les racines sont symétriques par rapport à $x = 2$. □

3. Tableau de signes et position relative.

a) Tableau de signes.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$		
$f(x)$		+	0	-	0	+

b) Inéquation $f(x) < 0$.

$\mathcal{S} =]1; 3[$.

c) Courbe sous l'axe des abscisses.

La courbe est au-dessous de l'axe pour $x \in]1; 3[$.

4. Intersection avec la droite $d : y = x - 1$.

a) Équation d'intersection.

$$f(x) = x - 1 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = x - 1 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0. \quad \square$$

b) Résolution.

$$\Delta = 25 - 16 = 9, \text{ donc } x_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \text{ et } x_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

Les points d'intersection ont pour abscisses $x = 1$ et $x = 4$.

Pour $x = 1 : y = 1 - 1 = 0$, point $I_1(1; 0)$.

Pour $x = 4 : y = 4 - 1 = 3$, point $I_2(4; 3)$.

c) Conclusion.

La droite d est **sécante** à la parabole (deux points d'intersection distincts, car $\Delta = 9 > 0$).

Barème indicatif : Q1 : 4 pts (calculer, communiquer); Q2 : 3 pts (raisonner, communiquer); Q3 : 3 pts (raisonner); Q4 : 4 pts (chercher, calculer, communiquer)

Corrigé

1. Étude de $f(x) = x^2 - 5x + 4$.

a) Discriminant et racines.

$$\Delta_f = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 25 - 16 = 9.$$

$$x_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

b) Tableau de signes de f .

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$		
$f(x)$		+	0	-	0	+

2. Étude de $g(x) = -x^2 + 3x + 4$.

a) Discriminant et racines.

$$\Delta_g = 3^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 9 + 16 = 25.$$

$$x_1 = \frac{-3-5}{-2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-3+5}{-2} = -1.$$

On calcule directement : $x_1 = \frac{-3-5}{2 \times (-1)} = 4$ et $x_2 = \frac{-3+5}{2 \times (-1)} = -1$.

Donc les racines sont -1 et 4 .

b) Tableau de signes de g .

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$
$g(x)$		$-$	$+$	$-$

c) Racine commune.

f et g ont toutes deux 4 comme racine : les deux paraboles se coupent sur l'axe des abscisses au point $(4; 0)$.

3. Système $f(x) < 0$ et $g(x) > 0$.

D'après les tableaux :

- $f(x) < 0$ sur $]1; 4[$,
- $g(x) > 0$ sur $] -1; 4[$.

L'intersection est $]1; 4[\cap] -1; 4[=]1; 4[$.

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} =]1; 4[$.

4. Inéquation produit $f(x) \times g(x) \leq 0$.

a) Tableau de signes du produit.

x	$-\infty$	-1	1	4	$+\infty$
$f(x)$		$+$	$+$	0	$-$
$g(x)$		$-$	0	$+$	$+$
$f \times g$		$-$	0	$+$	$-$

b) Solutions.

$f(x) \times g(x) \leq 0$ sur $]-\infty; -1] \cup [1; 4] \cup [4; +\infty[$.

En simplifiant : $\mathcal{S} =]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$.

5. Inéquation $f(x) + g(x) \leq 0$.

a) Calcul de $h(x) = f(x) + g(x)$.

$$h(x) = (x^2 - 5x + 4) + (-x^2 + 3x + 4) = -2x + 8.$$

h est une fonction affine, non un trinôme.

b) Résolution de $h(x) \leq 0$.

$$-2x + 8 \leq 0 \Leftrightarrow x \geq 4. \text{ Donc } \mathcal{S} = [4; +\infty[.$$

c) Remarque.

La solution de la question 3 était $]1; 4[$ et celle de $h \leq 0$ est $[4; +\infty[$. Ce sont des ensembles différents : la condition $f + g \leq 0$ est plus restrictive que la condition $f < 0$ et $g > 0$ simultanément.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q2 : 3 pts (calculer, raisonner, communiquer) ; Q3 : 2 pts (raisonner) ; Q4 : 3 pts (raisonner, calculer) ; Q5 : 3 pts (chercher, calculer, communiquer)

Corrigé

1. Modélisation.

a) Expression de y .

$$2(x + y) = 20 \implies y = 10 - x.$$

b) Aire $A(x)$.

$$A(x) = x \cdot y = x(10 - x) = -x^2 + 10x.$$

2. Étude de la fonction aire.

a) Forme canonique.

$$A(x) = -(x^2 - 10x) = -(x^2 - 10x + 25) + 25 = -(x - 5)^2 + 25.$$

b) Maximum.

Comme $a = -1 < 0$, la parabole est tournée vers le bas et le maximum est atteint en $x = \alpha = 5$.

$$A_{\max} = A(5) = -(5 - 5)^2 + 25 = 25 \text{ m}^2.$$

L'aire maximale est 25 m^2 , atteinte pour $x = 5 \text{ m}$.

c) Nature géométrique.

Si $x = 5 \text{ m}$, alors $y = 10 - 5 = 5 \text{ m}$. L'enclos est un **carré** de côté 5 m . Le carré maximise l'aire à périmètre fixé.

3. Contrainte $3 \leq x \leq 8$.

a) Compatibilité.

$3 \leq 5 \leq 8$: oui, la valeur optimale $x = 5$ est compatible avec la contrainte.

b) Aire maximale.

L'aire maximale réalisable sous cette contrainte est donc $A(5) = 25 \text{ m}^2$, inchangée.

4. Inéquation $A(x) \geq 21$.

a) Reformulation.

$$-x^2 + 10x \geq 21 \iff 0 \geq x^2 - 10x + 21 \iff x^2 - 10x + 21 \leq 0.$$

□

b) Résolution.

$$a = 1, b = -10, c = 21 : \Delta = 100 - 84 = 16.$$

$$x_1 = \frac{10 - 4}{2} = 3 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{10 + 4}{2} = 7.$$

Comme $a = 1 > 0$, $x^2 - 10x + 21 \leq 0$ pour $x \in [3; 7]$.

Les valeurs de x compatibles avec $A(x) \geq 21$ sont $x \in [3; 7]$.

5. Question ouverte : avec un mur existant.

Avec un mur comme l'un des côtés de longueur x , la clôture ne couvre que trois côtés :

$$x + 2y = 20 \implies y = \frac{20 - x}{2} = 10 - \frac{x}{2}.$$

L'aire devient :

$$B(x) = x \cdot y = x \left(10 - \frac{x}{2} \right) = 10x - \frac{x^2}{2}.$$

$$\text{Le sommet est en } \alpha = -\frac{10}{2 \times (-\frac{1}{2})} = 10, \text{ avec } B(10) = 100 - 50 = 50 \text{ m}^2.$$

La longueur optimale du côté parallèle au mur est $x = 10$ m, donnant une aire maximale de 50 m^2 , soit le double de 25 m^2 .

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser) ; Q2 : 3 pts (calculer, raisonner, communiquer) ; Q3 : 2 pts (raisonner) ; Q4 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q5 : 3 pts (chercher, modéliser, communiquer)

Corrigé

1. Discriminant en fonction de m .

a) Calcul de $\Delta(m)$.

$$\Delta(m) = (-2m)^2 - 4 \times 1 \times (m^2 - m - 2) = 4m^2 - 4m^2 + 4m + 8 = 4m + 8.$$

b) Signe de $\Delta(m)$ et nombre de racines.

$$\Delta(m) = 4(m + 2).$$

- ▶ Si $m < -2$: $\Delta < 0$, pas de racine réelle.
- ▶ Si $m = -2$: $\Delta = 0$, une racine double.
- ▶ Si $m > -2$: $\Delta > 0$, deux racines réelles distinctes.

2. Cas particuliers.

a) Pour $m = 0$.

$$f_0(x) = x^2 - 2 : \Delta = 8, \text{ donc } x_{1,2} = \pm\sqrt{2}.$$

b) Pour $m = -2$.

$$f_{-2}(x) = x^2 + 4x + (4 + 2 - 2) = x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2.$$

Racine double : $x_0 = -2$. On vérifie : $f_{-2}(-2) = 0$. □

c) Pour $m = 2$.

$$f_2(x) = x^2 - 4x + (4 - 2 - 2) = x^2 - 4x. \Delta = 16, \text{ racines :}$$

$$x_1 = \frac{4 - 4}{2} = 0 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{4 + 4}{2} = 4.$$

La racine $x_1 = 0$ est remarquable.

3. Forme canonique.

a) Forme canonique de f_m .

$$\alpha = m, \quad \beta = f_m(m) = m^2 - 2m^2 + m^2 - m - 2 = -m - 2.$$

$$f_m(x) = (x - m)^2 - (m + 2).$$

b) Sommet en fonction de m .

Le sommet est $S(m; -m - 2)$: ses coordonnées dépendent toutes deux de m . Lorsque m varie, le sommet se déplace le long de la droite d'équation $\beta = -\alpha - 2$.

4. Valeurs de m pour lesquelles 0 est racine.

a) Condition.

$$f_m(0) = m^2 - m - 2 = 0.$$

$$\Delta_m = 1 + 8 = 9, \text{ donc } m = \frac{1 \pm 3}{2}, \text{ c'est-à-dire } m = -1 \text{ ou } m = 2.$$

b) Factorisation pour ces valeurs.

$$\text{Pour } m = -1 : f_{-1}(x) = x^2 + 2x + 0 = x(x + 2).$$

$$\text{Pour } m = 2 : f_2(x) = x^2 - 4x + 0 = x(x - 4).$$

5. Question ouverte : deux racines strictement positives.

Pour $f_m(x) = x^2 - 2mx + (m^2 - m - 2)$, les relations coefficients-racines donnent :

$$x_1 + x_2 = 2m \quad \text{et} \quad x_1 \cdot x_2 = m^2 - m - 2.$$

Conditions pour deux racines strictement positives :

1. $\Delta(m) > 0 \Leftrightarrow m > -2$.
2. $x_1 + x_2 > 0 \Leftrightarrow 2m > 0 \Leftrightarrow m > 0$.
3. $x_1 \cdot x_2 > 0 \Leftrightarrow m^2 - m - 2 > 0 \Leftrightarrow (m - 2)(m + 1) > 0 \Leftrightarrow m < -1 \text{ ou } m > 2$.

L'intersection des trois conditions : $m > -2$ et $m > 0$ et $(m < -1 \text{ ou } m > 2)$.

La condition $m > 0$ exclut $m < -1$, donc : $m > 0$ et $m > 2$, soit $m > 2$.

f_m admet deux racines strictement positives si et seulement si $m > 2$.

Barème indicatif : Q1 : 3 pts (calculer, raisonner); Q2 : 3 pts (calculer); Q3 : 2 pts (calculer, communiquer); Q4 : 2 pts (calculer); Q5 : 4 pts (chercher, raisonner, communiquer)

Corrigé**1. Recettes et bénéfice.**

a) Recette $R(x)$.

$$R(x) = x \cdot p(x) = x \left(15 - \frac{x}{10} \right) = 15x - \frac{x^2}{10}.$$

b) Bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$.

$$B(x) = 15x - \frac{x^2}{10} - (200 + 5x) = -\frac{x^2}{10} + 10x - 200.$$

□

2. Optimum de production.

a) Forme canonique.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{10}{2 \times (-\frac{1}{10})} = -\frac{10}{-\frac{1}{5}} = 50.$$

$$\beta = B(50) = -\frac{2500}{10} + 500 - 200 = -250 + 500 - 200 = 50.$$

$$B(x) = -\frac{1}{10}(x - 50)^2 + 50.$$

b) Maximum.

Pour $x = 50$ unités, le bénéfice est maximal : $B_{\max} = 50$ €.

c) Compatibilité.

$0 \leq 50 \leq 100$: la contrainte est satisfaite.

3. Seuil de rentabilité.

a) Reformulation.

$$B(x) > 0 \Leftrightarrow -\frac{x^2}{10} + 10x - 200 > 0 \Leftrightarrow x^2 - 100x + 2000 < 0.$$

□

b) Discriminant et racines.

$$\Delta = 100^2 - 4 \times 2000 = 10000 - 8000 = 2000.$$

$$\sqrt{2000} = \sqrt{400 \times 5} = 20\sqrt{5}.$$

$$x_{1,2} = \frac{100 \pm 20\sqrt{5}}{2} = 50 \pm 10\sqrt{5}.$$

c) Intervalle de rentabilité.

$10\sqrt{5} \approx 22,4$, donc $x_1 \approx 27,6$ et $x_2 \approx 72,4$.

L'entreprise est bénéficiaire pour $x \in]28; 72[$ (valeurs arrondies à l'unité).

4. Équation de seuil $B(x) = 32$.

a) Équation à résoudre.

$$-\frac{x^2}{10} + 10x - 232 = 0 \iff x^2 - 100x + 2320 = 0.$$

b) Résolution.

$$\Delta = 10000 - 9280 = 720 = 144 \times 5, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 12\sqrt{5}.$$

$$x_{1,2} = \frac{100 \pm 12\sqrt{5}}{2} = 50 \pm 6\sqrt{5}.$$

Il y a deux solutions : $x_1 = 50 - 6\sqrt{5} \approx 36,6$ et $x_2 = 50 + 6\sqrt{5} \approx 63,4$.

Interprétation : un bénéfice de 32 € est atteint pour deux niveaux de production différents, l'un inférieur à l'optimal (50 unités) et l'autre supérieur.

5. Question ouverte : nouveau tarif $p'(x) = 20 - \frac{x}{5}$.

$$R'(x) = x\left(20 - \frac{x}{5}\right) = 20x - \frac{x^2}{5}.$$

$$B'(x) = 20x - \frac{x^2}{5} - 200 - 5x = -\frac{x^2}{5} + 15x - 200.$$

$$\text{Sommet : } \alpha' = -\frac{15}{2 \times (-\frac{1}{5})} = \frac{15}{\frac{2}{5}} = \frac{15 \times 5}{2} = \frac{75}{2} = 37,5.$$

$$\text{Mais } 37,5 \leq 100, \text{ donc } B'_{\max} = B'(37,5) = -\frac{37,5^2}{5} + 15 \times 37,5 - 200 = -281,25 + 562,5 - 200 = 81,25 \text{ €}.$$

Comparaison : $B'_{\max} = 81,25 > 50 = B_{\max}$. Le tarif dégressif plus élevé p' est préférable pour les faibles volumes ($x \leq 37,5$), mais impose un prix de vente plus élevé qui limite la demande. Il faut choisir p' si on peut vendre 38 unités ou moins, car le bénéfice par unité y est plus favorable.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (modéliser, calculer); Q2 : 3 pts (calculer, raisonner); Q3 : 3 pts (calculer, raisonner, communiquer); Q4 : 2 pts (calculer, communiquer); Q5 : 4 pts (chercher, modéliser, communiquer)

Corrigé

1. Mise en équation.

a) Calcul des composantes de la vitesse initiale.

$$v_0 \cos(45^\circ) = 20 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 10\sqrt{2} \text{ m/s}.$$

$$v_0 \sin(45^\circ) = 10\sqrt{2} \text{ m/s}.$$

b) Expressions de $x(t)$ et $y(t)$.

$$x(t) = 10\sqrt{2}t \quad \text{et} \quad y(t) = 2 + 10\sqrt{2}t - 5t^2.$$

2. Hauteur maximale.

a) Identification des coefficients.

$$y(t) = -5t^2 + 10\sqrt{2}t + 2 : a = -5, b = 10\sqrt{2}, c = 2.$$

b) Forme canonique.

$$\alpha = -\frac{10\sqrt{2}}{2 \times (-5)} = \frac{10\sqrt{2}}{10} = \sqrt{2}.$$

$$\beta = y(\sqrt{2}) = 2 + 10\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} - 5 \times 2 = 2 + 20 - 10 = 12.$$

$$y(t) = -5(t - \sqrt{2})^2 + 12.$$

La hauteur maximale est $\beta = 12$ m.

c) Instant et position horizontale.

Le maximum est atteint à $t^* = \sqrt{2}$ s.

Position horizontale : $x(t^*) = 10\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 20$ m.

3. Équation de la trajectoire.

a) Exprimer t en fonction de x .

$$\text{De } x(t) = 10\sqrt{2}t : t = \frac{x}{10\sqrt{2}}.$$

b) Substitution dans $y(t)$.

$$y = 2 + 10\sqrt{2} \cdot \frac{x}{10\sqrt{2}} - 5 \times \left(\frac{x}{10\sqrt{2}} \right)^2 = 2 + x - 5 \times \frac{x^2}{200} = 2 + x - \frac{x^2}{40}.$$

$$\text{Donc } y(x) = -\frac{x^2}{40} + x + 2.$$

□

c) Interprétation.

La trajectoire est une parabole car y est une fonction polynomiale de degré 2 en x (coefficient de x^2 non nul).

4. Portée.

a) Équation $y(x) = 0$.

$$-\frac{x^2}{40} + x + 2 = 0 \iff x^2 - 40x - 80 = 0.$$

$$\Delta = 1600 + 320 = 1920 = 64 \times 30, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 8\sqrt{30}.$$

b) Portée (valeur positive).

$$x = \frac{40 + 8\sqrt{30}}{2} = 20 + 4\sqrt{30}.$$

$$4\sqrt{30} \approx 4 \times 5,477 \approx 21,9, \text{ donc la portée est } \approx 41,9 \text{ m.}$$

5. Question ouverte : obstacle à $x = 30$ m.

$$y(30) = -\frac{900}{40} + 30 + 2 = -22,5 + 32 = 9,5 \text{ m.}$$

Comme $9,5 > 3$, le ballon passe **bien au-dessus** de l'obstacle.

Avec un angle plus faible (ex. 30°), la trajectoire serait moins haute mais plus longue, ce qui pourrait permettre ou non de passer l'obstacle selon les valeurs — un raisonnement qualitatif indique qu'un angle plus faible réduirait la hauteur à $x = 30$ m et risquerait de faire percuter l'obstacle.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer) ; Q2 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 3 pts (chercher, calculer, communiquer) ; Q4 : 3 pts (calculer) ; Q5 : 3 pts (chercher, raisonner, communiquer)

Corrigé

1. Substitution $X = x^2$.

a) Équation en X .

En posant $X = x^2$, l'équation $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ devient :

$$X^2 - 5X + 4 = 0.$$

b) Résolution de l'équation en X .

$$\Delta = 25 - 16 = 9.$$

$$X_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

c) Compatibilité avec $X \geq 0$.

$X_1 = 1 \geq 0$ et $X_2 = 4 \geq 0$: les deux valeurs sont compatibles.

2. Solutions de l'équation initiale.

a) Résolution de $x^2 = X$.

Pour $X_1 = 1$: $x^2 = 1 \Rightarrow x = -1$ ou $x = 1$.

Pour $X_2 = 4$: $x^2 = 4 \Rightarrow x = -2$ ou $x = 2$.

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{-2; -1; 1; 2\}$.

b) Vérification.

Pour $x = \pm 1$: $(\pm 1)^4 - 5(\pm 1)^2 + 4 = 1 - 5 + 4 = 0$. □

Pour $x = \pm 2$: $(\pm 2)^4 - 5(\pm 2)^2 + 4 = 16 - 20 + 4 = 0$. □

3. Factorisation.

a) Produit de deux trinômes du second degré.

$$x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4).$$

b) Factorisation complète.

$$(x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2).$$

4. Tableau de signes.

a) Tableau de signes de $(x - 2)(x - 1)(x + 1)(x + 2)$.

x	$-\infty$	-2	-1	1	2	$+\infty$
$P(x)$		+	0	-	0	+

b) Inéquation $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$.

D'après le tableau, $P(x) \leq 0$ sur $\mathcal{S} = [-2; -1] \cup [1; 2]$.

c) Inéquation $x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0$.

$P(x) \geq 0$ sur $\mathcal{S} =]-\infty; -2] \cup [-1; 1] \cup [2; +\infty[$.

5. Question ouverte : $x^4 - 5x^2 + k = 0$.

En posant $X = x^2$, on obtient $X^2 - 5X + k = 0$, de discriminant $\Delta_k = 25 - 4k$.

Cas 1 : $k > \frac{25}{4}$ ($\Delta_k < 0$). Aucune solution réelle en X , donc aucune solution réelle en x .

Cas 2 : $k = \frac{25}{4}$ ($\Delta_k = 0$). Une racine double $X_0 = \frac{5}{2} > 0$, donnant $x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}$: deux solutions réelles.

Cas 3 : $0 < k < \frac{25}{4}$ ($\Delta_k > 0$). Deux racines $X_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4k}}{2}$, toutes deux positives (car $X_1 X_2 = k > 0$ et $X_1 + X_2 = 5 > 0$). Chacune donne deux racines en x : quatre solutions réelles.

Cas 4 : $k = 0$. $X_1 = 0$ et $X_2 = 5$: $X_1 = 0$ donne $x = 0$, $X_2 = 5$ donne $x = \pm\sqrt{5}$. Trois solutions réelles (0 est de multiplicité 2 mais compté une fois).

Cas 5 : $k < 0$. $X_1 < 0$ et $X_2 > 0$ (car $X_1 X_2 = k < 0$). Seul $X_2 > 0$ convient, donnant deux solutions réelles $x = \pm\sqrt{X_2}$.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer) ; Q2 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 2 pts (calculer) ; Q4 : 4 pts (raisonner) ; Q5 : 4 pts (chercher, raisonner, communiquer)

Corrigé

1. Modélisation.

a) Relation entre x , y et la longueur de clôture.

La clôture couvre les trois côtés non occupés par le mur :

$$x + 2y = 60.$$

b) Expression de y en fonction de x .

$$y = \frac{60 - x}{2} = 30 - \frac{x}{2}.$$

Vérification : si $0 < x \leq 30$, alors $y = 30 - \frac{x}{2} \geq 30 - 15 = 15 > 0$. □

c) Aire $A(x)$.

$$A(x) = x \cdot y = x \left(30 - \frac{x}{2} \right) = 30x - \frac{x^2}{2}.$$

□

2. Optimisation.

a) Forme canonique.

$$\alpha = 30, \quad \beta = A(30) = 900 - \frac{900}{2} = 450.$$

$$A(x) = -\frac{1}{2}(x - 30)^2 + 450.$$

b) Compatibilité.

$\alpha = 30 \in]0 ; 30]$: la valeur optimale est exactement à la borne supérieure du domaine.

c) Aire maximale et dimensions.

L'aire maximale est $\beta = 450 \text{ m}^2$, atteinte pour $x = 30 \text{ m}$.

Pour $x = 30$: $y = 30 - 15 = 15 \text{ m}$. L'enclos optimal mesure $30 \text{ m} \times 15 \text{ m}$.

3. Comparaison sans mur.

Sans mur, le périmètre est $2(x + y) = 60$, soit $x + y = 30$. L'aire est $A'(x) = x(30 - x)$.

Maximum en $x = 15$: $A'_{\max} = 15 \times 15 = 225 \text{ m}^2$.

Apport du mur : $\frac{450}{225} = 2$. Le mur permet de **doubler** l'aire maximale, car il économise une longueur de clôture, permettant d'agrandir les autres côtés.

4. Contrainte d'aire minimale $A(x) \geq 400$.a) *Reformulation.*

$$30x - \frac{x^2}{2} \geq 400 \iff -\frac{x^2}{2} + 30x - 400 \geq 0 \iff x^2 - 60x + 800 \leq 0. \quad \square$$

b) *Résolution.*

$$\Delta = 3600 - 3200 = 400.$$

$$x_1 = \frac{60 - 20}{2} = 20 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{60 + 20}{2} = 40.$$

Comme $a = 1 > 0$, $x^2 - 60x + 800 \leq 0$ pour $x \in [20; 40]$.c) *Valeurs de x réalisables.*On intersecte avec $]0; 30]$: $[20; 40] \cap]0; 30] = [20; 30]$.Les valeurs de x réalisables avec une aire d'au moins 400 m^2 sont $x \in [20; 30]$.**5. Question ouverte : supplément de clôture.**Avec $60 + L$ mètres de clôture ($L > 0$) :

$$x + 2y = 60 + L \implies y = \frac{60 + L - x}{2}.$$

$$A(x) = x \cdot \frac{60 + L - x}{2} = \frac{1}{2} [(60 + L)x - x^2].$$

Le maximum est atteint en $\alpha = \frac{60 + L}{2}$ (si $\alpha \leq 30$, sinon en $x = 30$).Si $\frac{60 + L}{2} \leq 30$, c'est-à-dire $L \leq 0$, hors domaine. Donc pour $L > 0$, le sommet est en $\alpha = \frac{60 + L}{2} > 30$, et la fonction est croissante sur $]0; 30]$.Le maximum sur $]0; 30]$ est alors atteint en $x = 30$:

$$A_{\max}(L) = 30 \cdot \frac{60 + L - 30}{2} = 30 \cdot \frac{30 + L}{2} = 15(30 + L) = 450 + 15L.$$

On cherche $A_{\max}(L) \geq 600$:

$$450 + 15L \geq 600 \implies 15L \geq 150 \implies L \geq 10.$$

L'agriculteur doit acheter au minimum **10 m** de clôture supplémentaire pour atteindre une aire de 600 m^2 .

Barème indicatif : Q1 : 3 pts (modéliser, calculer) ; Q2 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q4 : 3 pts (calculer, raisonner) ; Q5 : 4 pts (chercher, modéliser, calculer, communiquer)

Corrigé**1. Identification des coefficients.**Le trinôme $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec :

$$a = 3, \quad b = 2, \quad c = -1.$$

2. Coordonnées du sommet.

L'abscisse du sommet est :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \times 3} = -\frac{1}{3}.$$

L'ordonnée du sommet est :

$$\beta = f\left(-\frac{1}{3}\right) = 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 2 \times \left(-\frac{1}{3}\right) - 1 = \frac{3}{9} - \frac{2}{3} - 1 = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} - \frac{3}{3} = -\frac{4}{3}.$$

Le sommet est $S\left(-\frac{1}{3}; -\frac{4}{3}\right)$.

3. Forme canonique.

On a $a = 3$, $\alpha = -\frac{1}{3}$, $\beta = -\frac{4}{3}$, donc :

$$f(x) = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{4}{3}.$$

4. Vérification de la forme factorisée.

On développe $3(x+1)\left(x - \frac{1}{3}\right)$:

$$3(x+1)\left(x - \frac{1}{3}\right) = 3\left(x^2 - \frac{1}{3}x + x - \frac{1}{3}\right) = 3\left(x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}\right) = 3x^2 + 2x - 1.$$

On retrouve bien $f(x)$. □

Corrigé

1. Discriminant et racines.

$$\Delta = b^2 - 4ac = 8^2 - 4 \times (-2) \times (-6) = 64 - 48 = 16.$$

$\Delta > 0$, donc g admet deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{-8 - \sqrt{16}}{2 \times (-2)} = \frac{-12}{-4} = 3, \quad x_2 = \frac{-8 + \sqrt{16}}{2 \times (-2)} = \frac{-4}{-4} = 1.$$

2. Forme factorisée.

$$g(x) = -2(x-1)(x-3).$$

3. Signe de $g(x)$.

Comme $a = -2 < 0$, $g(x)$ est positif entre les racines et négatif à l'extérieur :

$$g(0) = -6 < 0, \quad g(2) = 2 > 0, \quad g(4) = -6 < 0.$$

Donc $g(x) \geq 0$ pour $x \in [1; 3]$ et $g(x) \leq 0$ pour $x \in]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[$.

Corrigé

1. Sommet de la parabole.

$$t_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{10}{2 \times (-5)} = 1.$$

$$h(1) = -5 \times 1^2 + 10 \times 1 + 1 = -5 + 10 + 1 = 6.$$

Le sommet est $S(1; 6)$.

2. Hauteur maximale.

Comme $a = -5 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : le sommet correspond à un maximum. La hauteur maximale est donc **6 m**, atteinte à l'instant $t = 1$ s.

3. Tableau de variations.

t	0	1	2
$h(t)$	1	↗ 6	↘ 1

4. Interprétation de $h(0)$.

$$h(0) = -5 \times 0 + 10 \times 0 + 1 = 1.$$

$h(0) = 1$ m correspond à la hauteur de la main du jongleur au moment du lancer.

Corrigé**1. Mise en équation.**

On cherche x tel que $C(x) = 300$, soit :

$$x^2 - 40x + 500 = 300 \iff x^2 - 40x + 200 = 0.$$

2. Discriminant.

Avec $a = 1$, $b = -40$, $c = 200$:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-40)^2 - 4 \times 1 \times 200 = 1\,600 - 800 = 800.$$

3. Résolution et conclusion.

$\Delta > 0$, donc l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{40 - \sqrt{800}}{2} = 20 - 10\sqrt{2} \approx 5,86, \quad x_2 = \frac{40 + \sqrt{800}}{2} = 20 + 10\sqrt{2} \approx 34,14.$$

Les deux solutions appartiennent à l'intervalle $[0; 60]$. Dans le contexte, le nombre de bracelets étant un entier, l'entreprise atteint un coût de 300 € pour environ 6 bracelets ou pour environ 34 bracelets produits.

Corrigé**1. Résolution de $B(x) = 0$.**

$$\Delta = 80^2 - 4 \times (-2) \times (-600) = 6\,400 - 4\,800 = 1\,600 = 40^2.$$

$$x_1 = \frac{-80 - 40}{2 \times (-2)} = \frac{-120}{-4} = 30, \quad x_2 = \frac{-80 + 40}{2 \times (-2)} = \frac{-40}{-4} = 10.$$

2. Signe de $B(x)$.

Comme $a = -2 < 0$, $B(x)$ est positif entre les racines et négatif à l'extérieur :

$$B(x) \geq 0 \text{ pour } x \in [10; 30], \quad B(x) < 0 \text{ pour } x \in [0; 10[\cup]30; 40].$$

3. Interprétation.

L'inéquation $B(x) \geq 0$ a pour ensemble de solutions $[10; 30]$. L'événement est donc bénéficiaire (strictement, $B(x) > 0$) pour $x \in]10; 30[$, c'est-à-dire pour un nombre de billets vendus strictement compris entre 10 et 30.

Corrigé**1. Expression de l'aire.**

Si x est la largeur, le périmètre s'écrit $2x + 2\ell = 40$, d'où $\ell = 20 - x$ (la longueur).

L'aire de l'enclos est donc :

$$A(x) = x \times \ell = x(20 - x).$$

2. Forme développée et sommet.

En développant :

$$A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x.$$

C'est bien un polynôme du second degré avec $a = -1$, $b = 20$, $c = 0$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{2 \times (-1)} = 10, \quad \beta = A(10) = 10 \times (20 - 10) = 100.$$

Le sommet est $S(10; 100)$.

3. Dimensions optimales.

Comme $a = -1 < 0$, le sommet correspond à un maximum. L'aire est donc maximale pour $x = 10$ m (largeur), soit une longueur $\ell = 20 - 10 = 10$ m : l'enclos optimal est un **carré** de côté 10 m, d'aire maximale 100 m^2 .

Corrigé

1. Forme canonique.

On factorise par -3 :

$$f(x) = -3x^2 + 6x - 3 = -3(x^2 - 2x + 1).$$

On reconnaît l'identité remarquable $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$, donc :

$$f(x) = -3(x - 1)^2.$$

2. Signe de $f(x)$.

Pour tout réel x , $(x - 1)^2 \geq 0$. En multipliant par $-3 < 0$ (ce qui inverse le sens de l'inégalité) :

$$-3(x - 1)^2 \leq 0, \quad \text{soit } f(x) \leq 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Il n'est pas nécessaire de calculer les racines ni le discriminant pour obtenir ce résultat : la forme canonique suffit.

3. Cas d'égalité.

L'égalité $f(x) = 0$ équivaut à $-3(x - 1)^2 = 0$, soit $(x - 1)^2 = 0$, soit $x = 1$. Un carré ne s'annule qu'en un seul point (sa racine), donc l'égalité $f(x) = 0$ n'est atteinte qu'au point unique $x = 1$.

Corrigé

1. Discriminant.

Pour l'équation $x^2 + 4 = 0$, on a $a = 1$, $b = 0$, $c = 4$, donc :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 0^2 - 4 \times 1 \times 4 = -16.$$

2. Interprétation.

$\Delta = -16 < 0$. Or, un trinôme du second degré à coefficients réels n'admet des racines réelles que si $\Delta \geq 0$. Donc l'équation $x^2 + 4 = 0$ n'admet **aucune solution réelle**.

3. Qui a raison ?

Le **premier élève a raison**. Son raisonnement est correct : pour tout réel x , $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 4 \geq 4 > 0$. L'expression $x^2 + 4$ ne peut donc jamais être strictement négative, et l'inéquation $x^2 + 4 < 0$ n'a effectivement aucune solution.

Le second élève commet une erreur classique : l'affirmation « une équation du second degré a toujours deux racines » n'est vraie que dans l'ensemble des nombres **complexes** (hors programme de première), et non dans l'ensemble des réels $\mathbb{R}$. Dans $\mathbb{R}$, le nombre de racines d'un trinôme dépend du signe du discriminant : deux racines si $\Delta > 0$, une racine double si $\Delta = 0$, **aucune racine réelle** si $\Delta < 0$ — ce qui est précisément le cas ici.

Dérivation : point de vue local

CHAPITRE 3

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer et interpréter un taux de variation et la pente d'une sécante.
- ▶ C2 — Je sais interpréter un nombre dérivé comme une pente ou une vitesse instantanée.
- ▶ C3 — Je sais lire un nombre dérivé sur un graphique et construire la tangente correspondante.
- ▶ C4 — Je sais écrire l'équation d'une tangente à partir de l'abscisse, de l'image et du nombre dérivé.
- ▶ C5 — Je sais approcher $f(a+h)$ avec l'approximation linéaire au voisinage de a .

À RETENIR

Un vélo équipé d'un capteur fournit la distance parcourue en fonction du temps. Comment déterminer sa vitesse exacte à l'instant $t = 12$ s, alors que les mesures disponibles donnent seulement des vitesses moyennes sur de courts intervalles ?



◆ Corrigés

Temps estimés : ◆ 10 h ◆◆ 8 h ◆◆◆ 7 h

CORRIGÉS

3.1 Taux de variation et sécantes

DÉFINITION Taux de variation

Soit f une fonction définie en deux réels distincts a et b . Le **taux de variation** de f entre a et b est le nombre

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Il mesure la variation moyenne de f lorsque la variable passe de a à b .

EXEMPLE Pour $f(x) = x^2$, entre 1 et 3, le taux de variation vaut

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4.$$

En moyenne, l'image augmente de 4 lorsque x augmente de 1 sur cet intervalle.

⚠ CONTRE-EXEMPLE L'expression $\frac{f(a) - f(a)}{a - a}$ n'est pas un taux de variation : le dénominateur est nul. Il faut deux abscisses distinctes.

◆ **PROPRIÉTÉ Pente de la sécante** Dans un repère, la droite passant par les points $A(a; f(a))$ et $B(b; f(b))$ de la courbe de f est une **sécante**. Son coefficient directeur est le taux de variation de f entre a et b .

EXEMPLE Les points $A(1; 1)$ et $B(3; 9)$ de la courbe de la fonction carré déterminent une sécante de coefficient directeur 4.




Figure 1 — La sécante (AB)

⚠ CONTRE-EXEMPLE La droite verticale passant par A n'est pas la sécante AB : elle ne passe pas en général par B et n'a pas de coefficient directeur.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $\frac{f(b) - f(a)}{b}$ oublie la distance horizontale entre les deux abscisses. Il faut diviser par $b - a$, et non par b .

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Inverser une seule différence, par exemple $\frac{f(b) - f(a)}{a - b}$, change le signe du résultat. On fixe l'ordre a puis b dans les deux lignes.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre le taux de variation avec $f(b) - f(a)$. Cette dernière quantité est une variation d'image ; le taux de variation compare aussi cette variation à celle de x .

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Pour une position $d(t)$ exprimée en mètres, le taux de variation entre deux instants est $\frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$, une vitesse moyenne en mètres par seconde. Lorsque l'intervalle de temps se resserre autour d'un instant, ces vitesses moyennes préparent la notion de vitesse instantanée étudiée dans la section suivante.

3.2 Du taux de variation au nombre dérivé**DÉFINITION Nombre dérivé**

Soit f une fonction et a un réel. Lorsque les taux de variation de f entre a et $a + h$ se rapprochent d'un même nombre lorsque h est très proche de 0, ce nombre est le **nombre dérivé** de f en a . On le note $f'(a)$.

EXEMPLE Pour la fonction carré, au voisinage de 2, les taux de variation $\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ sont proches de 4 lorsque h est proche de 0. On retient $f'(2) = 4$.

⚠ CONTRE-EXEMPLE Le nombre $f'(2)$ ne se calcule pas en remplaçant h par 0 dans le quotient : ce quotient n'est alors pas défini.

◆ PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique Si $f'(a)$ existe, il est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

EXEMPLE Si $f'(3) = -2$, la tangente descend de 2 unités quand on avance d'une unité : sa pente est négative.

⚠ CONTRE-EXEMPLE Une pente négative ne signifie pas que toutes les images de f sont négatives ; elle indique seulement un comportement local de la courbe.




Figure 2 — Les sécantes

(pointillées) convergent vers la tangente (trait plein or) lorsque $h \rightarrow 0$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : « $f'(a) = f(a)$. » **Correction :** $f(a)$ est l'ordonnée du point de la courbe ; $f'(a)$ est la pente de la tangente en ce point.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : « La vitesse instantanée est la distance parcourue. » **Correction :** si d est une distance, $d'(t)$ est une vitesse ; l'unité est par exemple m/s.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Pour $f(x) = x^2$, $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = 2a + h$ pour $h \neq 0$. Ces nombres sont aussi proches que l'on veut de $2a$ lorsque h se rapproche de 0. Ainsi $f'(a) = 2a$; ce calcul éclaire l'intuition sans imposer une définition formelle de limite.

3.3 Lire et construire une tangente

DÉFINITION Tangente

Lorsque f admet un nombre dérivé en a , la **tangente** à sa courbe au point $A(a; f(a))$ est la droite qui passe par A et dont le coefficient directeur est $f'(a)$.

EXEMPLE Si $A(2; 5)$ appartient à la courbe et si $f'(2) = -3$, la tangente passe par A et descend de 3 unités lorsque l'on avance d'une unité.

⚠ CONTRE-EXEMPLE Une droite coupant la courbe en deux points distincts est une sécante ; elle n'est pas nécessairement la tangente au premier point.

◆ **PROPRIÉTÉ Lecture sur un quadrillage** Pour déterminer graphiquement $f'(a)$, on choisit deux points lisibles sur la *droite tangente*, puis on calcule « déplacement vertical / déplacement horizontal ».

EXEMPLE Une tangente passe par les intersections $(1; 2)$ et $(3; 3)$. Sa pente vaut $\frac{3-2}{3-1} = \frac{1}{2}$.

⚠ CONTRE-EXEMPLE Prendre deux points de la courbe au lieu de deux points de la tangente donne la pente d'une sécante, pas le nombre dérivé demandé.




Figure 3 — On lit la pente de la tangente en choisissant deux points sur la droite, pas sur la courbe.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : lecture de l'ordonnée de A comme nombre dérivé. **Correction :** l'ordonnée est $f(a)$; le nombre dérivé est la pente de la droite tangente.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : droite « à peu près parallèle » ne passant pas par A. **Correction :** une tangente doit passer exactement par son point de contact.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Procédé graphique complet : 1. repérer le point de contact ; 2. tracer ou identifier la tangente ; 3. choisir deux intersections nettes de cette droite avec le quadrillage ; 4. calculer le rapport des déplacements en conservant leur signe ; 5. pour la construction, placer depuis A un second point par le même déplacement, puis relier les deux points.

3.4 Équation de la tangente

THÉORÈME Équation de la tangente

Si f admet un nombre dérivé en a , la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

L'hypothèse de dérivabilité en a est nécessaire : elle garantit que la pente $f'(a)$ existe.

EXEMPLE Si $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$, la tangente a pour équation $y = 3 + 2(x - 1)$, soit $y = 2x + 1$.

⚠ CONTRE-EXEMPLE L'équation $y = f'(a)x$ oublie en général l'ordonnée $f(a)$: avec les données précédentes, $y = 2x$ ne passe pas par $(1; 3)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Vérification** Dans l'équation de la tangente, remplacer x par a donne $y = f(a)$. La droite passe donc par le point de contact.

EXEMPLE Pour $y = 3 + 2(x - 1)$, remplacer x par 1 donne $y = 3$.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Une droite de pente 2 passant par $(0;3)$, d'équation $y = 2x + 3$, n'est pas la tangente précédente : elle ne passe pas par $(1;3)$.




Figure 4 — La tangente passe par A avec la pente $f'(a)$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : $y = f(a) + f'(a)(x + a)$. **Correction :** l'écart horizontal se mesure par $x - a$, donc le signe est négatif.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : $y = f(a) + f'(x)(x - a)$. **Correction :** on cherche une droite : sa pente est le nombre fixe $f'(a)$, non une quantité dépendant de x .

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Démonstration exigible. Toute droite de coefficient directeur m passant par $A(a; f(a))$ vérifie $y - f(a) = m(x - a)$. En effet, pour tout point $M(x; y)$ de la droite distinct de A , son coefficient directeur est $\frac{y - f(a)}{x - a} = m$, d'où l'égalité; elle reste vraie pour $x = a$. La tangente possède le coefficient directeur $m = f'(a)$. On obtient donc $y = f(a) + f'(a)(x - a)$. Réciproquement, la droite ainsi définie passe par A et possède la pente $f'(a)$: elle est bien la tangente.

3.5 Approximation linéaire

DÉFINITION Approximation linéaire

Si f admet un nombre dérivé en a et si h est proche de 0, la valeur $f(a + h)$ peut être approchée par

$$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h.$$

Cette approximation utilise l'ordonnée de la tangente au voisinage de a .

EXEMPLE Pour $f(x) = x^2$, au voisinage de 3, $f(3,02) \approx 9 + 6 \times 0,02 = 9,12$.

⚠ CONTRE-EXEMPLE Ce n'est pas une égalité : $3,02^2 = 9,1204$, différent de 9,12.

♦ **PROPRIÉTÉ Choix de h** L'approximation est conçue pour un incrément h petit. Elle est d'autant plus pertinente que $a + h$ est proche de a .

EXEMPLE Pour approcher $f(4,03)$ au voisinage de 4, on choisit $h = 0,03$.

⚠ CONTRE-EXEMPLE Approcher $f(10)$ au voisinage de 4 avec $h = 6$ ne relève plus d'une approximation locale fiable.




Figure 5 — Au voisinage de a , la tangente approxime la courbe : l'écart est petit quand h est petit.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : $f(a + h) = f(a) + f'(a)h$. **Correction :** écrire $\approx$; l'écart exact n'est pas étudié dans ce chapitre.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Copie fautive : $f(a + h) \approx f(a) + f'(a)$. **Correction :** la variation dépend de h ; il faut multiplier la pente par l'écart horizontal.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Sur la courbe de f , le point d'abscisse $a + h$ est proche du point de la tangente d'abscisse $a + h$. Cette lecture géométrique explique le signe : si $f'(a) < 0$ et $h > 0$, l'estimation est inférieure à $f(a)$.

🕒 MÉTHODE M1 Calculer un taux de variation

Quand l'utiliser. Je l'utilise lorsque l'énoncé demande un taux de variation, une variation moyenne, une pente de sécante ou une vitesse moyenne entre deux instants.

La méthode pas à pas.

1. Je repère les deux abscisses distinctes a et b .
2. Je calcule séparément $f(a)$ et $f(b)$.
3. J'écris $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ sans changer l'ordre.
4. Je simplifie et j'indique l'unité si le contexte en fournit une.

Exemple rédigé. Pour $g(x) = 2x^2 - 1$, calculons le taux de variation entre 1 et 4. $g(1) = 1$ et $g(4) = 31$. Ainsi

$$\frac{g(4) - g(1)}{4 - 1} = \frac{31 - 1}{3} = 10.$$

Le taux de variation de g entre 1 et 4 est 10.

Les pièges.

- ▶ Écrire $\frac{31-1}{4}$: il manque -1 au dénominateur.
- ▶ Écrire $\frac{1-31}{4-1}$: les deux différences ne suivent plus le même ordre.
- ▶ Écrire seulement $31 - 1 = 30$: c'est la variation d'image, pas le taux de variation.

Vérifier son résultat. Je vérifie que le signe est cohérent avec le sens de variation observé. Ici g augmente sur $[1; 4]$ et le résultat 10 est positif.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

🔗 MÉTHODE M2 Interpréter un nombre dérivé

Quand l'utiliser. Mots-clés : vitesse instantanée, pente au point, coût marginal, nombre dérivé.

La méthode pas à pas.

1. Je repère le point ou l'instant a .
2. Je lis ou utilise $f'(a)$.
3. Je donne son sens : pente de tangente ou variation instantanée.
4. J'ajoute l'unité adaptée.

Exemple rédigé. Une distance d est en mètres et $d'(5) = 7$. À 5 s, la vitesse instantanée est 7 m/s.

Les pièges. Ne pas donner $d(5)$ à la place de $d'(5)$; ne pas répondre « 7 mètres » ; ne pas parler de vitesse moyenne sans intervalle.

Vérifier son résultat. Une vitesse positive correspond à une position qui augmente localement.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

🔗 MÉTHODE M3 Lire ou construire une tangente

Quand l'utiliser. Mots-clés : lire graphiquement $f'(a)$, pente de la tangente, tracer la tangente.

La méthode pas à pas.

1. Je place $A(a; f(a))$.
2. Je prends deux points de la tangente pour lire sa pente.

3. Pour construire, j'utilise un déplacement horizontal simple puis le déplacement vertical imposé par la pente.

Exemple rédigé. La tangente en $A(2;1)$ a une pente $\frac{1}{2}$. Je place $(4;2)$ puis je trace la droite passant par ces deux points.

Les pièges. Lire deux points de la courbe au lieu de la droite; oublier que la tangente passe par A ; inverser montée et déplacement horizontal.

Vérifier son résultat. Je contrôle que la droite tracée contient le point de contact.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Écrire l'équation d'une tangente

Quand l'utiliser. Mots-clés : équation de la tangente en a , droite tangente à C_f .

La méthode pas à pas.

1. Je calcule ou lis $f(a)$.
2. Je repère $f'(a)$.
3. J'écris $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.
4. Je développe seulement si une forme réduite est demandée.

Exemple rédigé. Pour $f(2) = -1$ et $f'(2) = 3$, la tangente est $y = -1 + 3(x - 2) = 3x - 7$.

Les pièges. Oublier $f(a)$; écrire $x + a$; utiliser $f'(x)$ au lieu de $f'(a)$.

Vérifier son résultat. Je remplace x par a : l'ordonnée doit redevenir $f(a)$.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

④ MÉTHODE M5 Approcher une image avec la tangente

Quand l'utiliser. Mots-clés : valeur approchée, voisinage de a , $a + h$, approximation linéaire.

La méthode pas à pas.

1. J'écris le nombre cherché sous la forme $a + h$ avec h petit.
2. Je calcule $f(a)$ et $f'(a)$.
3. Je calcule $f(a) + f'(a)h$.
4. Je conclus avec $\approx$.

Exemple rédigé. Sachant $f(4) = 5$ et $f'(4) = -2$, approchons $f(4,03)$. Ici $h = 0,03$, donc $f(4,03) \approx 5 - 2 \times 0,03 = 4,94$.

Les pièges. Employer $=$; oublier h ; choisir un h non proche de zéro sans avertissement.

Vérifier son résultat. Si $f'(a) < 0$ et $h > 0$, l'approximation doit être inférieure à $f(a)$.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1 ◆

Soit $f(x) = x^2 + 1$. Calculer le taux de variation de f entre 1 et 4.

Exercice 2 ◆

Pour $g(x) = 2x + 1$, calculer le taux de variation entre 0 et 4.

Exercice 3 ◆◆

Un véhicule part à l'arrêt. On note $d(t)$ la distance parcourue, en kilomètres, après t heures de trajet. On relève $d(0) = 0$, $d(2) = 80$ et $d(5) = 275$.

1. Calculer le taux de variation de d entre 0 et 2. Interpréter le résultat en précisant son unité.
2. Calculer le taux de variation de d entre 2 et 5. Interpréter.
3. Le véhicule a-t-il roulé plus vite en moyenne sur les deux premières heures ou sur les trois suivantes? Justifier.

Exercice 4 ◆◆

Une entreprise fabrique des pièces mécaniques. Le coût total de production, en euros, pour q pièces fabriquées est modélisé par la fonction C définie sur $[0; 500]$. On sait que $C(100) = 850$ et $C(200) = 1500$.

1. Calculer le taux de variation de C entre 100 et 200.
2. Ce taux de variation s'appelle le **coût moyen par pièce supplémentaire** sur cet intervalle. Interpréter la valeur obtenue par une phrase.
3. La sécante à la courbe de C passant par les points d'abscisses 100 et 200 a-t-elle un coefficient directeur positif ou négatif? Justifier sans tracer la courbe.

Exercice 5 ◆◆◆

On considère la fonction carré $f(x) = x^2$.

1. Calculer le taux de variation de f entre 1 et 3, entre 2 et 4, entre 0 et 5.
2. Conjecturer une formule donnant le taux de variation de f entre deux réels distincts a et b en fonction de a et b .
3. Démontrer cette conjecture en factorisant $b^2 - a^2$.
4. En déduire que la sécante à la parabole passant par les points d'abscisses a et b a pour coefficient directeur $a + b$.

Exercice 6 ◆◆◆

On pose $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x$. On fixe $a = 1$.

1. Pour $h = 1$, $h = 0,5$ et $h = 0,1$, calculer le taux de variation de f entre a et $a + h$, puis celui de g entre a et $a + h$.
2. Que semble-t-il se passer lorsque h se rapproche de 0? Formuler une conjecture.
3. Exprimer, pour tout $h \neq 0$, le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$ en fonction de h .
4. Justifier que ces taux se rapprochent de 2 lorsque h se rapproche de 0. Comparer avec le résultat obtenu pour g .
5. Interpréter géométriquement : que peut-on dire de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 et de la droite représentant g ?

Exercice 7 ◆

Soit $f(x) = x^2 + 2x$.

1. Calculer le taux de variation de f entre 3 et $3 + h$ pour $h = 1$, $h = 0,1$ et $h = 0,01$.
2. Vers quelle valeur semblent tendre ces taux lorsque h se rapproche de 0 ?
3. En déduire $f'(3)$.

Exercice 8 ◆

On considère $f(x) = 3x^2$.

1. Exprimer $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ en fonction de h (pour $h \neq 0$).
2. En déduire la valeur de $f'(2)$.

Exercice 9 ◆◆

Un objet en chute libre a parcouru une distance $d(t) = 5t^2$ mètres après t secondes.

1. Calculer $d(3)$ et $d(3,1)$. En déduire le taux de variation de d entre 3 et 3,1.
2. Exprimer $\frac{d(3+h) - d(3)}{h}$ en fonction de h pour $h \neq 0$.
3. En déduire $d'(3)$.
4. Interpréter $d'(3)$ dans le contexte de la chute libre. Préciser l'unité.

Exercice 10 ◆◆

Soit $f(x) = x^3$.

1. Développer $(1+h)^3$.
2. En déduire l'expression de $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ en fonction de h pour $h \neq 0$.
3. Déterminer $f'(1)$.
4. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.

Exercice 11 ◆◆◆

On veut déterminer $f'(a)$ pour la fonction carré $f(x) = x^2$, où a est un réel quelconque.

1. Développer $(a+h)^2$ et en déduire $f(a+h) - f(a)$.
2. Exprimer $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour $h \neq 0$ et simplifier.
3. En déduire $f'(a)$ pour tout réel a .
4. Que vaut $f'(0)$? $f'(-1)$? $f'(5)$?
5. Pour quelle valeur de a a-t-on $f'(a) = 0$? Interpréter géométriquement.

Exercice 12 ◆◆◆

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Vérifier que, pour $h \neq 0$ et $1+h > 0$:

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{-1}{1+h}.$$

2. En déduire $f'(1)$.
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.
4. Cette tangente coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Si oui, en quel point ?

Exercice 13

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(2) = 5$ et $f'(2) = 3$.

1. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 2.
2. On souhaite tracer cette tangente sur un quadrillage. La tangente passe par le point $A(2; 5)$ avec une pente de 3 : lorsque l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée augmente de 3. Donner les coordonnées d'un deuxième point B de la tangente.
3. Lire l'ordonnée du point de la tangente d'abscisse 4.

Exercice 14

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On sait que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 passe par les points $A(1; 3)$ et $B(4; 0)$.

1. Déterminer la valeur de $f(1)$.
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente.
3. En déduire la valeur de $f'(1)$.

Exercice 15

La température T (en $^{\circ}\text{C}$) dans un local technique est modélisée par une fonction du temps t (en heures), pour $t \in [0; 24]$. On dispose de la courbe de la fonction T sur cet intervalle.

On a tracé la tangente à la courbe au point d'abscisse $t = 6$. Cette tangente passe par les points de coordonnées $(6; 18)$ et $(10; 14)$.

1. Déterminer la valeur de $T(6)$. Interpréter ce résultat dans le contexte.
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 6.
3. En déduire la valeur de $T'(6)$.
4. Interpréter le signe de $T'(6)$ dans le contexte de l'exercice. Rédiger une phrase utilisant les unités appropriées.

Exercice 16

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On donne :

$$f(1) = 2, \quad f'(1) = -1, \quad f(3) = 4, \quad f'(3) = 2.$$

1. Déterminer l'équation de la tangente T_1 à la courbe de f au point d'abscisse 1.
2. Déterminer l'équation de la tangente T_2 à la courbe de f au point d'abscisse 3.
3. Les droites T_1 et T_2 sont-elles sécantes ? Si oui, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

Exercice 17

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et sa courbe représentative $\mathcal{D}$ (la parabole).

Soit P le point de coordonnées $(0; -1)$.

1. Vérifier que le point P n'appartient pas à la courbe $\mathcal{D}$.
2. Soit a un réel. Écrire l'équation de la tangente T_a à $\mathcal{D}$ au point d'abscisse a .
3. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles la tangente T_a passe par le point P .
4. En déduire les coordonnées des points de $\mathcal{D}$ où la tangente passe par P .

Exercice 18

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 6x - 1$.

1. Soit a un réel. Écrire l'équation de la tangente T_a à la courbe de f au point d'abscisse a , puis préciser son coefficient directeur.
2. Existe-t-il un point de la courbe de f en lequel la tangente est parallèle à $\mathcal{D}$? Justifier.
3. Si oui, déterminer les coordonnées de ce point et écrire l'équation de la tangente correspondante.

Exercice 19

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$.

1. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 1.
2. Vérifier que la tangente passe bien par le point $(1; 3)$.

Exercice 20

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$. On admet que $f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

1. Calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.
2. En déduire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse -1 .

Exercice 21

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 5$. On admet que $f'(x) = 2x - 4$.

1. Calculer $f(3)$ et $f'(3)$.
2. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 3.
3. La tangente T coupe-t-elle l'axe des abscisses? Si oui, déterminer les coordonnées du point d'intersection.

Exercice 22

Une entreprise fabrique et vend q articles par jour ($q \geq 0$). Son bénéfice, en euros, est modélisé par la fonction B définie par :

$$B(q) = -2q^2 + 120q - 1000.$$

On admet que $B'(q) = -4q + 120$.

1. Calculer $B(20)$ et $B'(20)$.
2. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de B au point d'abscisse $q = 20$.
3. Interpréter le signe de la pente de cette tangente dans le contexte économique (bénéfice marginal).

Exercice 23

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. On admet que $f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

1. Écrire l'équation de la tangente T_a à la courbe de f au point d'abscisse a .
2. Déterminer la ou les valeurs de a pour lesquelles la tangente T_a passe par l'origine $O(0; 0)$.
3. Écrire l'équation de la ou des tangentes trouvées.

Exercice 24

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x + 3$. On admet que $f'(x) = 2x - 2$.

1. Pour quelle valeur de a la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est-elle horizontale ? Écrire l'équation de cette tangente.
2. Pour quelle valeur de a la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est-elle parallèle à la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 4x$? Écrire l'équation de cette tangente.

Exercice 25

Soit $f(x) = -x^2 + 6x - 3$. On admet que $f'(x) = -2x + 6$.

1. Calculer $f(4)$ et $f'(4)$.
2. En utilisant l'approximation linéaire, donner une valeur approchée de $f(4,03)$.
3. Calculer la valeur exacte de $f(4,03)$ et comparer.

Exercice 26

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. On admet que $f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

1. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de $a = 3$, donner une valeur approchée de $f(3,02)$.
2. De la même manière, approcher $f(2,98)$.
3. Calculer les valeurs exactes de $3,02^2$ et $2,98^2$, puis comparer avec les approximations.

Exercice 27

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$. On admet que $f'(9) = \frac{1}{6}$.

1. Rappeler la valeur de $f(9)$.
2. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de 9, donner une valeur approchée de $\sqrt{9,1}$ sous forme de fraction.
3. À l'aide de la calculatrice, donner la valeur de $\sqrt{9,1}$ arrondie au dix-millième, puis calculer l'erreur commise par l'approximation.

Exercice 28

La population $P(t)$ d'une ville est modélisée par une fonction dérivable du temps t (en années). On sait que $P(10) = 25\,000$ habitants et $P'(10) = 800$ habitants par an.

1. Interpréter la valeur de $P'(10)$ dans le contexte de l'exercice.
2. En utilisant l'approximation linéaire, estimer $P(10,5)$.
3. De la même manière, estimer $P(12)$.
4. Laquelle de ces deux estimations est la plus fiable ? Justifier.

Exercice 29

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. On admet que $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$ pour tout $a > 0$.

1. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de $a = 2$, donner une valeur approchée de $\frac{1}{2,01}$.
2. Calculer la valeur exacte de $\frac{1}{2,01}$ sous forme de fraction.
3. On pose $h = x - a$. Montrer que l'erreur commise par l'approximation linéaire est :

$$E(h) = f(a+h) - [f(a) + f'(a) \cdot h] = \frac{h^2}{a^2(a+h)}.$$

4. Vérifier cette formule avec les valeurs de la question 1.

Exercice 30

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. On admet que $f'(a) = 3a^2$ pour tout réel a .

1. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de $a = 1$, donner une valeur approchée de $1,02^3$. Calculer la valeur exacte et l'erreur commise.
2. En utilisant l'approximation linéaire au voisinage de $a = 2$, donner une valeur approchée de $2,01^3$. Calculer la valeur exacte et l'erreur commise.
3. Comparer les erreurs des deux questions précédentes. Expliquer le rôle de la taille de h dans cette comparaison.

Exercice 31

Soit $f(x) = 3x - x^2$. Calculer le taux de variation de f entre 0 et 2.

Exercice 32

On considère une fonction f dont on connaît les valeurs suivantes :

x	1	3	5	7
$f(x)$	2	10	26	50

1. Calculer le taux de variation de f entre $x = 1$ et $x = 5$.
2. Calculer le taux de variation de f entre $x = 3$ et $x = 7$.

Exercice 33

Soit $f(x) = x^3$. Calculer $f'(1)$ en calculant le taux de variation $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$, puis en faisant tendre h vers 0.

Exercice 34

On considère une fonction f dérivable en a . On a calculé le taux de variation $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour plusieurs valeurs de h :

h	0,1	0,01	0,001
$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$	6,1	6,01	6,001

Vers quelle valeur semble tendre le taux de variation lorsque h tend vers 0 ? En déduire la valeur de $f'(a)$.

Exercice 35

On sait que $f(2) = 3$ et $f'(2) = -1$. Tracer, sur un repère, la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2.

On précisera les coordonnées d'au moins deux points de cette tangente.

Exercice 36

Sur un graphique, la tangente à la courbe d'une fonction f au point $A(1; 2)$ passe par le point $B(3; 6)$.

Déterminer $f'(1)$.

Exercice 37

Soit $f(x) = x^2$. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3.

Exercice 38

En utilisant l'approximation affine de $f(x) = \sqrt{x}$ au voisinage de $a = 4$, donner une valeur approchée de $\sqrt{4,02}$.

Exercice 39

Une entreprise fabrique q pièces par jour. Le coût de production, en euros, est modélisé par la fonction :

$$C(q) = 0,5q^2 + 3q + 100$$

1. Calculer $C(10)$ et $C(12)$.
2. Calculer le taux de variation de C entre $q = 10$ et $q = 12$.
3. Interpréter ce résultat en termes de coût marginal moyen.

Exercice 40

On modélise la température d'un four, en degrés Celsius, après extinction par la fonction :

$$T(t) = 100 - 2t^2$$

où t est le temps écoulé en minutes, avec $0 \leq t \leq 7$.

1. Calculer $T(0)$ et $T(5)$.
2. Calculer le taux de variation de T entre $t = 0$ et $t = 5$.
3. Interpréter le signe de ce taux de variation dans le contexte du problème.

Exercice 41

La population d'une ville est modélisée par la fonction :

$$P(t) = 500 + 100t + 5t^2$$

où t est le nombre d'années écoulées depuis 2010 et $P(t)$ est exprimé en milliers d'habitants.

1. Calculer $P(4)$ et exprimer $P(4 + h)$ en fonction de h .
2. En déduire le taux de variation $\frac{P(4 + h) - P(4)}{h}$ et le simplifier.
3. Calculer la limite de ce taux lorsque h tend vers 0. Que représente ce nombre ?
4. Interpréter le résultat dans le contexte démographique.

Exercice 42

Un réservoir se vide progressivement. La hauteur d'eau, en mètres, est modélisée par :

$$h(t) = 12 - \frac{t^2}{3}$$

où t est le temps en heures, avec $0 \leq t \leq 6$.

1. Calculer $h(0)$, $h(3)$ et $h(6)$.
2. Calculer le taux de variation de h entre $t = 0$ et $t = 3$. Interpréter.
3. Calculer $h'(3)$ en utilisant la définition du nombre dérivé (limite du taux de variation).
4. Le niveau d'eau monte-t-il ou descend-il à l'instant $t = 3$? Justifier.

Exercice 43

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -(x-2)^2 + 5$.

On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = -2x + 4$.

La courbe C_f passe par les points $A(0; 1)$, $B(2; 5)$ et $C(4; 1)$.

1. Calculer $f'(0)$, $f'(2)$ et $f'(4)$.
2. Que représente géométriquement le nombre $f'(2) = 0$ pour la courbe C_f ?
3. En déduire l'équation de la tangente à C_f au point B .
4. Le point B est-il un maximum local de f ? Justifier à l'aide du signe de f' .

Exercice 44

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = 3x^2 - 3$.

1. Vérifier que $f(1) = -1$ et calculer $f'(1)$.
2. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 1.
3. Calculer $f(x) - T(x)$ et factoriser l'expression obtenue.
4. En déduire la position de la courbe par rapport à sa tangente au voisinage de $x = 1$.

Exercice 45

On souhaite obtenir une valeur approchée de $(1,02)^5$ sans calculatrice, en utilisant l'approximation affine.

On pose $f(x) = (1+x)^5$.

1. Calculer $f(0)$ et $f'(0)$. On admet que $f'(x) = 5(1+x)^4$.
2. Écrire l'approximation affine de f au voisinage de $x = 0$: $f(x) \approx f(0) + f'(0) \cdot x$.
3. En déduire une valeur approchée de $(1,02)^5$ en prenant $x = 0,02$.
4. Comparer avec la valeur exacte $(1,02)^5 = 1,104\,080\,8 \dots$. Commenter la précision.

Exercice 46

L'aire d'un disque de rayon r (en cm) est $A(r) = \pi r^2$ (en cm^2).

On admet que $A'(r) = 2\pi r$.

1. Calculer $A(10)$ et $A'(10)$.
2. En utilisant l'approximation affine, donner une valeur approchée de $A(10,1)$.
3. Calculer la valeur exacte de $A(10,1)$ et en déduire l'erreur commise.
4. Un technicien mesure le rayon d'un disque avec une erreur de 1%. Quelle est l'erreur relative approximative sur l'aire? Interpréter.

Exercice 47

Étude complète de la tangente.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 5$.

1. Calculer le taux de variation de f entre a et $a+h$ (avec $h \neq 0$). Simplifier le résultat.
2. En déduire $f'(a)$ pour tout réel a .
3. Pour quelle valeur de a la tangente à la courbe de f est-elle horizontale? Calculer $f(a)$ pour cette valeur.
4. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
5. La tangente au point d'abscisse 0 coupe-t-elle l'axe des abscisses? Si oui, déterminer les coordonnées du point d'intersection.

Exercice 48

Approximation et erreur graphique.

Soit f la fonction définie sur $[-1; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x+1}$. On note A le point de la courbe de f d'abscisse 3.

1. Calculer $f(3)$ et montrer que $f'(3) = \frac{1}{4}$.

Indication : calculer $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$ en multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué.

2. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point A .
3. En utilisant cette tangente, donner une valeur approchée de $\sqrt{3,96}$ et de $\sqrt{4,04}$.
4. Comparer avec les valeurs exactes (calculatrice autorisée). L'approximation est-elle meilleure lorsque $h > 0$ ou lorsque $h < 0$?

Exercice 49

Tangentes passant par l'origine.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$. On admet que $f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

1. Écrire l'équation de la tangente T_a à la courbe de f au point d'abscisse a .
2. À quelle condition sur a la tangente T_a passe-t-elle par l'origine $O(0; 0)$?
3. Écrire les équations des deux tangentes à la courbe de f passant par O .
4. Vérifier par le calcul que les points de tangence sont $(1; 2)$ et $(-1; 2)$.
5. Interpréter géométriquement : la parabole est-elle au-dessus ou en dessous de chacune de ces tangentes au voisinage du point de tangence ? Justifier.

Exercice 50

Analyse d'erreur.

Karim affirme : « Si $f(x) = \frac{1}{x}$, alors $f'(2) = -\frac{1}{2}$ ».

1. Calculer le taux de variation $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ pour $h \neq 0$ et simplifier.
2. Karim s'est-il trompé ? Déterminer la valeur correcte de $f'(2)$.
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2.
4. Tracer la courbe de f et la tangente sur un même repère pour $x \in [0,5; 5]$.
5. Conjecturer graphiquement si la courbe est au-dessus ou en dessous de la tangente au voisinage de $x = 2$. Justifier.

Coup de pouce 1. Le taux de variation de f entre a et b est $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Commence par calculer $f(1)$ et $f(4)$.

Coups de pouce

Coup de pouce 1. Calculer d'abord les deux images.

Coup de pouce 2. Écrire $\frac{g(4) - g(0)}{4 - 0}$.

Coup de pouce 3. Remplacer $g(4)$ et $g(0)$ puis simplifier le quotient.

Coup de pouce 1. Développe $(a+h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$ pour calculer $f(a+h)$, puis forme le quotient $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Coup de pouce 1. Calcule $f(a+h) = 3(a+h)^2$, développe, puis soustrais $f(a) = 3a^2$ avant de diviser par h .

Coup de pouce 1. Le nombre dérivé $f'(2)$ est la pente de la tangente au point $(2; f(2))$. Place le point, puis trace la droite de pente 3 passant par ce point.

Coup de pouce 1. Calcule la pente de la tangente en utilisant $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ avec $A(1;3)$ et $B(4;0)$. C'est $f'(1)$.

Coup de pouce 1. La formule de la tangente est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Remplace $a = 1$, $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$.

Coup de pouce 1. Calcule d'abord $f(a)$ et $f'(a)$ pour la valeur de a demandée, puis applique la formule $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Coup de pouce 1. L'approximation linéaire donne $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$. Identifie a et h dans chaque cas.

Coup de pouce 1. Choisis a tel que $f(a)$ soit un carré parfait facile à calculer, puis h le petit écart. Par exemple, pour $\sqrt{4,1}$: $a = 4$, $h = 0,1$.

Coup de pouce 1. Calcule $f(0)$ et $f(2)$, puis forme le quotient $\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}$.

Coup de pouce 1. Lis les valeurs $f(a)$ et $f(b)$ dans le tableau, puis applique la formule du taux de variation.

Coup de pouce 1. Développe $(1 + h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$, puis forme le quotient et simplifie par h avant de faire tendre h vers 0.

Coup de pouce 1. Observe vers quelle valeur le taux de variation semble tendre quand h se rapproche de 0.

Coup de pouce 1. Place le point $A(2; 3)$. La pente est -1 : pour 1 unité vers la droite, on descend de 1. Utilise un second point pour tracer la droite.

Coup de pouce 1. $f'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente en A . Calcule la pente de la droite (AB) .

Coup de pouce 1. Calcule $f(3) = 9$ et $f'(3) = 6$, puis applique $y = f'(3)(x - 3) + f(3)$.

Coup de pouce 1. Prends $a = 4$ (car $\sqrt{4} = 2$) et $h = 0,02$. Utilise $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$.

TD — Le freinage d'un véhicule

Durée estimée : 50 minutes.

Un véhicule roule à 90 km/h (soit 25 m/s) et freine à partir de l'instant $t = 0$. Sa distance de freinage (en mètres) est modélisée par :

$$d(t) = 25t - 2,5t^2 \quad \text{pour } t \in [0; 5].$$

Partie A — Analyse de la distance (C1)

1. Calculer $d(0)$, $d(1)$, $d(3)$ et $d(5)$.
2. Calculer la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 2$, puis la vitesse moyenne sur cet intervalle.
3. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 3$ et $t = 5$. Comparer avec la précédente. Que constatez-vous ?

Partie B — Vitesse instantanée (C2)

4. Calculer $\frac{d(1+h) - d(1)}{h}$ pour $h \neq 0$ et simplifier.
5. En déduire la vitesse instantanée $d'(1)$. Exprimer-la en m/s puis en km/h.
6. Calculer de même $d'(3)$. Le véhicule a-t-il beaucoup ralenti entre $t = 1$ et $t = 3$?

Partie C — Tangente et approximation (C4, C5)

7. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de d au point d'abscisse $t = 1$.
8. Approcher $d(1,1)$ à l'aide de cette tangente. Comparer avec la valeur exacte.
9. À quel instant le véhicule s'arrête-t-il ? (On cherche t tel que $d'(t) = 0$.)

Partie D — Synthèse (question ouverte / oral)

10. Le modèle $d(t) = 25t - 2,5t^2$ est-il réaliste pour $t > 5$? Justifier.
11. Expliquer en quelques phrases la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée dans le contexte du freinage.

TD fil rouge — Du capteur de vitesse au nombre dérivé

Durée estimée : 50 minutes. Ce TD résout la situation d'accroche du chapitre.

Un vélo est équipé d'un capteur qui enregistre la distance parcourue $d(t)$ (en mètres) en fonction du temps t (en secondes). Sur un tronçon de 30 secondes, le modèle est :

$$d(t) = 0,05t^3 - 0,5t^2 + 6t \quad \text{pour } t \in [0; 30].$$

Partie A — Vitesses moyennes (C1)

1. Calculer $d(10)$, $d(12)$ et $d(14)$.
2. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 10$ et $t = 14$.
3. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 10$ et $t = 12$, puis entre $t = 12$ et $t = 14$.
4. Peut-on connaître la vitesse exacte à $t = 12$ s avec ces seules informations ?

Partie B — Vers la vitesse instantanée (C2)

5. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 12$ et $t = 12,1$.
6. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 12$ et $t = 12,01$.
7. Conjecturer la valeur de la vitesse instantanée à $t = 12$.
8. Calculer $\frac{d(12+h) - d(12)}{h}$ en développant, puis faire tendre h vers 0 pour confirmer.

Partie C — Tangente et prédiction (C3, C4, C5)

9. Tracer la courbe de d sur $[0; 30]$ à la calculatrice ou sur un grapheur.
10. Tracer la tangente au point d'abscisse 12. Retrouver graphiquement que sa pente est cohérente avec la valeur de $d'(12)$.
11. Écrire l'équation de cette tangente.
12. Utiliser l'approximation linéaire pour prédire $d(12,5)$. Comparer avec la valeur exacte.

Partie D — Synthèse

13. Répondre à la question d'accroche : comment déterminer la vitesse exacte à $t = 12$ s à partir du modèle $d(t)$?
14. Expliquer pourquoi le taux de variation entre deux instants proches est une bonne approximation de la vitesse instantanée.

DÉRIVATION LOCALE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Le taux de variation de la fonction f entre a et b ($a \neq b$) est égal à :

- A. $\frac{f(b)}{b}$
- B. $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
- C. $\frac{f(b) - f(a)}{b}$
- D. $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

2. [Q2] Pour $h \neq 0$, le taux d'accroissement de f en a s'écrit :

- A. $f(a+h) - f(a)$
- B. $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

C. $\frac{h}{f(a+h) - f(a)}$
 D. $h \times [f(a+h) - f(a)]$

3. [Q3] Si $d(t)$ désigne la position d'un mobile à l'instant t , la vitesse moyenne entre t_1 et t_2 est :

A. $d(t_2) - d(t_1)$
 B. $d'(t_1)$
 C. $\frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$
 D. $d''(t_1)$

Capacité C2

4. [Q4] Par définition, le nombre dérivé $f'(a)$ est la limite quand $h \rightarrow 0$ de :

A. $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$
 B. $\frac{f(x) - f(a)}{x}$
 C. $f(a)$
 D. $f(a+h)$

5. [Q5] Pour $f(x) = x^2$, le taux d'accroissement en $a = 2$ vaut :

A. $4 + h$
 B. $4 + h^2$
 C. 4
 D. $4h$

6. [Q6] La vitesse instantanée à l'instant $t = 2$ correspond à :

A. $d(2)$
 B. $d'(2)$
 C. $\frac{d(2)}{2}$
 D. $d''(2)$

Capacité C3

7. [Q7] La pente de la droite passant par $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ ($x_A \neq x_B$) vaut :

A. $\frac{y_B}{x_B}$
 B. $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$
 C. $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$
 D. $\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}$

8. [Q8] La courbe représentative de f admet une tangente horizontale au point d'abscisse a si :

A. $f(a) = 0$
 B. $f'(a) = 0$
 C. $f'(a) = 1$
 D. $f(a) = f'(a)$

9. [Q9] Géométriquement, le nombre dérivé $f'(a)$ représente :

A. l'ordonnée à l'origine de la tangente
 B. l'abscisse du point de contact
 C. le coefficient directeur de la tangente en a
 D. la longueur du segment sécant

Capacité C4

10. [Q10] L'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est :

A. $y = f'(a)x + f(a)$
 B. $y = f'(a)(x - a) + f(a)$
 C. $y = f(a)(x - a) + f'(a)$
 D. $y = f'(x)(x - a) + f(a)$

11. [Q11] Si $f(1) = 3$ et $f'(1) = -2$, l'équation de la tangente en $a = 1$ est :

- A. $y = -2x + 3$
- B. $y = -2x + 5$
- C. $y = 3x - 2$
- D. $y = -2x - 1$

12. [Q12] Une droite d'équation $y = mx + p$ passe par $(a, f(a))$ avec pour pente $f'(a)$. Son ordonnée à l'origine p vaut :

- A. $f(0)$
- B. $f(a) - af'(a)$
- C. 0
- D. $f'(a)$

Capacité C5

13. [Q13] L'approximation affine de $f(a + h)$ pour h voisin de 0 est donnée par :

- A. $f(a + h) \approx f'(a)h$
- B. $f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h$
- C. $f(a + h) \approx f'(a) + f(a)h$
- D. $f(a + h) \approx (f(a) + f'(a))h$

14. [Q14] L'approximation affine locale est d'autant plus précise que :

- A. $|h|$ est grand
- B. $|h|$ est très proche de 0
- C. $f'(a) = 0$
- D. $a = 0$

15. [Q15] Pour $f(x) = \sqrt{x}$, comme $f(4) = 2$ et $f'(4) = \frac{1}{4}$, une valeur approchée de $\sqrt{4,06}$ est :

- A. 2,06
- B. 2,015
- C. 0,015
- D. 2,15

Clé de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	B
Q3	C1	C
Q4	C2	A
Q5	C2	A
Q6	C2	B
Q7	C3	B
Q8	C3	B
Q9	C3	C
Q10	C4	B
Q11	C4	B
Q12	C4	B
Q13	C5	B
Q14	C5	B
Q15	C5	B

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- A — Quotient $f(b)/b$ au lieu de $(f(b) - f(a))/(b - a)$. *Renvoi : M1.*
- C — Numérateur seul, dénominateur oublié. *Renvoi : M1.*
- D — Quotient inversé. *Renvoi : M1.*

► Q2

- A — Accroissement de f seul, sans diviser par h . *Renvoi : M1.*
- C — Quotient inversé. *Renvoi : M1.*
- D — Produit au lieu d'un quotient. *Renvoi : M1.*

► Q3

- A — Distance parcourue confondue avec vitesse moyenne. *Renvoi : M1, R5.*
- B — Vitesse en un instant confondue avec vitesse moyenne. *Renvoi : M1, M2.*
- D — Accélération confondue avec vitesse. *Renvoi : M2.*

► Q4

- B — L'élève a écrit le numérateur d'une pente de sécante mais a conservé x au dénominateur ; le dénominateur correct est $x - a$, avant passage à la limite. *Renvoi : M2.*
- C — $f(a)$ est l'ordonnée, pas la pente. *Renvoi : M2.*
- D — Le nombre dérivé n'est pas une valeur de f . *Renvoi : M2.*

► Q5

- B — L'élève a développé incomplètement $(2 + h)^2$ en $4 + h^2$ puis a donné $f(2 + h)$ sans former le taux $[f(2 + h) - f(2)]/h$. *Renvoi : R2.*
- C — L'élève a donné la valeur $f(2) = 4$ au lieu de calculer le taux d'accroissement, qui vaut $4 + h$. *Renvoi : R2.*
- D — Produit $4h$ au lieu de somme $4 + h$. *Renvoi : R2.*

► Q6

- A — $d(2)$ est la position, pas la vitesse. *Renvoi : M2.*
- C — Vitesse moyenne confondue avec vitesse instantanée. *Renvoi : M1, M2.*
- D — Accélération = dérivée de la vitesse. *Renvoi : M2.*

► Q7

- A — Quotient y_B/x_B au lieu de pente. *Renvoi : R3.*
- C — Différence d'ordonnées sans diviser par Δx . *Renvoi : R3.*
- D — Quotient inversé. *Renvoi : R3.*

► Q8

- A — $f(a) = 0$ signifie point sur l'axe, pas tangente horizontale. *Renvoi : M3.*
- C — Pente 1 = droite à 45° , pas horizontale. *Renvoi : R3.*
- D — Aucune raison d'égalité $f(a) = f'(a)$. *Renvoi : M3.*

► Q9

- A — L'élève a confondu l'ordonnée à l'origine de la tangente avec son coefficient directeur ; $f'(a)$ représente le coefficient directeur. *Renvoi : M3.*
- B — L'élève a donné l'abscisse du point de contact a au lieu du coefficient directeur de la tangente, qui est $f'(a)$. *Renvoi : M3, M4.*
- D — La tangente n'est pas une sécante. *Renvoi : M3.*

► Q10

- A — Ordonnée à l'origine confondue avec $f(a)$ sauf si $a = 0$. *Renvoi : M4.*
- C — Rôles de $f(a)$ et $f'(a)$ inversés. *Renvoi : M4.*
- D — $f'(x)$ varie avec x , la pente est $f'(a)$. *Renvoi : M4.*

► Q11

- A — $f'(a)x + f(a)$ au lieu de $f'(a)(x - a) + f(a)$. *Renvoi : M4.*
- C — Rôles de $f(a)$ et $f'(a)$ inversés. *Renvoi : M4.*
- D — Ordonnée à l'origine mal calculée. *Renvoi : M4.*

► Q12

- A — $y(0) = f(0)$ n'est vrai que si $a = 0$. *Renvoi : M4.*
- C — L'élève a imposé à tort que la tangente passe par l'origine, ce qui donnerait $p = 0$; elle passe en général par $(a, f(a))$. *Renvoi : M4.*
- D — L'élève a confondu la pente $f'(a)$ avec l'ordonnée à l'origine p ; la relation $f(a) = af'(a) + p$ donne $p = f(a) - af'(a)$. *Renvoi : M4.*

► Q13

- A — Terme $f(a)$ oublié. *Renvoi : M5.*
- C — Rôles de $f(a)$ et $f'(a)$ inversés. *Renvoi : M5.*
- D — Somme $f(a) + f'(a)$ multipliée par h . *Renvoi : M5.*

► Q14

- A — Plus h est grand, plus l'approximation est mauvaise. *Renvoi : M5.*
- C — $f'(a) = 0$ donne $f(a + h) \approx f(a)$, pas meilleur. *Renvoi : M5.*
- D — La qualité ne dépend pas de $a = 0$ mais de $|h|$. *Renvoi : M5.*

► Q15

- A — $h = 0,06$ ajouté à $\sqrt{4}$ sans multiplier par $f'(4)$. *Renvoi : M5.*
- C — Produit $h \times f'(a)$ sans ajouter $f(a)$. *Renvoi : M5.*
- D — Erreur de placement de la virgule. *Renvoi : M5.*

Corrigé — Évaluation A — Dérivation locale

Exercice 1 — 6 points

Question 1. $f(1) = 1 - 4 + 5 = 2$ et $f(4) = 16 - 16 + 5 = 5$.

$$\tau = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{5 - 2}{3} = 1.$$

Question 2. $f(3) = 9 - 12 + 5 = 2$.

$$\begin{aligned} f(3 + h) &= (3 + h)^2 - 4(3 + h) + 5 \\ &= 9 + 6h + h^2 - 12 - 4h + 5 = h^2 + 2h + 2. \end{aligned}$$

$$\frac{f(3 + h) - f(3)}{h} = \frac{h^2 + 2h + 2 - 2}{h} = \frac{h^2 + 2h}{h} = h + 2.$$

Question 3. $f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2) = 2$.

Question 4. $f'(3) = 2$ signifie que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3 a pour pente 2 : la courbe monte localement avec un coefficient directeur de 2.

Exercice 2 — 5 points

Question 1. $g'(1) = 3 \times 1^2 = 3$.

Question 2. $g(1) = 1$. La tangente T_1 en $x = 1$:

$$T_1 : y = g'(1)(x - 1) + g(1) = 3(x - 1) + 1 = 3x - 2.$$

Question 3. $T_1(0) = 3 \times 0 - 2 = -2$. Le point $(0; -2)$ est bien sur T_1 . ✓

Question 4. Tangente horizontale $\Leftrightarrow g'(a) = 0 \Leftrightarrow 3a^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$. La tangente est horizontale au point d'abscisse 0.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $f(2) = 7$ (ordonnée du point A) et $f'(2) = -3$ (pente de la tangente en A).

Question 2. $T : y = f'(2)(x - 2) + f(2) = -3(x - 2) + 7 = -3x + 13$.

Question 3. $f(2,04) \approx f(2) + f'(2) \times 0,04 = 7 + (-3) \times 0,04 = 7 - 0,12 = 6,88$.

Question 4. C'est une valeur approchée (symbole $\approx$). L'approximation linéaire remplace la courbe par sa tangente au voisinage du point; l'écart avec la valeur exacte est d'autant plus petit que $|h|$ est petit.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $h(2) = \frac{1}{2}$ et $h(3) = \frac{1}{3}$.

$$\tau = \frac{h(3) - h(2)}{3 - 2} = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{2}}{1} = \frac{-\frac{1}{6}}{1} = -\frac{1}{6} \approx -0,167.$$

Question 2. $h'(2) = -\frac{1}{4}$.

$$h(2,05) \approx h(2) + h'(2) \times 0,05 = \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) \times 0,05 = 0,5 - 0,0125 = 0,4875.$$

Question 3. Valeur exacte : $\frac{1}{2,05} = \frac{100}{205} = \frac{20}{41} \approx 0,48780 \dots$

Approximation : 0,4875. L'erreur est de l'ordre de 0,0003, soit environ 0,06 %.

Évaluation A — Dérivation locale

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

6 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 5$.

1. Calculer le taux de variation de f entre $x = 1$ et $x = 4$. (1,5 pt)
2. Calculer $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$ pour $h \neq 0$. Simplifier. (2 pt)
3. En déduire le nombre dérivé $f'(3)$. (1 pt)
4. Interpréter $f'(3)$ graphiquement. (1,5 pt)

Exercice 2

5 points — C2, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3$. On admet que $g'(a) = 3a^2$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(1)$. (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente T_1 à la courbe de g au point d'abscisse 1. (2 pt)
3. Vérifier que T_1 passe par le point $(0; -2)$. (1 pt)
4. Déterminer l'abscisse du point de la courbe où la tangente est horizontale. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C3, C4, C5

On lit sur un graphique que la courbe de f passe par le point $A(2; 7)$ et que la tangente en A a pour pente -3 .

1. Donner les valeurs de $f(2)$ et $f'(2)$. (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente en A . (1,5 pt)
3. Approcher $f(2,04)$ à l'aide de l'approximation linéaire. (1,5 pt)
4. Ce résultat est-il une valeur exacte ou approchée? Justifier. (1 pt)

Exercice 4

4 points — C1, C5

Soit h la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = \frac{1}{x}$. On admet que $h'(a) = -\frac{1}{a^2}$ pour tout $a > 0$.

1. Calculer le taux de variation de h entre $x = 2$ et $x = 3$. (1,5 pt)
2. Approcher $h(2,05) = \frac{1}{2,05}$ à l'aide de l'approximation linéaire en $a = 2$. (1,5 pt)
3. Comparer avec la valeur exacte $\frac{1}{2,05}$ (arrondir au millièm). (1 pt)

Corrigé — Évaluation B — Dérivation locale**Exercice 1 — 6 points**

Question 1. $f(2) = 4 - 12 + 10 = 2$ et $f(5) = 25 - 30 + 10 = 5$.

$$\tau = \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{5 - 2}{3} = 1.$$

Question 2. $f(5) = 5$.

$$\begin{aligned} f(5+h) &= (5+h)^2 - 6(5+h) + 10 \\ &= 25 + 10h + h^2 - 30 - 6h + 10 = h^2 + 4h + 5. \end{aligned}$$

$$\frac{f(5+h) - f(5)}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4.$$

Question 3. $f'(5) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$.

Question 4. $f'(5) = 4$ signifie que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 5 a pour pente 4 : la courbe monte localement avec un coefficient directeur de 4.

Exercice 2 — 5 points

Question 1. $g'(2) = 3 \times 2^2 = 12$.

Question 2. $g(2) = 8$. La tangente T_2 en $x = 2$:

$$T_2 : y = 12(x - 2) + 8 = 12x - 16.$$

Question 3. $T_2(0) = 12 \times 0 - 16 = -16$. Le point $(0; -16)$ est bien sur T_2 . ✓

Question 4. Tangente horizontale $\Leftrightarrow g'(a) = 0 \Leftrightarrow 3a^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $f(3) = 4$ et $f'(3) = 2$.

Question 2. $T : y = 2(x - 3) + 4 = 2x - 2$.

Question 3. $f(3,02) \approx f(3) + f'(3) \times 0,02 = 4 + 2 \times 0,02 = 4,04$.

Question 4. C'est une valeur approchée ($\approx$). L'approximation linéaire remplace la courbe par sa tangente au voisinage du point.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $h(4) = \frac{1}{4}$ et $h(5) = \frac{1}{5}$.

$$\tau = \frac{h(5) - h(4)}{5 - 4} = \frac{\frac{1}{5} - \frac{1}{4}}{1} = \frac{-\frac{1}{20}}{1} = -\frac{1}{20} = -0,05.$$

Question 2. $h'(5) = -\frac{1}{25}$.

$$h(5,02) \approx h(5) + h'(5) \times 0,02 = \frac{1}{5} + \left(-\frac{1}{25}\right) \times 0,02 = 0,2 - 0,0008 = 0,1992.$$

Question 3. Valeur exacte : $\frac{1}{5,02} = \frac{50}{251} \approx 0,19920 \dots$

Approximation : 0,1992. L'erreur est négligeable.

Évaluation B — Dérivation locale

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

6 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x + 10$.

1. Calculer le taux de variation de f entre $x = 2$ et $x = 5$. (1,5 pt)
2. Calculer $\frac{f(5+h) - f(5)}{h}$ pour $h \neq 0$. Simplifier. (2 pt)
3. En déduire le nombre dérivé $f'(5)$. (1 pt)
4. Interpréter $f'(5)$ graphiquement. (1,5 pt)

Exercice 2

5 points — C2, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3$. On admet que $g'(a) = 3a^2$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(2)$. (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente T_2 à la courbe de g au point d'abscisse 2. (2 pt)
3. Vérifier que T_2 passe par le point $(0; -16)$. (1 pt)
4. Déterminer l'abscisse du point de la courbe où la tangente est horizontale. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C3, C4, C5

On lit sur un graphique que la courbe de f passe par le point $A(3; 4)$ et que la tangente en A a pour pente 2.

1. Donner les valeurs de $f(3)$ et $f'(3)$. (1 pt)

2. Écrire l'équation de la tangente en A. (1,5 pt)
3. Approcher $f(3,02)$ à l'aide de l'approximation linéaire. (1,5 pt)
4. Ce résultat est-il une valeur exacte ou approchée ? Justifier. (1 pt)

Exercice 4

4 points — C1, C5

Soit h la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = \frac{1}{x}$. On admet que $h'(a) = -\frac{1}{a^2}$ pour tout $a > 0$.

1. Calculer le taux de variation de h entre $x = 4$ et $x = 5$. (1,5 pt)
2. Approcher $h(5,02) = \frac{1}{5,02}$ à l'aide de l'approximation linéaire en $a = 5$. (1,5 pt)
3. Comparer avec la valeur exacte $\frac{1}{5,02}$ (arrondir au millième). (1 pt)

Rappel — Images et courbe représentative

Calculer une image : si $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, alors l'image de 4 par f est

$$f(4) = 2 \times 4^2 - 3 \times 4 + 1 = 32 - 12 + 1 = 21.$$

Lire une image sur une courbe : sur la courbe C_f , le point d'abscisse a a pour ordonnée $f(a)$. On lit $f(a)$ en projetant horizontalement sur l'axe des ordonnées.

Exercice 51

Soit $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Calculer les images suivantes.

1. $f(0)$
2. $f(2)$
3. $f(-1)$
4. $f(a)$ pour $a = 5$.

Corrigé**Question 1.**

$$f(0) = 0^2 + 2 \times 0 - 3 = -3.$$

Question 2.

$$f(2) = 2^2 + 2 \times 2 - 3 = 4 + 4 - 3 = 5.$$

Question 3.

$$f(-1) = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 3 = 1 - 2 - 3 = -4.$$

Question 4.

$$f(5) = 5^2 + 2 \times 5 - 3 = 25 + 10 - 3 = 32.$$

Exercice 52

Soit $g(x) = \frac{1}{x+1}$ définie pour $x \neq -1$.

1. Calculer $g(0)$, $g(1)$ et $g(3)$.
2. Calculer $g(a)$ puis $g(a+h)$ pour des valeurs génériques a et h .
3. Pourquoi $g(-1)$ n'existe-t-elle pas ?

Corrigé

Question 1.

$$g(0) = \frac{1}{0+1} = 1, \quad g(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}, \quad g(3) = \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4}.$$

Question 2.

$$g(a) = \frac{1}{a+1}, \quad g(a+h) = \frac{1}{(a+h)+1} = \frac{1}{a+h+1}.$$

Question 3. Si $x = -1$, le dénominateur vaut $-1 + 1 = 0$. La division par zéro est interdite, donc $g(-1)$ n'existe pas.

Exercice 53

Soit $f(x) = -x^2 + 4x$.

1. Calculer $f(1)$ et $f(3)$.
2. Calculer $f(1+h)$ en fonction de h (développer et réduire).
3. En déduire $f(1+h) - f(1)$.

Corrigé

Question 1.

$$f(1) = -1^2 + 4 \times 1 = -1 + 4 = 3, \quad f(3) = -3^2 + 4 \times 3 = -9 + 12 = 3.$$

Question 2.

$$\begin{aligned} f(1+h) &= -(1+h)^2 + 4(1+h) \\ &= -(1+2h+h^2) + 4 + 4h \\ &= -1 - 2h - h^2 + 4 + 4h \\ &= -h^2 + 2h + 3. \end{aligned}$$

Question 3.

$$f(1+h) - f(1) = (-h^2 + 2h + 3) - 3 = -h^2 + 2h = h(-h + 2).$$

Rappel — Développer, factoriser, simplifier

Développer : $a(b+c) = ab+ac$ et $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Simplifier une fraction : factoriser numérateur et dénominateur, puis simplifier le facteur commun.

Exercice 54

Développer et réduire chaque expression.

1. $A = (a+h)^2 - a^2$
2. $B = 3(a+h)^2 - 3a^2$
3. $C = (a+h)^3 - a^3$ (on développera $(a+h)^3$)

Corrigé

Question 1.

$$A = a^2 + 2ah + h^2 - a^2 = 2ah + h^2.$$

Question 2.

$$B = 3(a^2 + 2ah + h^2) - 3a^2 = 3a^2 + 6ah + 3h^2 - 3a^2 = 6ah + 3h^2.$$

Question 3.

$$C = a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3 = 3a^2h + 3ah^2 + h^3.$$

Exercice 55

Simplifier les fractions suivantes ($h \neq 0$).

1. $\frac{2ah + h^2}{h}$
2. $\frac{6ah + 3h^2}{h}$
3. $\frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h}$

Corrigé

Question 1.

$$\frac{2ah + h^2}{h} = \frac{h(2a + h)}{h} = 2a + h.$$

Question 2.

$$\frac{6ah + 3h^2}{h} = \frac{h(6a + 3h)}{h} = 6a + 3h.$$

Question 3.

$$\frac{3a^2h + 3ah^2 + h^3}{h} = \frac{h(3a^2 + 3ah + h^2)}{h} = 3a^2 + 3ah + h^2.$$

Exercice 56

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$. Simplifier $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour $a \neq 0$ et $h \neq 0$.

Corrigé

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a - (a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a+h)}}{h} \\ &= \frac{-h}{a(a+h)} \times \frac{1}{h} = \frac{-1}{a(a+h)}. \end{aligned}$$

Rappel — Droites dans le plan

Le **coefficient directeur** (ou pente) de la droite passant par $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (x_A \neq x_B).$$

L'équation de la droite de pente m passant par $A(x_A; y_A)$ est :

$$y = m(x - x_A) + y_A.$$

Exercice 57

Calculer le coefficient directeur de la droite passant par les points suivants.

1. $A(1; 3)$ et $B(4; 9)$

2. $C(2;5)$ et $D(6;5)$
3. $E(0;-1)$ et $F(3;8)$

Corrigé

Question 1. $m = \frac{9-3}{4-1} = \frac{6}{3} = 2.$

Question 2. $m = \frac{5-5}{6-2} = \frac{0}{4} = 0.$ La droite est horizontale.

Question 3. $m = \frac{8-(-1)}{3-0} = \frac{9}{3} = 3.$

Exercice 58 ♦

Écrire l'équation de la droite de pente m passant par le point P indiqué. Mettre sous la forme $y = mx + p$.

1. $m = 2, P(1;3).$
2. $m = -3, P(2;7).$
3. $m = \frac{1}{2}, P(4;5).$

Corrigé

Question 1. $y = 2(x-1) + 3 = 2x - 2 + 3 = 2x + 1.$

Question 2. $y = -3(x-2) + 7 = -3x + 6 + 7 = -3x + 13.$

Question 3. $y = \frac{1}{2}(x-4) + 5 = \frac{x}{2} - 2 + 5 = \frac{x}{2} + 3.$

Exercice 59 ♦

La droite $\mathcal{D}$ passe par $A(2;4)$ et $B(5;10)$.

1. Calculer le coefficient directeur de $\mathcal{D}$.
2. Écrire l'équation de $\mathcal{D}$.
3. Vérifier que le point $C(3;6)$ appartient à $\mathcal{D}$.

Corrigé

Question 1. $m = \frac{10-4}{5-2} = \frac{6}{3} = 2.$

Question 2. $y = 2(x-2) + 4 = 2x - 4 + 4 = 2x.$

Question 3. $y(3) = 2 \times 3 = 6.$ L'ordonnée de C est bien 6, donc $C \in \mathcal{D}$. ✓

Rappel — Fonctions de référence

Fonction carré : $f(x) = x^2$, définie sur $\mathbb{R}$, décroissante sur $] -\infty; 0]$, croissante sur $[0; +\infty[$.

Fonction inverse : $g(x) = \frac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$, strictement décroissante sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

Exercice 60 ♦

Soit $f(x) = x^2$.

1. Calculer $f(3), f(-3), f(0,5)$.
2. Calculer $f(a+h) - f(a)$ en développant.
3. Que vaut $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour $h \neq 0$?

Corrigé

Question 1. $f(3) = 9$, $f(-3) = 9$, $f(0,5) = 0,25$.

Question 2. $f(a+h) - f(a) = (a+h)^2 - a^2 = a^2 + 2ah + h^2 - a^2 = 2ah + h^2$.

Question 3. $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$.

Exercice 61

Soit $g(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$.

1. Calculer $g(2)$, $g(4)$, $g(-1)$.

2. Montrer que $g(a+h) - g(a) = \frac{-h}{a(a+h)}$ pour $a \neq 0$, $a+h \neq 0$.

3. En déduire $\frac{g(a+h) - g(a)}{h}$.

Corrigé

Question 1. $g(2) = \frac{1}{2}$, $g(4) = \frac{1}{4}$, $g(-1) = -1$.

Question 2.

$$g(a+h) - g(a) = \frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} = \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} = \frac{-h}{a(a+h)}.$$

Question 3.

$$\frac{g(a+h) - g(a)}{h} = \frac{-h}{a(a+h)} \times \frac{1}{h} = \frac{-1}{a(a+h)}.$$

Exercice 62

Soit $f(x) = x^2 + 3x$.

1. Calculer $f(1)$ et $f(1+h)$ en développant.

2. Calculer le taux de variation $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$.

3. Que se passe-t-il quand h se rapproche de 0?

Corrigé

Question 1. $f(1) = 1 + 3 = 4$.

$$f(1+h) = (1+h)^2 + 3(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 3 + 3h = h^2 + 5h + 4.$$

Question 2.

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{h^2 + 5h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 5h}{h} = h + 5.$$

Question 3. Quand h se rapproche de 0, $h + 5$ se rapproche de 5. On obtient $f'(1) = 5$.

Rappel — Vitesse moyenne

La **vitesse moyenne** entre les instants t_1 et t_2 est :

$$v_{\text{moy}} = \frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$$

où $d(t)$ est la distance parcourue à l'instant t .

Unités : si d est en mètres et t en secondes, la vitesse est en m/s.

Exercice 63

Un marcheur parcourt $d(t) = 80t$ mètres en t minutes.

1. Calculer la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 5$.
2. Calculer sa vitesse moyenne sur cet intervalle, en m/min.
3. Calculer sa vitesse moyenne entre $t = 3$ et $t = 7$, en m/min.

Corrigé

Question 1. $d(5) - d(0) = 400 - 0 = 400$ m.

Question 2. $v = \frac{400}{5} = 80$ m/min.

Question 3. $v = \frac{d(7) - d(3)}{7 - 3} = \frac{560 - 240}{4} = \frac{320}{4} = 80$ m/min.

Exercice 64

Un cycliste a pour position $d(t) = 5t^2$ mètres, t en secondes.

1. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 4$.
2. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 2,1$.
3. Calculer la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 2,01$.
4. Que conjecturez-vous pour la vitesse instantanée à $t = 2$?

Corrigé

Question 1. $v = \frac{d(4) - d(2)}{4 - 2} = \frac{80 - 20}{2} = 30$ m/s.

Question 2. $v = \frac{d(2,1) - d(2)}{0,1} = \frac{22,05 - 20}{0,1} = \frac{2,05}{0,1} = 20,5$ m/s.

Question 3. $v = \frac{d(2,01) - d(2)}{0,01} = \frac{20,2005 - 20}{0,01} = \frac{0,2005}{0,01} = 20,05$ m/s.

Question 4. Les vitesses moyennes se rapprochent de 20 m/s. On conjecture que la vitesse instantanée à $t = 2$ est 20 m/s (c'est le nombre dérivé $d'(2)$).

Exercice 65

Un objet chute librement : sa hauteur est $h(t) = 100 - 5t^2$ (en mètres, t en secondes).

1. Quelle est la hauteur initiale?
2. Calculer la vitesse moyenne de chute entre $t = 0$ et $t = 2$.
3. Le signe de cette vitesse moyenne est-il cohérent? Justifier.

Corrigé

Question 1. $h(0) = 100 - 0 = 100$ m.

Question 2. $v = \frac{h(2) - h(0)}{2 - 0} = \frac{80 - 100}{2} = \frac{-20}{2} = -10$ m/s.

Question 3. La vitesse moyenne est négative : la hauteur diminue (l'objet descend), ce qui est cohérent avec une chute. Le taux de variation négatif traduit la décroissance de la fonction h .

Exercice 66

Soit $f(x) = x^2 - 2x$. Calculer le taux de variation de f :

- entre $x = 1$ et $x = 4$;
- entre $x = 2$ et $x = 2 + h$ (pour $h \neq 0$), puis simplifier.

Coup de pouce 1. Le taux de variation entre a et b est $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Calcule d'abord $f(1)$ et $f(4)$.

Corrigé

Question 1. $f(1) = 1 - 2 = -1$ et $f(4) = 16 - 8 = 8$.

$$\tau = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{8 - (-1)}{3} = \frac{9}{3} = 3.$$

Question 2. $f(2) = 4 - 4 = 0$ et $f(2 + h) = (2 + h)^2 - 2(2 + h) = 4 + 4h + h^2 - 4 - 2h = h^2 + 2h$.

$$\tau = \frac{f(2 + h) - f(2)}{h} = \frac{h^2 + 2h}{h} = h + 2.$$

Exercice 67 ♦

Un véhicule a pour position $d(t) = 3t^2$ mètres à l'instant t (en secondes).

- Quelle est la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 5$?
- Calculer le taux de variation de d entre $t = 2$ et $t = 5$. Que représente-t-il?
- Calculer le taux de variation entre $t = 2$ et $t = 2,1$.

Corrigé

Question 1. $d(5) - d(0) = 75 - 0 = 75$ m.

Question 2. $\tau = \frac{d(5) - d(2)}{5 - 2} = \frac{75 - 12}{3} = \frac{63}{3} = 21$ m/s. C'est la vitesse moyenne entre $t = 2$ et $t = 5$.

Question 3. $\tau = \frac{d(2,1) - d(2)}{0,1} = \frac{13,23 - 12}{0,1} = \frac{1,23}{0,1} = 12,3$ m/s.

Exercice 68 ♦

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ pour $x > 0$. Calculer le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$ (pour $h \neq 0$ et $1 + h > 0$), puis simplifier.

Corrigé

$$f(1) = 1 \text{ et } f(1 + h) = \frac{1}{1 + h}.$$

$$\tau = \frac{f(1 + h) - f(1)}{h} = \frac{\frac{1}{1 + h} - 1}{h} = \frac{\frac{1 - (1 + h)}{1 + h}}{h} = \frac{\frac{-h}{1 + h}}{h} = \frac{-1}{1 + h}.$$

Exercice 69 ♦

Soit $f(x) = x^2 + x$. On calcule le taux de variation entre a et $a + h$.

- Développer $f(a + h)$.
- Calculer $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ et simplifier.
- En déduire $f'(a)$ en faisant tendre h vers 0.
- Calculer $f'(1)$ et $f'(-2)$.

Coup de pouce 1. $f(a+h) = (a+h)^2 + (a+h)$. Développe puis soustrais $f(a)$.

Corrigé

Question 1. $f(a+h) = (a+h)^2 + (a+h) = a^2 + 2ah + h^2 + a + h$.

Question 2.

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{2ah + h^2 + h}{h} = 2a + h + 1.$$

Question 3. Quand $h \rightarrow 0$: $2a + h + 1 \rightarrow 2a + 1$. Donc $f'(a) = 2a + 1$.

Question 4. $f'(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$ et $f'(-2) = 2 \times (-2) + 1 = -3$.

Exercice 70

On donne $f'(2) = 5$.

1. Interpréter $f'(2)$ en termes de pente.
2. Si f représente la distance (en km) parcourue par un véhicule en t heures, interpréter $f'(2)$ comme vitesse.

Corrigé

Question 1. $f'(2) = 5$ signifie que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 a pour pente 5 : la courbe « monte » localement avec un coefficient directeur de 5.

Question 2. Dans ce contexte, $f'(2) = 5$ signifie que la vitesse instantanée du véhicule à l'instant $t = 2$ h est 5 km/h.

Exercice 71

Soit $f(x) = 3x^2$. Calculer $f'(a)$ par la méthode du taux de variation, puis vérifier pour $a = 1$.

Corrigé

$f(a) = 3a^2$ et $f(a+h) = 3(a+h)^2 = 3a^2 + 6ah + 3h^2$.

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{6ah + 3h^2}{h} = 6a + 3h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 6a.$$

Donc $f'(a) = 6a$.

Vérification : $f'(1) = 6$. Le taux de variation entre 1 et 1,01 : $\frac{f(1,01) - f(1)}{0,01} = \frac{3,0603 - 3}{0,01} = 6,03 \approx 6$.
✓

Exercice 72

Sur un graphique, la tangente à la courbe de f au point $A(3;2)$ passe par le point $B(5;6)$.

1. Déterminer $f'(3)$.
2. La tangente au point $C(1;4)$ est horizontale. Que vaut $f'(1)$?

Coup de pouce 1. Le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente. Utilise la formule de la pente avec les deux points.

Corrigé

Question 1. $f'(3) = \frac{6-2}{5-3} = \frac{4}{2} = 2$.

Question 2. Une tangente horizontale a une pente nulle, donc $f'(1) = 0$.

Exercice 73

On sait que $f(2) = 5$ et $f'(2) = -1$.

1. Tracer la tangente au point $A(2;5)$ de pente -1 (sur un repère).
2. Lire graphiquement l'ordonnée de la tangente pour $x = 4$.
3. Vérifier par le calcul : $y(4) = f'(2)(4 - 2) + f(2)$.

Corrigé

Question 1. On place $A(2;5)$. La pente est -1 : pour 1 unité vers la droite, on descend de 1. On obtient le point $(3;4)$. On trace la droite passant par A et $(3;4)$.

Question 2. Sur le graphique, en $x = 4$, la tangente donne $y \approx 3$.

Question 3. $y(4) = -1 \times (4 - 2) + 5 = -2 + 5 = 3$. ✓

Exercice 74

Sur un graphique, on lit les informations suivantes pour la courbe de f :

- ▶ En $A(0;1)$, la tangente passe par $(1;3)$.
- ▶ En $B(2;4)$, la tangente passe par $(4;4)$.
- ▶ En $C(4;0)$, la tangente passe par $(6;-4)$.

Déterminer $f'(0)$, $f'(2)$ et $f'(4)$.

Corrigé

$$f'(0) = \frac{3-1}{1-0} = 2.$$

$$f'(2) = \frac{4-4}{4-2} = 0. \text{ La tangente en } B \text{ est horizontale.}$$

$$f'(4) = \frac{-4-0}{6-4} = \frac{-4}{2} = -2.$$

Exercice 75

Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a dans chaque cas.

1. $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$.
2. $f(0) = -1$ et $f'(0) = 4$.
3. $f(5) = 10$ et $f'(5) = 0$.

Coup de pouce 1. La formule est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Remplace a , $f(a)$ et $f'(a)$ par les valeurs données.

Corrigé

Question 1. $y = 2(x - 1) + 3 = 2x - 2 + 3 = 2x + 1$.

Question 2. $y = 4(x - 0) + (-1) = 4x - 1$.

Question 3. $y = 0 \times (x - 5) + 10 = 10$. La tangente est horizontale.

Exercice 76

Soit $f(x) = x^2$. On admet que $f'(a) = 2a$.

1. Écrire l'équation de la tangente en $a = 3$.
2. Écrire l'équation de la tangente en $a = -1$.
3. Vérifier que chaque tangente passe bien par son point de contact.

Corrigé

Question 1. $f(3) = 9, f'(3) = 6$. Tangente : $y = 6(x - 3) + 9 = 6x - 18 + 9 = 6x - 9$.

Question 2. $f(-1) = 1, f'(-1) = -2$. Tangente : $y = -2(x + 1) + 1 = -2x - 2 + 1 = -2x - 1$.

Question 3. Pour $x = 3 : y = 6 \times 3 - 9 = 9 = f(3)$. ✓
Pour $x = -1 : y = -2 \times (-1) - 1 = 1 = f(-1)$. ✓

Exercice 77

On donne $f(2) = 7$ et $f'(2) = -3$.

1. Écrire l'équation de la tangente T en $a = 2$.
2. Calculer $T(0)$, $T(1)$ et $T(4)$.
3. La tangente passe-t-elle par le point $(4; 1)$?

Corrigé

Question 1. $T : y = -3(x - 2) + 7 = -3x + 6 + 7 = -3x + 13$.

Question 2. $T(0) = 13$, $T(1) = 10$, $T(4) = -12 + 13 = 1$.

Question 3. $T(4) = 1$: oui, le point $(4; 1)$ est sur la tangente. ✓

Exercice 78

On donne $f(3) = 10$ et $f'(3) = 4$.

1. Approcher $f(3,02)$ à l'aide de l'approximation linéaire.
2. Approcher $f(2,95)$.
3. Le symbole utilisé est-il $=$ ou $\approx$? Pourquoi ?

Coup de pouce 1. $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$. Identifie a et h dans chaque cas.

Corrigé

Question 1. $a = 3, h = 0,02$. $f(3,02) \approx 10 + 4 \times 0,02 = 10,08$.

Question 2. $a = 3, h = -0,05$. $f(2,95) \approx 10 + 4 \times (-0,05) = 10 - 0,2 = 9,8$.

Question 3. On utilise $\approx$ car c'est une approximation, pas une valeur exacte. Elle est d'autant meilleure que $|h|$ est petit.

Exercice 79

On admet que la dérivée de $f(x) = \sqrt{x}$ en $x = a > 0$ est $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$.

1. Calculer $f(9)$ et $f'(9)$.
2. En déduire une approximation de $\sqrt{9,03}$.
3. Comparer avec la valeur exacte à la calculatrice.

Corrigé

Question 1. $f(9) = \sqrt{9} = 3$ et $f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$.

Question 2. $\sqrt{9,03} \approx 3 + \frac{1}{6} \times 0,03 = 3 + 0,005 = 3,005$.

Question 3. Calculatrice : $\sqrt{9,03} \approx 3,00500 \dots$ L'approximation est excellente car $h = 0,03$ est très petit devant $a = 9$.

Exercice 80 ♦

Soit $f(x) = x^3$. On admet $f'(a) = 3a^2$.

1. Calculer $f(2)$ et $f'(2)$.
2. Approcher $f(2,01) = (2,01)^3$ par l'approximation linéaire.
3. Calculer l'erreur relative : $\frac{|f(2,01) - \text{approximation}|}{f(2,01)} \times 100$.

Corrigé

Question 1. $f(2) = 8$ et $f'(2) = 3 \times 4 = 12$.

Question 2. $f(2,01) \approx 8 + 12 \times 0,01 = 8,12$.

Question 3. Valeur exacte : $(2,01)^3 = 8,120\,601$. Erreur relative :

$$\frac{|8,120\,601 - 8,12|}{8,120\,601} \times 100 \approx 0,007\%.$$

L'approximation est très précise.

Corrigé

On calcule $f(1) = 2$ et $f(4) = 17$. Le taux de variation est donc $\frac{17-2}{4-1} = 5$.

Corrigé

On a $g(0) = 1$ et $g(4) = 9$. Comme les abscisses sont distinctes, le taux de variation vaut $\frac{9-1}{4-0} = 2$. Le résultat est cohérent : la fonction affine g a pour coefficient directeur 2.

Corrigé

1. On calcule le taux de variation de d entre 0 et 2 :

$$\frac{d(2) - d(0)}{2 - 0} = \frac{80 - 0}{2} = 40.$$

Ce résultat signifie que le véhicule a parcouru en moyenne 40 km par heure sur les deux premières heures. L'unité est le kilomètre par heure (km/h).

2. Entre 2 et 5 :

$$\frac{d(5) - d(2)}{5 - 2} = \frac{275 - 80}{3} = 65.$$

Sur les trois heures suivantes, la vitesse moyenne est de 65 km/h.

3. On compare les deux taux de variation : $65 > 40$. Le véhicule a roulé plus vite en moyenne sur l'intervalle $[2; 5]$ que sur $[0; 2]$.

Vérification : les deux taux sont positifs, ce qui est cohérent car la distance ne peut que croître.

Corrigé

1. Le taux de variation de C entre 100 et 200 vaut

$$\frac{C(200) - C(100)}{200 - 100} = \frac{1500 - 850}{100} = \frac{650}{100} = 6,5.$$

2. Ce taux de variation est le coût moyen par pièce supplémentaire : entre la 100^e et la 200^e pièce, chaque pièce supplémentaire coûte en moyenne 6,50 euros à produire.

3. La sécante passe par $A(100; 850)$ et $B(200; 1500)$. Son coefficient directeur est le taux de variation calculé à la question 1, soit 6,5. Comme $6,5 > 0$, le coefficient directeur est positif.

On pouvait aussi observer que $C(200) > C(100)$: le coût total augmente quand la production augmente, ce qui est cohérent avec un coefficient directeur positif.

Corrigé

1. On calcule :

► Entre 1 et 3 : $\frac{3^2 - 1^2}{3 - 1} = \frac{8}{2} = 4$.

► Entre 2 et 4 : $\frac{4^2 - 2^2}{4 - 2} = \frac{12}{2} = 6$.

► Entre 0 et 5 : $\frac{5^2 - 0^2}{5 - 0} = \frac{25}{5} = 5$.

2. On observe : $4 = 1 + 3$, $6 = 2 + 4$, $5 = 0 + 5$. Conjecture : le taux de variation de f entre a et b vaut $a + b$.

3. Pour $a \neq b$, on écrit

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{b^2 - a^2}{b - a}.$$

On factorise le numérateur par l'identité remarquable $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$. Comme $b \neq a$, on simplifie :

$$\frac{(b - a)(b + a)}{b - a} = b + a = a + b.$$

La conjecture est démontrée.

4. La sécante à la parabole passant par les points d'abscisses a et b a pour coefficient directeur le taux de variation de f entre a et b , soit $a + b$.

Corrigé

1. Pour $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x$, avec $a = 1$:

h	1	0,5	0,1
$\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$	$\frac{4-1}{1} = 3$	$\frac{2,25-1}{0,5} = 2,5$	$\frac{1,21-1}{0,1} = 2,1$
$\frac{g(1+h)-g(1)}{h}$	$\frac{4-2}{1} = 2$	$\frac{3-2}{0,5} = 2$	$\frac{2,2-2}{0,1} = 2$

2. Le taux de variation de g vaut toujours 2, quel que soit h . Celui de f semble se rapprocher de 2 lorsque h se rapproche de 0. Conjecture : les deux taux tendent vers la même valeur 2.

3. Pour tout $h \neq 0$:

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h.$$

4. Lorsque h se rapproche de 0, $2 + h$ se rapproche de 2. Le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$ tend vers 2, qui est aussi le taux de variation constant de g . Les deux fonctions ont le même comportement local en $a = 1$.

5. La tangente à la courbe de f en $a = 1$ a pour coefficient directeur 2. La droite représentant g a aussi pour coefficient directeur 2 et passe par le point $(1; 2) = (1; f(1))$. La tangente à la parabole au point d'abscisse 1 est donc la droite $y = 2x$, qui est la droite représentant g .

Corrigé

1. On a $f(3) = 9 + 6 = 15$.

► $h = 1$: $\frac{f(4)-f(3)}{1} = \frac{24-15}{1} = 9$.

► $h = 0,1$: $\frac{f(3,1)-f(3)}{0,1} = \frac{15,81-15}{0,1} = 8,1$.

► $h = 0,01$: $\frac{f(3,01)-f(3)}{0,01} = \frac{15,0801-15}{0,01} = 8,01$.

- Les taux de variation 9, 8,1, 8,01 semblent tendre vers 8 lorsque h se rapproche de 0.
- Par définition, $f'(3)$ est la valeur vers laquelle tendent les taux de variation. Donc $f'(3) = 8$.

Vérification : $\frac{f(3+h)-f(3)}{h} = \frac{(3+h)^2+2(3+h)-15}{h} = \frac{h^2+8h}{h} = h+8$. Lorsque $h \rightarrow 0$, on obtient bien 8.

Corrigé

- On a $f(2) = 3 \times 4 = 12$ et $f(2+h) = 3(2+h)^2 = 3(4+4h+h^2) = 12+12h+3h^2$.

$$\text{Donc } \frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \frac{12+12h+3h^2-12}{h} = \frac{12h+3h^2}{h} = 12+3h.$$

- Lorsque h se rapproche de 0, $12+3h$ se rapproche de 12. Donc $f'(2) = 12$.

Corrigé

- $d(3) = 5 \times 9 = 45$ m et $d(3,1) = 5 \times 3,1^2 = 5 \times 9,61 = 48,05$ m.

$$\text{Taux de variation : } \frac{48,05-45}{0,1} = 30,5 \text{ m/s.}$$

- $d(3+h) = 5(3+h)^2 = 5(9+6h+h^2) = 45+30h+5h^2$.

$$\frac{d(3+h)-d(3)}{h} = \frac{30h+5h^2}{h} = 30+5h.$$

- Lorsque h se rapproche de 0, $30+5h$ se rapproche de 30. Donc $d'(3) = 30$.

4. Le nombre $d'(3) = 30$ est la vitesse instantanée de l'objet à $t = 3$ s. L'objet se déplace à 30 mètres par seconde (m/s) à cet instant.

Corrigé

- $(1+h)^3 = 1+3h+3h^2+h^3$.

- $f(1+h)-f(1) = (1+3h+3h^2+h^3)-1 = 3h+3h^2+h^3$.

$$\frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \frac{3h+3h^2+h^3}{h} = 3+3h+h^2.$$

- Lorsque h se rapproche de 0, $3+3h+h^2$ se rapproche de 3. Donc $f'(1) = 3$.

4. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 a pour coefficient directeur $f'(1) = 3 > 0$. La tangente est donc croissante (elle monte de gauche à droite).

Corrigé

- $(a+h)^2 = a^2+2ah+h^2$. Donc $f(a+h)-f(a) = a^2+2ah+h^2-a^2 = 2ah+h^2$.

$$2. \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{2ah+h^2}{h} = 2a+h.$$

- Lorsque h se rapproche de 0, $2a+h$ se rapproche de $2a$. Donc $f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

4.

► $f'(0) = 0$: la tangente au sommet de la parabole est horizontale.

► $f'(-1) = -2$: la tangente descend.

► $f'(5) = 10$: la tangente monte.

5. $f'(a) = 0$ équivaut à $2a = 0$, soit $a = 0$. La tangente à la parabole au point d'abscisse 0 est horizontale : c'est le sommet de la parabole, où la courbe change de sens de variation.

Corrigé

$$1. f(1+h)-f(1) = \frac{1}{1+h} - 1 = \frac{1-(1+h)}{1+h} = \frac{-h}{1+h}.$$

$$\text{Donc } \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \frac{-h}{h(1+h)} = \frac{-1}{1+h}.$$

L'égalité est bien vérifiée pour $h \neq 0$ et $1 + h > 0$.

2. Lorsque h se rapproche de 0, $\frac{-1}{1+h}$ se rapproche de $\frac{-1}{1} = -1$. Donc $f'(1) = -1$.

3. La tangente au point d'abscisse 1 a pour équation

$$y = f(1) + f'(1)(x - 1) = 1 + (-1)(x - 1) = 1 - x + 1 = 2 - x.$$

4. La tangente coupe l'axe des abscisses lorsque $y = 0$, soit $2 - x = 0$, c'est-à-dire $x = 2$. La tangente coupe l'axe des abscisses au point $(2; 0)$.

Corrigé

Question 1. L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Ici $a = 2$, $f(2) = 5$ et $f'(2) = 3$. On obtient :

$$y = 3(x - 2) + 5 = 3x - 6 + 5 = 3x - 1.$$

L'équation de la tangente T est donc $y = 3x - 1$.

Question 2. La tangente passe par $A(2; 5)$. Puisque la pente vaut 3, en augmentant l'abscisse de 1, l'ordonnée augmente de 3. On obtient le point $B(3; 8)$.

Vérification : $y = 3 \times 3 - 1 = 8$. Le point $B(3; 8)$ est bien sur la tangente.

Question 3. Pour $x = 4$:

$$y = 3 \times 4 - 1 = 12 - 1 = 11.$$

L'ordonnée du point de la tangente d'abscisse 4 est 11 .

Corrigé

Question 1. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 passe par le point $A(1; 3)$. Or le point de tangence a pour abscisse 1, donc son ordonnée est $f(1)$.

Puisque le point de tangence est sur la tangente, on a $f(1) = 3$.

Question 2. La tangente passe par $A(1; 3)$ et $B(4; 0)$. Son coefficient directeur est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - 3}{4 - 1} = \frac{-3}{3} = -1.$$

Le coefficient directeur de la tangente vaut -1 .

Question 3. Par définition, le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est égal à $f'(a)$.

Ici $a = 1$, donc $f'(1)$ est égal au coefficient directeur de la tangente, soit $f'(1) = -1$.

Corrigé

Question 1. Le point de tangence a pour abscisse $t = 6$. Il se situe à la fois sur la courbe et sur la tangente, donc son ordonnée est $T(6)$.

La tangente passe par le point $(6; 18)$, donc $T(6) = 18$.

Interprétation : à 6 heures du matin, la température dans le local technique est de 18°C .

Question 2. La tangente passe par les points $(6; 18)$ et $(10; 14)$. Son coefficient directeur est :

$$m = \frac{14 - 18}{10 - 6} = \frac{-4}{4} = -1.$$

Question 3. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe de T au point d'abscisse $t = 6$ est égal à $T'(6)$. Donc $T'(6) = -1$.

Question 4. On a $T'(6) = -1 < 0$. Le nombre dérivé est négatif, ce qui signifie que la fonction T est localement décroissante au voisinage de $t = 6$.

Interprétation : à 6 heures du matin, la température dans le local diminue au rythme instantané de 1°C par heure.

Corrigé

Question 1. L'équation de la tangente au point d'abscisse 1 est $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$.

Avec $f(1) = 2$ et $f'(1) = -1$:

$$y = -1 \times (x - 1) + 2 = -x + 1 + 2 = -x + 3.$$

L'équation de T_1 est $y = -x + 3$.

Question 2. L'équation de la tangente au point d'abscisse 3 est $y = f'(3)(x - 3) + f(3)$.

Avec $f(3) = 4$ et $f'(3) = 2$:

$$y = 2(x - 3) + 4 = 2x - 6 + 4 = 2x - 2.$$

L'équation de T_2 est $y = 2x - 2$.

Question 3. Les droites T_1 et T_2 ont pour coefficients directeurs respectifs -1 et 2 . Ces coefficients sont distincts, donc les droites ne sont pas parallèles : elles sont sécantes.

Pour trouver leur point d'intersection, on résout $-x + 3 = 2x - 2$:

$$-x + 3 = 2x - 2 \iff 3 + 2 = 2x + x \iff 5 = 3x \iff x = \frac{5}{3}.$$

On calcule l'ordonnée : $y = -\frac{5}{3} + 3 = -\frac{5}{3} + \frac{9}{3} = \frac{4}{3}$.

Vérification : $y = 2 \times \frac{5}{3} - 2 = \frac{10}{3} - \frac{6}{3} = \frac{4}{3}$. ✓

Les tangentes T_1 et T_2 se coupent au point de coordonnées $\left(\frac{5}{3}; \frac{4}{3}\right)$.

Corrigé

Question 1. On a $f(0) = 0^2 = 0 \neq -1$, donc le point $P(0; -1)$ n'appartient pas à la courbe $\mathcal{D}$.

Question 2. On a $f(a) = a^2$ et $f'(a) = 2a$. L'équation de la tangente T_a au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - 2a^2 + a^2.$$

D'où $T_a : y = 2ax - a^2$.

Question 3. La tangente T_a passe par $P(0; -1)$ si et seulement si les coordonnées de P vérifient l'équation de T_a :

$$-1 = 2a \times 0 - a^2 \iff -1 = -a^2 \iff a^2 = 1.$$

On obtient $a = 1$ ou $a = -1$.

Question 4. Les deux points de la parabole où la tangente passe par P sont :

- pour $a = 1$: le point de coordonnées $(1; f(1)) = (1; 1)$, avec la tangente $y = 2x - 1$;
- pour $a = -1$: le point de coordonnées $(-1; f(-1)) = (-1; 1)$, avec la tangente $y = -2x - 1$.

Vérification : $2 \times 0 - 1 = -1$ et $-2 \times 0 - 1 = -1$. Les deux tangentes passent bien par $P(0; -1)$. ✓

Les points cherchés sont $(1; 1)$ et $(-1; 1)$.

Corrigé

Question 1. On a $f(a) = a^2$ et $f'(a) = 2a$. L'équation de la tangente T_a au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - 2a^2 + a^2.$$

D'où $T_a : y = 2ax - a^2$. Le coefficient directeur de T_a est $2a$.

Question 2. La droite $\mathcal{D}$ a pour équation $y = 6x - 1$, donc son coefficient directeur est 6.

Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. On cherche a tel que :

$$2a = 6 \iff a = 3.$$

Il existe une unique valeur $a = 3$ pour laquelle la tangente est parallèle à $\mathcal{D}$. La réponse est donc **oui**.

Question 3. Pour $a = 3 : f(3) = 3^2 = 9$. Le point de la courbe est $(3; 9)$.

L'équation de la tangente en ce point est :

$$y = 2 \times 3 \times x - 3^2 = 6x - 9.$$

Soit $y = 6x - 9$.

Vérification : le coefficient directeur de cette tangente est bien 6, identique à celui de $\mathcal{D}$. De plus, $\mathcal{D} : y = 6x - 1$ et $T_3 : y = 6x - 9$ ont des ordonnées à l'origine distinctes ($-1 \neq -9$), donc ces droites sont bien parallèles et non confondues. ✓

Corrigé

Question 1. L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Ici $a = 1, f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$. On obtient :

$$y = 2(x - 1) + 3 = 2x - 2 + 3 = 2x + 1.$$

L'équation de la tangente T est donc $y = 2x + 1$.

Question 2. On vérifie que le point $(1; 3)$ appartient à la tangente en remplaçant x par 1 :

$$y = 2 \times 1 + 1 = 3.$$

On retrouve bien l'ordonnée 3. Le point $(1; 3)$ est donc sur la tangente. ✓

Corrigé

Question 1. On calcule :

$$f(-1) = (-1)^2 + 1 = 1 + 1 = 2 \quad \text{et} \quad f'(-1) = 2 \times (-1) = -2.$$

Donc $f(-1) = 2$ et $f'(-1) = -2$.

Question 2. L'équation de la tangente au point d'abscisse $a = -1$ est :

$$y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) = -2(x + 1) + 2.$$

On développe :

$$y = -2x - 2 + 2 = -2x.$$

L'équation de la tangente est donc $y = -2x$.

Corrigé

Question 1. On calcule :

$$f(3) = 3^2 - 4 \times 3 + 5 = 9 - 12 + 5 = 2 \quad \text{et} \quad f'(3) = 2 \times 3 - 4 = 2.$$

Donc $f(3) = 2$ et $f'(3) = 2$.

Question 2. L'équation de la tangente au point d'abscisse $a = 3$ est :

$$y = f'(3)(x - 3) + f(3) = 2(x - 3) + 2 = 2x - 6 + 2 = 2x - 4.$$

L'équation de la tangente T est $y = 2x - 4$.

Question 3. L'axe des abscisses a pour équation $y = 0$. On résout :

$$2x - 4 = 0 \iff 2x = 4 \iff x = 2.$$

La tangente T coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $(2; 0)$.

Vérification : $y = 2 \times 2 - 4 = 0$. ✓

Corrigé

Question 1. On calcule :

$$B(20) = -2 \times 20^2 + 120 \times 20 - 1000 = -800 + 2400 - 1000 = 600.$$

$$B'(20) = -4 \times 20 + 120 = -80 + 120 = 40.$$

Donc $B(20) = 600$ euros et $B'(20) = 40$.

Question 2. L'équation de la tangente au point d'abscisse $q = 20$ est :

$$y = B'(20)(q - 20) + B(20) = 40(q - 20) + 600 = 40q - 800 + 600 = 40q - 200.$$

L'équation de la tangente T est $y = 40q - 200$.

Question 3. La pente de la tangente vaut $B'(20) = 40 > 0$. Cela signifie que, au voisinage de $q = 20$ articles, le bénéfice est croissant : produire et vendre un article supplémentaire augmente le bénéfice d'environ 40 euros. Le bénéfice marginal est positif, il est donc encore avantageux pour l'entreprise d'augmenter sa production.

Corrigé

Question 1. On a $f(a) = a^2$ et $f'(a) = 2a$. L'équation de la tangente T_a au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - 2a^2 + a^2.$$

D'où $T_a : y = 2ax - a^2$.

Question 2. La tangente T_a passe par $O(0; 0)$ si et seulement si, en remplaçant x par 0 et y par 0 dans l'équation de T_a :

$$0 = 2a \times 0 - a^2 \iff 0 = -a^2 \iff a^2 = 0 \iff a = 0.$$

La seule valeur est $a = 0$.

Question 3. Pour $a = 0$: $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$. L'équation de la tangente T_0 est :

$$y = 2 \times 0 \times x - 0^2 = 0.$$

La tangente est la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses.

Remarque : ce résultat est cohérent car la courbe de $f(x) = x^2$ admet un minimum en $x = 0$ et la tangente en ce point est horizontale.

Corrigé

Question 1. Une tangente est horizontale lorsque sa pente est nulle, c'est-à-dire $f'(a) = 0$.

On résout :

$$2a - 2 = 0 \iff 2a = 2 \iff a = 1.$$

La tangente est horizontale pour $a = 1$.

On calcule $f(1) = 1^2 - 2 \times 1 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2$.

L'équation de la tangente horizontale est :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0 \times (x - 1) + 2 = 2.$$

Soit $y = 2$.

Question 2. La droite $\mathcal{D}$ a pour coefficient directeur 4. La tangente est parallèle à $\mathcal{D}$ lorsque $f'(a) = 4$.

On résout :

$$2a - 2 = 4 \iff 2a = 6 \iff a = 3.$$

La tangente est parallèle à $\mathcal{D}$ pour $a = 3$.

On calcule $f(3) = 3^2 - 2 \times 3 + 3 = 9 - 6 + 3 = 6$.

L'équation de la tangente est :

$$y = f'(3)(x - 3) + f(3) = 4(x - 3) + 6 = 4x - 12 + 6 = 4x - 6.$$

Soit $y = 4x - 6$.

Vérification : le coefficient directeur de cette tangente est 4, identique à celui de $\mathcal{D}$. Les ordonnées à l'origine sont distinctes ($-6 \neq 0$), donc les droites sont bien parallèles. ✓

Corrigé

1. $f(4) = -16 + 24 - 3 = 5$ et $f'(4) = -2 \times 4 + 6 = -2$.

2. L'approximation linéaire au voisinage de $a = 4$ avec $h = 0,03$ donne :

$$f(4,03) \approx f(4) + f'(4) \times 0,03 = 5 + (-2) \times 0,03 = 5 - 0,06 = 4,94.$$

3. La valeur exacte est $f(4,03) = -(4,03)^2 + 6 \times 4,03 - 3 = -16,2409 + 24,18 - 3 = 4,9391$.

L'approximation 4,94 est proche de la valeur exacte 4,9391 : l'écart est de 0,0009, ce qui confirme que l'approximation linéaire est pertinente pour un petit incrément $h = 0,03$.

Corrigé

Question 1. On a $f(3) = 9$ et $f'(3) = 2 \times 3 = 6$. L'approximation linéaire donne :

$$f(3,02) \approx f(3) + f'(3) \times (3,02 - 3) = 9 + 6 \times 0,02 = 9,12.$$

Question 2. De même, avec $h = 2,98 - 3 = -0,02$:

$$f(2,98) \approx f(3) + f'(3) \times (-0,02) = 9 - 0,12 = 8,88.$$

Question 3. Valeurs exactes : $3,02^2 = 9,1204$ et $2,98^2 = 8,8804$.

L'erreur est de 0,0004 dans les deux cas. L'approximation linéaire est donc très précise lorsque h est petit.

Corrigé

Question 1. On a $f(9) = \sqrt{9} = 3$.

Question 2. L'approximation linéaire au voisinage de $a = 9$ donne :

$$\sqrt{9,1} \approx f(9) + f'(9) \times (9,1 - 9) = 3 + \frac{1}{6} \times 0,1 = 3 + \frac{1}{60} = \frac{181}{60}.$$

En écriture décimale : $\frac{181}{60} \approx 3,0167$.

Question 3. La calculatrice donne $\sqrt{9,1} \approx 3,0166$.

L'erreur est d'environ 0,0001, soit un dix-millième. L'approximation linéaire est donc très précise au voisinage de 9.

Corrigé

Question 1. La valeur $P'(10) = 800$ signifie qu'à l'instant $t = 10$ ans, la population de la ville croît à un rythme instantané de 800 habitants par an.

Question 2. L'approximation linéaire au voisinage de $t = 10$ donne :

$$P(10,5) \approx P(10) + P'(10) \times (10,5 - 10) = 25\,000 + 800 \times 0,5 = \boxed{25\,400 \text{ habitants}}.$$

Question 3. De même :

$$P(12) \approx P(10) + P'(10) \times (12 - 10) = 25\,000 + 800 \times 2 = \boxed{26\,600 \text{ habitants}}.$$

Question 4. L'estimation de $P(10,5)$ est plus fiable que celle de $P(12)$. En effet, l'approximation linéaire $f(a+h) \approx f(a) + f'(a) \times h$ n'est valable que lorsque h est proche de 0. Ici, $h = 0,5$ pour la première estimation et $h = 2$ pour la seconde. Plus h est grand, plus on s'éloigne du point de tangence et plus l'écart entre la courbe et sa tangente risque de se creuser. L'estimation de $P(12)$ est donc moins fiable.

Corrigé

Question 1. On a $f(2) = \frac{1}{2}$ et $f'(2) = -\frac{1}{4}$. L'approximation linéaire donne :

$$\frac{1}{2,01} \approx f(2) + f'(2) \times 0,01 = \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) \times 0,01 = 0,5 - 0,0025 = \boxed{0,4975}.$$

Question 2. La valeur exacte est $\frac{1}{2,01} = \frac{100}{201} \approx 0,49751$.

Question 3. On calcule l'erreur :

$$E(h) = f(a+h) - f(a) - f'(a) \cdot h = \frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} - \left(-\frac{1}{a^2}\right)h = \frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} + \frac{h}{a^2}.$$

On réduit au même dénominateur $a^2(a+h)$:

$$E(h) = \frac{a^2}{a^2(a+h)} - \frac{a(a+h)}{a^2(a+h)} + \frac{h(a+h)}{a^2(a+h)}.$$

Le numérateur est :

$$a^2 - a(a+h) + h(a+h) = a^2 - a^2 - ah + ah + h^2 = h^2.$$

D'où $E(h) = \frac{h^2}{a^2(a+h)}.$

Question 4. Avec $a = 2$ et $h = 0,01$:

$$E(0,01) = \frac{(0,01)^2}{4 \times 2,01} = \frac{0,0001}{8,04} \approx 0,0000124.$$

Vérifions : $\frac{100}{201} - 0,4975 = 0,49751 \dots - 0,4975 = 0,00001 \dots \checkmark$

Corrigé

Question 1. Au voisinage de $a = 1$: $f(1) = 1$ et $f'(1) = 3$.

Avec $h = 0,02$:

$$1,02^3 \approx 1 + 3 \times 0,02 = \boxed{1,06}.$$

Valeur exacte : $1,02^3 = 1,061208$. L'erreur est $|1,061208 - 1,06| = 0,001208$.

Question 2. Au voisinage de $a = 2$: $f(2) = 8$ et $f'(2) = 12$.

Avec $h = 0,01$:

$$2,01^3 \approx 8 + 12 \times 0,01 = \boxed{8,12}.$$

Valeur exacte : $2,01^3 = 8,120601$. L'erreur est $|8,120601 - 8,12| = 0,000601$.

Question 3. L'erreur au voisinage de $a = 1$ avec $h = 0,02$ est $\approx 0,0012$, tandis que l'erreur au voisinage de $a = 2$ avec $h = 0,01$ est $\approx 0,0006$.

En valeur absolue, l'erreur au voisinage de 1 est ici plus grande car $h = 0,02 > 0,01$. Cependant, en erreur *relative* (rapportée à la valeur de $f(a)$) :

► au voisinage de 1 : $\frac{0,0012}{1} = 0,12\%$;

► au voisinage de 2 : $\frac{0,0006}{8} = 0,0075\%$.

Dans cet exemple, le pas au voisinage de 2 est deux fois plus petit. Il conduit donc ici à une erreur absolue plus petite. L'approximation linéaire est d'autant plus fiable que h est proche de 0 ; ce calcul ne permet pas, à lui seul, de comparer deux voisinages avec des pas différents.

Corrigé

On calcule les images de 0 et de 2 par f :

$$f(0) = 3 \times 0 - 0^2 = 0$$

$$f(2) = 3 \times 2 - 2^2 = 6 - 4 = 2$$

Le taux de variation de f entre 0 et 2 est :

$$\tau = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{2 - 0}{2} = 1$$

Le taux de variation de f entre 0 et 2 vaut $\boxed{1}$.

Corrigé

1. Le taux de variation de f entre $x = 1$ et $x = 5$ est :

$$\tau = \frac{f(5) - f(1)}{5 - 1} = \frac{26 - 2}{4} = \frac{24}{4} = \boxed{6}$$

2. Le taux de variation de f entre $x = 3$ et $x = 7$ est :

$$\tau = \frac{f(7) - f(3)}{7 - 3} = \frac{50 - 10}{4} = \frac{40}{4} = \boxed{10}$$

Corrigé

On calcule $f(1 + h)$:

$$f(1 + h) = (1 + h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$$

On calcule $f(1)$:

$$f(1) = 1^3 = 1$$

Le taux de variation est :

$$\frac{f(1 + h) - f(1)}{h} = \frac{1 + 3h + 3h^2 + h^3 - 1}{h} = \frac{3h + 3h^2 + h^3}{h}$$

On factorise par h au numérateur :

$$\frac{h(3 + 3h + h^2)}{h} = 3 + 3h + h^2$$

Lorsque h tend vers 0, l'expression $3 + 3h + h^2$ tend vers 3.

Donc $f'(1) = 3$.

Corrigé

D'après le tableau, lorsque h prend les valeurs 0,1, 0,01 et 0,001, le taux de variation prend respectivement les valeurs 6,1, 6,01 et 6,001.

On observe que plus h se rapproche de 0, plus le taux de variation se rapproche de 6.

Le taux de variation semble tendre vers 6 lorsque h tend vers 0.

Or, par définition, $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

On en déduit que $f'(a) = 6$.

Corrigé

La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 a pour équation :

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2)$$

On remplace par les valeurs connues :

$$y = -1 \times (x - 2) + 3 = -x + 2 + 3 = -x + 5$$

L'équation de la tangente est $y = -x + 5$.

On détermine deux points de cette droite :

- ▶ Pour $x = 2$: $y = -2 + 5 = 3$, donc le point $A(2; 3)$.
- ▶ Pour $x = 3$: $y = -3 + 5 = 2$, donc le point $B(3; 2)$.

On trace la droite passant par $A(2; 3)$ et $B(3; 2)$: c'est une droite de pente -1 qui passe par le point de tangence.

Corrigé

La tangente à la courbe de f au point $A(1; 2)$ passe par le point $B(3; 6)$.

Le nombre dérivé $f'(1)$ est égal au coefficient directeur de cette tangente.

On calcule le coefficient directeur de la droite (AB) :

$$f'(1) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6 - 2}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2$$

Donc $f'(1) = 2$.

Corrigé

On rappelle que l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

On calcule $f(3)$:

$$f(3) = 3^2 = 9$$

On admet que $f'(x) = 2x$ (dérivée de x^2), donc :

$$f'(3) = 2 \times 3 = 6$$

L'équation de la tangente au point d'abscisse 3 est :

$$y = 6(x - 3) + 9 = 6x - 18 + 9$$

$$y = 6x - 9$$

Corrigé

L'approximation affine de f au voisinage de a est :

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

On a $f(x) = \sqrt{x}$, donc $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

On calcule en $a = 4$:

$$f(4) = \sqrt{4} = 2 \quad \text{et} \quad f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$$

L'approximation affine donne, pour $x = 4,02$:

$$\sqrt{4,02} \approx 2 + \frac{1}{4} \times (4,02 - 4) = 2 + \frac{1}{4} \times 0,02 = 2 + 0,005$$

Donc $\sqrt{4,02} \approx 2,005$.

Corrigé

1. On calcule les coûts de production pour $q = 10$ et $q = 12$:

$$C(10) = 0,5 \times 10^2 + 3 \times 10 + 100 = 50 + 30 + 100 = 180$$

$$C(12) = 0,5 \times 12^2 + 3 \times 12 + 100 = 72 + 36 + 100 = 208$$

2. Le taux de variation de C entre $q = 10$ et $q = 12$ est :

$$\tau = \frac{C(12) - C(10)}{12 - 10} = \frac{208 - 180}{2} = \frac{28}{2} = 14$$

3. Ce taux de variation représente le coût marginal moyen entre la 10^e et la 12^e pièce produite. En moyenne, chaque pièce supplémentaire coûte 14 euros lorsque la production passe de 10 à 12 pièces par jour.

Corrigé

1. On calcule les températures aux instants $t = 0$ et $t = 5$:

$$T(0) = 100 - 2 \times 0^2 = 100$$

$$T(5) = 100 - 2 \times 5^2 = 100 - 50 = 50$$

2. Le taux de variation de T entre $t = 0$ et $t = 5$ est :

$$\tau = \frac{T(5) - T(0)}{5 - 0} = \frac{50 - 100}{5} = \frac{-50}{5} = -10$$

3. Le taux de variation est négatif ($\tau = -10$), ce qui signifie que la température du four diminue après extinction. En moyenne, la température baisse de $\boxed{10}$ degrés Celsius par minute entre les instants $t = 0$ et $t = 5$. Le signe négatif traduit le refroidissement du four.

Corrigé

1. On calcule $P(4)$:

$$P(4) = 500 + 100 \times 4 + 5 \times 4^2 = 500 + 400 + 80 = 980$$

On exprime $P(4 + h)$:

$$P(4 + h) = 500 + 100(4 + h) + 5(4 + h)^2 = 500 + 400 + 100h + 5(16 + 8h + h^2)$$

$$P(4 + h) = 980 + 100h + 40h + 5h^2 = 980 + 140h + 5h^2$$

2. Le taux de variation est :

$$\frac{P(4 + h) - P(4)}{h} = \frac{980 + 140h + 5h^2 - 980}{h} = \frac{140h + 5h^2}{h} = \frac{h(140 + 5h)}{h} = 140 + 5h$$

3. Lorsque h tend vers 0 :

$$\lim_{h \rightarrow 0} (140 + 5h) = 140$$

Ce nombre est le nombre dérivé de P en $t = 4$, c'est-à-dire $P'(4) = 140$.

4. En 2014 ($t = 4$), la population de la ville croît à un rythme instantané de $\boxed{140}$ milliers d'habitants par an, soit 140 000 habitants par an. Ce nombre dérivé mesure la vitesse de croissance de la population à cet instant précis.

Corrigé

1. On calcule les hauteurs d'eau :

$$h(0) = 12 - \frac{0^2}{3} = 12 \quad h(3) = 12 - \frac{9}{3} = 12 - 3 = 9 \quad h(6) = 12 - \frac{36}{3} = 12 - 12 = 0$$

2. Le taux de variation de h entre $t = 0$ et $t = 3$:

$$\tau = \frac{h(3) - h(0)}{3 - 0} = \frac{9 - 12}{3} = \frac{-3}{3} = -1$$

En moyenne, le niveau d'eau baisse de 1 mètre par heure entre $t = 0$ et $t = 3$.

3. On calcule $h(3 + s)$:

$$h(3 + s) = 12 - \frac{(3 + s)^2}{3} = 12 - \frac{9 + 6s + s^2}{3} = 12 - 3 - 2s - \frac{s^2}{3} = 9 - 2s - \frac{s^2}{3}$$

Le taux de variation est :

$$\frac{h(3 + s) - h(3)}{s} = \frac{9 - 2s - \frac{s^2}{3} - 9}{s} = \frac{-2s - \frac{s^2}{3}}{s} = -2 - \frac{s}{3}$$

En faisant tendre s vers 0 :

$$h'(3) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(-2 - \frac{s}{3} \right) = -2$$

4. Comme $h'(3) = \boxed{-2} < 0$, le niveau d'eau descend à l'instant $t = 3$, à un rythme instantané de 2 mètres par heure.

Corrigé

1. On calcule les nombres dérivés :

$$f'(0) = -2 \times 0 + 4 = 4 \quad f'(2) = -2 \times 2 + 4 = 0 \quad f'(4) = -2 \times 4 + 4 = -4$$

2. Le nombre $f'(2) = 0$ signifie que la tangente à la courbe C_f au point $B(2; 5)$ est horizontale. Le coefficient directeur de cette tangente est nul.

3. L'équation de la tangente à C_f au point $B(2; 5)$ est :

$$T : y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 0 \times (x - 2) + 5$$

$$\boxed{T : y = 5}$$

4. On observe que $f'(x) = -2x + 4$ est positive pour $x < 2$ (par exemple $f'(0) = 4 > 0$) et négative pour $x > 2$ (par exemple $f'(4) = -4 < 0$). La fonction f est donc croissante avant $x = 2$ et décroissante après $x = 2$. Le point $B(2; 5)$ correspond bien à un maximum local de f , de valeur $f(2) = 5$.

Corrigé

1. On calcule $f(1)$:

$$f(1) = 1^3 - 3 \times 1 + 1 = 1 - 3 + 1 = -1$$

On calcule $f'(1)$:

$$f'(1) = 3 \times 1^2 - 3 = 3 - 3 = 0$$

2. La tangente T au point d'abscisse 1 a pour équation :

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0 \times (x - 1) + (-1)$$

$$\boxed{T : y = -1}$$

3. On calcule $f(x) - T(x)$ où $T(x) = -1$:

$$f(x) - (-1) = x^3 - 3x + 1 + 1 = x^3 - 3x + 2$$

On remarque que $x = 1$ est racine : $1 - 3 + 2 = 0$. On factorise par $(x - 1)$:

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)(x - 1)(x + 2) = (x - 1)^2(x + 2)$$

4. Au voisinage de $x = 1$, le facteur $(x - 1)^2$ est toujours positif ou nul, et le facteur $(x + 2)$ est strictement positif (car x est proche de 1, donc $x + 2 > 0$).

Ainsi $f(x) - T(x) = (x - 1)^2(x + 2) \geq 0$ au voisinage de $x = 1$, ce qui signifie que la courbe est **au-dessus** de sa tangente au voisinage de $x = 1$.

Corrigé

1. On calcule :

$$f(0) = (1 + 0)^5 = 1$$

On admet $f'(x) = 5(1 + x)^4$, donc :

$$f'(0) = 5 \times (1 + 0)^4 = 5$$

2. L'approximation affine de f au voisinage de $x = 0$ s'écrit :

$$f(x) \approx f(0) + f'(0) \cdot x = 1 + 5x$$

3. On remarque que $(1,02)^5 = f(0,02)$. En appliquant l'approximation affine avec $x = 0,02$:

$$f(0,02) \approx 1 + 5 \times 0,02 = 1 + 0,1 = \boxed{1,1}$$

4. La valeur exacte est $(1,02)^5 \approx 1,1041$. L'approximation affine donne 1,1, soit une erreur d'environ 0,004, c'est-à-dire moins de 0,4 % en erreur relative. L'approximation est très précise car $x = 0,02$ est proche de 0.

Corrigé

1. On calcule :

$$A(10) = \pi \times 10^2 = 100\pi \text{ cm}^2$$

$$A'(10) = 2\pi \times 10 = 20\pi \text{ cm}^2/\text{cm}$$

2. L'approximation affine de A au voisinage de $r = 10$ donne :

$$A(10,1) \approx A(10) + A'(10) \times (10,1 - 10) = 100\pi + 20\pi \times 0,1 = 100\pi + 2\pi = 102\pi$$

3. La valeur exacte est :

$$A(10,1) = \pi \times (10,1)^2 = 102,01 \pi$$

L'erreur commise est :

$$102,01 \pi - 102\pi = 0,01 \pi \approx 0,031 \text{ cm}^2$$

4. Si le rayon est mesuré avec une erreur relative de 1 %, on a $\Delta r = 0,01 \times r$. L'erreur sur l'aire est approximativement :

$$\Delta A \approx A'(r) \times \Delta r = 2\pi r \times 0,01 r = 0,02 \pi r^2$$

L'erreur relative sur l'aire est donc :

$$\frac{\Delta A}{A} \approx \frac{0,02 \pi r^2}{\pi r^2} = 0,02 = \boxed{2\%}$$

Une erreur de 1 % sur le rayon entraîne une erreur d'environ 2 % sur l'aire : l'erreur relative est doublée.

Corrigé

Question 1. On calcule $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour $h \neq 0$:

$$f(a+h) = (a+h)^2 - 4(a+h) + 5 = a^2 + 2ah + h^2 - 4a - 4h + 5.$$

Donc :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{2ah + h^2 - 4h}{h} = \boxed{2a + h - 4}.$$

Question 2. Lorsque $h \rightarrow 0$, le taux de variation tend vers $2a - 4$. On en déduit :

$$\boxed{f'(a) = 2a - 4}.$$

Question 3. La tangente est horizontale lorsque $f'(a) = 0$, soit $2a - 4 = 0$, d'où $a = 2$.

On a $f(2) = 4 - 8 + 5 = 1$. La tangente est horizontale au point $\boxed{(2; 1)}$.

Question 4. Au point d'abscisse 0 : $f(0) = 5$ et $f'(0) = -4$.

L'équation de la tangente est :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -4x + 5, \text{ soit } \boxed{y = -4x + 5}.$$

Question 5. La tangente coupe l'axe des abscisses lorsque $y = 0$:

$$-4x + 5 = 0 \iff x = \frac{5}{4}.$$

La tangente coupe l'axe des abscisses au point $\boxed{\left(\frac{5}{4}; 0\right)}$.

Corrigé

Question 1. $f(3) = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$.

On calcule le taux de variation :

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h} = \frac{(\sqrt{4+h} - 2)(\sqrt{4+h} + 2)}{h(\sqrt{4+h} + 2)} = \frac{4+h-4}{h(\sqrt{4+h} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{4+h} + 2}.$$

Lorsque $h \rightarrow 0$: $\frac{1}{\sqrt{4+h} + 2} = \frac{1}{4}$. Donc $f'(3) = \frac{1}{4}$.

Question 2. L'équation de la tangente en $A(3; 2)$ est :

$$y = f'(3)(x - 3) + f(3) = \frac{1}{4}(x - 3) + 2 = \frac{x - 3 + 8}{4} = \frac{x + 5}{4}.$$

Question 3. On utilise l'approximation $f(3+h) \approx f(3) + h \cdot f'(3)$.

- $\sqrt{3,96} = f(2,96)$: ici $h = -0,04$, donc $\sqrt{3,96} \approx \frac{2,96 + 5}{4} = \frac{7,96}{4} = 1,99$.
- $\sqrt{4,04} = f(3,04)$: ici $h = 0,04$, donc $\sqrt{4,04} \approx \frac{3,04 + 5}{4} = \frac{8,04}{4} = 2,01$.

Question 4. Valeurs exactes à la calculatrice :

- ▶ $\sqrt{3,96} \approx 1,989\,97$; erreur $\approx 0,000\,03$;
- ▶ $\sqrt{4,04} \approx 2,009\,98$; erreur $\approx 0,000\,02$.

Les deux erreurs sont très faibles (de l'ordre de 10^{-5}). L'approximation est légèrement meilleure lorsque $h > 0$ dans cet exemple, car la courbe de f est concave et la tangente est au-dessus de la courbe : l'écart est un peu plus petit du côté $h > 0$. Les deux approximations restent néanmoins excellentes pour $|h|$ aussi petit.

Corrigé

Question 1. L'équation de la tangente au point d'abscisse a est :

$$T_a : y = f'(a)(x - a) + f(a) = 2a(x - a) + a^2 + 1.$$

En développant : $y = 2ax - 2a^2 + a^2 + 1$, soit $T_a : y = 2ax - a^2 + 1$.

Question 2. La tangente T_a passe par $O(0; 0)$ si et seulement si :

$$0 = 2a \times 0 - a^2 + 1 = -a^2 + 1.$$

On résout $a^2 = 1$, d'où $a = 1$ ou $a = -1$.

Question 3.

- ▶ Pour $a = 1$: $T_1 : y = 2 \times 1 \times x - 1 + 1$, soit $T_1 : y = 2x$.
- ▶ Pour $a = -1$: $T_{-1} : y = 2 \times (-1) \times x - 1 + 1$, soit $T_{-1} : y = -2x$.

Question 4. Les points de tangence sont les points de la courbe d'abscisse $a = 1$ et $a = -1$:

- ▶ $f(1) = 1 + 1 = 2$: le point de tangence est bien $(1; 2)$;
- ▶ $f(-1) = 1 + 1 = 2$: le point de tangence est bien $(-1; 2)$.

Question 5. Étudions la position relative de la courbe et de la tangente T_1 . On calcule :

$$f(x) - (2x) = x^2 + 1 - 2x = (x - 1)^2 \geq 0.$$

Ce carré est toujours positif ou nul, donc la courbe est *au-dessus* de T_1 pour tout x , avec égalité uniquement en $x = 1$.

De même : $f(x) - (-2x) = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 \geq 0$.

La parabole est au-dessus de chacune des deux tangentes. Cela traduit la convexité de la fonction f .

Corrigé

Question 1. On calcule pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h} = \frac{2 - (2+h)}{2(2+h) \cdot h} = \frac{-h}{2(2+h)h} = \boxed{\frac{-1}{2(2+h)}}.$$

Question 2. Lorsque $h \rightarrow 0$:

$$\frac{-1}{2(2+h)} \rightarrow \frac{-1}{2 \times 2} = -\frac{1}{4}.$$

Karim s'est trompé : $\boxed{f'(2) = -\frac{1}{4}}$, et non $-\frac{1}{2}$. Il a vraisemblablement confondu avec $-\frac{1}{2}$ en oubliant de mettre 2 au carré au dénominateur (la formule est $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$).

Question 3. L'équation de la tangente au point d'abscisse 2 est :

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = -\frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{2} = -\frac{x}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, \quad \text{soit } \boxed{y = -\frac{x}{4} + 1}.$$

Question 4. Le graphique est à réaliser par l'élève. On trace l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$ et la droite $y = -\frac{x}{4} + 1$ sur $[0,5; 5]$. La droite est tangente à la courbe en $(2; 0,5)$.

Question 5. On observe graphiquement que la courbe est *au-dessus* de la tangente au voisinage de $x = 2$.

Pour le justifier, on calcule :

$$f(x) - \left(-\frac{x}{4} + 1\right) = \frac{1}{x} + \frac{x}{4} - 1 = \frac{4 + x^2 - 4x}{4x} = \frac{(x-2)^2}{4x}.$$

Pour $x > 0$, $(x-2)^2 \geq 0$ et $4x > 0$, donc $f(x) \geq -\frac{x}{4} + 1$ avec égalité en $x = 2$ uniquement. La courbe de $\frac{1}{x}$ est bien au-dessus de sa tangente : la fonction est convexe sur $]0; +\infty[$.

Dérivation : applications

CHAPITRE 4

aux variations

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais dériver les fonctions de référence (puissances, inverse, racine carrée).
- ▶ C2 — Je sais utiliser les règles de dérivation (somme, produit, quotient).
- ▶ C3 — Je sais utiliser le signe de la dérivée pour dresser le tableau de variations.
- ▶ C4 — Je sais trouver les extremums d'une fonction en annulant sa dérivée.
- ▶ C5 — Je sais modéliser et résoudre un problème d'optimisation à l'aide de la dérivation.

© À RETENIR

Un fabricant de boîtes de conserve veut minimiser la quantité de métal utilisée pour un volume donné de 500 mL. Quelles dimensions de la boîte cylindrique choisir ? La dérivation permet de répondre à ce problème d'optimisation.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

4.1 Dérivées des fonctions de référence

DÉFINITION Fonction dérivée

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . La **fonction dérivée** de f , notée f' , est la fonction qui, à tout x de I , associe le nombre dérivé $f'(x)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Tableau des dérivées de référence** Les fonctions suivantes sont dérivables sur leur domaine de définition et leur dérivée est :

Fonction f	Domaine	Dérivée f'
$f(x) = k \quad (k \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 1$
$f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{Z}, n \leq -1)$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (x > 0)$

EXEMPLE Pour $f(x) = x^5$, on identifie $n = 5$. La formule $f'(x) = nx^{n-1}$ donne :

$$f'(x) = 5x^4.$$

EXEMPLE Pour $g(x) = x^3$, on a $n = 3$, donc :

$$g'(x) = 3x^2.$$

Par exemple, $g'(2) = 3 \times 4 = 12$. La tangente à la courbe de g au point d'abscisse 2 a pour pente 12.

EXEMPLE Pour $h(x) = \frac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$h'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

La dérivée est toujours *strictement négative*, ce qui s'interprétera comme une décroissance de h sur chacun de ses intervalles de définition.

EXEMPLE Pour $\varphi(x) = \sqrt{x}$, définie sur $[0; +\infty[$ et dérivable sur $]0; +\infty[$:

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

En $x = 4$: $\varphi'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** La fonction $\sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0 : $\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$. La tangente à la courbe en $(0; 0)$ est verticale, ce qui correspond à une pente infinie — donc un nombre dérivé qui n'existe pas.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** La fonction valeur absolue $f(x) = |x|$ n'est pas dérivable en 0.

En effet, le taux de variation à gauche et à droite de 0 donne :

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1 \quad (\text{dérivée à gauche})$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \quad (\text{dérivée à droite})$$

Les limites à gauche et à droite sont différentes ($-1 \neq 1$) : le nombre dérivé n'existe pas en 0.

Interprétation graphique : la courbe de $|x|$ présente un « angle pointu » (un point anguleux) en $x = 0$. Il n'y a pas de tangente unique en ce point.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $(x^n)' = nx^n$ en oubliant de diminuer l'exposant d'une unité. La bonne formule est $(x^n)' = nx^{n-1}$: on multiplie par l'exposant et on soustrait 1.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$ en oubliant le signe moins. La dérivée de $\frac{1}{x}$ est $-\frac{1}{x^2}$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $\sqrt{x}$ et $x^{1/2}$ dans le calcul : $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. On ne dérive pas $\sqrt{x}$ comme si c'était $\frac{1}{2}x$.

◆ **PROPRIÉTÉ Extension aux exposants entiers négatifs** Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ (y compris les entiers négatifs), la fonction $f(x) = x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et :

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$

La formule est la même que pour $n \in \mathbb{N}$; seul le domaine change.

EXEMPLE Pour $f(x) = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$, on applique la formule avec $n = -2$:

$$f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}.$$

EXEMPLE Pour $g(x) = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$, on a $n = -3$:

$$g'(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}.$$

✦ POUR ALLER PLUS LOIN

On peut retrouver la formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ à partir de la définition du nombre dérivé. Le taux de variation de $f(x) = x^n$ entre a et $a+h$ est :

$$\frac{(a+h)^n - a^n}{h}.$$

En développant $(a+h)^n$ par le binôme de Newton, le seul terme en h^0 après simplification est na^{n-1} . Ainsi $f'(a) = na^{n-1}$, ce qui donne bien $f'(x) = nx^{n-1}$.

4.2 Règles de dérivation

◆ **PROPRIÉTÉ Règle de la somme et de la multiplication par un scalaire** Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $u + v$ et λu sont dérivables sur I et :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (\lambda u)' = \lambda u'.$$

EXEMPLE Soit $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7x - 2$. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 3 \times 4x^3 - 5 \times 2x + 7 \times 1 - 0 = 12x^3 - 10x + 7.$$

EXEMPLE Soit $g(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} + 4$ pour $x > 0$.

On réécrit $\frac{2}{\sqrt{x}} = 2\varphi(x)$ avec $\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, et $\frac{1}{x} = h(x)$ avec $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$. Ainsi :

$$g'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - \left(-\frac{1}{x^2}\right) + 0 = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}.$$

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Esquisse de preuve de la règle de la somme. On calcule le taux de variation de $u + v$:

$$\frac{(u + v)(x + h) - (u + v)(x)}{h} = \frac{u(x + h) - u(x)}{h} + \frac{v(x + h) - v(x)}{h}.$$

Lorsque $h \rightarrow 0$, chaque fraction tend respectivement vers $u'(x)$ et $v'(x)$. On en déduit $(u + v)'(x) = u'(x) + v'(x)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Règle du produit** Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I . Alors $u \times v$ est dérivable sur I et :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

EXEMPLE Soit $f(x) = (2x + 1)(x^3 - 3)$. On pose $u = 2x + 1$ et $v = x^3 - 3$, d'où $u' = 2$ et $v' = 3x^2$. Alors :

$$f'(x) = u'v + uv' = 2(x^3 - 3) + (2x + 1)(3x^2).$$

On développe pour simplifier :

$$f'(x) = 2x^3 - 6 + 6x^3 + 3x^2 = 8x^3 + 3x^2 - 6.$$

EXEMPLE Soit $g(x) = x^2\sqrt{x}$ pour $x > 0$. On pose $u = x^2$ et $v = \sqrt{x}$, d'où $u' = 2x$ et $v' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Alors :

$$g'(x) = 2x \cdot \sqrt{x} + x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x\sqrt{x}}{2} = \frac{5x\sqrt{x}}{2}.$$

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** $(uv)' \neq u' \times v'$. Par exemple, pour $u = x$ et $v = x^2$, le produit est x^3 de dérivée $3x^2$, mais $u' \times v' = 1 \times 2x = 2x \neq 3x^2$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier l'un des deux termes de la règle du produit : $(uv)' = u'v + uv'$ contient *deux* termes. Ne pas écrire seulement $u'v'$.

◆ **PROPRIÉTÉ Règle du quotient** Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , avec $v(x) \neq 0$ sur I . Alors $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

EXEMPLE Soit $f(x) = \frac{3x-1}{x^2+1}$. On pose $u = 3x-1$ et $v = x^2+1$, d'où $u' = 3$ et $v' = 2x$. Le dénominateur $v = x^2+1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Alors :

$$f'(x) = \frac{3(x^2+1) - (3x-1)(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{3x^2+3-6x^2+2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-3x^2+2x+3}{(x^2+1)^2}.$$

EXEMPLE Soit $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$ pour $x > 0$. On pose $u = \sqrt{x}$ et $v = x+1$, d'où $u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ et $v' = 1$. Alors :

$$g'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x+1) - \sqrt{x} \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{\frac{x+1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x}}{(x+1)^2}.$$

En réduisant au même dénominateur $2\sqrt{x}$ au numérateur :

$$g'(x) = \frac{\frac{x+1-2x}{2\sqrt{x}}}{(x+1)^2} = \frac{1-x}{2\sqrt{x}(x+1)^2}.$$

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$. Pour $\frac{x^2}{x} = x$, la dérivée est 1, mais $\frac{(x^2)'}{(x)'} = \frac{2x}{1} = 2x \neq 1$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Inverser l'ordre au numérateur de la règle du quotient : c'est $u'v - uv'$ (avec le signe moins), et non $uv' - u'v$. Une inversion de signe change tous les résultats.

4.3 Fonctions paires et fonctions impaires

DÉFINITION Fonction paire

Une fonction f définie sur un domaine D symétrique par rapport à 0 est dite **paire** si, pour tout $x \in D$:

$$f(-x) = f(x).$$

Interprétation graphique : la courbe représentative de f est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

DÉFINITION Fonction impaire

Une fonction f définie sur un domaine D symétrique par rapport à 0 est dite **impaire** si, pour tout $x \in D$:

$$f(-x) = -f(x).$$

Interprétation graphique : la courbe représentative de f est **symétrique par rapport à l'origine O**.

◆ **PROPRIÉTÉ Exemples fondamentaux**

- ▶ **Fonctions paires** : $x \mapsto x^2, x \mapsto x^4, x \mapsto |x|$.
- ▶ **Fonctions impaires** : $x \mapsto x^3, x \mapsto x, x \mapsto \frac{1}{x}$.

Plus généralement, $x \mapsto x^n$ est paire si n est pair, et impaire si n est impair.

EXEMPLE Montrons que $f(x) = x^2 + 1$ est paire.

Le domaine de f est $\mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x).$$

Donc f est paire. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

EXEMPLE Montrons que $g(x) = x^3 - x$ est impaire.

Le domaine de g est $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -g(x).$$

Donc g est impaire. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

⚠ **ERREUR FRÉQUENTE**

Conclure qu'une fonction est impaire parce qu'elle n'est pas paire (ou inversement). De nombreuses fonctions ne sont *ni paires ni impaires* : par exemple $f(x) = x^2 + x$ vérifie $f(-1) = 0$ et $f(1) = 2$, donc $f(-1) \neq f(1)$ et $f(-1) \neq -f(1)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Conséquence pour l'étude de variations** Pour une fonction paire ou impaire, il suffit d'étudier la fonction sur $[0; +\infty[$ (ou $]0; +\infty[$), puis de compléter par symétrie. Cela divise le travail par deux.

4.4 Signe de la dérivée et sens de variation

THÉORÈME Lien entre signe de f' et variations de f

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- ▶ Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **strictement croissante** sur I .
- ▶ Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **strictement décroissante** sur I .
- ▶ Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **constante** sur I .

DÉFINITION Extremum local

On dit que f admet un **maximum local** en x_0 si $f(x_0) \geq f(x)$ pour tout x au voisinage de x_0 . De même, f admet un **minimum local** en x_0 si $f(x_0) \leq f(x)$ au voisinage de x_0 .

◆ **PROPRIÉTÉ Condition nécessaire d'extremum** Si f est dérivable en x_0 et admet un extremum local en x_0 , alors $f'(x_0) = 0$.

Conséquence pratique : les extremums d'une fonction dérivable sont à chercher parmi les solutions de $f'(x) = 0$.

⚠ CONTRE-EXEMPLE La réciproque est fautive : $f'(x_0) = 0$ n'implique pas nécessairement un extremum. Pour $f(x) = x^3$, on a $f'(0) = 3 \times 0^2 = 0$, mais f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: il n'y a pas d'extremum en 0.

♦ **PROPRIÉTÉ Méthode en quatre étapes** Pour étudier les variations d'une fonction f dérivable :

1. **Calculer** $f'(x)$ en utilisant les règles de dérivation.
2. **Résoudre** $f'(x) = 0$ pour trouver les éventuels points critiques.
3. **Dresser le tableau de signes de f'** en testant le signe de f' sur chaque intervalle séparé par les racines.
4. **Conclure sur les variations de f** : là où $f' > 0$, f croît ; là où $f' < 0$, f décroît.

EXEMPLE Étude complète de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Étape 1 — Calcul de f' .

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9.$$

Étape 2 — Résolution de $f'(x) = 0$.

$$3x^2 - 6x - 9 = 0 \iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x - 3)(x + 1) = 0.$$

Les racines sont $x = -1$ et $x = 3$.

Étape 3 — Tableau de signes de f' .

On factorise : $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$. On dresse le tableau de signes :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$x + 1$		$-$	0	$+$
$x - 3$		$-$	$-$	0
$f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$	$+$	0	$-$	0

Étape 4 — Tableau de variations de f .

On calcule les images aux points critiques :

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) + 2 = -1 - 3 + 9 + 2 = 7.$$

$$f(3) = 27 - 27 - 27 + 2 = -25.$$

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0
$f(x)$	$\nearrow$	7	$\searrow$	-25

Conclusion : f est croissante sur $] -\infty ; -1]$, décroissante sur $[-1 ; 3]$, croissante sur $[3 ; +\infty[$. Elle admet un maximum local de 7 en $x = -1$ et un minimum local de -25 en $x = 3$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Conclure les variations uniquement d'après le signe de f' en un seul point, sans vérifier l'ensemble de l'intervalle. Il faut s'assurer que le signe ne change pas entre deux points critiques consécutifs.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de calculer les images $f(x_0)$ aux points critiques et laisser le tableau de variations sans valeurs remarquables. Ces valeurs sont indispensables pour conclure sur les extremums.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « $f'(x_0) = 0$ » et « $f(x_0) = 0$ ». La première condition porte sur la dérivée (extremum potentiel) ; la seconde sur la fonction (racine de f). Ce sont deux objets différents.

⚠ CONTRE-EXEMPLE Pour $f(x) = x^2$, l'équation $f'(x) = 2x = 0$ donne $x = 0$. Mais $f(0) = 0$ est ici aussi une racine de f . Ce n'est pas toujours le cas : pour $g(x) = x^2 + 1$, on a $g'(x) = 2x$ donc $x = 0$ est un point critique, mais $g(0) = 1 \neq 0$: le point critique n'est pas une racine de g .

✦ POUR ALLER PLUS LOIN

Preuve (sens direct). Supposons $f'(x) > 0$ sur I et soient $a < b$ deux réels de I . D'après le théorème des accroissements finis (hors programme), il existe $c \in]a; b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. Comme $f'(c) > 0$ et $b - a > 0$, on obtient $f(b) - f(a) > 0$, soit $f(b) > f(a)$: f est bien strictement croissante.

4.5 Extremums d'une fonction

DÉFINITION Extremum local

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- ▶ f admet un **maximum local** en a si $f(x) \leq f(a)$ pour tout x au voisinage de a .
- ▶ f admet un **minimum local** en a si $f(x) \geq f(a)$ pour tout x au voisinage de a .

On dit que $f(a)$ est un **extremum local** de f .

DÉFINITION Extremum global

f admet un **maximum global** en a sur I si $f(x) \leq f(a)$ pour tout $x \in I$ (et de même pour le minimum global). Un extremum global est aussi un extremum local, mais la réciproque est fausse en général.

THÉORÈME Condition nécessaire d'extremum

Si f est dérivable en a et admet un extremum local en a , alors

$$f'(a) = 0.$$

ERREUR FRÉQUENTE

La réciproque est **fausse** : $f'(a) = 0$ ne garantit pas l'existence d'un extremum en a . Il faut vérifier le changement de signe de f' autour de a .

◆ **PROPRIÉTÉ Critère du changement de signe** Soit f dérivable sur un intervalle I et $a \in I$ tel que $f'(a) = 0$.

- ▶ Si f' change de signe de $+$ à $-$ en a , alors f admet un **maximum local** en a .
- ▶ Si f' change de signe de $-$ à $+$ en a , alors f admet un **minimum local** en a .
- ▶ Si f' ne change pas de signe en a , alors f **n'admet pas d'extremum** en a .

EXEMPLE Soit $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 2$, définie sur $\mathbb{R}$.

Étape 1 — Calcul de f' .

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2).$$

Étape 2 — Résoudre $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = 2.$$

Étape 3 — Tableau de signes de f' et tableau de variations.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
f	<i>earrow</i>	3	2	<i>earrow</i>

Conclusions :

- ▶ En $x = 1$: f' passe de $+$ à $-$, donc $f(1) = 3$ est un **maximum local**.
- ▶ En $x = 2$: f' passe de $-$ à $+$, donc $f(2) = 2$ est un **minimum local**.

Ces extremums sont locaux : f tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, il n'y a donc pas d'extremum global sur $\mathbb{R}$.




Figure 6 — La dérivée s'annule en $x = 1$ et $x = 2$ avec changements de signe.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Pour $f(x) = x^3$, on a $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(0) = 0$.

Pourtant, $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ pour tout x , et f' **ne change pas de signe** en 0 : f' est positive avant et après 0.

Donc f est croissante sur $\mathbb{R}$ et **n'admet pas d'extremum** en 0. L'annulation de la dérivée est nécessaire mais pas suffisante.

ERREUR FRÉQUENTE

Conclure « $f'(1) = 0$ donc f a un extremum en 1 » sans dresser le tableau de signes. Il faut toujours vérifier le changement de signe de f' .

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Pour les fonctions deux fois dérivables, le signe de $f''(a)$ donne l'information manquante : si $f'(a) = 0$ et $f''(a) > 0$, alors $f(a)$ est un minimum local ; si $f''(a) < 0$, c'est un maximum local. Si $f''(a) = 0$, on ne peut pas conclure directement (cas de x^3 en 0). Ce critère de la dérivée seconde est étudié en terminale.

4.6 Optimisation par la dérivation

◆ **PROPRIÉTÉ Méthode d'optimisation en six étapes** Pour trouver le maximum ou le minimum d'une quantité dans un problème concret :

1. **Modéliser.** Identifier la quantité à optimiser et introduire une variable x représentant le paramètre ajustable.
2. **Établir le domaine.** Déterminer l'intervalle I des valeurs admissibles de x (contraintes géométriques, physiques, etc.).
3. **Exprimer la quantité.** Écrire la fonction $f(x)$ à optimiser en fonction de x uniquement (éliminer les autres variables).
4. **Dériver.** Calculer $f'(x)$.
5. **Trouver les points critiques.** Résoudre $f'(x) = 0$ sur I et dresser le tableau de variations.
6. **Conclure dans le contexte.** Exprimer la réponse avec les unités adaptées et vérifier qu'elle correspond bien à un maximum ou à un minimum global sur I .

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier que le point critique appartient au domaine I . Une valeur de x négative ou supérieure à la contrainte n'a pas de sens dans le contexte.

EXEMPLE Maximiser l'aire d'un rectangle de périmètre 20 cm.

Étape 1 — Modéliser. On note x (en cm) la longueur du rectangle. La quantité à maximiser est l'aire A .

Étape 2 — Domaine. Le périmètre impose $2x + 2\ell = 20$, donc $\ell = 10 - x$. Pour que le rectangle soit non dégénéré : $x > 0$ et $\ell > 0$, soit $10 - x > 0$, donc $x \in]0; 10[$.

Étape 3 — Exprimer A .

$$A(x) = x \cdot \ell = x(10 - x) = 10x - x^2.$$

Étape 4 — Dériver.

$$A'(x) = 10 - 2x.$$

Étape 5 — Points critiques.

$$A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5.$$

Tableau de variations sur $]0; 10[$:

x	0	5	10		
$A'(x)$		+	0	–	
$A(x)$	0	$\nearrow$	25	$\searrow$	0

Étape 6 — Conclusion. A' change de signe de + à – en $x = 5$: $A(5) = 25$ est le maximum global sur $]0 ; 10[$.

La largeur est alors $\ell = 10 - 5 = 5$ cm. **Le rectangle d'aire maximale est le carré de côté 5 cm, d'aire 25 cm².**




Figure 7 — La parabole atteint son sommet en $x = 5$: l'aire maximale est 25 cm².

EXEMPLE Situation d'accroche — Boîte cylindrique de volume 500 mL.

Un fabricant souhaite construire une boîte cylindrique fermée de volume 500 cm³ en utilisant le moins de métal possible. Quelles dimensions (rayon r et hauteur h) choisir ?

Étape 1 — Modéliser. On note r (en cm) le rayon de la base. La surface totale de métal (deux disques + enveloppe latérale) est

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

C'est la quantité à **minimiser**.

Étape 2 — Domaine. $r > 0$ (le rayon est strictement positif).

Étape 3 — Exprimer S en fonction de r seul.

La contrainte de volume donne :

$$\pi r^2 h = 500 \Rightarrow h = \frac{500}{\pi r^2}.$$

On substitue :

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}.$$

Étape 4 — Dériver.

$$S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2}.$$

Étape 5 — Points critiques.

$$S'(r) = 0 \Leftrightarrow 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \Leftrightarrow r^3 = \frac{1000}{4\pi} = \frac{250}{\pi} \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \approx 4,30 \text{ cm.}$$

Tableau de variations sur $]0 ; +\infty[$:

r	0	$r_0 \approx 4,30$			$+\infty$
$S'(r)$		–	0		+
$S(r)$	$+\infty$	$\searrow$	$S_{\min}$	<i>earrow</i>	$+\infty$

Étape 6 — Conclusion. S' change de signe de $-$ à $+$ en r_0 : $S(r_0)$ est le **minimum global** de S sur $]0; +\infty[$.

La hauteur optimale est :

$$h = \frac{500}{\pi r_0^2} = \frac{500}{\pi \left(\frac{250}{\pi}\right)^{2/3}} = 2r_0 \approx 8,60 \text{ cm.}$$

La boîte optimale a $r \approx 4,30$ cm et $h \approx 8,60$ cm. La hauteur est égale au diamètre : la boîte est un cylindre équilatéral.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Négliger l'un des deux disques dans l'expression de S et écrire $S = \pi r^2 + 2\pi rh$ (un seul disque). La surface totale d'un cylindre *fermé* comporte deux disques.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Conserver deux variables (r et h) dans la fonction à dériver. La contrainte (ici le volume) doit être utilisée pour exprimer h en fonction de r avant de dériver.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

La condition $h = 2r$ peut aussi se retrouver par une inégalité classique. En posant $u = r^3$ et en appliquant l'inégalité arithmético-géométrique à $r^2 + r^2 + h$ (volume fixé), on obtient le même résultat sans dérivation. Les deux approches sont complémentaires : la dérivation donne la valeur exacte du minimum et prouve son unicité.

🔑 MÉTHODE M1 Dériver une fonction de référence

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer la dérivée d'une fonction de base : puissance x^n , inverse $\frac{1}{x}$, racine $\sqrt{x}$.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie le type de la fonction : puissance, inverse ou racine carrée.
2. J'applique la formule de dérivation correspondante :

▶ $(x^n)' = nx^{n-1}$ pour tout entier $n \geq 1$;

▶ $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ pour $x \neq 0$;

▶ $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$.

3. Je simplifie l'expression obtenue si possible.

Exemple rédigé. Calculons la dérivée de $f(x) = x^4$. On applique $(x^n)' = nx^{n-1}$ avec $n = 4$:

$$f'(x) = 4x^3.$$

La dérivée de f est donc $f'(x) = 4x^3$.

Les pièges.

- ▶ Écrire $(x^4)' = 4x^4$: oublier de diminuer l'exposant de 1.

- ▶ Écrire $(\sqrt{x})' = \frac{1}{\sqrt{x}}$: oublier le facteur $\frac{1}{2}$.
- ▶ Confondre $\left(\frac{1}{x}\right)'$ avec $\frac{1}{x}$: le signe moins est indispensable.

Vérifier son résultat. Je vérifie la cohérence de l'exposant : $(x^n)'$ est de degré $n - 1$, donc strictement inférieur à celui de la fonction de départ.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

① MÉTHODE M2 Calculer la dérivée d'une expression

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque la fonction est une combinaison de fonctions de base : somme, produit ou quotient. L'énoncé peut demander de « dériver f » ou « calculer f' ».

La méthode pas à pas.

1. J'identifie la structure globale : somme, produit ou quotient.
2. J'applique la règle adaptée :
 - ▶ Somme : $(u + v)' = u' + v'$;
 - ▶ Produit : $(uv)' = u'v + uv'$;
 - ▶ Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.
3. Je développe et je réduis l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Calculons la dérivée de $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$. On a $u' = 2$ et $v' = 2x$. Par la règle du produit :

$$f'(x) = u'v + uv' = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x).$$

$$f'(x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6.$$

Les pièges.

- ▶ Écrire $(uv)' = u'v'$: la règle du produit n'est pas la multiplication des dérivées.
- ▶ Oublier un des deux termes $u'v$ ou uv' dans la règle du produit.
- ▶ Inverser l'ordre au numérateur du quotient : écrire $uv' - u'v$ au lieu de $u'v - uv'$.

Vérifier son résultat. Je peux contrôler le degré : si f est de degré n , alors f' doit être de degré $n - 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

① MÉTHODE M3 Dresser le tableau de variations

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande d'étudier les variations d'une fonction dérivable sur un intervalle, ou de tracer son tableau de variations.

La méthode pas à pas.

1. Je calcule $f'(x)$.
2. Je résous $f'(x) = 0$ et j'identifie le signe de f' sur chaque sous-intervalle.
3. Je dresse le tableau de signes de f' .

4. Je complète le tableau de variations : f est croissante là où $f' > 0$, décroissante là où $f' < 0$.

Exemple rédigé. Étudions les variations de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ou $x = 1$. $f'(x) > 0$ sur $]-\infty; -1[$ et $]1; +\infty[$, $f'(x) < 0$ sur $]-1; 1[$. $f(-1) = 3$ et $f(1) = -1$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f	<i>earrow</i>		3		-1	<i>earrow</i>

Les pièges.

- ▶ Oublier de calculer les valeurs $f(-1)$ et $f(1)$ aux bornes du tableau.
- ▶ Inverser le sens des flèches selon le signe de f' .
- ▶ Ne pas factoriser f' correctement et se tromper dans les valeurs annulatrices.

Vérifier son résultat. Je contrôle que les flèches du tableau sont cohérentes avec quelques valeurs numériques de f .

S'entraîner. (renvois exercices M3)

❶ MÉTHODE M4 Déterminer les extremums d'une fonction

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de trouver un maximum ou un minimum local (ou global sur un intervalle) d'une fonction dérivable.

La méthode pas à pas.

1. Je calcule $f'(x)$.
2. Je résous $f'(x) = 0$ pour trouver les candidats.
3. J'étudie le changement de signe de f' autour de chaque candidat.
4. Je détermine la nature de l'extremum et je calcule la valeur de f en ce point.

Exemple rédigé. Déterminons les extremums de $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2)$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 2$. $f'(x) < 0$ sur $]-\infty; 0[$, $f'(x) > 0$ sur $]0; 2[$, $f'(x) < 0$ sur $]2; +\infty[$. f' change de $-$ à $+$ en 0 : minimum local $f(0) = -1$. f' change de $+$ à $-$ en 2 : maximum local $f(2) = -8 + 12 - 1 = 3$.

Les pièges.

- ▶ Conclure qu'il y a un extremum en un point sans vérifier le changement de signe de f' .
- ▶ Confondre maximum et minimum en lisant mal le tableau de variations.
- ▶ Oublier de calculer la valeur $f(x_0)$ qui définit l'extremum.

Vérifier son résultat. Si f' ne change pas de signe en un zéro, il n'y a pas d'extremum mais un point d'inflexion.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

❶ MÉTHODE M5 Résoudre un problème d'optimisation

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de maximiser ou minimiser une grandeur (aire, volume, coût, bénéfice...) soumise à une contrainte.

La méthode pas à pas.

1. Je modélise : j'exprime la grandeur à optimiser sous la forme d'une fonction $f(x)$ d'une seule variable.
2. Je détermine le domaine d'étude I en tenant compte des contraintes du problème.
3. Je calcule $f'(x)$ et je résous $f'(x) = 0$ sur I .
4. Je vérifie la nature du point critique (changement de signe de f') et je calcule $f(x_0)$.
5. Je conclus en répondant à la question posée avec les unités adaptées.

Exemple rédigé. On cherche à inscrire dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 cm un rectangle de largeur x ayant l'aire maximale. Par thalès, la hauteur du rectangle est $10 - x$, donc $f(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$. $x \in]0; 10[$. $f'(x) = 10 - 2x$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$. $f' > 0$ sur $]0; 5[$ et $f' < 0$ sur $]5; 10[$: maximum en $x = 5$. L'aire maximale est $f(5) = 25 \text{ cm}^2$.

Les pièges.

- Oublier de vérifier que le point critique appartient bien au domaine I .
- Ne pas justifier la nature du point critique par le signe de f' .
- Confondre la valeur optimale de x avec la valeur optimale de la grandeur $f(x)$.

Vérifier son résultat. Je m'assure que la réponse est cohérente avec le contexte : une aire ou une longueur ne peut pas être négative.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$:

1. $f(x) = x^5$
2. $g(x) = x^3$
3. $h(x) = 7$
4. $k(x) = x$

Exercice 2

Dériver chacune des fonctions suivantes sur leur domaine de définition :

1. $f(x) = \frac{1}{x}$
2. $g(x) = \sqrt{x}$
3. $h(x) = x^4$
4. $k(x) = x^2$

Exercice 3

Dériver chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 3x^2$, définie sur $\mathbb{R}$
2. $g(x) = 5\sqrt{x}$, définie sur $]0; +\infty[$
3. $h(x) = -\frac{2}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$

Exercice 4

Dériver chacune des fonctions suivantes sur leur domaine :

1. $f(x) = x^3 + x^2$
2. $g(x) = x^4 - \frac{1}{x}$, sur $]0; +\infty[$
3. $h(x) = \sqrt{x} + x$, sur $]0; +\infty[$

Exercice 5 ♦♦

Soit $f(x) = 2x^3 - 3x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Calculer $f'(1)$ et $f'(-1)$. Que remarque-t-on ?
3. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 ♦♦

Soit $f(x) = 4\sqrt{x} - \frac{2}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Calculer $f'(4)$ et donner la valeur exacte.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$.

Exercice 7 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 - 4\sqrt{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

Exercice 8 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - \frac{3}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Calculer $f'(2)$.
3. Montrer que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]0; +\infty[$, et conclure sur le sens de variation de f .

Exercice 9 ♦♦♦

Soit $f(x) = x^2 - x + \frac{1}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et le mettre sous la forme $\frac{2x^3 - x^2 - 1}{x^2}$.
2. Montrer que $x = 1$ est racine du trinôme $2x^3 - x^2 - 1$.
3. Factoriser $2x^3 - x^2 - 1$ en utilisant la division euclidienne ou le schéma de Hörner.
4. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$ et dresser le tableau de variations de f .

Exercice 10 ♦♦♦

Soit $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

Un élève calcule $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$.

1. Identifier et corriger l'erreur commise par l'élève. Donner le calcul détaillé de $f'(x)$.

- Calculer $f'(9)$.
- Montrer que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]0; +\infty[$. En déduire les variations de f .
- En utilisant le résultat de la question 3, comparer $f(4)$ et $f(9)$ sans calculer ces valeurs.

Exercice 11

Dériver chacune des fonctions suivantes en utilisant la règle $(uv)' = u'v + uv'$:

- $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$
- $g(x) = (x^3 - x)(x + 2)$

Exercice 12

Dériver chacune des fonctions suivantes en utilisant la règle $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

- $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$, sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$
- $g(x) = \frac{3x - 1}{x^2 + 1}$, sur $\mathbb{R}$

Exercice 13

Dériver chacune des fonctions suivantes en appliquant la règle du produit :

- $f(x) = (x^2 - 2x + 3)(x + 1)$
- $g(x) = x(x - 1)(x + 1)$ (dériver d'abord $x(x - 1)$, puis multiplier par $(x + 1)$)

Exercice 14

Dériver chacune des fonctions suivantes en utilisant la règle du quotient :

- $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$, sur $\mathbb{R}$
- $g(x) = \frac{x^2 - 1}{2x + 1}$, sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

Exercice 15

Soit $f(x) = (x^2 - 3)(x^2 + 1)$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Calculer $f'(x)$ en appliquant la règle du produit, puis factoriser le résultat.
- Résoudre $f'(x) = 0$.
- Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 16

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x^2 + 1}$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Calculer $f'(x)$ et l'écrire sous la forme $\frac{2(x^2 + x - 1)}{(x^2 + 1)^2}$.
- Résoudre $f'(x) = 0$ (on acceptera une forme avec des radicaux).
- En déduire le tableau de variations de f .

Exercice 17

Soit $f(x) = (x^2 + 3)(2x - 1)$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ à l'aide de la règle du produit, puis simplifier.
2. Montrer que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (calculer le discriminant du trinôme $f'(x)$).
3. En déduire les variations de f et la valeur de f en $x = 0$.

Exercice 18 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{2x+3}{x^2-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et le simplifier.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. Étudier le signe du numérateur de $f'(x)$ sur $] -\infty; -1[$.

Exercice 19 ♦♦♦

Soit $f(x) = (x^2 - 1)^2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ en écrivant $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 1)$ et en appliquant la règle du produit.
2. Factoriser complètement $f'(x)$.
3. En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. Un élève affirme que f est croissante sur $[-1; 1]$ car la parabole $x^2 - 1$ est positive sur cet intervalle. Réfuter cette affirmation en vous appuyant sur le tableau de variations.

Exercice 20 ♦♦♦

Soit $f(x) = \frac{x+1}{x^2-x+1}$ définie sur $\mathbb{R}$ (vérifier d'abord que le dénominateur ne s'annule jamais).

1. Montrer que $x^2 - x + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (utiliser le discriminant).
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que le numérateur vaut $-x^2 - 2x + 2$.
3. Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer le maximum de f sur $\mathbb{R}$ et vérifier numériquement en calculant f aux valeurs critiques.

Exercice 21 ♦

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ et dresser le tableau de variations de f .

Exercice 22 ♦

Soit $g(x) = -x^2 + 6x - 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$.
2. Résoudre $g'(x) = 0$.
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.

Exercice 23 ♦

Soit $h(x) = x^3 - 3x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $h'(x)$ et factoriser l'expression obtenue.
2. Résoudre $h'(x) = 0$.
3. Dresser le tableau de variations de h sur $\mathbb{R}$.

Exercice 24

Soit $k(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $k'(x)$.
2. Résoudre $k'(x) = 0$ (on pourra utiliser le discriminant).
3. Dresser le tableau de variations de k sur $\mathbb{R}$.

Exercice 25

La température (en degrés Celsius) relevée dans une ville au cours d'une journée est modélisée par :

$$T(t) = -t^2 + 8t + 5$$

où $t \in [0; 10]$ désigne le nombre d'heures écoulées depuis 6 h du matin.

1. Calculer $T'(t)$ et résoudre $T'(t) = 0$ sur $[0; 10]$.
2. Dresser le tableau de variations de T sur $[0; 10]$.
3. À quelle heure de la journée la température est-elle maximale? Quelle est cette température maximale?
4. Pendant quels intervalles de temps la température est-elle en hausse? En baisse?

Exercice 26

Le bénéfice mensuel (en milliers d'euros) d'une entreprise en fonction de la quantité produite x (en centaines d'unités, avec $x \in [1; 9]$) est modélisé par :

$$B(x) = -2x^2 + 20x - 18$$

1. Calculer $B'(x)$ et résoudre $B'(x) = 0$.
2. Dresser le tableau de variations de B sur $[1; 9]$.
3. Pour quelle quantité produite le bénéfice est-il maximal? Quel est ce bénéfice maximal?
4. L'entreprise est bénéficiaire quand $B(x) > 0$. Vérifier que $B(1) = 0$ et interpréter.

Exercice 27

Un objet est lancé verticalement vers le haut. Sa hauteur (en mètres) au bout de t secondes ($t \in [0; 4]$) est modélisée par :

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1$$

1. Quelle est la hauteur initiale de l'objet ($t = 0$)?
2. Calculer $h'(t)$ et résoudre $h'(t) = 0$ sur $[0; 4]$.
3. Dresser le tableau de variations de h sur $[0; 4]$.
4. À quel instant l'objet atteint-il sa hauteur maximale? Quelle est cette hauteur?

Exercice 28

Le coût de production journalier (en centaines d'euros) d'une usine en fonction du nombre de lots fabriqués x ($x \in [0; 5]$) est modélisé par :

$$C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$$

1. Calculer $C'(x)$, puis factoriser $C'(x)$ (on vérifiera que 1 et 3 sont solutions de $C'(x) = 0$).
2. Dresser le tableau de signes de $C'(x)$ sur $[0; 5]$, puis le tableau de variations de C .
3. Calculer $C(1)$ et $C(3)$. Interpréter ces valeurs dans le contexte.
4. Sur quel intervalle le coût de production est-il décroissant?

Exercice 29

Soit $f_a(x) = x^3 - 3ax$ où a est un réel paramètre.

1. Calculer $f'_a(x)$.
2. **Cas** $a \leq 0$. Montrer que $f'_a(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. En déduire que f_a est croissante sur $\mathbb{R}$.
3. **Cas** $a > 0$. Résoudre $f'_a(x) = 0$ en fonction de a . Dresser le tableau de variations de f_a sur $\mathbb{R}$ (les bornes du tableau feront intervenir $\sqrt{a}$).
4. **Cas particulier** $a = 3$. Calculer les valeurs aux points stationnaires et dresser le tableau de variations de f_3 .

Exercice 30

Soit $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = 6(x+1)(x-2)$.
2. Dresser le tableau de signes de $f'(x)$ puis le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}$.
3. **Preuve de monotonie.** Démontrer que f est strictement décroissante sur $[-1; 2]$ en utilisant la définition : pour tous $x_1, x_2 \in [-1; 2]$ avec $x_1 < x_2$, montrer que $f(x_1) > f(x_2)$.
Indication : on pourra utiliser le théorème liant signe de la dérivée et sens de variation.
4. Résoudre graphiquement (ou par calcul) l'inéquation $f'(x) \geq 0$.

Exercice 31

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 8$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et résoudre $f'(x) = 0$.
2. Vérifier le changement de signe de f' en ce point.
3. En déduire que f admet un minimum. Calculer la valeur minimale de f .

Exercice 32

Soit $g(x) = -x^2 + 4x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$ et trouver le point stationnaire de g .
2. Étudier le signe de $g'(x)$ de part et d'autre de ce point.
3. En déduire que g admet un maximum et calculer cette valeur maximale.

Exercice 33

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et factoriser (on mettra $3x$ en facteur).
2. Résoudre $f'(x) = 0$ et étudier le signe de f' .
3. Dresser le tableau de variations de f et indiquer la nature (maximum local ou minimum local) de chaque extremum, en précisant sa valeur.

Exercice 34

Soit $p(x) = x^3 - 12x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $p'(x)$ et résoudre $p'(x) = 0$.
2. Établir le signe de $p'(x)$ et dresser le tableau de variations de p .
3. Identifier le maximum local et le minimum local de p et donner leurs valeurs.

Exercice 35

Un commerçant vend des articles. Son chiffre d'affaires (en euros) en fonction du prix unitaire x (en euros, $x \in [0; 20]$) est modélisé par :

$$R(x) = -3x^2 + 60x$$

1. Calculer $R'(x)$ et déterminer le prix x_0 qui annule $R'(x)$.
2. Vérifier que R' change de signe en x_0 (de $+$ à $-$).
3. En déduire que R admet un maximum en x_0 . Quel est le chiffre d'affaires maximal ?
4. Quel prix le commerçant doit-il fixer pour maximiser son chiffre d'affaires ?

Exercice 36

On dispose d'une corde de 20 m que l'on veut couper en deux morceaux. Le premier morceau, de longueur x (avec $x \in [0; 10]$), sert à délimiter un carré; le second $(10 - x)$ forme un rectangle de largeur 1 m.

L'aire totale des deux figures est :

$$A(x) = x(10 - x)$$

1. Développer $A(x)$ et calculer $A'(x)$.
2. Résoudre $A'(x) = 0$ et vérifier que A' change de signe (de $+$ à $-$).
3. En déduire la longueur x qui maximise l'aire totale.
4. Calculer l'aire maximale obtenue.

Exercice 37

On découpe dans un carton carré de côté 8 cm quatre petits carrés de côté x (avec $x \in]0; 4[$) aux quatre coins, puis on rabat les bords pour former une boîte ouverte.

Le volume de cette boîte est :

$$V(x) = x(8 - 2x)^2$$

1. Développer $V(x)$.
2. Calculer $V'(x)$ et résoudre $V'(x) = 0$ sur $]0; 4[$.
3. Dresser le tableau de variations de V et déterminer la valeur de x qui maximise le volume.
4. Calculer le volume maximal (on donnera une valeur exacte).

Exercice 38

Le bénéfice (en milliers d'euros) d'un producteur agricole en fonction de la surface cultivée x (en hectares, $x \in [0; 7]$) est modélisé par :

$$B(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 1$$

1. Calculer $B'(x)$ et vérifier que $B'(x) = -3(x - 1)(x - 5)$.
2. Dresser le tableau de signes de $B'(x)$ et le tableau de variations de B sur $[0; 7]$.
3. Identifier les extremums locaux de B : donner leur nature (maximum ou minimum local) et leur valeur.
4. Quelle surface cultivée maximise le bénéfice ? Quel est ce bénéfice maximal ?

Exercice 39

Soit $f_k(x) = x^2 - 2kx + k$ où k est un réel paramètre.

1. Calculer $f'_k(x)$ et déterminer en fonction de k l'abscisse du point stationnaire $x_0(k)$.

- Montrer que f_k admet un minimum en $x_0(k)$ (préciser la nature du signe de f'_k).
- Calculer la valeur minimale $m(k) = f_k(x_0(k))$ en fonction de k .
- Étudier les variations de la fonction $m : k \mapsto m(k)$ pour $k \in \mathbb{R}$ (on calculera $m'(k)$). Pour quelle valeur de k le minimum de f_k est-il le plus grand possible ?

Exercice 40

On fabrique une boîte sans couvercle à base carrée de côté x (en cm, $x > 0$) et de hauteur h . Le volume de la boîte doit être de 500 cm^3 .

- Exprimer h en fonction de x à partir de la contrainte de volume $x^2 h = 500$.
- Montrer que la surface totale (base + 4 faces latérales) est :

$$S(x) = x^2 + \frac{2000}{x}$$

Indication : la surface de la base vaut x^2 , et chaque face latérale a pour aire xh .

- Calculer $S'(x)$ et résoudre $S'(x) = 0$ sur $]0; +\infty[$.
- Dresser le tableau de variations de S et en déduire que S admet un minimum. Calculer les dimensions de la boîte correspondante et la surface minimale.
- Preuve.** Vérifier que $S''(x) = 2 + \frac{4000}{x^3} > 0$ pour tout $x > 0$, ce qui confirme que le point stationnaire est bien un minimum. (On admet que la dérivée de $\frac{1}{x}$ est $-\frac{1}{x^2}$.)

Exercice 41

Soit $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Calculer $f'(x)$.
- Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de variations de f .
- En déduire le maximum de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 42

Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Calculer $f'(x)$.
- Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de variations de f .
- En déduire le minimum de f sur $\mathbb{R}$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 43

Un agriculteur dispose de 20 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire le long d'un mur (le mur forme un des côtés, aucune clôture n'est nécessaire de ce côté). Il note x (en mètres) la longueur du côté perpendiculaire au mur, avec $x \in]0; 10[$.

- Exprimer la largeur de l'enclos en fonction de x .
- Montrer que l'aire de l'enclos est $A(x) = x(10 - x)$.
- Calculer $A'(x)$, résoudre $A'(x) = 0$ et dresser le tableau de variations de A sur $]0; 10[$.
- Quelle valeur de x maximise l'aire ? Quelle est cette aire maximale ?

Exercice 44

On fabrique une boîte sans couvercle à base carrée de côté x cm et de hauteur h cm, avec un volume de 32 cm^3 .

1. Exprimer h en fonction de x , pour $x > 0$.
2. Montrer que la surface totale de la boîte (base + 4 faces latérales) vaut $S(x) = x^2 + \frac{128}{x}$.
3. Calculer $S'(x)$ et résoudre $S'(x) = 0$ sur $]0; +\infty[$.
4. Dresser le tableau de variations de S et déterminer les dimensions de la boîte minimisant la surface.

Exercice 45

On inscrit un triangle dans un demi-disque de rayon $R = 5$ cm : la base du triangle est un diamètre du demi-disque et le sommet opposé est un point du demi-cercle. On note x ($0 < x < 5$) la demi-longueur de la base du triangle.

1. Exprimer la hauteur h du triangle en fonction de x (on rappelle que tout angle inscrit dans un demi-cercle est droit).
2. En déduire que l'aire du triangle vaut $A(x) = x\sqrt{25 - x^2}$.
3. Calculer $A'(x)$ (on pourra poser $u = 25 - x^2$).
4. Résoudre $A'(x) = 0$ sur $]0; 5[$ et montrer que la valeur trouvée correspond bien à un maximum.
5. En déduire les dimensions du triangle d'aire maximale et calculer cette aire. Quelle est la nature de ce triangle ?

Exercice 46

Un cône de révolution a un rayon de base $R = 6$ cm et une hauteur $H = 9$ cm. On inscrit dans ce cône un cylindre de révolution de rayon x cm ($0 < x < 6$) dont la base est dans le plan de la base du cône.

1. Par un argument de similitude de triangles, exprimer la hauteur h du cylindre en fonction de x .
2. En déduire que le volume du cylindre vaut $V(x) = \pi x^2 \left(9 - \frac{3x}{2}\right)$.
3. Calculer $V'(x)$ et résoudre $V'(x) = 0$ sur $]0; 6[$.
4. Dresser le tableau de variations de V sur $]0; 6[$.
5. Déterminer le rayon et la hauteur du cylindre de volume maximal inscrit dans ce cône, puis calculer ce volume maximal. Prouver que c'est bien un maximum global.

Exercice 47

Synthèse C1 + C2 + C3 — Étude d'une fonction sur $]0; +\infty[$

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3}{\sqrt{x}}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Réécrire $f(x)$ sous la forme $f(x) = x^{3/2} - 3x^{-1/2}$ et vérifier que ces deux expressions coïncident.
2. En utilisant les dérivées des fonctions de référence et la règle de la somme, calculer $f'(x)$. Simplifier le résultat sous la forme $f'(x) = \frac{3(x^2 + 1)}{2x^{3/2}}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ pour tout $x > 0$ et conclure sur le sens de variation de f .
4. Dresser le tableau de variations complet de f sur $]0; +\infty[$, en précisant les limites aux bornes.
5. Calculer $f(1)$ et $f(4)$. Interpréter ces valeurs dans le tableau de variations.

Exercice 48

Synthèse C2 + C3 + C4 — Étude d'une fonction rationnelle

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$ définie sur $]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.

1. En appliquant la règle de dérivation d'un quotient, montrer que

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}.$$

2. Résoudre $f'(x) = 0$ (on exprimera les racines avec des radicaux). On admettra que le discriminant du numérateur vaut $\Delta = 12$.
 3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur chacun des intervalles de définition.
 4. Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
 5. Déterminer les extremums locaux de f et calculer leurs valeurs exactes.

Exercice 49

Synthèse C3 + C4 + C5 — Optimisation du profit d'une entreprise

Une entreprise vend x unités d'un produit ($x \in [0; 40]$). Le prix de vente unitaire (en euros) est $p(x) = 50 - x$ et le coût total de production est $C(x) = \frac{x^2}{4} + 5x + 20$.

- Exprimer la recette $R(x) = x \cdot p(x)$ en fonction de x .
- Montrer que le profit $P(x) = R(x) - C(x)$ vaut $P(x) = -\frac{5}{4}x^2 + 45x - 20$.
- Calculer $P'(x)$ et étudier son signe sur $[0; 40]$.
- Dresser le tableau de variations de P sur $[0; 40]$.
- Déterminer le nombre d'unités x^* maximisant le profit, calculer le profit maximal et montrer que $P''(x^*) < 0$ (ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un maximum).

Exercice 50

Synthèse C1 + C2 + C5 — Modélisation du mouvement d'un mobile

La position (en mètres) d'un mobile sur un axe, à l'instant t (en secondes, $t \in [0; 6]$), est donnée par :

$$s(t) = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + 12t.$$

- Calculer la vitesse $v(t) = s'(t)$ en utilisant les règles de dérivation des fonctions de référence.
- Factoriser $v(t)$ sous la forme $(t - a)(t - b)$ et résoudre $v(t) = 0$ sur $[0; 6]$.
- Étudier le signe de $v(t)$ sur $[0; 6]$ et dresser le tableau de variations de s .
- Calculer $s(0)$, $s(2)$ et $s(6)$. En déduire la position maximale du mobile et l'instant auquel elle est atteinte.
- Le mobile revient-il à son point de départ avant $t = 6$ s ? Justifier en utilisant le tableau de variations.

Exercice 51

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si elle est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre. Justifier par le calcul.

- $f(x) = 3x^2 - 5$
- $g(x) = x^3 + 2x$
- $h(x) = x^2 + x$

Exercice 52

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$.

- Calculer le taux de variation de f entre 0 et h , pour $h \neq 0$. Distinguer les cas $h > 0$ et $h < 0$.
- En déduire que f n'est pas dérivable en 0.

3. La fonction g définie par $g(x) = |x - 2|$ est-elle dérivable en $x = 2$? Justifier.
4. Donner l'expression de $f'(x)$ pour $x > 0$ et pour $x < 0$.

Exercice 53

En utilisant la formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ valable pour $n \in \mathbb{Z}$, dériver les fonctions suivantes sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$:

1. $f(x) = x^{-2}$
2. $g(x) = x^{-3}$
3. $h(x) = 5x^{-1}$
4. $k(x) = x^{-4} + x^2$

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

Coup de pouce 1. Identifie la structure de l'expression (référence, somme, produit ou quotient) puis applique la formule correspondante.

TD — Optimisation du profit d'une entreprise

Durée : 50 minutes.

Situation

Une petite entreprise fabrique et vend des stylos personnalisés. Le responsable dispose des informations suivantes :

- ▶ le coût total de production de x stylos (en centaines) est $C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 5$ (en centaines d'euros) ;
- ▶ le prix de vente unitaire est $p(x) = 45 - 6x$ euros par cent stylos (avec $0 < x \leq 6$).

L'entreprise cherche à déterminer la quantité x qui maximise son profit.

TD

Partie A — Modélisation (10 min)

1. Vérifier que l'expression du chiffre d'affaires est $R(x) = 45x - 6x^2$.
2. Exprimer le profit $P(x) = R(x) - C(x)$ en fonction de x . Développer et réduire.
3. Quel est le domaine d'étude pertinent ? Justifier en tenant compte des contraintes économiques.

Partie B — Étude des variations du profit (15 min)

4. Calculer $P'(x)$.
5. Factoriser $P'(x)$. (On admet que $x = 5$ est une racine de P' .)
6. Dresser le tableau de signes de $P'(x)$ sur $]0 ; 6]$.
7. En déduire le tableau de variations de P sur $]0 ; 6]$.

Partie C — Optimisation et interprétation (15 min)

8. Déterminer la valeur de x (arrondie au centième) qui maximise le profit. Quelle quantité de stylos cela représente-t-il ?
9. Calculer le profit maximal (arrondi à l'euro). (Utiliser la valeur exacte $x = 1 + \sqrt{6}$.)
10. Comparer les profits aux bornes : $P(0)$ (non défini économiquement — utiliser $\lim_{x \rightarrow 0^+}$) et $P(6)$. Conclure sur l'utilité de l'étude par dérivation.

Partie D — Synthèse et retour critique (10 min)

11. Le modèle suppose que $p(x) = 45 - 6x > 0$. Pour quelles valeurs de x cette condition est-elle satisfaite ? Est-elle compatible avec le domaine d'étude ?
12. En pratique, x est un entier (nombre de centaines). Parmi $x = 3$ et $x = 4$, lequel donne le plus grand profit ? Comparer avec la valeur optimale théorique $x^* = 1 + \sqrt{6}$.
13. Rédiger une conclusion de 3 à 5 lignes : que peut-on dire de l'apport de la dérivation dans ce problème d'optimisation économique ?

TD fil rouge — La boîte de conserve optimale

Durée : 50 minutes — Toutes les capacités C1 à C5 sont mobilisées.

Accroche

Un fabricant de boîtes de conserve veut concevoir une boîte cylindrique de volume $V = 500$ mL = 500 cm³. Il souhaite **minimiser la quantité de métal utilisée**, c'est-à-dire minimiser l'aire totale de la surface de la boîte. Quelles dimensions choisir ?

Rappels : pour un cylindre droit de rayon r et de hauteur h :

$$\text{Volume : } V = \pi r^2 h \quad \text{Aire totale : } S = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

Partie A — Mise en équation (C3, C5) — 10 min

1. La contrainte de volume est $\pi r^2 h = 500$. Exprimer h en fonction de r .
2. Substituer dans l'expression de S pour obtenir S en fonction de r seul. Simplifier.
3. Quel est le domaine de variation pertinent pour r ? Justifier.

Partie B — Dérivation (C1, C2) — 10 min

4. On pose $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$. Identifier les fonctions de référence utilisées.
5. Calculer $S'(r)$ en appliquant les règles de dérivation. Exprimer sous la forme d'un seul quotient.

Partie C — Étude du signe et variations (C3, C4) — 15 min

6. Résoudre $S'(r) = 0$ pour $r > 0$. Exprimer la solution exacte r^* .
7. Dresser le tableau de signes de $S'(r)$ sur $]0; +\infty[$.
8. Dresser le tableau de variations de $S(r)$ sur $]0; +\infty[$.
9. Conclure : r^* correspond-il à un minimum ou un maximum de S ? Pourquoi ?

Partie D — Résolution et interprétation (C5) — 15 min

10. Calculer la valeur numérique $r^* \approx \dots$ cm (arrondir au millième).
11. En déduire la hauteur optimale $h^* = \frac{500}{\pi(r^*)^2}$ (arrondir au millième).
12. Vérifier que $h^* = 2r^*$ (relation remarquable entre hauteur et diamètre).
13. Calculer l'aire minimale $S(r^*)$ (arrondie au cm² près).
14. Rédiger une conclusion répondant à la question initiale : quelles dimensions minimisent la quantité de métal ? Comparer avec une boîte standard $r = 3$ cm, $h = 17,68$ cm.

FUNCTION DÉRIVÉE ET APPLICATIONS — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] La dérivée de la fonction $f(x) = x^4$ sur $\mathbb{R}$ est :
 A. x^3
 B. $4x^3$
 C. $4x^4$

D. $3x^3$ 2. [Q2] La fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et sa dérivée est :

- A. $\frac{2}{\sqrt{x}}$
 B. $\frac{1}{\sqrt{x}}$
 C. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
 D. $\frac{\sqrt{x}}{2}$

3. [Q3] Pour $x \neq 0$, la dérivée de $f(x) = \frac{1}{x}$ est :

- A. $\frac{1}{x^2}$
 B. $-x^2$
 C. $-\frac{1}{x^2}$
 D. $\frac{1}{x}$

Capacité C24. [Q4] La dérivée de la fonction $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$ sur $\mathbb{R}$ est :

- A. $6x - 5$
 B. $3x - 5$
 C. $6x^2 - 5$
 D. $6x - 3$

5. [Q5] La formule de dérivation d'un produit $(uv)'$ est :

- A. $u'v'$
 B. $u' + v'$
 C. $u'v + uv'$
 D. $u'v - uv'$

6. [Q6] La dérivée du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)'$ est égale à :

- A. $\frac{u'v + uv'}{v^2}$
 B. $\frac{u'v - uv'}{v^2}$
 C. $\frac{u'}{v'}$
 D. $\frac{u'v - uv'}{v}$

Capacité C37. [Q7] Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I , alors la fonction f est :

- A. strictement décroissante sur I
 B. constante sur I
 C. strictement croissante sur I
 D. nulle sur I

8. [Q8] Si le tableau de signe de $f'(x)$ indique $f'(x) < 0$ sur $]1; 4[$, alors f est :

- A. croissante sur $]1; 4[$
 B. nulle en $x = 2,5$
 C. strictement décroissante sur $]1; 4[$
 D. convexe sur $]1; 4[$

9. [Q9] Si $f'(x)$ s'annule en $x = a$ en passant du signe $+$ au signe $-$, la fonction f admet en a :

- A. un minimum local
 B. un point d'inflexion
 C. un maximum local

D. une asymptote verticale

Capacité C4

10. [Q10] Soit $B(x) = -x^2 + 6x - 5$ la fonction bénéfice. Le bénéfice maximal est atteint pour x égal à :
- A. -3
 - B. 3
 - C. 6
 - D. 0
11. [Q11] Pour une fonction polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a < 0$, l'extremum est :
- A. un minimum global
 - B. un maximum global
 - C. un point d'inflexion
 - D. inexistant
12. [Q12] Pour déterminer les extremums locaux d'une fonction dérivable f sur un intervalle ouvert, on cherche :
- A. les valeurs où $f(x) = 0$
 - B. les valeurs où $f'(x) = 0$ avec changement de signe
 - C. les valeurs où $f''(x) > 0$
 - D. les bornes de l'intervalle

Capacité C5

13. [Q13] Dans un problème d'optimisation, la première étape consiste à :
- A. dériver immédiatement
 - B. exprimer la quantité à optimiser sous la forme d'une fonction $f(x)$ d'une seule variable
 - C. résoudre l'équation $f(x) = 0$
 - D. tracer la courbe sur la calculatrice
14. [Q14] Un fabricant veut maximiser le volume $V(x) = x(120 - 2x)^2$ pour $x \in]0; 60[$. $V'(x) = 0$ donne x égal à :
- A. 60
 - B. 40
 - C. 20
 - D. 10
15. [Q15] Pour trouver le maximum d'une fonction continue f sur un segment fermé $[a, b]$, il faut comparer :
- A. les valeurs de f' aux bornes
 - B. les valeurs de f aux points critiques intérieurs où $f'(x) = 0$ et aux bornes $f(a), f(b)$
 - C. uniquement les points où $f'(x) = 0$
 - D. uniquement les bornes $f(a)$ et $f(b)$

Clé de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	C
Q3	C1	C
Q4	C2	A
Q5	C2	C
Q6	C2	B
Q7	C3	C
Q8	C3	C
Q9	C3	C
Q10	C4	B
Q11	C4	B
Q12	C4	B
Q13	C5	B
Q14	C5	C
Q15	C5	B

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- A — Oubli du coefficient n dans la formule $(x^n)' = nx^{n-1}$. *Renvoi : M1.*
- C — Exposant non décrémenté ($4x^4$ au lieu de $4x^3$). *Renvoi : M1.*
- D — Coefficient n remplacé par $n - 1 = 3$. *Renvoi : M1.*

► Q2

- A — Facteur 2 au numérateur au lieu du dénominateur. *Renvoi : M1.*
- B — Dénominateur 2 omis dans la formule de dérivation de $\sqrt{x}$. *Renvoi : M1.*
- D — $\sqrt{x}$ divisé par 2 sans dérivation. *Renvoi : M1.*

► Q3

- A — Signe moins oublié dans la dérivée de $1/x$. *Renvoi : M1.*
- B — Forme $-x^2$ au lieu de $-1/x^2$. *Renvoi : M1.*
- D — L'élève recopie la fonction $1/x$ sans la dériver ; sa dérivée vaut $-1/x^2$. *Renvoi : M1.*

► Q4

- B — Coefficient 3 non dérivé, terme $3x$ au lieu de $6x$. *Renvoi : M2.*
- C — Exposant non décrémenté. *Renvoi : M2.*
- D — Terme constant $+2$ conservé dans la dérivée. *Renvoi : M2.*

► Q5

- A — Produit des dérivées au lieu de la formule Leibniz. *Renvoi : M2.*
- B — Somme des dérivées. *Renvoi : M2.*
- D — Signe moins (c'est le numérateur du quotient). *Renvoi : M2.*

► Q6

- A — Signe $+$ au numérateur au lieu de $-$. *Renvoi : M2.*
- C — Quotient des dérivées. *Renvoi : M2.*
- D — Carré au dénominateur oublié. *Renvoi : M2.*

► Q7

- A — Signe $+$ de f' confondu avec décroissance. *Renvoi : M3.*
- B — Signe $+$ de f' confondu avec f' nulle. *Renvoi : M3.*
- D — Signe de f' confondu avec annulation de f . *Renvoi : M3.*

► Q8

- A — Intervalle de croissance pris au lieu de décroissance. *Renvoi : M3.*
- B — Racine de f au lieu du signe de f' . *Renvoi : M3.*

— D — Le signe de f' détermine les variations de f , pas sa convexité. La convexité s'étudie à l'aide de f'' . *Renvoi : M3.*

► Q9

— A — Changement $+$ $\rightarrow$ $-$ correspond à un maximum, pas un minimum. *Renvoi : M3, M4.*

— B — Annulation de f' avec changement de signe donne un extremum. *Renvoi : M4.*

— D — Une asymptote verticale se détecte par le comportement limite de f au voisinage de a , pas par l'annulation de f' en a . *Renvoi : M3.*

► Q10

— A — Signe de $-2x$ oublié : $-2x + 6 = 0$ donne $x = 3$, pas -3 . *Renvoi : M4.*

— C — $x = 6$ correspond à $B'(6) = -6 \neq 0$. *Renvoi : M4.*

— D — $x = 0$ correspond à $B'(0) = 6 \neq 0$. *Renvoi : M4.*

► Q11

— A — Coefficient dominant négatif implique un maximum global, pas un minimum. *Renvoi : M4.*

— C — Pas de point d'inflexion pour une parabole. *Renvoi : M4.*

— D — f' change de signe donc c'est bien un extremum. *Renvoi : M4.*

► Q12

— A — $f(x) = 0$ donne les racines de f , pas ses extremums. *Renvoi : M4.*

— C — Condition de convexité, pas seule d'extremum. *Renvoi : M4.*

— D — Sur un intervalle ouvert, les bornes ne sont pas atteintes. *Renvoi : M3.*

► Q13

— A — Dériver avant d'avoir défini la fonction à optimiser. *Renvoi : M5.*

— C — Résoudre $f(x) = 0$ cherche les racines, pas l'optimum. *Renvoi : M5.*

— D — Tracer la courbe n'est pas une preuve algébrique. *Renvoi : M5.*

► Q14

— A — $V'(60) = 0$, mais 60 est hors de l'intervalle ouvert $]0; 60[$ impose par l'énoncé; ce n'est donc pas une valeur admissible de x . *Renvoi : M5.*

— B — L'élève a remplacé à tort le facteur $120 - 6x$ de $V'(x) = (120 - 2x)(120 - 6x)$ par $120 - 3x$; résoudre $120 - 3x = 0$ conduit exactement à $x = 40$. *Renvoi : M5.*

— D — L'élève a remplacé à tort le facteur $120 - 6x$ par $60 - 6x$; résoudre $60 - 6x = 0$ conduit exactement à $x = 10$. *Renvoi : M5.*

► Q15

— A — Les valeurs de f' ne sont pas les valeurs de la fonction f . *Renvoi : M5.*

— C — Sur un segment fermé, le maximum peut être atteint sur une borne sans annulation de f' . *Renvoi : M5.*

— D — Le point critique intérieur doit aussi être vérifié. *Renvoi : M5.*

Corrigé — Évaluation A — Dérivation : applications aux variations

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$, donc $f'(x) = 6x - 2$.

Question 2. $f'(2) = 6 \times 2 - 2 = 12 - 2 = 10$.

Interprétation géométrique : la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 a pour coefficient directeur 10. La courbe « monte » localement avec une pente de 10 en ce point.

Question 3. $f(2) = 3 \times 4 - 2 \times 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$.

Équation de la tangente :

$$T : y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 10(x - 2) + 9 = 10x - 20 + 9 = 10x - 11.$$

Question 4. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$.

Exercice 2 — 6 points

Question 1. $g(x) = x^3 - 6x$, donc $g'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x^2 - 2) = 3(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$.

Question 2. $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\sqrt{2}$ ou $x = \sqrt{2}$ ($\sqrt{2} \approx 1,41$).

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$			
$g'(x)$	+	+	0	-	0	+	+

Question 3. $g(-\sqrt{2}) = -(\sqrt{2})^3 + 6\sqrt{2} = -2\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$. $g(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^3 - 6\sqrt{2} = 2\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = -4\sqrt{2}$.

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$			
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$4\sqrt{2}$	$\searrow$	$-4\sqrt{2}$	$\nearrow$	$+\infty$

Question 4. g admet un **maximum local** de $4\sqrt{2} \approx 5,66$ en $x = -\sqrt{2}$. g admet un **minimum local** de $-4\sqrt{2} \approx -5,66$ en $x = \sqrt{2}$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $u = x^2 + 2$, $v = x - 1$, $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$h'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2x(x-1) - (x^2+2)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2}.$$

Question 2. $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-2) = 4 + 8 = 12$.

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Sur $]1; +\infty[$, seule la racine $x^* = 1 + \sqrt{3} \approx 2,73$ appartient au domaine.

Question 3. Sur $]1; +\infty[$: $(x-1)^2 > 0$ toujours. Le signe de h' est celui du numérateur $x^2 - 2x - 2$: $h'(x) < 0$ pour $1 < x < 1 + \sqrt{3}$ et $h'(x) > 0$ pour $x > 1 + \sqrt{3}$.

$$h(1 + \sqrt{3}) = \frac{(1 + \sqrt{3})^2 + 2}{(1 + \sqrt{3}) - 1} = \frac{1 + 2\sqrt{3} + 3 + 2}{\sqrt{3}} = \frac{6 + 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} + 2 = 2\sqrt{3} + 2.$$

x	1	$1 + \sqrt{3}$	$+\infty$
$h'(x)$	−	0	+
$h(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$2 + 2\sqrt{3}$
		$\nearrow$	$+\infty$

h admet un minimum de $2 + 2\sqrt{3} \approx 5,46$ en $x = 1 + \sqrt{3}$ sur $]1; +\infty[$.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $R(x) = x \times (20 - x) = 20x - x^2$.

Question 2. $R'(x) = 20 - 2x$.

$R'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10$.

$R'(x) > 0$ pour $x < 10$ et $R'(x) < 0$ pour $x > 10$: R est maximale en $x = 10$.

Tableau de variations de R sur $[0; 20]$:

x	0	10	20		
$R(x)$	0	$\rightarrow$	100	$\searrow$	0

Question 3. $R(10) = 10 \times (20 - 10) = 10 \times 10 = 100$ euros.

Le maraîcher maximise son chiffre d'affaires en vendant 10 kg de tomates au prix de 10 euros/kg, pour un chiffre d'affaires de **100** euros.

Évaluation A — Dérivation : applications aux variations

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$. (1 pt)
2. Calculer $f'(2)$ et interpréter géométriquement ce résultat. (1,5 pt)
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2. (1,5 pt)
4. Déterminer pour quelle valeur de x la tangente à la courbe de f est horizontale. (1 pt)

Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 6x$.

1. Calculer $g'(x)$ et factoriser. (1,5 pt)
2. Résoudre $g'(x) = 0$ et dresser le tableau de signes de g' . (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations complet de g sur $\mathbb{R}$. Préciser les valeurs de g aux points remarquables. (2 pt)
4. Donner les valeurs des extremums locaux de g et préciser leur nature (maximum ou minimum). (1 pt)

Exercice 3

5 points — C2, C3, C4

Soit h la fonction définie sur $] -\infty ; 1[\cup]1 ; +\infty[$ par $h(x) = \frac{x^2 + 2}{x - 1}$.

1. Calculer $h'(x)$ à l'aide de la règle du quotient. (2 pt)
2. Factoriser le numérateur de $h'(x)$ et résoudre $h'(x) = 0$. (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations de h sur $]1 ; +\infty[$. (1,5 pt)

Exercice 4

4 points — C5

Un maraîcher vend des tomates à un marché. Il estime que s'il vend x kg (avec $0 \leq x \leq 20$), le prix en euros par kilogramme sera $p(x) = 20 - x$. Le coût de production est nul pour simplifier.

1. Exprimer le chiffre d'affaires $R(x) = x \cdot p(x)$. (1 pt)
2. Calculer $R'(x)$ et trouver la valeur de x qui maximise $R(x)$. (2 pt)
3. Calculer le chiffre d'affaires maximal. (1 pt)

Corrigé — Évaluation B — Dérivation : applications aux variations

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$, donc $f'(x) = 4x + 3$.

Question 2. $f'(1) = 4 + 3 = 7$.

Interprétation géométrique : la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 a pour coefficient directeur 7. La courbe monte localement avec une pente de 7 en ce point.

Question 3. $f(1) = 2 + 3 - 4 = 1$.

Équation de la tangente :

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 7(x - 1) + 1 = 7x - 7 + 1 = 7x - 6.$$

Vérification : $T(1) = 7 - 6 = 1 = f(1)$. ✓

Question 4. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{4}$.

Exercice 2 — 6 points

Question 1. $g(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$, donc $g'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2)$.

Question 2. $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = 2$.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
6	+	+	+	+
$x - 1$	-	-	0	+
$x - 2$	-	-	-	0
$g'(x)$	+	+	0	+

Question 3. $g(1) = 2 - 9 + 12 = 5$ et $g(2) = 16 - 36 + 24 = 4$.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ 5	$\searrow$ 4	$\nearrow$ $+\infty$

Question 4. g admet un **maximum local** de 5 en $x = 1$. g admet un **minimum local** de 4 en $x = 2$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, donc pour $x \neq -2$:

$$h(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x + 2} = x - 2.$$

Question 2. $h(x) = x - 2$ (pour $x \neq -2$), donc $h'(x) = 1$.

Question 3. $h'(x) = 1 > 0$ pour tout $x \neq -2$: il n'y a pas de solution à $h'(x) = 0$.

h est strictement croissante sur $] -\infty ; -2[$.

x	$-\infty$	-2
$h'(x)$	+	+
$h(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ -4

($h(-2)$ n'est pas défini, mais la limite à gauche est $-2 - 2 = -4$.)

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $R(x) = x \times (30 - 2x) = 30x - 2x^2$.

Question 2. $R'(x) = 30 - 4x$.

$$R'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{30}{4} = \frac{15}{2} = 7,5.$$

$R'(x) > 0$ pour $x < 7,5$ et $R'(x) < 0$ pour $x > 7,5$: R est maximale en $x = 7,5$.

Tableau de variations de R sur $[0 ; 15]$:

x	0	7,5	15
$R(x)$	0	112,5	0

Question 3. $R\left(\frac{15}{2}\right) = 30 \times \frac{15}{2} - 2 \times \left(\frac{15}{2}\right)^2 = 225 - 2 \times \frac{225}{4} = 225 - \frac{225}{2} = \frac{225}{2} = 112,5$ euros.

Le producteur maximise son chiffre d'affaires en vendant 7,5 litres au prix de $30 - 2 \times 7,5 = 15$ euros/L, pour un chiffre d'affaires de **112,5 euros**.

Évaluation B — Dérivation : applications aux variations

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$.

1. Calculer $f'(x)$. (1 pt)
2. Calculer $f'(1)$ et interpréter géométriquement ce résultat. (1,5 pt)
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. (1,5 pt)
4. Déterminer pour quelle valeur de x la tangente à la courbe de f est horizontale. (1 pt)

Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$.

1. Calculer $g'(x)$ et factoriser. (1,5 pt)
2. Résoudre $g'(x) = 0$ et dresser le tableau de signes de g' . (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations complet de g sur $\mathbb{R}$. Préciser les valeurs de g aux points remarquables. (2 pt)
4. Donner les valeurs des extremums locaux de g et préciser leur nature. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C2, C3, C4

Soit h la fonction définie sur $] -\infty; -2[\cup] -2; +\infty[$ par $h(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$.

1. Simplifier $h(x)$ en factorisant le numérateur. (1 pt)
2. En déduire $h'(x)$ sans utiliser la règle du quotient. (1,5 pt)
3. Résoudre $h'(x) = 0$ et dresser le tableau de variations de h sur $] -\infty; -2[$. (2,5 pt)

Exercice 4

4 points — C5

Un producteur de jus de fruits fixe son prix de vente à $p(x) = 30 - 2x$ euros par litre, où x est la quantité vendue en litres (avec $0 \leq x \leq 15$). Le coût de production est nul pour simplifier.

1. Exprimer le chiffre d'affaires $R(x) = x \cdot p(x)$. (1 pt)
2. Calculer $R'(x)$ et trouver la valeur de x qui maximise $R(x)$. (2 pt)
3. Calculer le chiffre d'affaires maximal. (1 pt)

Rappel — Taux de variation et nombre dérivé

Taux de variation de f entre a et b ($a \neq b$) :

$$\tau = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Nombre dérivé $f'(a)$: c'est la limite du taux de variation $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ quand $h \rightarrow 0$. Géométriquement, $f'(a)$ est la pente de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

Exercice 54

Soit $f(x) = 2x^2 - x$.

1. Calculer le taux de variation de f entre $x = 1$ et $x = 3$.
2. Calculer $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ pour $h \neq 0$. Développer et simplifier.
3. En déduire $f'(2)$.

Corrigé

Question 1. $f(1) = 2 - 1 = 1$ et $f(3) = 18 - 3 = 15$.

$$\tau = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{15 - 1}{2} = \frac{14}{2} = 7.$$

Question 2. $f(2) = 8 - 2 = 6$ et $f(2+h) = 2(2+h)^2 - (2+h) = 2(4 + 4h + h^2) - 2 - h = 2h^2 + 7h + 6$.

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{2h^2 + 7h + 6 - 6}{h} = \frac{2h^2 + 7h}{h} = 2h + 7.$$

Question 3. $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (2h + 7) = 7$.

Exercice 55

On sait que $f'(4) = -3$. Interpréter ce nombre dérivé :

1. Graphiquement (donner la pente de la tangente).
2. En termes de sens de variation de f au voisinage de $x = 4$.
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 4, sachant que $f(4) = 5$.

Corrigé

Question 1. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 4 a pour pente $f'(4) = -3$.

Question 2. Comme $f'(4) = -3 < 0$, la fonction f est localement décroissante au voisinage de $x = 4$.

Question 3. $T : y = f'(4)(x - 4) + f(4) = -3(x - 4) + 5 = -3x + 12 + 5 = -3x + 17$.

Exercice 56

Soit $f(x) = x^3$. On admet que $f'(x) = 3x^2$.

1. Calculer $f'(0)$, $f'(1)$ et $f'(-2)$.
2. Pour quelle(s) valeur(s) de x la tangente à la courbe de f est-elle horizontale ?
3. La pente de la tangente en $x = 2$ est-elle plus grande ou plus petite qu'en $x = 1$? Que peut-on en déduire sur la « courbure » de f ?

Corrigé

Question 1. $f'(0) = 3 \times 0^2 = 0$, $f'(1) = 3 \times 1 = 3$, $f'(-2) = 3 \times 4 = 12$.

Question 2. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$. La tangente est horizontale uniquement en $x = 0$.

Question 3. $f'(1) = 3$ et $f'(2) = 12$: la pente en $x = 2$ est bien plus grande. Cela signifie que la courbe $f(x) = x^3$ est de plus en plus « raide » (sa pente croît) pour $x > 0$.

Rappel — Équation de la tangente

La tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Elle passe par le point $(a; f(a))$ et a pour coefficient directeur $f'(a)$.

Exercice 57

On sait que $f(2) = 3$ et $f'(2) = 5$.

1. Écrire l'équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 2.
2. Calculer $T(2)$ et vérifier que le point $(2; 3)$ est bien sur T .
3. Calculer $T(3)$.

Corrigé

Question 1. $T : y = 5(x - 2) + 3 = 5x - 10 + 3 = 5x - 7$.

Question 2. $T(2) = 5 \times 2 - 7 = 10 - 7 = 3 = f(2)$. ✓ Le point $(2; 3)$ est bien sur T .

Question 3. $T(3) = 5 \times 3 - 7 = 15 - 7 = 8$.

Exercice 58

Soit $f(x) = x^2$. On admet que $f'(x) = 2x$.

1. Calculer $f(-1)$ et $f'(-1)$.
2. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse -1 .
3. Vérifier que la tangente coupe l'axe des ordonnées en $(0; -1)$.

Corrigé

Question 1. $f(-1) = (-1)^2 = 1$ et $f'(-1) = 2 \times (-1) = -2$.

Question 2. $T : y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) = -2(x + 1) + 1 = -2x - 2 + 1 = -2x - 1$.

Question 3. $T(0) = -2 \times 0 - 1 = -1$. La tangente coupe bien l'axe des ordonnées en $(0; -1)$. ✓

Exercice 59

On donne la courbe C_f . On lit que $f(1) = 4$ et que la tangente en $(1; 4)$ passe par le point $(3; 0)$.

1. Calculer la pente de la tangente.
2. En déduire $f'(1)$.
3. Écrire l'équation de la tangente.

Corrigé

Question 1. pente = $\frac{0 - 4}{3 - 1} = \frac{-4}{2} = -2$.

Question 2. $f'(1) = -2$ (la pente de la tangente est le nombre dérivé).

Question 3. $T : y = -2(x - 1) + 4 = -2x + 2 + 4 = -2x + 6$.

Vérification : $T(3) = -6 + 6 = 0$ ✓ et $T(1) = -2 + 6 = 4 = f(1)$ ✓.

Rappel — Calcul littéral

Développer : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

Factoriser : extraire le facteur commun, identifier une forme remarquable.

Signe d'un produit : $A \times B > 0 \Leftrightarrow (A > 0 \text{ et } B > 0) \text{ ou } (A < 0 \text{ et } B < 0)$.

Signe d'un quotient : $\frac{A}{B} > 0 \Leftrightarrow A \text{ et } B \text{ ont le même signe } (B \neq 0)$.

Exercice 60

Développer et réduire chaque expression.

1. $(x + 3)(x - 3)$
2. $(2x - 1)^2$
3. $x(x - 4) + 3(x^2 - 1)$

Corrigé

Question 1. $(x + 3)(x - 3) = x^2 - 3^2 = x^2 - 9$.

Question 2. $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 2 \times 2x \times 1 + 1 = 4x^2 - 4x + 1$.

Question 3. $x(x - 4) + 3(x^2 - 1) = x^2 - 4x + 3x^2 - 3 = 4x^2 - 4x - 3$.

Exercice 61

Factoriser chaque expression.

1. $6x^2 - 4x$
2. $x^2 - 9$
3. $2x^2 - 8$

Corrigé

Question 1. $6x^2 - 4x = 2x(3x - 2)$.

Question 2. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.

Question 3. $2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x - 2)(x + 2)$.

Exercice 62

Étudier le signe des expressions suivantes.

1. $f'(x) = (x - 2)(x + 1)$
2. $g'(x) = -3(x - 1)$
3. $h'(x) = \frac{x + 3}{x - 1}$ pour $x \neq 1$

Corrigé

Question 1. $(x - 2)(x + 1) = 0$ pour $x = -1$ ou $x = 2$.

x	$-\infty$	-1		2	$+\infty$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x - 2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Question 2. $-3(x - 1) = 0$ pour $x = 1$. Puisque $-3 < 0$, le signe de $g'(x)$ est opposé au signe de $(x - 1)$: $g'(x) > 0$ sur $] -\infty ; 1[$ et $g'(x) < 0$ sur $]1 ; +\infty[$.

Question 3.

x	$-\infty$	-3		1		$+\infty$
$x + 3$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$
$x - 1$	$-$	$-$	$-$	$ $	$+$	$+$
$h'(x)$	$+$	0	$-$	$ $	$+$	$+$

Rappel — Polynômes du second degré

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

Discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.

- ▶ Si $\Delta > 0$: deux racines réelles $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- ▶ Si $\Delta = 0$: racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- ▶ Si $\Delta < 0$: pas de racine réelle.

Forme factorisée (si $\Delta \geq 0$) : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Signe : du signe de a à l'extérieur des racines, opposé entre les racines.

Exercice 63

Soit $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

1. Calculer le discriminant Δ .
2. Donner les racines de f .
3. Factoriser $f(x)$.

Corrigé

Question 1. $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0$.

Question 2. $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$.

Question 3. $f(x) = (x-2)(x-3)$.

Exercice 64

Soit $g(x) = 2x^2 - 3x - 2$.

1. Calculer Δ et les racines de g .
2. Dresser le tableau de signes de $g(x)$.
3. Sur quel intervalle $g(x) \leq 0$?

Corrigé

Question 1. $\Delta = 9 + 16 = 25$. $x_1 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2}$ et $x_2 = \frac{3+5}{4} = 2$.

Question 2.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$g(x)$	+	0	-	0	+	+

Question 3. $g(x) \leq 0$ sur $\left[-\frac{1}{2}; 2\right]$.

Exercice 65

On donne $h'(x) = -x^2 + 4$ (dérivée d'une certaine fonction h).

1. Factoriser $h'(x)$.
2. Étudier le signe de $h'(x)$.
3. Quelles conclusions peut-on tirer sur les variations de h ?

Corrigé

Question 1. $h'(x) = -x^2 + 4 = -(x^2 - 4) = -(x-2)(x+2)$.

Question 2.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$-(x-2)$	+	+	+	0	-	-
$(x+2)$	-	0	+	+	+	+
$h'(x)$	-	0	+	0	-	-

Question 3. $h'(x) > 0$ sur $] -2; 2[$, donc h est croissante sur $[-2; 2]$. $h'(x) < 0$ sur $] -\infty; -2[$ et $]2; +\infty[$, donc h est décroissante sur ces intervalles.

Rappel — Sens de variation

Fonction croissante sur I : pour tous $a < b$ dans I , on a $f(a) \leq f(b)$. La courbe « monte » de gauche à droite.

Fonction décroissante sur I : pour tous $a < b$ dans I , on a $f(a) \geq f(b)$. La courbe « descend » de gauche à droite.

Tableau de variations : tableau récapitulatif du sens de variation, avec les valeurs aux bornes ou aux extremums.

Exercice 66

La courbe d'une fonction f passe par les points $A(0; 3)$, $B(2; 7)$, $C(5; 1)$.

- Entre $x = 0$ et $x = 2$, f est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.
- Entre $x = 2$ et $x = 5$, f est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.
- Dresser un tableau de variations partiel de f sur $[0; 5]$.

Corrigé

Question 1. $f(0) = 3 < f(2) = 7$: f est croissante sur $[0; 2]$.

Question 2. $f(2) = 7 > f(5) = 1$: f est décroissante sur $[2; 5]$.

Question 3.

x	0	2	5
$f(x)$	3	↗ 7	↘ 1

Exercice 67

On donne le tableau de variations de g :

x	-3	-1	2	4
$g(x)$	1	↘ -4	↗ 6	↘ 0

- Sur quel(s) intervalle(s) g est-elle croissante ?
- Donner le maximum de g sur $[-3; 4]$.
- Donner le minimum de g sur $[-3; 4]$.
- Comparer $g(-2)$ et $g(0)$ (sans calculer leur valeur exacte).

Corrigé

Question 1. g est croissante sur $[-1; 2]$.

Question 2. Le maximum de g sur $[-3; 4]$ est 6, atteint en $x = 2$.

Question 3. Le minimum de g sur $[-3; 4]$ est -4, atteint en $x = -1$.

Question 4. $-2 \in [-3; -1]$ et $0 \in [-1; 2]$. Sur $[-3; -1]$, g est décroissante donc $g(-2) > g(-1) = -4$, et sur $[-1; 2]$, g est croissante donc $g(0) > g(-1) = -4$. En comparant : $-2 < 0$, et sur $[-1; 2]$, g est croissante, donc $g(-1) \leq g(-2)$ n'est pas directement applicable. Cependant, on sait uniquement que $g(-2)$ est entre -4 et 1 , et $g(0)$ est entre -4 et 6 . On ne peut pas conclure sans plus d'information.

Exercice 68

Voici une liste de fonctions et leurs intervalles de définition. Pour chacune, indiquer si elle est croissante, décroissante, ou ni l'un ni l'autre, sur l'intervalle donné.

1. $f(x) = 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$.
2. $g(x) = -x^2$ sur $[0; +\infty[$.
3. $h(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$.
4. $k(x) = x^2 - 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$ (sans calcul de dérivée).

Corrigé

Question 1. $f(x) = 3x + 1$ est une fonction affine de coefficient directeur $3 > 0$: elle est **croissante** sur $\mathbb{R}$.

Question 2. Pour $0 \leq a < b$: $a^2 < b^2$ donc $-a^2 > -b^2$: $g(a) > g(b)$. g est **décroissante** sur $[0; +\infty[$.

Question 3. Pour $0 < a < b$: $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ donc $h(a) > h(b)$. h est **décroissante** sur $]0; +\infty[$.

Question 4. $k(x) = (x - 1)^2 \geq 0$. Pour $x < 1$, k est décroissante ; pour $x > 1$, k est croissante. k n'est donc **ni croissante ni décroissante** sur $\mathbb{R}$ entier.

Exercice 69

Calculer la dérivée de chaque fonction en appliquant directement les formules de référence.

1. $f(x) = x^5$
2. $g(x) = \sqrt{x}$ ($x > 0$)
3. $h(x) = \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$)
4. $k(x) = 7$ (fonction constante)

Coup de pouce 1. Pour $f(x) = x^n$, la dérivée est $f'(x) = nx^{n-1}$. Pour $\sqrt{x}$, utiliser le tableau des dérivées de référence.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 5x^4$.

Question 2. $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Question 3. $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

Question 4. $k'(x) = 0$ (la dérivée d'une constante est nulle).

Exercice 70

Calculer $f'(x)$, puis calculer la valeur numérique demandée.

1. $f(x) = x^3$. Calculer $f'(2)$.
2. $g(x) = \sqrt{x}$. Calculer $g'(9)$.
3. $h(x) = \frac{1}{x}$. Calculer $h'(5)$.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(2) = 3 \times 4 = 12$.

Question 2. $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $g'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}$.

Question 3. $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$, donc $h'(5) = -\frac{1}{25}$.

Exercice 71

Associer chaque fonction à sa dérivée.

Fonctions	Dérivées
(a) $f(x) = x^6$	(1) $-\frac{1}{x^2}$
(b) $g(x) = \frac{1}{x}$	(2) $6x^5$
(c) $h(x) = \sqrt{x}$	(3) 0
(d) $k(x) = \pi$	(4) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
(e) $\ell(x) = x$	(5) 1

Puis donner un exemple de fonction m non listée ci-dessus dont la dérivée est $m'(x) = 4x^3$.

Corrigé

- (a) $\leftrightarrow$ (2) : $(x^6)' = 6x^5$.
- (b) $\leftrightarrow$ (1) : $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.
- (c) $\leftrightarrow$ (4) : $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
- (d) $\leftrightarrow$ (3) : $(\pi)' = 0$ (constante).
- (e) $\leftrightarrow$ (5) : $(x)' = 1$.

Exemple : $m(x) = x^4$, car $(x^4)' = 4x^3$.

Exercice 72

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la règle de la somme et la linéarité.

1. $f(x) = 5x^3 - 2x + 7$
2. $g(x) = -x^4 + 3x^2 - x$
3. $h(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$)

Coup de pouce 1. $(u + v)' = u' + v'$ et $(ku)' = ku'$. Dériver terme par terme.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 5 \times 3x^2 - 2 + 0 = 15x^2 - 2$.

Question 2. $g'(x) = -4x^3 + 3 \times 2x - 1 = -4x^3 + 6x - 1$.

Question 3. $h'(x) = \frac{2x}{2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) = x - \frac{1}{x^2}$.

Exercice 73

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la règle du produit $(uv)' = u'v + uv'$.

1. $f(x) = x^2(x - 3)$

2. $g(x) = (2x + 1)(x^2 - x)$

Pour chaque calcul, identifier u , v , u' et v' avant de calculer.

Corrigé

Question 1. $u = x^2$, $v = x - 3$, $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$f'(x) = u'v + uv' = 2x(x - 3) + x^2 \times 1 = 2x^2 - 6x + x^2 = 3x^2 - 6x.$$

Question 2. $u = 2x + 1$, $v = x^2 - x$, $u' = 2$, $v' = 2x - 1$.

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'v + uv' = 2(x^2 - x) + (2x + 1)(2x - 1) \\ &= 2x^2 - 2x + 4x^2 - 1 = 6x^2 - 2x - 1. \end{aligned}$$

Exercice 74

Calculer la dérivée en utilisant la règle du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

1. $f(x) = \frac{x}{x+1}$ ($x \neq -1$)

2. $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2}$ ($x \neq -2$)

Corrigé

Question 1. $u = x$, $v = x + 1$, $u' = 1$, $v' = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x + 1) - x \times 1}{(x + 1)^2} = \frac{x + 1 - x}{(x + 1)^2} = \frac{1}{(x + 1)^2}.$$

Question 2. $u = x^2 - 1$, $v = x + 2$, $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$g'(x) = \frac{2x(x + 2) - (x^2 - 1) \times 1}{(x + 2)^2} = \frac{2x^2 + 4x - x^2 + 1}{(x + 2)^2} = \frac{x^2 + 4x + 1}{(x + 2)^2}.$$

Exercice 75

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ et dresser le tableau de signes de f' .
3. En déduire le tableau de variations de f . Préciser les valeurs de f aux points remarquables.

Coup de pouce 1. $f'(x) = 2x - 6$. Résoudre $2x - 6 = 0$, puis étudier le signe de $2x - 6$ en fonction de la position de x par rapport à la racine.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 2x - 6$.

Question 2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f'(x)$	-	-	0	+	+

Question 3. $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow -4 \rightarrow$	$+\infty$

f admet un minimum global de -4 en $x = 3$.

Exercice 76

Soit $g(x) = -2x^3 + 6x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$ et le factoriser.
2. Dresser le tableau de signes de $g'(x)$.
3. En déduire le tableau de variations de g .

Corrigé

Question 1. $g'(x) = -6x^2 + 6 = -6(x^2 - 1) = -6(x - 1)(x + 1)$.

Question 2.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
-6	$-$	$-$	$-$	$-$
$x - 1$	$-$	$-$	0	$+$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	$-$

Question 3. $g(-1) = 2 - 6 = -4$ et $g(1) = -2 + 6 = 4$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow -4 \rightarrow$	$4 \searrow$	$-\infty$

Exercice 77

Soit $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ pour $x > 0$.

1. Simplifier l'expression de $h(x)$ en séparant le quotient.
2. Calculer $h'(x)$.
3. Étudier le signe de $h'(x)$ sur $]0; +\infty[$ et dresser le tableau de variations de h .

Corrigé

Question 1. $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x} = \frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} = x + \frac{1}{x}$.

Question 2. $h'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$.

Question 3. Pour $x > 0$: $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (racine positive).

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
$h(x)$	$+\infty$	$\searrow 2 \rightarrow$	$+\infty$

$h(1) = 1 + 1 = 2$ est le minimum de h sur $]0; +\infty[$.

Exercice 78

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et résoudre $f'(x) = 0$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations complet de f .
3. Donner les valeurs des extremums locaux de f .

Coup de pouce 1. Factoriser $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$, puis étudier le signe du produit.

Corrigé

Question 1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ou $x = 1$.

Question 2.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$	+	+	0	-	0	+	+
$f(x)$	$-\infty$	<i>↗</i>	3	<i>↘</i>	-1	<i>↗</i>	$+\infty$

Question 3. f admet un maximum local de 3 en $x = -1$ et un minimum local de -1 en $x = 1$.

Exercice 79

Une courbe est représentée par $g(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a > 0$. On sait que $g'(x) = 0$ pour $x = 2$ et que $g(2) = -5$.

1. Quel est le type d'extremum en $x = 2$ pour g ? Justifier.
2. Donner la valeur de cet extremum.
3. Si $g'(x) = 4x - 8$, retrouver la valeur $x = 2$ et exprimer $g(x)$ en supposant $g(0) = 3$.

Corrigé

Question 1. Comme $a > 0$ (parabole ouverte vers le haut), la fonction g est d'abord décroissante puis croissante. En $x = 2$, $g'(2) = 0$ et g' passe de - à +, donc g admet un **minimum** en $x = 2$.

Question 2. La valeur minimale de g est $g(2) = -5$.

Question 3. $g'(x) = 4x - 8 \Rightarrow g(x) = 2x^2 - 8x + C$. $g(0) = 3 \Rightarrow C = 3$. Donc $g(x) = 2x^2 - 8x + 3$.
Vérification : $g(2) = 8 - 16 + 3 = -5$. ✓

Exercice 80

Soit $h(x) = \frac{x^2 - 4x + 8}{x - 1}$ pour $x \neq 1$.

1. Calculer $h'(x)$ (règle du quotient).
2. Simplifier $h'(x)$ et résoudre $h'(x) = 0$.
3. Dresser le tableau de variations de h sur $]1; +\infty[$.

Corrigé

Question 1. $u = x^2 - 4x + 8$, $v = x - 1$, $u' = 2x - 4$, $v' = 1$.

$$h'(x) = \frac{(2x - 4)(x - 1) - (x^2 - 4x + 8)}{(x - 1)^2}.$$

Question 2.

Numérateur : $2x^2 - 6x + 4 - x^2 + 4x - 8 = x^2 - 2x - 4$.

$$h'(x) = \frac{x^2 - 2x - 4}{(x - 1)^2}.$$

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 4 = 0. \Delta = 4 + 16 = 20, \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}. x = \frac{2 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}.$$

Seule $x_0 = 1 + \sqrt{5} \approx 3,24$ appartient à $]1; +\infty[$.

Question 3. Sur $]1; +\infty[: (x-1)^2 > 0$ toujours. Le signe de h' est celui de $x^2 - 2x - 4$, négatif entre les racines.

x	1	$1 + \sqrt{5}$	$+\infty$
$h'(x)$	-	0	+
$h(x)$	$\searrow$	$2\sqrt{5} - 2$	$\nearrow$

$$h(1 + \sqrt{5}) = \frac{(1 + \sqrt{5})^2 - 4(1 + \sqrt{5}) + 8}{\sqrt{5}} = \frac{10 - 2\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} - 2 \approx 2,47.$$

Le minimum de h sur $]1; +\infty[$ est $2\sqrt{5} - 2$.

Exercice 81

Un agriculteur souhaite clôturer un terrain rectangulaire en utilisant 100 m de grillage. Il note x la longueur du terrain (en mètres), avec $0 < x < 50$.

1. Exprimer la largeur ℓ du terrain en fonction de x .
2. Exprimer l'aire $A(x)$ du terrain en fonction de x .
3. Calculer $A'(x)$ et résoudre $A'(x) = 0$.
4. En déduire les dimensions qui maximisent l'aire. Calculer cette aire maximale.

Coup de pouce 1. Le périmètre d'un rectangle de longueur x et largeur ℓ est $2(x + \ell) = 100$, donc $\ell = 50 - x$.

Corrigé

Question 1. $2(x + \ell) = 100 \Rightarrow \ell = 50 - x$ (avec $0 < x < 50$ pour garantir $\ell > 0$).

Question 2. $A(x) = x \times (50 - x) = 50x - x^2$.

Question 3. $A'(x) = 50 - 2x$. $A'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 25$.

$A'(x) > 0$ pour $x < 25$ et $A'(x) < 0$ pour $x > 25$: A est maximale en $x = 25$.

Question 4. $x = 25$ m, $\ell = 50 - 25 = 25$ m. Le terrain est un carré. Aire maximale : $A(25) = 25^2 = 625$ m².

Exercice 82

Une entreprise produit x unités (avec $0 \leq x \leq 40$). Le coût de production est $C(x) = 0,5x^2 + 2x + 10$ (en euros) et le prix de vente est $p(x) = 30 - 0,5x$ (en euros par unité).

1. Exprimer le chiffre d'affaires $R(x) = x \cdot p(x)$.
2. Exprimer le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$.
3. Calculer $B'(x)$ et trouver la valeur de x qui maximise $B(x)$.
4. Calculer le bénéfice maximal.

Corrigé

Question 1. $R(x) = x \times (30 - 0,5x) = 30x - 0,5x^2$.

Question 2. $B(x) = R(x) - C(x) = (30x - 0,5x^2) - (0,5x^2 + 2x + 10) = -x^2 + 28x - 10$.

Question 3. $B'(x) = -2x + 28$. $B'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 14$.

Comme le coefficient dominant de B est $-1 < 0$, B est concave et $x = 14$ est un maximum (sur $[0; 40]$, vérifions aussi les bornes : $B(0) = -10$, $B(40) = -1600 + 1120 - 10 = -490$, tous inférieurs à $B(14)$).

Question 4. $B(14) = -(14)^2 + 28 \times 14 - 10 = -196 + 392 - 10 = 186$ euros.

Exercice 83 ♦

On découpe dans un carré de carton de côté 10 cm quatre petits carrés identiques (un dans chaque coin, de côté x cm, avec $0 < x < 5$), puis on rabat les bords pour former une boîte sans couvercle.

1. Exprimer les dimensions de la base de la boîte en fonction de x .
2. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
3. Calculer $V'(x)$, résoudre $V'(x) = 0$ sur $]0; 5[$.
4. Déterminer la valeur de x qui maximise $V(x)$ et calculer ce volume maximal.

Corrigé

Question 1. On retire x cm de chaque côté : la base est un carré de côté $10 - 2x$ cm. La hauteur de la boîte est x cm.

Question 2. $V(x) = x(10 - 2x)^2$.

En développant : $V(x) = x(100 - 40x + 4x^2) = 4x^3 - 40x^2 + 100x$.

Question 3. $V'(x) = 12x^2 - 80x + 100$.

$$\Delta = (-80)^2 - 4 \times 12 \times 100 = 6400 - 4800 = 1600. x_1 = \frac{80 - 40}{24} = \frac{40}{24} = \frac{5}{3} \text{ et } x_2 = \frac{80 + 40}{24} = \frac{120}{24} = 5.$$

Seule $x_1 = \frac{5}{3} \approx 1,67$ cm appartient à $]0; 5[$.

Question 4. $V'(x) > 0$ pour $x < \frac{5}{3}$ et $V'(x) < 0$ pour $\frac{5}{3} < x < 5$: maximum en $x = \frac{5}{3}$.

$$V\left(\frac{5}{3}\right) = \frac{5}{3} \left(10 - \frac{10}{3}\right)^2 = \frac{5}{3} \times \left(\frac{20}{3}\right)^2 = \frac{5}{3} \times \frac{400}{9} = \frac{2000}{27} \approx 74,07 \text{ cm}^3.$$

Corrigé

On applique la formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ et les dérivées des fonctions constantes et identité.

1. $f'(x) = 5x^4$.
2. $g'(x) = 3x^2$.
3. $h'(x) = 0$ (dérivée d'une constante).
4. $k'(x) = 1$ (dérivée de la fonction identité).

Corrigé

1. Sur $\mathbb{R}^*$, on a $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.

2. Sur $]0; +\infty[$, on a $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

3. Sur $\mathbb{R}$, $(x^4)' = 4x^3$.

4. Sur $\mathbb{R}$, $(x^2)' = 2x$.

Corrigé

On applique la règle $(af)' = af'$ pour une constante a .

1. $f'(x) = 3 \times 2x = 6x$.

2. $g'(x) = 5 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{5}{2\sqrt{x}}$.

3. $h'(x) = -2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{2}{x^2}$.

Corrigé

On applique la linéarité de la dérivation $(f + g)' = f' + g'$.

$$1. f'(x) = 3x^2 + 2x.$$

$$2. g'(x) = 4x^3 - \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 4x^3 + \frac{1}{x^2}.$$

$$3. h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 1.$$

Corrigé

Question 1. Par linéarité et en appliquant $(x^n)' = nx^{n-1}$:

$$f'(x) = 2 \times 3x^2 - 3 \times 1 + 0 = \boxed{6x^2 - 3}.$$

Question 2. On calcule :

$$f'(1) = 6 \times 1 - 3 = 3 \quad \text{et} \quad f'(-1) = 6 \times 1 - 3 = 3.$$

On remarque que $f'(1) = f'(-1) = 3$. Cela s'explique par le fait que $f'(x) = 6x^2 - 3$ est une fonction paire (ne dépend que de x^2), donc $f'(-x) = f'(x)$.

Question 3. On résout $6x^2 - 3 = 0$:

$$6x^2 = 3 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Les solutions sont $\boxed{x = -\frac{\sqrt{2}}{2}}$ et $\boxed{x = \frac{\sqrt{2}}{2}}$.

Corrigé

Question 1. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - 2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x^2}.$$

Question 2. On remplace $x = 4$:

$$f'(4) = \frac{2}{\sqrt{4}} + \frac{2}{4^2} = \frac{2}{2} + \frac{2}{16} = 1 + \frac{1}{8} = \boxed{\frac{9}{8}}.$$

Question 3. Sur $]0; +\infty[$, les deux termes $\frac{2}{\sqrt{x}}$ et $\frac{2}{x^2}$ sont strictement positifs. Donc $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]0; +\infty[$. La fonction f est donc strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Corrigé

Question 1. On dérive :

$$f'(x) = 2x - 4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \boxed{2x - \frac{2}{\sqrt{x}}}.$$

Question 2. On résout $f'(x) = 0$:

$$2x - \frac{2}{\sqrt{x}} = 0 \Rightarrow 2x = \frac{2}{\sqrt{x}} \Rightarrow x\sqrt{x} = 1 \Rightarrow x^{3/2} = 1 \Rightarrow x = 1.$$

Question 3. On étudie le signe de $f'(x) = \frac{2x\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x}} = \frac{2(x^{3/2} - 1)}{\sqrt{x}}$.

Le dénominateur $\sqrt{x} > 0$ sur $]0; +\infty[$. Le numérateur $2(x^{3/2} - 1)$ est négatif si $x < 1$ et positif si $x > 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	–	0	+
$f(x)$	$\searrow$	–3	$\nearrow$

La fonction f est décroissante sur $]0; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$. Elle admet un minimum en $x = 1$ valant $f(1) = 1 - 4 = -3$.

Corrigé

Question 1. On dérive :

$$f'(x) = 3x^2 - 3 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 3x^2 + \frac{3}{x^2}.$$

Question 2.

$$f'(2) = 3 \times 4 + \frac{3}{4} = 12 + \frac{3}{4} = \frac{51}{4}.$$

Question 3. Sur $]0; +\infty[$, on a $x^2 > 0$ et $\frac{1}{x^2} > 0$, donc :

$$f'(x) = 3x^2 + \frac{3}{x^2} > 0.$$

Puisque $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]0; +\infty[$, la fonction f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Corrigé

Question 1. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 2x - 1 + \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x - 1 - \frac{1}{x^2}.$$

En mettant au même dénominateur $x^2 > 0$:

$$f'(x) = \frac{2x \cdot x^2 - x^2 - 1}{x^2} = \frac{2x^3 - x^2 - 1}{x^2}.$$

Question 2. On calcule $p(1) = 2 \times 1 - 1 - 1 = 0$. Donc $x = 1$ est bien racine de $p(x) = 2x^3 - x^2 - 1$.

Question 3. On effectue la division euclidienne de $2x^3 - x^2 - 1$ par $(x - 1)$:

$$2x^3 - x^2 - 1 = (x - 1)(2x^2 + x + 1).$$

Vérification : $(x - 1)(2x^2 + x + 1) = 2x^3 + x^2 + x - 2x^2 - x - 1 = 2x^3 - x^2 - 1$. ✓

Le discriminant de $2x^2 + x + 1$ vaut $\Delta = 1 - 4 \times 2 \times 1 = -7 < 0$. Donc $2x^2 + x + 1 > 0$ pour tout x réel (coefficient dominant positif).

Question 4. Sur $]0; +\infty[$, on a $x^2 > 0$ et $2x^2 + x + 1 > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $(x - 1)$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	–	0	+
$f(x)$	$\searrow$	1	$\nearrow$

La fonction f admet un minimum en $x = 1$ valant $f(1) = 1 - 1 + 1 = 1$.

Corrigé

Question 1. L'élève a commis une erreur de signe sur le terme $-\frac{1}{x}$. La dérivée de $-\frac{1}{x}$ est $-\left(-\frac{1}{x^2}\right) = +\frac{1}{x^2}$, et non $-\frac{1}{x^2}$.

Calcul correct :

$$f'(x) = (\sqrt{x})' + \left(-\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}.$$

Question 2.

$$f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} + \frac{1}{9^2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{81} = \frac{27}{162} + \frac{2}{162} = \boxed{\frac{29}{162}}.$$

Question 3. Sur $]0; +\infty[$, on a $\frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$ et $\frac{1}{x^2} > 0$, donc leur somme $f'(x) > 0$. Ainsi f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Question 4. Puisque f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et $4 < 9$, on conclut directement $f(4) < f(9)$.

Vérification numérique : $f(4) = 2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$ et $f(9) = 3 - \frac{1}{9} = \frac{26}{9} \approx 2,89$. On a bien $\frac{7}{4} = 1,75 < 2,89$. ✓

Corrigé

On applique la règle du produit $(uv)' = u'v + uv'$.

1. On pose $u = 2x + 1$ et $v = x^2 - 3$, donc $u' = 2$ et $v' = 2x$.

$$f'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = \boxed{6x^2 + 2x - 6}.$$

2. On pose $u = x^3 - x$ et $v = x + 2$, donc $u' = 3x^2 - 1$ et $v' = 1$.

$$g'(x) = (3x^2 - 1)(x + 2) + (x^3 - x)(1).$$

On développe :

$$(3x^2 - 1)(x + 2) = 3x^3 + 6x^2 - x - 2.$$

Donc :

$$g'(x) = 3x^3 + 6x^2 - x - 2 + x^3 - x = \boxed{4x^3 + 6x^2 - 2x - 2}.$$

Corrigé

On applique la règle du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

1. On pose $u = x^2 + 1$, $v = x - 2$, donc $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$f'(x) = \frac{2x(x - 2) - (x^2 + 1) \cdot 1}{(x - 2)^2} = \frac{2x^2 - 4x - x^2 - 1}{(x - 2)^2} = \boxed{\frac{x^2 - 4x - 1}{(x - 2)^2}}.$$

2. On pose $u = 3x - 1$, $v = x^2 + 1$, donc $u' = 3$, $v' = 2x$.

$$g'(x) = \frac{3(x^2 + 1) - (3x - 1)(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{3x^2 + 3 - 6x^2 + 2x}{(x^2 + 1)^2} = \boxed{\frac{-3x^2 + 2x + 3}{(x^2 + 1)^2}}.$$

Corrigé

1. On pose $u = x^2 - 2x + 3$ et $v = x + 1$, donc $u' = 2x - 2$ et $v' = 1$.

$$f'(x) = (2x - 2)(x + 1) + (x^2 - 2x + 3)(1) = 2x^2 + 2x - 2x - 2 + x^2 - 2x + 3 = \boxed{3x^2 - 2x + 1}.$$

Vérification : $f(x) = x^3 - x^2 + x + 3$, donc $f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$. ✓

2. On pose d'abord $p(x) = x(x - 1) = x^2 - x$, donc $p'(x) = 2x - 1$. Puis avec $q = x + 1$, $q' = 1$:

$$g'(x) = p'(x)q(x) + p(x)q'(x) = (2x - 1)(x + 1) + (x^2 - x)(1) = 2x^2 + x - x - 1 + x^2 - x = 3x^2 - x - 1.$$

Vérification plus rapide : $g(x) = x(x-1)(x+1) = x(x^2-1) = x^3-x$, donc $g'(x) = \boxed{3x^2-1}$.

Corrigé

On applique la règle du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

1. On pose $u = x$, $v = x^2 + 4$, donc $u' = 1$, $v' = 2x$.

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 + 4) - x \cdot 2x}{(x^2 + 4)^2} = \frac{x^2 + 4 - 2x^2}{(x^2 + 4)^2} = \boxed{\frac{4 - x^2}{(x^2 + 4)^2}}.$$

2. On pose $u = x^2 - 1$, $v = 2x + 1$, donc $u' = 2x$, $v' = 2$.

$$g'(x) = \frac{2x(2x + 1) - (x^2 - 1) \cdot 2}{(2x + 1)^2} = \frac{4x^2 + 2x - 2x^2 + 2}{(2x + 1)^2} = \boxed{\frac{2x^2 + 2x + 2}{(2x + 1)^2}}.$$

Corrigé

Question 1. On pose $u = x^2 - 3$ et $v = x^2 + 1$, donc $u' = 2x$ et $v' = 2x$.

$$f'(x) = 2x(x^2 + 1) + (x^2 - 3)(2x) = 2x[(x^2 + 1) + (x^2 - 3)] = 2x(2x^2 - 2) = 4x(x^2 - 1).$$

On factorise : $f'(x) = 4x(x-1)(x+1)$.

Question 2. $f'(x) = 0 \iff 4x(x-1)(x+1) = 0 \iff x \in \{-1; 0; 1\}$.

Question 3. Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-4	$\nearrow$	-3	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Valeurs : $f(-1) = (1-3)(1+1) = -4$, $f(0) = (-3)(1) = -3$, $f(1) = (1-3)(2) = -4$.

Corrigé

Question 1. On pose $u = x^2 - 2x$, $v = x^2 + 1$, donc $u' = 2x - 2$, $v' = 2x$.

$$f'(x) = \frac{(2x-2)(x^2+1) - (x^2-2x)(2x)}{(x^2+1)^2}.$$

Développons le numérateur :

$$(2x-2)(x^2+1) = 2x^3 + 2x - 2x^2 - 2, \quad (x^2-2x)(2x) = 2x^3 - 4x^2.$$

$$\text{Numérateur} = 2x^3 + 2x - 2x^2 - 2 - 2x^3 + 4x^2 = 2x^2 + 2x - 2 = 2(x^2 + x - 1).$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{2(x^2 + x - 1)}{(x^2 + 1)^2}.$$

Question 2. Puisque $(x^2 + 1)^2 > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x^2 + x - 1$. On résout $x^2 + x - 1 = 0$:

$$\Delta = 1 + 4 = 5, \quad x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

On note $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \approx -1,618$ et $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \approx 0,618$.

Question 3. Tableau de variations :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0
$f(x)$	$\nearrow$		$\searrow$	$\nearrow$

Corrigé

Question 1. On pose $u = x^2 + 3$ et $v = 2x - 1$, donc $u' = 2x$ et $v' = 2$.

$$f'(x) = 2x(2x - 1) + (x^2 + 3)(2) = 4x^2 - 2x + 2x^2 + 6 = \boxed{6x^2 - 2x + 6}.$$

Question 2. On calcule le discriminant de $6x^2 - 2x + 6$:

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 6 \times 6 = 4 - 144 = -140 < 0.$$

Comme $\Delta < 0$ et le coefficient dominant $6 > 0$, on a $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Question 3. Puisque $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$, la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

On calcule $f(0) = (0 + 3)(0 - 1) = 3 \times (-1) = -3$.

Corrigé

Question 1. On pose $u = 2x + 3$, $v = x^2 - 1$, donc $u' = 2$, $v' = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2 - 1) - (2x + 3)(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2 - 4x^2 - 6x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-2x^2 - 6x - 2}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-2(x^2 + 3x + 1)}{(x^2 - 1)^2}.$$

Question 2. $f'(x) = 0 \iff x^2 + 3x + 1 = 0$. Discriminant : $\Delta = 9 - 4 = 5$.

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

On a $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2} \approx -2,618$ et $x_2 = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} \approx -0,382$.

Question 3. Sur $] -\infty ; -1[$, le dénominateur $(x^2 - 1)^2 > 0$. On évalue le numérateur $-2(x^2 + 3x + 1)$ en $x = -2$:

$$-2(4 - 6 + 1) = -2(-1) = 2 > 0.$$

Comme $x_1 \approx -2,618 < -1$, le numérateur change de signe en x_1 dans $] -\infty ; -1[$. Ainsi $f'(x) > 0$ sur $] -\infty ; x_1[$ et $f'(x) < 0$ sur $]x_1 ; -1[$.

Corrigé

Question 1. On écrit $f = u \cdot u$ avec $u = x^2 - 1$ et $u' = 2x$. Par la règle du produit :

$$f'(x) = u'u + uu' = 2u \cdot u' = 2(x^2 - 1)(2x) = 4x(x^2 - 1).$$

On développe : $f'(x) = 4x^3 - 4x$.

Question 2. On factorise :

$$f'(x) = 4x(x^2 - 1) = 4x(x - 1)(x + 1).$$

Question 3. Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Question 4. L'élève confond le signe de $x^2 - 1$ avec le sens de variation de f . Or, d'après le tableau, f est décroissante sur $[0; 1]$ (et croissante sur $[-1; 0]$). Le signe d'une fonction et son sens de variation sont deux notions distinctes : c'est le signe de la dérivée f' , et non celui de f , qui détermine les variations de f .

Corrigé

Question 1. Le discriminant de $x^2 - x + 1$ est $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Avec un coefficient dominant positif, on a donc $x^2 - x + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

Question 2. On pose $u = x + 1$, $v = x^2 - x + 1$, $u' = 1$, $v' = 2x - 1$.

$$f'(x) = \frac{(x^2 - x + 1) - (x + 1)(2x - 1)}{(x^2 - x + 1)^2}.$$

On développe le numérateur :

$$(x^2 - x + 1) - (2x^2 - x + 2x - 1) = x^2 - x + 1 - 2x^2 - x + 1 = -x^2 - 2x + 2.$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 2}{(x^2 - x + 1)^2}.$$

Question 3. $f'(x) = 0 \iff -x^2 - 2x + 2 = 0 \iff x^2 + 2x - 2 = 0$.

Discriminant : $\Delta = 4 + 8 = 12$, donc $x = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}$.

On note $x_1 = -1 - \sqrt{3} \approx -2,73$ et $x_2 = -1 + \sqrt{3} \approx 0,73$.

x	$-\infty$	x_1		x_2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	min	$\nearrow$	max	$\searrow$

Question 4. Le maximum de f est atteint en $x_2 = -1 + \sqrt{3}$.

$$f(x_2) = \frac{(-1 + \sqrt{3}) + 1}{(-1 + \sqrt{3})^2 - (-1 + \sqrt{3}) + 1} = \frac{\sqrt{3}}{1 - 2\sqrt{3} + 3 + 1 - \sqrt{3} + 1} = \frac{\sqrt{3}}{6 - 3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3(2 - \sqrt{3})}.$$

$$\text{En rationalisant : } \frac{\sqrt{3}(2 + \sqrt{3})}{3(4 - 3)} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{3} = 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 2,155.$$

$$\text{Vérification numérique : } f(0,73) \approx \frac{1,73}{0,53 - 0,73 + 1} \approx \frac{1,73}{0,80} \approx 2,16. \checkmark$$

Corrigé

1. On dérive $f(x) = x^2 - 4x + 3$:

$$f'(x) = 2x - 4$$

2. On résout $f'(x) = 0$:

$$2x - 4 = 0 \iff x = 2$$

3. On étudie le signe de $f'(x) = 2(x - 2)$:

- ▶ Si $x < 2$: $x - 2 < 0$, donc $f'(x) < 0$: f est décroissante.
- ▶ Si $x > 2$: $x - 2 > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est croissante.

Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$

f admet un **minimum** en $x = 2$, avec $f(2) = 4 - 8 + 3 = \boxed{-1}$.

Corrigé

1. On dérive $g(x) = -x^2 + 6x - 5$:

$$g'(x) = -2x + 6$$

2. On résout $g'(x) = 0$:

$$-2x + 6 = 0 \iff x = 3$$

3. On étudie le signe de $g'(x) = -2(x - 3)$:

- ▶ Si $x < 3$: $-(x - 3) > 0$, donc $g'(x) > 0$: g est croissante.
- ▶ Si $x > 3$: $-(x - 3) < 0$, donc $g'(x) < 0$: g est décroissante.

Tableau de variations de g :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$g'(x)$		+	-
g	$-\infty$	$\nearrow$ 4 $\searrow$	$-\infty$

g admet un **maximum** en $x = 3$, avec $g(3) = -9 + 18 - 5 = \boxed{4}$.

Corrigé

1. On dérive $h(x) = x^3 - 3x$:

$$h'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$$

2. On résout $h'(x) = 0$:

$$3(x - 1)(x + 1) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = 1$$

Signe de $h'(x) = 3(x + 1)(x - 1)$:

- ▶ Si $x < -1$: $(x + 1) < 0$ et $(x - 1) < 0$, donc $h'(x) > 0$.
- ▶ Si $-1 < x < 1$: $(x + 1) > 0$ et $(x - 1) < 0$, donc $h'(x) < 0$.
- ▶ Si $x > 1$: $(x + 1) > 0$ et $(x - 1) > 0$, donc $h'(x) > 0$.

3. Tableau de variations de h :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$h'(x)$		+	-	+
h	$-\infty$	$\nearrow$ 2 $\searrow$	-2 $\nearrow$	$+\infty$

avec $h(-1) = -1 + 3 = 2$ et $h(1) = 1 - 3 = -2$.

Corrigé

1. On dérive $k(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$:

$$k'(x) = 6x^2 - 18x + 12$$

2. On résout $k'(x) = 0$, c'est-à-dire $6x^2 - 18x + 12 = 0$, soit $x^2 - 3x + 2 = 0$ (en divisant par 6).

Discriminant : $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$, donc :

$$x_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3+1}{2} = 2$$

3. Signe de $k'(x) = 6(x - 1)(x - 2)$:

- ▶ $x < 1 : k'(x) > 0$ (k croissante).
- ▶ $1 < x < 2 : k'(x) < 0$ (k décroissante).
- ▶ $x > 2 : k'(x) > 0$ (k croissante).

Tableau de variations de k :

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$k'(x)$		+	0 -	0 +
k	$-\infty$	$\nearrow$ 5	$\searrow$ 4	$\nearrow +\infty$

avec $k(1) = 2 - 9 + 12 = 5$ et $k(2) = 16 - 36 + 24 = 4$.

Corrigé

1. On dérive $T(t) = -t^2 + 8t + 5$:

$$T'(t) = -2t + 8$$

On résout $T'(t) = 0$:

$$-2t + 8 = 0 \Leftrightarrow t = 4$$

Ainsi $t_0 = 4 \in [0; 10]$.

2. Signe de $T'(t) = -2(t - 4)$:

- ▶ Pour $t < 4 : T'(t) > 0$, la température est en hausse.
- ▶ Pour $t > 4 : T'(t) < 0$, la température est en baisse.

Tableau de variations de T sur $[0; 10]$:

t	0	4	10
$T'(t)$		+	0 -
T	5	$\nearrow$ 21	$\searrow$ -15

3. Le maximum est atteint en $t = 4$, c'est-à-dire à 6 h + 4 h = 10 h du matin. La température maximale est :

$$T(4) = -16 + 32 + 5 = \boxed{21^\circ\text{C}}$$

4. La température est en hausse sur $[0; 4]$, c'est-à-dire de 6 h à 10 h. Elle est en baisse sur $[4; 10]$, c'est-à-dire de 10 h à 16 h.

Corrigé

1. On dérive $B(x) = -2x^2 + 20x - 18$:

$$B'(x) = -4x + 20$$

On résout $B'(x) = 0$:

$$-4x + 20 = 0 \Leftrightarrow x = 5$$

2. Signe de $B'(x) = -4(x - 5)$:

- ▶ Pour $x < 5 : B'(x) > 0$, le bénéfice croît.
- ▶ Pour $x > 5 : B'(x) < 0$, le bénéfice décroît.

Tableau de variations de B sur $[1; 9]$:

x	1	5	9
$B'(x)$		+	0 -
B	0	$\nearrow$ 32	$\searrow$ 0

3. Pour une production de 500 unités ($x = 5$), le bénéfice est maximal :

$$B(5) = -2 \times 25 + 100 - 18 = -50 + 100 - 18 = \boxed{32\,000\text{€}}$$

4. $B(1) = -2 + 20 - 18 = 0$. Cela signifie qu'avec une production de 100 unités, le bénéfice est nul : l'entreprise est à l'équilibre (ni bénéfice, ni perte). De même $B(9) = 0$.

Corrigé

1. La hauteur initiale est $h(0) = -5 \times 0 + 20 \times 0 + 1 = \boxed{1 \text{ m}}$.

2. On dérive $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$:

$$h'(t) = -10t + 20$$

On résout $h'(t) = 0$ sur $[0; 4]$:

$$-10t + 20 = 0 \iff t = 2$$

Ainsi $t_0 = 2 \in [0; 4]$.

3. Signe de $h'(t) = -10(t - 2)$:

- Pour $0 \leq t < 2$: $h'(t) > 0$, l'objet monte.
- Pour $2 < t \leq 4$: $h'(t) < 0$, l'objet redescend.

Tableau de variations de h sur $[0; 4]$:

t	0	2	4
$h'(t)$		+	0 -
h	1	$\nearrow$ 21	$\searrow$ 1

4. L'objet atteint sa hauteur maximale à $t = 2$ secondes. Cette hauteur vaut :

$$h(2) = -5 \times 4 + 20 \times 2 + 1 = -20 + 40 + 1 = \boxed{21 \text{ m}}$$

Corrigé

1. On dérive $C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$:

$$C'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

On résout $C'(x) = 0$: discriminant $\Delta = 144 - 108 = 36$, donc :

$$x_1 = \frac{12 - 6}{6} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{12 + 6}{6} = 3$$

D'où $C'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$.

2. Signe de $C'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$ sur $[0; 5]$:

- $0 \leq x < 1$: $C'(x) > 0$ (croissant).
- $1 < x < 3$: $C'(x) < 0$ (décroissant).
- $3 < x \leq 5$: $C'(x) > 0$ (croissant).

Tableau de variations de C sur $[0; 5]$:

x	0	1	3	5
$C'(x)$		+	0 -	0 +
C	2	$\nearrow$ 6	$\searrow$ 2	$\nearrow$ 12

3. $C(1) = 1 - 6 + 9 + 2 = 6$ (maximum local) et $C(3) = 27 - 54 + 27 + 2 = 2$ (minimum local).

En contexte : pour 1 lot fabriqué, le coût est maximal localement à 600 €; pour 3 lots, il atteint son minimum local à 200 €.

4. Le coût de production est décroissant sur $[1; 3]$: augmenter la production de 1 à 3 lots réduit le coût grâce aux économies d'échelle.

Corrigé

1. On dérive $f_a(x) = x^3 - 3ax$:

$$f'_a(x) = 3x^2 - 3a$$

2. Cas $a \leq 0$.

On a $-3a \geq 0$, donc $f'_a(x) = 3x^2 - 3a = 3x^2 + 3|a| \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

La dérivée est positive (ou nulle) sur $\mathbb{R}$: d'après le théorème liant signe de la dérivée et sens de variation, f_a est **croissante** sur $\mathbb{R}$.

3. Cas $a > 0$.

On résout $f'_a(x) = 0$, c'est-à-dire $3x^2 = 3a$, soit $x^2 = a$, d'où :

$$x = -\sqrt{a} \quad \text{ou} \quad x = \sqrt{a}$$

Signe de $f'_a(x) = 3(x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a})$:

x	$-\infty$	$-\sqrt{a}$	$\sqrt{a}$	$+\infty$			
$f'_a(x)$		+	0	-	0	+	
f_a	$-\infty$	$\nearrow$	$2a\sqrt{a}$	$\searrow$	$-2a\sqrt{a}$	$\nearrow$	$+\infty$

avec $f_a(-\sqrt{a}) = -a\sqrt{a} + 3a\sqrt{a} = 2a\sqrt{a}$ et $f_a(\sqrt{a}) = a\sqrt{a} - 3a\sqrt{a} = -2a\sqrt{a}$.

4. Cas particulier $a = 3$.

$\sqrt{3} \approx 1,73$. Les points stationnaires sont $x = -\sqrt{3}$ et $x = \sqrt{3}$.

$f_3(-\sqrt{3}) = 2 \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ et $f_3(\sqrt{3}) = -6\sqrt{3}$.

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$+\infty$			
$f_3'(x)$		+	0	-	0	+	
f_3	$-\infty$	$\nearrow$	$6\sqrt{3}$	$\searrow$	$-6\sqrt{3}$	$\nearrow$	$+\infty$

Corrigé

1. On dérive $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$:

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2) = 6(x + 1)(x - 2)$$

On vérifie : $(x + 1)(x - 2) = x^2 - x - 2 \checkmark$.

2. Signe de $f'(x) = 6(x + 1)(x - 2)$:

- ▶ $x < -1$: $(x + 1) < 0$, $(x - 2) < 0$, donc $f'(x) > 0$ (f croissante).
- ▶ $-1 < x < 2$: $(x + 1) > 0$, $(x - 2) < 0$, donc $f'(x) < 0$ (f décroissante).
- ▶ $x > 2$: $(x + 1) > 0$, $(x - 2) > 0$, donc $f'(x) > 0$ (f croissante).

Tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	11	$\searrow$	-16	$\nearrow$	$+\infty$

avec $f(-1) = -2 - 3 + 12 + 4 = 11$ et $f(2) = 16 - 12 - 24 + 4 = -16$.

3. Preuve de décroissance sur $[-1; 2]$.

Soient $x_1, x_2 \in [-1; 2]$ avec $x_1 < x_2$.

D'après le tableau de variations, $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in [-1; 2]$ (avec $f'(x) = 0$ seulement aux bornes -1 et 2). Le théorème fondamental — si f' est négative sur un intervalle alors f est décroissante sur cet intervalle — conclut directement que $f(x_1) > f(x_2)$: f est strictement décroissante sur $[-1; 2]$.

4. L'inéquation $f'(x) \geq 0$ équivaut à $6(x+1)(x-2) \geq 0$, soit :

$$x \leq -1 \quad \text{ou} \quad x \geq 2$$

L'ensemble solution est $]-\infty; -1] \cup [2; +\infty[$.

Corrigé

1. On calcule la dérivée de $f(x) = x^2 - 6x + 8$:

$$f'(x) = 2x - 6$$

On résout $f'(x) = 0$:

$$2x - 6 = 0 \iff x = 3$$

2. On vérifie le changement de signe de $f'(x) = 2(x - 3)$:

- Pour $x < 3$: $x - 3 < 0$, donc $f'(x) < 0$.
- Pour $x > 3$: $x - 3 > 0$, donc $f'(x) > 0$.

La dérivée change de signe de $-$ à $+$ en $x = 3$.

3. Puisque f' passe de négative à positive en $x = 3$, f admet un **minimum** en $x = 3$.

La valeur minimale est :

$$f(3) = 9 - 18 + 8 = \boxed{-1}$$

Corrigé

1. On calcule la dérivée de $g(x) = -x^2 + 4x + 1$:

$$g'(x) = -2x + 4$$

On résout $g'(x) = 0$:

$$-2x + 4 = 0 \iff x = 2$$

Le point stationnaire de g est $x = 2$.

2. Signe de $g'(x) = -2(x - 2)$:

- Pour $x < 2$: $-(x - 2) > 0$, donc $g'(x) > 0$.
- Pour $x > 2$: $-(x - 2) < 0$, donc $g'(x) < 0$.

La dérivée change de signe de $+$ à $-$ en $x = 2$.

3. Puisque g' passe de positive à négative en $x = 2$, g admet un **maximum** en $x = 2$.

La valeur maximale est :

$$g(2) = -4 + 8 + 1 = \boxed{5}$$

Corrigé

1. On dérive $f(x) = x^3 - 3x^2$:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

2. On résout $f'(x) = 0$:

$$3x(x - 2) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 2$$

Signe de $f'(x) = 3x(x - 2)$:

- $x < 0$: $x < 0$ et $x - 2 < 0$, donc $f'(x) > 0$.
- $0 < x < 2$: $x > 0$ et $x - 2 < 0$, donc $f'(x) < 0$.
- $x > 2$: $x > 0$ et $x - 2 > 0$, donc $f'(x) > 0$.

3. Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
f	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

f admet un **maximum local** en $x = 0$ de valeur $f(0) = \boxed{0}$.

f admet un **minimum local** en $x = 2$ de valeur $f(2) = 8 - 12 = \boxed{-4}$.

Corrigé

1. On dérive $p(x) = x^3 - 12x + 5$:

$$p'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2)$$

On résout $p'(x) = 0$:

$$3(x - 2)(x + 2) = 0 \iff x = -2 \text{ ou } x = 2$$

2. Signe de $p'(x) = 3(x + 2)(x - 2)$:

- ▶ $x < -2$: $(x + 2) < 0$, $(x - 2) < 0$, donc $p'(x) > 0$ (croissant).
- ▶ $-2 < x < 2$: $(x + 2) > 0$, $(x - 2) < 0$, donc $p'(x) < 0$ (décroissant).
- ▶ $x > 2$: $(x + 2) > 0$, $(x - 2) > 0$, donc $p'(x) > 0$ (croissant).

Tableau de variations de p :

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$			
$p'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
p	$-\infty$	$\nearrow$	21	$\searrow$	-11	$\nearrow$	$+\infty$

3. p admet un **maximum local** en $x = -2$ de valeur :

$$p(-2) = -8 + 24 + 5 = \boxed{21}$$

p admet un **minimum local** en $x = 2$ de valeur :

$$p(2) = 8 - 24 + 5 = \boxed{-11}$$

Corrigé

1. On dérive $R(x) = -3x^2 + 60x$:

$$R'(x) = -6x + 60$$

On résout $R'(x) = 0$:

$$-6x + 60 = 0 \iff x = 10$$

Le prix $x_0 = 10$ € annule R' .

2. Signe de $R'(x) = -6(x - 10)$:

- ▶ Pour $x < 10$: $R'(x) > 0$ (le chiffre d'affaires augmente avec le prix).
- ▶ Pour $x > 10$: $R'(x) < 0$ (le chiffre d'affaires diminue si le prix est trop élevé).

La dérivée change de signe de + à - en $x_0 = 10$: changement de signe vérifié.

3. Puisque R' passe de + à - en $x_0 = 10$, R admet un **maximum** en $x = 10$.

Le chiffre d'affaires maximal est :

$$R(10) = -3 \times 100 + 600 = -300 + 600 = \boxed{300 \text{ €}}$$

4. Le commerçant doit fixer le prix unitaire à $\boxed{10 \text{ €}}$ pour maximiser son chiffre d'affaires, qui atteint alors 300 €.

Corrigé

1. On développe $A(x) = x(10 - x)$:

$$A(x) = -x^2 + 10x$$

On dérive :

$$A'(x) = -2x + 10$$

2. On résout $A'(x) = 0$:

$$-2x + 10 = 0 \iff x = 5$$

Signe de $A'(x) = -2(x - 5)$:

- Pour $x < 5$: $A'(x) > 0$ (croissant).
- Pour $x > 5$: $A'(x) < 0$ (décroissant).

La dérivée change bien de signe de + à - en $x = 5$.

3. Puisque A' passe de + à - en $x = 5$, A est **maximale** pour $x = 5$. La longueur du premier morceau doit être de 5 m (et le second fait $10 - 5 = 5$ m).

4. L'aire maximale est :

$$A(5) = 5 \times (10 - 5) = 5 \times 5 = \boxed{25 \text{ m}^2}$$

Corrigé

1. On développe $V(x) = x(8 - 2x)^2$:

$$V(x) = x(64 - 32x + 4x^2) = 4x^3 - 32x^2 + 64x$$

2. On dérive :

$$V'(x) = 12x^2 - 64x + 64 = 4(3x^2 - 16x + 16)$$

On résout $3x^2 - 16x + 16 = 0$ (discriminant $\Delta = 256 - 192 = 64$) :

$$x = \frac{16 - 8}{6} = \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{16 + 8}{6} = 4$$

Sur $]0; 4[$, la seule solution est $x = \frac{4}{3}$.

3. Signe de $V'(x) = 4(3x - 4)(x - 4)$ sur $]0; 4[$:

- Pour $0 < x < \frac{4}{3}$: $(3x - 4) < 0$, $(x - 4) < 0$, donc $V'(x) > 0$ (croissant).
- Pour $\frac{4}{3} < x < 4$: $(3x - 4) > 0$, $(x - 4) < 0$, donc $V'(x) < 0$ (décroissant).

Tableau de variations de V sur $]0; 4[$:

x	0	$\frac{4}{3}$	4
$V'(x)$		+	-
V	0	$\nearrow \frac{1024}{27}$	$\searrow 0$

V est maximale pour $x = \frac{4}{3}$ cm.

4. Le volume maximal est :

$$V\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3} \left(8 - \frac{8}{3}\right)^2 = \frac{4}{3} \times \left(\frac{16}{3}\right)^2 = \frac{4}{3} \times \frac{256}{9} = \boxed{\frac{1024}{27} \approx 37,9 \text{ cm}^3}$$

Corrigé

1. On dérive $B(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 1$:

$$B'(x) = -3x^2 + 18x - 15 = -3(x^2 - 6x + 5) = -3(x - 1)(x - 5)$$

Vérification : $(x - 1)(x - 5) = x^2 - 6x + 5$, donc $-3(x - 1)(x - 5) = -3x^2 + 18x - 15 \checkmark$.

2. Signe de $B'(x) = -3(x - 1)(x - 5)$ sur $[0; 7]$:

- ▶ $0 \leq x < 1$: $(x-1) < 0$, $(x-5) < 0$, donc $B'(x) < 0$ (décroissant).
- ▶ $1 < x < 5$: $(x-1) > 0$, $(x-5) < 0$, donc $B'(x) > 0$ (croissant).
- ▶ $5 < x \leq 7$: $(x-1) > 0$, $(x-5) > 0$, donc $B'(x) < 0$ (décroissant).

Tableau de variations de B sur $[0; 7]$:

x	0	1	5	7			
$B'(x)$	−	0	+	0	−		
B	−1	↘	−8	↗	24	↘	10

avec $B(0) = -1$, $B(1) = -1 + 9 - 15 - 1 = -8$, $B(5) = -125 + 225 - 75 - 1 = 24$, $B(7) = -343 + 441 - 105 - 1 = -8$.

Correction : $B(7) = -343 + 441 - 105 - 1 = -8$.

3. Les extremums locaux sont :

- ▶ **Minimum local** en $x = 1$: $B(1) = \boxed{-8}$ (milliers d'euros).
- ▶ **Maximum local** en $x = 5$: $B(5) = \boxed{24}$ (milliers d'euros).

4. Le bénéfice est maximal pour une surface de 5 hectares cultivés. Le bénéfice maximal est de 24 000 €.

Corrigé

1. On dérive $f_k(x) = x^2 - 2kx + k$ par rapport à x (k est une constante) :

$$f'_k(x) = 2x - 2k$$

On résout $f'_k(x) = 0$:

$$2x - 2k = 0 \iff x = k$$

Le point stationnaire est $x_0(k) = k$.

2. On étudie le signe de $f'_k(x) = 2(x - k)$:

- ▶ Pour $x < k$: $f'_k(x) < 0$ (décroissant).
- ▶ Pour $x > k$: $f'_k(x) > 0$ (croissant).

La dérivée change de signe de $-$ à $+$ en $x = k$: f_k admet bien un **minimum** en $x_0(k) = k$.

3. La valeur minimale est :

$$m(k) = f_k(k) = k^2 - 2k \cdot k + k = k^2 - 2k^2 + k = -k^2 + k$$

4. On étudie $m(k) = -k^2 + k$ en tant que fonction de k :

$$m'(k) = -2k + 1$$

On résout $m'(k) = 0$:

$$-2k + 1 = 0 \iff k = \frac{1}{2}$$

Signe de $m'(k)$:

- ▶ Pour $k < \frac{1}{2}$: $m'(k) > 0$ (m croissante).
- ▶ Pour $k > \frac{1}{2}$: $m'(k) < 0$ (m décroissante).

La valeur minimale $m(k)$ est **maximale** pour $k = \frac{1}{2}$:

$$m\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

C'est pour $k = \frac{1}{2}$ que le minimum de f_k est le plus grand possible, avec un minimum valant $\frac{1}{4}$.

Corrigé

1. De $x^2h = 500$, on tire :

$$h = \frac{500}{x^2}$$

2. La surface totale comprend la base (x^2) et quatre faces latérales (chacune de dimensions $x \times h$) :

$$S(x) = x^2 + 4 \times x \times h = x^2 + 4x \times \frac{500}{x^2} = x^2 + \frac{2000}{x}$$

3. On dérive (en utilisant le fait que la dérivée de $\frac{1}{x}$ est $-\frac{1}{x^2}$) :

$$S'(x) = 2x - \frac{2000}{x^2}$$

On résout $S'(x) = 0$ sur $]0; +\infty[$:

$$2x = \frac{2000}{x^2} \Leftrightarrow 2x^3 = 2000 \Leftrightarrow x^3 = 1000 \Leftrightarrow x = 10$$

4. Signe de $S'(x) = \frac{2x^3 - 2000}{x^2} = \frac{2(x^3 - 1000)}{x^2}$:

► Pour $0 < x < 10$: $x^3 < 1000$, donc $S'(x) < 0$ (S décroissante).

► Pour $x > 10$: $x^3 > 1000$, donc $S'(x) > 0$ (S croissante).

Tableau de variations de S sur $]0; +\infty[$:

x	0	10	$+\infty$
$S'(x)$		- 0 +	
S	$+\infty$	$\searrow$ 300 $\nearrow$	$+\infty$

S admet un **minimum** en $x = 10$. Les dimensions optimales sont :

$$x = 10 \text{ cm}, \quad h = \frac{500}{100} = 5 \text{ cm}$$

La surface minimale est :

$$S(10) = 100 + \frac{2000}{10} = 100 + 200 = \boxed{300 \text{ cm}^2}$$

5. On calcule la dérivée seconde. On a $S'(x) = 2x - 2000x^{-1}$, donc :

$$S''(x) = 2 + \frac{4000}{x^3}$$

Pour tout $x > 0$, les deux termes sont strictement positifs, donc $S''(x) > 0$. Cela confirme que le point stationnaire $x = 10$ est bien un minimum.

Corrigé

1. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = -2x + 6.$$

2. On résout $f'(x) = 0$:

$$-2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3.$$

$f'(x) > 0$ pour $x < 3$ et $f'(x) < 0$ pour $x > 3$.

Tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$		+ 0 -	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ 4 $\searrow$	$-\infty$

3. f' change de signe de + à - en $x = 3$, donc f admet un **maximum** en $x = 3$. Ce maximum vaut $f(3) = -9 + 18 - 5 = \boxed{4}$.

Corrigé

1. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 4x - 8.$$

2. On résout $f'(x) = 0$:

$$4x - 8 = 0 \iff x = 2.$$

$f'(x) < 0$ pour $x < 2$ et $f'(x) > 0$ pour $x > 2$.

Tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$ -5 <i>arrow</i>	$+\infty$

3. f' change de signe de - à + en $x = 2$, donc f admet un **minimum** en $x = 2$. Ce minimum vaut $f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 3 = 8 - 16 + 3 = \boxed{-5}$.

Corrigé

1. La clôture disponible mesure 20 m. Les deux côtés perpendiculaires au mur consomment $2x$ m, donc le côté parallèle au mur mesure $20 - 2x$ m. La largeur de l'enclos (côté parallèle au mur) est donc $\ell = 20 - 2x$.

Remarque : pour que l'enclos soit non dégénéré, on doit avoir $\ell > 0$, soit $x < 10$, et $x > 0$, d'où $x \in]0; 10[$.

2. L'aire vaut longueur $\times$ largeur :

$$A(x) = x \times (20 - 2x) = 20x - 2x^2.$$

On peut aussi écrire $A(x) = 2x(10 - x)$. [Note : la forme $x(10 - x)$ correspond à la moitié de la clôture totale allouée à la largeur ; dans l'énoncé, avec 20 m et un côté libre, la formule exacte est $A(x) = x(20 - 2x)$.]

Vérification de la formule demandée par l'énoncé : si on pose $L = 10 - x$ (la demi-largeur allouée par mètre de clôture), on obtient $A(x) = x(10 - x)$, ce qui correspond à la lecture de l'énoncé avec la contrainte $x + \ell = 10$ (soit 20 m répartis comme $x + x + \ell = 20$, donc $\ell = 20 - 2x$ ou, en notant $y = 10 - x$, $A = xy = x(10 - x)$).

3. On calcule la dérivée de $A(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$:

$$A'(x) = 10 - 2x.$$

On résout $A'(x) = 0$: $10 - 2x = 0 \iff x = 5$.

Signe de $A'(x)$: $A'(x) > 0$ pour $x < 5$ et $A'(x) < 0$ pour $x > 5$.

Tableau de variations de A sur $]0; 10[$:

x	0	5	10
$A'(x)$		+	0 -
$A(x)$	0 <i>arrow</i>	25 $\searrow$	0

4. A' change de signe de + à - en $x = 5$: l'aire est maximale pour $x = \boxed{5}$ m.

L'aire maximale vaut $A(5) = 5 \times (10 - 5) = \boxed{25}$ m².

Corrigé

1. La contrainte de volume donne $x^2h = 32$, d'où :

$$h = \frac{32}{x^2} \quad (x > 0).$$

2. La surface totale comprend la base carrée (x^2) et les 4 faces latérales (chacune de dimensions $x \times h$) :

$$S(x) = x^2 + 4xh = x^2 + 4x \cdot \frac{32}{x^2} = x^2 + \frac{128}{x}.$$

3. On dérive :

$$S'(x) = 2x - \frac{128}{x^2}.$$

On résout $S'(x) = 0$:

$$2x = \frac{128}{x^2} \Leftrightarrow 2x^3 = 128 \Leftrightarrow x^3 = 64 \Leftrightarrow x = 4.$$

4. Signe de $S'(x)$: $S'(x) < 0$ pour $0 < x < 4$ et $S'(x) > 0$ pour $x > 4$.

Tableau de variations de S sur $]0; +\infty[$:

x	0	4	$+\infty$
$S'(x)$		- 0 +	
$S(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 48 $\nearrow$	$+\infty$

S' change de signe de $-$ à $+$ en $x = 4$: la surface est minimale pour $x = \boxed{4}$ cm.

La hauteur optimale est $h = \frac{32}{16} = \boxed{2}$ cm.

La surface minimale vaut $S(4) = 16 + 32 = \boxed{48}$ cm².

Corrigé

1. Le triangle a sa base sur un diamètre (longueur $2x$) et son sommet S sur le demi-cercle. L'angle inscrit dans un demi-cercle étant droit, l'angle en S est droit. Par Pythagore dans le triangle rectangle en S :

$$(2x)^2 = (x + OS)^2 + h^2 \quad [\text{non recommandé}]$$

Plus simplement : le sommet est à distance $\sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{25 - x^2}$ du diamètre, donc la hauteur du triangle vaut $h = \sqrt{25 - x^2}$.

2. L'aire du triangle (base = $2x$, hauteur = h) est :

$$A(x) = \frac{1}{2} \times 2x \times \sqrt{25 - x^2} = x\sqrt{25 - x^2}.$$

3. On pose $u = 25 - x^2$, donc $u' = -2x$. Avec la règle de dérivation :

$$A'(x) = \sqrt{25 - x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{25 - x^2}} = \sqrt{25 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{25 - x^2 - x^2}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{25 - 2x^2}{\sqrt{25 - x^2}}.$$

4. Sur $]0; 5[$, le dénominateur $\sqrt{25 - x^2} > 0$. On résout $25 - 2x^2 = 0$:

$$x^2 = \frac{25}{2} \Rightarrow x = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3,54.$$

$A'(x) > 0$ pour $x < \frac{5\sqrt{2}}{2}$ et $A'(x) < 0$ pour $x > \frac{5\sqrt{2}}{2}$: c'est bien un maximum.

5. La demi-base optimale est $x^* = \frac{5\sqrt{2}}{2}$, donc la base vaut $2x^* = 5\sqrt{2}$ cm. La hauteur est $h^* = \sqrt{25 - \frac{25}{2}} = \sqrt{\frac{25}{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ cm.

Comme $h^* = x^*$, les deux côtés perpendiculaires du triangle rectangle sont égaux : **le triangle est isocèle rectangle**.

L'aire maximale est :

$$A\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{5\sqrt{2}}{2} \times \frac{5\sqrt{2}}{2} = \frac{25 \times 2}{4} = \boxed{\frac{25}{2} = 12,5 \text{ cm}^2}.$$

Corrigé

1. Par similitude, le triangle axial du cône (hauteur 9, rayon 6) et celui du cylindre (hauteur h , rayon $6 - x$... non, rayon x) donnent par Thalès : la section du cône à la hauteur h a un rayon $r_h = 6\left(1 - \frac{h}{9}\right)$.

Comme le bord du cylindre touche le cône : $x = 6\left(1 - \frac{h}{9}\right)$, d'où

$$1 - \frac{h}{9} = \frac{x}{6} \Rightarrow h = 9\left(1 - \frac{x}{6}\right) = 9 - \frac{3x}{2}.$$

2. Le volume du cylindre est $V = \pi x^2 h$:

$$V(x) = \pi x^2 \left(9 - \frac{3x}{2}\right) = \pi \left(9x^2 - \frac{3x^3}{2}\right).$$

3. On dérive :

$$V'(x) = \pi \left(18x - \frac{9x^2}{2}\right) = \frac{9\pi x}{2}(4 - x).$$

On résout $V'(x) = 0$ sur $]0; 6[$: $\frac{9\pi x}{2}(4 - x) = 0$. $x = 0$ est hors du domaine ouvert, donc la seule solution est $x = 4$.

4. $V'(x) > 0$ pour $0 < x < 4$ et $V'(x) < 0$ pour $4 < x < 6$.

Tableau de variations de V sur $]0; 6[$:

x	0	4	6		
$V'(x)$		+	0	-	
$V(x)$	0	$\nearrow$	48π	$\searrow$	0

5. V' change de signe de + à - en $x = 4$: c'est un maximum global sur $]0; 6[$.

La hauteur optimale est $h = 9 - \frac{3 \times 4}{2} = 9 - 6 = 3$ cm.

Le volume maximal est $V(4) = \pi \times 16 \times 3 = \boxed{48\pi \approx 150,8 \text{ cm}^3}$.

On confirme avec $V''(4) = \pi(18 - 9 \times 4) = \pi(18 - 36) = -18\pi < 0$: c'est bien un maximum.

Corrigé

1. On vérifie : $x^{3/2} - 3x^{-1/2} = x^{3/2} - \frac{3}{x^{1/2}} = \frac{x^2 - 3}{\sqrt{x}}$ (en multipliant numérateur et dénominateur par $\sqrt{x}$). Les deux expressions coïncident bien pour tout $x > 0$.

2. On dérive terme à terme en utilisant $(x^n)' = nx^{n-1}$:

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2} + \frac{3}{2}x^{-3/2}.$$

On factorise par $\frac{3}{2x^{3/2}}$:

$$f'(x) = \frac{3}{2x^{3/2}}(x^{1/2} \cdot x^{3/2} + x^{-3/2} \cdot x^{3/2}) = \frac{3}{2x^{3/2}}(x^2 + 1) = \frac{3(x^2 + 1)}{2x^{3/2}}.$$

3. Pour tout $x > 0$: $x^2 + 1 > 0$ et $x^{3/2} > 0$, donc $f'(x) > 0$. f est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

4. Comportement aux bornes :

- ▶ Quand $x \rightarrow 0^+ : x^{-1/2} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.
- ▶ Quand $x \rightarrow +\infty : x^{3/2} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

Tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$:

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

$$5. f(1) = 1 - 3 = \boxed{-2} \text{ et } f(4) = 4^{3/2} - 3 \times 4^{-1/2} = 8 - \frac{3}{2} = \boxed{\frac{13}{2}}.$$

Ces valeurs sont cohérentes avec la stricte croissance : $f(1) = -2 < f(4) = 6,5$. Comme f est continue et strictement croissante de $-\infty$ à $+\infty$, f admet un unique zéro sur $]0; +\infty[$ (entre $x = 1$ et $x = 4$, car $f(1) < 0 < f(4)$).

Corrigé

1. On pose $u = x^2 - 2x + 4$ et $v = x - 1$, d'où $u' = 2x - 2$ et $v' = 1$. La règle du quotient donne :

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{(2x - 2)(x - 1) - (x^2 - 2x + 4)}{(x - 1)^2}.$$

On développe le numérateur :

$$(2x - 2)(x - 1) - (x^2 - 2x + 4) = 2x^2 - 4x + 2 - x^2 + 2x - 4 = x^2 - 2x - 2.$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}.$$

2. On résout $x^2 - 2x - 2 = 0$: $\Delta = 4 + 8 = 12$.

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Les deux racines sont $x_1 = 1 - \sqrt{3} \approx -0,73$ et $x_2 = 1 + \sqrt{3} \approx 2,73$.

3. Le dénominateur $(x - 1)^2 > 0$ pour $x \neq 1$. Le numérateur $x^2 - 2x - 2 = (x - x_1)(x - x_2)$ est :

- ▶ positif sur $] -\infty ; x_1[$ et sur $]x_2 ; +\infty[$,
- ▶ négatif sur $]x_1 ; 1[$ et sur $]1 ; x_2[$.

4. Tableau de variations de f sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$:

x	$-\infty$	x_1	1	x_2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$f(x_1)$	$-\infty$	$f(x_2)$	$+\infty$

5. f admet un **maximum local** en $x_1 = 1 - \sqrt{3}$:

$$f(x_1) = \frac{(1 - \sqrt{3})^2 - 2(1 - \sqrt{3}) + 4}{-\sqrt{3}} = \frac{1 - 2\sqrt{3} + 3 - 2 + 2\sqrt{3} + 4}{-\sqrt{3}} = \frac{6}{-\sqrt{3}} = -2\sqrt{3}.$$

f admet un **minimum local** en $x_2 = 1 + \sqrt{3}$:

$$f(x_2) = \frac{(1 + \sqrt{3})^2 - 2(1 + \sqrt{3}) + 4}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}.$$

Les extremums locaux valent $\boxed{f(x_1) = -2\sqrt{3}}$ (maximum local) et $\boxed{f(x_2) = 2\sqrt{3}}$ (minimum local).

Corrigé

1. La recette est $R(x) = x \cdot p(x) = x(50 - x) = 50x - x^2$.

2. Le profit vaut :

$$\begin{aligned} P(x) &= R(x) - C(x) = 50x - x^2 - \frac{x^2}{4} - 5x - 20 \\ &= -x^2 - \frac{x^2}{4} + 45x - 20 = -\frac{5x^2}{4} + 45x - 20. \end{aligned}$$

3. On dérive :

$$P'(x) = -\frac{5}{2}x + 45.$$

$$P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{45 \times 2}{5} = 18.$$

$P'(x) > 0$ pour $x < 18$ et $P'(x) < 0$ pour $x > 18$.

4. Tableau de variations de P sur $[0; 40]$:

x	0	18	40		
$P'(x)$		+	0	-	
$P(x)$	-20	$\nearrow$	385	$\searrow$	-300

$$(P(0) = -20, P(40) = -\frac{5 \times 1600}{4} + 45 \times 40 - 20 = -2000 + 1800 - 20 = -220.)$$

5. Le profit est maximal pour $x^* = 18$ unités.

Le profit maximal est :

$$P(18) = -\frac{5 \times 324}{4} + 45 \times 18 - 20 = -405 + 810 - 20 = 385 \text{ euros}.$$

On vérifie : $P''(x) = -\frac{5}{2} < 0$ pour tout x , donc en particulier en $x^* = 18$, ce qui confirme que c'est bien un maximum (la parabole est tournée vers le bas).

Corrigé

1. On dérive terme à terme :

$$v(t) = s'(t) = \frac{3t^2}{3} - 4 \times 2t + 12 = t^2 - 8t + 12.$$

2. On factorise $v(t) = t^2 - 8t + 12$. Le discriminant est $\Delta = 64 - 48 = 16$, d'où :

$$t = \frac{8 \pm 4}{2}, \text{ soit } t_1 = 2 \text{ et } t_2 = 6.$$

Donc $v(t) = (t - 2)(t - 6)$.

Les solutions de $v(t) = 0$ sur $[0; 6]$ sont $t = 2$ et $t = 6$.

3. Signe de $v(t) = (t - 2)(t - 6)$:

- ▶ $v(t) > 0$ pour $0 \leq t < 2$ (le mobile avance).
- ▶ $v(t) < 0$ pour $2 < t < 6$ (le mobile recule).
- ▶ $v(6) = 0$ (le mobile est instantanément arrêté).

Tableau de variations de s sur $[0; 6]$:

t	0	2	6		
$v(t)$		+	0	−	
$s(t)$	0	$\nearrow$	$\frac{32}{3}$	$\searrow$	0

$$4. s(0) = 0, s(2) = \frac{8}{3} - 16 + 24 = \frac{8}{3} + 8 = \frac{32}{3} \approx 10,67 \text{ m}, s(6) = \frac{216}{3} - 144 + 72 = 72 - 144 + 72 = 0 \text{ m}.$$

La position maximale est $\frac{32}{3} \approx 10,7 \text{ m}$, atteinte à $t = 2 \text{ s}$.

5. Oui, le mobile revient à son point de départ. En $t = 6 \text{ s}$, on a $s(6) = 0 = s(0)$: le mobile est revenu exactement à sa position initiale. Le tableau de variations confirme que s est décroissante sur $[2; 6]$, passant de $\frac{32}{3}$ à 0 : le mobile revient bien à l'origine avant $t = 6 \text{ s}$ (et exactement en $t = 6 \text{ s}$).

Corrigé

Chaque fonction est définie sur $\mathbb{R}$, domaine symétrique par rapport à 0.

1. Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = 3(-x)^2 - 5 = 3x^2 - 5 = f(x).$$

Donc f est **paire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2. Calculons $g(-x)$:

$$g(-x) = (-x)^3 + 2(-x) = -x^3 - 2x = -(x^3 + 2x) = -g(x).$$

Donc g est **impaire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

3. Calculons $h(-x)$:

$$h(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x.$$

On a $h(-x) = x^2 - x \neq x^2 + x = h(x)$ et $h(-x) = x^2 - x \neq -(x^2 + x) = -h(x)$.

Donc h n'est **ni paire ni impaire**.

Corrigé

1. Le taux de variation de f entre 0 et h ($h \neq 0$) est :

$$\tau(h) = \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h| - 0}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

► Si $h > 0$: $|h| = h$, donc $\tau(h) = \frac{h}{h} = 1$.

► Si $h < 0$: $|h| = -h$, donc $\tau(h) = \frac{-h}{h} = -1$.

2. Quand $h \rightarrow 0^+$, $\tau(h) \rightarrow 1$. Quand $h \rightarrow 0^-$, $\tau(h) \rightarrow -1$.

Les limites à gauche et à droite sont différentes ($1 \neq -1$), donc $\tau(h)$ n'a pas de limite en 0 : le nombre dérivé $f'(0)$ n'existe pas. La fonction f n'est **pas dérivable en 0**.

Graphiquement, la courbe de $|x|$ présente un point anguleux en $x = 0$.

3. La fonction $g(x) = |x - 2|$ se comporte comme $|u|$ avec $u = x - 2$. Le point « anguleux » se situe là où $u = 0$, c'est-à-dire en $x = 2$. Par le même raisonnement (taux de variation $\frac{|h|}{h}$ en $x = 2$), g n'est **pas dérivable en $x = 2$** .

4. Pour $x > 0$: $f(x) = |x| = x$, donc $f'(x) = 1$.

Pour $x < 0$: $f(x) = |x| = -x$, donc $f'(x) = -1$.

Corrigé

On applique la formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

1. $f(x) = x^{-2}$, donc $n = -2$:

$$f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}.$$

2. $g(x) = x^{-3}$, donc $n = -3$:

$$g'(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}.$$

CHAPITRE 5

Fonction exponentielle

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais que la fonction exponentielle est l'unique fonction égale à sa dérivée valant 1 en 0.
- ▶ **C2** — Je sais utiliser les propriétés algébriques de l'exponentielle (somme, produit, puissance).
- ▶ **C3** — Je sais exploiter le signe, la croissance et la courbe de l'exponentielle, en lien avec les suites géométriques.
- ▶ **C4** — Je sais dériver la fonction $t \rightarrow e^{at}$ pour un réel a .
- ▶ **C5** — Je sais représenter et utiliser un modèle de croissance ou de décroissance exponentielle.

À RETENIR

La population d'une culture bactérienne double toutes les 20 minutes. Combien de bactéries y aura-t-il après 3 heures si l'on part de 1000 ? Comment modéliser cette croissance exponentielle ?

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

5.1 Définition de la fonction exponentielle

THÉORÈME Existence et unicité de la fonction exponentielle

Il existe une unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$f' = f \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle**, notée $\exp$.

DÉFINITION Fonction exponentielle

La **fonction exponentielle**, notée $\exp$, est l'unique fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\exp'(x) = \exp(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \exp(0) = 1.$$

◆ PROPRIÉTÉ Valeurs remarquables et signe

- ▶ $\exp(0) = 1$.
- ▶ $\exp(1) = e \approx 2,718$.
- ▶ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) > 0$.
- ▶ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) \neq 0$.

Approfondissement — Vers la Terminale

DÉMONSTRATION

Preuve que $\exp(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Posons $g(x) = \exp(x) \times \exp(-x)$. Calculons la dérivée de g à l'aide de la règle du produit :

$$g'(x) = \exp'(x) \cdot \exp(-x) + \exp(x) \cdot (\exp(-x))' = \exp(x) \cdot \exp(-x) + \exp(x) \cdot (-\exp(-x)) = 0.$$

Donc g est constante sur $\mathbb{R}$. Or $g(0) = \exp(0) \times \exp(0) = 1 \times 1 = 1$. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) \times \exp(-x) = 1$. En particulier, $\exp(x) \neq 0$ pour tout x . ■

DÉFINITION Nombre e

Le nombre $e = \exp(1) \approx 2,718\,28$ est appelé le **nombre d'Euler**. C'est un nombre irrationnel.

◆ **PROPRIÉTÉ Notation e^x** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on note $e^x = \exp(x)$.

Cette notation sera justifiée dans la section suivante par les propriétés algébriques de la fonction exponentielle.

EXEMPLE Calculer $\exp(0)$, $\exp(1)$ et vérifier que $\exp'(0) = \exp(0)$.

$\exp(0) = 1$. $\exp(1) = e \approx 2,718$. Comme $\exp' = \exp$, on a $\exp'(0) = \exp(0) = 1$. La tangente à la courbe de $\exp$ au point d'abscisse 0 a pour pente 1.

EXEMPLE La tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = \exp(a)(x - a) + \exp(a) = e^a(x - a + 1).$$

En $a = 0$: $y = 1 \cdot (x + 1) = x + 1$.

En $a = 1 : y = e(x - 1 + 1) = ex$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $\exp(0) = 0$. La condition initiale est $\exp(0) = 1$, et non 0. L'exponentielle ne s'annule jamais.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $e = 2,718$ exactement. Le nombre e est irrationnel : 2,718 n'est qu'une valeur approchée. En calcul exact, on laisse e .

⚠ CONTRE-EXEMPLE La fonction $f(x) = 2e^x$ vérifie $f' = f$ mais $f(0) = 2 \neq 1$. Elle n'est donc pas la fonction exponentielle. La condition $f(0) = 1$ est indispensable pour l'unicité.

Approfondissement — Vers la Terminale

+ POUR ALLER PLUS LOIN

La propriété $\exp' = \exp$ est une *équation différentielle* : $y' = y$. L'ensemble complet des solutions de cette équation est $\{x \mapsto Ce^x \mid C \in \mathbb{R}\}$. La condition initiale $y(0) = 1$ sélectionne l'unique solution $C = 1$, c'est-à-dire $y = \exp$.

5.2 Propriétés algébriques de la fonction exponentielle

THÉORÈME Relation fonctionnelle — Propriété admise dans le socle

Pour tous réels a et b :

$$\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b).$$

Approfondissement — Vers la Terminale : démonstration facultative

DÉMONSTRATION

Soit $a \in \mathbb{R}$ fixé. Posons $f(x) = \exp(x + a)$ et $g(x) = \exp(a) \times \exp(x)$.

Étape 1 : f et g vérifient la même équation différentielle.

$$f'(x) = \exp(x + a) = f(x) \quad (\text{car } \exp' = \exp).$$

$$g'(x) = \exp(a) \times \exp(x) = g(x) \quad (\text{car } \exp(a) \text{ est une constante et } \exp' = \exp).$$

Étape 2 : f et g ont la même valeur en 0.

$$f(0) = \exp(0 + a) = \exp(a).$$

$$g(0) = \exp(a) \times \exp(0) = \exp(a) \times 1 = \exp(a).$$

Conclusion. Considérons $h = \frac{f}{g}$. On a $g > 0$ sur $\mathbb{R}$ donc h est bien définie.

$$h'(x) = \frac{f'g - fg'}{g^2} = \frac{fg - fg}{g^2} = 0.$$

Donc h est constante, et $h(0) = \frac{f(0)}{g(0)} = 1$. Ainsi $f = g$ sur $\mathbb{R}$, c'est-à-dire :

$$\exp(x + a) = \exp(a) \times \exp(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

En posant $x = b$, on obtient $\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b)$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Conséquences algébriques** Pour tous réels a et b , et pour tout entier relatif n :

1. $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$
2. $\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$
3. $\exp(na) = [\exp(a)]^n$

Approfondissement — Vers la Terminale : démonstrations facultatives

DÉMONSTRATION

Preuve de $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$.

On applique la relation fonctionnelle avec $b = -a$:

$$\exp(a + (-a)) = \exp(a) \times \exp(-a), \quad \text{soit} \quad \exp(0) = \exp(a) \times \exp(-a).$$

Or $\exp(0) = 1$, donc $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$.

Preuve de $\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$.

$$\exp(a-b) = \exp(a + (-b)) = \exp(a) \times \exp(-b) = \exp(a) \times \frac{1}{\exp(b)} = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}.$$

Preuve de $\exp(na) = [\exp(a)]^n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Par récurrence : le cas $n = 0$ donne $\exp(0) = 1 = [\exp(a)]^0$. Si $\exp(na) = [\exp(a)]^n$, alors :

$$\exp((n+1)a) = \exp(na + a) = \exp(na) \times \exp(a) = [\exp(a)]^n \times \exp(a) = [\exp(a)]^{n+1}.$$

Le cas $n < 0$ se déduit de $\exp(na) = \frac{1}{\exp(-na)} = \frac{1}{[\exp(a)]^{-n}} = [\exp(a)]^n$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Justification de la notation e^x** La relation $\exp(na) = [\exp(a)]^n$ montre que l'exponentielle se comporte comme une puissance. En posant $a = 1$:

$$\exp(n) = [\exp(1)]^n = e^n.$$

On étend alors cette notation à tout réel x : $\exp(x) = e^x$.

EXEMPLE Simplifier $A = e^3 \times e^{-5}$.

On applique $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$:

$$A = e^{3+(-5)} = e^{-2}.$$

EXEMPLE Simplifier $B = \frac{e^7}{e^3}$.

$$B = e^{7-3} = e^4.$$

EXEMPLE Simplifier $C = (e^2)^4 \times e^{-3}$.

$$C = e^{2 \times 4} \times e^{-3} = e^8 \times e^{-3} = e^{8-3} = e^5.$$

EXEMPLE Simplifier $D = \frac{e^{2x+1} \times e^{3-x}}{e^{x+2}}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Au numérateur : $e^{2x+1} \times e^{3-x} = e^{(2x+1)+(3-x)} = e^{x+4}$.

Puis : $D = \frac{e^{x+4}}{e^{x+2}} = e^{(x+4)-(x+2)} = e^2$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $e^a \times e^b = e^{ab}$. L'exponentielle transforme une *somme* en produit : $e^a \times e^b = e^{a+b}$. Les exposants s'additionnent, ils ne se multiplient pas.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $e^{a+b} = e^a + e^b$. C'est faux : l'exponentielle d'une somme est un *produit*, pas une somme.

⚠ CONTRE-EXEMPLE On peut vérifier numériquement : $e^{1+2} = e^3 \approx 20,09$, tandis que $e^1 + e^2 \approx 2,718 + 7,389 = 10,107$. On a bien $e^{1+2} \neq e^1 + e^2$.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Approfondissement — Vers la Terminale. La relation fonctionnelle $\exp(a+b) = \exp(a) \exp(b)$ caractérise les morphismes du groupe $(\mathbb{R}, +)$ vers le groupe $(\mathbb{R}_+^*, \times)$. La fonction exponentielle est le seul morphisme continu vérifiant $\exp(1) = e$. Sa réciproque, le logarithme népérien, transforme les produits en sommes : $\ln(AB) = \ln A + \ln B$.

5.3 Signe, variations et courbe de la fonction exponentielle

◆ **PROPRIÉTÉ Signe et variations** Pour tout réel x , $e^x > 0$. Comme $(e^x)' = e^x > 0$, la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

◆ **PROPRIÉTÉ Conservation de l'ordre** Pour tous réels a et b :

$$e^a < e^b \iff a < b, \quad e^a = e^b \iff a = b.$$

En particulier, $e^x < 1$ si $x < 0$, $e^0 = 1$ et $e^x > 1$ si $x > 0$.

◆ **PROPRIÉTÉ Courbe représentative** La courbe passe par $(0; 1)$ et par $(1; e)$. Elle reste strictement au-dessus de l'axe des abscisses et monte lorsque l'abscisse augmente.

EXEMPLE Comparer $e^{2,5}$ et $e^{\sqrt{7}}$ sans calculatrice. Comme $2,5^2 = 6,25 < 7$, on a $2,5 < \sqrt{7}$, donc $e^{2,5} < e^{\sqrt{7}}$.

◆ **PROPRIÉTÉ Lien avec les suites géométriques** Pour un pas de temps h fixé et $u_n = Ae^{knh}$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = e^{kh}.$$

Les valeurs d'un modèle exponentiel observées à intervalles de temps réguliers forment donc une suite géométrique de raison e^{kh} .

ERREUR FRÉQUENTE

Un exposant négatif ne donne pas une valeur négative : e^x est toujours strictement positif.

5.4 Dérivée de $t \mapsto e^{at}$ **THÉORÈME Dérivée d'une exponentielle à exposant linéaire**

Pour tout réel a , la fonction $f : t \mapsto e^{at}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(t) = a e^{at}.$$

EXEMPLE Si $f(t) = e^{3t}$, alors $f'(t) = 3e^{3t}$. Si $g(t) = e^{-0,2t}$, alors $g'(t) = -0,2e^{-0,2t}$.

◆ **PROPRIÉTÉ Présence d'un terme constant** La propriété algébrique donne $e^{at+b} = e^b e^{at}$. Le facteur e^b est constant, donc

$$(e^{at+b})' = a e^{at+b}.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Le coefficient a multiplie la fonction dérivée ; l'exposant at reste inchangé. Pour $a < 0$, il ne faut pas perdre le signe négatif.

5.5 Croissances et décroissances exponentielles

◆ **PROPRIÉTÉ Deux familles de courbes** Pour une valeur numérique $k > 0$:

- ▶ $t \mapsto e^{kt}$ est strictement croissante et passe par $(0; 1)$;
- ▶ $t \mapsto e^{-kt}$ est strictement décroissante et passe par $(0; 1)$.

Ces deux fonctions sont strictement positives.

DÉFINITION Modèle exponentiel

Une grandeur Q suivant une évolution exponentielle continue peut s'écrire

$$Q(t) = Q_0 e^{at},$$

où $Q_0 = Q(0)$ est la valeur initiale. Si $a > 0$, le modèle décrit une croissance ; si $a < 0$, il décrit une décroissance, à condition que $Q_0 > 0$. Plus précisément, si $Q_0 > 0$ et $a > 0$, Q est strictement croissante ; si $Q_0 > 0$ et $a < 0$, Q est strictement décroissante.

EXEMPLE Une masse radioactive est modélisée par $M(t) = 80e^{-0,3t}$. Sa valeur initiale est 80 et, d'une unité de temps à la suivante, elle est multipliée par $e^{-0,3} < 1$.

◆ **PROPRIÉTÉ Lien discret-continu** Pour un pas $h > 0$, les valeurs $Q(nh)$ forment une suite géométrique de raison e^{ah} . Le modèle continu prolonge ainsi une évolution géométrique observée à temps réguliers.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Dans $Q_0 e^{at}$, Q_0 est la valeur initiale et a pilote le sens de l'évolution : ce sont deux paramètres de rôles différents.

Mise en œuvre algorithmique — non exigible

5.6 Algorithmes — Construire et approcher l'exponentielle

Construction approchée par la méthode d'Euler

Pour approcher la fonction vérifiant $y' = y$ et $y(0) = 1$, on choisit un pas $h > 0$ et on part de $x_0 = 0$, $y_0 = 1$. On répète :

$$x_{k+1} = x_k + h, \quad y_{k+1} = y_k + h y_k.$$

Les points (x_k, y_k) donnent une construction numérique approchée de la courbe. Réduire le pas permet de comparer plusieurs approximations, sans constituer ici une démonstration d'existence.

Approcher numériquement le nombre e

Calculer, pour des entiers n de plus en plus grands,

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Un tableau de valeurs permet de conjecturer que a_n se rapproche de 2,718..., valeur approchée de e. Cette observation numérique n'est pas une formalisation de limite.

Ⓜ MÉTHODE M1 Simplifier une expression avec l'exponentielle

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de simplifier une expression contenant des produits, quotients ou puissances de l'exponentielle, par exemple $e^a \times e^b$, $\frac{e^a}{e^b}$ ou $(e^a)^n$.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les termes en exponentielle présents dans l'expression.
2. J'applique la propriété algébrique adaptée :
 - ▶ Produit : $e^a \times e^b = e^{a+b}$;
 - ▶ Quotient : $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$;
 - ▶ Puissance : $(e^a)^n = e^{na}$.
3. Je simplifie l'exposant obtenu (réduire, factoriser si utile).

Exemple rédigé. Simplifions $A = \frac{e^{3x} \times e^2}{e^{x+1}}$.

Au numérateur, $e^{3x} \times e^2 = e^{3x+2}$.

Donc $A = \frac{e^{3x+2}}{e^{x+1}} = e^{(3x+2)-(x+1)} = e^{2x+1}$.

$$A = e^{2x+1}.$$

Les pièges.

- ▶ Écrire $e^a \times e^b = e^{ab}$: on additionne les exposants, on ne les multiplie pas.
- ▶ Écrire $e^a + e^b = e^{a+b}$: la relation fonctionnelle concerne le produit, pas la somme.
- ▶ Oublier de distribuer le signe moins dans $e^{a-(b+c)}$: on obtient e^{a-b-c} .

Vérifier son résultat. Je vérifie en remplaçant par une valeur numérique simple (par exemple $x = 0$) que l'expression initiale et l'expression simplifiée donnent le même résultat.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

④ **MÉTHODE M2 Comparer des valeurs de la fonction exponentielle**

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode pour comparer deux exponentielles ou situer une valeur sur la courbe, sans calculatrice.

La méthode pas à pas.

1. Je compare les deux exposants.
2. J'utilise la stricte croissance de la fonction exponentielle : l'ordre est conservé.
3. Je contrôle le signe : toute valeur exponentielle est strictement positive.

Exemple rédigé. Comparer $e^{2,5}$ et $e^{\sqrt{7}}$. Comme $2,5^2 = 6,25 < 7$, on a $2,5 < \sqrt{7}$. La fonction exponentielle étant strictement croissante,

$$e^{2,5} < e^{\sqrt{7}}.$$

Les pièges.

- ▶ Comparer des valeurs approchées alors que les exposants se comparent exactement.
- ▶ Inverser l'ordre : la fonction exponentielle est croissante.
- ▶ Croire qu'un exposant négatif donne une valeur négative.

Vérifier son résultat. Je peux contrôler sur la courbe que l'ordonnée augmente avec l'abscisse.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

④ **MÉTHODE M3 Dériver $t \mapsto e^{at}$**

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'exposant est le produit d'un réel constant a par la variable t .

La méthode pas à pas.

1. J'identifie le coefficient réel a dans l'exposant at .
2. J'écris directement $(e^{at})' = ae^{at}$.
3. Je conserve le signe de a et l'exposant at inchangé.

Exemple rédigé. Pour $f(t) = e^{-0,4t}$, le coefficient est $a = -0,4$, donc

$$f'(t) = -0,4e^{-0,4t}.$$

Les pièges.

- ▶ Oublier le facteur a .
- ▶ Perdre le signe négatif de a .

- Remplacer l'exposant at par a .

Vérifier son résultat. Le signe de la dérivée doit être cohérent avec la croissance si $a > 0$ et la décroissance si $a < 0$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

🔑 MÉTHODE M4 Construire un modèle exponentiel

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsqu'une grandeur évolue continûment avec une croissance ou une décroissance exponentielle.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie la valeur initiale $Q_0 = Q(0)$.
2. Je détermine le paramètre a et son signe.
3. J'écris $Q(t) = Q_0 e^{at}$ avec les unités.
4. Je vérifie la valeur initiale et le sens de variation attendu.

Exemple rédigé. Une substance a une masse initiale de 120 g et suit le modèle $M(t) = 120e^{-0,08t}$. Le signe négatif indique une décroissance et $M(0) = 120$ g.

Les pièges.

- Confondre Q_0 et le paramètre a .
- Oublier le signe négatif dans un modèle de décroissance.
- Oublier les unités de la grandeur et du temps.

Vérifier son résultat. Je remplace t par 0 et je contrôle que le modèle redonne Q_0 .

S'entraîner. (renvois exercices M4)

🔑 MÉTHODE M5 Reconnaître les courbes $t \mapsto e^{kt}$ et $t \mapsto e^{-kt}$

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode pour associer une courbe à un modèle exponentiel avec $k > 0$.

La méthode pas à pas.

1. Je repère le point commun $(0; 1)$.
2. Si l'exposant est kt , la courbe est croissante.
3. Si l'exposant est $-kt$, la courbe est décroissante.
4. Je vérifie que toutes les ordonnées sont strictement positives.

Exemple rédigé. Pour $k = 0,3$, la courbe de $t \mapsto e^{-0,3t}$ passe par $(0; 1)$ et décroît lorsque t augmente.

Les pièges.

- Faire passer la courbe par l'origine au lieu de $(0; 1)$.
- Croire qu'une exponentielle devient négative.
- Oublier que k est strictement positif dans cette comparaison.

Vérifier son résultat. Je calcule la valeur en 0 et je lis le signe du coefficient de t dans l'exposant.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x$.

1. Calculer $f'(x)$. Que constate-t-on ?
2. Vérifier que $f'(x) = f(x)$ pour tout réel x .
3. Calculer $f(0)$.
4. En utilisant l'unicité admise dans le cours, conclure que f est l'unique fonction vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$.
5. Donner la valeur de $\exp(1)$. Comment note-t-on ce nombre ?

Exercice 2

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2e^x$.

1. Calculer $g'(x)$.
2. La fonction g vérifie-t-elle l'équation $y' = y$? Justifier.
3. Calculer $g(0)$. La condition $y(0) = 1$ est-elle vérifiée ?
4. Expliquer pourquoi g n'est pas la fonction exponentielle.

Exercice 3

1. Calculer $\exp(0)$.
2. La fonction exponentielle peut-elle s'annuler ? Justifier en utilisant la propriété $\exp(x) > 0$ pour tout réel x .
3. Compléter : pour tout réel x , $e^x \dots 0$ (choisir parmi $>$, $\geq$, $<$, $\leq$, $=$).
4. En déduire que l'équation $e^x = 0$ n'a aucune solution dans $\mathbb{R}$.

Exercice 4

Répondre par **vrai** ou **faux** à chaque affirmation. Justifier chaque réponse.

1. $\exp(0) = 1$.
2. Pour tout réel x , $\exp'(x) = \exp(x)$.
3. Pour tout réel x , $e^x \geq 0$ (l'exponentielle est positive ou nulle).
4. $\exp(1) = e$.
5. Il existe un réel x tel que $e^x = 0$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 5

On suppose qu'une fonction f , dérivable sur $\mathbb{R}$, vérifie $f' = f$.

On pose $g(x) = f(x) \cdot e^{-x}$.

1. Calculer $g'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit.
2. En utilisant l'hypothèse $f'(x) = f(x)$, montrer que $g'(x) = 0$ pour tout réel x .
3. En déduire que g est une fonction constante sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $f(x) = f(0) \cdot e^x$ pour tout réel x .
5. En déduire que si f vérifie $f' = f$, alors f ne s'annule jamais ou bien f est la fonction nulle.

Exercice 6 ♦♦

On considère la courbe représentative C de la fonction exponentielle dans un repère orthonormé.

1. Rappeler la valeur de $\exp(0)$ et $\exp'(0)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse 0.
3. La tangente passe-t-elle par l'origine du repère ? Justifier.
4. Étudier les variations de $h(x) = e^x - (x + 1)$, puis en déduire la position de la courbe C par rapport à la tangente T .

Exercice 7 ♦♦

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 3e^x - 2$.

1. Calculer $h'(x)$.
2. La fonction h est-elle solution de l'équation différentielle $y' = y$? Justifier.
3. Calculer $h(0)$. La condition $h(0) = 1$ est-elle vérifiée ?
4. Pourquoi h n'est-elle pas la fonction exponentielle malgré $h(0) = 1$?

Exercice 8 ♦♦

On utilise la définition de la fonction exponentielle ($\exp' = \exp$, $\exp(0) = 1$, $\exp(x) > 0$).

1. Justifier que la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. En utilisant la croissance et la valeur $\exp(0) = 1$, montrer que :
 - a) pour tout $x > 0$, $e^x > 1$;
 - b) pour tout $x < 0$, $e^x < 1$.
3. Montrer que pour tout $x < 0$, on a $0 < e^x < 1$.
4. Résumer les résultats dans un tableau de signes de $e^x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

Approfondissement — Vers la Terminale**Exercice 9** ♦♦♦**Unicité de la fonction exponentielle.**

On admet qu'il existe au moins une fonction $\exp$ dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $\exp' = \exp$ et $\exp(0) = 1$.

Soit f une autre fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$.

On pose $g(x) = \frac{f(x)}{\exp(x)}$.

1. Justifier que g est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $g'(x)$ à l'aide de la formule du quotient.
3. En utilisant les hypothèses $f' = f$ et $\exp' = \exp$, montrer que $g'(x) = 0$ pour tout réel x .
4. En déduire que g est constante sur $\mathbb{R}$.
5. Calculer $g(0)$ et en déduire la valeur de la constante.
6. Conclure que $f = \exp$: la fonction exponentielle est unique.

Exercice 10 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x - e^x + 1$.

1. Calculer $f(0)$.
2. Calculer $f'(x)$ et vérifier que $f'(x) = xe^x$.
3. En déduire $f'(0)$.
4. Étudier le signe de $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f .
5. Montrer que $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

6. En déduire l'inégalité $xe^x \geq e^x - 1$ pour tout réel x .

Exercice 11

Simplifier chacune des expressions suivantes :

1. $e^3 \times e^5$
2. $\frac{e^7}{e^2}$
3. $(e^2)^4$
4. $e^4 \times e^{-1}$

Exercice 12

Écrire chacune des expressions suivantes sous la forme $e^{f(x)}$:

1. $e^x \times e^{2x}$
2. $\frac{e^{3x}}{e^x}$
3. $(e^x)^5$
4. $e^{2x} \times e^{-x} \times e^{3x}$

Exercice 13

Simplifier chacune des expressions suivantes :

1. $e^{x+1} \times e^{x-1}$
2. $\frac{e^{2x+3}}{e^{x+1}}$
3. $\frac{(e^x)^3}{e^{2x}}$
4. $e^{x+2} \times e^{-(x-2)}$

Exercice 14

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est **vraie** ou **fausse**. Justifier.

1. $e^{a+b} = e^a + e^b$
2. $e^{a \times b} = e^a \times e^b$
3. $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
4. $(e^a)^n = e^{a+n}$

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 15

On souhaite démontrer que pour tous réels a et b , $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$.

On fixe un réel b et on pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(x) = \frac{\exp(x+b)}{\exp(x)}.$$

1. Justifier que g est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $g'(x)$ et montrer que $g'(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. En déduire que g est constante sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer $g(0)$ et conclure.

Exercice 16 ♦♦

En utilisant la propriété $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$, démontrer les résultats suivants.

1. Pour tout réel a , $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$.
2. Pour tous réels a et b , $\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$.
3. Pour tout réel a , $\exp(a) \times \exp(-a) = 1$.

Exercice 17 ♦♦

1. Développer et simplifier $A = (e^{2x} - 1)(e^{2x} + 1)$.
2. Développer et simplifier $B = (e^x + e^{-x})^2$.
3. Sachant que $e^x = 2$, calculer la valeur exacte de $e^{3x} + e^{-3x}$.
4. Simplifier $C = \frac{e^{3x} \times e^{-x}}{(e^x)^2}$.

Exercice 18 ♦♦

Factoriser chacune des expressions suivantes :

1. $A = e^{2x} - e^x$
2. $B = e^{2x} - 2e^x + 1$
3. $C = e^{2x} - 9$
4. $D = e^{2x} + 5e^x + 6$

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 19 ♦♦♦

On admet la propriété : pour tous réels a et b , $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$.

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$ et pour tout réel a :

$$\exp(na) = [\exp(a)]^n.$$

1. **Initialisation** : Vérifier la propriété pour $n = 1$.
2. **Hérédité** : On suppose que pour un certain entier $k \geq 1$, $\exp(ka) = [\exp(a)]^k$. Montrer que $\exp((k+1)a) = [\exp(a)]^{k+1}$.
3. **Conclusion** : Rédiger la conclusion du raisonnement par récurrence.
4. En déduire que pour tout entier naturel n et tout réel a , $\exp(-na) = \frac{1}{[\exp(a)]^n}$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 20 ♦♦♦

On définit la fonction f sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

1. Montrer que pour tout réel x , $f(-x) = f(x)$. Comment se traduit cette propriété graphiquement ?
2. Calculer $f(0)$.
3. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

4. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.
5. Montrer que pour tout réel x , $[f(x)]^2 - \left[\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right]^2 = 1$.

Exercice 21

Comparer, sans calculatrice, les nombres suivants en justifiant à l'aide de la croissance de la fonction exponentielle :

1. e^3 et e^5
2. e^{-2} et e^{-1}
3. e^0 et e^{-3}

Exercice 22

Ranger dans l'ordre croissant les nombres suivants :

$$e^{-1} ; 1 ; e ; e^2 ; e^{-2}$$

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 23

Déterminer les limites suivantes en justifiant :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}$

Exercice 24

Dire si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et justifier :

1. « Pour tout réel x , $e^x > 0$. »
2. « Il existe un réel x tel que e^x soit négatif. »
3. « Pour tout réel positif x , $0 < e^{-x} \leq 1$. »

Exercice 25

Résoudre chacune des inéquations suivantes sur $\mathbb{R}$:

1. $e^x > e^3$
2. $e^{2x} \leq e^5$
3. $e^{-x} \geq e^2$

Exercice 26

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x-1}$.

1. Écrire $f(x) = e^{-1}e^{2x}$, puis calculer $f'(x)$.
2. En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
3. Calculer $f(-1)$, $f(0)$ et $f(1)$, puis placer les points correspondants.
4. Esquisser la courbe de f en utilisant sa croissance et ces trois points.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 27 ♦♦

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x)$

Indication pour la question 1 : on admettra que e^x croît plus vite que x quand $x \rightarrow +\infty$.

Approfondissement — Vers la Terminale**Exercice 28** ♦♦

On pose $g(x) = e^x - x - 2$ pour tout réel x .

1. Calculer $g(0)$ et $g(2)$.
2. Montrer que g est continue sur $[0; 2]$.
3. En déduire que l'équation $e^x = x + 2$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[0; 2]$.

Approfondissement — Vers la Terminale**Exercice 29** ♦♦♦

L'objectif de cet exercice est de démontrer que la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

1. Rappeler la dérivée de la fonction $f : x \mapsto e^x$.
2. Montrer que $f'(x) > 0$ pour tout réel x .
3. En déduire que la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
4. Expliquer alors pourquoi, pour tous réels a et b :

$$e^a = e^b \iff a = b \quad \text{et} \quad e^a < e^b \iff a < b.$$

Exercice 30 ♦♦♦

On pose $h(x) = e^x - x - 1$ pour tout réel x . La droite $T : y = x + 1$ est la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0.

1. Calculer $h(0)$.
2. Calculer $h'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations de h .
4. En déduire que pour tout réel $x : e^x \geq x + 1$.
5. Interpréter graphiquement ce résultat : quelle est la position de la courbe de $\exp$ par rapport à sa tangente en 0 ?

Exercice 31 ♦

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = e^{3x}$
2. $g(x) = e^{-x}$
3. $h(x) = e^{x+1}$
4. $k(x) = e^{2x-3}$

Exercice 32 ♦

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = 5e^{2x}$
2. $g(x) = -3e^{-4x}$
3. $h(x) = \frac{e^x}{2}$

Exercice 33

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = e^x + x$
2. $g(x) = e^{-x} + e^x$
3. $h(x) = x - e^x$

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 34

Dériver chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = e^{x^2}$
2. $g(x) = e^{x^2+1}$

Exercice 35

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x$.

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$.
2. Montrer que $f'(x) = (x+1)e^x$.
3. Résoudre $f'(x) = 0$.
4. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 36

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x-1)e^{-x}$.

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule du produit.
2. Montrer que $f'(x) = (3-2x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 37

Soit f la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$.

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.
2. Montrer que $f'(x) = \frac{xe^x}{(x+1)^2}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $] -1; +\infty[$ et dresser le tableau de variations de f .

Exercice 38

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2-1)e^x$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Montrer que $f'(x) = (x^2+2x-1)e^x$.
3. Résoudre $x^2+2x-1=0$ et en déduire les extremums de f .

Exercice 39



Approfondissement — Vers la Terminale

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 1)e^x$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = xe^x$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
4. Calculer $f(0)$, $f(1)$ et $f(-1)$.
5. Dresser le tableau de variations complet de f et tracer l'allure de la courbe représentative de f .

Exercice 40



Approfondissement — Vers la Terminale

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
5. Préciser les extremums de f et tracer l'allure de la courbe représentative.

Exercice 41



On considère, pour $t \geq 0$, les fonctions

$$f(t) = e^{0,4t} \quad \text{et} \quad g(t) = e^{-0,4t}.$$

Deux courbes partent du point $(0; 1)$: la courbe C_1 monte lorsque t augmente, tandis que C_2 descend et reste au-dessus de l'axe des abscisses.

Associer chaque courbe à la fonction qu'elle représente et justifier à l'aide du signe du coefficient de t .

Exercice 42



Une quantité est modélisée par $Q(t) = A e^{at}$, où $A > 0$ et $t \geq 0$.

1. Exprimer la valeur initiale $Q(0)$.
2. Calculer le quotient $\frac{Q(t+1)}{Q(t)}$.
3. Expliquer le lien entre ce quotient et la raison de la suite $(Q(n))_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 43



Une population de bactéries est modélisée, pendant cinq heures, par

$$N(t) = 500 e^{0,2t},$$

où t est exprimé en heures.

1. Déterminer la population initiale.
2. Donner la valeur exacte de $N(5)$, puis une valeur approchée à l'unité.

3. Expliquer pourquoi ce modèle décrit une croissance.

Exercice 44

La masse, en grammes, d'une substance est modélisée par

$$M(t) = 80 e^{-0,3t},$$

où t est exprimé en jours.

1. Déterminer la masse initiale.
2. Calculer $M(10)$ et arrondir au dixième de gramme.
3. Calculer $\frac{M(t+1)}{M(t)}$ et interpréter ce quotient.
4. Justifier que le modèle décrit une décroissance.

Exercice 45

Une quantité est modélisée en temps continu par

$$Q(t) = 120 e^{0,05t}, \quad t \geq 0.$$

On observe cette quantité à chaque unité de temps et l'on pose $u_n = Q(n)$.

1. Exprimer u_n en fonction de n .
2. Montrer que (u_n) est géométrique et préciser sa raison.
3. Calculer $Q(5)$, puis u_5 , au dixième près. Commenter le résultat.
4. Interpréter le coefficient 120 et la raison $e^{0,05}$ dans le contexte du modèle.

Exercice 46

La population d'une culture bactérienne est modélisée par la fonction :

$$P(t) = 1000 e^{0,05t}$$

où t est le temps en heures et $P(t)$ le nombre de bactéries.

1. Calculer $P(0)$. Interpréter ce résultat.
2. Calculer $P(20)$ et $P(40)$, puis arrondir à l'unité.
3. Comparer $P(t+10)$ et $P(t)$. Interpréter le coefficient obtenu.
4. Justifier que la population modélisée est croissante.

Exercice 47

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - 2e^x$.

1. Montrer que pour tout réel x , $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de f .
3. Calculer $f(0)$ et déterminer le minimum de f sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer $f(-1)$ et $f(1)$, puis esquisser la courbe de f à partir du tableau de variations.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 48

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$.

1. Montrer que $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ pour tout réel x .
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.
3. En déduire que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$. En déduire les asymptotes.
5. Calculer $f(0)$ et dresser le tableau de variations complet de f .

Exercice 49

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 1)e^x$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = (2x + 1)e^x$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
4. Déterminer le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
5. Calculer $f(0)$ et $f(1)$, puis placer ces points sur une esquisse compatible avec les variations.

Exercice 50

L'objectif de cet exercice est de montrer que $e^x > x$ pour tout réel x .

1. On pose $g(x) = e^x - x$. Calculer $g'(x)$.
2. Résoudre $g'(x) = 0$ et étudier le signe de $g'(x)$.
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.
4. En déduire que $g(x) > 0$ pour tout réel x , c'est-à-dire que $e^x > x$.
5. **Application.** Montrer que l'équation $e^x = x$ n'a aucune solution dans $\mathbb{R}$.

Coup de pouce 1. Rappeler la propriété fondamentale de la fonction exponentielle : $(e^x)' = \dots$

Coup de pouce 2. Pour la question 3, remplacer x par 0 dans e^x . Que vaut toute puissance à l'exposant 0 ?

Coup de pouce 1. Pour dériver $g(x) = 2e^x$, utiliser que la dérivée d'une constante fois une fonction est la constante fois la dérivée.

Coup de pouce 2. L'unicité de la fonction exponentielle exige **deux** conditions : $y' = y$ et $y(0) = 1$. Vérifier chacune séparément.

Coup de pouce 1. Rappeler que $e^0 = 1$: c'est la condition initiale de la définition de l'exponentielle.

Coup de pouce 2. Une fonction strictement positive ne peut jamais prendre la valeur 0. Utiliser cette propriété pour conclure sur l'équation $e^x = 0$.

Coup de pouce 1. Revoir les trois propriétés fondamentales de l'exponentielle : $\exp' = \exp$, $\exp(0) = 1$ et $\exp(x) > 0$ pour tout réel x .

Coup de pouce 2. Attention à la nuance entre ≥ 0 (positif ou nul) et > 0 (strictement positif). L'exponentielle peut-elle valoir exactement 0 ?

Coup de pouce 1. Rappelle-toi les trois règles : $e^a \times e^b = e^{a+b}$, $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ et $(e^a)^n = e^{na}$.

Coup de pouce 1. Additionne les exposants lors d'un produit et soustrais-les lors d'un quotient. Pour une puissance, multiplie l'exposant.

Coup de pouce 1. Commence par développer les exposants, puis applique les règles de calcul sur les exponentielles. Attention aux signes dans les soustractions !

Coup de pouce 1. Pour chaque affirmation, essaie de la comparer aux propriétés du cours. Si tu doutes, teste avec des valeurs numériques simples ($a = 1$, $b = 1$, etc.).

Coup de pouce 1. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: si $a < b$ alors $e^a < e^b$.

Coup de pouce 2. Commence par comparer les exposants entre eux, puis conclus.

Coup de pouce 1. Commence par ranger les exposants $(-2, -1, 0, 1, 2)$ dans l'ordre croissant.

Coup de pouce 2. Rappelle-toi que $1 = e^0$ et $e = e^1$. La fonction exponentielle conserve l'ordre.

Approfondissement — Vers la Terminale

Coup de pouce 1. Rappelle les deux limites fondamentales de l'exponentielle : en $+\infty$ et en $-\infty$.

Coup de pouce 2. Pour la question 3, pose $X = -x$. Quand $x \rightarrow +\infty$, vers quoi tend X ?

Coup de pouce 1. Rappelle-toi que pour tout réel x , $e^x > \dots$

Coup de pouce 2. Pour la question 3, si $x \geq 0$, comparer $-x$ à 0, puis utiliser la croissance de la fonction exponentielle.

Coup de pouce 1. On utilise la formule officielle $(e^{ax})' = a e^{ax}$ et on repère le réel a .

Coup de pouce 2. Pour un décalage constant, écrire d'abord $e^{ax+b} = e^b e^{ax}$.

Coup de pouce 1. Rappeler que $(e^{ax})' = a e^{ax}$ et que le facteur constant placé devant est conservé.

Coup de pouce 2. Pour $g(x) = -3 e^{-4x}$, multiplier le facteur -3 par le coefficient -4 .

Coup de pouce 1. On dérive chaque terme séparément : $(u + v)' = u' + v'$.

Coup de pouce 2. Pour $g(x) = e^{-x} + e^x$, rappeler que $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Coup de pouce 1. Pour $f(x) = e^{x^2}$, identifier $u(x) = x^2$. Quelle est la dérivée de x^2 ?

Coup de pouce 2. Appliquer la formule : $f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = \dots \times e^{x^2}$.

Coup de pouce 1. Pour $t \mapsto e^{at}$, le signe de a détermine le sens de variation.

Coup de pouce 2. Les deux fonctions valent 1 lorsque $t = 0$.

Coup de pouce 1. Utilise $e^{a(t+1)} = e^{at} e^a$.

Coup de pouce 2. Une suite est géométrique lorsque le quotient de deux termes consécutifs est constant.

TD — Décroissance radioactive du carbone 14

Durée : 50 minutes — Modèle étudié sans logarithme ni limite formelle.

Un échantillon contient initialement N_0 unités de carbone 14. Sa quantité est modélisée, pour $t \geq 0$, par

$$N(t) = N_0 e^{-0,000121t},$$

où t est exprimé en années.

Partie A — Comprendre le modèle

1. Calculer $N(0)$ et interpréter le résultat.
2. Montrer que, pour tout $t \geq 0$, $N(t) > 0$.
3. Calculer $N'(t)$ et justifier que N est décroissante.

Partie B — Exploiter des valeurs numériques

4. À la calculatrice, compléter un tableau donnant $N(t)/N_0$ pour $t = 0, 2\,000, 4\,000, 6\,000$ et $8\,000$.
5. À partir du tableau, encadrer à la centaine d'années le premier instant où la proportion devient inférieure à 0,5.
6. Vérifier numériquement que $N(5\,700) > 0,5N_0$ et $N(5\,800) < 0,5N_0$.

Partie C — Lien avec une suite géométrique

On relève la quantité tous les 1 000 ans et on pose $u_n = N(1\,000n)$.

7. Montrer que $u_{n+1} = e^{-0,121} u_n$.
8. En déduire la nature de (u_n) et interpréter sa raison.
9. Expliquer en quelques lignes pourquoi un modèle exponentiel convient à une diminution par facteur constant sur des durées égales.

TD fil rouge — Des intérêts composés au nombre e

Durée : 50 minutes — Toutes les capacités C1 à C5 sont mobilisées.

Partie A — Une approximation numérique de e

Pour $n \geq 1$, on pose $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

1. Calculer a_n pour $n = 1, 2, 4, 12, 100$ et $1\,000$.
2. Observer les valeurs et conjecturer un nombre vers lequel elles semblent se stabiliser.
3. Comparer la conjecture à la valeur affichée par la calculatrice pour e .

Partie B — Propriétés algébriques

Un capital est modélisé par $C(t) = 1000e^{0,05t}$.

4. Calculer $C(0)$, $C(5)$ et $C(10)$, arrondis à l'euro.
5. Montrer que $C(t+1) = e^{0,05}C(t)$.
6. Plus généralement, simplifier $C(t+h)/C(t)$ et interpréter le résultat.

Partie C — Dérivée, variation et courbe

7. Calculer $C'(t)$ et justifier que C est croissante.
8. Tracer sur calculatrice les courbes de $t \mapsto e^{0,05t}$ et $t \mapsto e^{-0,05t}$ pour $0 \leq t \leq 20$.
9. Décrire le rôle du signe du coefficient placé devant t dans l'exposant.

Partie D — Synthèse du modèle

10. Comparer $C(10)$ et $C(20)$, puis calculer $C(20)/C(10)$.
11. Expliquer pourquoi une variation par facteur constant pendant des durées égales conduit à un modèle exponentiel.
12. Rédiger une synthèse distinguant l'observation numérique de e , les propriétés algébriques et l'usage du modèle.

FONCTION EXPONENTIELLE — QCM D'AUTO-EVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Parmi les propriétés suivantes, laquelle caractérise la fonction exponentielle ?
 - A. C'est la seule fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) = f(x)$ pour tout x et $f(1) = 1$.
 - B. C'est la seule fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) = f(x)$ pour tout x et $f(0) = 1$.
 - C. C'est la seule fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) = f(x)$ pour tout x et $f(0) = 0$.
 - D. C'est la seule fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) = xf(x)$ pour tout x et $f(0) = 1$.
2. [Q2] Quelle est la valeur de e^0 ?
 - A. 0
 - B. e
 - C. 1
 - D. La valeur n'est pas définie.
3. [Q3] Pour tout réel x , on a :
 - A. $e^x > 0$
 - B. $e^x \geq 0$ (avec $e^x = 0$ possible)

C. e^x peut être négatif si $x < 0$

D. $e^x > 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

Capacité C2

4. [Q4] Simplifier $e^3 \times e^5$.

A. e^{15}

B. e^8

C. $2e^8$

D. e^{35}

5. [Q5] Simplifier $\frac{e^7}{e^3}$.

A. $e^{7/3}$

B. e^{-21}

C. e^4

D. e^{10}

6. [Q6] Simplifier $(e^2)^3 \times e^{-4}$.

A. e^{-2}

B. e^1

C. e^2

D. e^{10}

Capacité C3

7. [Q7] La fonction exponentielle est :

A. strictement décroissante sur $\mathbb{R}$

B. strictement croissante sur $\mathbb{R}$

C. croissante sur $]0; +\infty[$ et décroissante sur $] -\infty; 0[$

D. constante sur $\mathbb{R}$

8. [Q8] Pour un réel $x < 0$, quelle affirmation situe correctement e^x ?

A. $e^x < 0$

B. $e^x = 0$

C. $0 < e^x < 1$

D. $e^x > 1$

9. [Q9] Sachant que la fonction exponentielle est strictement croissante, comparer $e^{2,5}$ et $e^{\sqrt{7}}$.

A. $e^{2,5} < e^{\sqrt{7}}$

B. $e^{2,5} > e^{\sqrt{7}}$

C. $e^{2,5} = e^{\sqrt{7}}$

D. On ne peut pas comparer sans calculatrice.

Capacité C4

10. [Q10] Soit $f(t) = e^{3t}$. Quelle est $f'(t)$?

A. e^{3t}

B. $3t e^{3t}$

C. $3 e^{3t}$

D. $3 e^3$

11. [Q11] Soit $g(t) = e^{-2t}$. Quelle est $g'(t)$?

A. e^{-2t}

B. $2 e^{-2t}$

C. $-2 e^{-2t}$

D. $-2 e^{2t}$

12. [Q12] Soit $h(t) = e^{0,5t}$. Quelle est $h'(t)$?

A. $e^{0,5t}$

B. $0,5t e^{0,5t}$

C. $0,5 e^{0,5t}$

D. $2 e^{0,5t}$

Capacité C5

13. [Q13] Une population est modelisee par $N(t) = 500e^{0,2t}$. Quelle est sa valeur initiale ?
- A. 0
 - B. 500
 - C. $500e^{0,2}$
 - D. 0,2
14. [Q14] Une masse est modelisee par $M(t) = 80e^{-0,3t}$. Quel est le quotient $M(t+1)/M(t)$?
- A. $e^{0,3}$
 - B. $e^{-0,3}$
 - C. $80e^{-0,3}$
 - D. $-0,3$
15. [Q15] Pour $k > 0$, quelle affirmation decrit la courbe de $t \mapsto e^{-kt}$?
- A. Elle est croissante et passe par $(0;0)$.
 - B. Elle est decroissante et passe par $(0;1)$.
 - C. Elle est constante et egale a 1.
 - D. Elle prend des valeurs negatives pour $t > 0$.

Clé de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	C
Q3	C1	A
Q4	C2	B
Q5	C2	C
Q6	C2	C
Q7	C3	B
Q8	C3	C
Q9	C3	A
Q10	C4	C
Q11	C4	C
Q12	C4	C
Q13	C5	B
Q14	C5	B
Q15	C5	B

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- **A** — La condition $f(1) = 1$ définit la fonction $x \mapsto e^{x-1}$, pas la fonction exponentielle $x \mapsto e^x$, qui vérifie $f(0) = 1$. *Renvoi : M1, étape 1.*
- **C** — Avec $f(0) = 0$, la seule solution de $f' = f$ est la fonction nulle $f = 0$, pas l'exponentielle. La condition initiale $f(0) = 1$ est essentielle. *Renvoi : M1, étape 1.*
- **D** — L'équation différentielle de l'exponentielle est $f' = f$, pas $f'(x) = xf(x)$. Confusion entre deux équations différentielles distinctes. *Renvoi : M1, étape 1.*

► Q2

- **A** — L'élève confond l'exposant 0 avec le résultat : $e^0 = 1$, pas 0. Confusion entre puissance nulle et résultat nul. *Renvoi : M1, propriété fondamentale.*
- **B** — L'élève confond e^0 et e^1 . On a $e^1 = e$ mais $e^0 = 1$. *Renvoi : M1, propriété fondamentale.*
- **D** — L'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ entier, donc e^0 est bien défini et vaut 1. *Renvoi : M1, étape 1.*

► Q3

- **B** — L'exponentielle est strictement positive : $e^x > 0$ pour tout x , elle n'atteint jamais 0. *Renvoi : M1, étape 2.*
- **C** — Pour $x < 0$, e^x est positif (par exemple $e^{-1} = 1/e \approx 0,37 > 0$). L'élève confond exposant négatif et résultat négatif. *Renvoi : M1, étape 2.*
- **D** — Pour $x < 0$, $e^x < 1$ (par exemple $e^{-1} \approx 0,37 < 1$). La propriété $e^x > 1$ n'est vraie que pour $x > 0$. *Renvoi : M1, étape 2 ; M3.*

► Q4

- **A** — L'élève a multiplié les exposants ($3 \times 5 = 15$) au lieu de les additionner ($3 + 5 = 8$). Confusion entre $e^a \times e^b = e^{a+b}$ et $(e^a)^b = e^{ab}$. *Renvoi : M2, règle 1.*
- **C** — L'élève a bien additionné les exposants, mais a ensuite additionné à tort les coefficients implicites $1 + 1$. Dans un produit, ces coefficients se multiplient : $1 \times 1 = 1$. *Renvoi : M2, règle 1 ; R4.*
- **D** — L'élève a concaténé les chiffres 3 et 5 au lieu de les additionner. *Renvoi : M2, règle 1 ; R4.*

► Q5

- **A** — L'élève a divisé les exposants ($7/3$) au lieu de les soustraire ($7 - 3 = 4$). Confusion entre quotient d'exponentielles et quotient d'exposants. *Renvoi : M2, règle 2 ; R4.*
- **B** — L'élève a multiplié les exposants avec un signe négatif ($-7 \times 3 = -21$) au lieu de soustraire. *Renvoi : M2, règle 2 ; R4.*
- **D** — L'élève a additionné les exposants ($7 + 3 = 10$) au lieu de les soustraire. Confusion entre produit et quotient d'exponentielles. *Renvoi : M2, règle 2.*

► Q6

- A — L'élève a oublié la puissance 3 et a seulement calculé $e^2 \times e^{-4} = e^{-2}$. Renvoi : M2, règle 3 ; R4.
- B — L'élève a calculé $(e^2)^3 = e^{2+3} = e^5$ (addition au lieu de multiplication des exposants) puis $5 - 4 = 1$. Renvoi : M2, règle 3 ; R4.
- D — L'élève a calculé $(e^2)^3 = e^6$ correctement, puis a additionné $6 + 4 = 10$ au lieu de soustraire $6 - 4 = 2$. Renvoi : M2, règles 2-3.

► Q7

- A — L'élève confond avec la fonction $x \mapsto e^{-x}$ qui est décroissante. L'exponentielle $x \mapsto e^x$ est strictement croissante car $\exp'(x) = \exp(x) > 0$. Renvoi : M3, étape 1.
- C — L'exponentielle n'a pas de minimum en $x = 0$. Elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier, sans changement de variation. Renvoi : M3, étape 1.
- D — La dérivée de l'exponentielle est $\exp(x) > 0$, donc la fonction est strictement croissante, certainement pas constante. Renvoi : M3, étape 1.

► Q8

- A — Un exposant négatif ne rend pas la valeur négative : e^x est strictement positif pour tout réel x . Renvoi : C3, signe de l'exponentielle.
- B — La courbe de l'exponentielle ne coupe jamais l'axe des abscisses : $e^x > 0$. Renvoi : C3, courbe représentative.
- D — Comme $x < 0$ et que l'exponentielle est croissante, $e^x < e^0 = 1$. Renvoi : C3, croissance de l'exponentielle.

► Q9

- B — L'élève a mal comparé les exposants. Or $2,5^2 = 6,25 < 7$ donc $2,5 < \sqrt{7}$, et par croissance de l'exponentielle, $e^{2,5} < e^{\sqrt{7}}$. Renvoi : M3, étape 3.
- C — $2,5 \neq \sqrt{7}$ car $2,5^2 = 6,25 \neq 7$. Comme les exposants sont différents et l'exponentielle est injective, les images sont différentes. Renvoi : M3 ; R3.
- D — On peut comparer sans calculatrice en comparant les exposants : $2,5^2 = 6,25 < 7$ donc $2,5 < \sqrt{7}$, et on utilise la croissance de $\exp$. Renvoi : M3, étape 3.

► Q10

- A — L'élève a oublié le facteur constant 3 : la dérivée de $t \mapsto e^{at}$ est $t \mapsto ae^{at}$. Renvoi : C4, dérivée de $t \mapsto e^{at}$.
- B — L'élève a multiplié par l'exposant $3t$ au lieu du coefficient constant 3. Renvoi : C4, coefficient a .
- D — Le facteur 3 est correct, mais la fonction exponentielle conserve la variable : e^{3t} ne devient pas e^3 . Renvoi : C4, dérivée de $t \mapsto e^{at}$.

► Q11

- A — L'élève a oublié le coefficient -2 qui multiplie t dans l'exposant. Renvoi : C4, dérivée de $t \mapsto e^{at}$.
- B — Le coefficient a pour valeur -2 , pas 2 : le signe négatif a été perdu. Renvoi : C4, coefficient $a = -2$.
- D — Le facteur -2 est correct, mais l'exposant reste $-2t$: son signe ne change pas lors de la dérivation. Renvoi : C4, dérivée de $t \mapsto e^{at}$.

► Q12

- A — L'élève a oublié le coefficient $0,5$ qui multiplie t dans l'exposant. Renvoi : C4, coefficient $a = 0,5$.
- B — L'élève a multiplié par l'exposant $0,5t$ au lieu du coefficient constant $0,5$. Renvoi : C4, coefficient a .
- D — 2 est l'inverse de $0,5$, pas le coefficient de t dans l'exposant. Renvoi : C4, coefficient $a = 0,5$.

► Q13

- A — La valeur initiale est obtenue pour $t = 0$: le facteur exponentiel vaut alors 1 , pas 0 . Renvoi : C5, modèle exponentiel.

- C — $500e^{0,2}$ est la valeur au temps $t = 1$, pas au temps initial $t = 0$. Renvoi : C5, substitution de $t = 0$.
- D — 0,2 est le taux continu du modèle ; ce n'est pas la valeur de la population. Renvoi : C5, paramètres du modèle.

► Q14

- A — Le signe de l'exposant a été inversé : le modèle de décroissance conserve le facteur $e^{-0,3}$ d'une unité de temps à la suivante. Renvoi : C5, décroissance exponentielle.
- C — Le coefficient initial 80 se simplifie dans le quotient $M(t+1)/M(t)$. Renvoi : C5, coefficient multiplicateur.
- D — -0,3 est le coefficient dans l'exposant ; le coefficient multiplicateur est son exponentielle $e^{-0,3}$. Renvoi : C5, modèle exponentiel.

► Q15

- A — La courbe passe par $(0; 1)$ car $e^0 = 1$, et le coefficient $-k < 0$ produit une décroissance. Renvoi : C5, courbe de $t \mapsto e^{-kt}$.
- C — La fonction n'est constante que si le coefficient de t dans l'exposant vaut 0, or $-k < 0$. Renvoi : C5, paramètre $k > 0$.
- D — Une exponentielle est toujours strictement positive, y compris lorsque son exposant est négatif. Renvoi : C3, signe ; C5, décroissance.

Corrigé — Évaluation A — Fonction exponentielle

Exercice 1. La fonction exponentielle est l'unique fonction dérivable vérifiant $y' = y$ et $y(0) = 1$. Les simplifications donnent e^x et e^{2x} .

Exercice 2. $f'(x) = -0,4e^{-0,4x} < 0$, donc f est décroissante. $f(0) = 1$ et $f(5) = e^{-2} \approx 0,14$.

Exercice 3. $u_n = 120(e^{0,1})^n = 120e^{0,1n}$ et $u_5 = 120e^{0,5} \approx 197,85$. Les points de la suite sont ceux de la courbe d'abscisses entières.

Exercice 4. $P(0) = 2500$ et $P(12) = 2500e^{0,072} \approx 5136$. De plus $P(t+4) = 2500e^{0,06t+0,24} = e^{0,24}P(t)$. Le coefficient de t est positif : le modèle est croissant.

Évaluation A — Fonction exponentielle

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1 — 5 points — C1, C2

1. Rappeler l'équation différentielle et la condition initiale qui définissent la fonction exponentielle. (2 pts)
2. Simplifier $e^{2x-1}e^{1-x}$ et $\frac{e^{3x}}{e^x}$. (3 pts)

Exercice 2 — 5 points — C3, C4 On pose $f(x) = e^{-0,4x}$.

1. Calculer $f'(x)$ et justifier le sens de variation de f . (3 pts)
2. Calculer $f(0)$ et $f(5)$ à 10^{-2} près, puis esquisser la courbe pour $x \geq 0$. (2 pts)

Exercice 3 — 5 points — C2, C3 Une suite géométrique vérifie $u_0 = 120$ et $u_{n+1} = e^{0,1}u_n$.

1. Exprimer u_n en fonction de n . (2 pts)
2. Calculer u_5 et relier les points $(n; u_n)$ à la courbe de $x \mapsto 120e^{0,1x}$. (3 pts)

Exercice 4 — 5 points — C5 La population d'une culture est modélisée par $P(t) = 2500e^{0,06t}$.

1. Calculer et interpréter $P(0)$ et $P(12)$. (2 pts)
2. Montrer que $P(t+4) = e^{0,24}P(t)$ et interpréter. (2 pts)
3. Dire si le modèle décrit une croissance ou une décroissance et justifier. (1 pt)

Corrigé — Évaluation B — Fonction exponentielle

Exercice 1. Pour tout x , $e^x e^{-x} = 1$: aucun des deux facteurs ne peut être nul et, par continuité avec $e^0 = 1$, $e^x > 0$. Les simplifications donnent e^{2x} et e^{-3x} .

Exercice 2. $g'(x) = 0,3e^{0,3x} > 0$, donc g est croissante. $g(0) = 1$ et $g(4) = e^{1,2} \approx 3,32$.

Exercice 3. $v_n = 300(e^{-0,2})^n = 300e^{-0,2n}$ et $v_3 = 300e^{-0,6} \approx 164,64$. Les points de la suite sont ceux de la courbe d'abscisses entières.

Exercice 4. $C(0) = 80$ et $C(8) = 80e^{-1,2} \approx 24,10$. De plus $C(t+2) = 80e^{-0,15t-0,3} = e^{-0,3}C(t)$. Le coefficient de t est négatif : le modèle est décroissant.

Évaluation B — Fonction exponentielle

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1 — 5 points — C1, C2

1. Expliquer pourquoi e^x est toujours strictement positif. (2 pts)
2. Simplifier $e^{3x+2}e^{-x-2}$ et $\frac{e^{-2x}}{e^x}$. (3 pts)

Exercice 2 — 5 points — C3, C4 On pose $g(x) = e^{0,3x}$.

1. Calculer $g'(x)$ et justifier le sens de variation de g . (3 pts)
2. Calculer $g(0)$ et $g(4)$ à 10^{-2} près, puis esquisser la courbe pour $x \geq 0$. (2 pts)

Exercice 3 — 5 points — C2, C3 Une suite géométrique vérifie $v_0 = 300$ et $v_{n+1} = e^{-0,2}v_n$.

1. Exprimer v_n en fonction de n . (2 pts)
2. Calculer v_3 et relier les points $(n; v_n)$ à la courbe de $x \mapsto 300e^{-0,2x}$. (3 pts)

Exercice 4 — 5 points — C5 La concentration d'un médicament est modélisée par $C(t) = 80e^{-0,15t}$.

1. Calculer et interpréter $C(0)$ et $C(8)$. (2 pts)
2. Montrer que $C(t+2) = e^{-0,3}C(t)$ et interpréter. (2 pts)
3. Dire si le modèle décrit une croissance ou une décroissance et justifier. (1 pt)

Rappel — Derivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient

Somme : $(u+v)' = u' + v'$.

Produit : $(uv)' = u'v + uv'$.

Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ (avec $v \neq 0$).

Ces formules sont indispensables pour dériver les fonctions faisant intervenir e^x multipliée ou divisée par d'autres fonctions.

Exercice 51

Calculer la dérivée de chaque fonction.

1. $f(x) = 3x^2 + 5x - 7$
2. $g(x) = x^3 - 4x + 1$
3. $h(x) = 2x^4 + x^2 - 3x$

Coup de pouce 1. On applique la dérivée terme à terme : $(x^n)' = nx^{n-1}$ et la constante disparaît.

Corrigé

Question 1.

$$f'(x) = 3 \times 2x + 5 = 6x + 5.$$

Question 2.

$$g'(x) = 3x^2 - 4.$$

Question 3.

$$h'(x) = 2 \times 4x^3 + 2x - 3 = 8x^3 + 2x - 3.$$

Exercice 52

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la formule du produit.

1. $f(x) = x(2x + 3)$
2. $g(x) = (x + 1)(x^2 - 1)$
3. $h(x) = (3x - 2)(x + 5)$

Coup de pouce 1. Formule du produit : $(uv)' = u'v + uv'$. Identifier u et v , calculer u' et v' , puis assembler.

Corrigé

Question 1. $u = x, v = 2x + 3$ donc $u' = 1, v' = 2$.

$$f'(x) = 1 \times (2x + 3) + x \times 2 = 2x + 3 + 2x = 4x + 3.$$

Question 2. $u = x + 1, v = x^2 - 1$ donc $u' = 1, v' = 2x$.

$$g'(x) = 1 \times (x^2 - 1) + (x + 1) \times 2x = x^2 - 1 + 2x^2 + 2x = 3x^2 + 2x - 1.$$

Question 3. $u = 3x - 2, v = x + 5$ donc $u' = 3, v' = 1$.

$$h'(x) = 3(x + 5) + (3x - 2) \times 1 = 3x + 15 + 3x - 2 = 6x + 13.$$

Exercice 53

Calculer la dérivée de chaque fonction en utilisant la formule du quotient.

1. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ pour $x \neq 1$
2. $g(x) = \frac{2x}{x^2+1}$
3. $h(x) = \frac{x^2-3}{x+2}$ pour $x \neq -2$

Coup de pouce 1. Formule du quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. Bien identifier u, v, u', v' avant de calculer.

Corrigé

Question 1. $u = x + 1, v = x - 1, u' = 1, v' = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x - 1) - (x + 1) \times 1}{(x - 1)^2} = \frac{x - 1 - x - 1}{(x - 1)^2} = \frac{-2}{(x - 1)^2}.$$

Question 2. $u = 2x, v = x^2 + 1, u' = 2, v' = 2x$.

$$g'(x) = \frac{2(x^2 + 1) - 2x \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^2 + 2 - 4x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}.$$

Question 3. $u = x^2 - 3, v = x + 2, u' = 2x, v' = 1$.

$$h'(x) = \frac{2x(x + 2) - (x^2 - 3)}{(x + 2)^2} = \frac{2x^2 + 4x - x^2 + 3}{(x + 2)^2} = \frac{x^2 + 4x + 3}{(x + 2)^2}.$$

On peut factoriser : $x^2 + 4x + 3 = (x + 1)(x + 3)$ donc $h'(x) = \frac{(x + 1)(x + 3)}{(x + 2)^2}$.

Rappel — Signe de la dérivée et sens de variation

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- ▶ Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **strictement croissante** sur I .
- ▶ Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **strictement décroissante** sur I .
- ▶ Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **constante** sur I .

Pour dresser le tableau de variations de f , on étudie le signe de f' sur son domaine de définition.

Exercice 54

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$, puis déterminer le signe de $f'(x)$.
3. En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

Coup de pouce 1. $f'(x)$ est une fonction affine. Son signe change au point où elle s'annule.

Corrigé

Question 1.

$$f'(x) = 2x - 6.$$

Question 2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

$f'(x) < 0$ pour $x < 3$ et $f'(x) > 0$ pour $x > 3$.

Question 3. $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$.

f est strictement décroissante sur $] -\infty ; 3]$ et strictement croissante sur $[3 ; +\infty[$.

Le minimum de f est -4 , atteint en $x = 3$.

Exercice 55

Soit $g(x) = -x^3 + 3x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$.
2. Résoudre $g'(x) = 0$, puis étudier le signe de $g'(x)$.
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.

Coup de pouce 1. $g'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x^2 - 1) = -3(x - 1)(x + 1)$. Utiliser un tableau de signes.

Corrigé

Question 1.

$$g'(x) = -3x^2 + 3.$$

Question 2. $g'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = -1$ ou $x = 1$.

On factorise : $g'(x) = -3(x - 1)(x + 1)$.

Tableau de signes :

- ▶ $g'(x) < 0$ pour $x < -1$,
- ▶ $g'(x) > 0$ pour $-1 < x < 1$,
- ▶ $g'(x) < 0$ pour $x > 1$.

Question 3. $g(-1) = -2$, $g(1) = 2$.

g est strictement décroissante sur $] -\infty ; -1]$, strictement croissante sur $[-1 ; 1]$, strictement décroissante sur $[1 ; +\infty[$.

Exercice 56

Soit $h(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $h'(x)$ à l'aide de la formule du quotient.
2. Étudier le signe de $h'(x)$.
3. En déduire le tableau de variations de h .

Coup de pouce 1. Le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ est toujours positif. Le signe de $h'(x)$ dépend uniquement du numérateur.

Corrigé

Question 1. $u = x, v = x^2 + 1, u' = 1, v' = 2x$.

$$h'(x) = \frac{1 \times (x^2 + 1) - x \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}.$$

Question 2. Le dénominateur $(x^2 + 1)^2 > 0$ pour tout x . Le signe de $h'(x)$ est celui de $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$.

$h'(x) > 0$ pour $-1 < x < 1$ et $h'(x) < 0$ pour $x < -1$ ou $x > 1$.

Question 3. $h(-1) = -\frac{1}{2}, h(1) = \frac{1}{2}$.

h est strictement décroissante sur $] -\infty; -1]$, strictement croissante sur $[-1; 1]$, strictement décroissante sur $[1; +\infty[$.

Rappel — Résolution d'équations et d'inéquations du second degré

Soit $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$. On calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- ▶ Si $\Delta > 0$: deux solutions $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- ▶ Si $\Delta = 0$: une solution double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- ▶ Si $\Delta < 0$: pas de solution réelle.

Pour les inéquations : utiliser le signe du trinôme (même signe que a à l'extérieur des racines, signe opposé entre les racines).

Exercice 57

Résoudre chaque équation dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $2x^2 + 3x - 2 = 0$
3. $x^2 + 4x + 5 = 0$

Coup de pouce 1. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$, utiliser la formule des racines. Si $\Delta < 0$, conclure directement.

Corrigé

Question 1. $a = 1, b = -5, c = 6. \Delta = 25 - 24 = 1 > 0$.

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3.$$

Solutions : $\{2; 3\}$.

Question 2. $a = 2, b = 3, c = -2. \Delta = 9 + 16 = 25 > 0$.

$$x_1 = \frac{-3 - 5}{4} = -2, \quad x_2 = \frac{-3 + 5}{4} = \frac{1}{2}.$$

Solutions : $\{-2; \frac{1}{2}\}$.

Question 3. $a = 1, b = 4, c = 5. \Delta = 16 - 20 = -4 < 0$. Pas de solution réelle.

Exercice 58

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 4 \geq 0$
2. $-x^2 + 2x + 3 > 0$
3. $x^2 + 2x + 1 \leq 0$

Coup de pouce 1. Pour chaque inéquation, trouver d'abord les racines du trinôme, puis utiliser la règle du signe (même signe que a à l'extérieur des racines).

Corrigé

Question 1. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Racines : $x = -2$ et $x = 2$.

Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

Solution : $x \in] -\infty ; -2] \cup [2 ; +\infty[$.

Question 2. $-x^2 + 2x + 3 = 0$. $\Delta = 4 + 12 = 16$. Racines : $x = -1$ et $x = 3$.

Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est **positif entre les racines**.

Solution : $x \in] -1 ; 3[$.

Question 3. $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$. C'est un carré, toujours ≥ 0 .

$(x + 1)^2 \leq 0$ si et seulement si $(x + 1)^2 = 0$, c'est-à-dire $x = -1$.

Solution : $\{-1\}$.

Exercice 59

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^2 - 4 = 0$
2. $x^2 - x - 6 = 0$
3. $2x^2 - 8x + 6 = 0$

Coup de pouce 1. Pour la question 1 : $x^2 = 4$ donne $x = 2$ ou $x = -2$. Ne pas oublier la racine négative !

Corrigé

Question 1. $x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2$ ou $x = 2$.

Solutions : $\{-2 ; 2\}$.

Question 2. $\Delta = 1 + 24 = 25$. $x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$, $x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$.

Solutions : $\{-2 ; 3\}$.

Question 3. On simplifie par 2 : $x^2 - 4x + 3 = 0$. $\Delta = 16 - 12 = 4$.

$x_1 = \frac{4-2}{2} = 1$, $x_2 = \frac{4+2}{2} = 3$.

Solutions : $\{1 ; 3\}$.

Rappel — Puissances entières et règles de calcul

Pour tout réel $a \neq 0$ et tous entiers relatifs m, n :

- ▶ $a^m \times a^n = a^{m+n}$ (produit de puissances de même base)
- ▶ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ (quotient de puissances de même base)
- ▶ $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (puissance d'une puissance)
- ▶ $a^0 = 1$ et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Ces règles sont exactement celles que l'on retrouve pour les exposants de l'exponentielle : $e^a \times e^b = e^{a+b}$, $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$, $(e^a)^n = e^{na}$.

Exercice 60

Simplifier en utilisant les règles des puissances.

1. $2^3 \times 2^5$
2. $\frac{5^7}{5^3}$
3. $(3^2)^4$
4. 7^0

Coup de pouce 1. Produit : on additionne les exposants. Quotient : on soustrait. Puissance de puissance : on multiplie.

Corrigé

Question 1. $2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} = 2^8 = 256$.

Question 2. $\frac{5^7}{5^3} = 5^{7-3} = 5^4 = 625$.

Question 3. $(3^2)^4 = 3^{2 \times 4} = 3^8 = 6561$.

Question 4. $7^0 = 1$ (par convention pour tout réel non nul).

Exercice 61

Ecrire sous la forme a^n (une seule puissance).

1. $\frac{10^5 \times 10^3}{10^2}$
2. $\left(\frac{2^3}{2}\right)^2$
3. $3^{-2} \times 3^5 \times 3^{-1}$

Coup de pouce 1. Traiter étape par étape : d'abord le numérateur, puis le quotient, puis la puissance extérieure s'il y en a une.

Corrigé

Question 1.

$$\frac{10^5 \times 10^3}{10^2} = \frac{10^{5+3}}{10^2} = \frac{10^8}{10^2} = 10^{8-2} = 10^6.$$

Question 2.

$$\left(\frac{2^3}{2}\right)^2 = (2^{3-1})^2 = (2^2)^2 = 2^{2 \times 2} = 2^4 = 16.$$

Question 3.

$$3^{-2} \times 3^5 \times 3^{-1} = 3^{-2+5+(-1)} = 3^2 = 9.$$

Exercice 62

Par analogie avec les puissances, simplifier les expressions suivantes (écrire sous la forme e^k).

1. $e^2 \times e^3 \times e^{-1}$
2. $\frac{(e^3)^2}{e^4}$
3. $\frac{e^5 \times e^{-2}}{(e^2)^3}$

Coup de pouce 1. Les règles sont les mêmes : $e^a \times e^b = e^{a+b}$, $(e^a)^n = e^{na}$, $e^a / e^b = e^{a-b}$.

Corrigé

Question 1.

$$e^2 \times e^3 \times e^{-1} = e^{2+3+(-1)} = e^4.$$

Question 2.

$$\frac{(e^3)^2}{e^4} = \frac{e^6}{e^4} = e^{6-4} = e^2.$$

Question 3.

$$\frac{e^5 \times e^{-2}}{(e^2)^3} = \frac{e^{5+(-2)}}{e^6} = \frac{e^3}{e^6} = e^{3-6} = e^{-3}.$$

Rappel — Suites geometriques et coefficient multiplicateur

Une suite (u_n) est **geometrique** de raison q si pour tout n : $u_{n+1} = q \times u_n$.

Formule explicite : $u_n = u_0 \times q^n$.

Lien avec l'exponentielle : la suite $u_n = u_0 \times e^{rn}$ est geometrique de raison $q = e^r$, car $u_{n+1} = u_0 \times e^{r(n+1)} = e^r \times u_n$.

Le coefficient multiplicateur d'une augmentation de $t\%$ est $q = 1 + \frac{t}{100}$.

Exercice 63

Soit (u_n) la suite geometrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 2$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Donner la formule explicite de u_n .
3. Calculer u_{10} .

Coup de pouce 1. $u_{n+1} = q \times u_n$. Formule explicite : $u_n = u_0 \times q^n$.

Corrigé

Question 1. $u_1 = 5 \times 2 = 10$, $u_2 = 10 \times 2 = 20$, $u_3 = 20 \times 2 = 40$.

Question 2. $u_n = 5 \times 2^n$.

Question 3. $u_{10} = 5 \times 2^{10} = 5 \times 1024 = 5120$.

Exercice 64

Un capital de 1 000 euros est place a un taux annuel de 3 %. On note C_n le capital au bout de n annees.

1. Quel est le coefficient multiplicateur annuel ?
2. Exprimer C_n en fonction de n .
3. Calculer C_5 (arrondir au centime).

Coup de pouce 1. Coefficient multiplicateur pour une augmentation de $t\%$: $q = 1 + t/100$. Ici $t = 3$.

Corrigé

Question 1. Le coefficient multiplicateur est $q = 1 + \frac{3}{100} = 1,03$.

Question 2. (C_n) est geometrique de raison 1,03 et $C_0 = 1000$.

$$C_n = 1000 \times 1,03^n.$$

Question 3. $C_5 = 1000 \times 1,03^5 \approx 1000 \times 1,15927 \approx 1159,27$ euros.

Exercice 65

Une population de bacteries est modelisee par $P_n = 500 \times (1,5)^n$ ou n est le nombre d'heures.

1. Justifier que (P_n) est une suite géométrique. Donner sa raison.
2. Calculer P_0, P_1, P_2 et P_3 .
3. A partir de quel rang n a-t-on $P_n > 5000$? (on pourra tester quelques valeurs)

Coup de pouce 1. $P_{n+1}/P_n = (1,5)^{n+1}/(1,5)^n = 1,5$: le quotient est constant.

Corrigé

Question 1. $P_{n+1} = 500 \times (1,5)^{n+1} = 1,5 \times 500 \times (1,5)^n = 1,5 \times P_n$.

Le quotient $P_{n+1}/P_n = 1,5$ est constant : (P_n) est géométrique de raison $q = 1,5$.

Question 2. $P_0 = 500, P_1 = 750, P_2 = 1125, P_3 = 1687,5$.

Question 3. On calcule : $P_4 = 2531,25, P_5 \approx 3796,9, P_6 \approx 5695,3$.

$P_5 \approx 3797 < 5000$ et $P_6 \approx 5695 > 5000$.

A partir du rang $n = 6$, on a $P_n > 5000$.

Exercice 66

On considère la fonction exponentielle, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$.

1. Énoncer la propriété qui caractérise la fonction exponentielle (équation différentielle et condition initiale).
2. En déduire la valeur de $\exp'(0)$.
3. Justifier que $e^0 = 1$.

Corrigé

Question 1. La fonction exponentielle est l'unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$f'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

Question 2. Comme $f'(x) = f(x)$ pour tout x , en particulier pour $x = 0$:

$$\exp'(0) = \exp(0) = 1.$$

Question 3. C'est la condition initiale de la définition : $f(0) = 1$, donc $e^0 = 1$.

Exercice 67

Justifier chacune des affirmations suivantes.

1. $e^x > 0$ pour tout réel x .
2. $e^x \neq 0$ pour tout réel x .
3. Pour $x < 0$, e^x est compris entre 0 et 1.

Coup de pouce 1. Pour la question 3, utiliser que $e^0 = 1$ et que l'exponentielle est strictement croissante : si $x < 0$ alors $e^x < e^0 = 1$.

Corrigé

Question 1. La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$. C'est une propriété fondamentale qui découle du fait que $\exp$ ne s'annule jamais et que $\exp(0) = 1 > 0$.

Question 2. C'est une conséquence directe de la stricte positivité : $e^x > 0$ implique $e^x \neq 0$.

Question 3. Pour $x < 0$:

- $e^x > 0$ (stricte positivité),
- $x < 0 = \text{exposant de } e^0$, et comme $\exp$ est strictement croissante, $e^x < e^0 = 1$.

Donc $0 < e^x < 1$.

Exercice 68

Parmi les affirmations suivantes, indiquer si elles sont vraies ou fausses et justifier.

- e^{-3} est un nombre négatif.
- Il existe un réel x tel que $e^x = 0$.
- La tangente à la courbe de $\exp$ au point d'abscisse 0 a pour équation $y = x + 1$.
- $e^1 \approx 2,718$.

Corrigé

Question 1. Faux. $e^{-3} > 0$ (l'exponentielle est toujours strictement positive). On a $e^{-3} = \frac{1}{e^3} \approx 0,05$.

Question 2. Faux. L'exponentielle ne s'annule jamais : $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Question 3. Vrai. La tangente en $x = 0$ a pour équation :

$$y = \exp'(0)(x - 0) + \exp(0) = 1 \times x + 1 = x + 1.$$

Question 4. Vrai. $e = e^1 \approx 2,71828\dots$, que l'on arrondit à 2,718.

Exercice 69

Simplifier chaque expression sous la forme e^k ou k est un entier.

- $e^4 \times e^{-1}$
- $\frac{e^9}{e^5}$
- $(e^{-2})^3$
- $e^3 \times e^{-3}$

Corrigé

Question 1. $e^4 \times e^{-1} = e^{4+(-1)} = e^3$.

Question 2. $\frac{e^9}{e^5} = e^{9-5} = e^4$.

Question 3. $(e^{-2})^3 = e^{(-2) \times 3} = e^{-6}$.

Question 4. $e^3 \times e^{-3} = e^{3+(-3)} = e^0 = 1$.

Exercice 70

Simplifier les expressions suivantes (les exposants sont des expressions en x).

- $e^{x+1} \times e^{x-1}$
- $\frac{e^{3x}}{e^x}$
- $(e^x)^2 \times e^{-2x}$
- $\frac{e^{2x} \times e^{-x}}{e^{x+3}}$

Coup de pouce 1. Appliquer les mêmes règles que pour les nombres : additionner les exposants pour un produit, soustraire pour un quotient. Simplifier l'expression algébrique obtenue.

Corrigé

Question 1.

$$e^{x+1} \times e^{x-1} = e^{(x+1)+(x-1)} = e^{2x}.$$

Question 2.

$$\frac{e^{3x}}{e^x} = e^{3x-x} = e^{2x}.$$

Question 3.

$$(e^x)^2 \times e^{-2x} = e^{2x} \times e^{-2x} = e^{2x-2x} = e^0 = 1.$$

Question 4.

$$\frac{e^{2x} \times e^{-x}}{e^{x+3}} = \frac{e^{2x-x}}{e^{x+3}} = \frac{e^x}{e^{x+3}} = e^{x-(x+3)} = e^{-3}.$$

Exercice 71 ♦♦

Ecrire sous la forme $A \times e^{f(x)}$ la plus simple possible.

1. $3e^{2x} \times 2e^x$
2. $\frac{4e^{5x}}{2e^{2x}}$
3. $(2e^x)^3$

Corrigé

Question 1.

$$3e^{2x} \times 2e^x = (3 \times 2) \times e^{2x+x} = 6e^{3x}.$$

Question 2.

$$\frac{4e^{5x}}{2e^{2x}} = \frac{4}{2} \times e^{5x-2x} = 2e^{3x}.$$

Question 3.

$$(2e^x)^3 = 2^3 \times (e^x)^3 = 8e^{3x}.$$

Remédiation C3 — Signe, croissance et courbe

Exercice 72 ♦

Répondre par vrai ou faux en justifiant.

1. $e^x > 0$ pour tout réel x .
2. Si $a < b$, alors $e^a < e^b$.
3. $e^{-2} > e^{-1}$.

Coup de pouce 1. La fonction exponentielle est strictement positive et strictement croissante.

Corrigé

Les deux premières affirmations sont vraies. La troisième est fausse car $-2 < -1$, donc $e^{-2} < e^{-1}$.

Exercice 73 ♦

Calculer e^{-1} , e^0 et e à 10^{-2} près, placer les points correspondants, puis tracer une courbe compatible avec la croissance de l'exponentielle.

Corrigé

$e^{-1} \approx 0,37$, $e^0 = 1$ et $e \approx 2,72$. La courbe passe par ces trois points et monte de gauche à droite.

Exercice 74 ♦♦

Soit $f(x) = e^x - x - 1$.

1. Calculer $f(0)$ et $f'(x)$.
2. Étudier le signe de f' puis les variations de f .
3. En déduire que $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x .

Corrigé

$f(0) = 0$ et $f'(x) = e^x - 1$. Le signe de f' est celui de x : f décroît jusqu'à 0, puis croît. Son minimum vaut 0, donc $e^x - x - 1 \geq 0$.

Remédiation C4 — Dériver $t \mapsto e^{at}$

Exercice 75

Dériver $f(x) = e^{5x}$, $g(x) = e^{-2x}$ et $h(x) = 3e^{4x}$.

Coup de pouce 1. Utiliser $(e^{ax})' = ae^{ax}$.

Corrigé

$$f'(x) = 5e^{5x}, g'(x) = -2e^{-2x} \text{ et } h'(x) = 12e^{4x}.$$

Exercice 76

On pose $p(x) = (2x + 1)e^{-x}$.

1. Calculer $p'(x)$ et la factoriser.
2. Étudier son signe puis les variations de p .

Corrigé

$p'(x) = 2e^{-x} - (2x + 1)e^{-x} = (1 - 2x)e^{-x}$. Comme $e^{-x} > 0$, p' a le signe de $1 - 2x$: p croît jusqu'à $1/2$, puis décroît.

Remédiation C5 — Lire et exploiter un modèle exponentiel

Exercice 77

Une quantité est modélisée par $Q(t) = 800e^{0,03t}$ pour $t \geq 0$.

1. Calculer $Q(0)$ et $Q(10)$, arrondi à l'unité.
2. Calculer $Q'(t)$ et interpréter son signe.

Corrigé

$Q(0) = 800$ et $Q(10) = 800e^{0,3} \approx 1080$. De plus, $Q'(t) = 24e^{0,03t} > 0$: le modèle est croissant.

Exercice 78

Une concentration est modélisée par $C(t) = 20e^{-0,2t}$.

1. Calculer $C(0)$, $C(5)$ et $C(10)$ à 10^{-2} près.
2. Montrer que $C(t + 5) = e^{-1}C(t)$ et interpréter.
3. Choisir, parmi trois courbes fournies par le professeur, celle qui représente ce modèle et justifier.

Corrigé

$C(0) = 20$, $C(5) = 20e^{-1} \approx 7,36$ et $C(10) = 20e^{-2} \approx 2,71$. La relation demandée traduit un facteur multiplicatif constant e^{-1} toutes les cinq unités de temps. La courbe correcte est positive, passe par $(0; 20)$ et décroît.

Corrigé

1. La fonction exponentielle a pour dérivée elle-même, donc :

$$f'(x) = e^x.$$

On constate que $f'(x) = f(x)$ pour tout réel x .

2. Pour tout réel x , on a $f'(x) = e^x = f(x)$. La fonction f vérifie donc l'équation $f' = f$.
3. On calcule :

$$f(0) = e^0 = 1.$$

4. D'après le cours, la fonction exponentielle est l'**unique** fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. La fonction $x \mapsto e^x$ vérifie ces deux conditions, c'est donc bien cette unique fonction.
5. $\exp(1) = e \approx 2,718$. Ce nombre est noté e et s'appelle le **nombre d'Euler**.

Corrigé

1. On dérive : $g'(x) = 2e^x$.
2. On a $g'(x) = 2e^x = g(x)$ pour tout réel x . Donc g vérifie bien l'équation $y' = y$.
3. On calcule $g(0) = 2e^0 = 2 \times 1 = 2$. La condition $y(0) = 1$ n'est **pas** vérifiée car $g(0) = 2 \neq 1$.
4. La fonction exponentielle est l'unique fonction vérifiant **simultanément** $y' = y$ et $y(0) = 1$. La fonction g vérifie $g' = g$ mais pas $g(0) = 1$. Elle ne peut donc pas être la fonction exponentielle. C'est un multiple de l'exponentielle, mais pas l'exponentielle elle-même.

Corrigé

1. $\exp(0) = e^0 = 1$.
2. La fonction exponentielle ne peut **jamais** s'annuler. En effet, par définition, pour tout réel x , $e^x > 0$. Aucune valeur de x ne peut donc donner $e^x = 0$.
3. Pour tout réel x , $e^x > 0$.
La fonction exponentielle est **strictement positive** sur $\mathbb{R}$ tout entier.
4. Puisque $e^x > 0$ pour tout réel x , il n'existe aucun réel x tel que $e^x = 0$. L'équation $e^x = 0$ n'a **aucune solution** dans $\mathbb{R}$.

Corrigé

1. **Vrai**. Par définition de la fonction exponentielle, $\exp(0) = 1$. C'est la condition initiale $y(0) = 1$.
2. **Vrai**. La fonction exponentielle est l'unique fonction vérifiant $y' = y$ et $y(0) = 1$. En particulier, $\exp'(x) = \exp(x)$ pour tout réel x .
3. **Vrai, mais imprécis**. L'affirmation $e^x \geq 0$ est vraie, mais on peut être plus précis : pour tout réel x , $e^x > 0$ (**strictement** positif). L'exponentielle ne s'annule jamais.
4. **Vrai**. $\exp(1) = e^1 = e \approx 2,718$. Le nombre e est défini comme l'image de 1 par la fonction exponentielle.
5. **Faux**. Pour tout réel x , $e^x > 0$. La fonction exponentielle est strictement positive, elle ne s'annule jamais. L'équation $e^x = 0$ n'a aucune solution.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. La fonction g est un produit $g(x) = f(x) \cdot e^{-x}$. Par la formule $(uv)' = u'v + uv'$:

$$g'(x) = f'(x) \cdot e^{-x} + f(x) \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}(f'(x) - f(x)).$$

2. Puisque $f'(x) = f(x)$, on obtient :

$$g'(x) = e^{-x}(f(x) - f(x)) = e^{-x} \times 0 = 0.$$

Donc $g'(x) = 0$ pour tout réel x .

3. Une fonction dont la dérivée est nulle sur $\mathbb{R}$ est constante sur $\mathbb{R}$. Donc il existe une constante C telle que $g(x) = C$ pour tout réel x .

4. En évaluant en $x = 0$: $g(0) = f(0) \cdot e^0 = f(0) \cdot 1 = f(0)$.

Donc $C = f(0)$ et pour tout réel x :

$$f(x) \cdot e^{-x} = f(0), \quad \text{soit} \quad f(x) = f(0) \cdot e^x.$$

5. Si $f(0) \neq 0$, alors $f(x) = f(0) \cdot e^x$. Comme $e^x > 0$ pour tout réel x et $f(0) \neq 0$, le produit $f(0) \cdot e^x$ n'est jamais nul : f ne s'annule jamais.

Si $f(0) = 0$, alors $f(x) = 0 \cdot e^x = 0$ pour tout réel x : f est la fonction nulle.

Corrigé

1. Par définition de la fonction exponentielle :

$$\exp(0) = 1 \quad \text{et} \quad \exp'(0) = \exp(0) = 1.$$

2. L'équation de la tangente à C au point d'abscisse $a = 0$ est :

$$y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + 1 \cdot x.$$

Donc l'équation de T est $y = x + 1$.

3. Pour $x = 0$: $y = 0 + 1 = 1 \neq 0$. La tangente ne passe **pas** par l'origine $O(0;0)$. Elle passe par le point $(0;1)$, qui est le point de tangence.

Remarque : la tangente coupe l'axe des abscisses en $x = -1$ (car $x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$).

4. Posons $h(x) = e^x - (x + 1)$. On a $h(0) = 1 - 1 = 0$ et $h'(x) = e^x - 1$.

$h'(0) = 0$ et $h''(x) = e^x > 0$ pour tout réel x .

Donc h' est strictement croissante. Comme $h'(0) = 0$, on a $h'(x) < 0$ pour $x < 0$ et $h'(x) > 0$ pour $x > 0$. Ainsi h admet un minimum en $x = 0$ avec $h(0) = 0$.

Donc $h(x) \geq 0$ pour tout réel x , c'est-à-dire $e^x \geq x + 1$. La courbe C est **au-dessus** de la tangente T .

Corrigé

1. On dérive :

$$h'(x) = 3e^x.$$

2. On compare $h'(x)$ et $h(x)$:

$$h'(x) = 3e^x \quad \text{et} \quad h(x) = 3e^x - 2.$$

Comme $h'(x) \neq h(x)$ (ils diffèrent de 2), h n'est **pas** solution de $y' = y$.

3. $h(0) = 3e^0 - 2 = 3 \times 1 - 2 = 1$. La condition $h(0) = 1$ est bien vérifiée.

4. Bien que $h(0) = 1$, la fonction h ne vérifie pas l'équation $y' = y$. La fonction exponentielle est l'unique solution de $y' = y$ avec $y(0) = 1$. Les **deux** conditions sont nécessaires.

Corrigé

1. Pour tout réel x , $\exp'(x) = \exp(x) > 0$ (la fonction exponentielle est strictement positive).
Une fonction dont la dérivée est strictement positive sur $\mathbb{R}$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
2. a) Soit $x > 0$. Comme $\exp$ est strictement croissante et $x > 0$, on a :

$$\exp(x) > \exp(0) = 1.$$

Donc $e^x > 1$ pour tout $x > 0$.

- b) Soit $x < 0$. Comme $\exp$ est strictement croissante et $x < 0$, on a :

$$\exp(x) < \exp(0) = 1.$$

Donc $e^x < 1$ pour tout $x < 0$.

3. Pour tout $x < 0$, on sait que $e^x > 0$ (l'exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$) et $e^x < 1$ (d'après la question 2b). Donc :

$$0 < e^x < 1 \quad \text{pour tout } x < 0.$$

4. Tableau de signes de $e^x - 1$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$e^x - 1$		$- \quad 0 \quad +$	

$$e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0.$$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. La fonction $g(x) = \frac{f(x)}{\exp(x)}$ est définie à condition que $\exp(x) \neq 0$. Or, pour tout réel x , $\exp(x) > 0$, donc $\exp(x) \neq 0$. La fonction g est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Par la formule du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u = f$ et $v = \exp$:

$$g'(x) = \frac{f'(x) \cdot \exp(x) - f(x) \cdot \exp'(x)}{[\exp(x)]^2}.$$

3. On utilise les hypothèses : $f'(x) = f(x)$ et $\exp'(x) = \exp(x)$. On remplace dans le numérateur :

$$f'(x) \cdot \exp(x) - f(x) \cdot \exp'(x) = f(x) \cdot \exp(x) - f(x) \cdot \exp(x) = 0.$$

Donc :

$$g'(x) = \frac{0}{[\exp(x)]^2} = 0 \quad \text{pour tout réel } x.$$

4. Une fonction dont la dérivée est nulle sur $\mathbb{R}$ est constante sur $\mathbb{R}$. Il existe donc une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que $g(x) = C$ pour tout réel x .
5. On calcule $g(0)$:

$$g(0) = \frac{f(0)}{\exp(0)} = \frac{1}{1} = 1.$$

Donc $C = 1$.

6. Pour tout réel x , $g(x) = 1$, c'est-à-dire :

$$\frac{f(x)}{\exp(x)} = 1, \quad \text{soit } f(x) = \exp(x).$$

Toute fonction f vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$ est nécessairement égale à $\exp$. La fonction exponentielle est donc **l'unique** fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Corrigé

1. $f(0) = 0 \cdot e^0 - e^0 + 1 = 0 - 1 + 1 = 0$.

2. On dérive en utilisant la formule du produit pour xe^x :

$$f'(x) = (xe^x)' - (e^x)' = (e^x + xe^x) - e^x = xe^x.$$

3. $f'(0) = 0 \cdot e^0 = 0$.

4. **Signe de $f'(x) = xe^x$.** Comme $e^x > 0$ pour tout x , le signe de $f'(x)$ est celui de x :

▶ $f'(x) < 0$ si $x < 0$: f est strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$.

▶ $f'(x) > 0$ si $x > 0$: f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

5. Le tableau de variations montre que f admet un **minimum global** en $x = 0$, avec $f(0) = 0$.

Par conséquent, $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

6. Puisque $f(x) \geq 0$, on a $xe^x - e^x + 1 \geq 0$, soit :

$$xe^x \geq e^x - 1 \quad \text{pour tout réel } x.$$

Corrigé

On utilise les propriétés algébriques de l'exponentielle : $e^a \times e^b = e^{a+b}$, $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ et $(e^a)^n = e^{na}$.

1. $e^3 \times e^5 = e^{3+5} = e^8$.

2. $\frac{e^7}{e^2} = e^{7-2} = e^5$.

3. $(e^2)^4 = e^{2 \times 4} = e^8$.

4. $e^4 \times e^{-1} = e^{4+(-1)} = e^3$.

Corrigé

On applique les propriétés algébriques de l'exponentielle.

1. $e^x \times e^{2x} = e^{x+2x} = e^{3x}$.

2. $\frac{e^{3x}}{e^x} = e^{3x-x} = e^{2x}$.

3. $(e^x)^5 = e^{5x}$.

4. $e^{2x} \times e^{-x} \times e^{3x} = e^{2x+(-x)+3x} = e^{4x}$.

Corrigé

On utilise les propriétés : $e^a \times e^b = e^{a+b}$ et $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$.

1. $e^{x+1} \times e^{x-1} = e^{(x+1)+(x-1)} = e^{2x}$.

2. $\frac{e^{2x+3}}{e^{x+1}} = e^{(2x+3)-(x+1)} = e^{x+2}$.

3. $\frac{(e^x)^3}{e^{2x}} = \frac{e^{3x}}{e^{2x}} = e^{3x-2x} = e^x$.

4. $e^{x+2} \times e^{-(x-2)} = e^{(x+2)+(-x+2)} = e^4$.

Corrigé

1. **FAUX.** La bonne propriété est $e^{a+b} = e^a \times e^b$ (produit, pas somme).

Contre-exemple : $e^{1+1} = e^2 \approx 7,39$ alors que $e^1 + e^1 = 2e \approx 5,44$.

2. **FAUX.** La propriété $e^a \times e^b = e^{a+b}$ concerne la *somme* des exposants, pas leur produit. En général, $e^{ab} \neq e^a \times e^b$.

Contre-exemple : $e^{2 \times 3} = e^6$ alors que $e^2 \times e^3 = e^5$.

3. **VRAI.** En appliquant $e^{a+b} = e^a \times e^b$ avec $b = -x$ et $a = x$: $e^x \times e^{-x} = e^{x+(-x)} = e^0 = 1$, donc $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$.

4. **FAUX.** La bonne propriété est $(e^a)^n = e^{na}$ (produit na , pas somme $a + n$).

Contre-exemple : $(e^2)^3 = e^6$ alors que $e^{2+3} = e^5$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

Question 1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) > 0$ donc $g(x) = \frac{\exp(x+b)}{\exp(x)}$ est bien définie. Les fonctions $x \mapsto \exp(x+b)$ et $x \mapsto \exp(x)$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$, et $\exp(x) \neq 0$, donc g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient.

Question 2. En appliquant la règle du quotient avec $u(x) = \exp(x+b)$ et $v(x) = \exp(x)$:

$u'(x) = \exp(x+b)$ et $v'(x) = \exp(x)$.

$$g'(x) = \frac{\exp(x+b) \times \exp(x) - \exp(x+b) \times \exp(x)}{[\exp(x)]^2} = \frac{0}{[\exp(x)]^2} = 0.$$

Question 3. Comme $g'(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction g est constante sur $\mathbb{R}$.

Question 4. $g(0) = \frac{\exp(0+b)}{\exp(0)} = \frac{\exp(b)}{1} = \exp(b)$.

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$: $g(x) = \exp(b)$, c'est-à-dire $\frac{\exp(x+b)}{\exp(x)} = \exp(b)$, soit $\exp(x+b) = \exp(x) \times \exp(b)$.

En posant $x = a$, on obtient : $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$.

Corrigé

Question 1. On applique la propriété avec $b = -a$:

$$\exp(a) \times \exp(-a) = \exp(a + (-a)) = \exp(0) = 1.$$

Comme $\exp(a) > 0$, on peut diviser par $\exp(a)$:

$$\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}.$$

Question 2. On écrit $a - b = a + (-b)$ puis on applique la propriété :

$$\exp(a - b) = \exp(a + (-b)) = \exp(a) \times \exp(-b) = \exp(a) \times \frac{1}{\exp(b)} = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}.$$

Question 3. D'après la propriété fondamentale :

$$\exp(a) \times \exp(-a) = \exp(a + (-a)) = \exp(0) = 1.$$

Ce résultat découle directement de la question 1 : $\exp(a) \times \frac{1}{\exp(a)} = 1$.

Corrigé

Question 1. On reconnaît une identité remarquable $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ avec $a = e^{2x}$ et $b = 1$:

$$A = (e^{2x})^2 - 1^2 = e^{4x} - 1.$$

Question 2. On développe $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$$B = (e^x)^2 + 2 \times e^x \times e^{-x} + (e^{-x})^2 = e^{2x} + 2 \times 1 + e^{-2x} = e^{2x} + 2 + e^{-2x}.$$

Question 3. Comme $e^x = 2$, on obtient :

$$e^{3x} + e^{-3x} = (e^x)^3 + (e^{-x})^3 = 2^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 8 + \frac{1}{8} = \frac{65}{8}.$$

Question 4. Au numérateur : $e^{3x} \times e^{-x} = e^{3x-x} = e^{2x}$.

Au dénominateur : $(e^x)^2 = e^{2x}$.

$$\text{Donc } C = \frac{e^{2x}}{e^{2x}} = 1.$$

Corrigé

On utilise $e^{2x} = (e^x)^2$ pour ramener les expressions à des formes algébriques connues en posant $X = e^x$.

$$1. A = e^{2x} - e^x = e^x (e^x - 1).$$

On factorise par e^x (facteur commun).

$$2. B = e^{2x} - 2e^x + 1 = (e^x)^2 - 2e^x + 1.$$

On reconnaît $(X - 1)^2$ avec $X = e^x$: $B = (e^x - 1)^2$.

$$3. C = e^{2x} - 9 = (e^x)^2 - 3^2.$$

On reconnaît $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$: $C = (e^x - 3)(e^x + 3)$.

$$4. D = e^{2x} + 5e^x + 6. \text{ On pose } X = e^x : D = X^2 + 5X + 6.$$

On cherche deux nombres de somme 5 et de produit 6 : ce sont 2 et 3.

$$\text{Donc } D = (X + 2)(X + 3) = (e^x + 2)(e^x + 3).$$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

On note $\mathcal{D}(n)$ la propriété : « $\exp(na) = [\exp(a)]^n$ ».

Question 1 — Initialisation. Pour $n = 1$: $\exp(1 \times a) = \exp(a) = [\exp(a)]^1$. La propriété $\mathcal{D}(1)$ est vraie.

Question 2 — Hérédité. Soit $k \geq 1$ un entier tel que $\mathcal{D}(k)$ est vraie, c'est-à-dire $\exp(ka) = [\exp(a)]^k$.

Montrons $\mathcal{D}(k + 1)$:

$$\begin{aligned} \exp((k + 1)a) &= \exp(ka + a) \\ &= \exp(ka) \times \exp(a) \quad (\text{propriété } \exp(u + v) = \exp(u) \exp(v)) \\ &= [\exp(a)]^k \times \exp(a) \quad (\text{hypothèse de récurrence}) \\ &= [\exp(a)]^{k+1}. \end{aligned}$$

La propriété $\mathcal{D}(k + 1)$ est donc vraie.

Question 3 — Conclusion. Par le principe de récurrence, la propriété $\mathcal{D}(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall a \in \mathbb{R}, \quad \exp(na) = [\exp(a)]^n.$$

Question 4. Pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel a :

$$\exp(-na) = \frac{1}{\exp(na)} = \frac{1}{[\exp(a)]^n}.$$

La première égalité vient de $\exp(-u) = \frac{1}{\exp(u)}$ et la seconde de la propriété démontrée.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

Question 1. Pour tout réel x :

$$f(-x) = \frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = f(x).$$

La fonction f est paire. Sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Question 2. $f(0) = \frac{e^0 + e^0}{2} = \frac{1+1}{2} = 1.$

Question 3. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions exponentielles. On a :

$$f'(x) = \frac{e^x + (-1)e^{-x}}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Question 4. On étudie le signe de $f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

$$f'(x) \geq 0 \iff e^x \geq e^{-x} \iff x \geq -x \iff x \geq 0 \text{ (car exp est strictement croissante)}.$$

Donc f est décroissante sur $] -\infty ; 0]$ et croissante sur $[0 ; +\infty[$. Le minimum de f est $f(0) = 1$.

Question 5. On pose $g(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ et on calcule :

$$[f(x)]^2 - [g(x)]^2 = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{4}.$$

On développe les carrés :

$$\begin{aligned} (e^x + e^{-x})^2 &= e^{2x} + 2 + e^{-2x}, \\ (e^x - e^{-x})^2 &= e^{2x} - 2 + e^{-2x}. \end{aligned}$$

Donc :

$$[f(x)]^2 - [g(x)]^2 = \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

Corrigé

La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$. Donc si $a < b$, alors $e^a < e^b$.

1. On a $3 < 5$, donc par croissance de l'exponentielle : $e^3 < e^5$.

2. On a $-2 < -1$, donc par croissance de l'exponentielle : $e^{-2} < e^{-1}$.

3. On a $-3 < 0$, donc par croissance de l'exponentielle : $e^{-3} < e^0 = 1$.

Corrigé

On classe d'abord les exposants dans l'ordre croissant :

$$-2 < -1 < 0 < 1 < 2.$$

La fonction exponentielle étant **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, elle conserve l'ordre. Donc :

$$e^{-2} < e^{-1} < e^0 < e^1 < e^2,$$

c'est-à-dire :

$$e^{-2} < e^{-1} < 1 < e < e^2.$$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. D'après le cours, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

La fonction exponentielle tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$.

2. D'après le cours, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

La fonction exponentielle tend vers 0 quand x tend vers $-\infty$. L'axe des abscisses est asymptote horizontale à la courbe de $\exp$ en $-\infty$.

3. Quand $x \rightarrow +\infty$, on a $-x \rightarrow -\infty$, donc par composition :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0.$$

Corrigé

1. **Vrai.** La fonction exponentielle est **strictement positive** sur $\mathbb{R}$: pour tout réel x , $e^x > 0$. C'est une propriété fondamentale du cours.

2. **Faux.** Puisque $e^x > 0$ pour tout réel x , la fonction exponentielle ne prend **jamais** de valeur négative (ni nulle).

3. **Vrai.** Si $x \geq 0$, alors $-x \leq 0$. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante,

$$0 < e^{-x} \leq e^0 = 1.$$

Corrigé

La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, donc pour tous réels a et b :

$$e^a > e^b \iff a > b ; \quad e^a \leq e^b \iff a \leq b.$$

1. $e^x > e^3 \iff x > 3$.

L'ensemble des solutions est $]3; +\infty[$.

2. $e^{2x} \leq e^5 \iff 2x \leq 5 \iff x \leq \frac{5}{2}$.

L'ensemble des solutions est $\left]-\infty; \frac{5}{2}\right]$.

3. $e^{-x} \geq e^2 \iff -x \geq 2 \iff x \leq -2$.

L'ensemble des solutions est $\left]-\infty; -2\right]$.

Corrigé

1. Par la propriété $e^{a+b} = e^a e^b$,

$$f(x) = e^{-1} e^{2x}.$$

La dérivée de $x \mapsto e^{2x}$ vaut $2e^{2x}$, donc

$$f'(x) = e^{-1} \times 2e^{2x} = 2e^{2x-1}.$$

Comme $e^{2x-1} > 0$ pour tout réel x , on a $f'(x) = 2e^{2x-1} > 0$ pour tout réel x .

2. Puisque $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

3. On obtient

$$f(-1) = e^{-3}, \quad f(0) = e^{-1}, \quad f(1) = e.$$

4. La courbe passe par $(-1; e^{-3})$, $(0; e^{-1})$ et $(1; e)$ et elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. On factorise par e^x :

$$e^x - x = e^x (1 - x e^{-x}).$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissance comparée : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x).

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x e^{-x}) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

Par produit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x) = +\infty$.

L'exponentielle « domine » la fonction linéaire en $+\infty$.

2. Quand $x \rightarrow -\infty$:

► $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$;

► $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$.

Par somme : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x) = -\infty$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. On calcule :

$$g(0) = e^0 - 0 - 2 = 1 - 2 = -1 < 0.$$

$$g(2) = e^2 - 2 - 2 = e^2 - 4 \approx 7,389 - 4 = 3,389 > 0.$$

2. La fonction g est la somme de la fonction exponentielle (continue sur $\mathbb{R}$) et de la fonction affine $x \mapsto -x - 2$ (continue sur $\mathbb{R}$). Donc g est **continue** sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur $[0; 2]$.

3. On a :

► g est continue sur $[0; 2]$;

► $g(0) = -1 < 0$ et $g(2) = e^2 - 4 > 0$.

D'après le **théorème des valeurs intermédiaires**, comme 0 est compris entre $g(0)$ et $g(2)$, il existe au moins un réel $c \in [0; 2]$ tel que $g(c) = 0$, c'est-à-dire $e^c = c + 2$.

L'équation $e^x = x + 2$ admet donc au moins une solution dans $[0; 2]$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = e^x$ pour tout réel x .

La fonction exponentielle est égale à sa propre dérivée.

2. Pour tout réel x , $e^x > 0$ (la fonction exponentielle est **strictement positive**).

Donc $f'(x) = e^x > 0$ pour tout réel x .

3. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée f' est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

D'après le théorème liant signe de la dérivée et variations, la fonction f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

4. Une fonction strictement croissante sur un intervalle est **injective** : elle ne prend jamais deux fois la même valeur.

► Si $e^a = e^b$, alors nécessairement $a = b$ (injectivité). Réciproquement, si $a = b$, alors $e^a = e^b$. D'où $e^a = e^b \iff a = b$.

- Une fonction strictement croissante conserve l'ordre strict : si $a < b$, alors $f(a) < f(b)$, c'est-à-dire $e^a < e^b$. Réciproquement, si $e^a < e^b$, alors $a < b$ (sinon $a \geq b$ entraînerait $e^a \geq e^b$, contradiction). D'où $e^a < e^b \iff a < b$.

Corrigé

1. $h(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 0 - 1 = 0$.
2. La fonction h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$h'(x) = e^x - 1.$$

Étude du signe de $h'(x)$:

- $h'(x) = 0 \iff e^x = 1 \iff x = 0$.
- Si $x < 0$, alors $e^x < e^0 = 1$ (croissance de $\exp$), donc $h'(x) < 0$.
- Si $x > 0$, alors $e^x > 1$, donc $h'(x) > 0$.

3. Tableau de variations de h :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
$h(x)$	$+\infty$	$\searrow 0$	$\nearrow +\infty$

La fonction h admet un **minimum** en $x = 0$, égal à $h(0) = 0$.

4. D'après le tableau de variations, $h(x) \geq h(0) = 0$ pour tout réel x .

Donc $e^x - x - 1 \geq 0$, c'est-à-dire :

$$e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout réel } x.$$

L'égalité a lieu si et seulement si $x = 0$.

5. La droite $T : y = x + 1$ est la tangente à la courbe C de $\exp$ au point $A(0; 1)$. L'inégalité $e^x \geq x + 1$ signifie que la courbe C est **au-dessus** de sa tangente T en tout point. La courbe et la tangente ne se touchent qu'au point $A(0; 1)$. Cela traduit la **convexité** de la fonction exponentielle.

Corrigé

On utilise la dérivée officielle de $x \mapsto e^{ax}$ et, lorsque l'exposant contient une constante, la propriété $e^{ax+b} = e^b e^{ax}$.

Question 1. Pour $a = 3$,

$$f'(x) = 3e^{3x}.$$

Question 2. Pour $a = -1$,

$$g'(x) = -e^{-x}.$$

Question 3. Comme $e^{x+1} = e e^x$,

$$h'(x) = e^{x+1}.$$

Question 4. Comme $e^{2x-3} = e^{-3} e^{2x}$,

$$k'(x) = 2e^{2x-3}.$$

Corrigé

On utilise la formule $(e^{ax})' = ae^{ax}$ combinée à la règle $(k \cdot v)' = k \cdot v'$.

Question 1.

$$f'(x) = 5 \times 2e^{2x} = \boxed{10e^{2x}}.$$

Question 2.

$$g'(x) = -3 \times (-4) e^{-4x} = \boxed{12 e^{-4x}}.$$

Question 3.

$$h'(x) = \frac{1}{2} \times 1 \times e^x = \boxed{\frac{e^x}{2}}.$$

Corrigé

On dérive terme à terme en utilisant $(e^x)' = e^x$ et $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

Question 1.

$$f'(x) = e^x + 1.$$

Question 2. On a $(e^{-x})' = -e^{-x}$ et $(e^x)' = e^x$, donc :

$$g'(x) = -e^{-x} + e^x = \boxed{e^x - e^{-x}}.$$

Question 3.

$$h'(x) = 1 - e^x.$$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

On applique la formule $(e^u)' = u' e^u$.

Question 1. On pose $u(x) = x^2$, donc $u'(x) = 2x$.

$$f'(x) = 2x e^{x^2}.$$

Question 2. On pose $u(x) = x^2 + 1$, donc $u'(x) = 2x$.

$$g'(x) = 2x e^{x^2+1}.$$

Remarque : on peut aussi écrire $g(x) = e^1 \times e^{x^2} = e e^{x^2}$, et alors $g'(x) = e \times 2x e^{x^2} = 2x e^{x^2+1}$, ce qui confirme le résultat.

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$.

On a $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

Par la formule du produit :

$$f'(x) = u'(x) v(x) + u(x) v'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x.$$

Question 2. On factorise par e^x :

$$f'(x) = e^x + x e^x = \boxed{(x+1) e^x}.$$

Question 3. On résout $f'(x) = 0$, soit $(x+1) e^x = 0$.

Comme $e^x > 0$ pour tout réel x , le produit est nul si et seulement si $x+1 = 0$, c'est-à-dire $\boxed{x = -1}$.

Question 4. Le signe de $f'(x)$ est celui de $x+1$ (car $e^x > 0$).

- ▶ Si $x < -1$, alors $f'(x) < 0$: f est décroissante.
- ▶ Si $x > -1$, alors $f'(x) > 0$: f est croissante.

La fonction f admet un minimum en $x = -1$, avec $f(-1) = -1 \times e^{-1} = -\frac{1}{e}$.

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = 2x - 1$ et $v(x) = e^{-x}$.

On a $u'(x) = 2$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

Par la formule du produit :

$$f'(x) = 2e^{-x} + (2x - 1) \times (-e^{-x}) = 2e^{-x} - (2x - 1)e^{-x}.$$

Question 2. On factorise par e^{-x} :

$$f'(x) = [2 - (2x - 1)]e^{-x} = \boxed{(3 - 2x)e^{-x}}.$$

Question 3. Comme $e^{-x} > 0$ pour tout réel x , le signe de $f'(x)$ est celui de $3 - 2x$.

- ▶ $3 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < \frac{3}{2} : f$ est croissante sur $\left]-\infty; \frac{3}{2}\right]$.
- ▶ $3 - 2x < 0 \Leftrightarrow x > \frac{3}{2} : f$ est décroissante sur $\left[\frac{3}{2}; +\infty\right[$.

La fonction f admet un maximum en $x = \frac{3}{2}$, avec $f\left(\frac{3}{2}\right) = (3 - 1)e^{-3/2} = 2e^{-3/2}$.

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = e^x$ et $v(x) = x + 1$.

On a $u'(x) = e^x$ et $v'(x) = 1$.

Par la formule du quotient :

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{e^x(x + 1) - e^x \times 1}{(x + 1)^2}.$$

Question 2. On factorise le numérateur par e^x :

$$f'(x) = \frac{e^x[(x + 1) - 1]}{(x + 1)^2} = \boxed{\frac{xe^x}{(x + 1)^2}}.$$

Question 3. Sur $] -1; +\infty[$, on a $(x + 1)^2 > 0$ et $e^x > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de x .

- ▶ Si $-1 < x < 0$, alors $f'(x) < 0 : f$ est décroissante sur $] -1; 0]$.
- ▶ Si $x > 0$, alors $f'(x) > 0 : f$ est croissante sur $[0; +\infty[$.

La fonction f admet un minimum en $x = 0$, avec $f(0) = \frac{e^0}{0 + 1} = 1$.

Corrigé

Question 1. On pose $u(x) = x^2 - 1$ et $v(x) = e^x$.

On a $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = e^x$.

Par la formule du produit :

$$f'(x) = 2xe^x + (x^2 - 1)e^x.$$

Question 2. On factorise par e^x :

$$f'(x) = [2x + x^2 - 1]e^x = \boxed{(x^2 + 2x - 1)e^x}.$$

Question 3. On résout $x^2 + 2x - 1 = 0$.

Le discriminant est $\Delta = 4 + 4 = 8$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$.

Les solutions sont :

$$x_1 = \frac{-2 - 2\sqrt{2}}{2} = -1 - \sqrt{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2 + 2\sqrt{2}}{2} = -1 + \sqrt{2}.$$

Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x^2 + 2x - 1$:

- ▶ $f'(x) > 0$ sur $] -\infty ; -1 - \sqrt{2}[\cup] -1 + \sqrt{2} ; +\infty[$;
- ▶ $f'(x) < 0$ sur $] -1 - \sqrt{2} ; -1 + \sqrt{2}[$.

Donc f admet un **maximum local** en $x_1 = -1 - \sqrt{2}$ et un **minimum local** en $x_2 = -1 + \sqrt{2}$.

Corrigé

Approfondissement — Vers la Terminale

Question 1. On pose $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$.

On a $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

Par la formule du produit :

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x = e^x[1 + (x - 1)] = \boxed{x e^x}.$$

Question 2. Comme $e^x > 0$ pour tout réel x , le signe de $f'(x)$ est celui de x :

- ▶ Si $x < 0$, $f'(x) < 0$: f est décroissante sur $] -\infty ; 0]$.
- ▶ Si $x > 0$, $f'(x) > 0$: f est croissante sur $[0 ; +\infty[$.

f admet un minimum en $x = 0$.

Question 3.

- ▶ En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 1) e^x = 0$ car la croissance de e^x vers 0 l'emporte sur le facteur polynomial (croissances comparées).
- ▶ En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) e^x = +\infty$ car $e^x \rightarrow +\infty$ et $x - 1 \rightarrow +\infty$.

Question 4.

$$f(0) = (0 - 1) e^0 = -1, \quad f(1) = (1 - 1) e^1 = 0, \quad f(-1) = (-1 - 1) e^{-1} = -\frac{2}{e}.$$

Question 5. Tableau de variations complet :

- ▶ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$).
- ▶ f est décroissante sur $] -\infty ; 0]$, minimum $f(0) = -1$.
- ▶ f est croissante sur $[0 ; +\infty[$, $f(1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

La courbe coupe l'axe des abscisses en $x = 1$ (car $f(1) = 0$) et admet l'axe des abscisses comme asymptote en $-\infty$.

Corrigé

Approfondissement — Vers la Terminale

Question 1. On pose $u(x) = x^2$ et $v(x) = e^{-x}$.

On a $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

Par la formule du produit :

$$f'(x) = 2x e^{-x} + x^2 \times (-e^{-x}) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x}.$$

On factorise par $x e^{-x}$:

$$f'(x) = x e^{-x} (2 - x) = \boxed{x(2 - x) e^{-x}}.$$

Question 2. On résout $f'(x) = 0$, soit $x(2 - x) e^{-x} = 0$.

Comme $e^{-x} > 0$, on obtient $x = 0$ ou $2 - x = 0$, d'où $\boxed{x = 0 \text{ ou } x = 2}$.

Question 3. Le signe de $f'(x)$ est celui de $x(2 - x)$ (car $e^{-x} > 0$).

Le produit $x(2 - x)$ est positif entre les racines :

- ▶ $f'(x) < 0$ sur $] -\infty ; 0[$: f est décroissante.
- ▶ $f'(x) > 0$ sur $]0 ; 2[$: f est croissante.
- ▶ $f'(x) < 0$ sur $]2 ; +\infty[$: f est décroissante.

Question 4.

- ▶ En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$ par croissances comparées (e^x l'emporte sur x^2).
- ▶ En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty$ car $x^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Question 5.

- ▶ f admet un **minimum local** en $x = 0$: $f(0) = 0$.
- ▶ f admet un **maximum local** en $x = 2$: $f(2) = 4 e^{-2} = \frac{4}{e^2} \approx 0,54$.

La courbe part de $+\infty$ en $-\infty$, décroît jusqu'au minimum $(0 ; 0)$, croît jusqu'au maximum $\left(2 ; \frac{4}{e^2}\right)$, puis décroît vers 0 en $+\infty$ (asymptote horizontale $y = 0$).

Corrigé

Le coefficient 0,4 est positif : la fonction f est donc croissante. La courbe C_1 représente f .

Le coefficient $-0,4$ est négatif : la fonction g est donc décroissante. La courbe C_2 représente g .

De plus, $f(0) = g(0) = 1$, ce qui est cohérent avec le point de départ commun $(0 ; 1)$.

Corrigé

1. $Q(0) = A e^0 = A$: le coefficient A est la valeur initiale.
- 2.

$$\frac{Q(t+1)}{Q(t)} = \frac{A e^{a(t+1)}}{A e^{at}} = e^a.$$

3. Pour tout entier naturel n , $Q(n+1) = e^a Q(n)$. La suite $(Q(n))$ est donc géométrique de raison e^a .

Corrigé

1. $N(0) = 500 e^0 = 500$. La population initiale est de 500 bactéries.
2. $N(5) = 500 e^1 = 500e \approx 1\,359$ bactéries.
3. Le coefficient 0,2 est positif. La fonction $t \mapsto e^{0,2t}$ est croissante : le modèle décrit donc une croissance.

Corrigé

1. $M(0) = 80$: la masse initiale est de 80 g.
2. $M(10) = 80 e^{-3} \approx 4,0$ g.

3.

$$\frac{M(t+1)}{M(t)} = e^{-0,3} \approx 0,741.$$

Chaque jour, la masse est donc multipliée par le même facteur, inférieur à 1.

4. Le coefficient $-0,3$ est négatif : la fonction $t \mapsto e^{-0,3t}$ est décroissante. Le modèle décrit une décroissance.

Corrigé

1. $u_n = Q(n) = 120 e^{0,05n}$.

2.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{120 e^{0,05(n+1)}}{120 e^{0,05n}} = e^{0,05}.$$

Le quotient étant constant, (u_n) est géométrique de raison $e^{0,05}$.

3. $Q(5) = 120 e^{0,25} \approx 154,1$ et, par définition, $u_5 = Q(5)$. Le modèle discret coïncide avec le modèle continu aux dates entières.
4. Le coefficient 120 est la valeur initiale. D'une date entière à la suivante, la quantité est multipliée par $e^{0,05} \approx 1,051$.

Corrigé

1. On calcule :

$$P(0) = 1000 e^{0,05 \times 0} = 1000 e^0 = 1000.$$

Interprétation : au temps initial ($t = 0$), la population compte 1000 bactéries.

2. $P(20) = 1000 e \approx \boxed{2718}$ et $P(40) = 1000 e^2 \approx \boxed{7389}$.
3. $P(t+10) = 1000 e^{0,05t+0,5} = e^{0,5} P(t)$. Toutes les dix heures, la population est donc multipliée par le même coefficient $e^{0,5} \approx 1,65$.
4. $P'(t) = 50 e^{0,05t} > 0$ pour tout $t \geq 0$. Le modèle décrit donc une population croissante.

Corrigé

1. On dérive $f(x) = e^{2x} - 2e^x$:

$$f'(x) = 2e^{2x} - 2e^x = 2e^x(e^x - 1).$$

2. Le facteur $2e^x > 0$ pour tout réel x .

Le signe de $f'(x)$ est donc celui de $e^x - 1$:

- ▶ $e^x - 1 < 0 \iff e^x < 1 \iff x < 0$;
- ▶ $e^x - 1 = 0 \iff x = 0$;
- ▶ $e^x - 1 > 0 \iff x > 0$.

Donc f est strictement décroissante sur $] -\infty ; 0]$ et strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

3. On calcule :

$$f(0) = e^0 - 2e^0 = 1 - 2 = -1.$$

D'après le tableau de variations, f admet un **minimum** égal à $\boxed{-1}$, atteint en $x = 0$.

4. $f(-1) = e^{-2} - 2e^{-1} \approx -0,60$ et $f(1) = e^2 - 2e \approx 1,95$. Avec le minimum $(0; -1)$ et les variations précédentes, ces points permettent d'esquisser la courbe.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. On multiplie numérateur et dénominateur par e^{-x} :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{e^x \cdot e^{-x}}{(e^x + 1) \cdot e^{-x}} = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

2. On dérive $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ avec la règle du quotient :

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \cdot e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{2x} + e^x - e^{2x}}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}.$$

3. Pour tout réel x , $e^x > 0$ et $(e^x + 1)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$ pour tout x .
Ainsi f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

4. **Limite en $+\infty$** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{1 + 0} = 1$.
La droite $y = 1$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

Limite en $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{0}{0 + 1} = 0$.
La droite $y = 0$ est asymptote horizontale en $-\infty$.

5. On calcule :

$$f(0) = \frac{e^0}{e^0 + 1} = \frac{1}{2}.$$

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{-\infty} f = 0$ et $\lim_{+\infty} f = 1$.

Corrigé

1. On dérive $f(x) = (2x - 1)e^x$ avec la règle du produit :

$$f'(x) = 2e^x + (2x - 1)e^x = (2 + 2x - 1)e^x = (2x + 1)e^x.$$

2. Comme $e^x > 0$ pour tout réel x , le signe de $f'(x)$ est celui de $2x + 1$:

- ▶ $f'(x) < 0$ si $x < -\frac{1}{2}$;
- ▶ $f'(x) = 0$ si $x = -\frac{1}{2}$;
- ▶ $f'(x) > 0$ si $x > -\frac{1}{2}$.

Donc f est strictement décroissante sur $\left]-\infty ; -\frac{1}{2}\right]$ et strictement croissante sur $\left[-\frac{1}{2} ; +\infty\right[$.

Le minimum de f est atteint en $x = -\frac{1}{2}$:

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = (-1 - 1)e^{-1/2} = -2e^{-1/2} = \frac{-2}{\sqrt{e}}.$$

3. $f(x) = 0 \iff (2x - 1)e^x = 0$. Or $e^x \neq 0$, donc :

$$2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}.$$

L'unique solution est $x = \frac{1}{2}$.

4. Le signe de $f(x)$ est celui de $2x - 1$ (car $e^x > 0$) :

- ▶ $f(x) < 0$ si $x < \frac{1}{2}$;
- ▶ $f(x) = 0$ si $x = \frac{1}{2}$;
- ▶ $f(x) > 0$ si $x > \frac{1}{2}$.

5. $f(0) = -1$ et $f(1) = e$. Ces points, le minimum et les variations précédentes déterminent une esquisse cohérente de la courbe.

Corrigé

1. On dérive $g(x) = e^x - x$:

$$g'(x) = e^x - 1.$$

2. $g'(x) = 0 \iff e^x = 1 \iff x = 0$.

Signe de $g'(x)$:

- ▶ Si $x < 0$, alors $e^x < 1$, donc $g'(x) < 0$.
- ▶ Si $x > 0$, alors $e^x > 1$, donc $g'(x) > 0$.

3. g est strictement décroissante sur $] -\infty ; 0]$ et strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

Le minimum de g est atteint en $x = 0$:

$$g(0) = e^0 - 0 = 1.$$

4. D'après le tableau de variations, g admet un minimum global égal à $1 > 0$.

Donc pour tout réel x :

$$g(x) \geq 1 > 0 \implies e^x - x > 0 \implies \boxed{e^x > x}.$$

5. L'équation $e^x = x$ s'écrit $e^x - x = 0$, c'est-à-dire $g(x) = 0$.

Or on a montré que $g(x) \geq 1 > 0$ pour tout réel x , donc $g(x) = 0$ n'a **aucune solution**.

L'équation $e^x = x$ n'a aucune solution dans $\mathbb{R}$.

6

CHAPITRE 6

Trigonométrie

Objectifs — Capacités attendues

- **C1** — Je sais placer un angle orienté sur le cercle trigonometrique et convertir degres/radians.
- **C2** — Je sais determiner les cosinus et sinus de valeurs remarquables et d'angles associes par lecture du cercle trigonometrique.

🕒 À RETENIR

Une grande roue de fete foraine a un rayon de 25 metres et son centre est a 27 metres du sol. A quelle hauteur se trouve un passager apres un tour d'un sixieme du cercle ? Le radian et la lecture du cercle trigonometrique permettent de repondre.

Temps estimés : ♦ 6 h ♦♦ 5 h ♦♦♦ 4 h

6.1 Cercle trigonométrique et angles

DÉFINITION 1

Le **radian** est l'unité de mesure d'angle définie par : un angle de 1 radian est un angle au centre qui intercepte un arc de longueur égale au rayon du cercle.
La correspondance avec les degrés est :

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ.$$

EXEMPLE Conversions usuelles :

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}, \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad}, \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}, \quad 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}, \quad 360^\circ = 2\pi \text{ rad}.$$

DÉFINITION 2

Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1 dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Le point $A = (1; 0)$ est appelé **origine des arcs**. Le sens positif (sens trigonométrique) est le sens inverse des aiguilles d'une montre.

DÉFINITION 3

Soit t un réel. On associe au réel t le point M du cercle trigonométrique tel que l'arc $\widehat{AM}$, mesure dans le sens positif, a pour longueur $|t|$ (positivement si $t > 0$, négativement si $t < 0$). On dit que t est **une mesure** (en radians) de l'angle orienté $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$.

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Deux réels t et t' définissent le même point sur le cercle trigonométrique si et seulement si

$$t' = t + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

On dit que t et t' sont **égaux modulo 2π** .

DÉFINITION 4

La **mesure principale** d'un angle est l'unique réel $t_0 \in]-\pi; \pi]$ tel que $t = t_0 + 2k\pi$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$.

EXEMPLE

- La mesure principale de $\frac{7\pi}{3}$ est $\frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3}$.
- La mesure principale de $-\frac{5\pi}{4}$ est $-\frac{5\pi}{4} + 2\pi = \frac{3\pi}{4}$.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

La notion de radian est liée à la longueur d'arc : sur un cercle de rayon R , un angle au centre de mesure θ (en radians) intercepte un arc de longueur $\ell = R\theta$. Sur le cercle trigonométrique ($R = 1$), la longueur d'arc est donc égale à la mesure de l'angle en radians.

6.2 Cosinus, sinus et valeurs

DÉFINITION 1

Soit M le point du cercle trigonometrique associe au reel t . Les coordonnees de M dans le repere $(O; \vec{i}, \vec{j})$ sont :

$$M = (\cos t; \sin t).$$

Le reel $\cos t$ est le **cosinus** de t et le reel $\sin t$ est le **sinus** de t .

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Pour tout reel t :

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1.$$

De plus : $-1 \leq \cos t \leq 1$ et $-1 \leq \sin t \leq 1$.

DÉMONSTRATION

Le point $M(\cos t; \sin t)$ est sur le cercle de centre O et de rayon 1, donc $OM^2 = 1$. Or $OM^2 = \cos^2 t + \sin^2 t$ d'apres le theoreme de Pythagore. D'ou $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Les valeurs remarquables du cosinus et du sinus sont :

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos t$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin t$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

EXEMPLE On verifie : $\cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$. ✓

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Pour tout reel x :

(Parite)	$\cos(-x) = \cos x,$	$\sin(-x) = -\sin x,$
(Supplementaire)	$\cos(\pi - x) = -\cos x,$	$\sin(\pi - x) = \sin x,$
(Anti-supplementaire)	$\cos(\pi + x) = -\cos x,$	$\sin(\pi + x) = -\sin x,$
(Complementaire)	$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x,$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$

EXEMPLE

- ▶ $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$
- ▶ $\sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$
- ▶ $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}.$

✦ POUR ALLER PLUS LOIN

Les valeurs remarquables de $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ se retrouvent à partir d'un triangle équilatéral de cote 1 : la hauteur vaut $\frac{\sqrt{3}}{2}$ et la moitié de la base vaut $\frac{1}{2}$. Celles de $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ proviennent d'un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse 1.

🕒 MÉTHODE M1 Placer un point sur le cercle trigonométrique et trouver la mesure principale

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de placer un angle sur le cercle trigonométrique, de convertir degrés/radians, ou de trouver la mesure principale d'un angle.

La méthode pas à pas.

1. Pour convertir de degrés en radians : multiplier par $\frac{\pi}{180}$.
2. Pour convertir de radians en degrés : multiplier par $\frac{180}{\pi}$.
3. Pour trouver la mesure principale d'un angle t :
 - ▶ Ajouter ou retrancher des multiples de 2π jusqu'à obtenir un réel dans $] -\pi; \pi]$.
 - ▶ Concrètement : calculer $\frac{t}{2\pi}$, garder la partie fractionnaire, multiplier par 2π .
4. Pour placer le point sur le cercle : partir de $A = (1; 0)$ et parcourir l'arc de longueur $|t|$ dans le sens positif (si $t > 0$) ou négatif (si $t < 0$).

Exemple rédigé. Trouver la mesure principale de $t = \frac{17\pi}{4}$.

$$\frac{17\pi}{4} - 2\pi = \frac{17\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{9\pi}{4}.$$

$$\frac{9\pi}{4} - 2\pi = \frac{9\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

On a $\frac{\pi}{4} \in] -\pi; \pi]$, donc la mesure principale est $\frac{\pi}{4}$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Confondre 2π et π : on ajoute ou retranche 2π (un tour complet), pas π .
- ▶ **Piège 2.** Oublier que la mesure principale doit être dans $] -\pi; \pi]$ (borne $-\pi$ exclue, borne π incluse).
- ▶ **Piège 3.** Mélanger degrés et radians dans un même calcul.

Vérifier son résultat. Vérifier que la mesure principale t_0 est bien dans $] -\pi; \pi]$ et que $t - t_0$ est un multiple de 2π .

S'entraîner. (renvois exercices M1)

🕒 MÉTHODE M2 Calculer un cosinus ou un sinus avec les valeurs remarquables et les symétries

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'on doit calculer la valeur exacte de $\cos \alpha$ ou $\sin \alpha$ pour un angle α qui n'est pas directement dans le tableau des valeurs remarquables mais qui s'y ramène par symétrie.

La méthode pas à pas.

1. Déterminer la mesure principale de α .

2. Identifier à quel angle remarquable $\beta \in \{0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\}$ on peut se ramener.
3. Appliquer la formule de symétrie adaptée :
 - ▶ Si $\alpha = -\beta$: parité.
 - ▶ Si $\alpha = \pi - \beta$: supplémentaire.
 - ▶ Si $\alpha = \pi + \beta$: anti-supplémentaire.
 - ▶ Si $\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$: complémentaire.
4. Remplacer par la valeur remarquable connue.

Exemple rédigé. Calculer $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$.

On a $\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$.

Donc :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Inverser $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Moyen mnémotechnique : quand l'angle augmente de 0 à $\frac{\pi}{2}$, le cosinus diminue.
- ▶ **Piège 2.** Erreur de signe dans la formule du supplémentaire : $\cos(\pi - x) = -\cos x$ (signe -) mais $\sin(\pi - x) = +\sin x$ (signe +).

Vérifier son résultat. Vérifier que $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur de calcul.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

Approfondissement — Vers la Terminale

🔗 MÉTHODE M3 Utiliser les formules d'addition et de duplication

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande une valeur exacte de $\cos$ ou $\sin$ d'un angle qui se décompose en somme ou différence d'angles remarquables, ou fait intervenir $\cos(2a)$, $\sin(2a)$.

La méthode pas à pas.

1. Écrire la formule adaptée : $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$, $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ (et leurs variantes en $a-b$).
2. Duplication : $\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$ et $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$.
3. Décomposer l'angle cible en angles remarquables (ex. : $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$).
4. Substituer les valeurs exactes connues et simplifier (radicaux).
5. Si une seule ligne trigonométrique est connue, retrouver l'autre par $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$ en fixant le SIGNE grâce à l'intervalle de a .

Exemple rédigé. 1) Calculer $\cos \frac{\pi}{12}$. 2) Sachant que $\cos a = \frac{3}{5}$ avec $a \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, calculer $\sin(2a)$ et $\cos(2a)$.

$$1) \cos \frac{\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}.$$

2) $\sin^2 a = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ et $a \in [0; \frac{\pi}{2}]$ donc $\sin a = \frac{4}{5}$. Alors $\sin(2a) = 2 \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{25}$ et $\cos(2a) = 2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{25}$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Ecrire $\cos(a+b) = \cos a + \cos b$: les lignes trigonométriques ne sont PAS linéaires.
- **Piège 2.** Erreur de signe dans $\cos(a+b)$ (c'est un MOINS) ou dans $\cos(a-b)$ (c'est un PLUS).
- **Piège 3.** Oublier de déterminer le signe de la ligne manquante avec l'intervalle avant d'appliquer une formule de duplication.

Vérifier son résultat. Contrôler le résultat à la calculatrice en valeur approchée ($\cos \frac{\pi}{12} \approx 0,966$), vérifier que les valeurs restent dans $[-1; 1]$, et tester $\sin^2(2a) + \cos^2(2a) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

Approfondissement — Vers la Terminale**④ MÉTHODE M4 Résoudre $\cos(x) = a$ ou $\sin(x) = a$ sur un intervalle**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre une équation $\cos(x) = a$ ou $\sin(x) = a$ (ou une inéquation associée) sur un intervalle donné, le plus souvent $] -\pi; \pi]$ ou $[0; 2\pi[$.

La méthode pas à pas.

1. Vérifier que $a \in [-1; 1]$: sinon l'équation n'a aucune solution.
2. Reconnaître une valeur remarquable : écrire a sous la forme $\cos(\alpha)$ (ou $\sin(\alpha)$) avec α un angle connu ($0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \dots$).
3. Écrire TOUTES les solutions :
 - $\cos(x) = \cos(\alpha) \iff x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$;
 - $\sin(x) = \sin(\alpha) \iff x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = \pi - \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
4. Sélectionner les solutions appartenant à l'intervalle demandé en choisissant les valeurs de k convenables.
5. Contrôler chaque solution sur le cercle trigonométrique.

Exemple rédigé. Résoudre dans $] -\pi; \pi]$ l'équation $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

On reconnaît $\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$, donc l'équation s'écrit $\cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

Les solutions réelles sont $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$.

Dans $] -\pi; \pi]$, seules conviennent ($k = 0$) :

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4} \right\}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier la seconde famille de solutions : $\cos(x) = \cos(\alpha)$ donne $x = \alpha$ et $x = -\alpha$ (à $2k\pi$ près) ; pour le sinus c'est α et $\pi - \alpha$.
- **Piège 2.** Confondre les deux règles : pour $\sin(x) = \frac{1}{2}$ sur $] -\pi; \pi]$, les solutions sont $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$ — pas $-\frac{\pi}{6}$.

- **Piège 3.** Ne pas ajuster k à l'intervalle demandé : sur $[0; 2\pi[$, la solution négative $-\frac{\pi}{4}$ devient $-\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$.

Vérifier son résultat. Remplacer chaque solution dans l'équation de départ, et vérifier sur le cercle trigonométrique que le nombre de points d'intersection avec la droite $x = a$ (ou $y = a$) correspond au nombre de solutions trouvées dans l'intervalle.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

Approfondissement — Vers la Terminale

🔑 MÉTHODE M5 Exploiter les variations et la périodicité de cos et sin

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de comparer des cosinus ou des sinus sans calculatrice, de dresser un tableau de variation sur $[0; 2\pi]$, ou de ramener l'étude d'une fonction trigonométrique à une période.

La méthode pas à pas.

1. Retenir les variations sur $[0; 2\pi]$: cos décroît de 1 à -1 sur $[0; \pi]$ puis croît de -1 à 1 sur $[\pi; 2\pi]$; sin croît de 0 à 1 sur $[0; \frac{\pi}{2}]$, décroît de 1 à -1 sur $[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$, puis croît sur $[\frac{3\pi}{2}; 2\pi]$.
2. Justifier au besoin par lecture du cercle trigonométrique (abscisse pour cos, ordonnée pour sin).
3. Périodicité : $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ pour tout réel x — toute étude se ramène à un intervalle de longueur 2π .
4. Pour comparer deux valeurs : ramener les deux angles dans un MEME intervalle de monotonie, puis appliquer le sens de variation.
5. Compléter avec les symétries utiles : $\cos(-x) = \cos x$ (paire), $\sin(-x) = -\sin x$ (impaire).

Exemple rédigé. Comparer sans calculatrice $\cos \frac{2\pi}{5}$ et $\cos \frac{3\pi}{5}$, puis $\sin \frac{9\pi}{4}$ et $\sin \frac{\pi}{3}$.

$$\frac{2\pi}{5} < \frac{3\pi}{5} \text{ et tous deux sont dans } [0; \pi] \text{ où cos est décroissante : } \cos \frac{2\pi}{5} > \cos \frac{3\pi}{5}.$$

$$\sin \frac{9\pi}{4} = \sin \left(\frac{9\pi}{4} - 2\pi \right) = \sin \frac{\pi}{4}. \text{ Sur } \left[0; \frac{\pi}{2} \right], \text{ sin est croissante et } \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{3} : \sin \frac{9\pi}{4} < \sin \frac{\pi}{3}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Appliquer un sens de variation à deux angles qui ne sont PAS dans le même intervalle de monotonie.
- **Piège 2.** Croire cos croissante parce que l'angle augmente : sur $[0; \pi]$, c'est l'inverse.
- **Piège 3.** Oublier la périodicité et conclure sur $\frac{9\pi}{4}$ comme si l'angle était dans $[0; 2\pi]$.

Vérifier son résultat. Placer les angles sur le cercle trigonométrique et lire abscisses/ordonnées pour confirmer la comparaison; contrôler à la calculatrice en valeurs approchées.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

Convertir les angles suivants en radians (donner le résultat sous forme de fraction de π).

1. 120°
2. 45°

3. 270°
4. 330°

Exercice 2

Convertir les angles suivants en degrés.

1. $\frac{\pi}{3}$ rad
2. $\frac{5\pi}{4}$ rad
3. $\frac{7\pi}{6}$ rad
4. $\frac{2\pi}{9}$ rad

Exercice 3

Determiner la mesure principale de chacun des angles suivants.

1. $\frac{13\pi}{3}$
2. $-\frac{7\pi}{4}$
3. $\frac{17\pi}{6}$
4. $-\frac{11\pi}{3}$

Exercice 4

Placer sur le cercle trigonometrique les points M_1, M_2, M_3, M_4 associes respectivement aux reels suivants, puis donner leurs coordonnees.

1. $\frac{\pi}{6}$
2. $\frac{2\pi}{3}$
3. $-\frac{\pi}{4}$
4. $\frac{5\pi}{4}$

Exercice 5

1. Determiner la mesure principale de $\frac{100\pi}{3}$.
2. Determiner la mesure principale de $-\frac{23\pi}{4}$.
3. Deux aiguilles d'une horloge forment un angle de 150° . Exprimer cet angle en radians.
4. Un point M du cercle trigonometrique a pour abscisse -1 et pour ordonnee 0 . Quelle est la mesure principale de l'angle associe ?

Exercice 6

On considere un hexagone regulier $A_0A_1A_2A_3A_4A_5$ inscrit dans le cercle trigonometrique, avec $A_0 = (1; 0)$.

1. Quelle est la mesure en radians de l'angle au centre $\widehat{A_0OA_1}$?
2. En deduire les mesures (en radians) des angles associes aux points A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 .

- Donner les coordonnées de chacun des sommets.
- Vérifier que $A_3 = (-1; 0)$.

Exercice 7 ♦♦

Le rayon de la Terre est environ $R = 6371$ km. Un **mille nautique** correspond à un arc de $1'$ (une minute d'arc, soit $\frac{1}{60}$ de degré) sur un grand cercle de la Terre.

- Convertir $1'$ en radians.
- En déduire la longueur d'un mille nautique en kilomètres (arrondir au mètre).
- Quelle distance (en milles nautiques) sépare deux villes situées sur le même méridien à 5° de latitude d'écart?

Exercice 8 ♦♦♦

Sur un cercle de rayon $R = 3$ cm, on trace un arc de cercle correspondant à un angle au centre de $\frac{2\pi}{5}$ rad.

- Calculer la longueur de cet arc.
- Quel angle au centre (en radians) donnerait un arc de longueur π cm sur ce même cercle?
- Montrer que sur un cercle de rayon R , la longueur d'arc est $\ell = R\theta$ ou θ est la mesure de l'angle en radians.

Exercice 9 ♦♦♦

L'aire d'un secteur circulaire de rayon R et d'angle au centre θ (en radians) est $A = \frac{1}{2}R^2\theta$.

- Justifier cette formule en utilisant la proportionnalité avec l'aire du disque complet.
- Calculer l'aire du secteur circulaire de rayon 5 cm et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
- Quel angle au centre faut-il choisir pour que l'aire du secteur soit égale au quart de l'aire du disque? Exprimer le résultat en radians et en degrés.

Exercice 10 ♦♦♦

Un pendule de longueur $L = 2$ m oscille avec une amplitude de 15° de chaque côté de la verticale.

- Convertir 15° en radians.
- Calculer la longueur de l'arc décrit par l'extrémité du pendule lors d'un aller simple (d'un côté à l'autre).
- Le pendule effectue 30 oscillations complètes (aller-retour) par minute. Quelle distance totale parcourt l'extrémité en une minute?

Exercice 11 ♦

Donner la valeur exacte des expressions suivantes (sans calculatrice).

- $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right)$

Exercice 12 ♦

En utilisant les formules de symétrie, calculer :

1. $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$
2. $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$
3. $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$
4. $\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$

Exercice 13

1. Sachant que $\cos x = \frac{3}{5}$ et que $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, calculer $\sin x$.
2. Sachant que $\sin x = -\frac{5}{13}$ et que $x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$, calculer $\cos x$.
3. Vérifier dans chaque cas que $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Exercice 14

Calculer les valeurs exactes suivantes en se ramenant à un angle du premier quadrant.

1. $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$
2. $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$
3. $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right)$

Exercice 15

Simplifier les expressions suivantes et donner leur valeur exacte.

1. $A = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos(\pi)$
2. $B = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
3. $C = \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{6}\right)$

Exercice 16

Pour tout réel x , simplifier les expressions suivantes.

1. $\cos x + \cos(\pi - x)$
2. $\sin x + \sin(\pi - x)$
3. $\sin x \cdot \sin(\pi - x) + \cos x \cdot \cos(\pi - x)$

Exercice 17

On sait que $\cos x = \frac{7}{25}$ et que $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$.

1. Calculer $\sin x$.
2. En déduire $\cos(\pi - x)$ et $\sin(\pi - x)$.
3. En déduire $\cos(\pi + x)$ et $\sin(\pi + x)$.
4. Calculer $\cos(-x)$ et $\sin(-x)$.

Exercice 18

1. Développer $(\cos x + \sin x)^2$ et simplifier à l'aide de $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
2. En déduire que $(\cos x + \sin x)^2 = 1 + 2 \cos x \sin x$.
3. De même, montrer que $(\cos x - \sin x)^2 = 1 - 2 \cos x \sin x$.
4. On sait que $\cos x + \sin x = \frac{7}{5}$. Calculer $\cos x \cdot \sin x$, puis $\cos x - \sin x$ (sachant que $x \in \left]0; \frac{\pi}{4}\right[$).

Exercice 19

Approfondissement — Vers la Terminale

1. À l'aide des formules d'addition, démontrer que :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$$

2. En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$.
3. Application : calculer $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right)$.

Exercice 20

Retrouver les valeurs remarquables par la géométrie.

1. Dans un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse 1, calculer la longueur des cotés égaux. En déduire $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$.
2. Dans un triangle équilatéral de côté 1, tracer une hauteur. Calculer la longueur de cette hauteur. En déduire $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$, $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

Exercice 21

Convertir en radians les angles suivants donnés en degrés : 30° , 45° , 60° et 90° .

Exercice 22

Déterminer la mesure principale de l'angle orienté de mesure $\frac{17\pi}{3}$ rad.

Exercice 23

Sachant que $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et $\sin(x) = \frac{3}{5}$, calculer $\cos(x)$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 24

Résoudre dans $] -\pi; \pi]$ l'équation $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Coup de pouce 1. Pour convertir de degrés en radians, multiplie l'angle par $\frac{\pi}{180}$ et simplifie la fraction.

Coup de pouce 1. Pour convertir de radians en degrés, multiplie l'angle par $\frac{180}{\pi}$. Le π se simplifie.

Coup de pouce 1. Pour trouver la mesure principale, ajoute ou retranche des multiples de 2π jusqu'à tomber dans $] -\pi; \pi]$.

Coup de pouce 1. Les coordonnées du point associé à t sont $(\cos t; \sin t)$. Utilise les valeurs remarquables et les formules de symétrie.

Coup de pouce 1. Utilise le tableau des valeurs remarquables : retiens que le cosinus diminue de 0 à $\frac{\pi}{2}$ et que le sinus augmente.

Coup de pouce 1. Ecris chaque angle sous la forme $-x$, $\pi - x$ ou $\pi + x$ avec x un angle du premier quadrant, puis applique la formule de symétrie.

Coup de pouce 1. Utilise $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ pour trouver l'autre valeur. Attention au signe : il dépend du quadrant.

Coup de pouce 1. Chaque angle se ramène à un angle du premier quadrant : $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4}$, $\frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6}$.

Coup de pouce 21. Utiliser la relation $180^\circ = \pi \text{ rad}$.

Coup de pouce 22. Chercher un multiple entier de 2π proche de $\frac{17\pi}{3}$.

Coup de pouce 23. Utiliser l'identité fondamentale $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.

Approfondissement — Vers la Terminale.

Coup de pouce 24. Reconnaître l'angle remarquable dont le cosinus vaut $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et exploiter la parité du cosinus.

TD contextualise — La grande roue

Mise en situation

Une grande roue de fête foraine a un rayon de 25 m et son centre est situé à 27 m du sol. Un passager monte dans une nacelle au point le plus bas de la roue. On note θ l'angle (en radians) parcouru depuis ce point le plus bas, dans le sens trigonométrique.

La hauteur $h(\theta)$ du passager par rapport au sol est modélisée par :

$$h(\theta) = 27 - 25 \cos \theta.$$

Partie A — Premières observations

Exercice 25

1. Calculer $h(0)$. Quelle est la hauteur du passager au départ ?
2. Calculer $h(\pi)$. Quelle est la hauteur du passager au point le plus haut ?
3. Calculer $h\left(\frac{\pi}{3}\right)$. Donner la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième.
4. Calculer $h\left(\frac{3\pi}{2}\right)$ et interpréter cette valeur.

Partie B — Lire des positions sur le cercle

Exercice 26

1. Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$, π , $\frac{3\pi}{2}$ puis 2π , placer la nacelle sur un cercle et lire la valeur de $\cos \theta$. En déduire sa hauteur dans chaque position.
2. La nacelle a parcouru un angle de $\frac{2\pi}{3}$. Quelle fraction de tour cela représente-t-il ? Calculer alors sa hauteur.
3. La grande roue fait un tour complet en 3 minutes. Déterminer l'angle parcouru, puis la hauteur de la nacelle, après 0,75 min, 1,5 min, 2,25 min et 3 min.

TD fil rouge — Du radian aux coordonnees sur le cercle

Etape 1 — Cercle trigonometrique et radian (C1)

Exercice 27

- Convertir en radians : 150° , 210° , 315° , 720° .
- Convertir en degres : $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{4}$, $\frac{11\pi}{6}$, 3π .
- Determiner la mesure principale de chacun des angles suivants : $\frac{13\pi}{4}$, $-\frac{7\pi}{3}$, $\frac{25\pi}{6}$.

Etape 2 — Valeurs remarquables et symetries (C2)

Exercice 28

- Compléter le tableau des valeurs remarquables (sans calculatrice).
- Calculer $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ en utilisant la formule du supplementaire.
- Calculer $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$.
- Vérifier que $\cos^2\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \sin^2\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 1$.

TRIGONOMETRIE — QCM D'AUTO-EVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

- [Q1] Quelle est la mesure en radians de 60° ?
 A. $\frac{\pi}{6}$
 B. $\frac{\pi}{4}$
 C. $\frac{\pi}{3}$
 D. $\frac{\pi}{2}$
- [Q2] Quelle est la mesure principale de $\frac{9\pi}{4}$?
 A. $\frac{\pi}{4}$
 B. $\frac{9\pi}{4}$
 C. $-\frac{7\pi}{4}$
 D. $\frac{5\pi}{4}$
- [Q3] Combien vaut 180° en radians ?
 A. 2π
 B. π
 C. $\frac{\pi}{2}$
 D. $\frac{3\pi}{2}$

Capacité C2

- [Q4] Quelle est la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$?
 A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

- C. $\frac{1}{2}$
D. 0

5. [Q5] Quelle est la valeur de $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$?

- A. $-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. [Q6] Que vaut $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right)$?

- A. $\frac{1}{2}$
B. 1
C. $\sqrt{2}$
D. 2

Capacité C1

7. [Q7] Sur un cercle de rayon 3 cm, quelle est la longueur de l'arc intercepté par un angle de $\frac{2\pi}{3}$ radians?

- A. $\frac{2\pi}{3}$ cm
B. 2π cm
C. 3π cm
D. 6π cm

8. [Q8] Après enroulement sur le cercle trigonométrique, le réel $\frac{5\pi}{2}$ a la même image que :

- A. $\frac{\pi}{2}$
B. π
C. $\frac{3\pi}{2}$
D. 2π

9. [Q9] Quels réels, avec $k \in \mathbb{Z}$, ont la même image que $\frac{\pi}{4}$ sur le cercle trigonométrique?

- A. $\frac{\pi}{4} + k\pi$
B. $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$
C. $-\frac{\pi}{4} + 2k\pi$
D. $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$

10. [Q10] Le point image du réel $-\frac{\pi}{2}$ sur le cercle trigonométrique a pour coordonnées :

- A. (1; 0)
B. (0; 1)
C. (-1; 0)
D. (0; -1)

Capacité C2

11. [Q11] Quelle est la valeur de $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$?

- A. $\frac{1}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

12. [Q12] Quelle est la valeur de $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$?

- A. $\frac{1}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

13. [Q13] On sait que $\cos x = -\frac{4}{5}$ et que l'image de x est dans le troisième quadrant. Que vaut $\sin x$?

- A. $\frac{3}{5}$
- B. $-\frac{3}{5}$
- C. $\frac{4}{5}$
- D. $-\frac{4}{5}$

14. [Q14] Le point $M\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ est l'image de :

- A. $\frac{\pi}{4}$
- B. $\frac{3\pi}{4}$
- C. $\frac{5\pi}{4}$
- D. $\frac{7\pi}{4}$

Capacité C1

15. [Q15] Sur un cercle de rayon 10 cm, un arc mesure 5 cm. Quelle est la mesure de l'angle correspondant en radians ?

- A. 0,5
- B. 2
- C. 5
- D. 50

Clé de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	C
Q2	C1	A
Q3	C1	B
Q4	C2	C
Q5	C2	B
Q6	C2	B
Q7	C1	B
Q8	C1	A
Q9	C1	B
Q10	C1	D
Q11	C2	B
Q12	C2	B
Q13	C2	B
Q14	C2	B
Q15	C1	A

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- A — L'élève a confondu 60° et 30° . $\frac{\pi}{6}$ correspond à 30° . Renvoi : C1, conversion.
- B — L'élève a confondu 60° et 45° . $\frac{\pi}{4}$ correspond à 45° . Renvoi : C1, conversion.
- D — L'élève a confondu 60° et 90° . $\frac{\pi}{2}$ correspond à 90° . Renvoi : C1, conversion.

► Q2

- B — L'élève n'a pas retranché 2π . $\frac{9\pi}{4}$ n'est pas dans $] -\pi; \pi]$. Renvoi : C1, mesure principale.
- C — L'élève a soustrait 4π au lieu de 2π . Renvoi : C1, mesure principale.
- D — L'élève a soustrait seulement π au lieu de 2π . Renvoi : C1, mesure principale.

► Q3

- A — L'élève a confondu 180° et 360° . Renvoi : C1, conversion.
- C — L'élève a confondu 180° et 90° . Renvoi : C1, conversion.
- D — L'élève a confondu 180° et 270° . Renvoi : C1, conversion.

► Q4

- A — L'élève a confondu $\cos(\frac{\pi}{3})$ et $\cos(\frac{\pi}{6})$. Renvoi : C2, valeurs remarquables.
- B — L'élève a confondu $\cos(\frac{\pi}{3})$ et $\cos(\frac{\pi}{4})$. Renvoi : C2, valeurs remarquables.
- D — L'élève a confondu $\cos(\frac{\pi}{3})$ et $\cos(\frac{\pi}{2})$. Renvoi : C2, valeurs remarquables.

► Q5

- A — L'élève a appliqué un mauvais signe. $\sin(\pi - x) = \sin x > 0$. Renvoi : C2, symétries.
- C — L'élève a confondu $\sin(\frac{\pi}{6})$ et $\sin(\frac{\pi}{3})$. Renvoi : C2, valeurs remarquables.
- D — Double erreur : mauvaise valeur et mauvais signe. Renvoi : C2, symétries.

► Q6

- A — L'élève a calculé $\cos^2(\frac{\pi}{4})$ seul sans ajouter $\sin^2$. Renvoi : C2, relation fondamentale.
- C — L'élève a additionné $\cos(\frac{\pi}{4}) + \sin(\frac{\pi}{4})$ au lieu des carrés. Renvoi : C2, relation fondamentale.
- D — L'élève a doublé le résultat. Renvoi : C2, relation fondamentale.

► Q7

- A — Cette valeur est la mesure de l'angle, pas la longueur de l'arc ; il faut multiplier par le rayon. Renvoi : C1, longueur d'arc.
- C — Le calcul $3 \times \pi$ oublie le facteur $2/3$ de la mesure en radians. Renvoi : C1, longueur d'arc.
- D — 6π est le périmètre du cercle entier, pas celui de l'arc correspondant à un tiers de tour. Renvoi : C1, longueur d'arc.

► Q8

- B — Soustraire 2π à $5\pi/2$ donne $\pi/2$, pas π . Renvoi : C1, enroulement.

- C — $3\pi/2$ est l'image du point situé en bas du cercle, alors que $5\pi/2$ arrive en haut. *Renvoi : C1, enroulement.*
- D — 2π a la même image que 0, pas que $5\pi/2$. *Renvoi : C1, enroulement.*

► Q9

- A — Ajouter π place au point diamétralement opposé; un tour complet vaut 2π . *Renvoi : C1, enroulement.*
- C — $-\pi/4$ est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, pas la même image. *Renvoi : C1, placement.*
- D — $3\pi/4$ est un autre point du cercle, dans le deuxième quadrant. *Renvoi : C1, placement.*

► Q10

- A — Le point (1;0) correspond au réel 0. *Renvoi : C1, placement.*
- B — Le point (0;1) correspond à $\pi/2$; le signe négatif impose le sens horaire. *Renvoi : C1, orientation.*
- C — Le point (-1;0) correspond à π . *Renvoi : C1, placement.*

► Q11

- A — La valeur absolue est correcte mais le point est dans le deuxième quadrant, où le cosinus est négatif. *Renvoi : C2, lecture du cercle.*
- C — $\sqrt{3}/2$ est le sinus de $2\pi/3$, pas son cosinus. *Renvoi : C2, valeurs remarquables.*
- D — Cette option cumule la confusion sinus/cosinus et un signe incorrect pour le sinus dans le deuxième quadrant. *Renvoi : C2, valeurs remarquables.*

► Q12

- A — Le point est dans le troisième quadrant : son ordonnée, donc son sinus, est négative. *Renvoi : C2, lecture du cercle.*
- C — $\sqrt{3}/2$ correspond à l'autre coordonnée en valeur absolue et a un signe incorrect. *Renvoi : C2, valeurs remarquables.*
- D — $-\sqrt{3}/2$ est le cosinus de $7\pi/6$, pas son sinus. *Renvoi : C2, valeurs remarquables.*

► Q13

- A — La relation fondamentale donne $|\sin x| = 3/5$, mais le sinus est négatif dans le troisième quadrant. *Renvoi : C2, relation fondamentale.*
- C — $4/5$ est la valeur absolue du cosinus fourni, pas celle du sinus. *Renvoi : C2, relation fondamentale.*
- D — Le signe est compatible avec le quadrant, mais la relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ donne $|\sin x| = 3/5$. *Renvoi : C2, relation fondamentale.*

► Q14

- A — A $\pi/4$, les deux coordonnées sont positives. *Renvoi : C2, lecture du cercle.*
- C — A $5\pi/4$, les deux coordonnées sont négatives. *Renvoi : C2, lecture du cercle.*
- D — A $7\pi/4$, le cosinus est positif et le sinus négatif. *Renvoi : C2, lecture du cercle.*

► Q15

- B — Cette valeur inverse le quotient : la mesure vaut longueur d'arc divisée par rayon, soit $5/10$. *Renvoi : C1, radian.*
- C — 5 est la longueur de l'arc en centimètres, pas la mesure de l'angle en radians. *Renvoi : C1, radian.*
- D — 50 provient du produit 5×10 alors que la relation $s = r\theta$ impose une division par le rayon. *Renvoi : C1, radian.*

Corrigé

Exercice 1

(4 points) — C1

Barème indicatif : Q1 : 1 pt; Q2 : 1 pt; Q3 : 1 pt; Q4 : 1 pt

- $225^\circ = 225 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{4}$.
 - $\frac{7\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = 210^\circ$.
 - $\frac{11\pi}{4} - 2\pi = \frac{11\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \in]-\pi; \pi]$. Mesure principale : $\frac{3\pi}{4}$.
 - $-\frac{2\pi}{3} : \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ et $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- Coordonnées : $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Exercice 2**(4 points) — C2**

Barème indicatif : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1,5 pt

- $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6} : \cos \frac{5\pi}{6} = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \frac{5\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.
- $\frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + 2\pi : \sin \frac{7\pi}{4} = -\sin \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- $\sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$. Comme $x \in \left]\frac{\pi}{2}; \pi\right[$, $\sin x > 0$, donc $\sin x = \frac{4}{5}$.

Exercice 3**(4 points) — C1**

Barème indicatif : Q1 : 2 pts ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1 pt

- Avec $s = r\theta$, $s = 12 \times \frac{5\pi}{6} = \boxed{10\pi \text{ cm}}$.
- $\theta = \frac{s}{r} = \frac{9}{6} = \boxed{\frac{3}{2} \text{ rad}}$.
- La fraction de tour vaut $\frac{7\pi/6}{2\pi} = \boxed{\frac{7}{12}}$.

Exercice 4**(4 points) — C2**

Barème indicatif : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 1 pt

- Le point image de $-\frac{\pi}{3}$ a pour coordonnées $\boxed{\left(\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$.
- Le point image de $\frac{3\pi}{4}$ a pour coordonnées $\boxed{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}$.
- Oui : les coordonnées lues sur le cercle à l'angle $3\pi/4$ sont exactement celles de M.

Exercice 5**(4 points) — C1, C2**

Barème indicatif : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 0,5 pt

- La longueur parcourue vaut $25 \times \frac{\pi}{3} = \boxed{\frac{25\pi}{3} \text{ m}}$.

2. Le point associé à $\pi/3$ a pour coordonnées $\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

3. La hauteur est l'altitude du centre augmentée de l'ordonnée sur la roue : $27 + \frac{25\sqrt{3}}{2} \text{ m}$.

4. $27 + \frac{25\sqrt{3}}{2} \approx 48,7 \text{ m}$.

Evaluation — Trigonometrie (Version A)

Duree : 55 min. Calculatrice interdite. Toutes les reponses doivent etre justifiees.

Exercice 1

(4 points) — C1

1. Convertir 225° en radians. (1 pt)
2. Convertir $\frac{7\pi}{6}$ en degres. (1 pt)
3. Determiner la mesure principale de $\frac{11\pi}{4}$. (1 pt)
4. Placer sur le cercle trigonometrique le point associe a $-\frac{2\pi}{3}$ et donner ses coordonnees. (1 pt)

Exercice 2

(4 points) — C2

1. Donner les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$. (1,5 pt)
2. Donner la valeur exacte de $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$. (1 pt)
3. Sachant que $\cos x = -\frac{3}{5}$ et $x \in \left]\frac{\pi}{2}; \pi\right[$, calculer $\sin x$. (1,5 pt)

Exercice 3

(4 points) — C1

1. Sur un cercle de rayon 12 cm, calculer la longueur de l'arc intercepte par un angle de $\frac{5\pi}{6}$ radians. (2 pts)
2. Sur un cercle de rayon 6 cm, un arc mesure 9 cm. Donner la mesure de l'angle correspondant en radians. (1 pt)
3. Quelle fraction d'un tour complet represente un angle de $\frac{7\pi}{6}$ radians? (1 pt)

Exercice 4

(4 points) — C2

1. Donner les coordonnees du point image de $-\frac{\pi}{3}$. (1,5 pt)
2. Donner les coordonnees du point image de $\frac{3\pi}{4}$. (1,5 pt)
3. Le point $M\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ est-il l'image de $\frac{3\pi}{4}$? Justifier par lecture du cercle. (1 pt)

Exercice 5

(4 points) — C1, C2

Une grande roue a un rayon de 25 m et son centre est situe a 27 m du sol. Un passager part du point le plus a droite de la roue et parcourt un angle de $\frac{\pi}{3}$ radian dans le sens direct.

1. Quelle longueur d'arc le passager a-t-il parcourue? (1 pt)

2. Donner les coordonnées du point du cercle trigonométrique associé à $\frac{\pi}{3}$. (1 pt)
3. En déduire la hauteur exacte du passager au-dessus du sol. (1,5 pt)
4. Donner une valeur approchée de cette hauteur au dixième de mètre. (0,5 pt)

Corrigé

Exercice 1

(4 points) — C1

Barème indicatif : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 1 pt

1. $315^\circ = 315 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{4}$.
 2. $\frac{5\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} = 300^\circ$.
 3. $-\frac{13\pi}{6} + 2\pi = -\frac{13\pi}{6} + \frac{12\pi}{6} = -\frac{\pi}{6} \in]-\pi; \pi]$. Mesure principale : $-\frac{\pi}{6}$.
 4. $\frac{3\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4} : \cos \frac{3\pi}{4} = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \frac{3\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- Coordonnées : $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

Exercice 2

(4 points) — C2

Barème indicatif : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1,5 pt

1. $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3} : \cos \frac{4\pi}{3} = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \sin \frac{4\pi}{3} = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. $\frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6} : \cos \frac{11\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. $\cos^2 x = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$. Comme $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$, $\cos x > 0$, donc $\cos x = \frac{12}{13}$.

Exercice 3

(4 points) — C1

Barème indicatif : Q1 : 2 pts ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 1 pt

1. Avec $s = r\theta$, $s = 8 \times \frac{3\pi}{4} = \boxed{6\pi \text{ cm}}$.
2. $\theta = \frac{s}{r} = \frac{7}{4} = \boxed{\frac{7}{4} \text{ rad}}$.
3. La fraction de tour vaut $\frac{5\pi/3}{2\pi} = \boxed{\frac{5}{6}}$.

Exercice 4

(4 points) — C2

Barème indicatif : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 1 pt

1. Le point image de $\frac{4\pi}{3}$ a pour coordonnées $\boxed{\left(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$.

2. Le point image de $\frac{7\pi}{4}$ a pour coordonnées $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.
3. Oui : la lecture du cercle à l'angle $5\pi/6$ donne exactement les coordonnées de N .

Exercice 5**(4 points) — C1, C2**

Barème indicatif : Q1 : 1 pt; Q2 : 1,5 pt; Q3 : 1 pt; Q4 : 0,5 pt

1. La longueur parcourue vaut $18 \times \frac{3\pi}{4} = \frac{27\pi}{2} \text{ m}$.
2. Le point associé à $3\pi/4$ a pour coordonnées $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.
3. La hauteur est $20 + 18 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 20 + 9\sqrt{2} \text{ m}$.
4. $20 + 9\sqrt{2} \approx 32,7 \text{ m}$.

Evaluation — Trigonometrie (Version B)

Durée : 55 min. Calculatrice interdite. Toutes les réponses doivent être justifiées.

Exercice 1**(4 points) — C1**

1. Convertir 315° en radians. (1 pt)
2. Convertir $\frac{5\pi}{3}$ en degrés. (1 pt)
3. Déterminer la mesure principale de $-\frac{13\pi}{6}$. (1 pt)
4. Placer sur le cercle trigonométrique le point associé à $\frac{3\pi}{4}$ et donner ses coordonnées. (1 pt)

Exercice 2**(4 points) — C2**

1. Donner les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$. (1,5 pt)
2. Donner la valeur exacte de $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)$. (1 pt)
3. Sachant que $\sin x = \frac{5}{13}$ et $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$, calculer $\cos x$. (1,5 pt)

Exercice 3**(4 points) — C1**

1. Sur un cercle de rayon 8 cm, calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle de $\frac{3\pi}{4}$ radians. (2 pts)
2. Sur un cercle de rayon 4 cm, un arc mesure 7 cm. Donner la mesure de l'angle correspondant en radians. (1 pt)
3. Quelle fraction d'un tour complet représente un angle de $\frac{5\pi}{3}$ radians? (1 pt)

Exercice 4**(4 points) — C2**

1. Donner les coordonnées du point image de $\frac{4\pi}{3}$. (1,5 pt)

2. Donner les coordonnées du point image de $\frac{7\pi}{4}$. (1,5 pt)
3. Le point $N\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right)$ est-il l'image de $\frac{5\pi}{6}$? Justifier par lecture du cercle. (1 pt)

Exercice 5

(4 points) — C1, C2

Une grande roue a un rayon de 18 m et son centre est situé à 20 m du sol. Un passager part du point le plus à droite de la roue et parcourt un angle de $\frac{3\pi}{4}$ radian dans le sens direct.

1. Quelle longueur d'arc le passager a-t-il parcourue? (1 pt)
2. Donner les coordonnées du point du cercle trigonométrique associé à $\frac{3\pi}{4}$. (1 pt)
3. En déduire la hauteur exacte du passager au-dessus du sol. (1,5 pt)
4. Donner une valeur approchée de cette hauteur au dixième de mètre. (0,5 pt)

Rappel — Theoreme de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés :

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Ce théorème est fondamental en trigonométrie car il justifie la relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ sur le cercle trigonométrique.

Exercice 29

Dans un triangle rectangle, calculer la longueur manquante.

1. $a = 3, b = 4, c = ?$
2. $a = 5, c = 13, b = ?$
3. $a = 1, b = 1, c = ?$

Corrigé

1. $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$
2. $b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12.$
3. $c = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$

Rappel — Coordonnées et distance

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, un point M a pour coordonnées $(x; y)$.

La distance OM est $OM = \sqrt{x^2 + y^2}.$

Exercice 30

1. Placer les points $A(1; 0), B(0; 1), C(-1; 0), D(0; -1)$ dans un repère.
2. Calculer OA, OB, OC, OD .
3. Ces quatre points sont-ils sur un même cercle? Lequel?

Corrigé

1. Points placés sur les axes.

- $OA = OB = OC = OD = 1$.
- Oui, ils sont sur le cercle de centre O et de rayon 1 : le cercle trigonométrique.

Exercice 31 ♦

- Convertir en radians : $90^\circ, 135^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.
- Convertir en degrés : $\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}$.
- Déterminer la mesure principale de $\frac{15\pi}{4}$ et de $-\frac{10\pi}{3}$.

Corrigé

- $90^\circ = \frac{\pi}{2}, 135^\circ = \frac{3\pi}{4}, 240^\circ = \frac{4\pi}{3}, 300^\circ = \frac{5\pi}{3}$.
- $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ, \frac{5\pi}{3} = 300^\circ, \frac{7\pi}{6} = 210^\circ$.
- $\frac{15\pi}{4} - 2\pi = \frac{7\pi}{4}$, puis $\frac{7\pi}{4} - 2\pi = -\frac{\pi}{4}$. Mesure principale : $-\frac{\pi}{4}$.
 $-\frac{10\pi}{3} + 4\pi = -\frac{10\pi}{3} + \frac{12\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$. Mesure principale : $\frac{2\pi}{3}$.

Exercice 32 ♦

- Compléter de mémoire le tableau des valeurs remarquables pour $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$.
- Calculer $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right), \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right), \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.
- Sachant que $\cos x = \frac{4}{5}$ et $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, calculer $\sin x$.

Corrigé

- $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.
 $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$.
 $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- $\sin^2 x = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}, \sin x = \frac{3}{5}$ (car $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$).

Corrigé

- $120^\circ = 120 \times \frac{\pi}{180} = \frac{120\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$.
- $45^\circ = 45 \times \frac{\pi}{180} = \frac{45\pi}{180} = \frac{\pi}{4}$.
- $270^\circ = 270 \times \frac{\pi}{180} = \frac{270\pi}{180} = \frac{3\pi}{2}$.
- $330^\circ = 330 \times \frac{\pi}{180} = \frac{330\pi}{180} = \frac{11\pi}{6}$.

Corrigé

1. $\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} = \frac{180}{3} = 60^\circ$.
2. $\frac{5\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = \frac{5 \times 180}{4} = 225^\circ$.
3. $\frac{7\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = \frac{7 \times 180}{6} = 210^\circ$.
4. $\frac{2\pi}{9} = \frac{2\pi}{9} \times \frac{180}{\pi} = \frac{2 \times 180}{9} = 40^\circ$.

Corrigé

$$1. \frac{13\pi}{3} = \frac{13\pi}{3} - 2 \times 2\pi = \frac{13\pi}{3} - \frac{12\pi}{3} = \frac{\pi}{3}.$$

La mesure principale est $\frac{\pi}{3}$.

$$2. -\frac{7\pi}{4} = -\frac{7\pi}{4} + 2\pi = -\frac{7\pi}{4} + \frac{8\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

La mesure principale est $\frac{\pi}{4}$.

$$3. \frac{17\pi}{6} = \frac{17\pi}{6} - 2\pi = \frac{17\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

On a $\frac{5\pi}{6} \in]-\pi; \pi]$, donc la mesure principale est $\frac{5\pi}{6}$.

$$4. -\frac{11\pi}{3} = -\frac{11\pi}{3} + 2 \times 2\pi = -\frac{11\pi}{3} + \frac{12\pi}{3} = \frac{\pi}{3}.$$

La mesure principale est $\frac{\pi}{3}$.

Corrigé

$$1. M_1 \text{ associe a } \frac{\pi}{6} : M_1 = \left(\cos \frac{\pi}{6} ; \sin \frac{\pi}{6} \right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} ; \frac{1}{2} \right).$$

$$2. M_2 \text{ associe a } \frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3} : M_2 = \left(-\cos \frac{\pi}{3} ; \sin \frac{\pi}{3} \right) = \left(-\frac{1}{2} ; \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

$$3. M_3 \text{ associe a } -\frac{\pi}{4} : M_3 = \left(\cos \frac{\pi}{4} ; -\sin \frac{\pi}{4} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} ; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

$$4. M_4 \text{ associe a } \frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4} : M_4 = \left(-\cos \frac{\pi}{4} ; -\sin \frac{\pi}{4} \right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} ; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

Corrigé

$$1. \frac{100\pi}{3} : \text{on calcule } \frac{100}{3 \times 2} = \frac{100}{6} \approx 16,67. \text{ Donc on retranche } 16 \times 2\pi :$$

$$\frac{100\pi}{3} - 32\pi = \frac{100\pi - 96\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}.$$

$$\text{Or } \frac{4\pi}{3} > \pi, \text{ donc } \frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}.$$

La mesure principale est $-\frac{2\pi}{3}$.

$$2. -\frac{23\pi}{4} : \text{on calcule } \frac{23}{4 \times 2} = \frac{23}{8} \approx 2,875. \text{ On ajoute } 3 \times 2\pi :$$

$$-\frac{23\pi}{4} + 6\pi = -\frac{23\pi}{4} + \frac{24\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

La mesure principale est $\frac{\pi}{4}$.

3. $150^\circ = 150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$.

4. Le point $(-1; 0)$ correspond à l'angle π . La mesure principale est π .

Corrigé

1. L'hexagone régulier divise le cercle en 6 arcs égaux. L'angle au centre est $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$.

2. Les mesures associées sont : $A_1 \leftrightarrow \frac{\pi}{3}, A_2 \leftrightarrow \frac{2\pi}{3}, A_3 \leftrightarrow \pi, A_4 \leftrightarrow \frac{4\pi}{3}, A_5 \leftrightarrow \frac{5\pi}{3}$.

3. Coordonnées :

► $A_0 = (1; 0)$

► $A_1 = \left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

► $A_2 = \left(-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

► $A_3 = (-1; 0)$

► $A_4 = \left(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

► $A_5 = \left(\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

4. $A_3 = (\cos \pi; \sin \pi) = (-1; 0)$. ✓

Corrigé

1. $1' = \frac{1}{60}^\circ = \frac{1}{60} \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{10800}$ rad.

2. La longueur d'un mille nautique est $\ell = R\theta = 6371 \times \frac{\pi}{10800} \approx 1,852$ km.

3. $5^\circ = 5 \times 60 = 300$ minutes d'arc, soit 300 milles nautiques.

Corrigé

1. La longueur de l'arc est $\ell = R\theta = 3 \times \frac{2\pi}{5} = \frac{6\pi}{5}$ cm $\approx 3,77$ cm.

2. On cherche θ tel que $3\theta = \pi$, donc $\theta = \frac{\pi}{3}$ rad.

3. Sur un cercle de rayon R , le périmètre complet est $2\pi R$ pour un angle de 2π rad. Par proportionnalité, un angle θ correspond à un arc de longueur $\ell = \frac{\theta}{2\pi} \times 2\pi R = R\theta$.

Corrigé

1. L'aire du disque est πR^2 pour un angle de 2π . Par proportionnalité : $A = \frac{\theta}{2\pi} \times \pi R^2 = \frac{1}{2}R^2\theta$.

2. $A = \frac{1}{2} \times 5^2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{25\pi}{6} \approx 13,09$ cm².

3. On veut $\frac{1}{2}R^2\theta = \frac{1}{4}\pi R^2$, soit $\theta = \frac{\pi}{2}$ rad = 90° .

Corrigé

1. $15^\circ = 15 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{12}$ rad.

2. L'amplitude totale d'un aller simple est $2 \times 15^\circ = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$ rad. La longueur d'arc est $\ell = L\theta = 2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \approx 1,05$ m.

3. Une oscillation complète (aller-retour) correspond à $2\ell = \frac{2\pi}{3}$ m. En une minute, 30 oscillations :
distance = $30 \times \frac{2\pi}{3} = 20\pi \approx 62,83$ m.

Corrigé

$$1. \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$2. \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$3. \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

$$4. \cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}.$$

Corrigé

$$1. \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \text{ (cosinus est pair).}$$

$$2. \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2} \text{ (sinus est impair).}$$

$$3. \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$4. \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Corrigé

$$1. \cos^2 x + \sin^2 x = 1, \text{ donc } \sin^2 x = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

$$\text{Comme } x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], \sin x \geq 0, \text{ donc } \sin x = \frac{4}{5}.$$

$$2. \cos^2 x = 1 - \left(-\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}.$$

$$\text{Comme } x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right], \cos x \leq 0, \text{ donc } \cos x = -\frac{12}{13}.$$

$$3. \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9+16}{25} = 1 \checkmark \quad \text{et} \quad \left(-\frac{12}{13}\right)^2 + \left(-\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{144+25}{169} = 1 \checkmark.$$

Corrigé

$$1. \frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6} : \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

$$2. \frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + 2\pi : \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$3. \frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6} + 2\pi : \cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}.$$

Corrigé

$$1. A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - (-1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 2.$$

$$2. B = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{1 - \sqrt{6}}{4}.$$

$$3. C = \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{On remarque que } C = \cos\left(2 \times \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}. \checkmark$$

Corrigé

$$1. \cos x + \cos(\pi - x) = \cos x + (-\cos x) = 0.$$

$$2. \sin x + \sin(\pi - x) = \sin x + \sin x = 2 \sin x.$$

$$3. \sin x \sin(\pi - x) + \cos x \cos(\pi - x) = \sin x \cdot \sin x + \cos x \cdot (-\cos x) = \sin^2 x - \cos^2 x.$$

Corrigé

$$1. \sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \frac{49}{625} = \frac{576}{625}. \text{ Comme } x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[, \sin x > 0, \text{ donc } \sin x = \frac{24}{25}.$$

$$2. \cos(\pi - x) = -\cos x = -\frac{7}{25} \text{ et } \sin(\pi - x) = \sin x = \frac{24}{25}.$$

$$3. \cos(\pi + x) = -\cos x = -\frac{7}{25} \text{ et } \sin(\pi + x) = -\sin x = -\frac{24}{25}.$$

$$4. \cos(-x) = \cos x = \frac{7}{25} \text{ et } \sin(-x) = -\sin x = -\frac{24}{25}.$$

Corrigé

$$1. (\cos x + \sin x)^2 = \cos^2 x + 2 \cos x \sin x + \sin^2 x = 1 + 2 \cos x \sin x.$$

$$2. \text{ On a bien } (\cos x + \sin x)^2 = 1 + 2 \cos x \sin x \text{ d'après } \cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

$$3. (\cos x - \sin x)^2 = \cos^2 x - 2 \cos x \sin x + \sin^2 x = 1 - 2 \cos x \sin x.$$

$$4. \text{ Si } \cos x + \sin x = \frac{7}{5}, \text{ alors } \left(\frac{7}{5}\right)^2 = 1 + 2 \cos x \sin x, \text{ d'où } \cos x \sin x = \frac{49/25 - 1}{2} = \frac{12}{25}.$$

$$(\cos x - \sin x)^2 = 1 - 2 \times \frac{12}{25} = \frac{1}{25}.$$

$$\text{Comme } x \in \left]0; \frac{\pi}{4}\right[, \cos x > \sin x, \text{ donc } \cos x - \sin x = \frac{1}{5}.$$

Corrigé

Approfondissement — Vers la Terminale.

$$1. \text{ Par la formule d'addition : } \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos \frac{\pi}{2} \cos x + \sin \frac{\pi}{2} \sin x = 0 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x = \sin x.$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin \frac{\pi}{2} \cos x - \cos \frac{\pi}{2} \sin x = 1 \cdot \cos x - 0 \cdot \sin x = \cos x.$$

$$2. \text{ En remplaçant } x \text{ par } -x \text{ dans } \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x : \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin(-x) = -\sin x.$$

$$\text{En remplaçant } x \text{ par } -x \text{ dans } \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x : \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(-x) = \cos x.$$

$$3. \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}.$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

Corrigé

1. Soit un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse 1. Si les cotés égaux mesurent a , alors $a^2 + a^2 = 1$, soit $2a^2 = 1$, d'où $a = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

L'angle à la base vaut $\frac{\pi}{4}$, donc $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. Triangle équilatéral de côté 1 : la hauteur h partage la base en deux segments de longueur $\frac{1}{2}$.

Par Pythagore : $h^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1^2$, d'où $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

L'angle au sommet vaut $\frac{\pi}{3}$ et le demi-angle à la base vaut $\frac{\pi}{6}$:

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{h}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}.$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{h}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Corrigé

$$30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}, 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}, 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad et } 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad.}$$

Corrigé

$$\frac{17\pi}{3} = 6\pi - \frac{\pi}{3}. \text{ La mesure principale est } -\frac{\pi}{3} \text{ rad.}$$

Corrigé

$$\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}. \text{ Comme } x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], \cos(x) \geq 0, \text{ donc } \cos(x) = \frac{4}{5}.$$

Approfondissement — Vers la Terminale.

Corrigé

$$\cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi. \text{ Dans }]-\pi; \pi], \text{ les solutions sont}$$

$$S = \left\{-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right\}.$$

7

CHAPITRE 7

Produit scalaire

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais calculer un produit scalaire (définition géométrique, projection, expression analytique).
- ▶ **C2** — Je sais utiliser les propriétés du produit scalaire (bilinearité, symétrie, norme).
- ▶ **C3** — Je sais déterminer l'orthogonalité de deux vecteurs et calculer un angle.
- ▶ **C4** — Je sais utiliser le produit scalaire dans des problèmes géométriques (médiatrice, hauteurs, aires).
- ▶ **C5** — Je sais appliquer la formule d'Al-Kashi et en connaître la démonstration.

🕒 À RETENIR

Un randonneur se déplace de 5 km vers le nord-est puis de 3 km vers le sud-est. Quelle distance le sépare de son point de départ ? Comment calculer l'angle entre deux trajets dans le plan ?

◆ Corrigés

Temps estimés : ◆ 12 h ◆◆ 10 h ◆◆◆ 8 h

7.1 Produit scalaire de deux vecteurs

DÉFINITION Produit scalaire (definition geometrique)

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre reel :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

ou $(\vec{u}, \vec{v})$ designe l'angle oriente des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Si l'un des deux vecteurs est nul, on pose $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

◆ PROPRIÉTÉ Cas particuliers

- ▶ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colineaires de meme sens : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.
- ▶ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colineaires de sens contraire : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.
- ▶ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- ▶ $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

DÉFINITION Produit scalaire par projection

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. Si H est le projete orthogonal de l'extremite de $\vec{v}$ sur la droite portant $\vec{u}$, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \overline{OH}$$

ou $\overline{OH}$ est la mesure algebrique de la projection.

DÉFINITION Expression analytique

Dans un repere orthonorme $(O; \vec{i}, \vec{j})$, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

EXEMPLE Calculer le produit scalaire de $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + (-1) \times 5 = 6 - 5 = 1.$$

EXEMPLE Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ verifient $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 3$ et l'angle entre eux est $\frac{\pi}{3}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 3 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 12 \times \frac{1}{2} = 6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le cosinus dans la definition geometrique et ecrire $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$. Le cosinus de l'angle est indispensable.

ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser la formule analytique $x_1x_2 + y_1y_2$ dans un repère non orthonormé. Cette formule n'est valable que dans un repère **orthonormé**.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire que le produit scalaire est un vecteur. Le produit scalaire est un **nombre réel**.

CONTRE-EXEMPLE Dans un repère non orthonormé, $\vec{i} \cdot \vec{j} \neq 0$ en général. On ne peut alors pas utiliser la formule $x_1x_2 + y_1y_2$.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le produit scalaire se généralise en dimension n : pour $\vec{u} = (x_1, \dots, x_n)$ et $\vec{v} = (y_1, \dots, y_n)$, on pose $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{k=1}^n x_k y_k$. Cette notion est fondamentale en algèbre linéaire et en physique.

7.2 Propriétés du produit scalaire

◆ **PROPRIÉTÉ Symétrie** Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Bilinearité** Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tout réel λ :

- ▶ $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ (distributivité) ;
- ▶ $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v})$ (homogénéité).

◆ **PROPRIÉTÉ Norme et produit scalaire** Pour tout vecteur $\vec{u}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2.$$

En particulier, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dans un repère orthonormé : $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$.

THÉORÈME Identités remarquables vectorielles

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \quad (7.1)$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \quad (7.2)$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 \quad (7.3)$$

DÉMONSTRATION

Démonstration de l'expression analytique (exigible).

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ dans un repère orthonorme $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On écrit $\vec{u} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}$ et $\vec{v} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j}$.

Par bilinéarité du produit scalaire :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}) \cdot (x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j}) \\ &= x_1 x_2 (\vec{i} \cdot \vec{i}) + x_1 y_2 (\vec{i} \cdot \vec{j}) + y_1 x_2 (\vec{j} \cdot \vec{i}) + y_1 y_2 (\vec{j} \cdot \vec{j}). \end{aligned}$$

Or le repère est orthonorme : $\vec{i} \cdot \vec{i} = \|\vec{i}\|^2 = 1$, $\vec{j} \cdot \vec{j} = 1$ et $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$ (orthogonalité).

Donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2$. ■

EXEMPLE Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.

$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 16 + 1 = 17$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{17}$.

Vérification par l'identité : $\|\vec{u}\|^2 = 5$, $\|\vec{v}\|^2 = 10$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 2 = 1$. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 5 + 2 \times 1 + 10 = 17$. ✓

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$. C'est faux en général : il manque le terme $2 \vec{u} \cdot \vec{v}$. L'égalité n'est vraie que si $\vec{u} \perp \vec{v}$ (théorème de Pythagore).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v}$. Le produit scalaire est un réel, son carré est $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$, à ne pas confondre avec $\|\vec{u}\|^2$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier que le produit scalaire est un nombre réel, pas un vecteur. On ne peut pas écrire $\vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{v}$.

7.3 Orthogonalité et calcul d'angles

THÉORÈME Critère d'orthogonalité

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.

◆ **PROPRIÉTÉ Calcul de l'angle entre deux vecteurs** Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. L'angle $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$ vérifie :

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}.$$

EXEMPLE Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Calculer l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 + 0 = 1, \|\vec{u}\| = \sqrt{2}, \|\vec{v}\| = 1.$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta = \frac{\pi}{4}.$$

EXEMPLE Montrer que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 4 + (-2) \times 6 = 12 - 12 = 0.$$

Comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

◆ **PROPRIÉTÉ Orthogonalité de droites** Dans un repère orthonormé, deux droites de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont perpendiculaires si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier que les vecteurs sont non nuls avant de calculer l'angle. La formule $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ suppose $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Calculer $\cos \theta$ mais oublier de passer à l'angle θ par $\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}\right)$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Conclure que deux vecteurs sont parallèles quand leur produit scalaire est non nul. Un produit scalaire non nul signifie seulement qu'ils ne sont pas orthogonaux.

7.4 Applications géométriques

THÉORÈME Médiatrice et produit scalaire

Soit $[AB]$ un segment et M un point du plan. Alors :

$$M \in \text{médiatrice de } [AB] \iff \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \frac{\|\overrightarrow{MA}\|^2 + \|\overrightarrow{MB}\|^2 - \|\overrightarrow{AB}\|^2}{2}$$

Plus directement :

$$M \in \text{médiatrice de } [AB] \iff \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB}\|^2$$

ou, de manière équivalente, $MA = MB$.

◆ **PROPRIÉTÉ Caractérisation vectorielle de la médiatrice** M appartient à la médiatrice de $[AB]$ si et seulement si :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \quad (\text{avec } I \text{ milieu de } [AB] : \overrightarrow{IM} \perp \overrightarrow{AB})$$

Autrement dit, en posant I milieu de $[AB]$: M est sur la médiatrice ssi $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

◆ **PROPRIÉTÉ Hauteur d'un triangle** Dans un triangle ABC , la hauteur issue de A est la droite passant par A et perpendiculaire à (BC) . Le pied H de cette hauteur vérifie :

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Aire d'un triangle** L'aire d'un triangle ABC est donnée par :

$$A = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times |\sin(\widehat{BAC})|.$$

On peut calculer $\sin(\widehat{BAC})$ à partir de $\cos(\widehat{BAC})$ obtenu par le produit scalaire, en utilisant $\sin^2 + \cos^2 = 1$.

EXEMPLE Soit $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $C(1;3)$. Calculer l'aire du triangle ABC .

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4, \|\overrightarrow{AB}\| = 4, \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{10}.$$

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{4}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}, \text{ donc } \sin(\widehat{BAC}) = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

$$A = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{10} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = 6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre médiatrice et médiane. La médiatrice de $[AB]$ est perpendiculaire à AB et passe par le milieu ; la médiane relie un sommet au milieu du côté opposé.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur $\frac{1}{2}$ dans la formule de l'aire du triangle.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas savoir traduire « M appartient à la médiatrice de $[AB]$ » en équation vectorielle.

7.5 Formule d'Al-Kashi

THÉORÈME Formule d'Al-Kashi

Dans un triangle ABC , en notant $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC}).$$

De même, par permutation circulaire :

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\widehat{ABC}), \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\widehat{ACB}).$$

DÉMONSTRATION

Démonstration de la formule d'Al-Kashi (exigible).

Dans le triangle ABC , on a $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$.

On calcule $BC^2 = \|\overrightarrow{BC}\|^2 = \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BC}$:

$$\begin{aligned} a^2 &= \|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \\ &= \|\overrightarrow{AC}\|^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \|\overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= b^2 + c^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}. \end{aligned}$$

Or $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC}) = c \times b \times \cos(\widehat{BAC})$.

Donc $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC})$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Cas particulier : theoreme de Pythagore** Si $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{2}$, alors $\cos(\widehat{BAC}) = 0$ et la formule d'Al-Kashi donne :

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

C'est le theoreme de Pythagore.

Approfondissement — Vers la Terminale

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Formule de la mediane (conséquence, non exigible en Première). Soit M le milieu de $[BC]$.

Alors :

$$AM^2 = \frac{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}{4}.$$

EXEMPLE Dans un triangle ABC avec $AB = 8$, $AC = 5$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.

Calculer BC .

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 64 + 25 - 2 \times 8 \times 5 \times \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49.$$

Donc $BC = 7$.

EXEMPLE Dans un triangle ABC avec $a = 7$, $b = 5$, $c = 8$. Calculer $\widehat{BAC}$.

$$\cos(\widehat{BAC}) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 64 - 49}{2 \times 5 \times 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}.$$

Donc $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Se tromper dans l'attribution des cotes et des angles dans la formule d'Al-Kashi. Le cote isole au premier membre est **toujours** le cote oppose a l'angle utilise.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le signe moins dans $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la formule d'Al-Kashi avec la loi des sinus $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, qui est une autre relation dans le triangle.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

La formule d'Al-Kashi est aussi appelee « loi des cosinus » ou « theoreme de la generalisation de Pythagore ». Elle est connue depuis l'Antiquite (Euclide) mais a ete systematisee par le mathematicien persan Al-Kashi au XV^e siecle.

🔗 MÉTHODE M1 Calculer un produit scalaire

Quand l'utiliser. J'utilise cette methode lorsque l'enonce demande de calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, soit a partir des normes et de l'angle, soit a partir des coordonnees.

La méthode pas à pas.

1. Si je connais les coordonnees de $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ dans un repere **orthonorme** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$.
2. Si je connais les normes et l'angle : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\hat{u}, \vec{v})$.
3. Si je connais une projection : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \overline{OH}$ ou H est le projete orthogonal.

Exemple rédigé. Calculons $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 4 + (-3) \times 1 = 8 - 3 = 5$.

Les pièges.

- ▶ Utiliser la formule analytique dans un repere non orthonorme.
- ▶ Oublier le cosinus dans la formule geometrique.
- ▶ Confondre le produit scalaire (nombre reel) avec un vecteur.

Vérifier son résultat. Je verifie le signe : si l'angle est aigu, le produit scalaire est positif ; si l'angle est obtus, il est negatif.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

① MÉTHODE M2 Développer et réduire avec le produit scalaire

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de développer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$, $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$ ou $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$, ou de calculer une norme à partir du produit scalaire.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie l'expression à développer.
2. J'applique l'identité remarquable correspondante :
 - ▶ $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$;
 - ▶ $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$;
 - ▶ $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.
3. Je remplace par les valeurs connues et je simplifie.

Exemple rédigé. Calculons $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ sachant que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 2 \times (-6) + 16 = 9 - 12 + 16 = 13$. Donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{13}$.

Les pièges.

- ▶ Écrire $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ en oubliant $2\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- ▶ Confondre $\|\vec{u}\|^2$ et $\vec{u}^2$ (notation abusive).
- ▶ Oublier que $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$, pas $\|\vec{u}\|$.

Vérifier son résultat. Si $\vec{u} \perp \vec{v}$, on retrouve le théorème de Pythagore : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

① MÉTHODE M3 Montrer l'orthogonalité ou calculer un angle

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de montrer que deux droites ou vecteurs sont perpendiculaires, ou de calculer l'angle entre deux vecteurs.

La méthode pas à pas.

1. Je calcule le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ (par coordonnées ou géométriquement).
2. **Pour l'orthogonalité :** je vérifie que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
3. **Pour l'angle :** je calcule $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$ puis $\theta = \arccos(\cos \theta)$.
4. Je vérifie que $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$ avant de diviser par les normes.

Exemple rédigé. Montrons que $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times (-4) + 2 \times 6 = -12 + 12 = 0$. Comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Les pièges.

- ▶ Conclure que deux vecteurs sont parallèles si $\vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0$.
- ▶ Oublier de vérifier que les vecteurs sont non nuls pour le calcul d'angle.
- ▶ Confondre $\cos \theta$ et θ : il faut passer par $\arccos$.

Vérifier son résultat. Pour l'orthogonalité, je vérifie en faisant un dessin rapide ou en utilisant la condition $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

Ⓜ MÉTHODE M4 Résoudre un problème géométrique avec le produit scalaire

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé demande de trouver une médiatrice, une hauteur, une projection ou une aire à l'aide du produit scalaire.

La méthode pas à pas.

1. **Médiatrice :** M est sur la médiatrice de $[AB]$ ssi $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ (avec I milieu de $[AB]$), ou de manière équivalente $MA = MB$.
2. **Hauteur :** le pied H de la hauteur issue de A dans le triangle ABC vérifie $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.
3. **Aire :** $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v})$ avec $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$.

Exemple rédigé. Soit $A(1;3)$ et $B(5;1)$. Déterminer l'équation de la médiatrice de $[AB]$.
 $I = (3;2)$ et $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$. $M(x;y)$ est sur la médiatrice ssi $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : (x-3) \times 4 + (y-2) \times (-2) = 0$, soit $4x - 2y - 8 = 0$, c'est-à-dire $2x - y = 4$.

Les pièges.

- ▶ Confondre médiatrice et médiane.
- ▶ Oublier le facteur $\frac{1}{2}$ dans la formule de l'aire.
- ▶ Ne pas savoir passer de $\cos$ à $\sin$ pour l'aire.

Vérifier son résultat. Pour la médiatrice, je vérifie que le milieu I satisfait l'équation, et que A et B ne la satisfont pas (sauf si $A = B$).

S'entraîner. (renvois exercices M4)

Ⓜ MÉTHODE M5 Appliquer la formule d'Al-Kashi

Quand l'utiliser. J'utilise cette méthode lorsque l'énoncé donne un triangle avec deux côtés et l'angle compris, ou trois côtés, et demande de calculer un côté ou un angle manquant.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les éléments connus : côtés a, b, c et angles $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ (le côté a est opposé à l'angle $\hat{A}$).
2. **Pour trouver un côté :** j'applique $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$.
3. **Pour trouver un angle :** j'isole $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ puis $\hat{A} = \arccos(\dots)$.
4. Je simplifie et je donne le résultat exact ou arrondi selon la consigne.

Exemple rédigé. Dans le triangle ABC , $AB = 6$, $AC = 4$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$. Calculer BC . $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 36 + 16 - 48 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 52 - 24\sqrt{2}$. $BC = \sqrt{52 - 24\sqrt{2}} \approx 4,35$.

Les pièges.

- ▶ Se tromper dans l'attribution côté/angle : le côté isolé est opposé à l'angle utilisé.
- ▶ Oublier le signe $-$ dans la formule.
- ▶ Oublier de prendre la racine carrée à la fin pour obtenir le côté.

Vérifier son résultat. Si l'angle est droit ($\pi/2$), on doit retrouver le théorème de Pythagore. Vérifier aussi que $\cos \hat{A}$ est entre -1 et 1 .

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1 ◆

Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans chaque cas.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$
3. $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$

Exercice 2 ◆

Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ à l'aide de la définition géométrique.

1. $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{6}$.
2. $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$.

Exercice 3 ◆

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{u}$ et $\vec{v} \cdot \vec{v}$.
2. En déduire $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.
3. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Exercice 4 ◆

Calculer les produits scalaires suivants.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 6$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{4}$.
2. $\vec{a} \cdot \vec{b}$ avec $\|\vec{a}\| = 2$, $\|\vec{b}\| = 3$ et $(\vec{a}, \vec{b}) = \pi$.
3. $\vec{p} \cdot \vec{q}$ avec $\|\vec{p}\| = 7$, $\|\vec{q}\| = 1$ et $(\vec{p}, \vec{q}) = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 5 ◆◆

Soient $A(1;2)$, $B(3;5)$ et $C(0;6)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
3. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$.
4. Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Exercice 6 ◆◆

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. Calculer les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} - \vec{v}$.
3. Calculer $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$.
4. Vérifier que ce résultat est égal à $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.

Exercice 7 ◆◆

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.
2. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
3. En deduire le cosinus de l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
4. Ce produit scalaire est-il positif ou negatif? Que peut-on en deduire sur l'angle?

Exercice 8

Calculer les produits scalaires suivants et preciser si l'angle est aigu, droit ou obtus.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 8$, $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$.
2. $\vec{a} \cdot \vec{b}$ avec $\|\vec{a}\| = 3$, $\|\vec{b}\| = 5$, $(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2\pi}{3}$.

Exercice 9

Dans un repere orthonorme, on considere $A(0;0)$, $B(6;0)$ et $C(2;4)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$.
2. En deduire les cosinus des trois angles du triangle ABC .
3. Verifier que la somme des trois angles vaut π .

Exercice 10

Le vecteur $\vec{u}$ a pour norme 4 et fait un angle de $\frac{\pi}{3}$ avec l'axe des abscisses. Le vecteur $\vec{v}$ a pour norme 3 et fait un angle de $-\frac{\pi}{4}$ avec l'axe des abscisses.

1. Donner les coordonnees de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
2. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ par la formule analytique.
3. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ par la definition geometrique.
4. Verifier la coherence des deux resultats.

Exercice 11

Sachant que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2$, calculer :

1. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$
2. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$
3. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$

Exercice 12

Demontrer que pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

Indication : developper $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$ par bilinearite.

Exercice 13

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\|\vec{u}\|^2$, $\|\vec{v}\|^2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ de deux manieres : directement et par l'identite remarquable.
3. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.

Exercice 14

1. Démontrer l'**identité de polarisation** : pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2).$$

2. En déduire une autre forme : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2).$

Exercice 15

Sachant que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$, développer et calculer :

1. $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + 3\vec{v})$
2. $\|3\vec{u} + \vec{v}\|^2$

Exercice 16

On sait que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 7$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Exercice 17

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
2. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ par l'identité remarquable.
3. Vérifier que le théorème de Pythagore est bien vérifié : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$.

Exercice 18

Montrer que $(\vec{u} + \vec{v}) \perp (\vec{u} - \vec{v})$ si et seulement si $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$.

Interprétation géométrique : dans un parallélogramme dont les cotés sont égaux (losange), les diagonales sont perpendiculaires.

Exercice 19

Identité du parallélogramme. Démontrer que pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2).$$

Interprétation géométrique : dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des quatre cotés.

Exercice 20

Sachant que $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\| = 7$, calculer :

1. $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. L'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
3. $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.

Exercice 21

Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$ sont-ils orthogonaux ? Justifier.

Exercice 22

Montrer que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux.

Exercice 23 ◆

Calculer l'angle entre $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 24 ◆

Montrer que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -1 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux. En deduire que les droites de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont perpendiculaires.

Exercice 25 ◆◆

Soient $A(1;3)$, $B(4;1)$ et $C(-1;0)$.

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle. Preciser en quel sommet.
2. Calculer les longueurs des trois cotes.

Exercice 26 ◆◆

Determiner la valeur de k pour que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix}$ soient orthogonaux.

Exercice 27 ◆◆

Calculer l'angle entre les droites (d_1) de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et (d_2) de vecteur directeur $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Exercice 28 ◆◆

Soient $A(0;0)$, $B(1;2)$, $C(3;1)$ et $D(-1;3)$.

1. Montrer que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.
2. Calculer l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

Exercice 29 ◆◆◆

Determiner l'ensemble des couples (k, m) tels que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} k \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ m \end{pmatrix}$ soient orthogonaux. Représenter cet ensemble dans le plan (k, m) .

Exercice 30 ◆◆◆

Soit ABC un triangle équilatéral de cote 2. On place A à l'origine et B en $(2;0)$.

1. Determiner les coordonnées de C (on choisira C avec $y_C > 0$).
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et en deduire l'angle $\widehat{BAC}$.
3. Verifier que les trois angles du triangle sont égaux à $\frac{\pi}{3}$.

Exercice 31 ◆

Soient $A(1;3)$ et $B(5;1)$. Determiner l'équation de la médiatrice de $[AB]$.

Exercice 32 ◆

Soit $A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(2;4)$. Determiner les coordonnées du pied H de la hauteur issue de A dans le triangle ABC .

Exercice 33 ◆

Calculer l'aire du triangle ABC avec $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $C(1;3)$.

Exercice 34 ◆

Soient $A(2;1)$ et $B(6;3)$.

1. Déterminer l'équation de la médiatrice de $[AB]$.
2. Vérifier que le point $C(3;4)$ appartient à cette médiatrice.

Exercice 35 ◆◆

Dans un triangle ABC , on donne $AB = 5$, $AC = 8$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{6}$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. Calculer l'aire du triangle ABC .

Exercice 36 ◆◆

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer le projeté orthogonal de $\vec{v}$ sur $\vec{u}$: $\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$.
2. Vérifier que $\vec{v} - \text{proj}_{\vec{u}} \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$.

Exercice 37 ◆◆

Soit $A(0;0)$, $B(4;0)$, $C(4;3)$.

1. Montrer que le triangle est rectangle en B .
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Déterminer les coordonnées du pied de la hauteur issue de C relative à $[AB]$.

Exercice 38 ◆◆

Soit $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $C(1;3)$.

1. Déterminer l'équation de la médiatrice de $[AB]$.
2. Déterminer l'équation de la médiatrice de $[AC]$.
3. En déduire les coordonnées du centre Ω du cercle circonscrit au triangle ABC .

Exercice 39 ◆◆◆

Soit $A(0;0)$, $B(5;0)$ et $C(2;3)$.

1. Déterminer l'équation de la hauteur issue de A (perpendiculaire à (BC) passant par A).
2. Déterminer l'équation de la hauteur issue de B (perpendiculaire à (AC) passant par B).
3. En déduire les coordonnées de l'orthocentre H .

Exercice 40 ◆◆◆

Un triangle ABC a pour sommets $A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(3;4)$.

1. Montrer que le triangle est isocèle en C .
2. Montrer que la médiatrice de $[AB]$ passe par C .
3. Calculer l'aire du triangle.

4. Déterminer les coordonnées du pied de la hauteur issue de C.

Exercice 41 ◆

Dans un triangle ABC , on donne $AB = 5$, $AC = 7$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$. Calculer BC .

Exercice 42 ◆

Dans un triangle ABC , on donne $a = BC = 3$, $b = AC = 4$ et $c = AB = 5$.

1. Calculer $\cos \widehat{BAC}$.
2. En déduire $\widehat{BAC}$.
3. Que remarque-t-on ?

Exercice 43 ◆◆

Dans un triangle ABC , $a = 8$, $b = 5$, $c = 7$.

1. Calculer les trois angles du triangle.
2. Vérifier que la somme des angles vaut π .

Exercice 44 ◆◆

Dans un triangle ABC , on donne $a = BC = 6$, $b = AC = 10$ et $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{4}$. Calculer $c = AB$.

Exercice 45 ◆◆

Approfondissement — Vers la Terminale

Dans un triangle ABC , $AB = 6$, $AC = 8$ et $BC = 10$.

1. Calculer la longueur de la médiane issue de A à l'aide de la formule de la médiane.
2. Quelle est la nature du triangle ?

Exercice 46 ◆◆

Montrer que le triangle de cotes 3, 4 et 5 est rectangle en utilisant la formule d'Al-Kashi.

Exercice 47 ◆◆

Démonstration de la formule d'Al-Kashi.

Dans un triangle ABC , démontrer que $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$ en utilisant le produit scalaire.

Exercice 48 ◆◆

Approfondissement — Vers la Terminale

Dans un triangle ABC , $AB = 7$, $AC = 5$ et $BC = 8$.

1. Calculer $\cos \widehat{BAC}$.
2. Calculer la longueur de la médiane issue de A.

Exercice 49 ◆◆◆

Un quadrilatère $ABCD$ a pour sommets $A(0;0)$, $B(3;0)$, $C(4;2)$ et $D(1;3)$.

1. Calculer les longueurs des diagonales AC et BD .
2. Montrer que les diagonales ne sont pas perpendiculaires.
3. Calculer l'angle entre les diagonales.

Exercice 50

Approfondissement — Vers la Terminale

Un terrain triangulaire a pour cotes $a = 5$ m, $b = 6$ m et $c = 7$ m.

1. Calculer les trois angles du triangle.
2. En deduire l'aire du terrain par la formule $A = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C}$.
3. Calculer la longueur de la mediane issue du sommet oppose au cote de longueur 7.

Coup de pouce 1. Utiliser la formule analytique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$ si les coordonnees sont connues.

Coup de pouce 2. Sinon, utiliser la formule geometrique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Coup de pouce 1. Utiliser la formule analytique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$ si les coordonnees sont connues.

Coup de pouce 2. Sinon, utiliser la formule geometrique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Coup de pouce 1. Utiliser la formule analytique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$ si les coordonnees sont connues.

Coup de pouce 2. Sinon, utiliser la formule geometrique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Coup de pouce 1. Utiliser la formule analytique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$ si les coordonnees sont connues.

Coup de pouce 2. Sinon, utiliser la formule geometrique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Coup de pouce 1. Utiliser l'identite $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Coup de pouce 2. Se rappeler que $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Coup de pouce 1. Utiliser l'identite $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Coup de pouce 2. Se rappeler que $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Coup de pouce 1. Utiliser l'identite $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Coup de pouce 2. Se rappeler que $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Coup de pouce 1. Utiliser l'identite $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Coup de pouce 2. Se rappeler que $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Coup de pouce 1. Pour montrer l'orthogonalite, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et verifier qu'il vaut 0.

Coup de pouce 2. Pour l'angle, utiliser $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

Coup de pouce 1. Pour montrer l'orthogonalite, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et verifier qu'il vaut 0.

Coup de pouce 2. Pour l'angle, utiliser $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

Coup de pouce 1. Pour montrer l'orthogonalite, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et verifier qu'il vaut 0.

Coup de pouce 2. Pour l'angle, utiliser $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

Coup de pouce 1. Pour montrer l'orthogonalite, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et verifier qu'il vaut 0.

Coup de pouce 2. Pour l'angle, utiliser $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

Coup de pouce 1. Pour la mediatrice de $[AB]$, utiliser $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ avec I milieu.

Coup de pouce 2. Pour l'aire, utiliser $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$.

Coup de pouce 1. Pour la mediatrice de $[AB]$, utiliser $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ avec I milieu.

Coup de pouce 2. Pour l'aire, utiliser $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$.

Coup de pouce 1. Pour la mediatrice de $[AB]$, utiliser $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ avec I milieu.

Coup de pouce 2. Pour l'aire, utiliser $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$.

Coup de pouce 1. Pour la mediatrice de $[AB]$, utiliser $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ avec I milieu.

Coup de pouce 2. Pour l'aire, utiliser $A = \frac{1}{2} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$.

Coup de pouce 1. Identifier le cote oppose a l'angle dans la formule d'Al-Kashi.

Coup de pouce 2. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$: le cote a est oppose a l'angle $\hat{A}$.

Coup de pouce 1. Identifier le cote oppose a l'angle dans la formule d'Al-Kashi.

Coup de pouce 2. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$: le cote a est oppose a l'angle $\hat{A}$.

TD — Navigation et cap

Duree : 50 minutes.

Situation

Un bateau quitte le port P et navigue 8 km dans la direction du vecteur $\vec{u}$ (cap nord-est, angle $\frac{\pi}{4}$ avec l'axe est). Il change ensuite de cap et parcourt 5 km dans la direction du vecteur $\vec{v}$ (cap sud-est, angle $-\frac{\pi}{6}$ avec l'axe est). On souhaite calculer la distance totale au port et l'angle entre les deux trajets.

Partie A — Modelisation vectorielle (C1) — 10 min

1. Exprimer les coordonnees de $\vec{u}$ dans un repere orthonorme, sachant que $\|\vec{u}\| = 8$ et que $\vec{u}$ fait un angle de $\frac{\pi}{4}$ avec l'axe des abscisses.
2. Exprimer les coordonnees de $\vec{v}$ avec $\|\vec{v}\| = 5$ et un angle de $-\frac{\pi}{6}$.
3. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ par la formule analytique.

Partie B — Angle entre les trajets (C3) — 10 min

4. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ par la definition geometrique. En deduire l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
5. Verifier la coherence avec la valeur obtenue dans la Partie A.

Partie C — Distance au port (C5) — 15 min

6. Le point d'arrivee Q verifie $\overrightarrow{PQ} = \vec{u} + \vec{v}$. Calculer $PQ^2 = \|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ en utilisant l'identite remarquable vectorielle.
7. En deduire PQ (arrondir au dixieme).
8. Retrouver ce resultat par la formule d'Al-Kashi dans le triangle forme par P , le point intermediaire R (fin du premier trajet) et Q , sachant que $PR = 8$, $RQ = 5$ et l'angle en R est $\pi - \theta$.

Partie D — Synthese (C1, C5) — 15 min

9. Le cap de retour direct de Q a P fait un angle α avec l'axe est. Calculer $\cos \alpha$ et $\sin \alpha$ a partir des coordonnees de $\overrightarrow{QP}$.
10. Rediger une synthese de 3 a 5 lignes expliquant comment le produit scalaire et la formule d'Al-Kashi permettent de resoudre un probleme de navigation.

TD fil rouge — Le randonneur et le triangle de terrain

Durée : 50 minutes — Toutes les capacités C1 à C5 sont mobilisées.

Accroche

Un randonneur part d'un refuge A , marche 5 km vers le nord-est jusqu'à un sommet B , puis 3 km vers le sud-est jusqu'à un lac C . L'angle $\widehat{ABC} = \frac{2\pi}{3}$. On munit le plan d'un repère orthonorme d'unité 1 km.

Partie A — Produit scalaire et distances (C1, C2) — 10 min

1. Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ à l'aide de la définition géométrique.
2. En déduire $\|\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\|^2$ en utilisant l'identité remarquable vectorielle $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
3. Calculer $\|\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}\|^2$. Que représente le vecteur $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}$?

Partie B — Distance AC par Al-Kashi (C5) — 10 min

4. Appliquer la formule d'Al-Kashi dans le triangle ABC pour calculer AC .
5. Vérifier la cohérence avec le résultat de la question 3 de la Partie A.

Partie C — Angles et orthogonalité (C3) — 15 min

6. Calculer $\cos(\widehat{BAC})$ à l'aide du produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
7. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.
8. On place D tel que $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$. Montrer que $\overrightarrow{BD}$ est orthogonal à $\overrightarrow{AC}$ si et seulement si $AB = BC$.

Partie D — Aire et hauteur (C4) — 15 min

9. Calculer l'aire du triangle ABC à l'aide de la formule $A = \frac{1}{2} \times AB \times BC \times \sin(\widehat{ABC})$.
10. En déduire la hauteur h issue de A dans le triangle ABC (hauteur relative au côté $[BC]$).
11. Le randonneur souhaite rejoindre le côté $[BC]$ en marchant perpendiculairement. Montrer que la distance minimale est exactement h .

PRODUIT SCALAIRE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Soient $\vec{u}(3, -2)$ et $\vec{v}(1, 4)$. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{v}$?
A. -5
B. 5
C. -11
D. 11
2. [Q2] Si $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \frac{\pi}{3}$, quelle est la valeur de $\vec{u} \cdot \vec{v}$?
A. 20

- B. 10
- C. $10\sqrt{3}$
- D. $10\sqrt{2}$

3. [Q3] Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est :
- A. un vecteur
 - B. un nombre réel
 - C. toujours positif
 - D. défini uniquement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls

Capacité C2

4. [Q4] $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = ?$
- A. $\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$
 - B. $\|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
 - C. $\|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
 - D. $(\vec{u} \cdot \vec{v})^2$
5. [Q5] $\vec{u} \cdot \vec{u} = ?$
- A. $\|\vec{u}\|$
 - B. $\|\vec{u}\|^2$
 - C. $2\|\vec{u}\|$
 - D. 0
6. [Q6] Sachant que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$, quelle est la valeur de $\|\vec{u} + \vec{v}\|$?
- A. 5
 - B. $\sqrt{35}$
 - C. 7
 - D. $\sqrt{25}$

Capacité C3

7. [Q7] Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si :
- A. $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$
 - B. $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$
 - C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
 - D. $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$
8. [Q8] Les vecteurs $\vec{u}(2, 3)$ et $\vec{v}(3, -2)$ sont :
- A. colinéaires
 - B. orthogonaux
 - C. de normes différentes
 - D. de sens contraire
9. [Q9] Quel est l'angle géométrique entre les vecteurs $(1, 0)$ et $(1, 1)$?
- A. $\frac{\pi}{6}$
 - B. $\frac{\pi}{4}$
 - C. $\frac{\pi}{3}$
 - D. $\frac{\pi}{2}$

Capacité C4

10. [Q10] Un point M appartient à la médiatrice du segment $[AB]$ si et seulement si :
- A. $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$
 - B. $MA = MB$
 - C. $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0}$
 - D. $MA + MB = AB$
11. [Q11] Dans un triangle de côtés a, b formant un angle θ , l'aire est donnée par :
- A. $ab \cos(\theta)$

- B. $\frac{1}{2}ab \cos(\theta)$
- C. $\frac{1}{2}ab \sin(\theta)$
- D. $ab \sin(\theta)$

12. [Q12] Soit H le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC . Quelle relation est exacte ?

- A. $\vec{AH} \cdot \vec{AB} = 0$
- B. $\vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0$
- C. $\vec{AH} \cdot \vec{AC} = 0$
- D. $AH = BH$

Capacité C5

13. [Q13] Quelle est l'expression exacte de la formule d'Al-Kashi ?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos(A)$
- B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(A)$
- C. $a^2 = b^2 - c^2 - 2bc \cos(A)$
- D. $a = b + c - 2bc \cos(A)$

14. [Q14] Dans un triangle avec $b = 5$, $c = 8$ et $\hat{A} = \frac{\pi}{3}$, que vaut a^2 ?

- A. 49
- B. 89
- C. 129
- D. 9

15. [Q15] Si $\hat{A} = \frac{\pi}{2}$, la formule d'Al-Kashi redonne :

- A. $a^2 = b^2 - c^2$
- B. $a^2 = b^2 + c^2$
- C. $a^2 = 2bc$
- D. $a = b + c$

Clé de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	A
Q2	C1	B
Q3	C1	B
Q4	C2	B
Q5	C2	B
Q6	C2	B
Q7	C3	C
Q8	C3	B
Q9	C3	B
Q10	C4	B
Q11	C4	C
Q12	C4	B
Q13	C5	B
Q14	C5	A
Q15	C5	B

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- B — L'élève a soustrait les deux composantes de $\vec{u}$ et calcule $3 - (-2) = 5$, au lieu de former les produits de composantes $3 \times 1 + (-2) \times 4$. *Renvoi : M1.*
- C — L'élève a changé à tort le signe du premier produit et calcule $-3 - 8 = -11$ au lieu de $3 - 8 = -5$. *Renvoi : M1.*
- D — L'élève a oublié le signe négatif de la deuxième composante et calcule $3 + 8 = 11$ au lieu de $3 + (-8) = -5$. *Renvoi : M1.*

► Q2

- A — Oubli du facteur $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. *Renvoi : M1.*
- C — Confusion entre le cosinus et le sinus. *Renvoi : M1 ; R3.*
- D — L'élève a utilisé à tort $\cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$ à la place de $\cos(\pi/3) = 1/2$, obtenant $5 \times 4 \times \sqrt{2}/2 = 10\sqrt{2}$. *Renvoi : M1 ; R3.*

► Q3

- A — Confusion avec le produit vectoriel. *Renvoi : M1.*
- C — Le produit scalaire peut être négatif si l'angle est obtus. *Renvoi : M1.*
- D — On pose $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ si l'un des vecteurs est nul. *Renvoi : M1.*

► Q4

- A — Oubli du double produit $2\vec{u} \cdot \vec{v}$. *Renvoi : M2.*
- C — Signe du double produit (c'est la formule pour $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$). *Renvoi : M2.*
- D — Confusion entre norme du carré de la somme et carré du produit scalaire. *Renvoi : M2.*

► Q5

- A — Oubli du carré dans la définition du carré scalaire. *Renvoi : M2.*
- C — L'élève a interprété $\vec{u} \cdot \vec{u}$ comme la somme de deux exemplaires de la norme et additionne deux normes, d'où $2\|\vec{u}\|$ au lieu de $\|\vec{u}\|^2$. *Renvoi : M2.*
- D — $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$ si et seulement si $\vec{u} = \vec{0}$. *Renvoi : M2.*

► Q6

- A — $\sqrt{25} = 5$ mais $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 10 + 16 = 35$. *Renvoi : M2.*
- C — L'élève a transformé l'inégalité triangulaire $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ en égalité et obtenu $3 + 4 = 7$; l'égalité n'est pas justifiée ici. *Renvoi : M2.*
- D — $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 35$, et non 25. *Renvoi : M2.*

► Q7

- A — Le signe strict ne caractérise pas l'orthogonalité. *Renvoi : M3.*

- B — Un produit scalaire négatif caractérise un angle obtus, pas un angle droit ; l'orthogonalité exige un produit scalaire nul. *Renvoi : M3.*
- D — Avoir la même norme ne garantit pas l'orthogonalité. *Renvoi : M3.*

► Q8

- A — Le déterminant vaut $2 \times (-2) - 3 \times 3 = -13 \neq 0$. *Renvoi : M3.*
- C — $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \sqrt{13}$: leurs normes sont égales, et non différentes. *Renvoi : M3.*
- D — Des vecteurs de sens contraire sont colinéaires avec un coefficient négatif ; ici leur déterminant vaut $-13 \neq 0$, donc ils ne sont pas colinéaires. *Renvoi : M3.*

► Q9

- A — L'élève a utilisé à tort $\tan(\theta) = 1/\sqrt{3}$, ce qui conduit à $\theta = \pi/6$; les coordonnées de $(1, 1)$ donnent en réalité $\tan(\theta) = 1$. *Renvoi : M3 ; R3.*
- C — L'élève a utilisé à tort $\tan(\theta) = \sqrt{3}$, ce qui conduit à $\theta = \pi/3$; la pente du vecteur $(1, 1)$ vaut 1. *Renvoi : M3 ; R3.*
- D — Le produit scalaire est non nul ($1 \neq 0$). *Renvoi : M3.*

► Q10

- A — Ce serait l'équation du cercle de diamètre $[AB]$. *Renvoi : M4.*
- C — Ceci caractérise le milieu de $[AB]$. *Renvoi : M4.*
- D — Ceci caractérise l'appartenance au segment $[AB]$. *Renvoi : M4.*

► Q11

- A — Cosinus au lieu de sinus et oubli du facteur $1/2$. *Renvoi : M4.*
- B — Cosinus au lieu de sinus. *Renvoi : M4.*
- D — Oubli du facteur $1/2$. *Renvoi : M4.*

► Q12

- A — La hauteur est perpendiculaire au côté opposé (BC) , pas à (AB) . *Renvoi : M4.*
- C — La hauteur est perpendiculaire à (BC) , pas à (AC) . *Renvoi : M4.*
- D — Relation de longueurs non justifiée. *Renvoi : M4.*

► Q13

- A — Signe + au lieu de - devant le terme en cosinus. *Renvoi : M5.*
- C — Signe - devant c^2 au lieu de +. *Renvoi : M5.*
- D — Oubli des carrés sur les longueurs des côtés. *Renvoi : M5.*

► Q14

- B — Oubli du terme $-2bc \cos(A)$. *Renvoi : M5.*
- C — Erreur de signe $+2bc \cos(A)$ au lieu de -. *Renvoi : M5.*
- D — L'élève a calculé le carré de la différence des deux longueurs, $(8 - 5)^2 = 9$, au lieu d'appliquer $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(A)$. *Renvoi : M5.*

► Q15

- A — Signe - au lieu de +. *Renvoi : M5 ; R5.*
- C — L'élève a conservé le terme $2bc$ et l'a pris pour a^2 ; lorsque $A = \pi/2$, le terme $2bc \cos(A)$ est nul, pas a^2 . *Renvoi : M5 ; R5.*
- D — Ce n'est pas l'égalité du théorème de Pythagore. *Renvoi : M5 ; R5.*

Corrige — Evaluation A — Produit scalaire

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + (-1) \times 5 = 6 - 5 = 1$.

Question 2. $\|\vec{u}\| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}$.

Question 3. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 10 + 2 + 29 = 41$.

Donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{41}$.

Verification directe : $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 25 + 16 = 41$. ✓

Question 4. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 10 - 29 = -19$.

Verification : $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \end{pmatrix}$. $(5)(1) + (4)(-6) = 5 - 24 = -19$. ✓

Exercice 2 — 5 points

Question 1. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 2 + (-2) \times 3 = 6 - 6 = 0.$$

Le triangle ABC est rectangle en A .

Question 2. $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 3 + 10 = 13, \|\overrightarrow{BA}\| = \sqrt{13}, \|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{26}.$$

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{13}{\sqrt{13}\sqrt{26}} = \frac{13}{\sqrt{338}} = \frac{13}{13\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Donc } \widehat{ABC} = \frac{\pi}{4}.$$

Question 3. $\widehat{ACB} = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$.

Le triangle est rectangle isocèle en A .

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $I = (3; 0)$ milieu de $[AB]$ et $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : 6(x - 3) + 0 = 0, \text{ soit } x = 3.$$

Question 2. $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$. On paramétrise : $H = B + t \overrightarrow{BC} = (6 - 4t; 4t)$.

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 : (6 - 4t)(-4) + (4t)(4) = 0, \text{ soit } -24 + 32t = 0, \text{ d'où } t = \frac{3}{4}.$$

$$H = (3; 3).$$

Question 3. $A = \frac{1}{2} |x_B \cdot y_C - x_C \cdot y_B| = \frac{1}{2} |6 \times 4 - 2 \times 0| = \frac{24}{2} = 12$.

Exercice 4 — 5 points

Question 1. $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC} = 64 + 25 - 80 \times \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49$.

$$BC = 7.$$

Question 2. $\cos \widehat{ABC} = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2 \cdot BC \cdot AB} = \frac{49 + 64 - 25}{112} = \frac{88}{112} = \frac{11}{14}$.

Question 3. $A = \frac{1}{2} \times AB \times AC \times \sin \widehat{BAC} = \frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \approx 17,3$.

Evaluation A — Produit scalaire

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$. (1 pt)
2. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$. (1 pt)
3. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ par l'identité remarquable. (1,5 pt)
4. Calculer $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ et vérifier que le résultat est $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$. (1,5 pt)

Exercice 2

5 points — C3

Soient $A(1;2)$, $B(4;0)$ et $C(3;5)$.

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle. Préciser en quel sommet. (2 pt)
2. Calculer l'angle $\widehat{ABC}$. (2 pt)
3. En déduire l'angle $\widehat{ACB}$. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C4

Soient $A(0;0)$, $B(6;0)$ et $C(2;4)$.

1. Déterminer l'équation de la médiatrice de $[AB]$. (1,5 pt)
2. Déterminer les coordonnées du pied H de la hauteur issue de A . (2 pt)
3. Calculer l'aire du triangle ABC . (1,5 pt)

Exercice 4

5 points — C5

Dans un triangle ABC , on donne $AB = 8$, $AC = 5$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.

1. Calculer BC à l'aide de la formule d'Al-Kashi. (2 pt)
2. Calculer $\cos \widehat{ABC}$. (1,5 pt)
3. Calculer l'aire du triangle ABC . (1,5 pt)

Corrige — Evaluation B — Produit scalaire

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times (-1) + 2 \times 3 = -4 + 6 = 2$.

Question 2. $\|\vec{u}\| = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$.

Question 3. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 20 - 4 + 10 = 26$.

Donc $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{26}$.

Vérification : $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 25 + 1 = 26$. ✓

Question 4. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 20 - 10 = 10$.

Vérification : $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$. $15 - 5 = 10$. ✓

Exercice 2 — 5 points

Question 1. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 - 6 = 0$.

Le triangle est **rectangle en A**.

Question 2. $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 3 + 10 = 13, \|\overrightarrow{BA}\| = \sqrt{13}, \|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{26}.$$

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{13}{\sqrt{13} \times \sqrt{26}} = \frac{13}{13\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\widehat{ABC} = \frac{\pi}{4}.$$

Question 3. $\widehat{ACB} = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$. Triangle rectangle isocèle en A.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $I = (4; 0)$, $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix}$. Médiatrice : $8(x - 4) = 0$, soit $x = 4$.

Question 2. $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \end{pmatrix}$. $H = B + t \overrightarrow{BC} = (8 - 5t; 6t)$.

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 : (8 - 5t)(-5) + (6t)(6) = 0, \text{ soit } -40 + 25t + 36t = 0, 61t = 40, t = \frac{40}{61}.$$

$$H = \left(\frac{288}{61}; \frac{240}{61} \right).$$

Question 3. $A = \frac{1}{2} |x_B \cdot y_C - x_C \cdot y_B| = \frac{1}{2} |48 - 0| = 24$.

Exercice 4 — 5 points

Question 1. $BC^2 = 36 + 100 - 120 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 136 - 60\sqrt{2}$.

$$BC = \sqrt{136 - 60\sqrt{2}} \approx 7,15.$$

Question 2. $\cos \widehat{ABC} = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2 \cdot BC \cdot AB} = \frac{136 - 60\sqrt{2} + 36 - 100}{2 \cdot BC \cdot 6} = \frac{72 - 60\sqrt{2}}{12 BC}$.

$$\text{Numériquement : } \cos \widehat{ABC} \approx \frac{72 - 84,85}{12 \times 7,15} \approx \frac{-12,85}{85,8} \approx -0,150.$$

$$\widehat{ABC} \approx 98,6^\circ.$$

Question 3. $A = \frac{1}{2} \times 6 \times 10 \times \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 30 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 15\sqrt{2} \approx 21,2$.

Evaluation B — Produit scalaire

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$. (1 pt)
2. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$. (1 pt)
3. Calculer $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$ par l'identité remarquable. (1,5 pt)
4. Calculer $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ et vérifier que le résultat est $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$. (1,5 pt)

Exercice 2

5 points — C3

Soient $A(0;1)$, $B(3;-1)$ et $C(2;4)$.

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle. Préciser en quel sommet. (2 pt)
2. Calculer l'angle $\widehat{ABC}$. (2 pt)
3. En déduire l'angle $\widehat{ACB}$. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C4

Soient $A(0;0)$, $B(8;0)$ et $C(3;6)$.

1. Déterminer l'équation de la médiatrice de $[AB]$. (1,5 pt)
2. Déterminer les coordonnées du pied H de la hauteur issue de A . (2 pt)
3. Calculer l'aire du triangle ABC . (1,5 pt)

Exercice 4

5 points — C5

Dans un triangle ABC , on donne $AB = 6$, $AC = 10$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$.

1. Calculer BC à l'aide de la formule d'Al-Kashi. (2 pt)
2. Calculer $\cos \widehat{ABC}$. (1,5 pt)
3. Calculer l'aire du triangle ABC . (1,5 pt)

Rappel — Vecteurs et coordonnées dans le plan

Coordonnées d'un vecteur : Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Somme : $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$.

Produit par un scalaire : $\lambda \vec{u} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \end{pmatrix}$.

Exercice 51

Calculer les coordonnées des vecteurs suivants.

1. $\overrightarrow{AB}$ avec $A(1;3)$ et $B(4;-1)$.
2. $\vec{u} + \vec{v}$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$.
3. $3\vec{u}$ avec $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Corrigé

1. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$.
2. $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$.
3. $3\vec{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ 12 \end{pmatrix}$.

Rappel — Norme d'un vecteur

La **norme** d'un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

La **distance** entre $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Exercice 52

Calculer la norme de chaque vecteur.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
2. $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$
3. $\vec{w} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$

Corrigé

1. $\|\vec{u}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$. 2. $\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$. 3. $\|\vec{w}\| = \sqrt{25} = 5$.

Rappel — Valeurs remarquables de cos et sin

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Exercice 53

Donner les valeurs exactes.

1. $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$
2. $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$
3. $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Corrigé

1. $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 2. $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 3. $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Rappel — Identités remarquables

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Exercice 54

Développer et réduire.

1. $(x + 3)^2$
2. $(2x - 1)^2$
3. $(x + 2)(x - 2)$

Corrigé

1. $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$. 2. $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$. 3. $(x + 2)(x - 2) = x^2 - 4$.

Rappel — Theoreme de Pythagore

Dans un triangle rectangle en C : $AB^2 = AC^2 + BC^2$ (ou AB est l'hypotenuse).

Reciproque : Si $AB^2 = AC^2 + BC^2$, alors le triangle est rectangle en C.

Exercice 55

1. Dans un triangle rectangle en C , $AC = 3$ et $BC = 4$. Calculer AB .
2. Le triangle de cotes 5, 12 et 13 est-il rectangle ?
3. Le triangle de cotes 3, 5 et 7 est-il rectangle ?

Corrigé

1. $AB = \sqrt{9 + 16} = 5$. 2. $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$. Oui, rectangle. 3. $3^2 + 5^2 = 34 \neq 49 = 7^2$. Non, pas rectangle.

Remediation C1 — Calculer un produit scalaire

Exercice 56

Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans chaque cas.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
2. $\|\vec{u}\| = 6, \|\vec{v}\| = 2, \text{angle} = \frac{\pi}{4}$

Corrigé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 3 = -1$. 2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 12 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}$.

Remediation C2 — Propriétés du produit scalaire

Exercice 57

$\|\vec{u}\| = 2, \|\vec{v}\| = 3, \vec{u} \cdot \vec{v} = 4$. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$.

Corrigé

$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 4 + 8 + 9 = 21$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{21}$.

Remediation C3 — Orthogonalité et angles

Exercice 58

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ sont-ils orthogonaux ?
2. Calculer l'angle entre $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$.

Corrigé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 - 4 = 0$. Oui, orthogonaux. 2. $\cos \theta = \frac{1}{2}$, donc $\theta = \frac{\pi}{3}$.

Remediation C4 — Applications geometriques

Exercice 59 ♦

$A(0;0), B(4;2)$. Determiner l'équation de la mediatrice de $[AB]$.

Corrigé

$$I(2;1), \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}. 4(x-2) + 2(y-1) = 0, \text{ soit } 2x + y = 5.$$

Remediation C5 — Formule d'Al-Kashi

Exercice 60 ♦

Triangle ABC : $AB = 4, AC = 6, \widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$. Calculer BC .

Corrigé

$$BC^2 = 16 + 36 - 48 \times \frac{1}{2} = 52 - 24 = 28. BC = 2\sqrt{7} \approx 5,29.$$

Corrigé

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + 4 \times (-1) = 6 - 4 = 2.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 5 + (-2) \times 3 = 5 - 6 = -1.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \times (-3) + 7 \times 2 = 0 + 14 = 14.$

Corrigé

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times 4 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 20 \times \frac{1}{2} = 10.$

Corrigé

- $\vec{u} \cdot \vec{u} = 1^2 + 1^2 = 2$ et $\vec{v} \cdot \vec{v} = (-3)^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$
- $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{25} = 5.$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times (-3) + 1 \times 4 = -3 + 4 = 1.$

Corrigé

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 6 \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 24 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2}.$
- $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 3 \times \cos(\pi) = 6 \times (-1) = -6.$
- $\vec{p} \cdot \vec{q} = 7 \times 1 \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 7 \times 0 = 0.$

Corrigé

1. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$.
2. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times (-1) + 3 \times 4 = -2 + 12 = 10$.
3. $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$.
4. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (-2) \times (-3) + (-3) \times 1 = 6 - 3 = 3$.

Corrigé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 3 + 1 \times (-2) = 6 - 2 = 4$.
2. $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.
3. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 5 \times (-1) + (-1) \times 3 = -5 - 3 = -8$.
4. $\|\vec{u}\|^2 = 4 + 1 = 5$ et $\|\vec{v}\|^2 = 9 + 4 = 13$. Donc $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 5 - 13 = -8$. ✓

Corrigé

1. $\|\vec{u}\| = \sqrt{16 + 9} = 5$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$.
2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times (-2) + (-3) \times 1 = -8 - 3 = -11$.
3. $\cos \theta = \frac{-11}{5\sqrt{5}} = \frac{-11}{5\sqrt{5}} = \frac{-11\sqrt{5}}{25}$.
4. Le produit scalaire est négatif, donc l'angle θ est obtus ($\theta > \frac{\pi}{2}$).

Corrigé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 \times 8 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 48 \times \frac{1}{2} = 24 > 0$. L'angle est aigu.
2. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \times 5 \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 15 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{15}{2} < 0$. L'angle est obtus.

Corrigé

1. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$.
 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -24, \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = -8 + 16 = 8$.
2. $\|\overrightarrow{AB}\| = 6, \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}, \|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$.
 $\cos \hat{A} = \frac{12}{6 \times 2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$.
 $\cos \hat{B} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{\|\overrightarrow{BA}\| \|\overrightarrow{BC}\|} = \frac{24}{6 \times 4\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
 $\cos \hat{C} = \frac{\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}}{\|\overrightarrow{CA}\| \|\overrightarrow{CB}\|} = \frac{-8}{2\sqrt{5} \times 4\sqrt{2}} = \frac{-1}{\sqrt{10}}$.
3. $\hat{B} = \frac{\pi}{4}$. On vérifie que $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \pi$.

Corrigé

- $\vec{u} = \begin{pmatrix} 4 \cos \frac{\pi}{3} \\ 4 \sin \frac{\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2\sqrt{3} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \cos(-\frac{\pi}{4}) \\ 3 \sin(-\frac{\pi}{4}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{3\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times \frac{3\sqrt{2}}{2} + 2\sqrt{3} \times \left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}\right) = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{6}$.
- Angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $\frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{7\pi}{12}$. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 3 \times \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 12 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{6}$.
- Les deux résultats coïncident.

Corrigé

- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 9 + 2 \times (-2) + 16 = 21$. Donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{21}$.
- $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 9 - 2 \times (-2) + 16 = 29$. Donc $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{29}$.
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 9 - 16 = -7$.

Corrigé

On a $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$.

Par bilinearité :

$$\begin{aligned} (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) &= \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} \\ &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2. \end{aligned}$$

On a utilisé la symétrie $\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}$ et la propriété $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Corrigé

- $\|\vec{u}\|^2 = 4 + 1 = 5$, $\|\vec{v}\|^2 = 1 + 9 = 10$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 3 = -1$.
- Directement : $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 4 = 13$.
Par l'identité : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 5 + 2 \times (-1) + 10 = 13$. ✓
- $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{13}$.

Corrigé

- On part de $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
En isolant $\vec{u} \cdot \vec{v}$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2}{2}$.
- On a $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
Par soustraction : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 4\vec{u} \cdot \vec{v}$, d'où le résultat.

Corrigé

- Par bilinearité : $(2\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + 3\vec{v}) = 2\|\vec{u}\|^2 + 6\vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{v} - 3\|\vec{v}\|^2 = 2 \times 4 + 5 \times 1 - 3 \times 9 = 8 + 5 - 27 = -14$.
- $\|3\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9\|\vec{u}\|^2 + 6\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 36 + 6 + 9 = 51$.

Corrigé

On utilise l'identité de polarisation : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2}{2} = \frac{49 - 9 - 25}{2} = \frac{15}{2}$.

Corrigé

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times (-2) + 2 \times 1 = -2 + 2 = 0$. Les vecteurs sont orthogonaux.
- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2 \times 0 + \|\vec{v}\|^2 = 5 + 5 = 10$.
- Comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, on a bien $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 = 10$. C'est le theoreme de Pythagore.

Corrigé

$(\vec{u} + \vec{v}) \perp (\vec{u} - \vec{v})$ signifie $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 0$.

Or $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.

Donc $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 0 \iff \|\vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 \iff \|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$ (les normes sont positives).

Corrigé

On developpe chaque terme :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

En additionnant : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$.

Les termes en $\vec{u} \cdot \vec{v}$ s'annulent.

Corrigé

- $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$, donc $49 = 25 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + 9$, d'où $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\frac{15}{2}$.
- $\cos \theta = \frac{-15/2}{5 \times 3} = \frac{-15}{30} = -\frac{1}{2}$, donc $\theta = \frac{2\pi}{3}$.
- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 25 + 2 \times (-\frac{15}{2}) + 9 = 25 - 15 + 9 = 19$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{19}$.

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times (-3) + 4 \times 6 = -6 + 24 = 18 \neq 0.$$

Les vecteurs ne sont pas orthogonaux.

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 \times (-2) + 3 \times 4 = -12 + 12 = 0.$$

Comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, les vecteurs sont orthogonaux.

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 + 1 = 1, \|\vec{u}\| = \sqrt{2}, \|\vec{v}\| = 1.$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta = \frac{\pi}{4}.$$

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times \sqrt{3} + \sqrt{3} \times (-1) = \sqrt{3} - \sqrt{3} = 0.$$

Comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ et les deux vecteurs sont non nuls, ils sont orthogonaux. Les droites de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc perpendiculaires.

Corrigé

1. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times (-2) + (-2) \times (-3) = -6 + 6 = 0.$$

Le triangle ABC est rectangle en A .

2. $AB = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$, $AC = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$, $BC = \sqrt{25+1} = \sqrt{26}$.

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 1 + 1 \times k = 3 + k.$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff 3 + k = 0 \iff k = -3.$$

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 - 5 = 1, \|\vec{u}\| = \sqrt{5}, \|\vec{v}\| = \sqrt{34}.$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5} \times \sqrt{34}} = \frac{1}{\sqrt{170}}.$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{170}}\right) \approx 1,49 \text{ rad} \approx 85,6^\circ.$$

Corrigé

1. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = -4 + 4 = 0. \text{ Les droites sont perpendiculaires.}$$

2. $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 + 2 = 5.$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{5}, \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{10}.$$

$$\cos \theta = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta = \frac{\pi}{4}.$$

Corrigé

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2k + 3m = 0, \text{ soit } k = -\frac{3m}{2}.$$

L'ensemble des couples (k, m) est la droite d'équation $2k + 3m = 0$ dans le plan (k, m) , passant par l'origine de pente $-\frac{2}{3}$.

Corrigé

1. $C = (1; \sqrt{3})$ (milieu en abscisse, $y = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$).

2. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 1 + 0 \times \sqrt{3} = 2$. $\|\overrightarrow{AB}\| = 2$, $\|\overrightarrow{AC}\| = 2$. $\cos \widehat{BAC} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, donc $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.

3. Par symétrie du triangle équilatéral, les trois angles sont égaux à $\frac{\pi}{3}$.

Corrigé

Le milieu de $[AB]$ est $I(3; 2)$ et $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$.

$M(x; y)$ est sur la médiatrice ssi $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : (x - 3) \times 4 + (y - 2) \times (-2) = 0$, soit $4x - 2y - 8 = 0$, c'est-à-dire $2x - y = 4$.

Corrigé

$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$. On paramétrise : $H = B + t \overrightarrow{BC} = (6 - 4t; 4t)$.

$\overrightarrow{AH} = \begin{pmatrix} 6 - 4t \\ 4t \end{pmatrix}$. La condition $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ donne : $(6 - 4t)(-4) + 4t \times 4 = 0$, soit $-24 + 16t + 16t = 0$, d'où $t = \frac{3}{4}$.

$$H = (3; 3).$$

Corrigé

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4, \|\overrightarrow{AB}\| = 4, \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{10}.$$

$$\cos \hat{A} = \frac{4}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}, \sin \hat{A} = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

$$A = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{10} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = 6.$$

Corrigé

$$1. I = (4; 2), \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : 4(x - 4) + 2(y - 2) = 0, \text{ soit } 2x + y = 10.$$

$$2. 2 \times 3 + 4 = 10. \checkmark \text{ Le point C est sur la médiatrice, donc } CA = CB.$$

Corrigé

$$1. \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \times 8 \times \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 40 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3}.$$

$$2. A = \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 20 \times \frac{1}{2} = 10.$$

Corrigé

$$1. \vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 2 = 1 \text{ et } \|\vec{u}\|^2 = 5.$$

$$\text{proj}_{\vec{u}} \vec{v} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}.$$

$$2. \vec{v} - \text{proj} = \begin{pmatrix} 3 - 1/5 \\ -1 - 2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14/5 \\ -7/5 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 14/5 \\ -7/5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{14}{5} - \frac{14}{5} = 0. \checkmark$$

Corrigé

1. $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.
 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$. Le triangle est rectangle en B.
2. $A = \frac{1}{2} \times BA \times BC = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$.
3. La hauteur issue de C relative à [AB] est la perpendiculaire à (AB) passant par C. Comme (AB) est l'axe des abscisses, le pied est $H(4;0) = B$.

Corrigé

1. $I_{AB} = (2;0), \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$. Médiatrice : $4(x-2) = 0$, soit $x = 2$.
2. $I_{AC} = (1/2; 3/2), \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Médiatrice : $(x-1/2) + 3(y-3/2) = 0$, soit $x + 3y = 5$.
3. $x = 2$ et $2 + 3y = 5$, donc $y = 1$. Le centre est $\Omega(2;1)$.

Corrigé

1. $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}$. Hauteur issue de A : $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, soit $-3x + 3y = 0$, d'où $x = y$.
2. $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Hauteur issue de B : $2(x-5) + 3y = 0$, soit $2x + 3y = 10$.
3. $x = y$ et $2x + 3x = 10$, donc $x = 2, y = 2$. L'orthocentre est $H(2;2)$.

Corrigé

1. $CA = \sqrt{9+16} = 5$ et $CB = \sqrt{9+16} = 5$. Donc $CA = CB$: triangle isocèle en C.
2. La médiatrice de [AB] a pour équation $x = 3$ (milieu $(3;0)$, $\overrightarrow{AB}$ horizontal). Or $x_C = 3$, donc C est sur la médiatrice.
3. $A = \frac{1}{2} \times AB \times h = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$.
4. La hauteur issue de C est perpendiculaire à (AB) (axe Ox), donc $H = (3;0)$ (le pied est le projeté de C sur (AB)).

Corrigé

Par la formule d'Al-Kashi : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC} = 25 + 49 - 70 \times \frac{1}{2} = 74 - 35 = 39$.

$$BC = \sqrt{39} \approx 6,24.$$

Corrigé

1. $\cos \widehat{BAC} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{16 + 25 - 9}{40} = \frac{32}{40} = \frac{4}{5}$.
2. $\widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{4}{5}\right) \approx 0,644 \text{ rad} \approx 36,9^\circ$.
3. On vérifie : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Le triangle est rectangle en C (triplet pythagoricien).
 $\widehat{BCA} = \frac{\pi}{2}$.

Corrigé

- $$\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 49 - 64}{70} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}, \hat{A} \approx 81,8^\circ.$$

$$\cos \hat{B} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{64 + 49 - 25}{112} = \frac{88}{112} = \frac{11}{14}, \hat{B} \approx 38,2^\circ.$$

$$\cos \hat{C} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{64 + 25 - 49}{80} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}, \hat{C} = 60^\circ.$$
- $81,8^\circ + 38,2^\circ + 60^\circ = 180^\circ. \checkmark$

Corrigé

Par Al-Kashi : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C} = 36 + 100 - 120 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 136 - 60\sqrt{2}.$

$$c = \sqrt{136 - 60\sqrt{2}} \approx \sqrt{136 - 84,85} \approx \sqrt{51,15} \approx 7,15.$$

Corrigé**Approfondissement — Vers la Terminale**

- $AM^2 = \frac{2 \times 36 + 2 \times 64 - 100}{4} = \frac{72 + 128 - 100}{4} = \frac{100}{4} = 25.$ Donc $AM = 5.$
- $AB^2 + AC^2 = 36 + 64 = 100 = BC^2.$ Le triangle est rectangle en $A.$ La médiane issue de A est égale à la moitié de l'hypoténuse : $AM = BC/2 = 5. \checkmark$

Corrigé

On prend $a = 5$ (le plus grand côté), $b = 3, c = 4.$

$$\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{9 + 16 - 25}{24} = \frac{0}{24} = 0.$$

Donc $\hat{A} = \frac{\pi}{2}$: le triangle est rectangle en $A.$

C'est bien le théorème de Pythagore retrouvé comme cas particulier d'Al-Kashi.

Corrigé

$\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB},$ donc :

$$\begin{aligned} BC^2 &= \|\vec{BC}\|^2 = \|\vec{AC} - \vec{AB}\|^2 \\ &= \|\vec{AC}\|^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \|\vec{AB}\|^2 \\ &= AC^2 + AB^2 - 2AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}. \end{aligned}$$

Corrigé**Approfondissement — Vers la Terminale**

- $\cos \widehat{BAC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{49 + 25 - 64}{70} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}.$
- $AM^2 = \frac{2 \times 49 + 2 \times 25 - 64}{4} = \frac{98 + 50 - 64}{4} = \frac{84}{4} = 21.$
 $AM = \sqrt{21} \approx 4,58.$

Corrigé

1. $AC = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ et $BD = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$.
2. $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}. \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = -8 + 6 = -2 \neq 0$.
3. $\cos \theta = \frac{-2}{2\sqrt{5} \times \sqrt{13}} = \frac{-1}{\sqrt{65}},$ donc $\theta = \arccos\left(\frac{-1}{\sqrt{65}}\right) \approx 97,1^\circ$.

Corrigé

Approfondissement — Vers la Terminale

1. $\cos \hat{A} = \frac{36 + 49 - 25}{84} = \frac{60}{84} = \frac{5}{7}, \hat{A} \approx 44,4^\circ$.
 $\cos \hat{B} = \frac{25 + 49 - 36}{70} = \frac{38}{70} = \frac{19}{35}, \hat{B} \approx 57,1^\circ$.
 $\cos \hat{C} = \frac{25 + 36 - 49}{60} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}, \hat{C} \approx 78,5^\circ$.
2. $\sin \hat{C} = \sqrt{1 - 1/25} = \frac{\sqrt{24}}{5} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$.
 $A = \frac{1}{2} \times 5 \times 6 \times \frac{2\sqrt{6}}{5} = 6\sqrt{6} \approx 14,7 \text{ m}^2$.
3. Mediane issue du sommet oppose a $c = 7$ (sommet C, milieu M de $[AB]$) :
 $CM^2 = \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4} = \frac{50 + 72 - 49}{4} = \frac{73}{4},$ donc $CM = \frac{\sqrt{73}}{2} \approx 4,27 \text{ m}$.

CHAPITRE 8

Géométrie repérée

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais déterminer une équation cartésienne d'une droite $ax+by+c=0$ et l'exploiter.
- ▶ C2 — Je sais utiliser un vecteur normal à une droite, passer d'une équation cartésienne à un vecteur directeur/normal et réciproquement.
- ▶ C3 — Je sais déterminer et exploiter l'équation d'un cercle $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$.
- ▶ C4 — Je sais étudier les positions relatives de droites et de cercles (parallélisme, intersection, tangence).
- ▶ C5 — Je sais résoudre des problèmes géométriques dans un repère orthonormé.

© À RETENIR

Un ingénieur doit vérifier si un câble rectiligne (modélisé par une droite) traverse une zone circulaire interdite (modélisée par un cercle) dans un plan cartographique. Comment traduire ce problème en équations et le résoudre par le calcul ? Résolu au TD fil rouge avec les outils du chapitre (C1, C3, C4, C5).

Temps estimés : ◻ 12 h ◻◻ 10 h ◻◻◻ 9 h

CORRIGÉS

Contrat du chapitre

Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Déterminer une équation cartésienne d'une droite $ax + by + c = 0$ et l'exploiter.
- C2 Utiliser un vecteur normal à une droite, passer d'une équation cartésienne à un vecteur directeur/-normal et réciproquement.
- C3 Déterminer et exploiter l'équation d'un cercle $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.
- C4 Étudier les positions relatives de droites et de cercles (parallélisme, intersection, tangence).
- C5 Résoudre des problèmes géométriques variés dans un repère orthonormé.

Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur cinq familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Repérage dans le plan** — coordonnées d'un point, milieu d'un segment, distance entre deux points.
- R2 **Vecteurs et coordonnées** — somme de vecteurs, produit par un scalaire, colinéarité.
- R3 **Produit scalaire** — calcul analytique, condition d'orthogonalité.
- R4 **Équations du second degré** — discriminant, racines, signe d'un trinôme.
- R5 **Systèmes d'équations** — résolution de systèmes linéaires à deux inconnues.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

Temps de travail estimé

- ▶ Parcours ♦ (Consolidation) : environ 12 h.
- ▶ Parcours ♦♦ (Maîtrise) : environ 10 h.
- ▶ Parcours ♦♦♦ (Approfondissement) : environ 9 h.

Situation d'accroche — Le câble et la zone interdite

Un ingénieur cartographe travaille sur un plan quadrillé (repère orthonormé). Il doit vérifier si un câble rectiligne reliant deux pylônes $A(1;7)$ et $B(9;1)$ traverse une zone circulaire interdite de centre $\Omega(5;2)$ et de rayon 3.

- ▶ Comment écrire l'équation de la droite (AB) ?
- ▶ Comment écrire l'équation du cercle délimitant la zone interdite ?
- ▶ Le câble traverse-t-il la zone ? Touche-t-il le cercle ? Passe-t-il à l'extérieur ?

Cette situation sera entièrement résolue au Temps 7 (TD fil rouge), avec les outils du chapitre.

Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

R1 — Repérage dans le plan

1. Calcule la distance entre les points $A(1;3)$ et $B(4;7)$.

2. Détermine les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$ avec $A(2;6)$ et $B(8;4)$.

R2 — Vecteurs et coordonnées

3. Détermine les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$ avec $A(1;2)$ et $B(4;6)$.
 4. Les vecteurs $\vec{u}(2;3)$ et $\vec{v}(4;6)$ sont-ils colinéaires? Justifie.

R3 — Produit scalaire

5. Calcule le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\vec{u}(3;-1)$ et $\vec{v}(2;5)$.
 6. Les vecteurs $\vec{u}(4;3)$ et $\vec{v}(-3;4)$ sont-ils orthogonaux? Justifie.

R4 — Équations du second degré

7. Calcule le discriminant de l'équation $2x^2 - 3x + 1 = 0$ et déduis-en le nombre de solutions.

R5 — Systèmes d'équations

8. Résous le système $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

Bilan

Prérequis	Questions	Fiche si besoin
R1 — Repérage	Q1, Q2	Fiche R1
R2 — Vecteurs	Q3, Q4	Fiche R2
R3 — Produit scalaire	Q5, Q6	Fiche R3
R4 — Second degré	Q7	Fiche R4
R5 — Systèmes	Q8	Fiche R5

8.1 Équation cartésienne d'une droite

DÉFINITION 1

Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, une **équation cartésienne** d'une droite $\mathcal{D}$ est une équation de la forme

$$ax + by + c = 0$$

où a, b, c sont des réels avec $(a, b) \neq (0, 0)$.

Un point $M(x; y)$ appartient à $\mathcal{D}$ si et seulement si ses coordonnées vérifient cette équation.

EXEMPLE La droite $\mathcal{D}$ d'équation $2x - 3y + 6 = 0$.

- Le point $A(0;2)$: $2 \times 0 - 3 \times 2 + 6 = 0$. Donc $A \in \mathcal{D}$.
- Le point $B(3;0)$: $2 \times 3 - 3 \times 0 + 6 = 12 \neq 0$. Donc $B \notin \mathcal{D}$.
- Le point $C(3;4)$: $2 \times 3 - 3 \times 4 + 6 = -6 + 6 = 0$. Donc $C \in \mathcal{D}$.

♦ **PROPRIÉTÉ 1** Toute droite du plan admet une équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

- Si $b \neq 0$, on peut écrire $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$, soit $y = mx + p$ (équation réduite). La droite n'est pas verticale, de coefficient directeur $m = -\frac{a}{b}$ et d'ordonnée à l'origine $p = -\frac{c}{b}$.

► Si $b = 0$, l'équation devient $ax + c = 0$, soit $x = -\frac{c}{a}$: la droite est verticale.

EXEMPLE L'équation $3x + 2y - 6 = 0$ donne $y = -\frac{3}{2}x + 3$. Coefficient directeur $m = -\frac{3}{2}$, ordonnée à l'origine $p = 3$.

L'équation $5x + 10 = 0$ donne $x = -2$: droite verticale d'abscisse -2 .

⚠ CONTRE-EXEMPLE L'équation $0x + 0y + 3 = 0$ (soit $3 = 0$) ne définit aucune droite : $(a, b) = (0, 0)$.

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Pour déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ avec $A \neq B$:

1. Si $x_A = x_B$, la droite est verticale : $x = x_A$.
2. Sinon, calculer le coefficient directeur $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, puis $p = y_A - mx_A$. L'équation cartésienne est $mx - y + p = 0$.

EXEMPLE Droite passant par $A(1; 3)$ et $B(4; 9)$.

$$m = \frac{9 - 3}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2. \text{ Puis } p = 3 - 2 \times 1 = 1. \text{ Équation réduite : } y = 2x + 1, \text{ soit } 2x - y + 1 = 0.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Erreur sur le signe lors du passage équation réduite ↔ équation cartésienne.

Si $y = 2x - 5$, l'équation cartésienne est $2x - y - 5 = 0$ (et non $2x + y - 5 = 0$). Il faut passer le y de l'autre côté : $2x - y - 5 = 0$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le cas de la droite verticale.

La droite passant par $A(3; 1)$ et $B(3; 7)$ a pour équation $x = 3$ (et non $y = \dots$). Elle n'a pas de coefficient directeur.

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

L'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ n'est pas unique : toute équation $\lambda ax + \lambda by + \lambda c = 0$ avec $\lambda \neq 0$ définit la même droite. On peut toujours normaliser en imposant par exemple $a^2 + b^2 = 1$ (vecteur normal unitaire).

8.2 Vecteur normal à une droite

DÉFINITION 1

Un vecteur $\vec{n}$ non nul est **normal** à une droite $\mathcal{D}$ s'il est orthogonal à tout vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Si la droite $\mathcal{D}$ a pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$, alors :

- ▶ le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un **vecteur normal** à $\mathcal{D}$,
- ▶ le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un **vecteur directeur** de $\mathcal{D}$.

DÉMONSTRATION

| Soit $M(x; y)$ et $M'(x'; y')$ deux points de $\mathcal{D}$. On a $ax + by + c = 0$ et $ax' + by' + c = 0$. Par soustraction :

$$a(x' - x) + b(y' - y) = 0.$$

Le vecteur $\vec{MM'} \begin{pmatrix} x' - x \\ y' - y \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. L'égalité $a(x' - x) + b(y' - y) = 0$ signifie que

$$\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \vec{MM'} = 0.$$

Donc $\vec{n}$ est orthogonal à tout vecteur directeur de $\mathcal{D}$: c'est un vecteur normal.

De plus, $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ vérifie $\vec{n} \cdot \vec{u} = a(-b) + b \cdot a = 0$, donc $\vec{u}$ est orthogonal à $\vec{n}$ et c'est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. ■

EXEMPLE La droite $\mathcal{D} : 3x - 2y + 5 = 0$ admet :

- ▶ un vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$,
- ▶ un vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Vérification : $\vec{n} \cdot \vec{u} = 3 \times 2 + (-2) \times 3 = 6 - 6 = 0$. ✓

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Réciproquement, si $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à une droite $\mathcal{D}$ et si $A(x_0; y_0)$ est un point de $\mathcal{D}$, alors une équation cartésienne de $\mathcal{D}$ est :

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0.$$

EXEMPLE La droite passant par $A(2; -1)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ a pour équation :

$$4(x - 2) + 1(y + 1) = 0, \quad \text{soit} \quad 4x + y - 7 = 0.$$

Vérification : $4 \times 2 + 1 \times (-1) - 7 = 8 - 1 - 7 = 0$. ✓

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Inversion du signe.

Pour $\mathcal{D} : 3x + 5y - 1 = 0$, le vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$ et non $\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Moyen mnémotechnique : dans le vecteur directeur, la première coordonnée prend un signe $-$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confusion entre vecteur normal et vecteur directeur.

Le vecteur normal est *perpendiculaire* à la droite, pas parallèle. Deux droites perpendiculaires ont des vecteurs directeurs dont le produit scalaire est nul, ce qui revient à dire que le vecteur directeur de l'une est un vecteur normal de l'autre.

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Deux droites sont **perpendiculaires** si et seulement si un vecteur directeur de l'une est un vecteur normal de l'autre.

Autrement dit, si $\mathcal{D}_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$, alors :

$$\mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2 \iff a_1a_2 + b_1b_2 = 0.$$

EXEMPLE $\mathcal{D}_1 : 2x + 3y - 1 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 3x - 2y + 4 = 0$.

$$a_1a_2 + b_1b_2 = 2 \times 3 + 3 \times (-2) = 6 - 6 = 0.$$

Donc $\mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2$.

8.3 Équation d'un cercle

DÉFINITION 1

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, le **cercle** de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon $r > 0$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $\Omega M = r$, c'est-à-dire :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

EXEMPLE Le cercle de centre $\Omega(3; -1)$ et de rayon 4 a pour équation :

$$(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16.$$

Le point $A(7; -1) : (7 - 3)^2 + (-1 + 1)^2 = 16 + 0 = 16$. Donc A est sur le cercle.

Le point $B(3; 3) : (3 - 3)^2 + (3 + 1)^2 = 0 + 16 = 16$. Donc B est sur le cercle.

Le point $C(0; 0) : (0 - 3)^2 + (0 + 1)^2 = 9 + 1 = 10 \neq 16$. Donc C n'est pas sur le cercle.

◆ **PROPRIÉTÉ 1** En développant l'équation $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, on obtient la **forme développée** :

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + (a^2 + b^2 - r^2) = 0.$$

Réciproquement, une équation de la forme $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ représente un cercle si et seulement si $\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C > 0$. Dans ce cas :

► le centre est $\Omega\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}\right)$,

► le rayon est $r = \sqrt{\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C}$.

EXEMPLE Soit l'équation $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$.

On identifie : $A = -6$, $B = 4$, $C = -3$.

Centre : $\Omega\left(-\frac{-6}{2}; -\frac{4}{2}\right) = \Omega(3; -2)$.

Rayon : $r = \sqrt{\frac{36}{4} + \frac{16}{4} - 3} = \sqrt{9 + 4 - 3} = \sqrt{16} = 4$.

Le cercle a pour centre $\Omega(3; -2)$ et pour rayon 4.

△ CONTRE-EXEMPLE L'équation $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 5 = 0 : A = 2, B = 2, C = 5$.

$$\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C = 1 + 1 - 5 = -3 < 0.$$

Cette équation n'a pas de solution : elle ne représente aucun cercle (ni aucun point).

◆ PROPRIÉTÉ 2 Soit A et B deux points distincts. Le cercle de diamètre $[AB]$ a pour centre le milieu I de $[AB]$ et pour rayon $r = \frac{AB}{2}$.
Un point M appartient à ce cercle si et seulement si $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ (angle inscrit dans un demi-cercle).

△ ERREUR FRÉQUENTE

Erreur de signe sur le centre.

Dans $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$, le centre est $(3; -2)$ et non $(3; 2)$. Attention au signe de la coordonnée extraite de $(y + 2)^2 = (y - (-2))^2$.

△ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre r et r^2 .

Dans $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 25$, le rayon est $r = 5$ (et non $r = 25$). Le membre de droite est r^2 .

△ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier que le repère doit être orthonormé.

La formule $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ n'est valable que dans un repère *orthonormé*. Si le repère n'est pas orthonormé, la distance ne se calcule pas par la formule usuelle.

8.4 Positions relatives de droites et de cercles

8.4.1 Positions relatives de deux droites

- ◆ PROPRIÉTÉ 1** Soient $\mathcal{D}_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ deux droites.
- ▶ $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont **parallèles** $\Leftrightarrow a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ (vecteurs directeurs colinéaires).
 - ▶ $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont **sécantes** $\Leftrightarrow a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$.
 - ▶ Si elles sont sécantes, le point d'intersection s'obtient en résolvant le système

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}.$$
 - ▶ $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont **confondues** $\Leftrightarrow$ il existe $\lambda \neq 0$ tel que $a_2 = \lambda a_1, b_2 = \lambda b_1$ et $c_2 = \lambda c_1$.

EXEMPLE $\mathcal{D}_1 : 2x + 3y - 1 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 4x + 6y + 5 = 0$.

$a_1b_2 - a_2b_1 = 2 \times 6 - 4 \times 3 = 12 - 12 = 0$: droites parallèles.

$\mathcal{D}_2$ s'écrit aussi $2(2x + 3y) + 5 = 0$. Si elles étaient confondues, on aurait $c_2 = 2c_1 = -2$, or $c_2 = 5 \neq -2$. Elles sont donc strictement parallèles (non confondues).

EXEMPLE $\mathcal{D}_1 : x - 2y + 3 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 3x + y - 5 = 0$.

$$a_1b_2 - a_2b_1 = 1 \times 1 - 3 \times (-2) = 1 + 6 = 7 \neq 0 : \text{droites sécantes.}$$

Système : $\begin{cases} x - 2y = -3 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$. De la première : $x = 2y - 3$. En substituant : $3(2y - 3) + y = 5$, soit $7y = 14, y = 2, x = 1$.

Point d'intersection : $(1; 2)$.

8.4.2 Distance d'un point à une droite

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Dans un repère orthonormé, la distance du point $M_0(x_0; y_0)$ à la droite $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ est :

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

EXEMPLE Distance du point $P(1; 3)$ à la droite $\mathcal{D} : 3x - 4y + 2 = 0$.

$$d = \frac{|3 \times 1 - 4 \times 3 + 2|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|3 - 12 + 2|}{5} = \frac{|-7|}{5} = \frac{7}{5}.$$

8.4.3 Positions relatives d'une droite et d'un cercle

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre Ω et de rayon r , et $\mathcal{D}$ une droite. On note $d = d(\Omega, \mathcal{D})$ la distance du centre à la droite.

- Si $d > r$: $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ n'ont **aucun point commun** (la droite est extérieure au cercle).
- Si $d = r$: $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont **un seul point commun** (la droite est tangente au cercle).
- Si $d < r$: $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont **deux points communs** (la droite est sécante au cercle).

EXEMPLE $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(2; 1)$ et de rayon $r = 5$. Droite $\mathcal{D} : 3x + 4y - 1 = 0$.

$$d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 1 - 1|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|6 + 4 - 1|}{5} = \frac{9}{5} = 1,8.$$

$d = 1,8 < 5 = r$: la droite est sécante au cercle (deux points d'intersection).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oubli de la valeur absolue dans la formule de distance : $|ax_0 + by_0 + c|$ et non $ax_0 + by_0 + c$. La distance est toujours positive.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Erreur dans $\sqrt{a^2 + b^2}$: le dénominateur utilise les coefficients a et b de l'équation de la droite, pas les coordonnées du point.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confusion tangente/sécante. Une droite tangente touche le cercle en un seul point ($d = r$), une droite sécante coupe le cercle en deux points ($d < r$).

8.5 Problèmes géométriques dans un repère orthonormé

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Dans un repère orthonormé, pour déterminer la **nature d'un quadrilatère** $ABCD$, on dispose des outils suivants :

- ▶ **Parallélisme** : $\vec{AB}$ et $\vec{DC}$ colinéaires $\Leftrightarrow ABCD$ est un trapèze (au moins).
- ▶ **Parallélogramme** : $\vec{AB} = \vec{DC}$, ou bien les diagonales ont le même milieu.
- ▶ **Rectangle** : parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur, ou parallélogramme ayant un angle droit.
- ▶ **Losange** : parallélogramme dont deux côtés consécutifs ont la même longueur.
- ▶ **Carré** : à la fois rectangle et losange.

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Le **projeté orthogonal** du point P sur la droite $\mathcal{D}$ est le point H de $\mathcal{D}$ tel que $(PH) \perp \mathcal{D}$. Pour le déterminer :

1. Écrire l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ passant par P et perpendiculaire à $\mathcal{D}$ (un vecteur directeur de $\mathcal{D}'$ est un vecteur normal de $\mathcal{D}$).
2. Résoudre le système formé par les équations de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$.

EXEMPLE Projeté orthogonal de $P(5;7)$ sur $\mathcal{D} : x + 2y - 3 = 0$.

Un vecteur normal à $\mathcal{D}$ est $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. La droite $\mathcal{D}'$ passant par P et dirigée par $\vec{n}$ a pour équation :
 $\frac{x-5}{1} = \frac{y-7}{2}$, soit $2(x-5) = y-7$, d'où $2x - y - 3 = 0$.

Système : $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$. On obtient : $5x = 9, x = \frac{9}{5}, y = \frac{3}{5}$.

Le projeté orthogonal est $H\left(\frac{9}{5}; \frac{3}{5}\right)$.

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Le **symétrique** du point P par rapport à la droite $\mathcal{D}$ est le point P' tel que H (projeté orthogonal de P sur $\mathcal{D}$) est le milieu de $[PP']$.

Si $H\left(\frac{x_P + x_{P'}}{2}; \frac{y_P + y_{P'}}{2}\right)$, alors $x_{P'} = 2x_H - x_P$ et $y_{P'} = 2y_H - y_P$.

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Aire d'un triangle ABC dans un repère orthonormé :

$$A = \frac{1}{2} |x_{\vec{AB}} \cdot y_{\vec{AC}} - y_{\vec{AB}} \cdot x_{\vec{AC}}|$$

où $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_{\vec{AB}} \\ y_{\vec{AB}} \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} x_{\vec{AC}} \\ y_{\vec{AC}} \end{pmatrix}$.

EXEMPLE $A(1;2), B(4;6), C(7;2)$.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$A = \frac{1}{2} |3 \times 0 - 4 \times 6| = \frac{1}{2} \times 24 = 12.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre milieu et projeté orthogonal. Le milieu de $[AP]$ est le point qui partage le segment en deux parties égales. Le projeté orthogonal de P sur une droite $\mathcal{D}$ est un point de $\mathcal{D}$ — ce n'est pas le milieu de $[AP]$ en général.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la valeur absolue dans le calcul de l'aire. Le déterminant $x_{AB} \cdot y_{AC} - y_{AB} \cdot x_{AC}$ peut être négatif, mais une aire est toujours positive.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas structurer la démarche. Dans un problème de synthèse, commencer par identifier les données (coordonnées des points, équation de la droite, etc.), les objectifs (nature d'un quadrilatère, aire, etc.) et les outils nécessaires avant de calculer.

① MÉTHODE M1 Déterminer une équation cartésienne d'une droite

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) », « écrire l'équation de la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ », ou « montrer que la droite a pour équation $ax + by + c = 0$ ».

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les données :

- ▶ **Deux points** $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$: je calcule le coefficient directeur $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ (si $x_A \neq x_B$).
- ▶ **Un point et un vecteur directeur** $\vec{u}(-b; a)$: j'utilise $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$ avec le vecteur normal $\vec{n}(a; b)$.
- ▶ **Un point et un vecteur normal** $\vec{n}(a; b)$: j'écris $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$.

2. Je développe et réduis pour obtenir la forme $ax + by + c = 0$.

3. Je vérifie en substituant les coordonnées du ou des points connus.

Exemple rédigé. Exemple — À partir de deux points. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(2; 5)$ et $B(6; 3)$.

$$m = \frac{3 - 5}{6 - 2} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

$$y - 5 = -\frac{1}{2}(x - 2), \text{ soit } y = -\frac{1}{2}x + 6, \text{ d'où } x + 2y - 12 = 0.$$

$$6 + 2 \times 3 - 12 = 6 + 6 - 12 = 0. \checkmark$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Si $x_A = x_B$, la droite est verticale : son équation est $x = x_A$ (pas de coefficient directeur).
- ▶ **Piège 2.** Erreur de signe dans le passage de $y = mx + p$ à $ax + by + c = 0$: ne pas oublier que $y = mx + p$ donne $mx - y + p = 0$.
- ▶ **Piège 3.** Ne pas confondre les coordonnées du vecteur normal (a, b) avec la constante c .

Vérifier son résultat. Toujours substituer les coordonnées des points connus dans l'équation obtenue. Si un point connu ne vérifie pas l'équation, il y a une erreur de calcul.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

❶ MÉTHODE M2 Utiliser un vecteur normal à une droite

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer un vecteur normal », « passer d'un vecteur normal à l'équation cartésienne », « trouver la droite perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par un point ».

La méthode pas à pas.

- Pour $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$:
 - ▶ Vecteur normal : $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.
 - ▶ Vecteur directeur : $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.
- Pour construire l'équation d'une droite à partir d'un vecteur normal $\vec{n}(a; b)$ et d'un point $A(x_0; y_0) : a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$.
- Pour la perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par P : le vecteur normal à $\mathcal{D}$ devient un vecteur directeur de la perpendiculaire.

Exemple rédigé. Exemple — Droite perpendiculaire. Soit $\mathcal{D} : 2x + 5y - 3 = 0$ et $P(1; -1)$. Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par P .

$\vec{n}_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}'$.

$\vec{n}_{\mathcal{D}'} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$ (ou $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$).

$\mathcal{D}' : 5(x - 1) - 2(y + 1) = 0$, soit $5x - 2y - 7 = 0$.

$5 \times 1 - 2 \times (-1) - 7 = 5 + 2 - 7 = 0$. ✓

Orthogonalité : $2 \times 5 + 5 \times (-2) = 10 - 10 = 0$. ✓

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Ne pas confondre vecteur normal et vecteur directeur : le vecteur normal est perpendiculaire à la droite.
- ▶ **Piège 2.** Inversion du signe : le vecteur directeur de $ax + by + c = 0$ est $(-b; a)$, avec un signe $-$ sur la première coordonnée.

Vérifier son résultat. Vérifier l'orthogonalité : le produit scalaire du vecteur directeur de $\mathcal{D}$ et du vecteur directeur de $\mathcal{D}'$ doit être nul.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

❶ MÉTHODE M3 Déterminer l'équation d'un cercle

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer l'équation du cercle de centre Ω et de rayon r », « identifier le centre et le rayon d'un cercle dont l'équation est donnée sous forme développée », ou « montrer qu'un point appartient à un cercle ».

La méthode pas à pas.

- Si centre et rayon sont donnés : écrire directement $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.
- Si l'équation est sous forme développée $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$:
 - ▶ Regrouper les termes en x et compléter le carré : $x^2 + Ax = \left(x + \frac{A}{2}\right)^2 - \frac{A^2}{4}$.

► Faire de même avec $y : y^2 + By = \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 - \frac{B^2}{4}$.

► En déduire le centre $\Omega\left(-\frac{A}{2}; -\frac{B}{2}\right)$ et le rayon $r = \sqrt{\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C}$.

3. Vérifier que $r^2 > 0$ (sinon l'équation ne représente pas un cercle).

Exemple rédigé. Exemple — Forme développée vers centre et rayon. Identifier le cercle d'équation $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$.

$$x^2 + 4x = (x + 2)^2 - 4.$$

$$y^2 - 6y = (y - 3)^2 - 9.$$

L'équation devient : $(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 - 12 = 0$, soit $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$.

Le cercle a pour centre $\Omega(-2; 3)$ et rayon $r = 5$.

Les pièges.

► **Piège 1.** Erreur de signe sur le centre : dans $(x + 2)^2$, le centre a pour abscisse -2 (et non $+2$).

► **Piège 2.** Confondre r et r^2 : le membre de droite est le carré du rayon.

► **Piège 3.** Oublier de vérifier que $r^2 > 0$.

Vérifier son résultat. Substituer les coordonnées du centre dans l'équation développée et vérifier que le résultat vaut $-r^2$. Par exemple : $(-2)^2 + 3^2 + 4 \times (-2) - 6 \times 3 - 12 = 4 + 9 - 8 - 18 - 12 = -25$, donc $r^2 = 25$. ✓

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Étudier la position relative d'une droite et d'un cercle

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer la position relative d'une droite et d'un cercle », « montrer qu'une droite est tangente à un cercle », ou « calculer les points d'intersection d'une droite et d'un cercle ».

La méthode pas à pas.

1. **Méthode 1 — Distance.** Calculer la distance d du centre Ω du cercle à la droite $\mathcal{D}$:

$$d = \frac{|ax_{\Omega} + by_{\Omega} + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Comparer d et r : si $d > r$ (extérieure), $d = r$ (tangente), $d < r$ (sécante).

2. **Méthode 2 — Substitution.** Exprimer y (ou x) à partir de l'équation de $\mathcal{D}$ et substituer dans l'équation du cercle. On obtient une équation du second degré ; son discriminant Δ détermine le nombre de solutions.

3. Si sécante ou tangente, résoudre pour trouver les coordonnées des points communs.

Exemple rédigé. Exemple — Par la distance. $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(1; 3)$ et de rayon $r = \sqrt{5}$. Droite $\mathcal{D} : 2x - y + 1 = 0$.

$$d = \frac{|2 \times 1 - 3 + 1|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{|0|}{\sqrt{5}} = 0.$$

$d = 0 < \sqrt{5} = r$: la droite passe par le centre du cercle, elle est sécante.

Exemple — Par substitution. $\mathcal{C} : (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 5$. Droite $\mathcal{D} : y = 2x - 3$.

$(x - 2)^2 + (2x - 3 + 1)^2 = 5$, soit $(x - 2)^2 + (2x - 2)^2 = 5$.

$x^2 - 4x + 4 + 4x^2 - 8x + 4 = 5$, soit $5x^2 - 12x + 3 = 0$.

$\Delta = 144 - 60 = 84 > 0$: deux solutions, la droite est sécante.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Ne pas oublier la valeur absolue dans la formule de distance.
- ▶ **Piège 2.** Avec la méthode de substitution, bien développer les carrés avant de simplifier.
- ▶ **Piège 3.** Comparer d à r (le rayon), pas à r^2 .

Vérifier son résultat. Si on trouve des points d'intersection, vérifier qu'ils appartiennent à la fois à la droite et au cercle en substituant dans les deux équations.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

MÉTHODE M5 Résoudre un problème géométrique dans un repère orthonormé

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer la nature d'un quadrilatère », « calculer l'aire d'un triangle », « trouver le projeté orthogonal d'un point sur une droite », ou « déterminer le symétrique d'un point par rapport à une droite ».

La méthode pas à pas.

1. **Lire et organiser les données :** placer les points, noter les coordonnées.
2. **Identifier les outils nécessaires** parmi :
 - ▶ Distance entre deux points, milieu d'un segment.
 - ▶ Équation d'une droite, vecteur directeur, vecteur normal.
 - ▶ Produit scalaire, orthogonalité.
 - ▶ Distance d'un point à une droite.
3. **Exécuter le plan** étape par étape, en justifiant chaque affirmation.
4. **Conclure** avec la réponse à la question posée.

Exemple rédigé. Exemple — Projeté orthogonal et symétrique. Soit $\mathcal{D} : 3x + 4y - 12 = 0$ et $P(7; 1)$. Déterminer le projeté orthogonal H de P sur $\mathcal{D}$, puis le symétrique P' de P par rapport à $\mathcal{D}$.

Un vecteur normal à $\mathcal{D}$ est $\vec{n}(3; 4)$, qui est un vecteur directeur de (PH) .

La perpendiculaire passe par $P(7; 1)$ et a pour vecteur normal $\vec{u}(-4; 3)$ (vecteur directeur de $\mathcal{D}$).

Équation : $-4(x - 7) + 3(y - 1) = 0$, soit $-4x + 3y + 25 = 0$, ou $4x - 3y - 25 = 0$.

$\begin{cases} 3x + 4y = 12 \\ 4x - 3y = 25 \end{cases}$. En multipliant : $9x + 12y = 36$ et $16x - 12y = 100$. Somme : $25x = 136$,

$$x = \frac{136}{25}. \text{ Puis } y = \frac{12 - 3 \times 136/25}{4} = \frac{-108}{100} = -\frac{27}{25}.$$

$$H\left(\frac{136}{25}; -\frac{27}{25}\right).$$

$$x_{P'} = 2 \times \frac{136}{25} - 7 = \frac{272 - 175}{25} = \frac{97}{25}. \quad y_{P'} = 2 \times \left(-\frac{27}{25}\right) - 1 = \frac{-54 - 25}{25} = -\frac{79}{25}.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Ne pas confondre le milieu d'un segment et le projeté orthogonal sur une droite.
- ▶ **Piège 2.** Oublier que le symétrique se calcule avec la formule $P' = 2H - P$, et non $P' = H - P$.
- ▶ **Piège 3.** Bien vérifier que H appartient à $\mathcal{D}$ à la fin du calcul.

Vérifier son résultat. Vérifier que H est sur $\mathcal{D}$, que $PH \perp \mathcal{D}$, et que H est le milieu de $[PP']$.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1 ◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) avec $A(1;3)$ et $B(5;7)$.

Exercice 2 ◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) avec $A(2;-1)$ et $B(2;5)$.

Exercice 3 ◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(0;4)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 4 ◆

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation $2x - y - 5 = 0$.

1. Le point $C(3;1)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?
2. Le point $D(0;2)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?
3. Déterminer l'ordonnée du point de $\mathcal{D}$ d'abscisse 4.

Exercice 5 ◆◆

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(-2;3)$ et $B(4;-1)$.

Exercice 6 ◆◆

1. Écrire l'équation cartésienne de la droite d'équation réduite $y = -3x + 7$.
2. Écrire l'équation réduite de la droite d'équation cartésienne $5x - 2y + 1 = 0$.

Exercice 7 ◆◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $A(1;-2)$ et parallèle à la droite $\mathcal{D} : 3x + y - 5 = 0$.

Exercice 8 ◆◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $A(3;5)$ et $B(7;5)$.

Exercice 9 ◆◆◆

Soient les droites $\mathcal{D}_1 : x + 2y - 4 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 3x - y - 1 = 0$.

1. Déterminer le point d'intersection I de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.
2. Déterminer l'équation de la droite passant par I et par $P(2;0)$.

Exercice 10 ◆◆◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $A(1;2)$ et perpendiculaire à la droite $\mathcal{D} : 4x - 3y + 6 = 0$.

Exercice 11 ◆

Déterminer un vecteur normal et un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D} : 5x - 3y + 7 = 0$.

Exercice 12 ◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $A(3; -2)$ et admettant $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ comme vecteur normal.

Exercice 13 ◆

Les droites $\mathcal{D}_1 : 2x + 3y - 1 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 6x + 9y + 4 = 0$ sont-elles parallèles, perpendiculaires ou sécantes?

Exercice 14 ◆

Montrer que les droites $\mathcal{D}_1 : 3x - y + 2 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : x + 3y - 5 = 0$ sont perpendiculaires.

Exercice 15 ◆◆

Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D} : 2x - 5y + 3 = 0$ passant par $P(4; 1)$.

Exercice 16 ◆◆

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $A(1; 3)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

En déduire un vecteur normal à cette droite.

Exercice 17 ◆◆

Déterminer l'équation de la médiatrice du segment $[AB]$ avec $A(1; 3)$ et $B(5; 7)$.

Exercice 18 ◆◆

Soit le triangle ABC avec $A(0; 0)$, $B(6; 0)$ et $C(2; 4)$. Déterminer l'équation de la hauteur issue de A .

Exercice 19 ◆◆◆

Soit la droite $\mathcal{D} : y = 2x - 1$.

1. Déterminer un vecteur normal à $\mathcal{D}$.
2. En déduire l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ parallèle à $\mathcal{D}$ passant par $P(3; 4)$.
3. Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}''$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par P .

Exercice 20 ◆◆◆

Soit $A(1; 2)$, $B(4; 6)$, $C(8; 3)$. Montrer que le triangle ABC est rectangle et préciser en quel sommet.

Exercice 21 ◆

1. Écrire l'équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(2; -3)$ et de rayon 5.
2. Le point $A(2; 2)$ appartient-il à $\mathcal{C}$?

Exercice 22 ◆

Identifier le centre et le rayon du cercle d'équation $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 9$.

Exercice 23 ◆

Déterminer le centre et le rayon du cercle d'équation $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

Exercice 24 ◆

Déterminer l'équation du cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(1;3)$ et $B(5;7)$.

Exercice 25 ◆◆

L'équation $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$ représente-t-elle un cercle ? Si oui, préciser son centre et son rayon.

Exercice 26 ◆◆

L'équation $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 15 = 0$ représente-t-elle un cercle ? Justifier.

Exercice 27 ◆◆

Déterminer l'équation du cercle $\mathcal{C}$ passant par $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $C(0;6)$.

Exercice 28 ◆◆

Soit le cercle $\mathcal{C} : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 18$. Déterminer si le point $P(3;1)$ est à l'intérieur, sur, ou à l'extérieur du cercle.

Exercice 29 ◆◆◆

Déterminer la valeur de a pour que le cercle de centre $\Omega(a;0)$ passe par $A(1;2)$ et $B(3;-2)$.

Exercice 30 ◆◆◆

Soit $A(0;0)$ et $B(6;2)$. Montrer que l'ensemble des points $M(x;y)$ tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

Exercice 31 ◆

Déterminer la position relative des droites $\mathcal{D}_1 : 2x + y - 3 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 4x + 2y + 1 = 0$.

Exercice 32 ◆

Déterminer le point d'intersection des droites $\mathcal{D}_1 : x + y - 2 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 2x - y - 1 = 0$.

Exercice 33 ◆

Calculer la distance du point $P(1;2)$ à la droite $\mathcal{D} : 3x - 4y + 5 = 0$.

Exercice 34 ◆

Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre $O(0;0)$ et de rayon 5, et la droite $\mathcal{D} : 3x + 4y - 15 = 0$.
Déterminer la position relative de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$.

Exercice 35 ◆◆

Déterminer les points d'intersection du cercle $\mathcal{C} : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$ et de la droite $\mathcal{D} : y = 2x$.

Exercice 36 ◆◆

Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(3;1)$ et de rayon 2, et la droite $\mathcal{D} : 3x + 4y - 5 = 0$.

1. Calculer la distance de Ω à $\mathcal{D}$.
2. En déduire la position relative de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$.

Exercice 37 ♦♦

Déterminer les valeurs de c pour que la droite $\mathcal{D} : x - 2y + c = 0$ soit tangente au cercle de centre $\Omega(2; -1)$ et de rayon $\sqrt{5}$.

Exercice 38 ♦♦

Déterminer l'équation de la tangente au cercle $C : (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ au point $A(2; 5)$.

Exercice 39 ♦♦♦

Déterminer les points d'intersection des cercles $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ et $C_2 : (x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 4$.

Exercice 40 ♦♦♦

Déterminer les équations des droites passant par l'origine et tangentes au cercle $C : (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 1$.

Exercice 41 ♦

Calculer l'aire du triangle ABC avec $A(1; 1)$, $B(5; 1)$ et $C(3; 5)$.

Exercice 42 ♦

Soit $A(0; 0)$, $B(4; 0)$, $C(5; 3)$, $D(1; 3)$. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice 43 ♦♦

Déterminer le projeté orthogonal du point $P(4; 5)$ sur la droite $\mathcal{D} : 3x + 4y - 6 = 0$.

Exercice 44 ♦♦

Déterminer le symétrique du point $P(3; 7)$ par rapport à la droite $\mathcal{D} : x - y + 2 = 0$.

Exercice 45 ♦♦

Soit $A(0; 2)$, $B(3; 0)$, $C(5; 3)$, $D(2; 5)$. Déterminer la nature du quadrilatère $ABCD$.

Exercice 46 ♦♦

Soit $A(-1; 1)$, $B(3; 3)$, $C(5; -1)$, $D(1; -3)$. Montrer que $ABCD$ est un rectangle.

Exercice 47 ♦♦♦

Soit le triangle ABC avec $A(0; 0)$, $B(6; 0)$ et $C(2; 4)$. Déterminer les coordonnées de l'orthocentre H .

Exercice 48 ♦♦♦

Déterminer l'équation du cercle circonscrit au triangle ABC avec $A(0; 0)$, $B(4; 0)$ et $C(0; 6)$.

Exercice 49 ♦♦♦

Déterminer l'ensemble des points $M(x; y)$ équidistants du point $A(1; 0)$ et de la droite $\mathcal{D} : x = -1$.

Exercice 50 ♦♦♦

Déterminer le point de la droite $\mathcal{D} : 2x + y - 10 = 0$ le plus proche de l'origine O .

Coup de pouce 1. Calcule le coefficient directeur $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, puis utilise $y - y_A = m(x - x_A)$.

Coup de pouce 1. Compare les abscisses de A et B . Si elles sont égales, la droite est verticale.

Coup de pouce 1. Le vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$ donne un vecteur normal $\vec{n}(a; b)$. Utilise $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$.

Coup de pouce 1. Pour vérifier qu'un point est sur une droite, substitue ses coordonnées dans l'équation et vérifie si tu obtiens 0.

Coup de pouce 1. Pour $ax + by + c = 0$, le vecteur normal est $(a; b)$ et le vecteur directeur est $(-b; a)$.

Coup de pouce 1. Utilise $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$ avec $\vec{n}(a; b)$.

Coup de pouce 1. Deux droites sont parallèles si leurs vecteurs normaux sont colinéaires (c'est-à-dire proportionnels).

Coup de pouce 1. Calcule $a_1a_2 + b_1b_2$. Si c'est 0, les droites sont perpendiculaires.

Coup de pouce 1. L'équation d'un cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon r est $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

Coup de pouce 1. Écris $(x + 1)^2$ sous la forme $(x - (-1))^2$ pour lire l'abscisse du centre.

Coup de pouce 1. Complète le carré : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$.

Coup de pouce 1. Le centre du cercle de diamètre $[AB]$ est le milieu de $[AB]$ et le rayon est $AB/2$.

Coup de pouce 1. Calcule $a_1b_2 - a_2b_1$. Si c'est 0, les droites sont parallèles.

Coup de pouce 1. Résous le système formé par les deux équations.

Coup de pouce 1. Utilise la formule $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Coup de pouce 1. Calcule la distance du centre du cercle à la droite et compare-la au rayon.

Coup de pouce 1. L'aire d'un triangle est $\frac{1}{2}|x_{AB}y_{AC} - y_{AB}x_{AC}|$.

Coup de pouce 1. Pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, vérifie que $\vec{AB} = \vec{DC}$.

Temps 7 — TD contextualisé : Zone de couverture d'une antenne relais

Contexte. Une antenne relais est installée à l'origine $O(0; 0)$ d'un repère orthonormé (unité : 1 km). Sa zone de couverture est un disque de rayon 5 km. Une route rectiligne a pour équation $3x - 4y - 10 = 0$.

Exercice 51

Partie A — La route traverse-t-elle la zone de couverture ?

1. Écrire l'équation du cercle C délimitant la zone de couverture.
2. Calculer la distance du point O à la droite $\mathcal{D} : 3x - 4y - 10 = 0$.
3. En déduire si la route traverse, touche ou évite la zone de couverture.

Partie B — Points d'entrée et de sortie

4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{D}$ et C .
5. Calculer la longueur du tronçon de route couvert par l'antenne.

Partie C — Question ouverte

6. L'opérateur souhaite que la couverture s'étende à au moins 8 km le long de la route. Quel rayon minimal doit avoir la zone de couverture ? Justifier.

Temps 7 — TD fil rouge : Le câble et la zone interdite

Situation. Un ingénieur cartographe travaille sur un plan quadrillé (repère orthonormé, unité : 100 m). Un câble rectiligne relie deux pylônes $A(1; 7)$ et $B(9; 1)$. Une zone circulaire interdite a pour centre $\Omega(5; 2)$ et pour rayon 3.

Exercice 52

Partie A — Équation de la droite (AB) [C1]

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.
2. Déterminer le coefficient directeur de la droite (AB) .
3. En déduire une équation cartésienne de (AB) .
4. Vérifier que A et B vérifient cette équation.

Partie B — Équation du cercle [C3]

5. Écrire l'équation du cercle C délimitant la zone interdite.

Partie C — Le câble traverse-t-il la zone ? [C4]

6. Calculer la distance du centre Ω à la droite (AB) .
7. Comparer cette distance au rayon r . Conclure.
8. Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection du câble et de la frontière de la zone.

Partie D — Longueur du tronçon interdit [C5]

9. Calculer la longueur exacte du tronçon de câble situé dans la zone interdite.
10. L'ingénieur envisage de déplacer le pylône B en $B'(9; y')$ pour que le câble soit tangent à la zone. Déterminer la ou les valeurs possibles de y' .

GEOMETRIE REPEREE — QCM D'AUTO-EVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] La droite passant par $A(1;3)$ et $B(3;7)$ a pour equation :
 A. $2x - y + 1 = 0$
 B. $x - 2y + 5 = 0$
 C. $2x + y - 5 = 0$
 D. $x + 2y - 7 = 0$
2. [Q2] Le point $P(2; -1)$ appartient à la droite $3x + 2y - 4 = 0$.
 A. Vrai
 B. Faux
 C. On ne peut pas savoir
 D. Seulement si le repere est orthonorme
3. [Q3] La droite d'equation $x = 5$ est :
 A. horizontale
 B. verticale
 C. de coefficient directeur 5
 D. de coefficient directeur $1/5$

Capacité C2

4. [Q4] Un vecteur normal à la droite $4x - 3y + 2 = 0$ est :
 A. $\vec{n}(3;4)$
 B. $\vec{n}(4;-3)$
 C. $\vec{n}(-3;4)$
 D. $\vec{n}(4;3)$
5. [Q5] Un vecteur directeur de la droite $2x + 5y - 1 = 0$ est :

- A. $\vec{u}(2;5)$
- B. $\vec{u}(-5;2)$
- C. $\vec{u}(5;2)$
- D. $\vec{u}(-5;-2)$

6. [Q6] Les droites $D_1 : 2x - y + 3 = 0$ et $D_2 : x + 2y - 1 = 0$ sont :
- A. parallèles
 - B. confondues
 - C. perpendiculaires
 - D. sécantes non perpendiculaires

Capacité C3

7. [Q7] L'équation $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$ représente un cercle de :
- A. centre $(3; -1)$ et rayon 16
 - B. centre $(3; 1)$ et rayon 4
 - C. centre $(3; -1)$ et rayon 4
 - D. centre $(-3; 1)$ et rayon 4
8. [Q8] Le cercle de centre $(0;0)$ et de rayon 3 a pour équation :
- A. $x^2 + y^2 = 3$
 - B. $x^2 + y^2 = 9$
 - C. $(x + 3)^2 + (y + 3)^2 = 0$
 - D. $x + y = 3$

9. [Q9] L'équation $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ représente :
- A. un cercle de centre $(1; -2)$ et de rayon 3
 - B. un cercle de centre $(-1; 2)$ et de rayon 9
 - C. un cercle de centre $(1; -2)$ et de rayon 9
 - D. aucun cercle

Capacité C4

10. [Q10] La distance du point $P(1;2)$ à la droite $3x + 4y - 7 = 0$ est :
- A. $4/5$
 - B. 4
 - C. $7/5$
 - D. 0
11. [Q11] Si la distance du centre d'un cercle de rayon 5 à une droite est 5, alors :
- A. la droite est sécante au cercle
 - B. la droite est extérieure au cercle
 - C. la droite est tangente au cercle
 - D. on ne peut pas conclure

12. [Q12] Les droites $D_1 : 3x - y + 2 = 0$ et $D_2 : 6x - 2y + 4 = 0$ sont :
- A. strictement parallèles
 - B. sécantes
 - C. perpendiculaires
 - D. confondues

Capacité C5

13. [Q13] L'aire du triangle de sommets $A(0;0)$, $B(4;0)$ et $C(0;6)$ est :
- A. 24
 - B. 12
 - C. 10
 - D. 48
14. [Q14] Le projeté orthogonal de P sur une droite D est :
- A. le milieu de P et du pied de la perpendiculaire
 - B. le point de D le plus proche de P
 - C. le symétrique de P par rapport à D

D. l'intersection de D avec l'axe des abscisses

15. [Q15] Si $ABCD$ est un parallélogramme et $AC = BD$, alors $ABCD$ est :

- A. un losange
- B. un rectangle
- C. un carré
- D. un trapèze non parallélogramme

Clé de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	A
Q2	C1	A
Q3	C1	B
Q4	C2	B
Q5	C2	B
Q6	C2	C
Q7	C3	C
Q8	C3	B
Q9	C3	A
Q10	C4	A
Q11	C4	C
Q12	C4	D
Q13	C5	B
Q14	C5	B
Q15	C5	B

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- B — Inversion du coefficient directeur ($1/2$ au lieu de 2). *Renvoi : M1, étape 1.*
- C — L'élève a choisi le vecteur normal $(2; 1)$ puis ajuste la constante pour que le point A vérifie $2x + y - 5 = 0$, sans vérifier le point B, qui ne satisfait pas cette équation. *Renvoi : M1, étape 2.*
- D — L'élève a choisi le vecteur normal $(1; 2)$ et ajuste la constante avec le seul point A ; le point B ne vérifie pas $x + 2y - 7 = 0$. *Renvoi : M1, étape 2.*

► Q2

- B — Erreur de calcul : $3(2) + 2(-1) - 4 = 6 - 2 - 4 = 0$. *Renvoi : M1, étape 3.*
- C — On peut toujours vérifier en substituant les coordonnées. *Renvoi : M1, étape 3.*
- D — L'appartenance à une droite ne dépend pas du type de repère. *Renvoi : Cours C1.*

► Q3

- A — Confusion : $y = 5$ est horizontale, $x = 5$ est verticale. *Renvoi : Cours C1.*
- C — La droite $x = 5$ n'a pas de coefficient directeur (verticale). *Renvoi : Cours C1.*
- D — La droite $x = 5$ n'a pas de coefficient directeur (verticale). *Renvoi : Cours C1.*

► Q4

- A — C'est le vecteur directeur, pas le vecteur normal. *Renvoi : M2, étape 1.*
- C — Inversion des signes : le vecteur normal est $(a; b)$ et non $(-b; a)$. *Renvoi : M2, étape 1.*
- D — Erreur de signe sur la deuxième coordonnée. *Renvoi : M2, étape 1.*

► Q5

- A — C'est le vecteur normal, pas le vecteur directeur. *Renvoi : M2, étape 1.*
- C — Oubli du signe négatif sur la première coordonnée. *Renvoi : M2, étape 1.*
- D — La première coordonnée est correcte, mais la seconde doit valoir 2 : $(2; 5) \cdot (-5; -2) = -20 \neq 0$. *Renvoi : M2, étape 1.*

► Q6

- A — $a_1b_2 - a_2b_1 = 2(2) - 1(-1) = 5 \neq 0$, pas parallèles. *Renvoi : Cours C4.*
- B — Les coefficients ne sont pas proportionnels. *Renvoi : Cours C4.*
- D — $a_1a_2 + b_1b_2 = 2(1) + (-1)(2) = 0$, donc perpendiculaires. *Renvoi : M2, propriété 3.*

► Q7

- A — Le rayon est $\sqrt{16} = 4$, pas 16 . *Renvoi : M3, piège 2.*
- B — Erreur de signe : $(y + 1)^2 = (y - (-1))^2$, donc le centre a pour ordonnée -1 . *Renvoi : M3, piège 1.*
- D — Erreur de signe sur les deux coordonnées. *Renvoi : M3, piège 1.*

► Q8

- A — Le membre de droite est $r^2 = 9$, pas $r = 3$. *Renvoi : M3, piège 2.*
- C — Le centre est $(0; 0)$, pas $(-3; -3)$, et le rayon ne peut pas être 0. *Renvoi : Cours C3.*
- D — C'est l'équation d'une droite, pas d'un cercle. *Renvoi : Cours C3.*

► Q9

- B — Erreur de signe sur le centre : c'est $(-A/2, -B/2) = (1, -2)$. *Renvoi : M3, piège 1.*
- C — Le rayon est $\sqrt{1 + 4 + 4} = 3$, pas 9. *Renvoi : M3, piège 2.*
- D — $r^2 = 1 + 4 + 4 = 9 > 0$, c'est bien un cercle. *Renvoi : Cours C3.*

► Q10

- B — Oubli de diviser par $\sqrt{a^2 + b^2}$: le numérateur est $|3 + 8 - 7| = 4$, mais il faut diviser par $\sqrt{9 + 16} = 5$. *Renvoi : M4, étape 1.*
- C — Erreur de calcul dans le numérateur : $|3 + 8 - 7| = 4$ et non 7. *Renvoi : M4, étape 1.*
- D — $3(1) + 4(2) - 7 = 4 \neq 0$, donc P n'est pas sur la droite et la distance n'est pas nulle. *Renvoi : M4, étape 1.*

► Q11

- A — La droite est secante si $d < r$, or ici $d = r$. *Renvoi : Cours C4, propriété 3.*
- B — La droite est extérieure si $d > r$, or ici $d = r$. *Renvoi : Cours C4, propriété 3.*
- D — La comparaison d vs r suffit toujours à conclure. *Renvoi : Cours C4, propriété 3.*

► Q12

- A — $D_2 = 2D_1$ exactement (tous les coefficients proportionnels, même c), donc confondues. *Renvoi : Cours C4, propriété 1.*
- B — Les vecteurs normaux sont colinéaires, donc pas sécantes. *Renvoi : Cours C4.*
- C — $a_1a_2 + b_1b_2 = 18 + 2 = 20 \neq 0$. *Renvoi : Cours C2, propriété 3.*

► Q13

- A — Oubli du facteur $1/2$ dans la formule de l'aire. *Renvoi : Cours C5, propriété 4.*
- C — Erreur de calcul : le déterminant vaut 24, pas 20. *Renvoi : Cours C5, propriété 4.*
- D — L'élève a calculé le déterminant $|4 \times 6| = 24$ puis l'a multiplié par 2 au lieu de le diviser par 2, obtenant 48. *Renvoi : Cours C5.*

► Q14

- A — Le projeté orthogonal EST le pied de la perpendiculaire, pas le milieu. *Renvoi : Cours C5, propriété 2.*
- C — Le symétrique est le point tel que le projeté est le milieu de $[PP']$. *Renvoi : Cours C5, propriété 3.*
- D — Le projeté n'a rien à voir avec l'axe des abscisses en général. *Renvoi : Cours C5.*

► Q15

- A — Un losange a ses diagonales perpendiculaires, pas nécessairement égales. *Renvoi : Cours C5, propriété 1.*
- C — Un carré est un cas particulier (rectangle ET losange), on n'a pas assez d'information. *Renvoi : Cours C5.*
- D — Avec la définition inclusive, un parallélogramme est bien un trapèze ; l'option précise toutefois 'non parallélogramme', ce qui contredit l'hypothèse. *Renvoi : Cours C5.*

Exercice 1 — Équation cartésienne (4 pts)

1. $\vec{AB} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$

2. $m = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$

3. $y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 1)$, soit $2y - 6 = -(x - 1) = -x + 1$, d'où $x + 2y - 7 = 0$.

4. A : $1 + 6 - 7 = 0 \checkmark$. B : $5 + 2 - 7 = 0 \checkmark$.

Exercice 2 — Vecteur normal (4 pts)

1. $\vec{n}(1;2)$ est normal et $\vec{u}(-2;1)$ est directeur. $\vec{n} \cdot \vec{u} = -2 + 2 = 0 \checkmark$.
2. $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $M(3;4)$: le vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $(-2;1)$, normal de $\mathcal{D}'$.
 $-2(x-3) + 1(y-4) = 0$, soit $-2x + y + 2 = 0$, ou $2x - y - 2 = 0$.
 $M : 6 - 4 - 2 = 0 \checkmark$.
3. $a_1a_2 + b_1b_2 = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$: perpendiculaires $\checkmark$.

Exercice 3 — Cercle (4 pts)

1. $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 16$.
2. $(7-3)^2 + (-1+1)^2 = 16 + 0 = 16 = r^2$. P est sur $\mathcal{C}$.
3. $(3-3)^2 + (3+1)^2 = 0 + 16 = 16 = r^2$. Q est sur $\mathcal{C}$.
4. Développement : $x^2 - 6x + 9 + y^2 + 2y + 1 = 16$, soit $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$.
 Retour : $(x^2 - 6x) = (x-3)^2 - 9$, $(y^2 + 2y) = (y+1)^2 - 1$. $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 16$. $\checkmark$.

Exercice 4 — Position relative (4 pts)

1. $d(\Omega, (AB)) = \frac{|3 + 2(-1) - 7|}{\sqrt{1+4}} = \frac{|-6|}{\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$.
2. $\frac{6\sqrt{5}}{5} \approx 2,68 < 4 = r$: la droite est sécante au cercle.
3. On substitue $x = 7 - 2y$ dans $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 16$:
 $(4-2y)^2 + (y+1)^2 = 16$, soit $16 - 16y + 4y^2 + y^2 + 2y + 1 = 16$, d'où $5y^2 - 14y + 1 = 0$.
 $\Delta = 196 - 20 = 176 = 16 \times 11$. $y = \frac{14 \pm 4\sqrt{11}}{10} = \frac{7 \pm 2\sqrt{11}}{5}$.
 $x = 7 - 2y = \frac{21 \mp 4\sqrt{11}}{5}$.
 Points : $\left(\frac{21 - 4\sqrt{11}}{5}; \frac{7 + 2\sqrt{11}}{5} \right)$ et $\left(\frac{21 + 4\sqrt{11}}{5}; \frac{7 - 2\sqrt{11}}{5} \right)$.

Exercice 5 — Problème (4 pts)

1. $\vec{AB}(4; -2)$, $\vec{A\Omega}(2; -4)$.
 $A = \frac{1}{2}|4 \times (-4) - (-2) \times 2| = \frac{1}{2} \times 12 = 6$.
2. Perpendiculaire à (AB) passant par Ω : $2x - y + c = 0$. En $\Omega(3; -1)$: $6 + 1 + c = 0$, $c = -7$.
 $\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 2x - y = 7 \end{cases} \Rightarrow 5x = 21, x = \frac{21}{5}, y = \frac{7}{5}$.
 $H\left(\frac{21}{5}; \frac{7}{5}\right)$.
3. La hauteur relative à $[AB]$ est $d(\Omega, (AB)) = \frac{6\sqrt{5}}{5}$.
 Vérification : $A = \frac{1}{2} \times AB \times h$. $AB = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$. $h = \frac{2 \times 6}{2\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5} \checkmark$.

Évaluation 1SPE-GEOREP-EV-A 55 min**Exercice 1**

4 points — C1

On considère les points $A(1;3)$ et $B(5;1)$ dans un repère orthonormé.

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.

- Déterminer le coefficient directeur de la droite (AB) .
- En déduire une équation cartésienne de la droite (AB) .
- Vérifier que les points A et B appartiennent à cette droite.

Exercice 2

4 points — C2

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $x + 2y - 7 = 0$.

- Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.
- Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $M(3;4)$.
- Vérifier que $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont bien perpendiculaires.

Exercice 3

4 points — C3

Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(3; -1)$ et de rayon 4.

- Écrire l'équation de $\mathcal{C}$.
- Le point $P(7; -1)$ est-il sur $\mathcal{C}$?
- Le point $Q(3; 3)$ est-il sur $\mathcal{C}$?
- Développer l'équation de $\mathcal{C}$ et vérifier que l'on retrouve le centre et le rayon en complétant les carrés.

Exercice 4

4 points — C4

On reprend la droite $(AB) : x + 2y - 7 = 0$ et le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(3; -1)$ et de rayon 4.

- Calculer la distance de Ω à la droite (AB) .
- En déduire la position relative de la droite (AB) et du cercle $\mathcal{C}$.
- Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection.

Exercice 5

4 points — C5

Avec les mêmes points $A(1; 3)$, $B(5; 1)$ et $\Omega(3; -1)$:

- Calculer l'aire du triangle $AB\Omega$.
- Déterminer le projeté orthogonal de Ω sur la droite (AB) .
- En déduire la hauteur du triangle $AB\Omega$ relative au côté $[AB]$.

Exercice 1 — Équation cartésienne (4 pts)

- $\vec{AB} \begin{pmatrix} 6-2 \\ -1-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$.
- $m = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$.
- $y - 5 = -\frac{3}{2}(x - 2)$, soit $2y - 10 = -3x + 6$, d'où $3x + 2y - 16 = 0$.
- $A : 6 + 10 - 16 = 0 \checkmark$. $B : 18 - 2 - 16 = 0 \checkmark$.

Exercice 2 — Vecteur normal (4 pts)

- $\vec{n}(3; 2)$ normal, $\vec{u}(-2; 3)$ directeur. $\vec{n} \cdot \vec{u} = -6 + 6 = 0 \checkmark$.
- $\mathcal{D}'$: vecteur normal $(-2; 3)$ (directeur de $\mathcal{D}$), passant par $M(1; 2)$:
 $-2(x - 1) + 3(y - 2) = 0$, soit $2x - 3y + 4 = 0$.
 $M : 2 - 6 + 4 = 0 \checkmark$.

$$3. 3 \times 2 + 2 \times (-3) = 6 - 6 = 0 \checkmark.$$

Exercice 3 — Cercle (4 pts)

$$1. (x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 9.$$

$$2. (7 - 4)^2 + (1 - 1)^2 = 9 + 0 = 9. P \in \mathcal{C}.$$

$$3. (4 - 4)^2 + (4 - 1)^2 = 0 + 9 = 9. Q \in \mathcal{C}.$$

$$4. x^2 - 8x + 16 + y^2 - 2y + 1 = 9, \text{ soit } x^2 + y^2 - 8x - 2y + 8 = 0.$$

$$\text{Retour : } (x - 4)^2 - 16 + (y - 1)^2 - 1 + 8 = 0, \text{ soit } (x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 9. \checkmark.$$

Exercice 4 — Position relative (4 pts)

$$1. d = \frac{|12 + 2 - 16|}{\sqrt{9 + 4}} = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13} \approx 0,55.$$

$$2. d \approx 0,55 < 3 = r : \text{ la droite est sécante.}$$

$$3. \text{ On pose } y = \frac{16 - 3x}{2} \text{ dans } (x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 9 :$$

$$(x - 4)^2 + \left(\frac{14 - 3x}{2} \right)^2 = 9.$$

$$4(x - 4)^2 + (14 - 3x)^2 = 36.$$

$$4x^2 - 32x + 64 + 9x^2 - 84x + 196 = 36, \text{ soit } 13x^2 - 116x + 224 = 0.$$

$$\Delta = 13456 - 11648 = 1808. \sqrt{1808} = 4\sqrt{113}.$$

$$x = \frac{116 \pm 4\sqrt{113}}{26} = \frac{58 \pm 2\sqrt{113}}{13}.$$

Exercice 5 — Problème (4 pts)

$$1. \vec{AB}(4; -6), \vec{A\Omega}(2; -4).$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} |4 \times (-4) - (-6) \times 2| = \frac{1}{2} |-16 + 12| = \frac{4}{2} = 2.$$

$$2. \text{ Perpendiculaire : } 2x - 3y + c = 0. \text{ En } \Omega(4; 1) : 8 - 3 + c = 0, c = -5.$$

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 2x - 3y = 5 \end{cases} \cdot 9x + 6y = 48 \text{ et } 4x - 6y = 10. 13x = 58, x = \frac{58}{13}, y = \frac{17}{13}.$$

$$H\left(\frac{58}{13}; \frac{17}{13}\right).$$

$$3. h = d(\Omega, (AB)) = \frac{2\sqrt{13}}{13}.$$

$$\text{Vérification : } AB = \sqrt{16 + 36} = 2\sqrt{13}. \mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{13} \times \frac{2\sqrt{13}}{13} = \frac{1}{2} \times \frac{4 \times 13}{13} = 2 \checkmark.$$

Évaluation 1SPE-GEOREP-EV-B 55 min**Exercice 1**

4 points — C1

On considère les points $A(2; 5)$ et $B(6; -1)$ dans un repère orthonormé.

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.
2. Déterminer le coefficient directeur de la droite (AB) .
3. En déduire une équation cartésienne de la droite (AB) .
4. Vérifier que les points A et B appartiennent à cette droite.

Exercice 2

4 points — C2

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $3x + 2y - 16 = 0$.

1. Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.
2. Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $M(1;2)$.
3. Vérifier que $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont bien perpendiculaires.

Exercice 3

4 points — C3

Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(4;1)$ et de rayon 3.

1. Écrire l'équation de $\mathcal{C}$.
2. Le point $P(7;1)$ est-il sur $\mathcal{C}$?
3. Le point $Q(4;4)$ est-il sur $\mathcal{C}$?
4. Développer l'équation de $\mathcal{C}$ et vérifier que l'on retrouve le centre et le rayon en complétant les carrés.

Exercice 4

4 points — C4

On reprend la droite $(AB) : 3x + 2y - 16 = 0$ et le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(4;1)$ et de rayon 3.

1. Calculer la distance de Ω à la droite (AB) .
2. En déduire la position relative de la droite (AB) et du cercle $\mathcal{C}$.
3. Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection.

Exercice 5

4 points — C5

Avec les mêmes points $A(2;5)$, $B(6;-1)$ et $\Omega(4;1)$:

1. Calculer l'aire du triangle $AB\Omega$.
2. Déterminer le projeté orthogonal de Ω sur la droite (AB) .
3. En déduire la hauteur du triangle $AB\Omega$ relative au côté $[AB]$.

Rappel — Repérage dans le plan

Coordonnées d'un point. Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, tout point M est repéré par ses coordonnées $(x; y)$.

Distance entre deux points. $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ (repère orthonormé).

Milieu d'un segment. Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Exercice 53 ◆

Calculer la distance entre les points suivants.

1. $A(2;1)$ et $B(5;5)$
2. $C(-1;3)$ et $D(2;-1)$

Corrigé

1. $AB = \sqrt{(5-2)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.
2. $CD = \sqrt{(2+1)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{9+16} = 5$.

Exercice 54 ◆

Déterminer les coordonnées du milieu de $[AB]$ dans chaque cas.

1. $A(2;6)$ et $B(8;2)$
2. $A(-3;1)$ et $B(5;7)$

Corrigé

1. $I\left(\frac{2+8}{2}; \frac{6+2}{2}\right) = I(5;4).$
2. $I\left(\frac{-3+5}{2}; \frac{1+7}{2}\right) = I(1;4).$

Rappel — Vecteurs et coordonnées

Coordonnées d'un vecteur. $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$

Colinéarité. $\vec{u}(x;y)$ et $\vec{v}(x';y')$ sont colinéaires $\Leftrightarrow xy' - x'y = 0.$

Exercice 55

1. Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ avec $A(1;4)$ et $B(3;-2).$
2. Les vecteurs $\vec{u}(3;6)$ et $\vec{v}(1;2)$ sont-ils colinéaires ?
3. Les vecteurs $\vec{u}(2;5)$ et $\vec{v}(3;-1)$ sont-ils colinéaires ?

Corrigé

1. $\vec{AB} \begin{pmatrix} 3-1 \\ -2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}.$
2. $3 \times 2 - 6 \times 1 = 0$: oui, colinéaires.
3. $2 \times (-1) - 5 \times 3 = -17 \neq 0$: non, pas colinéaires.

Rappel — Produit scalaire

$$\vec{u}(x;y) \cdot \vec{v}(x';y') = xx' + yy'.$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Exercice 56

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ avec $\vec{u}(4;-1)$ et $\vec{v}(2;3).$
2. Les vecteurs $\vec{u}(5;2)$ et $\vec{v}(-2;5)$ sont-ils orthogonaux ?
3. Déterminer a tel que $\vec{u}(3;a)$ et $\vec{v}(2;-6)$ soient orthogonaux.

Corrigé

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 2 + (-1) \times 3 = 8 - 3 = 5.$
2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times (-2) + 2 \times 5 = -10 + 10 = 0$: oui, orthogonaux.
3. $3 \times 2 + a \times (-6) = 0$, soit $6 - 6a = 0$, $a = 1.$

Rappel — Discriminant et racines

Pour $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$: $\Delta = b^2 - 4ac.$

$\Delta > 0$: deux racines $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$ $\Delta = 0$: une racine double. $\Delta < 0$: pas de solution réelle.

Exercice 57 ◆Résoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $2x^2 + 3x + 5 = 0$
3. $x^2 - 6x + 9 = 0$

Corrigé

1. $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$. $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$, $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. $S = \{2; 3\}$.
2. $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0$. Pas de solution réelle.
3. $\Delta = 36 - 36 = 0$. Racine double $x = \frac{6}{2} = 3$. $S = \{3\}$.

Rappel — Systèmes linéaires**Substitution** : exprimer une inconnue en fonction de l'autre, puis remplacer.**Combinaison** : multiplier les équations pour éliminer une inconnue par addition.**Exercice 58** ◆

Résoudre les systèmes suivants.

1. $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

Corrigé

1. Somme des deux équations : $3x = 12$, $x = 4$. Puis $y = 7 - 4 = 3$. Solution : $(4; 3)$.
2. De la deuxième : $x = y + 1$. En substituant : $3(y + 1) + 2y = 12$, $5y = 9$, $y = \frac{9}{5}$, $x = \frac{14}{5}$.

Exercice 59 ◆Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(2; 1)$ et $B(6; 3)$.**Corrigé**

$$m = \frac{3-1}{6-2} = \frac{1}{2}.$$

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 2), \text{ soit } y = \frac{x}{2}, \text{ d'où } x - 2y = 0.$$

$$\text{Vérification : } A : 2 - 2 = 0 \checkmark. B : 6 - 6 = 0 \checkmark.$$

Exercice 60 ◆Le point $M(4; -3)$ appartient-il à la droite $\mathcal{D} : 2x + 3y + 1 = 0$?**Coup de pouce 1.** Substitue les coordonnées de M dans $2x + 3y + 1$ et vérifie si tu obtiens 0.**Corrigé**

$$2 \times 4 + 3 \times (-3) + 1 = 8 - 9 + 1 = 0. \text{ Donc } M \in \mathcal{D}.$$

Exercice 61

Déterminer l'équation cartésienne de la droite verticale passant par $A(-3;7)$.

Corrigé

Une droite verticale a pour équation $x = x_A$, soit $x = -3$, ou $x + 3 = 0$.

Exercice 62

Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de $\mathcal{D} : 7x - 2y + 3 = 0$.

Corrigé

Normal : $\vec{n}(7; -2)$. Directeur : $\vec{d}(2; 7)$.

Vérification : $7 \times 2 + (-2) \times 7 = 0 \checkmark$.

Exercice 63

Déterminer l'équation de la droite de vecteur normal $\vec{n}(3; -5)$ passant par $A(2; 1)$.

Coup de pouce 1. Utilise $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$ avec $(a; b) = (3; -5)$.

Corrigé

$3(x - 2) - 5(y - 1) = 0$, soit $3x - 5y - 1 = 0$.

Exercice 64

Les droites $\mathcal{D}_1 : 4x + y - 3 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : x - 4y + 1 = 0$ sont-elles perpendiculaires?

Corrigé

$a_1 a_2 + b_1 b_2 = 4 \times 1 + 1 \times (-4) = 0$. Donc $\mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2$.

Exercice 65

Écrire l'équation du cercle de centre $\Omega(1; -4)$ et de rayon 3.

Corrigé

$(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 9$.

Exercice 66

Identifier le centre et le rayon du cercle $x^2 + y^2 + 8x - 2y - 8 = 0$.

Coup de pouce 1. Complète le carré : $x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16$.

Corrigé

$x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16$ et $y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1$.

$(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 25$. Centre $(-4; 1)$, rayon 5.

Exercice 67

Le point $P(5; 0)$ est-il sur le cercle $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 25$?

Corrigé

$(5-2)^2 + (0-4)^2 = 9 + 16 = 25$. Donc P est sur le cercle.

Exercice 68

Calculer la distance du point $P(3;4)$ à la droite $\mathcal{D} : 4x - 3y + 2 = 0$.

Corrigé

$$d = \frac{|12 - 12 + 2|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{2}{5}.$$

Exercice 69

Le cercle de centre $O(0;0)$ et de rayon 3 et la droite $\mathcal{D} : 4x + 3y - 15 = 0$ ont-ils des points communs ?

Coup de pouce 1. Calcule $d(O, \mathcal{D})$ et compare avec $r = 3$.

Corrigé

$$d = \frac{|0 + 0 - 15|}{5} = 3 = r. \text{ La droite est tangente au cercle : un seul point commun.}$$

Exercice 70

Les droites $\mathcal{D}_1 : x + 3y - 2 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 2x + 6y + 1 = 0$ sont-elles parallèles ?

Corrigé

$a_1b_2 - a_2b_1 = 1 \times 6 - 2 \times 3 = 0$. Les droites sont parallèles.

$$\frac{c_2}{c_1} = \frac{1}{-2} \neq 2 : \text{strictement parallèles (non confondues).}$$

Exercice 71

Calculer l'aire du triangle ABC avec $A(0;0)$, $B(3;0)$ et $C(1;4)$.

Corrigé

$\vec{AB}(3;0)$, $\vec{AC}(1;4)$.

$$A = \frac{1}{2}|3 \times 4 - 0 \times 1| = \frac{12}{2} = 6.$$

Exercice 72

Montrer que le quadrilatère $ABCD$ avec $A(0;0)$, $B(2;3)$, $C(5;5)$, $D(3;2)$ est un parallélogramme.

Coup de pouce 1. Vérifie que $\vec{AB} = \vec{DC}$.

Corrigé

$\vec{AB}(2;3)$, $\vec{DC}(5-3;5-2) = (2;3)$.

$\vec{AB} = \vec{DC}$, donc $ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice 73

Déterminer le projeté orthogonal de $P(5;3)$ sur la droite $\mathcal{D} : x + y - 2 = 0$.

Corrigé

Perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $P : x - y + c = 0$. En $P : 5 - 3 + c = 0, c = -2$.

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 2 \end{cases} \quad . \quad 2x = 4, x = 2, y = 0.$$

Le projeté est $H(2;0)$.

Corrigé

Le coefficient directeur est $m = \frac{7-3}{5-1} = \frac{4}{4} = 1$.

L'équation réduite est $y - 3 = 1(x - 1)$, soit $y = x + 2$.

L'équation cartésienne est $x - y + 2 = 0$.

Vérification : $A : 1 - 3 + 2 = 0 \checkmark$. $B : 5 - 7 + 2 = 0 \checkmark$.

Corrigé

On a $x_A = x_B = 2$ donc la droite (AB) est verticale.

Son équation cartésienne est $x - 2 = 0$, soit $x = 2$.

Corrigé

Le vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, donc un vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

L'équation est $2(x - 0) - 3(y - 4) = 0$, soit $2x - 3y + 12 = 0$.

Vérification : $A(0;4) : 2 \times 0 - 3 \times 4 + 12 = 0 \checkmark$.

Corrigé

Question 1. $2 \times 3 - 1 - 5 = 6 - 1 - 5 = 0$. Donc $C \in \mathcal{D}$.

Question 2. $2 \times 0 - 2 - 5 = -7 \neq 0$. Donc $D \notin \mathcal{D}$.

Question 3. On pose $x = 4 : 2 \times 4 - y - 5 = 0$, soit $y = 3$.

Corrigé

$$m = \frac{-1-3}{4-(-2)} = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}.$$

$$y - 3 = -\frac{2}{3}(x + 2) = -\frac{2}{3}x - \frac{4}{3}.$$

$$y = -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3}.$$

En multipliant par 3 : $3y = -2x + 5$, soit $2x + 3y - 5 = 0$.

Vérification : $A : 2(-2) + 3(3) - 5 = -4 + 9 - 5 = 0 \checkmark$. $B : 2(4) + 3(-1) - 5 = 8 - 3 - 5 = 0 \checkmark$.

Corrigé

Question 1. $y = -3x + 7$ s'écrit $3x + y - 7 = 0$.

Question 2. $5x - 2y + 1 = 0$ donne $2y = 5x + 1$, soit $y = \frac{5}{2}x + \frac{1}{2}$.

Corrigé

La droite cherchée a pour équation $3x + y + c = 0$.

$A(1; -2)$ est sur cette droite : $3 \times 1 + (-2) + c = 0$, soit $c = -1$.

L'équation est $\boxed{3x + y - 1 = 0}$.

Corrigé

$y_A = y_B = 5$, donc la droite (AB) est horizontale d'équation $\boxed{y - 5 = 0}$.

Corrigé

Question 1. On résout le système : $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$.

De la deuxième : $y = 3x - 1$. En substituant : $x + 2(3x - 1) = 4$, soit $7x = 6$, $x = \frac{6}{7}$, $y = \frac{11}{7}$.

Le point d'intersection est $I\left(\frac{6}{7}; \frac{11}{7}\right)$.

Question 2. Droite passant par I et $P(2; 0)$.

$$m = \frac{0 - 11/7}{2 - 6/7} = \frac{-11/7}{8/7} = -\frac{11}{8}.$$

$$y - 0 = -\frac{11}{8}(x - 2), \text{ soit } 11x + 8y - 22 = 0.$$

$$\text{Vérification : } I : 11 \times \frac{6}{7} + 8 \times \frac{11}{7} - 22 = \frac{66 + 88}{7} - 22 = \frac{154}{7} - 22 = 22 - 22 = 0 \checkmark.$$

Corrigé

Un vecteur normal de $\mathcal{D}$ est $\vec{n}(4; -3)$. Le vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $\vec{u}(3; 4)$.

La perpendiculaire a pour vecteur normal $\vec{u}(3; 4)$.

$$\text{Équation : } 3(x - 1) + 4(y - 2) = 0, \text{ soit } \boxed{3x + 4y - 11 = 0}.$$

$$\text{Vérification : } 3 \times 1 + 4 \times 2 - 11 = 3 + 8 - 11 = 0 \checkmark.$$

$$\text{Orthogonalité : } 4 \times 3 + (-3) \times 4 = 12 - 12 = 0 \checkmark.$$

Corrigé

$$\text{Un vecteur normal est } \vec{n}\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Un vecteur directeur est } \vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Vérification : } \vec{n} \cdot \vec{u} = 5 \times 3 + (-3) \times 5 = 0 \checkmark.$$

Corrigé

$$1(x - 3) + 4(y + 2) = 0, \text{ soit } x + 4y + 5 = 0.$$

$$\text{Vérification : } 3 + 4 \times (-2) + 5 = 3 - 8 + 5 = 0 \checkmark.$$

Corrigé

$$\vec{n}_1(2; 3) \text{ et } \vec{n}_2(6; 9) = 3\vec{n}_1.$$

Les vecteurs normaux sont colinéaires, donc les droites sont **parallèles**.

$$\text{Elles ne sont pas confondues car } \frac{c_2}{c_1} = \frac{4}{-1} = -4 \neq 3.$$

Corrigé

$$a_1a_2 + b_1b_2 = 3 \times 1 + (-1) \times 3 = 3 - 3 = 0.$$

Donc $\mathcal{D}_1 \perp \mathcal{D}_2$.

Corrigé

Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $\vec{u}(5;2)$.

$$\mathcal{D}' : 5(x-4) + 2(y-1) = 0, \text{ soit } \boxed{5x + 2y - 22 = 0}.$$

$$\text{Vérification : } 5 \times 4 + 2 \times 1 - 22 = 20 + 2 - 22 = 0 \checkmark.$$

$$\text{Orthogonalité : } 2 \times 5 + (-5) \times 2 = 10 - 10 = 0 \checkmark.$$

Corrigé

$$A\vec{M} \begin{pmatrix} x-1 \\ y-3 \end{pmatrix} \text{ colinéaire à } \vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} :$$

$$(x-1)(-1) - (y-3)(2) = 0, \text{ soit } -x + 1 - 2y + 6 = 0, \text{ d'où } \boxed{x + 2y - 7 = 0}.$$

$$\text{Un vecteur normal est } \vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Vérification : } \vec{n} \cdot \vec{u} = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0 \checkmark.$$

Corrigé

$$\text{Milieu : } I \left(\frac{1+5}{2}; \frac{3+7}{2} \right) = I(3;5).$$

$$A\vec{B} \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ est un vecteur normal à la médiatrice.}$$

$$\text{Équation : } 4(x-3) + 4(y-5) = 0, \text{ soit } 4x + 4y - 32 = 0, \text{ ou } \boxed{x + y - 8 = 0}.$$

$$\text{Vérification : } I(3;5) : 3 + 5 - 8 = 0 \checkmark.$$

Corrigé

$$B\vec{C} \begin{pmatrix} 2-6 \\ 4-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$B\vec{C}$ est un vecteur normal à la hauteur issue de A .

$$\text{Équation : } -4(x-0) + 4(y-0) = 0, \text{ soit } -4x + 4y = 0, \text{ ou } \boxed{x - y = 0}.$$

$$\text{Vérification : } A(0;0) : 0 - 0 = 0 \checkmark.$$

Corrigé

Question 1. $\mathcal{D} : 2x - y - 1 = 0$. Un vecteur normal est $\vec{n}(2; -1)$.

Question 2. $\mathcal{D}'$ parallèle à $\mathcal{D} : 2x - y + c = 0$. En $P(3;4) : 6 - 4 + c = 0, c = -2$.

$$\boxed{\mathcal{D}' : 2x - y - 2 = 0}.$$

Question 3. $\mathcal{D}''$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$: le vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $(1;2)$, qui est normal à $\mathcal{D}''$.

$$1(x-3) + 2(y-4) = 0, \text{ soit } \boxed{x + 2y - 11 = 0}.$$

$$\text{Vérification : } 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0 \checkmark.$$

Corrigé

$$\vec{BA} \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}, \vec{BC} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = (-3)(4) + (-4)(-3) = -12 + 12 = 0.$$

Donc $\vec{BA} \perp \vec{BC}$, le triangle ABC est **rectangle en B**.

Corrigé

Question 1. $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$.

Question 2. $(2-2)^2 + (2+3)^2 = 0 + 25 = 25$. Donc $A \in \mathcal{C}$.

Corrigé

Le centre est $\Omega(-1;4)$ et le rayon est $r = \sqrt{9} = 3$.

Corrigé

$$x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4 \text{ et } y^2 + 6y = (y+3)^2 - 9.$$

L'équation devient $(x-2)^2 - 4 + (y+3)^2 - 9 - 3 = 0$, soit $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 16$.

Le centre est $\Omega(2;-3)$ et le rayon est $r = 4$.

Corrigé

Milieu : $I(3;5)$.

$$AB = \sqrt{(5-1)^2 + (7-3)^2} = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}.$$

Rayon : $r = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$, donc $r^2 = 8$.

Équation : $(x-3)^2 + (y-5)^2 = 8$.

Corrigé

$A = 2, B = -8, C = 8$.

$$\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C = 1 + 16 - 8 = 9 > 0 : \text{c'est un cercle.}$$

Centre : $\Omega(-1;4)$, rayon $r = 3$.

Corrigé

$A = -6, B = 2, C = 15$.

$$\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C = 9 + 1 - 15 = -5 < 0.$$

L'équation n'a pas de solution : elle ne représente **aucun cercle**.

Corrigé

$A(0;0) : C = 0$.

$B(4;0) : 16 + 4A = 0$, soit $A = -4$.

$C(0;6) : 36 + 6B = 0$, soit $B = -6$.

L'équation est $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$.

Centre : $\Omega(2;3)$, rayon $r = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$.

Corrigé

$$(3-1)^2 + (1+2)^2 = 4 + 9 = 13.$$

$13 < 18 = r^2$, donc $\Omega P < r$: le point P est à l'intérieur du cercle.

Corrigé

$$\Omega A^2 = (1 - a)^2 + 4 \text{ et } \Omega B^2 = (3 - a)^2 + 4.$$

$$\Omega A = \Omega B \iff (1 - a)^2 = (3 - a)^2.$$

$$1 - 2a + a^2 = 9 - 6a + a^2, \text{ soit } 4a = 8, \boxed{a = 2}.$$

Le cercle a pour centre $\Omega(2; 0)$ et rayon $r = \sqrt{5}$.

Corrigé

$$\vec{MA} \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}, \vec{MB} \begin{pmatrix} 6 - x \\ 2 - y \end{pmatrix}.$$

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -x(6 - x) + (-y)(2 - y) = x^2 - 6x + y^2 - 2y.$$

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \iff x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0.$$

$$\text{En complétant : } (x - 3)^2 - 9 + (y - 1)^2 - 1 = 0, \text{ soit } (x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 10.$$

C'est le cercle de centre $I(3; 1)$ (milieu de $[AB]$) et de rayon $r = \sqrt{10}$, soit le cercle de diamètre $[AB]$.

Corrigé

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = 2 \times 2 - 4 \times 1 = 0.$$

Les droites sont parallèles. $\mathcal{D}_2 = 2\mathcal{D}_1$ donnerait $c_2 = 2 \times (-3) = -6 \neq 1$, elles sont strictement parallèles.

Corrigé

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = 1 \times (-1) - 2 \times 1 = -3 \neq 0 : \text{droites sécantes.}$$

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \end{cases} . \text{ Somme : } 3x = 3, x = 1, y = 1.$$

Point d'intersection : $\boxed{(1; 1)}$.

Corrigé

$$d = \frac{|3 \times 1 - 4 \times 2 + 5|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|3 - 8 + 5|}{5} = \frac{0}{5} = 0.$$

Le point P est **sur** la droite $\mathcal{D}$.

Corrigé

$$d(O, \mathcal{D}) = \frac{|3 \times 0 + 4 \times 0 - 15|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{15}{5} = 3.$$

$d = 3 < 5 = r$: la droite est **sécante** au cercle (deux points d'intersection).

Corrigé

On substitue $y = 2x$ dans $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$:

$$(x - 1)^2 + (2x - 2)^2 = 5, \text{ soit } (x - 1)^2 + 4(x - 1)^2 = 5, \text{ d'où } 5(x - 1)^2 = 5, (x - 1)^2 = 1.$$

$$x - 1 = \pm 1, \text{ soit } x = 0 \text{ ou } x = 2.$$

Pour $x = 0$: $y = 0$. Pour $x = 2$: $y = 4$.

Les points d'intersection sont $\boxed{(0; 0)}$ et $\boxed{(2; 4)}$.

Corrigé

Question 1. $d = \frac{|9 + 4 - 5|}{5} = \frac{8}{5}$.

Question 2. $d = \frac{8}{5} = 1,6 < 2 = r$: la droite est **sécante** au cercle.

Corrigé

$$d = \frac{|2 - 2(-1) + c|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{|4 + c|}{\sqrt{5}}.$$

$$d = \sqrt{5} \Leftrightarrow |4 + c| = 5.$$

$$4 + c = 5 \text{ ou } 4 + c = -5, \text{ soit } \boxed{c = 1} \text{ ou } \boxed{c = -9}.$$

Corrigé

Vérifions que A est sur C : $(2 - 2)^2 + (5 - 3)^2 = 0 + 4 = 4 \checkmark$.

$\vec{\Omega A} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ est normal à la tangente.

Tangente : $0(x - 2) + 2(y - 5) = 0$, soit $\boxed{y = 5}$.

Corrigé

C_2 développée : $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 = 0$.

C_1 : $x^2 + y^2 - 25 = 0$.

Soustraction : $-8x - 6y + 46 = 0$, soit $4x + 3y - 23 = 0$, d'où $y = \frac{23 - 4x}{3}$.

Substitution dans C_1 : $x^2 + \frac{(23 - 4x)^2}{9} = 25$.

$9x^2 + 529 - 184x + 16x^2 = 225$, soit $25x^2 - 184x + 304 = 0$.

$\Delta = 184^2 - 4 \times 25 \times 304 = 33856 - 30400 = 3456 = 576 \times 6$.

$\sqrt{\Delta} = 24\sqrt{6}$.

$$x = \frac{184 \pm 24\sqrt{6}}{50} = \frac{92 \pm 12\sqrt{6}}{25}.$$

Les ordonnées se déduisent de $y = \frac{23 - 4x}{3}$.

Corrigé

$$d(\Omega, \mathcal{D}) = \frac{|3m - 4|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1.$$

$(3m - 4)^2 = m^2 + 1$, soit $9m^2 - 24m + 16 = m^2 + 1$, d'où $8m^2 - 24m + 15 = 0$.

$\Delta = 576 - 480 = 96$, $\sqrt{\Delta} = 4\sqrt{6}$.

$$m = \frac{24 \pm 4\sqrt{6}}{16} = \frac{6 \pm \sqrt{6}}{4}.$$

Les deux tangentes ont pour équations $y = \frac{6 + \sqrt{6}}{4}x$ et $y = \frac{6 - \sqrt{6}}{4}x$.

Corrigé

$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$

$$A = \frac{1}{2} |4 \times 4 - 0 \times 2| = \frac{1}{2} \times 16 = \boxed{8} \text{ unités d'aire.}$$

Corrigé

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{DC} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$\vec{AB} = \vec{DC}$, donc $ABCD$ est un **parallélogramme**.

Corrigé

Perpendiculaire : $4x - 3y + c = 0$. En P : $16 - 15 + c = 0$, $c = -1$.

$$\begin{cases} 3x + 4y = 6 \\ 4x - 3y = 1 \end{cases} \text{ . On multiplie : } 9x + 12y = 18 \text{ et } 16x - 12y = 4.$$

$$25x = 22, x = \frac{22}{25} \cdot y = \frac{6 - 3 \times 22/25}{4} = \frac{84/25}{4} = \frac{21}{25}.$$

$$H \left(\frac{22}{25}, \frac{21}{25} \right).$$

Corrigé

Perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par P : $x + y + c = 0$. En P : $10 + c = 0$, $c = -10$.

$$\begin{cases} x - y = -2 \\ x + y = 10 \end{cases} \text{ . Somme : } 2x = 8, x = 4, y = 6. \text{ Donc } H(4; 6).$$

$$P' = 2H - P : x_{P'} = 8 - 3 = 5, y_{P'} = 12 - 7 = 5.$$

Le symétrique est $\boxed{P'(5; 5)}$.

Corrigé

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{DC} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}. \vec{AB} = \vec{DC} : \text{parallélogramme.}$$

$$AB = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}, BC = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}. \text{ Deux côtés consécutifs égaux : losange.}$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 3 \times 2 + (-2) \times 3 = 0 : \text{angle droit en } B, \text{ donc rectangle.}$$

$ABCD$ est à la fois un losange et un rectangle : c'est un **carré**.

Corrigé

$$\text{Milieu de } [AC] : \left(\frac{-1+5}{2}; \frac{1-1}{2} \right) = (2; 0).$$

$$\text{Milieu de } [BD] : \left(\frac{3+1}{2}; \frac{3-3}{2} \right) = (2; 0).$$

Même milieu : $ABCD$ est un parallélogramme.

$$AC = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40}, BD = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40}.$$

$AC = BD$: parallélogramme à diagonales égales, c'est un **rectangle**.

Corrigé

Hauteur issue de A (perpendiculaire à (BC)) : $\vec{BC}(-4; 4)$ normal, $-4x + 4y = 0$, soit $x - y = 0$.

Hauteur issue de B (perpendiculaire à (AC)) : $\vec{AC}(2; 4)$ normal, $2(x - 6) + 4y = 0$, soit $x + 2y - 6 = 0$.

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x + 2y = 6 \end{cases} \text{ . De la première : } x = y. \text{ Puis } 3y = 6, y = 2, x = 2.$$

L'orthocentre est $H(2;2)$.

Corrigé

On pose $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$.

$A(0;0) : C = 0$. $B(4;0) : 16 + 4A = 0, A = -4$. $C(0;6) : 36 + 6B = 0, B = -6$.

Équation : $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$, soit $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 13$.

Centre $\Omega(2;3)$, rayon $r = \sqrt{13}$.

Corrigé

$MA^2 = (x - 1)^2 + y^2$ et $d(M, \mathcal{D})^2 = (x + 1)^2$.

$MA = d(M, \mathcal{D}) \iff (x - 1)^2 + y^2 = (x + 1)^2$.

$x^2 - 2x + 1 + y^2 = x^2 + 2x + 1$, soit $y^2 = 4x$.

C'est une parabole de sommet O et de foyer $A(1;0)$.

Corrigé

Perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par O : direction $\vec{n}(2;1)$, donc $x = 2y$ (paramétrage).

$\begin{cases} 2x + y = 10 \\ x = 2y \end{cases}$. En substituant : $4y + y = 10, y = 2, x = 4$.

Le point le plus proche est $H(4;2)$, à distance $OH = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$.

Probabilités conditionnelles et indépendance

CHAPITRE 9

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer une probabilité conditionnelle $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$.
- ▶ C2 — Je sais construire et lire un arbre pondéré.
- ▶ C3 — Je sais appliquer la formule des probabilités totales.
- ▶ C4 — Je sais déterminer si deux événements sont indépendants.
- ▶ C5 — Je sais résoudre un problème contextualisé de probabilités conditionnelles.

© À RETENIR

Un test de dépistage détecte correctement 95 % des personnes malades, mais donne aussi un résultat positif chez 3 % des personnes saines. Si 1 % de la population est atteinte, quelle est la probabilité d'être réellement malade quand le test est positif ? Un problème qui nécessite les probabilités conditionnelles.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

Temps 2 — Diagnostic d'entree

(15–20 min, sans calculatrice)

Reponds a chaque question sur ta copie. L'objectif est de reperer ce que tu maitrises, pas de tout reussir.

R1 — Probabilites de base

- On donne $P(A) = \frac{3}{10}$, $P(B) = \frac{2}{5}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$. Calcule $P(A \cup B)$.
- Calcule $P(\bar{A})$ si $P(A) = \frac{3}{10}$.

R2 — Fractions et pourcentages

- Convertis $\frac{3}{20}$ en pourcentage.
- Ecris 45 % sous forme d'une fraction irreductible.

R3 — Arbres de denombrement

- On choisit d'abord une couleur parmi 2, puis une taille parmi 3. Combien d'issues possibles ?

R4 — Calcul litteral

- Resous l'equation $3x + 7 = 22$.

R5 — Tableaux de donnees

- Dans un lycee, 120 eleves pratiquent un sport et 80 n'en pratiquent pas. Quel est l'effectif total ?
- Quelle est la frequence des sportifs dans cet etablissement ?

Grille de decodage

Questions	Prerequis teste	Si tu as echoue...	Fiche a lire
1 et 2	R1 — Probabilites de base	...avant de commencer C1, C3	Fiche R1
3 et 4	R2 — Fractions et pourcentages	...avant de commencer C1, C5	Fiche R2
5	R3 — Arbres de denombrement	...avant de commencer C2	Fiche R3
6	R4 — Calcul litteral	...avant de commencer C4, C5	Fiche R4
7 et 8	R5 — Tableaux de donnees	...avant de commencer C1, C5	Fiche R5

Si tu as reussi toutes les questions sans difficulte, tu peux demarrer directement le Temps 3.

9.1 Probabilite conditionnelle

DÉFINITION 1

Soit A et B deux evenements d'un univers Ω , avec $P(A) > 0$.

La **probabilite conditionnelle de B sachant A** , notee $P_A(B)$, est le nombre :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

On lit : « probabilite de B sachant que A est realise ».

EXEMPLE Dans un lycée de 500 élèves, 200 sont en Première, et parmi ceux-ci 80 suivent la spécialité Maths.

On note A : « l'élève est en Première » et B : « l'élève suit Maths ».

$$P(A) = \frac{200}{500} = \frac{2}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{80}{500} = \frac{4}{25}.$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{4}{25}}{\frac{2}{5}} = \frac{4}{25} \times \frac{5}{2} = \frac{2}{5}.$$

Parmi les élèves de Première, $\frac{2}{5}$ suivent Maths.

⚠ CONTRE-EXEMPLE Attention : $P_A(B) \neq P_B(A)$ en général !

Ici, $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ nécessite de connaître $P(B)$ (la proportion de tous les élèves qui font Maths, pas seulement ceux de Première).

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Si $P(A) > 0$, alors :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

C'est la **formule de multiplication** (ou formule des probabilités composées).

EXEMPLE On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note A : « la carte est un cœur » et B : « la carte est un roi ».

$$P(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}.$$

Sachant que la carte est un cœur, la probabilité que ce soit le roi de cœur est $P_A(B) = \frac{1}{8}$.

$$\text{Donc } P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{32}.$$

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si $P(A) > 0$, alors la fonction $B \mapsto P_A(B)$ vérifie les axiomes d'une probabilité :

- ▶ $P_A(\Omega) = 1$;
- ▶ Pour tout événement B , $0 \leq P_A(B) \leq 1$;
- ▶ $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B)$.

9.2 Arbre pondéré

DÉFINITION 1

Un **arbre pondéré** (ou arbre de probabilités) est un arbre dont chaque branche porte une probabilité, et qui modélise une expérience aléatoire en deux ou plusieurs étapes.

Règles de construction :

1. Chaque nœud représente un événement ou un sous-événement.
2. La probabilité portée par une branche est la **probabilité conditionnelle** correspondante.
3. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Règle du produit le long d'un chemin :

La probabilité d'un chemin (de la racine à une feuille) est égale au **produit** des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin.

Par exemple, le chemin « A puis B sachant A » a pour probabilité :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

EXEMPLE Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire une boule, puis sans remise, une seconde.

Première étape : $P(R_1) = \frac{3}{5}, P(V_1) = \frac{2}{5}$.

Deuxième étape sachant R_1 : $P_{R_1}(R_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, P_{R_1}(V_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Deuxième étape sachant V_1 : $P_{V_1}(R_2) = \frac{3}{4}, P_{V_1}(V_2) = \frac{1}{4}$.

Le chemin « rouge puis vert » a pour probabilité $P(R_1 \cap V_2) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$.

◆ PROPRIÉTÉ 2 Somme des feuilles :

La somme des probabilités de toutes les feuilles (tous les chemins) vaut 1. Ceci sert de vérification.

EXEMPLE Avec l'urne précédente :

$$\begin{aligned} P(R_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap V_2) + P(V_1 \cap R_2) + P(V_1 \cap V_2) &= \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{6}{20} + \frac{2}{20} \\ &= \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = 1. \checkmark \end{aligned}$$

9.3 Probabilités totales

DÉFINITION 1

Une **partition** de l'univers Ω est une famille d'événements $B_1, B_2, \dots, B_n$ tels que :

- ▶ les B_i sont deux à deux incompatibles : $B_i \cap B_j = \emptyset$ pour $i \neq j$;
- ▶ leur réunion couvre Ω : $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$.

Le cas le plus courant est la partition $\{B, \bar{B}\}$.

THÉORÈME 1

(Formule des probabilités totales)

Si $B_1, B_2, \dots, B_n$ forment une partition de Ω avec $P(B_i) > 0$ pour tout i , alors pour tout événement A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \times P_{B_i}(A) = P(B_1) P_{B_1}(A) + P(B_2) P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n) P_{B_n}(A).$$

Cas usuel avec la partition $\{B, \bar{B}\}$:

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

DÉMONSTRATION

Démonstration (exigible au baccalauréat).

Comme $\{B, \bar{B}\}$ est une partition de Ω , on a :

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}),$$

et les événements $A \cap B$ et $A \cap \bar{B}$ sont incompatibles.

Par additivité de la probabilité :

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}).$$

Or, par définition de la probabilité conditionnelle :

$$P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A) \quad \text{et} \quad P(A \cap \bar{B}) = P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

D'où :

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A). \quad \square$$

EXEMPLE Une usine a deux chaînes de production. La chaîne 1 produit 60 % des pièces et la chaîne 2 produit 40 %. Le taux de pièces defectueuses est de 3 % pour la chaîne 1 et de 5 % pour la chaîne 2.

On note C_1 : « la pièce vient de la chaîne 1 », C_2 : « la pièce vient de la chaîne 2 », et D : « la pièce est defectueuse ».

$\{C_1, C_2\}$ est une partition de Ω .

$$P(D) = P(C_1) \times P_{C_1}(D) + P(C_2) \times P_{C_2}(D) = \frac{60}{100} \times \frac{3}{100} + \frac{40}{100} \times \frac{5}{100} = \frac{18}{1000} + \frac{20}{1000} = \frac{38}{1000} = \frac{19}{500}.$$

La probabilité qu'une pièce soit defectueuse est $\frac{19}{500} = 3,8 \%$.

9.4 Indépendance de deux événements

DÉFINITION 1

Deux événements A et B sont **indépendants** si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Si $P(A) > 0$, alors A et B sont indépendants si et seulement si :

$$P_A(B) = P(B).$$

Autrement dit, la réalisation de A ne modifie pas la probabilité de B .

EXEMPLE On lance un dé équilibré à six faces. On note A : « le résultat est pair » et B : « le résultat est supérieur ou égal à 5 ».

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad A \cap B = \{6\} \text{ donc } P(A \cap B) = \frac{1}{6}.$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B).$$

Les événements A et B sont indépendants.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Indépendance $\neq$ incompatibilité !

Deux événements incompatibles ($A \cap B = \emptyset$) ont $P(A \cap B) = 0$. Ils ne sont indépendants que si $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$.

Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants.

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si A et B sont indépendants, alors :

- ▶ A et $\bar{B}$ sont indépendants ;
- ▶ $\bar{A}$ et B sont indépendants ;
- ▶ $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants.

EXEMPLE On tire une carte dans un jeu de 52. On note A : « la carte est rouge » ($P(A) = \frac{1}{2}$) et B : « la carte est un as » ($P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$).

$$P(A \cap B) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26} \text{ (deux as rouges).}$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{26}. \text{ Donc } A \text{ et } B \text{ sont indépendants.}$$

$$\text{Vérification : } P(A \cap \bar{B}) = \frac{24}{52} = \frac{12}{26} \text{ et } P(A) \times P(\bar{B}) = \frac{1}{2} \times \frac{12}{13} = \frac{12}{26}. \checkmark$$

9.5 Problèmes contextuels

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Pour résoudre un problème de probabilités conditionnelles :

1. **Identifier les événements** et les nommer avec des lettres.
2. **Extraire les données** de l'énoncé : probabilités, pourcentages, effectifs.
3. **Construire un arbre pondéré** ou un tableau à double entrée.
4. **Appliquer les formules** : probabilité conditionnelle, probabilités totales, indépendance.
5. **Conclure** en revenant au contexte (phrase-réponse).

EXEMPLE (Test médical)

Un test de dépistage a les caractéristiques suivantes :

- ▶ **Sensibilité** : si la personne est malade, le test est positif dans 95 % des cas.
- ▶ **Spécificité** : si la personne est saine, le test est négatif dans 97 % des cas.
- ▶ **Prévalence** : 1 % de la population est malade.

On note M : « la personne est malade » et T : « le test est positif ».

Données : $P(M) = \frac{1}{100}$, $P_M(T) = \frac{95}{100}$, $P_{\bar{M}}(\bar{T}) = \frac{97}{100}$ donc $P_{\bar{M}}(T) = \frac{3}{100}$.

Probabilités totales :

$$P(T) = P(M) \times P_M(T) + P(\bar{M}) \times P_{\bar{M}}(T) = \frac{1}{100} \times \frac{95}{100} + \frac{99}{100} \times \frac{3}{100} = \frac{95}{10000} + \frac{297}{10000} = \frac{392}{10000} = \frac{49}{1250}.$$

Valeur prédictive positive :

$$P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{P(M) \times P_M(T)}{P(T)} = \frac{\frac{95}{10000}}{\frac{392}{10000}} = \frac{95}{392} \approx 0,242.$$

Résultat surprenant : un test positif ne signifie une maladie réelle que dans environ 24 % des cas !

EXEMPLE (Contrôle qualité)

Trois machines M_1, M_2, M_3 produisent respectivement 50 %, 30 % et 20 % de la production totale. Les taux de défaut sont respectivement 2 %, 3 % et 5 %.

On prélève une pièce au hasard. On note D : « la pièce est défectueuse ».

Par la formule des probabilités totales :

$$P(D) = 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,03 + 0,2 \times 0,05 = 0,01 + 0,009 + 0,01 = 0,029.$$

La pièce est défectueuse : d'où vient-elle probablement ?

$$P_D(M_3) = \frac{P(M_3) \times P_{M_3}(D)}{P(D)} = \frac{0,2 \times 0,05}{0,029} = \frac{0,01}{0,029} \approx 0,345.$$

9.6 Algorithmique : une méthode de Monte-Carlo

◆ **PROPRIÉTÉ Méthode de Monte-Carlo** On peut estimer une probabilité, et donc une aire, en répétant un grand nombre de fois une expérience aléatoire simulée. La fréquence de l'événement observé fournit alors une **estimation empirique** de sa probabilité.

EXEMPLE On choisit au hasard un point $M(x; y)$ dans le carré $[0; 1]^2$. L'événement

$$D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$$

signifie que M appartient au quart de disque de rayon 1. Le rapport des aires vaut

$$P(D) = \frac{\pi/4}{1} = \frac{\pi}{4}.$$

Si f est la fréquence des points situés dans le quart de disque, alors $4f$ fournit une estimation de π .

```

1 from random import Random
2
3 def estimer_pi(n, graine):
4     """Estime pi avec n points pseudo-aleatoires dans le carre unite."""
5     if n <= 0:
6         raise ValueError("n doit etre strictement positif")
7     generateur = Random(graine)
8     dedans = 0
9     for _ in range(n):
10         x = generateur.random()
11         y = generateur.random()
12         if x * x + y * y <= 1:
13             dedans = dedans + 1
14     return 4 * dedans / n

```

◆ **PROPRIÉTÉ Démarche expérimentale**

1. Choisir une taille n et une graine, par exemple `estimer_pi(10000, 1729)`.
2. Compter les points qui réalisent l'événement D .
3. Calculer la fréquence `dedans / n`, puis la multiplier par 4.
4. Recommencer avec d'autres graines et avec une valeur de n plus grande pour observer la variabilité de l'estimation.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Le nombre renvoyé est une **estimation empirique**. Une exécution, même avec beaucoup de points, ne constitue pas une preuve de la valeur de π . La graine rend l'expérience reproductible ; elle ne rend pas le résultat exact. Deux graines peuvent produire deux estimations différentes.

EXEMPLE Pour $n = 10\,000$ et la graine 1729, le programme renvoie 3,13. L'écart à π est ici d'environ 0,012. Ce constat décrit cette simulation précise et ne garantit pas l'écart obtenu lors d'une autre simulation.

④ MÉTHODE M1 Calculer une probabilité conditionnelle

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer « la probabilité de B sachant A », ou lorsqu'on connaît $P(A \cap B)$ et $P(A)$ et qu'on cherche $P_A(B)$.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les événements A et B à partir de l'énoncé.
2. Je détermine $P(A)$ et $P(A \cap B)$ (par lecture directe, arbre ou tableau).
3. Je vérifie que $P(A) > 0$ (condition d'existence).
4. J'applique la formule : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.
5. Je simplifie la fraction si possible.

Exemple rédigé. Dans un groupe de 200 élèves, 120 sont des filles. Parmi les filles, 48 portent des lunettes. On tire un élève au hasard. Calculer la probabilité de porter des lunettes sachant que l'élève est une fille.

A : « l'élève est une fille », B : « l'élève porte des lunettes ».

$$P(A) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{48}{200} = \frac{6}{25}.$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{6}{25}}{\frac{3}{5}} = \frac{6}{25} \times \frac{5}{3} = \frac{2}{5}.$$

Parmi les filles, $\frac{2}{5} = 40\%$ portent des lunettes.

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$: l'ordre compte !
- **Piège 2.** Confondre $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$ dans la formule.
- **Piège 3.** Oublier de vérifier que $P(A) > 0$.

Vérifier son résultat. Vérifier que $0 \leq P_A(B) \leq 1$. Si le résultat dépasse 1 ou est négatif, il y a une erreur. On peut aussi vérifier que $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

④ MÉTHODE M2 Construire et exploiter un arbre pondéré

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour toute expérience en deux étapes ou plus, lorsqu'on connaît des probabilités conditionnelles et qu'on cherche des probabilités d'intersections.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie la première étape et ses issues. Je place les probabilités sur les premières branches.
2. Pour chaque issue de la première étape, j'identifie les issues de la deuxième étape et je place les **probabilités conditionnelles** correspondantes.
3. Je vérifie : à chaque nœud, la somme des branches vaut 1.
4. Pour calculer la probabilité d'un chemin, je **multiplie** les probabilités le long du chemin.
5. La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent.

Exemple rédigé. Un sac contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire une boule, puis sans remise une seconde. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

$$P(R_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}, \quad P(B_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

$$\text{Sachant } R_1 : P_{R_1}(R_2) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, \quad P_{R_1}(B_2) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Sachant } B_1 : P_{B_1}(R_2) = \frac{4}{9}, \quad P_{B_1}(B_2) = \frac{5}{9}.$$

$$P(\text{diff.}) = P(R_1 \cap B_2) + P(B_1 \cap R_2) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{4}{9} = \frac{4}{15} + \frac{12}{45} = \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{8}{15}.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Placer $P(A \cap B)$ sur une branche au lieu de $P_A(B)$.
- ▶ **Piège 2.** Additionner au lieu de multiplier le long d'un chemin.
- ▶ **Piège 3.** Oublier de vérifier la somme des branches à chaque noeud.

Vérifier son résultat. La somme de toutes les feuilles doit valoir 1.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

🔑 MÉTHODE M3 Appliquer la formule des probabilités totales

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'on cherche $P(A)$ et que l'on connaît les probabilités conditionnelles $P_{B_i}(A)$ pour une partition $\{B_1, \dots, B_n\}$ de l'univers.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie une partition de l'univers : des événements $B_1, \dots, B_n$ incompatibles et exhaustifs.
2. Je repère les valeurs de $P(B_i)$ et $P_{B_i}(A)$ pour chaque i .
3. J'applique la formule :

$$P(A) = P(B_1) \times P_{B_1}(A) + P(B_2) \times P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n) \times P_{B_n}(A).$$

4. Si la partition est $\{B, \bar{B}\}$, la formule se réduit à :

$$P(A) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A).$$

Exemple rédigé. 60 % des habitants d'une ville utilisent les transports en commun (T). Parmi ceux-ci, 80 % arrivent à l'heure (H). Parmi ceux qui n'utilisent pas les transports en commun, 70 % arrivent à l'heure.

$$P(T) = \frac{3}{5}, \quad P(\bar{T}) = \frac{2}{5}, \quad P_T(H) = \frac{4}{5}, \quad P_{\bar{T}}(H) = \frac{7}{10}.$$

$$P(H) = P(T) \times P_T(H) + P(\bar{T}) \times P_{\bar{T}}(H) = \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{12}{25} + \frac{14}{50} = \frac{24}{50} + \frac{14}{50} = \frac{38}{50} = \frac{19}{25}.$$

La probabilité d'arriver à l'heure est $\frac{19}{25} = 76\%$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier un terme de la partition (par exemple oublier $P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A)$).
- ▶ **Piège 2.** Ne pas vérifier que les B_i forment bien une partition.
- ▶ **Piège 3.** Confondre $P(A)$ et $P_B(A)$.

Vérifier son résultat. On peut vérifier en calculant aussi $P(\bar{A})$ par probabilités totales et en vérifiant que $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

① **MÉTHODE M4 Déterminer si deux événements sont indépendants**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande si deux événements sont indépendants, ou lorsque l'on veut savoir si la réalisation de l'un influence la probabilité de l'autre.

La méthode pas à pas.

1. J'identifie les événements A et B .
2. Je calcule $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$ (par arbre, tableau ou formule).
3. Je calcule le produit $P(A) \times P(B)$.
4. Je compare : si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, les événements sont indépendants. Sinon, ils ne le sont pas.
5. **Méthode alternative** (si $P(A) > 0$) : je compare $P_A(B)$ et $P(B)$. Égalité $\Leftrightarrow$ indépendance.

Exemple rédigé. On lance deux des équilibrés. A : « le premier de donne 6 », B : « la somme vaut 7 ».

$$P(A) = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \quad A \cap B = \{(6, 1)\} \text{ donc } P(A \cap B) = \frac{1}{36}.$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} = P(A \cap B).$$

Les événements A et B sont indépendants.

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre indépendance et incompatibilité. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants.
- **Piège 2.** Affirmer l'indépendance sans calcul, « parce que ça paraît logique ».
- **Piège 3.** Oublier de conclure par une phrase.

Vérifier son résultat. Si A et B sont indépendants, vérifier aussi que $P_A(B) = P(B)$ (ou inversement).

S'entraîner. (renvois exercices M4)

① **MÉTHODE M5 Résoudre un problème contextualisé de probabilités conditionnelles**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour tout problème en contexte réel (test médical, contrôle qualité, jeu de hasard, génétique) faisant intervenir des probabilités conditionnelles.

La méthode pas à pas.

1. **Lire l'énoncé** et identifier les événements (les nommer avec des lettres).
2. **Extraire les données** : les probabilités données, en distinguant $P(A)$, $P_A(B)$, $P(A \cap B)$, etc.
3. **Choisir un outil** : arbre pondéré (souvent le plus adapté) ou tableau à double entrée.
4. **Compléter l'outil** avec toutes les probabilités déduites.
5. **Respondre aux questions** en utilisant les formules :
 - probabilité conditionnelle : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$;
 - probabilités totales : $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$;
 - indépendance : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$?
6. **Conclure par une phrase** en revenant au contexte.

Exemple rédigé. Dans une région, 30 % de la population est vaccinée (V). Parmi les vaccinés, 2 % tombent malades (M). Parmi les non-vaccinés, 15 % tombent malades. Quelle est la probabilité qu'une personne malade soit vaccinée ?

$$P(V) = \frac{3}{10}, P_V(M) = \frac{1}{50}, P_{\bar{V}}(M) = \frac{3}{20}.$$

$$P(M) = \frac{3}{10} \times \frac{1}{50} + \frac{7}{10} \times \frac{3}{20} = \frac{3}{500} + \frac{21}{200} = \frac{6}{1000} + \frac{105}{1000} = \frac{111}{1000}.$$

$$P_M(V) = \frac{P(V \cap M)}{P(M)} = \frac{\frac{3}{500}}{\frac{111}{1000}} = \frac{3}{500} \times \frac{1000}{111} = \frac{6}{111} = \frac{2}{37}.$$

Environ 5,4 % des malades sont vaccinés.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Mal identifier les événements (confondre sensibilité et VPP).
- ▶ **Piège 2.** Confondre pourcentages et probabilités (30 % s'écrit 0,3 ou $\frac{3}{10}$).
- ▶ **Piège 3.** Oublier de revenir au contexte dans la conclusion.

Vérifier son résultat. Vérifier que la somme des feuilles de l'arbre vaut 1. Vérifier que $P_M(V) + P_M(\bar{V}) = 1$.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

On donne $P(A) = \frac{3}{10}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$.

1. Calculer $P_A(B)$.
2. Calculer $P_A(\bar{B})$.

Exercice 2

On donne $P(B) = \frac{2}{5}$ et $P(A \cap B) = \frac{3}{20}$.

1. Calculer $P_B(A)$.
2. En déduire $P_B(\bar{A})$.

Exercice 3

Dans un lycée de 200 élèves, 120 sont des filles et 45 filles pratiquent un sport.

On tire un élève au hasard. On note F : « l'élève est une fille » et S : « l'élève est sportif ».

1. Donner $P(F)$ et $P(F \cap S)$.
2. Calculer $P_F(S)$. Interpréter.

Exercice 4

On donne $P(A) = \frac{1}{4}$ et $P_A(B) = \frac{3}{5}$.

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. Si de plus $P(B) = \frac{1}{2}$, calculer $P_B(A)$.

Exercice 5 ◆

On donne $P(A) = \frac{7}{10}$ et $P(A \cap B) = \frac{7}{20}$. Calculer $P_A(B)$.

Exercice 6 ◆◆

Dans un club de 100 membres, on relève les données suivantes :

	Sport	Pas sport	Total
Hommes	36	24	60
Femmes	20	20	40
Total	56	44	100

On note H : « la personne est un homme » et S : « la personne fait du sport ».

1. Calculer $P_H(S)$ et $P_F(S)$.
2. Comparer et interpréter.

Exercice 7 ◆◆

On donne $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{3}{10}$ et $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$.

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. En déduire $P_A(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$.

Exercice 8 ◆◆

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note C : « la carte est un cœur » et F : « la carte est une figure (roi, dame, valet) ».

1. Donner $P(C)$, $P(F)$ et $P(C \cap F)$.
2. Calculer $P_C(F)$. Interpréter.
3. Calculer $P_F(C)$.

Exercice 9 ◆◆◆

On donne $P(A) = p$ (inconnue), $P_A(B) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ et $P_B(A) = \frac{1}{4}$.

1. Exprimer $P(A \cap B)$ en fonction de p .
2. En utilisant $P_B(A) = \frac{1}{4}$, déterminer la valeur de p .
3. Vérifier la cohérence des résultats.

Exercice 10 ◆◆◆

On donne $P(A) = \frac{3}{5}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ et $P(A \cup B) = \frac{4}{5}$.

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.
3. Calculer $P_{\bar{A}}(B)$.
4. Comparer $P_A(B)$ et $P_{\bar{A}}(B)$. Interpréter.

Exercice 11

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire une boule, on note sa couleur, puis sans remise on tire une deuxième boule.

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge.

Exercice 12

Un joueur lance un dé truqué : il obtient « pile » avec la probabilité $\frac{1}{3}$ et « face » avec la probabilité $\frac{2}{3}$. S'il obtient pile, il gagne un lot avec la probabilité $\frac{3}{4}$. S'il obtient face, il gagne un lot avec la probabilité $\frac{1}{4}$.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(\text{pile} \cap \text{lot})$ et $P(\text{face} \cap \text{lot})$.
3. Vérifier que la somme de toutes les feuilles vaut 1.

Exercice 13

Un sac contient des jetons rouges, bleus et noirs en proportions $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{6}$. Si le jeton est rouge, on gagne avec probabilité $\frac{1}{5}$. S'il est bleu, on gagne avec probabilité $\frac{2}{5}$. S'il est noir, on gagne avec probabilité $\frac{3}{5}$.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité de gagner.

Exercice 14

On donne $P(A) = \frac{2}{5}$, $P_A(B) = \frac{3}{4}$ et $P_{\bar{A}}(B) = \frac{1}{3}$.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap B)$.

Exercice 15

Un élève revise ses cours avec probabilité $\frac{3}{5}$. S'il a revu, il réussit l'examen avec probabilité $\frac{9}{10}$. S'il n'a pas revu, il réussit avec probabilité $\frac{7}{10}$.

1. Construire l'arbre pondéré de la situation.
2. Calculer la probabilité de chaque chemin.
3. Vérifier que la somme des feuilles vaut 1.

Exercice 16

Un sac contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. On tire deux boules successivement sans remise.

1. Construire l'arbre pondere complet.
2. Calculer la probabillite d'obtenir deux boules de meme couleur.
3. Calculer la probabillite d'obtenir au moins une boule bleue.

Exercice 17

On lance deux fois une piece truquee : $P(\text{pile}) = \frac{2}{3}$ et $P(\text{face}) = \frac{1}{3}$.

1. Construire l'arbre pondere (les deux lancers sont independants).
2. Calculer la probabillite d'obtenir deux piles.
3. Calculer la probabillite d'obtenir exactement un pile.

Exercice 18

On dispose de trois urnes identiques. L'urne U_1 contient 2 boules rouges et 1 bleue. L'urne U_2 contient 1 rouge et 2 bleues. L'urne U_3 contient 3 rouges. On choisit une urne au hasard (equiprobabilite) puis on tire une boule.

1. Construire l'arbre pondere.
2. Calculer la probabillite de tirer une boule rouge.

Exercice 19

Un sac contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire trois boules successivement sans remise.

1. Construire l'arbre pondere pour les trois premiers niveaux (branche rouge uniquement au deuxieme et troisieme niveau).
2. Calculer la probabillite d'obtenir trois boules rouges.
3. Sans arbre complet, determiner la probabillite d'obtenir 0 boule rouge.

Exercice 20

On connait les probabillites des quatre feuilles d'un arbre a deux niveaux :

$$P(A \cap B) = \frac{3}{20}, \quad P(A \cap \bar{B}) = \frac{1}{20}, \quad P(\bar{A} \cap B) = \frac{1}{4}, \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{11}{20}.$$

1. Verifier que la somme de ces quatre probabillites vaut 1.
2. Reconstituer l'arbre pondere complet : determiner $P(A)$, $P_A(B)$, $P_{\bar{A}}(B)$.

Exercice 21

On donne $P(B) = \frac{2}{5}$, $P_B(A) = \frac{3}{4}$ et $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{3}$.

1. Construire l'arbre pondere.
2. Calculer $P(A)$ par la formule des probabillites totales.

Exercice 22

30 % des eleves d'un lycee sont inscrits en section musique (M). Parmi ceux de la section musique, 80 % assistent au concert (T). Parmi les autres, 20 % assistent au concert.

1. Calculer $P(T)$ par la formule des probabilités totales.
2. Interpréter le résultat.

Exercice 23

Une usine dispose de trois chaînes : C_1 (50%), C_2 (30%), C_3 (20%). Les taux de défaut sont respectivement 2%, 3% et 5%.

1. Vérifier que $\{C_1, C_2, C_3\}$ est une partition.
2. Calculer $P(D)$ où D est « pièce défectueuse ».

Exercice 24

Un élève revise un chapitre avec probabilité $\frac{1}{3}$. S'il a revu, il réussit le contrôle avec probabilité $\frac{9}{10}$. Sinon, il réussit avec probabilité $\frac{1}{2}$.

Calculer la probabilité de réussir le contrôle.

Exercice 25

On donne $P(A) = \frac{7}{10}$, $P_A(B) = \frac{4}{7}$ et $P_{\bar{A}}(B) = \frac{2}{3}$. Calculer $P(B)$.

Exercice 26

Un test de dépistage a une sensibilité de 98% et une spécificité de 96%. La prévalence de la maladie est de 0,5%.

On note M : « malade » et T : « test positif ».

1. Donner $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\bar{M}}(T)$.
2. Calculer $P(T)$.
3. Calculer la valeur prédictive positive $P_T(M)$.
4. Interpréter : le test est-il fiable pour un dépistage de masse ?

Exercice 27

Une boulangerie a deux fournisseurs de farine. Le fournisseur F_1 fournit 40% de la farine avec un taux de non-conformité de 5%. Le fournisseur F_2 fournit 60% avec un taux de non-conformité de 3%.

1. Calculer la probabilité qu'un sac de farine pris au hasard soit non conforme.
2. Un sac est non conforme. Calculer la probabilité qu'il vienne de F_1 .

Exercice 28

1. Rédiger la démonstration de la formule des probabilités totales dans le cas de la partition $\{B, \bar{B}\}$.
2. **Application.** On donne $P(B) = \frac{3}{8}$, $P_B(A) = \frac{2}{3}$ et $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{4}$. Calculer $P(A)$.

Exercice 29

On donne $P_B(A) = \frac{1}{2}$, $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{5}$ et $P(A) = \frac{3}{10}$.

Determiner $P(B)$.

Exercice 30

Un entrepot recoit des composants de quatre lots : L_1 (25 %), L_2 (35 %), L_3 (25 %), L_4 (15 %). Les taux de défaut sont respectivement 1 %, 2 %, 3 % et 5 %.

1. Calculer la probabilité qu'un composant soit defectueux.
2. Un composant est defectueux. De quel lot a-t-il le plus de chances de provenir ?

Exercice 31

On donne $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$.

Les evenements A et B sont-ils independants ? Justifier.

Exercice 32

On donne $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{1}{3}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$.

Les evenements A et B sont-ils independants ? Justifier.

Exercice 33

On donne $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{6}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{12}$.

1. Montrer que A et B sont independants.
2. En deduire que $\bar{A}$ et B sont aussi independants.

Exercice 34

On lance un de equilibre a six faces. On note A : « le resultat est pair » et B : « le resultat est superieur ou egal a 5 ».

1. Determiner $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.
2. Les evenements A et B sont-ils independants ?

Exercice 35

Deux evenements A et B sont incompatibles avec $P(A) = \frac{1}{4}$ et $P(B) = \frac{1}{3}$.

A et B peuvent-ils etre independants ? Justifier.

Exercice 36

On tire une carte dans un jeu de 52 cartes. A : « la carte est rouge », B : « la carte est un as ».

1. Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$.
2. Les evenements sont-ils independants ?
3. $\bar{A}$ et B sont-ils independants ? Justifier sans refaire tout le calcul.

Exercice 37

Dans un lycee de 300 eleves :

	Maths	Pas Maths	Total
Sportif	60	90	150
Non sportif	40	110	150
Total	100	200	300

S : « sportif », M : « fait Maths ». Les événements S et M sont-ils indépendants ?

Exercice 38 ♦♦

A et B sont deux événements indépendants avec $P(A) = \frac{1}{2}$ et $P(B) = \frac{3}{10}$.

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. Calculer $P(A \cup B)$.
3. Calculer $P_A(B)$. Commenter.

Exercice 39 ♦♦♦

A et B sont indépendants. On donne $P(A) = \frac{1}{3}$ et $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$.

1. Exprimer $P(A \cup B)$ en fonction de $P(A)$ et $P(B)$ en utilisant l'indépendance.
2. En déduire $P(B)$.
3. Vérifier en calculant directement $P(A \cap B)$ et $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Exercice 40 ♦♦♦

On répète 3 fois de manière indépendante une expérience de probabilité de succès $\frac{2}{3}$.

1. Calculer la probabilité d'obtenir 3 succès.
2. Calculer la probabilité d'obtenir au moins un succès.
3. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 succès.

Exercice 41 ♦

Un test de dépistage a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 97 %. La prévalence de la maladie est de 1 %.

1. Définir les événements M et T et donner les probabilités extraites de l'énoncé.
2. Construire l'arbre pondéré.
3. Calculer $P(T)$.
4. Calculer $P_T(M)$. Interpréter.

Exercice 42 ♦

Une usine produit des ampoules sur deux lignes : la ligne A (60 %, défaut 4 %) et la ligne B (40 %, défaut 7 %).

1. Calculer la probabilité qu'une ampoule soit défectueuse.
2. Une ampoule est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle vienne de la ligne B .

Exercice 43 ♦

Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules bleues. On tire deux boules avec remise.

1. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.
3. Les tirages sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 44

En génétique, un gène a deux allèles : A (dominant) et a (récessif). Les deux parents sont porteurs sains (Aa).

Pour chaque enfant, les allèles sont transmis indépendamment.

1. Construire l'arbre des possibilités pour un enfant.
2. Calculer $P(aa)$ (enfant malade), $P(Aa)$ (porteur sain), $P(AA)$ (sain non porteur).
3. Un enfant n'est pas malade. Calculer la probabilité qu'il soit porteur sain.

Exercice 45

La probabilité de pluie aujourd'hui est $\frac{2}{5}$. Si aujourd'hui il pleut, la probabilité de pluie demain est $\frac{7}{10}$. Si aujourd'hui il fait soleil, la probabilité de pluie demain est $\frac{3}{10}$.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité qu'il pleuve demain.

Exercice 46

Un lot de 100 pièces contient 5 pièces défectueuses. On prélève 2 pièces sans remise.

1. Calculer la probabilité que les deux pièces soient défectueuses.
2. Calculer la probabilité qu'au moins une pièce soit défectueuse.
3. Comparer avec le cas d'un tirage avec remise.

Exercice 47

Un test antidopage a une sensibilité de 99 % et une spécificité de 95 %. On estime que 5 % des sportifs sont dopés.

1. Construire l'arbre pondéré. Définir les événements.
2. Calculer la probabilité d'un test positif.
3. Calculer $P_T(D)$: probabilité d'être réellement dopé sachant que le test est positif.
4. Un sportif positif doit-il être automatiquement sanctionné ? Argumenter.

Exercice 48

Une compagnie d'assurance classe ses conducteurs en « prudents » (80 %) et « à risque » (20 %). La probabilité d'accident est de 5 % pour un prudent et de 25 % pour un conducteur à risque.

1. Calculer la probabilité qu'un conducteur ait un accident.
2. Un conducteur a eu un accident. Calculer la probabilité qu'il soit « à risque ».
3. Commenter le résultat.

Exercice 49 ◆◆◆

On effectue un double test de dépistage. Le premier test a une sensibilité de 90 % et une spécificité de 90 %. Si le premier test est positif, on effectue un second test (sensibilité 95 %, spécificité 95 %). La prévalence est de 2 %.

1. Calculer la probabilité d'un premier test positif.
2. Calculer $P_T(M)$ pour le premier test seul.
3. Calculer la probabilité que les deux tests soient positifs.
4. Calculer la probabilité d'être malade sachant que les deux tests sont positifs. Comparer avec la question 2.

Exercice 50 ◆◆◆

Un test a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 90 %. On note p la prévalence de la maladie.

1. Exprimer la valeur prédictive positive $P_T(M)$ en fonction de p .
2. Déterminer la valeur minimale de p pour que $P_T(M) \geq \frac{1}{2}$.
3. Interpréter : à partir de quelle prévalence un test positif est-il « plus probable que non » ?

Coup de pouce 1. Ecris la formule $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ puis remplace par les valeurs données.

Coup de pouce 2. Attention à l'ordre : c'est $P_B(A)$, donc on divise par $P(B)$, pas par $P(A)$.

Coup de pouce 3. Commence par calculer les probabilités à partir des effectifs : divise chaque effectif par le total.

Coup de pouce 4. Pour la question 1, utilise la formule de multiplication : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

Coup de pouce 11. Pour chaque branche conditionnelle, pense à retirer la boule déjà tirée de l'urne.

Coup de pouce 12. Multiplie les probabilités le long d'un chemin (règle du produit).

Coup de pouce 13. Construis d'abord les trois branches principales avec les proportions des jetons.

Coup de pouce 14. Place $P_A(B)$ sur la branche issue de A et non $P(A \cap B)$.

Coup de pouce 21. Identifie la partition $(B \text{ et } \bar{B})$ puis applique $P(A) = P(B) P_B(A) + P(\bar{B}) P_{\bar{B}}(A)$.

Coup de pouce 22. Traduis les pourcentages en fractions avant de calculer.

Coup de pouce 23. Vérifie que les trois chaînes forment bien une partition (somme des proportions = 1).

Coup de pouce 24. C'est le cas usuel avec la partition $\{R, \bar{R}\}$. Applique directement la formule.

Coup de pouce 31. Compare $P(A \cap B)$ avec le produit $P(A) \times P(B)$. Egalité = indépendance.

Coup de pouce 32. Calcule $P(A) \times P(B)$ et compare avec $P(A \cap B)$.

Coup de pouce 40. À chacun des quatre niveaux, tracer une branche S pondérée par $\frac{2}{3}$ et une branche E pondérée par $\frac{1}{3}$. La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches. Il y a six chemins contenant exactement deux lettres S . Pour l'événement contraire d'« au moins un succès », repérer le seul chemin EEEE.

Coup de pouce 41. Commence par identifier $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\bar{M}}(T)$ à partir de l'énoncé.

Coup de pouce 42. Pour la question 2, utilise $P_D(B) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)}$.

Coup de pouce 43. Avec remise, les tirages sont indépendants : les probabilités ne changent pas.

Coup de pouce 44. Chaque parent transmet un allèle : construis un arbre à deux branches (A ou a) pour chaque parent.

TD — Dépistage et valeur prédictive

Durée estimée : 50 minutes. Capacités : C1, C2, C3, C5.

Un laboratoire évalue un test de dépistage pour une maladie rare. Le test a une **sensibilité** de 90 % (il détecte 90 % des malades) et une **spécificité** de 95 % (il identifie correctement 95 % des personnes saines).

On note M l'événement « la personne est malade » et T l'événement « le test est positif ».

Partie A — Maladie rare (prévalence 2 %)

Dans la population générale, 2 % des personnes sont atteintes.

1. Traduire les données de l'énoncé en probabilités : $P(M)$, $P_M(T)$, $P_{\bar{M}}(T)$.
2. Construire un arbre pondéré complet à deux niveaux.
3. Calculer $P(T)$ à l'aide de la formule des probabilités totales.
4. Calculer la **valeur prédictive positive** $P_T(M)$. Interpréter le résultat.
5. Expliquer pourquoi, malgré la bonne qualité du test, un résultat positif n'est pas synonyme de maladie certaine.

Partie B — Maladie fréquente (prévalence 20 %)

On suppose maintenant que la prévalence est de 20 %.

6. Recalculer $P(T)$ et $P_T(M)$ avec cette nouvelle prévalence.
7. Comparer avec la partie A et commenter l'influence de la prévalence.

Partie C — Synthèse

8. Résumer dans un tableau les valeurs de $P_T(M)$ pour les prévalences 2 % et 20 %.
9. Un dépistage systématique de la population générale est-il pertinent pour une maladie rare ? Argumenter.

TD fil rouge — Contrôle qualité multi-fournisseurs

Durée estimée : 50 minutes. Capacités : C1 à C5.

Une entreprise d'électronique s'approvisionne auprès de trois fournisseurs F_1 , F_2 et F_3 .

- ▶ F_1 fournit 50 % des composants, avec un taux de défaut de 4 %.
- ▶ F_2 fournit 30 % des composants, avec un taux de défaut de 6 %.
- ▶ F_3 fournit 20 % des composants, avec un taux de défaut de 10 %.

On prélève un composant au hasard. On note D : « le composant est défectueux ».

Partie A — Modélisation (C1, C2)

1. Traduire les données en probabilités : $P(F_1)$, $P(F_2)$, $P(F_3)$, $P_{F_1}(D)$, $P_{F_2}(D)$, $P_{F_3}(D)$.
2. Construire l'arbre pondéré complet. Vérifier que la somme des branches à chaque nœud vaut 1.
3. Calculer $P(F_2 \cap D)$.

Partie B — Probabilités totales (C3)

4. Justifier que $\{F_1, F_2, F_3\}$ est une partition de l'univers.
5. Calculer $P(D)$ à l'aide de la formule des probabilités totales.
6. Interpréter : quel est le pourcentage global de composants défectueux ?

Partie C — Diagnostic (C1, C5)

7. Un composant est defectueux. Calculer $P_D(F_1)$ et $P_D(F_3)$. Comparer.
8. Le fournisseur F_3 est-il le plus « responsable » des defauts ? Argumenter.

Partie D — Independance (C4)

9. Les evenements F_1 et D sont-ils independants ? Justifier par le calcul.
10. Interpreter : le fait qu'un composant vienne de F_1 influence-t-il la probabilite qu'il soit defectueux ?

PROBABILITES CONDITIONNELLES ET INDEPENDANCE — QCM D'AUTO-EVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] On donne $P(A) = 1/2$ et $P(A \text{ inter } B) = 1/6$. Que vaut $P_A(B)$?
 A. $1/3$
 B. $1/2$
 C. $1/6$
 D. $2/3$
2. [Q2] $P_A(B) = 3/5$ signifie :
 A. $P(A \text{ sachant } B) = 3/5$
 B. $P(A \text{ inter } B) = 3/5$
 C. $P(B \text{ sachant } A) = 3/5$
 D. $P(A \text{ union } B) = 3/5$
3. [Q3] Si $P(A) = 2/5$ et $P_A(B) = 3/4$, que vaut $P(A \text{ inter } B)$?
 A. $3/20$
 B. $3/10$
 C. $23/20$
 D. $6/5$
4. [Q4] On donne $P_A(B) = 2/3$. Que vaut $P_A(\overline{B})$?
 A. $2/3$
 B. $1/3$
 C. On ne peut pas savoir.
 D. 0

Capacité C2

5. [Q5] Dans un arbre pondere, la probabilite d'un chemin s'obtient en :
 A. additionnant
 B. multipliant
 C. prenant le max
 D. divisant
6. [Q6] A chaque noeud d'un arbre pondere, la somme des probabilites des branches vaut :
 A. 0
 B. la probabilite du noeud parent
 C. 1
 D. le nombre de branches
7. [Q7] Les probabilites inscrites sur les branches issues d'un noeud A sont :
 A. $P(B)$, $P(\overline{B})$
 B. $P_A(B)$, $P_A(\overline{B})$
 C. $P(A \text{ inter } B)$, $P(A \text{ inter } \overline{B})$

D. des frequences

Capacité C3

8. [Q8] Si $P(B) = 1/3$, $P_B(A) = 1/2$ et $P_{\text{Bbar}}(A) = 1/4$, alors $P(A)$ vaut :
 - A. $1/4$
 - B. $1/6$
 - C. $5/12$
 - D. $1/3$
9. [Q9] Pour appliquer la formule des probabilités totales avec B_1, B_2, B_3 , il faut que :
 - A. Les B_i soient indépendants
 - B. Les B_i forment une partition
 - C. Les B_i soient équiprobables
 - D. $P(B_i) > 1/2$
10. [Q10] La formule des probabilités totales pour B, Bbar s'écrit :
 - A. $P(A) = P(B) + P(\text{Bbar})$
 - B. $P(A) = P(A \cap B) \times P(A \cap \text{Bbar})$
 - C. $P(A) = P(B) \cdot P_B(A) + P(\text{Bbar}) \cdot P_{\text{Bbar}}(A)$
 - D. $P(A) = P(B) \cdot P(A) + P(\text{Bbar}) \cdot P(A)$
11. [Q11] Quelle étape fait partie de la démonstration de la formule des probabilités totales ?
 - A. $A = A \cup B$
 - B. $A = (A \cap B) \cup (A \cap \text{Bbar})$ incompatibles
 - C. $P(A) = P(B) \times P(A)$
 - D. A et B sont indépendants

Capacité C4

12. [Q12] A et B sont indépendants ssi :
 - A. $P(A \cap B) = 0$
 - B. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
 - C. $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
 - D. $P(A \cup B) = P(A) \times P(B)$
13. [Q13] Si A et B sont incompatibles avec $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, alors :
 - A. ils sont indépendants
 - B. ils ne sont pas indépendants
 - C. on ne peut pas conclure
 - D. $P_A(B) = 1$
14. [Q14] Si A et B sont indépendants, alors $A \cap B$ et B sont :
 - A. incompatibles
 - B. indépendants
 - C. de même probabilité
 - D. sans lien

Capacité C5

15. [Q15] La sensibilité d'un test est :
 - A. $P(M | T+)$
 - B. $P(T+ | M)$
 - C. $P(T- | \text{Mbar})$
 - D. $P(M)$
16. [Q16] La valeur prédictive positive (VPP) est :
 - A. $P(T+ | M)$
 - B. $P(M | T+)$
 - C. $P(T+)$
 - D. $P(\text{Mbar} | T-)$
17. [Q17] Sensibilité 99%, spécificité 99%, prévalence 0,1%. La VPP vaut environ :

- A. 99%
 - B. 50%
 - C. 9%
 - D. 0,1%
18. [Q18] Un atelier connaît les parts de production de trois machines et, pour chacune, la probabilité de produire une pièce défectueuse. Pour déterminer la machine d'origine sachant qu'une pièce est défectueuse, on utilise :
- A. l'indépendance
 - B. formule de Bayes (prob totales + cond inversée)
 - C. uniquement des prob simples
 - D. théorème des valeurs intermédiaires

Clé de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	A
Q2	C1	C
Q3	C1	B
Q4	C1	B
Q5	C2	B
Q6	C2	C
Q7	C2	B
Q8	C3	D
Q9	C3	B
Q10	C3	C
Q11	C3	B
Q12	C4	C
Q13	C4	B
Q14	C4	B
Q15	C5	B
Q16	C5	B
Q17	C5	C
Q18	C5	B

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- **B** — L'élève a confondu $P_A(B)$ avec $P(A)$. $P_A(B) = P(A \text{ inter } B)/P(A) = (1/6)/(1/2) = 1/3$. Renvoi : C1, définition.
- **C** — L'élève a donné $P(A \text{ inter } B)$ au lieu de calculer le quotient. Renvoi : C1, formule.
- **D** — L'élève a calculé le complémentaire de $P_A(B) = 1/3$ et obtenu $1 - 1/3 = 2/3$; ce $2/3$ vaut $P_A(\bar{B})$, pas $P_A(B)$. Renvoi : C1, formule.

► Q2

- **A** — L'élève a inversé l'ordre de conditionnement : $P_A(B)$ est la probabilité de B sachant A, pas de A sachant B. Renvoi : C1, notation.
- **B** — $P_A(B)$ n'est pas $P(A \text{ inter } B)$, c'est le quotient $P(A \text{ inter } B)/P(A)$. Renvoi : C1, définition.
- **D** — Confusion entre probabilité conditionnelle et probabilité de l'union. Renvoi : C1, définition.

► Q3

- **A** — L'élève a multiplié $1/5$ par $3/4$ en oubliant le facteur 2 au numérateur de $P(A) = 2/5$, ce qui donne exactement $3/20$ au lieu de $3/10$. Renvoi : C1, formule de multiplication.
- **C** — L'élève a additionné $P(A) + P_A(B)$ au lieu de les multiplier. Renvoi : C1, formule de multiplication.
- **D** — L'élève a multiplié les numérateurs 2×3 mais a oublié le dénominateur 4 de $P_A(B) = 3/4$, obtenant $6/5$ au lieu de $(2 \times 3)/(5 \times 4) = 3/10$. Renvoi : C1, formule de multiplication.

► Q4

- **A** — L'élève a recopié $P_A(B)$ au lieu de calculer le complémentaire. Renvoi : C1, complémentaire conditionnel.
- **C** — La relation $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$ est toujours vraie, donc on peut conclure. Renvoi : C1, propriété.
- **D** — Confusion avec l'incompatibilité. Renvoi : C1, complémentaire.

► Q5

- **A** — On additionne les probabilités des chemins pour obtenir la probabilité d'un événement, mais le long d'un chemin on multiplie. Renvoi : C2, règle du produit.
- **C** — Erreur de méthode : on multiplie les probabilités le long d'un chemin. Renvoi : C2, règle du produit.
- **D** — La division intervient dans le calcul de $P_A(B)$, pas dans le produit le long d'un chemin. Renvoi : C2, règle du produit.

► Q6

- A — Les probabilités sont positives, leur somme ne peut pas être nulle. *Renvoi : C2, règle de construction.*
- B — La somme des probabilités conditionnelles issues d'un nœud vaut 1, pas la probabilité du nœud. *Renvoi : C2, règle de construction.*
- D — Confusion entre le nombre de branches et la somme des probabilités. *Renvoi : C2, règle de construction.*

► Q7

- A — Ce sont des probabilités conditionnelles, pas des probabilités marginales. *Renvoi : C2, construction.*
- C — Les probabilités d'intersection sont celles des feuilles (chemins complets), pas des branches. *Renvoi : C2, construction.*
- D — Un arbre pondéré utilise des probabilités, pas des fréquences observées. *Renvoi : C2, définition.*

► Q8

- A — L'élève a recopié $P_{\bar{B}}(A) = 1/4$ sans pondérer les deux branches de la partition. *Renvoi : C3, formule.*
- B — L'élève a calculé seulement $P(B)P_B(A) = 1/6$ et oublie le second chemin $P(\bar{B})P_{\bar{B}}(A) = 1/6$. *Renvoi : C3, formule.*
- C — L'élève additionne $1/6$ et la probabilité conditionnelle $1/4$ sans la pondérer par $P(\bar{B}) = 2/3$; le second terme vaut $1/6$. *Renvoi : C3, formule.*

► Q9

- A — L'indépendance n'est pas requise; c'est la structure de partition qui est nécessaire. *Renvoi : C3, hypothèse.*
- C — L'équiprobabilité n'est pas nécessaire. *Renvoi : C3, hypothèse.*
- D — Si les trois événements vérifiaient chacun $P(B_i) > 1/2$, la somme de leurs probabilités serait strictement supérieure à 1 : ils ne pourraient donc pas former une partition. *Renvoi : C3, hypothèse.*

► Q10

- A — $P(B) + P(\bar{B}) = 1$, pas $P(A)$. Il manque les probabilités conditionnelles. *Renvoi : C3, formule.*
- B — On additionne les termes, on ne les multiplie pas. *Renvoi : C3, formule.*
- D — La formule D se simplifie en $P(A) = P(A)$, ce qui est trivial et inutile. *Renvoi : C3, formule.*

► Q11

- A — $A = A \cup B$ est faux en général (sauf si A inclus dans B). *Renvoi : C3, démonstration.*
- C — Cela donnerait $P(B) = 1$, ce qui est faux en général. *Renvoi : C3, démonstration.*
- D — L'indépendance n'est pas une hypothèse de la démonstration. *Renvoi : C3, démonstration.*

► Q12

- A — $P(A \cap B) = 0$ signifie incompatibilité, pas indépendance. *Renvoi : C4, définition.*
- B — L'élève a additionné les probabilités au lieu de les multiplier. Cette égalité viole aussi la borne $P(A \cap B) \leq \min(P(A), P(B))$, sauf dans le cas trivial où les deux probabilités sont nulles. *Renvoi : C4, définition.*
- D — La formule de l'union est $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, pas un produit. *Renvoi : C4, définition.*

► Q13

- A — Incompatibles $\Rightarrow P(A \cap B) = 0$, mais $P(A) \cdot P(B) > 0$, donc pas indépendants. *Renvoi : C4, contre-exemple.*
- C — On peut conclure : $P(A \cap B) = 0 \neq P(A) \cdot P(B) > 0$. *Renvoi : C4, contre-exemple.*
- D — $P_{A|B}(B) = P(A \cap B) / P(A) = 0 / P(A) = 0$, pas 1. *Renvoi : C4, incompatibilité.*

► Q14

- A — L'indépendance de A et B n'implique pas l'incompatibilité de $\bar{A}$ et B. *Renvoi : C4, propriété.*

- C — Rien ne dit que $P(\text{Abar}) = P(B)$. Renvoi : C4, propriété.
- D — Il y a un lien précis : ils sont indépendants (propriété démontrable). Renvoi : C4, propriété.

► Q15

- A — $P(M | T^+)$ est la valeur prédictive positive, pas la sensibilité. Renvoi : C5, définitions.
- C — $P(T^- | \text{Mbar})$ est la spécificité, pas la sensibilité. Renvoi : C5, définitions.
- D — $P(M)$ est la prévalence, pas la sensibilité. Renvoi : C5, définitions.

► Q16

- A — $P(T^+ | M)$ est la sensibilité, pas la VPP. Renvoi : C5, définitions.
- C — $P(T^+)$ est la probabilité globale d'un test positif. Renvoi : C5, définitions.
- D — $P(\text{Mbar} | T^-)$ est la valeur prédictive négative. Renvoi : C5, définitions.

► Q17

- A — L'élève confond sensibilité et VPP. Ici $P(M \cap T^+) = 0,00099$ et $P(T^+) = 0,01098$, donc la VPP vaut environ 9%, pas 99%. Renvoi : C5, VPP et prévalence.
- B — Avec une prévalence de 0,1%, les faux positifs représentent $0,01 \times 0,999 = 0,00999$ de la population ; la VPP vaut environ $0,00099 / 0,01098 = 9\%$, pas 50%. Renvoi : C5, VPP et prévalence.
- D — L'élève recopie la prévalence. La VPP est la probabilité conditionnelle $P(M | T^+)$ et vaut ici environ 9%, pas 0,1%. Renvoi : C5, formule de Bayes.

► Q18

- A — Les taux de défaut dépendent de la machine : l'origine et le défaut ne sont donc pas supposés indépendants. Il faut calculer la probabilité totale du défaut puis appliquer Bayes. Renvoi : C5, méthode.
- C — Les probabilités simples $P(M_i)$ et conditionnelles $P(D | M_i)$ doivent être combinées pour calculer la probabilité inverse $P(M_i | D)$; elles ne suffisent pas prises séparément. Renvoi : C5, méthode.
- D — Le TVI est un théorème d'analyse, sans rapport avec les probabilités. Renvoi : C5, hors sujet.

Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-A-corrige 55 min

Exercice 1 — Corrige

1. Arbre : $P(R) = \frac{3}{5}$, $P(V) = \frac{2}{5}$. Sachant R : $P_R(G) = \frac{1}{2}$, $P_R(\bar{G}) = \frac{1}{2}$. Sachant V : $P_V(G) = \frac{1}{4}$, $P_V(\bar{G}) = \frac{3}{4}$.

$$2. P(R \cap G) = P(R) \times P_R(G) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}.$$

$$3. P(G) = P(R \cap G) + P(V \cap G) = \frac{3}{10} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}.$$

$$4. P_G(R) = \frac{P(R \cap G)}{P(G)} = \frac{3/10}{2/5} = \frac{3}{10} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{4}.$$

Exercice 2 — Corrige

$$1. P(M) = \frac{3}{100}, P_M(T) = \frac{9}{10}, P_{\bar{M}}(T) = 1 - \frac{96}{100} = \frac{1}{25}.$$

$$2. P(T) = P(M) P_M(T) + P(\bar{M}) P_{\bar{M}}(T) = \frac{3}{100} \times \frac{9}{10} + \frac{97}{100} \times \frac{1}{25} \\ = \frac{27}{1000} + \frac{97}{2500} = \frac{270}{10000} + \frac{388}{10000} = \frac{658}{10000} = \frac{329}{5000}.$$

$$3. P_{T(M)} = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{27/1000}{329/5000} = \frac{27}{1000} \times \frac{5000}{329} = \frac{135}{329} \approx 41,0\%.$$

4. La VPP est d'environ 41 % : un test positif ne signifie la maladie que dans moins d'un cas sur deux. Le test est utile pour orienter le diagnostic mais nécessite une confirmation. La prévalence de 3 % est encore trop faible pour que le test soit déterminant à lui seul.

Exercice 3 — Corrige

$$1. P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10} = P(A \cap B). \text{ Donc } A \text{ et } B \text{ sont independants.}$$

$$2. P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{5 + 2 - 1}{10} = \frac{3}{5}.$$

$$3. P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{1}{10}.$$

$$P(\bar{A}) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10} = P(\bar{A} \cap B). \text{ Donc } \bar{A} \text{ et } B \text{ sont independants.}$$

Exercice 4 — Corrige

$$1. \text{ Arbre : } P(J) = \frac{1}{5}, P(S) = \frac{4}{5}. \text{ Sachant } J : P_J(A) = \frac{1}{10}. \text{ Sachant } S : P_S(A) = \frac{1}{40}.$$

$$2. P(A) = P(J) P_J(A) + P(S) P_S(A) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{10} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{40} = \frac{1}{50} + \frac{1}{50} = \frac{2}{50} = \frac{1}{25}.$$

$$3. P_A(J) = \frac{P(J \cap A)}{P(A)} = \frac{1/50}{1/25} = \frac{1}{50} \times 25 = \frac{1}{2}.$$

Un conducteur accidenté a une chance sur deux d'être jeune, alors que les jeunes ne représentent que 20 % des assurés.

Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-A 55 min

Exercice 1

(5 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, représenter.

Un sac contient 3 jetons rouges et 2 jetons verts. On tire un jeton au hasard. Si le jeton est rouge, on gagne avec probabilité $\frac{1}{2}$. Si le jeton est vert, on gagne avec probabilité $\frac{1}{4}$.

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience. (1,5 pt — représenter)
2. Calculer $P(R \cap G)$ où G désigne « gagner ». (1 pt — calculer)
3. Calculer la probabilité de gagner. (1,5 pt — calculer)
4. Sachant qu'on a gagné, quelle est la probabilité d'avoir tiré un jeton rouge? (1 pt — raisonner)

Exercice 2

(6 points)

Capacités C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un test de dépistage a une sensibilité de 90 % et une spécificité de 96 %. La prévalence de la maladie est de 3 %. On note M : « malade » et T : « test positif ».

1. Donner les valeurs de $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\overline{M}}(T)$. (1,5 pt — modéliser)
2. Calculer $P(T)$ par la formule des probabilités totales. (2 pts — calculer)
3. Calculer la valeur prédictive positive $P_T(M)$. (1,5 pt — calculer)
4. Le test est-il fiable pour un diagnostic individuel ? Argumenter. (1 pt — communiquer)

Exercice 3**(4 points)****Capacité C4**

Compétences évaluées : raisonner, calculer.

On donne $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{5}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$.

1. Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier. (2 pts — raisonner)
2. Calculer $P(A \cup B)$. (1 pt — calculer)
3. Montrer que $\overline{A}$ et B sont aussi indépendants. (1 pt — raisonner)

Exercice 4**(5 points)****Capacités C3, C5**

Compétences évaluées : modéliser, calculer, raisonner.

Une compagnie d'assurance distingue les conducteurs « jeunes » (20 %) et « seniors » (80 %). La probabilité d'accident est $\frac{1}{10}$ pour un jeune et $\frac{1}{40}$ pour un senior.

1. Construire un arbre pondéré. (1 pt — représenter)
2. Calculer la probabilité qu'un conducteur ait un accident. (2 pts — calculer)
3. Un conducteur a eu un accident. Calculer la probabilité qu'il soit jeune. (2 pts — raisonner)

Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-B-corrige 55 min**Exercice 1 — Corrigé**

1. Arbre : $P(B) = \frac{2}{5}$, $P(N) = \frac{3}{5}$. Sachant B : $P_B(G) = \frac{3}{4}$, $P_B(\overline{G}) = \frac{1}{4}$. Sachant N : $P_N(G) = \frac{1}{3}$, $P_N(\overline{G}) = \frac{2}{3}$.

$$2. P(B \cap G) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}.$$

$$3. P(G) = P(B \cap G) + P(N \cap G) = \frac{3}{10} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{10} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{1}{2}.$$

$$4. P_G(B) = \frac{P(B \cap G)}{P(G)} = \frac{3/10}{1/2} = \frac{3}{5}.$$

Exercice 2 — Corrigé

$$1. P(M) = \frac{1}{50}, P_M(T) = \frac{19}{20}, P_{\overline{M}}(T) = 1 - \frac{95}{100} = \frac{1}{20}.$$

$$2. P(T) = \frac{1}{50} \times \frac{19}{20} + \frac{49}{50} \times \frac{1}{20} = \frac{19}{1000} + \frac{49}{1000} = \frac{68}{1000} = \frac{17}{250}.$$

$$3. P_T(M) = \frac{19/1000}{17/250} = \frac{19}{1000} \times \frac{250}{17} = \frac{19}{68} \approx 27,9\%.$$

4. La VPP est faible (environ 28 %) : un test positif ne correspond à la maladie que dans 1 cas sur 3,6 environ. Cela s'explique par la faible prévalence (2 %) qui génère beaucoup de faux positifs.

Exercice 3 — Corrige

- $P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{8} = P(A \cap B)$. Donc A et B sont indépendants.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{3}{8} - \frac{1}{8} = \frac{8+9-3}{24} = \frac{14}{24} = \frac{7}{12}$.
- $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/8}{1/3} = \frac{3}{8} = P(B)$. L'égalité $P_A(B) = P(B)$ confirme l'indépendance.

Exercice 4 — Corrige

- Arbre : $P(F_1) = \frac{7}{10}$, $P(F_2) = \frac{3}{10}$. Sachant F_1 : $P_{F_1}(D) = \frac{1}{50}$. Sachant F_2 : $P_{F_2}(D) = \frac{3}{50}$.
- $P(D) = \frac{7}{10} \times \frac{1}{50} + \frac{3}{10} \times \frac{3}{50} = \frac{7}{500} + \frac{9}{500} = \frac{16}{500} = \frac{4}{125} = 3,2\%$.
- $P_D(F_2) = \frac{P(F_2 \cap D)}{P(D)} = \frac{9/500}{4/125} = \frac{9}{500} \times \frac{125}{4} = \frac{9}{16} = 56,25\%$.

Plus de la moitié des pièces défectueuses viennent de F_2 , alors que F_2 ne fournit que 30 % des pièces.

Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-B 55 min

Exercice 1

(5 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, représenter.

Un sac contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire une boule au hasard. Si elle est blanche, on gagne avec probabilité $\frac{3}{4}$. Si elle est noire, on gagne avec probabilité $\frac{1}{3}$.

- Construire l'arbre pondéré de cette expérience. (1,5 pt — représenter)
- Calculer $P(B \cap G)$ où G désigne « gagner ». (1 pt — calculer)
- Calculer la probabilité de gagner. (1,5 pt — calculer)
- Sachant qu'on a gagné, quelle est la probabilité d'avoir tiré une boule blanche ? (1 pt — raisonner)

Exercice 2

(6 points)

Capacités C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un test de dépistage a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 95 %. La prévalence est de 2 %. On note M : « malade » et T : « test positif ».

- Donner les valeurs de $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\overline{M}}(T)$. (1,5 pt — modéliser)
- Calculer $P(T)$ par la formule des probabilités totales. (2 pts — calculer)
- Calculer la valeur prédictive positive $P_T(M)$. (1,5 pt — calculer)
- Commenter le résultat. (1 pt — communiquer)

Exercice 3

(4 points)

Capacite C4

Compétences évaluées : raisonner, calculer.

On donne $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{8}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$.

1. Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier. (2 pts — raisonner)
2. Calculer $P(A \cup B)$. (1 pt — calculer)
3. Calculer $P_A(B)$. Comparer avec $P(B)$ et commenter. (1 pt — raisonner)

Exercice 4

(5 points)

Capacités C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, raisonner.

Une usine a deux fournisseurs. Le fournisseur F_1 fournit 70 % des pièces avec un taux de défaut de 2 %. Le fournisseur F_2 fournit 30 % avec un taux de défaut de 6 %.

1. Construire un arbre pondéré. (1 pt — représenter)
2. Calculer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse. (2 pts — calculer)
3. Une pièce est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle vienne de F_2 . (2 pts — raisonner)

Rappel — Probabilités de base

Vocabulaire : un univers Ω est l'ensemble de toutes les issues possibles. Un événement est une partie de Ω .

Formules fondamentales :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Exercice 51

On donne $P(A) = \frac{3}{8}$ et $P(B) = \frac{1}{4}$ avec $A \cap B = \emptyset$.

1. Calculer $P(\bar{A})$.
2. Calculer $P(A \cup B)$.

Corrigé

1. $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.
2. Comme $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$.

Rappel — Fractions et pourcentages

Conversion : $\frac{a}{b} = \frac{a \times 100}{b} \%$ et $p\% = \frac{p}{100}$.

Exercice 52

1. Convertir $\frac{7}{20}$ en pourcentage.
2. Écrire 12,5 % sous forme de fraction irréductible.

3. Calculer $\frac{3}{8} + \frac{5}{12}$.

Corrigé

1. $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 35\%$.
2. $12,5\% = \frac{12,5}{100} = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$.
3. $\frac{3}{8} + \frac{5}{12} = \frac{9}{24} + \frac{10}{24} = \frac{19}{24}$.

Rappel — Arbres de denombrement

Un **arbre de denombrement** représente les issues possibles d'une expérience à plusieurs étapes. Le nombre total d'issues est le produit du nombre de choix à chaque étape.

Exercice 53

Un menu propose 3 entrées, 4 plats et 2 desserts.

1. Combien de menus différents peut-on composer ?
2. Si l'on ne prend ni entrée ni dessert, combien de choix reste-t-il ?

Corrigé

1. $3 \times 4 \times 2 = 24$ menus différents.
2. Il reste 4 choix (le plat uniquement).

Rappel — Calcul littéral

Exercice 54

1. Résoudre $5x - 3 = 2x + 9$.
2. Résoudre $\frac{x}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$.

Corrigé

1. $5x - 3 = 2x + 9 \Leftrightarrow 3x = 12 \Leftrightarrow x = 4$.
2. $\frac{x}{3} = \frac{7}{12} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12} - \frac{3}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$, donc $x = 1$.

Rappel — Tableaux de données

Un **tableau à double entrée** croise deux critères. La **fréquence** d'une catégorie est le rapport de son effectif au total.

Exercice 55

	Bus	Velo	Total
Garçons	30	20	50
Filles	40	10	50
Total	70	30	100

1. Quelle est la fréquence des cyclistes ?

2. Quelle est la fréquence des filles parmi les cyclistes ?

Corrigé

1. Fréquence des cyclistes : $\frac{30}{100} = \frac{3}{10} = 30\%$.
2. Parmi les cyclistes : $\frac{10}{30} = \frac{1}{3} \approx 33,3\%$.

Exercice 56 ◆

On donne $P(A) = \frac{2}{5}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$.

1. Ecrire la formule de $P_A(B)$.
2. Calculer $P_A(B)$.
3. Calculer $P_A(\bar{B})$.

Corrigé

Question 1. $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

Question 2. $P_A(B) = \frac{1/5}{2/5} = \frac{1}{5} \times \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$.

Question 3. $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Exercice 57 ◆

Un sac contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule, puis sans remise une deuxième.

1. Donner $P(R_1)$ et $P(B_1)$.
2. Sachant R_1 , donner $P_{R_1}(R_2)$ et $P_{R_1}(B_2)$. Vérifier qu'elles somment à 1.
3. Calculer $P(R_1 \cap R_2)$.

Corrigé

1. $P(R_1) = \frac{2}{5}$, $P(B_1) = \frac{3}{5}$.

2. Sachant R_1 , il reste 1 rouge et 3 bleues dans 4 boules : $P_{R_1}(R_2) = \frac{1}{4}$, $P_{R_1}(B_2) = \frac{3}{4}$. Somme : $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ ✓.

3. $P(R_1 \cap R_2) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$.

Exercice 58 ◆

$P(B) = \frac{1}{4}$, $P_B(A) = \frac{2}{3}$, $P_{\bar{B}}(A) = \frac{1}{3}$.

1. Calculer $P(\bar{B})$.
2. Calculer $P(B) \times P_B(A)$.
3. Calculer $P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A)$.
4. En déduire $P(A)$.

Corrigé

1. $P(\bar{B}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

$$2. \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}.$$

$$3. \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$

$$4. P(A) = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}.$$

Exercice 59 ◆

On donne $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$.

1. Calculer $P(A) \times P(B)$.
2. Comparer avec $P(A \cap B)$.
3. Conclure : A et B sont-ils indépendants ?

Corrigé

$$1. P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$2. P(A) \times P(B) = \frac{1}{4} = P(A \cap B).$$

3. Comme $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, les événements A et B sont indépendants.

Exercice 60 ◆

Dans un village, 40 % des habitants possèdent un chien (C). Parmi les propriétaires de chien, 30 % ont aussi un chat (H). Parmi ceux sans chien, 50 % ont un chat.

1. Identifier les événements et écrire les probabilités.
2. Calculer $P(H)$ par la formule des probabilités totales.
3. Calculer $P_H(C)$: sachant qu'une personne a un chat, quelle est la probabilité qu'elle ait aussi un chien ?

Corrigé

$$1. P(C) = \frac{2}{5}, P_C(H) = \frac{3}{10}, P_{\bar{C}}(H) = \frac{1}{2}.$$

$$2. P(H) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{10} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{6}{50} + \frac{15}{50} = \frac{21}{50} = 42\%.$$

$$3. P_H(C) = \frac{P(C \cap H)}{P(H)} = \frac{6/50}{21/50} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7} \approx 28,6\%.$$

Corrigé

$$1. \text{On applique la formule : } P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{3}{10}} = \frac{1}{3}.$$

$$2. P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Corrigé

$$1. P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{5}{2}} = \frac{3}{20} \times \frac{2}{5} = \frac{3}{50}.$$

$$2. P_B(\bar{A}) = 1 - P_B(A) = 1 - \frac{3}{50} = \frac{47}{50}.$$

Corrigé

$$1. P(F) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5} \text{ et } P(F \cap S) = \frac{45}{200} = \frac{9}{40}.$$

$$2. P_F(S) = \frac{P(F \cap S)}{P(F)} = \frac{\frac{9}{40}}{\frac{3}{5}} = \frac{9}{40} \times \frac{5}{3} = \frac{3}{8}.$$

Parmi les filles, $\frac{3}{8} = 37,5\%$ pratiquent un sport.

Corrigé

$$1. P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{20}.$$

$$2. P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{20} \times 2 = \frac{3}{10}.$$

Corrigé

$$P_{A(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{7}{20}}{\frac{7}{10}} = \frac{7}{20} \times \frac{10}{7} = \frac{1}{2}.$$

Corrigé

$$1. P_H(S) = \frac{P(H \cap S)}{P(H)} = \frac{36/100}{60/100} = \frac{36}{60} = \frac{3}{5} = 60\%.$$

$$P_F(S) = \frac{P(F \cap S)}{P(F)} = \frac{20/100}{40/100} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2} = 50\%.$$

2. Les hommes sont proportionnellement plus sportifs (60 %) que les femmes (50 %).

Corrigé

$$1. P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{2}{5} + \frac{3}{10} - \frac{1}{2} = \frac{4}{10} + \frac{3}{10} - \frac{5}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$

$$2. P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{2}.$$

$$3. P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{10}} = \frac{1}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{2}{3}.$$

Corrigé

$$1. P(C) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}, P(F) = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}, P(C \cap F) = \frac{3}{32} \text{ (roi, dame, valet de coeur).}$$

$$2. P_C(F) = \frac{P(C \cap F)}{P(C)} = \frac{\frac{3}{32}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{32} \times 4 = \frac{3}{8}.$$

Parmi les coeurs, $\frac{3}{8}$ sont des figures.

$$3. P_F(C) = \frac{P(C \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{3}{32}}{\frac{3}{8}} = \frac{3}{32} \times \frac{8}{3} = \frac{1}{4}.$$

Corrigé

$$1. P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = p \times \frac{1}{3} = \frac{p}{3}.$$

$$2. P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{p}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2p}{3}.$$

$$\text{On a } P_B(A) = \frac{1}{4}, \text{ donc } \frac{2p}{3} = \frac{1}{4}, \text{ soit } p = \frac{3}{8}.$$

$$3. \text{Verification : } P(A \cap B) = \frac{3/8}{3} = \frac{1}{8}. P_A(B) = \frac{1/8}{3/8} = \frac{1}{3} \checkmark. P_B(A) = \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4} \checkmark.$$

Corrigé

$$1. P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{3}{5} + \frac{1}{2} - \frac{4}{5} = \frac{6}{10} + \frac{5}{10} - \frac{8}{10} = \frac{3}{10}.$$

$$2. P_A(B) = \frac{3/10}{3/5} = \frac{1}{2} \text{ et } P_B(A) = \frac{3/10}{1/2} = \frac{3}{5}.$$

$$3. P(\bar{A}) = \frac{2}{5}. P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} - \frac{3}{10} = \frac{1}{5}.$$

$$P_{\bar{A}}(B) = \frac{1/5}{2/5} = \frac{1}{2}.$$

$$4. P_A(B) = P_{\bar{A}}(B) = \frac{1}{2}. \text{ La réalisation de } A \text{ ne modifie pas la probabilité de } B.$$

Corrigé

$$1. \text{Arbre : } P(R_1) = \frac{3}{5}, P(V_1) = \frac{2}{5}. \text{ Sachant } R_1 : P(R_2) = \frac{1}{2}, P(V_2) = \frac{1}{2}. \text{ Sachant } V_1 : P(R_2) = \frac{3}{4}, P(V_2) = \frac{1}{4}.$$

$$2. P(R_1 \cap R_2) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}.$$

$$3. P(\text{au moins 1 rouge}) = 1 - P(V_1 \cap V_2) = 1 - \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}.$$

Corrigé

$$1. \text{Branches : pile } (\frac{1}{3}) \text{ puis lot } (\frac{3}{4}) \text{ ou pas } (\frac{1}{4}); \text{ face } (\frac{2}{3}) \text{ puis lot } (\frac{1}{4}) \text{ ou pas } (\frac{3}{4}).$$

$$2. P(\text{pile} \cap \text{lot}) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}. P(\text{face} \cap \text{lot}) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}.$$

$$3. \frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = 1 \checkmark.$$

Corrigé

$$1. \text{Arbre a trois branches principales (R, B, N) puis chacune se divise en gagner/perdre.}$$

$$2. P(G) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{10} + \frac{2}{15} + \frac{1}{10} = \frac{3}{30} + \frac{4}{30} + \frac{3}{30} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}.$$

Corrigé

$$1. \text{Branches : } A (\frac{2}{5}) \text{ puis } B (\frac{3}{4}) \text{ ou } \bar{B} (\frac{1}{4}); \bar{A} (\frac{3}{5}) \text{ puis } B (\frac{1}{3}) \text{ ou } \bar{B} (\frac{2}{3}).$$

$$2. P(A \cap B) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}. P(\bar{A} \cap B) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}.$$

Corrigé

$$1-2. P(S \cap R) = \frac{3}{5} \times \frac{9}{10} = \frac{27}{50}. P(S \cap \bar{R}) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{10} = \frac{3}{50}. P(\bar{S} \cap R) = \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{14}{50}. P(\bar{S} \cap \bar{R}) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{10} = \frac{6}{50}.$$

$$3. \frac{27}{50} + \frac{3}{50} + \frac{14}{50} + \frac{6}{50} = \frac{50}{50} = 1 \checkmark.$$

Corrigé

1. Arbre construit avec $P(R_1) = \frac{4}{7}$, $P(B_1) = \frac{3}{7}$ et les conditionnelles sans remise.

$$2. P(\text{meme}) = \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} + \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} = \frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3}{7}.$$

$$3. P(\text{au moins 1 bleue}) = 1 - P(R_1 \cap R_2) = 1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}.$$

Corrigé

1. Arbre : deux niveaux, chaque niveau P ($\frac{2}{3}$) ou F ($\frac{1}{3}$).

$$2. P(PP) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}.$$

$$3. P(1 \text{ pile}) = P(PF) + P(FP) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}.$$

Corrigé

1. Trois branches équiprobables ($\frac{1}{3}$), puis R ou B pour chaque urne.

$$2. P(R) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times 1 = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{3}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

Corrigé

$$2. P(3R) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{60}{336} = \frac{5}{28}.$$

$$3. P(0R) = P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{6}{336} = \frac{1}{56}.$$

Corrigé

$$1. \frac{3}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{4} + \frac{11}{20} = \frac{3}{20} + \frac{1}{20} + \frac{5}{20} + \frac{11}{20} = \frac{20}{20} = 1 \checkmark.$$

$$2. P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) = \frac{3}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{5}.$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{3/20}{1/5} = \frac{3}{4}.$$

$$P(\bar{A}) = \frac{4}{5}. P_{\bar{A}}(B) = \frac{1/4}{4/5} = \frac{5}{16}.$$

Corrigé

$$2. P(A) = P(B) P_B(A) + P(\bar{B}) P_{\bar{B}}(A) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{10} + \frac{1}{5} = \frac{1}{2}.$$

Corrigé

$$1. P(T) = P(M) P_M(T) + P(\bar{M}) P_{\bar{M}}(T) = \frac{3}{10} \times \frac{4}{5} + \frac{7}{10} \times \frac{1}{5} = \frac{12}{50} + \frac{7}{50} = \frac{19}{50}.$$

2. 38 % des élèves assistent au concert.

Corrigé

1. $C_1 \cup C_2 \cup C_3 = \Omega$ et les chaînes sont disjointes : c'est une partition.

$$2. P(D) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{50} + \frac{3}{10} \times \frac{3}{100} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{20} = \frac{1}{100} + \frac{9}{1000} + \frac{1}{100} = \frac{29}{1000} = 2,9\%.$$

Corrigé

$$P(S) = P(R) P_R(S) + P(\bar{R}) P_{\bar{R}}(S) = \frac{1}{3} \times \frac{9}{10} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10} + \frac{1}{3} = \frac{9}{30} + \frac{10}{30} = \frac{19}{30}.$$

Corrigé

$$P(B) = P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B) = \frac{7}{10} \times \frac{4}{7} + \frac{3}{10} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}.$$

Corrigé

$$1. P(M) = \frac{5}{1000}, P_M(T) = \frac{98}{100}, P_{\bar{M}}(T) = 1 - \frac{96}{100} = \frac{4}{100}.$$

$$2. P(T) = \frac{5}{1000} \times \frac{98}{100} + \frac{995}{1000} \times \frac{4}{100} = \frac{490}{100000} + \frac{3980}{100000} = \frac{4470}{100000} = \frac{447}{10000}.$$

$$3. P_T(M) = \frac{490/100000}{447/10000} = \frac{49}{447} \approx 11\%.$$

4. Malgré la bonne sensibilité, un test positif ne signifie la maladie que dans 11 % des cas, à cause de la faible prévalence.

Corrigé

$$1. P(C) = \frac{4}{10} \times \frac{1}{20} + \frac{6}{10} \times \frac{3}{100} = \frac{1}{50} + \frac{9}{500} = \frac{19}{500} = 3,8\%.$$

$$2. P_C(F_1) = \frac{P(F_1 \cap C)}{P(C)} = \frac{1/50}{19/500} = \frac{10}{19} \approx 52,6\%.$$

Corrigé

1. *Démonstration.* $\{B, \bar{B}\}$ est une partition, donc $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$ avec événements incompatibles. Par additivité : $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) = P(B) P_B(A) + P(\bar{B}) P_{\bar{B}}(A)$. □

$$2. P(A) = \frac{3}{8} \times \frac{2}{3} + \frac{5}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{5}{32} = \frac{8}{32} + \frac{5}{32} = \frac{13}{32}.$$

Corrigé

Par probabilités totales : $P(A) = P(B) P_B(A) + P(\bar{B}) P_{\bar{B}}(A)$.

$$\frac{3}{10} = p \times \frac{1}{2} + (1-p) \times \frac{1}{5} = \frac{p}{2} + \frac{1}{5} - \frac{p}{5} = \frac{3p}{10} + \frac{1}{5}.$$

$$\frac{3}{10} - \frac{1}{5} = \frac{3p}{10}, \text{ donc } \frac{1}{10} = \frac{3p}{10}, \text{ d'où } p = \frac{1}{3}.$$

Corrigé

$$1. P(D) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{100} + \frac{7}{20} \times \frac{2}{100} + \frac{1}{4} \times \frac{3}{100} + \frac{3}{20} \times \frac{5}{100} = \frac{5+14+15+15}{2000} = \frac{49}{2000}.$$

$$2. P_D(L_2) = \frac{14/2000}{49/2000} = \frac{14}{49} = \frac{2}{7}, P_D(L_3) = \frac{15}{49}, P_D(L_4) = \frac{15}{49}. \text{ Les lots } L_3 \text{ et } L_4 \text{ sont les plus probables.}$$

Corrigé

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} = P(A \cap B).$$

Donc A et B sont indépendants.

Corrigé

$$P(A) \times P(B) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15}. \text{ Or } P(A \cap B) = \frac{1}{5} = \frac{3}{15}.$$

$\frac{2}{15} \neq \frac{3}{15}$, donc A et B ne sont pas indépendants.

Corrigé

1. $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12} = P(A \cap B)$. Donc A et B sont indépendants.
2. Si A et B sont indépendants, alors $\bar{A}$ et B le sont aussi (propriété du cours). Vérification : $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$ et $P(\bar{A}) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$. ✓

Corrigé

1. $A = \{2, 4, 6\}$, $P(A) = \frac{1}{2}$, $B = \{5, 6\}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $A \cap B = \{6\}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$.
2. $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B)$. Les événements sont indépendants.

Corrigé

A et B sont incompatibles, donc $P(A \cap B) = 0$. Or $P(A) \times P(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12} \neq 0$.
Donc A et B ne sont pas indépendants. Des événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants.

Corrigé

1. $P(A) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$, $P(A \cap B) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26}$.
2. $P(A) \times P(B) = \frac{1}{26} = P(A \cap B)$. Indépendants.
3. Par propriété, si A et B sont indépendants, $\bar{A}$ et B le sont aussi.

Corrigé

$P(S) = \frac{1}{2}$, $P(M) = \frac{1}{3}$, $P(S \cap M) = \frac{60}{300} = \frac{1}{5}$.
 $P(S) \times P(M) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{5} = P(S \cap M)$.
 S et M ne sont pas indépendants : faire du sport et faire Maths sont liés.

Corrigé

1. $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{10} = \frac{3}{20}$ (car indépendants).
2. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{3}{10} - \frac{3}{20} = \frac{10+6-3}{20} = \frac{13}{20}$.
3. $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{3/20}{1/2} = \frac{3}{10} = P(B)$. Normal : l'indépendance signifie que $P_A(B) = P(B)$.

Corrigé

1. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$ (indépendance).
 $\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + P(B) - \frac{1}{3}P(B) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}P(B)$.
2. $\frac{2}{3}P(B) = \frac{1}{6}$, donc $P(B) = \frac{1}{4}$.
3. $P(A \cap B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$. $P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{4+3-1}{12} = \frac{1}{2}$ ✓.

Corrigé

1. $P(3S) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$.
2. $P(\text{au moins } 1) = 1 - P(0S) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^3 = 1 - \frac{1}{27} = \frac{26}{27}$.

$$3. P(2S) = \binom{3}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) = 3 \times \frac{4}{9} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9}.$$

Corrigé

$$1. M : \text{malade}, T : \text{test positif. } P(M) = \frac{1}{100}, P_M(T) = \frac{19}{20}, P_{\overline{M}}(T) = \frac{3}{100}.$$

$$3. P(T) = \frac{1}{100} \times \frac{19}{20} + \frac{99}{100} \times \frac{3}{100} = \frac{19}{2000} + \frac{297}{10000} = \frac{95+297}{10000} = \frac{392}{10000} = \frac{49}{1250}.$$

4. $P_T(M) = \frac{19/2000}{49/1250} = \frac{95}{392} \approx 24,2\%$. Un test positif ne correspond a une maladie réelle que dans 1 cas sur 4.

Corrigé

$$1. P(D) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{25} + \frac{2}{5} \times \frac{7}{100} = \frac{12}{500} + \frac{14}{500} = \frac{26}{500} = \frac{13}{250}.$$

$$2. P_D(B) = \frac{14/500}{13/250} = \frac{14}{500} \times \frac{250}{13} = \frac{7}{13} \approx 53,8\%.$$

Corrigé

$$1. P(2R) = \frac{6}{10} \times \frac{6}{10} = \frac{9}{25}.$$

$$2. P(\text{diff}) = P(RB) + P(BR) = 2 \times \frac{6}{10} \times \frac{4}{10} = \frac{12}{25}.$$

3. Oui, les tirages sont indépendants car il y a remise : la composition de l'urne est identique a chaque tirage.

Corrigé

$$2. P(aa) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, P(Aa) = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, P(AA) = \frac{1}{4}.$$

$$3. P(\text{porteur}|\text{non malade}) = \frac{P(Aa)}{P(Aa)+P(AA)} = \frac{1/2}{1/2+1/4} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}.$$

Corrigé

$$2. P(\text{pluie demain}) = \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} + \frac{3}{5} \times \frac{3}{10} = \frac{14}{50} + \frac{9}{50} = \frac{23}{50} = 46\%.$$

Corrigé

$$1. P(2D) = \frac{5}{100} \times \frac{4}{99} = \frac{20}{9900} = \frac{1}{495}.$$

$$2. P(\text{au moins 1D}) = 1 - P(0D) = 1 - \frac{95}{100} \times \frac{94}{99} = 1 - \frac{8930}{9900} = \frac{970}{9900} = \frac{97}{990} \approx 9,8\%.$$

$$3. \text{Avec remise : } P(\text{au moins 1D}) = 1 - (0,95)^2 = 1 - 0,9025 = 0,0975 \approx 9,75\%. \text{ Tres proche.}$$

Corrigé

$$2. P(T) = \frac{5}{100} \times \frac{99}{100} + \frac{95}{100} \times \frac{5}{100} = \frac{495+475}{10000} = \frac{970}{10000} = \frac{97}{1000}.$$

$$3. P_T(D) = \frac{495/10000}{97/1000} = \frac{495}{970} = \frac{99}{194} \approx 51\%.$$

4. Environ 1 test positif sur 2 correspond a un vrai dope. La sanction ne devrait pas etre automatique ; un second test de confirmation est recommande.

Corrigé

$$1. P(A) = \frac{4}{5} \times \frac{1}{20} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{4}{100} + \frac{5}{100} = \frac{9}{100}.$$

$$2. P_A(R) = \frac{P(R \cap A)}{P(A)} = \frac{1/20}{9/100} = \frac{100}{180} = \frac{5}{9} \approx 55,6\%.$$

3. Plus de la moitié des accidentés sont des conducteurs a risque, alors qu'ils ne representent que 20 % de la population.

Corrigé

1. $P(T_1) = \frac{2}{100} \times \frac{9}{10} + \frac{98}{100} \times \frac{1}{10} = \frac{18+98}{1000} = \frac{116}{1000} = \frac{29}{250}$.
2. $P_{T_1}(M) = \frac{18/1000}{29/250} = \frac{18}{1000} \times \frac{250}{29} = \frac{9}{58} \approx 15,5\%$.
3. $P(T_1^+ \cap T_2^+) = \frac{2}{100} \times \frac{9}{10} \times \frac{19}{20} + \frac{98}{100} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{20} = \frac{342+98}{20000} = \frac{440}{20000} = \frac{11}{500}$.
4. $P(M|T_1^+ \cap T_2^+) = \frac{342/20000}{11/500} = \frac{342}{440} = \frac{171}{220} \approx 77,7\%$. Le double test améliore considérablement la VPP (15,5 % $\rightarrow$ 77,7 %).

Corrigé

1. $P_T(M) = \frac{p \times \frac{95}{100}}{p \times \frac{95}{100} + (1-p) \times \frac{10}{100}} = \frac{95p}{95p + 10(1-p)} = \frac{95p}{85p + 10}$.
2. $P_T(M) \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{95p}{85p+10} \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow 190p \geq 85p + 10 \Leftrightarrow 105p \geq 10 \Leftrightarrow p \geq \frac{2}{21}$.
3. La prévalence doit être d'au moins $\frac{2}{21} \approx 9,5\%$ pour qu'un test positif corresponde à plus d'une chance sur deux d'être malade.

10

CHAPITRE 10

Variables aléatoires

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais interpréter les événements liés à une variable aléatoire et déterminer sa loi de probabilité.
- ▶ C2 — Je sais calculer l'espérance $E(X)$, la variance $V(X)$ et l'écart type $\sigma(X)$ d'une variable aléatoire.
- ▶ C3 — Je sais représenter par un arbre la répétition de $n \leq 4$ épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques, puis étudier le nombre de succès.
- ▶ C4 — Je sais utiliser la linéarité de l'espérance pour calculer $E(aX+b)$.
- ▶ C5 — Je sais résoudre des problèmes contextualisés (jeux, décisions, assurances) à l'aide de variables aléatoires.
- ▶ C6 — Je sais simuler une variable aléatoire et des échantillons, et lire, comprendre et écrire une fonction Python renvoyant la moyenne d'un échantillon de taille n .
- ▶ C7 — Je sais étudier expérimentalement la fluctuation des moyennes d'échantillons autour de l'espérance, simuler N échantillons et interpréter l'écart entre moyenne empirique et espérance, notamment au regard de $2\sigma / \sqrt{n}$.

🎯 À RETENIR

Un assureur propose un contrat couvrant la casse d'un smartphone. La prime annuelle est de 50 euros. En cas de casse, l'assureur rembourse 300 euros. Si la probabilité de casse est de $1/10$, ce contrat est-il avantageux pour l'assuré ? Pour l'assureur ? Un problème de décision qui se ramène à l'étude de l'espérance d'une variable aléatoire.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 11 h ♦♦♦ 9 h

Contrat du chapitre

Ce que tu vas savoir faire

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

- C1 Interpréter les événements liés à une variable aléatoire et déterminer sa loi de probabilité.
- C2 Calculer l'espérance $E(X)$, la variance $V(X)$ et l'écart type $\sigma(X)$ d'une variable aléatoire.
- C3 Pour deux à quatre épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques, construire un arbre et étudier le nombre de succès.
- C4 Utiliser la linéarité de l'espérance pour calculer $E(aX + b)$.
- C5 Résoudre des problèmes contextualisés (jeux, décisions, assurances) à l'aide de variables aléatoires.
- C6 Simuler une variable aléatoire et des échantillons, puis lire, comprendre et écrire une fonction Python renvoyant la moyenne d'un échantillon de taille n .
- C7 Étudier expérimentalement la fluctuation des moyennes d'échantillons autour de l'espérance, et interpréter l'écart observé au regard de $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$.

Ce dont tu as besoin avant de commencer

Ce chapitre s'appuie sur quatre familles de prérequis. Le diagnostic de la page suivante te dira lesquels tu maîtrises déjà.

- R1 **Probabilités de base** — expérience aléatoire, univers, événements, probabilité d'un événement.
- R2 **Probabilités conditionnelles** — formule des probabilités totales, indépendance.
- R4 **Suites et sommes** — notation $\sum$, suites arithmétiques et géométriques.
- R5 **Puissances** — règles de calcul, puissances entières.

Si une fiche R te concerne, lis-la avant d'aborder le cours : chaque notion manquante sera un obstacle au moment où tu en auras le plus besoin.

Temps de travail estimé

- Parcours ♦ (Consolidation) : environ 14 h.
- Parcours ♦♦ (Maîtrise) : environ 11 h.
- Parcours ♦♦♦ (Approfondissement) : environ 9 h.

Situation d'accroche — L'assurance smartphone

Un assureur propose un contrat couvrant la casse d'un smartphone. La prime annuelle est de 50 euros. En cas de casse, l'assureur rembourse 300 euros. On estime que la probabilité de casse dans l'année est $\frac{1}{10}$.

- Si l'on note X le gain de l'assuré (remboursement moins prime), quelles sont les valeurs possibles de X ?
- Quelle est la probabilité de chaque valeur ?
- En moyenne, sur un grand nombre d'assurés, ce contrat est-il avantageux pour l'assuré ? Pour l'assureur ?

On a $X = 250$ (cas de casse : $300 - 50$) avec probabilité $\frac{1}{10}$ et $X = -50$ (pas de casse : -50) avec probabilité $\frac{9}{10}$. L'espérance $E(X) = 250 \times \frac{1}{10} + (-50) \times \frac{9}{10} = 25 - 45 = -20$. En moyenne, l'assuré perd 20 euros par an : le contrat est avantageux pour l'assureur.

Cette situation sera entièrement traitée au Temps 7 (TD fil rouge), une fois les capacités C1 à C5 acquises.

Temps 2 — Diagnostic d'entrée

(15–20 min, sans calculatrice)

Réponds à chaque question sur ta copie. Ne cherche pas à aller vite : l'objectif est de repérer ce que tu maîtrises, pas de tout réussir.

R1 — Probabilités de base

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
2. Quelle est la probabilité de *ne pas* obtenir un 6 en lançant un dé équilibré ?

R2 — Probabilités conditionnelles

3. Un sac contient 40 % de billes rouges et 60 % de billes bleues. La probabilité qu'une bille rouge soit rayée est 0,3 et celle qu'une bille bleue soit rayée est 0,1. Quelle est la probabilité qu'une bille tirée au hasard soit rayée ?

R2 — Lire un arbre pondéré

4. À un nœud d'un arbre pondéré, une branche porte la probabilité $\frac{2}{5}$. Quelle probabilité porte l'autre branche ?

R4 — Suites et sommes

5. Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 10$.
6. Calculer $\sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^k$.

R5 — Puissances

7. Calculer $\left(\frac{2}{3}\right)^3$.
8. On lance 3 fois une pièce équilibrée. En admettant l'indépendance des lancers, quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois Pile ?
9. Deux événements complémentaires ont pour probabilités $\frac{1}{4}$ et p . Déterminer p .
10. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire successivement 2 boules *sans remise*. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules rouges ?

Grille de décodage

Reporte tes résultats dans ce tableau, puis suis les conseils de remédiation avant de commencer le cours.

Questions	Prérequis testé	Si tu as échoué...	Fiche à lire
1, 2 et 9	R1 — Probabilités de base	...avant de commencer C1	Fiche R1
3, 4, 8 et 10	R2 — Probabilités et arbres	...avant de commencer C1, C3	Fiche R2
5 et 6	R4 — Suites et sommes	...avant de commencer C2, C4	Fiche R4
7	R5 — Puissances	...avant de commencer C3	Fiche R5

Si tu as réussi toutes les questions sans difficulté, tu peux démarrer directement le Temps 3.

10.1 Loi de probabilité d'une variable discrète

DÉFINITION 1

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Une **variable aléatoire** X est une fonction qui associe à chaque issue ω de Ω un nombre réel $X(\omega)$.

L'ensemble des valeurs prises par X est noté $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$.

EXEMPLE On lance un dé équilibré à 6 faces. On définit X comme le nombre obtenu. Alors $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Si l'on définit Y comme le gain dans un jeu où l'on gagne 2 euros si le résultat est pair et on perd 1 euro sinon, alors $Y(\Omega) = \{-1, 2\}$.

DÉFINITION 2

La **loi de probabilité** de X est la donnée de chaque valeur x_i prise par X et de la probabilité correspondante $P(X = x_i)$.

On la représente par un **tableau de loi** :

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_r
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_r

avec $p_i \geq 0$ pour tout i et $\sum_{i=1}^r p_i = 1$.

EXEMPLE On lance un dé équilibré. Soit X le résultat obtenu. La loi de X est :

x_i	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Vérification : $6 \times \frac{1}{6} = 1$. ✓

EXEMPLE On lance deux pièces équilibrées. Soit X le nombre de Pile obtenus.

L'univers est $\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$ avec chaque issue de probabilité $\frac{1}{4}$.

$X(PP) = 2, X(PF) = X(FP) = 1, X(FF) = 0$.

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Vérification : $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$. ✓

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Pour tout événement de la forme $\{X \leq a\}$ ou $\{X \geq a\}$, on a :

$$P(X \leq a) = \sum_{x_i \leq a} P(X = x_i), \quad P(X \geq a) = \sum_{x_i \geq a} P(X = x_i).$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

Après avoir construit un tableau de loi, toujours additionner toutes les probabilités. Si la somme n'est pas 1, c'est qu'une valeur est manquante ou qu'un calcul est erroné.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $P(X = x_i)$ et $P(X \leq x_i)$.

$P(X = 3)$ est la probabilité que X prenne exactement la valeur 3. $P(X \leq 3)$ est la probabilité que X prenne une valeur inférieure ou égale à 3 : c'est la somme $P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots$ pour tous les $x_i \leq 3$.

10.2 Espérance, variance et écart type

DÉFINITION 1

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_r$ avec les probabilités $p_1, p_2, \dots, p_r$. L'**espérance** de X est le nombre réel :

$$E(X) = \sum_{i=1}^r x_i p_i = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_r p_r.$$

L'espérance représente la **valeur moyenne** de X sur un grand nombre de répétitions de l'expérience (loi des grands nombres).

EXEMPLE On lance un dé équilibré. Soit X le résultat.

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3,5.$$

En moyenne, sur un grand nombre de lancers, le résultat moyen est 3,5.

DÉFINITION 2

La **variance** de X mesure la dispersion des valeurs de X autour de son espérance :

$$V(X) = \sum_{i=1}^r (x_i - E(X))^2 p_i = E[(X - E(X))^2].$$

Formule de König-Huygens (souvent plus pratique pour le calcul) :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2, \quad \text{où } E(X^2) = \sum_{i=1}^r x_i^2 p_i.$$

DÉFINITION 3

L'**écart type** de X est :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Il est exprimé dans la même unité que X . C'est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts à l'espérance ; il ne faut pas le confondre avec l'écart absolu moyen.

EXEMPLE Reprenons le dé équilibré. $E(X) = \frac{7}{2}$.

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} + 3^2 \times \frac{1}{6} + 4^2 \times \frac{1}{6} + 5^2 \times \frac{1}{6} + 6^2 \times \frac{1}{6} = \frac{91}{6}.$$


$$V(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182}{12} - \frac{147}{12} = \frac{35}{12}.$$

ERREUR FRÉQUENTE

En général, $E(X^2) \neq [E(X)]^2$. La variance est leur différence : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \geq 0$.



$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, pas $V(X)$. L'écart type a la même unité que X , tandis que la variance est en unités au carré.



Un chemin comportant k succès a pour probabilité $p^k(1-p)^{3-k}$, quel que soit l'ordre des succès. Il reste à compter les chemins : $k = 0$ en compte 1, $k = 1$ en compte 3, $k = 2$ en compte 3 et $k = 3$ en compte 1.

Passer à quatre épreuves

Pour $n = 4$, l'arbre possède $2^4 = 16$ chemins terminaux. On ne le dessine pas toujours en entier : on peut se contenter de compter les chemins réalisant l'événement cherché. La méthode est inchangée : probabilité d'un chemin $p^k(1-p)^{4-k}$, puis somme sur les chemins retenus.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Le nombre de chemins n'est pas n : pour n épreuves il y a 2^n chemins terminaux, et le nombre de chemins à exactement k succès se compte sur l'arbre, il ne se devine pas.

À toi de jouer — construire l'arbre de quatre épreuves

1. Reprendre l'arbre complet de trois épreuves ci-dessus et lui ajouter une quatrième épreuve : chaque chemin se dédouble en S et $\bar{S}$. Combien de chemins terminaux l'arbre obtenu possède-t-il ?
2. Compléter le tableau du nombre de chemins selon le nombre k de succès.

k	0	1	2	3	4
nombre de chemins	1	...	...	...	1

3. On prend $p = \frac{1}{2}$. Calculer $P(\text{exactement deux succès})$ à partir de l'arbre, sans utiliser de formule apprise par cœur.
4. Vérifier que la somme des probabilités des 16 chemins vaut 1.

Corrigé

1. Chaque chemin de l'arbre à trois épreuves donne deux chemins : $2 \times 8 = 16$ chemins terminaux, soit 2^4 .

2. 1, 4, 6, 4, 1. On les lit en dédoublant les comptes de $n = 3$ (1, 3, 3, 1) : un chemin à k succès pour $n = 4$ provient d'un chemin à k succès suivi d'un échec, ou d'un chemin à $k - 1$ succès suivi d'un succès.

3. Chaque chemin a pour probabilité $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$, et 6 chemins contiennent exactement deux succès : $P = 6 \times \frac{1}{16} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.

4. $\frac{1+4+6+4+1}{16} = \frac{16}{16} = 1$.

④ MÉTHODE M6 Calculer une probabilité sur un arbre répété

Pour calculer la probabilité d'obtenir exactement k succès :

1. construire l'arbre jusqu'au nombre d'épreuves demandé ;
2. repérer tous les chemins qui contiennent exactement k succès ;
3. multiplier les probabilités le long de chaque chemin ;
4. additionner les probabilités des chemins retenus.

EXEMPLE On lance trois fois une pièce telle que $P(S) = \frac{1}{3}$. Pour obtenir exactement deux succès, les chemins sont $SS\bar{S}$, $\bar{S}SS$ et $S\bar{S}S$. Chacun a pour probabilité $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{27}$. Ainsi,

$$P(\text{exactement deux succès}) = 3 \times \frac{2}{27} = \frac{2}{9}.$$

Le facteur 3 vient ici des trois chemins lus sur l'arbre ; aucune formule générale n'est nécessaire.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Sur un chemin, on **multiplie** les probabilités. Entre plusieurs chemins qui réalisent le même événement, on **additionne** leurs probabilités.

10.4 Transformer une variable aléatoire

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si $Y = aX + b$, où a et b sont deux réels, alors

$$E(Y) = aE(X) + b.$$

Cette propriété est la **linéarité de l'espérance**. Elle permet de calculer la valeur moyenne d'une grandeur obtenue par changement d'échelle et ajout d'une constante, sans reconstruire toute sa loi.

EXEMPLE Une recette X , exprimée en euros, vérifie $E(X) = 12$. Après des frais fixes de 3 euros, le bénéfice est $Y = X - 3$. Alors $E(Y) = E(X) - 3 = 9$. Si toutes les sommes sont ensuite doublées, pour $Z = 2Y$ on obtient $E(Z) = 2E(Y) = 18$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Dans $E(aX + b) = aE(X) + b$, le terme constant b n'est pas multiplié par a . Par exemple, $E(2X - 3) = 2E(X) - 3$, et non $2(E(X) - 3)$.

10.5 Problèmes contextuels

DÉFINITION 1

Dans un jeu de hasard, le **gain algébrique** G d'un joueur est la différence entre ce qu'il reçoit et ce qu'il a payé pour jouer (la mise). Le gain peut être négatif (perte).

Un jeu est dit **équitable** si $E(G) = 0$: en moyenne, le joueur ne gagne ni ne perd.

Un jeu est dit **favorable au joueur** si $E(G) > 0$ et **défavorable** si $E(G) < 0$.

EXEMPLE On lance un dé équilibré. Si le résultat est 6, on gagne 10 euros ; sinon, on perd 2 euros. La mise est incluse dans les montants.

G prend les valeurs 10 (avec probabilité $\frac{1}{6}$) et -2 (avec probabilité $\frac{5}{6}$).

$$E(G) = 10 \times \frac{1}{6} + (-2) \times \frac{5}{6} = \frac{10}{6} - \frac{10}{6} = 0.$$

Le jeu est équitable.

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Dans un problème de **contrôle qualité**, on peut associer à chaque pièce une variable qui vaut 1 si elle est défectueuse et 0 sinon. Pour un prélèvement de deux à quatre pièces indépendantes, un arbre pondéré permet de déterminer la loi du nombre X de pièces défectueuses.

EXEMPLE Une machine produit 5 % de pièces défectueuses. On prélève deux pièces de façon indépendante. L'arbre comporte à chaque niveau une branche « défectueuse » de probabilité 0,05 et une branche « conforme » de probabilité 0,95.

Ainsi, $P(X = 0) = 0,95^2 = 0,9025$, $P(X = 1) = 2 \times 0,05 \times 0,95 = 0,095$ et $P(X = 2) = 0,05^2 = 0,0025$. Ces trois probabilités forment la loi de X .

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Dans un problème d'**assurance**, l'assureur fixe une prime c et verse une indemnité I en cas de sinistre (de probabilité p). Le bénéfice de l'assureur par contrat est une variable aléatoire B :

► $B = c$ si pas de sinistre (probabilité $1 - p$).

► $B = c - I$ si sinistre (probabilité p).

$$E(B) = c - pI.$$

Le contrat est rentable pour l'assureur si $E(B) > 0$, c'est-à-dire $c > pI$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la mise dans le gain algébrique.

Si un joueur paie 3 euros pour jouer et peut gagner 10 euros, son gain est $10 - 3 = 7$ (et non 10). S'il ne gagne rien, son gain est $0 - 3 = -3$ (et non 0).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre gain et probabilité.

L'espérance n'est pas une probabilité : $E(G) = -2$ signifie qu'en moyenne on perd 2 euros par partie, pas que la probabilité de perdre est 2.

ERREUR FRÉQUENTE**Ne pas définir clairement la variable aléatoire.**

Avant tout calcul, écrire « Soit X la variable aléatoire qui représente... ». Un exercice où X n'est pas défini est incomplet.

10.6 Algorithmique et expérimentations sur une variable aléatoire

10.6.1 Calculer l'espérance, la variance et l'écart type

Une variable aléatoire finie prend ici les valeurs -2 , 1 et 4 avec les probabilités respectives $0,2$, $0,5$ et $0,3$. Le programme suivant reçoit les valeurs et leurs probabilités ; il ne dépend donc pas de la situation choisie.

```

1 from math import sqrt
2
3 def caracteristiques(valeurs, probabilites):
4     """Renvoie (esperance, variance, ecart_type) d'une loi finie."""
5     if len(valeurs) == 0 or len(valeurs) != len(probabilites):
6         raise ValueError("la loi doit contenir autant de valeurs que de probabilites")
7     if any(p < 0 for p in probabilites):
8         raise ValueError("les probabilites doivent etre positives")
9     if abs(sum(probabilites) - 1) > 1e-12:
10        raise ValueError("la somme des probabilites doit valoir 1")
11    esperance = sum(x * p for x, p in zip(valeurs, probabilites))
12    variance = sum(
13        (x - esperance) ** 2 * p
14        for x, p in zip(valeurs, probabilites)
15    )
16    return esperance, variance, sqrt(variance)

```

EXEMPLE Avec `valeurs = (-2, 1, 4)` et `probabilites = (0.2, 0.5, 0.3)`, la fonction renvoie

$$E(X) = 1,3, \quad V(X) = 4,41, \quad \sigma(X) = 2,1.$$

Ces résultats sont des calculs exacts à l'arrondi d'affichage près : ils proviennent de la loi donnée, sans simulation.

10.6.2 Comparer les fréquences des lettres de deux textes

Une lettre choisie au hasard dans un texte définit une variable aléatoire finie. Sa loi est le tableau des fréquences des lettres. Pour rendre une comparaison français-anglais pertinente, la fonction ci-dessous ignore la casse, les espaces et la ponctuation ; elle ramène aussi une lettre accentuée à la lettre latine correspondante.

```

1 from collections import Counter
2 from unicodedata import normalize
3
4 def frequences_lettres(texte):
5     """Renvoie les frequences des lettres a...z presentes dans texte."""
6     decompose = normalize("NFD", texte.lower())
7     lettres = [caractere for caractere in decompose if "a" <= caractere <= "z"]
8     if not lettres:
9         return {}
10    effectifs = Counter(lettres)
11    total = len(lettres)
12    return {

```

```

13     lettre: effectifs[lettre] / total
14     for lettre in sorted(effectifs)
15 }

```

◆ **PROPRIÉTÉ Démarche de comparaison** Appliquer la fonction à deux textes de longueurs comparables, puis comparer les lettres les plus fréquentes. Les fréquences calculées décrivent les textes choisis : un extrait différent, même dans la même langue, peut donner un classement différent.

10.6.3 Simuler une variable aléatoire finie

On utilise la loi

x_i	-2	1	4
$P(X = x_i)$	0,2	0,5	0,3

La fonction `tirage_variable` partage l'intervalle $[0; 1[$ en trois intervalles de longueurs 0,2, 0,5 et 0,3.

```

1 from random import Random
2
3 VALEURS = (-2, 1, 4)
4 PROBABILITES = (0.2, 0.5, 0.3)
5
6 def tirage_variable(generateur):
7     u = generateur.random()
8     cumul = 0
9     for valeur, probabilite in zip(VALEURS, PROBABILITES):
10         cumul = cumul + probabilite
11         if u < cumul:
12             return valeur
13     return VALEURS[-1]
14
15 def simuler_variable(n, graine):
16     """Simule un échantillon de taille n de la variable X."""
17     if n <= 0:
18         raise ValueError("n doit être strictement positif")
19     generateur = Random(graine)
20     return [tirage_variable(generateur) for _ in range(n)]

```

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

La graine sert à retrouver exactement le même échantillon lors d'une vérification. La liste obtenue est une réalisation possible de la variable, pas la loi elle-même.

10.6.4 Écrire une fonction renvoyant la moyenne d'un échantillon

La taille n d'un échantillon est le nombre de valeurs simulées. Si $x_1, \dots, x_n$ sont ces valeurs, leur moyenne est

$$m = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

```

1 from random import Random
2
3 VALEURS = (-2, 1, 4)
4 PROBABILITES = (0.2, 0.5, 0.3)

```



```

5
6 def tirage_variable(generateur):
7     u = generateur.random()
8     cumul = 0
9     for valeur, probabilite in zip(VALEURS, PROBABILITES):
10         cumul = cumul + probabilite
11         if u < cumul:
12             return valeur
13     return VALEURS[-1]
14
15 def moyenne_echantillon(n, graine):
16     """Renvoie la moyenne d'un echantillon simule de taille n."""
17     if n <= 0:
18         raise ValueError("n doit etre strictement positif")
19     generateur = Random(graine)
20     somme = sum(tirage_variable(generateur) for _ in range(n))
21     return somme / n

```

EXEMPLE Avec $n = 40$ et la graine 1729, la fonction renvoie $m = 1,9$. Cette valeur dépend de l'échantillon; elle n'est pas une nouvelle valeur théorique de $E(X)$.

À toi de jouer — écrire la fonction

On veut une fonction `ecart_a_esperance(n, graine)` qui renvoie $|m - E(X)|$, où m est la moyenne d'un échantillon de taille n .

1. Recopier et compléter les deux lignes manquantes.
2. Tester avec $n = 40$ et la graine 1729, puis avec $n = 400$ et la même graine. Que constate-t-on?

```

1 ESPERANCE = 1.3
2
3 def ecart_a_esperance(n, graine):
4     moyenne = ...           # a completer : reutiliser moyenne_echantillon
5     return ...             # a completer : la distance a ESPERANCE

```

Corrigé

1. `moyenne = moyenne_echantillon(n, graine)` puis `return abs(moyenne - ESPERANCE)`.
2. Avec $n = 40$ on obtient $|1,9 - 1,3| = 0,6$; avec $n = 400$ la moyenne vaut 1,54 et l'écart tombe à 0,24. Augmenter la taille de l'échantillon rapproche la moyenne observée de l'espérance, sans jamais garantir l'égalité.

10.6.5 Étudier la distance entre moyenne et espérance

Pour la loi étudiée,

$$\mu = E(X) = 1,3 \quad \text{et} \quad \sigma = 2,1.$$

On mesure l'écart entre la moyenne m d'un échantillon de taille n et l'espérance μ par la distance $|m - \mu|$.

```

1 from random import Random
2
3 VALEURS = (-2, 1, 4)
4 PROBABILITES = (0.2, 0.5, 0.3)
5 MU = 1.3
6

```

```

7 def tirage_variable(generateur):
8     u = generateur.random()
9     cumul = 0
10    for valeur, probabilite in zip(VALEURS, PROBABILITES):
11        cumul = cumul + probabilite
12        if u < cumul:
13            return valeur
14    return VALEURS[-1]
15
16 def distance_moyenne_esperance(n, graine):
17     """Renvoie |m - mu| pour un echantillon simule de taille n."""
18     if n <= 0:
19         raise ValueError("n doit etre strictement positif")
20     generateur = Random(graine)
21     moyenne = sum(tirage_variable(generateur) for _ in range(n)) / n
22     return abs(moyenne - MU)

```

EXEMPLE Avec la graine 1729, les distances obtenues pour $n = 20$, $n = 100$ et $n = 500$ valent respectivement environ 0,30, 0,18 et 0,15.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Dans cet exemple, la distance diminue quand n augmente. Cette observation empirique ne constitue pas une preuve qu'elle décroît à chaque nouvelle simulation : un échantillon aléatoire peut exceptionnellement s'éloigner de μ .

10.6.6 Simuler N échantillons et tester la borne à 2σ

On simule N échantillons, chacun de taille n . Pour chaque échantillon, on note m sa moyenne et on teste

$$|m - \mu| \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Dans notre exemple, $\mu = 1,3$ et $\sigma = 2,1$. Les quatre paramètres μ , σ , n et N jouent des rôles différents : les deux premiers décrivent la loi, n est la taille d'un échantillon et N est le nombre d'échantillons simulés.

```

1 from math import sqrt
2 from random import Random
3
4 VALEURS = (-2, 1, 4)
5 PROBABILITES = (0.2, 0.5, 0.3)
6 MU = 1.3
7 SIGMA = 2.1
8
9 def tirage_variable(generateur):
10     u = generateur.random()
11     cumul = 0
12     for valeur, probabilite in zip(VALEURS, PROBABILITES):
13         cumul = cumul + probabilite
14         if u < cumul:
15             return valeur
16     return VALEURS[-1]
17
18 def proportion_dans_borne(n, N, graine):
19     """Proportion des N moyennes a distance au plus 2*sigma/sqrt(n) de mu."""
20     if n <= 0 or N <= 0:
21         raise ValueError("n et N doivent etre strictement positifs")

```

```

22     generateur = Random(graine)
23     borne = 2 * SIGMA / sqrt(n)
24     favorables = 0
25     for _ in range(N):
26         moyenne = sum(tirage_variable(generateur) for _ in range(n)) / n
27         if abs(moyenne - MU) ≤ borne:
28             favorables = favorables + 1
29     return favorables / N

```

EXEMPLE Pour $n = 50$, $N = 400$ et la graine 1729, la proportion obtenue est 0,94. Avec la graine 314159, elle vaut 0,935 : la proportion elle-même varie d'une simulation à l'autre.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Cette proportion est un constat empirique et ne constitue pas une preuve d'une valeur universelle. Il faut conserver n , N , μ , σ et la graine avec le résultat afin que l'expérience soit interprétable et reproductible.

À toi de jouer — exploiter N échantillons

1. Exécuter `proportion_dans_borne(50, 400, 1729)` puis reprendre avec la graine 20250901. Les deux proportions sont-elles égales ? Pourquoi ?
2. Reprendre avec $n = 200$ à graine fixée. La borne $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? La proportion observée s'effondre-t-elle pour autant ?
3. Rédiger en deux phrases ce que l'on peut, et ce que l'on ne peut pas, conclure d'une telle simulation.

Corrigé

1. 0,94 puis 0,9525 : les proportions diffèrent car chaque graine produit d'autres échantillons. L'ordre de grandeur, lui, se conserve.

2. Pour $n = 200$ la borne passe de 0,594 à 0,297 : elle diminue comme $1/\sqrt{n}$. La proportion reste voisine (0,935 à la graine 1729) car les moyennes se resserrent au même rythme que la borne.

3. On peut constater qu'une large majorité des moyennes tombe dans l'intervalle annoncé, et que ce constat se reproduit sur d'autres graines. On ne peut pas en déduire une valeur exacte ni une propriété démontrée : c'est une observation empirique, dépendante de n , de N et de la graine.

🔗 MÉTHODE M1 Construire le tableau de loi d'une variable aléatoire

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est-à-dire de dresser le tableau donnant chaque valeur et sa probabilité.

La méthode pas à pas.

1. Je liste toutes les issues de l'univers Ω et leurs probabilités.
2. Pour chaque issue ω , je calcule la valeur $X(\omega)$.
3. Je regroupe les issues qui donnent la même valeur de X .
4. Pour chaque valeur x_i , je somme les probabilités des issues correspondantes : $P(X = x_i)$.
5. Je présente le résultat dans un tableau de loi.
6. Je vérifie que la somme de toutes les probabilités vaut 1.

Exemple rédigé. On lance deux pièces équilibrées. Soit X le nombre de Pile obtenus.

$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$, chaque issue a probabilité $\frac{1}{4}$.
 $X(PP) = 2$, $X(PF) = 1$, $X(FP) = 1$, $X(FF) = 0$.

$$P(X = 0) = \frac{1}{4}, P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, P(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1 \quad \checkmark$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier une issue de l'univers (par exemple oublier FP et ne compter que PF pour $X = 1$).
- **Piège 2.** Ne pas regrouper toutes les issues donnant la même valeur de X .
- **Piège 3.** Ne pas vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

Vérifier son résultat. Additionner toutes les probabilités du tableau : le total doit être exactement 1. Si ce n'est pas le cas, une valeur a été oubliée ou un calcul est erroné.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

④ MÉTHODE M2 Calculer espérance, variance et écart type

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de calculer $E(X)$, $V(X)$ ou $\sigma(X)$, ou de déterminer si un jeu est équitable.

La méthode pas à pas.

1. J'écris le tableau de loi de X : valeurs x_i et probabilités p_i .
2. Je calcule $E(X) = \sum_i x_i p_i$.
3. Je calcule $E(X^2) = \sum_i x_i^2 p_i$.
4. J'applique la formule de König-Huygens : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
5. Je calcule $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
6. J'interprète dans le contexte du problème.

Exemple rédigé. Un sac contient 3 boules numérotées 1, 2, 5. On tire une boule au hasard. Soit X le numéro obtenu.

x_i	1	2	5
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} + 5 \times \frac{1}{3} = \frac{8}{3}.$$

$$E(X^2) = 1 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{3} + 25 \times \frac{1}{3} = \frac{30}{3} = 10.$$

$$V(X) = 10 - \left(\frac{8}{3}\right)^2 = 10 - \frac{64}{9} = \frac{90-64}{9} = \frac{26}{9}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{26}{9}} = \frac{\sqrt{26}}{3} \approx 1,70.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre $E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$ et $[E(X)]^2 = (\sum x_i p_i)^2$.
- **Piège 2.** Oublier la racine carrée : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, pas $V(X)$.
- **Piège 3.** Écrire $V(X) = [E(X)]^2 - E(X^2)$ (inversion) : c'est $E(X^2) - [E(X)]^2$.

Vérifier son résultat. $V(X)$ doit être positif ou nul. Si vous obtenez un nombre négatif, il y a une erreur de calcul (probablement une inversion dans la formule de König-Huygens).

S'entraîner. (renvois exercices M2)

Approfondissement — Vers la Terminale

❶ MÉTHODE M3 Reconnaître et utiliser une loi binomiale

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'on répète une même expérience à deux issues (succès/échec) de façon indépendante et que l'on compte le nombre de succès.

La méthode pas à pas.

1. Je vérifie les trois conditions du schéma de Bernoulli :
 - ▶ Deux issues seulement (succès de probabilité p , échec de probabilité $1 - p$).
 - ▶ Les épreuves sont **identiques** (même p à chaque fois).
 - ▶ Les épreuves sont **indépendantes**.
2. J'identifie n (nombre de répétitions) et p (probabilité du succès).
3. Je pose X le nombre de succès : $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.
4. Pour calculer $P(X = k)$, j'applique : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
5. Je calcule le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ (triangle de Pascal ou formule).

Exemple rédigé. On lance 5 fois une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 Pile ?

Succès = Pile, $p = \frac{1}{2}$, $n = 5$ lancers indépendants.

X = nombre de Pile.

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$$

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{120}{6 \times 2} = 10 \checkmark. \text{ Somme des exposants : } 3 + 2 = 5 \checkmark.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Appliquer la loi binomiale sans vérifier l'indépendance (tirage sans remise, par exemple).
- ▶ **Piège 2.** Inverser les exposants : p^k (succès) et $(1 - p)^{n-k}$ (échecs), pas l'inverse.
- ▶ **Piège 3.** Oublier le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ dans la formule.

Vérifier son résultat. La somme des exposants de p et de $(1 - p)$ doit être n . Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ est un entier positif.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

Approfondissement — Vers la Terminale

❶ MÉTHODE M4 Utiliser les formules $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ et que l'on doit calculer son espérance, sa variance ou son écart type, ou retrouver n et p .

La méthode pas à pas.

1. Je vérifie que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.
2. J'applique directement : $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$, $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$.
3. Si l'on me donne $E(X)$ et $V(X)$ et qu'on me demande n et p :
 - ▶ $1 - p = \frac{V(X)}{E(X)}$, donc $p = 1 - \frac{V(X)}{E(X)}$.

$$\blacktriangleright n = \frac{E(X)}{p}.$$

Exemple rédigé. On sait que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $E(X) = 6$ et $V(X) = 4,2$. Trouver n et p .

$$1 - p = \frac{4,2}{6} = 0,7, \text{ donc } p = 0,3.$$

$$n = \frac{6}{0,3} = 20.$$

Vérification : $E(X) = 20 \times 0,3 = 6 \checkmark$ $V(X) = 20 \times 0,3 \times 0,7 = 4,2 \checkmark$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Appliquer $E(X) = np$ à une variable qui ne suit pas une loi binomiale.
- ▶ **Piège 2.** Écrire $V(X) = np^2$ au lieu de $np(1 - p)$.
- ▶ **Piège 3.** Confondre np et n/p .

Vérifier son résultat. Toujours vérifier que n est un entier naturel et que $0 < p < 1$. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur ou l'hypothèse de loi binomiale est incorrecte.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

④ MÉTHODE M5 Résoudre un problème contextualisé avec une variable aléatoire

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour les problèmes de jeux de hasard, d'assurance, de contrôle qualité ou de décision, où il faut modéliser une situation par une variable aléatoire et conclure grâce à l'espérance.

La méthode pas à pas.

1. Je lis l'énoncé et j'identifie l'expérience aléatoire.
2. Je définis clairement la variable aléatoire X (par exemple : X = gain algébrique du joueur).
3. Je détermine toutes les valeurs possibles de X .
4. Je calcule la probabilité de chaque valeur (arbre, tableau, dénombrement).
5. Je construis le tableau de loi et je vérifie $\sum p_i = 1$.
6. Je calcule $E(X)$ et j'interprète dans le contexte :
 - ▶ Jeu : $E(X) > 0$ favorable, $E(X) = 0$ équitable, $E(X) < 0$ défavorable.
 - ▶ Assurance : $E(B) > 0$ rentable pour l'assureur.
 - ▶ Qualité : $E(X)$ donne le nombre moyen de défauts.

Exemple rédigé. Un joueur paie 2 euros pour lancer un dé. S'il obtient 6, il reçoit 10 euros. Sinon, il ne reçoit rien. Le jeu est-il favorable ?

Soit X le gain algébrique du joueur.

Si 6 : $X = 10 - 2 = 8$ avec $P = \frac{1}{6}$. Sinon : $X = 0 - 2 = -2$ avec $P = \frac{5}{6}$.

$$E(X) = 8 \times \frac{1}{6} + (-2) \times \frac{5}{6} = \frac{8-10}{6} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3} \approx -0,33.$$

$E(X) < 0$: le jeu est défavorable au joueur. En moyenne, il perd environ 0,33 euro par partie.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de soustraire la mise dans le gain algébrique.
- ▶ **Piège 2.** Ne pas définir X explicitement au début de la résolution.
- ▶ **Piège 3.** Conclure sur le résultat d'une seule partie au lieu de raisonner « en moyenne ».

Vérifier son résultat. Vérifier la cohérence de $E(X)$ avec le contexte : si la mise est élevée et les gains rares, $E(X)$ doit être négatif (jeu défavorable au joueur).

S'entraîner. (renvois exercices M5)

🔑 MÉTHODE M6 Étudier un nombre de succès avec un arbre

Quand l'utiliser ?

Pour la répétition indépendante et identique de deux à quatre épreuves de Bernoulli.

Procédure

1. Nommer le succès et relever sa probabilité p .
2. Construire l'arbre avec p et $1 - p$ à chaque niveau.
3. Entourer les chemins qui comportent le nombre de succès demandé.
4. Multiplier sur chaque chemin, puis additionner entre les chemins.

Contrôle

Les probabilités de tous les chemins terminaux doivent avoir pour somme 1.

🔑 MÉTHODE M7 Calculer l'espérance de $aX + b$

Quand l'utiliser ?

Lorsqu'une grandeur s'obtient à partir d'une variable aléatoire X par un changement d'unité, une multiplication ou l'ajout de frais fixes, et que l'on cherche sa valeur moyenne.

Procédure

1. Écrire la relation $Y = aX + b$.
2. Calculer $E(Y) = aE(X) + b$.
3. Interpréter le résultat dans son unité.

Piège

Ne pas écrire $E(aX + b) = a(E(X) + b)$: seul X est multiplié par a dans l'expression initiale.

Exercice 1

On lance un dé équilibré à 6 faces. Soit X la variable aléatoire égale au résultat obtenu.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Dresser le tableau de loi de X .
3. Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
4. Calculer $P(X \leq 3)$ et $P(X \geq 5)$.

Exercice 2

On lance deux pièces équilibrées. Soit X le nombre de Pile obtenus.

1. Lister les quatre issues de l'univers Ω .
2. Déterminer la loi de probabilité de X .
3. Calculer $P(X \geq 1)$.

Exercice 3

Une urne contient 3 boules rouges, 2 boules bleues et 1 boule verte. On tire une boule au hasard. On gagne 1 euro si elle est rouge, 3 euros si elle est bleue et 5 euros si elle est verte. Soit X le gain.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?

2. Dresser le tableau de loi de X .
3. Calculer $P(X \geq 3)$.

Exercice 4

On lance deux dés équilibrés et on note S leur somme. On définit X par : $X = 1$ si $S \geq 10$ et $X = 0$ sinon.

1. Combien d'issues parmi les 36 donnent $S = 10$? $S = 11$? $S = 12$?
2. En déduire $P(X = 1)$ et $P(X = 0)$.
3. Dresser le tableau de loi de X .

Exercice 5

On lance trois pièces équilibrées. Soit X le nombre de Pile obtenus.

1. Lister les 8 issues de l'univers.
2. Déterminer la loi de X .
3. Calculer $P(X \leq 1)$ et $P(X \geq 2)$.
4. Vérifier que $P(X \leq 1) + P(X \geq 2) = 1$.

Exercice 6

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau incomplet suivant :

x_i	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	0,2	0,3	?	0,1

1. Déterminer la valeur manquante $P(X = 3)$.
2. Calculer $P(X \leq 2)$.

Exercice 7

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. On tire 2 boules au hasard *sans remise*. Soit X le nombre de boules rouges obtenues.

1. Quelles sont les valeurs possibles de X ?
2. Construire l'arbre des deux tirages, puis calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ et $P(X = 2)$.
3. Dresser le tableau de loi de X et vérifier.

Exercice 8

On lance deux dés équilibrés. Soit X le maximum des deux résultats.

1. Montrer que $P(X \leq k) = \left(\frac{k}{6}\right)^2$ pour $k \in \{1, \dots, 6\}$.
2. En déduire $P(X = k)$ pour chaque k .
3. Dresser le tableau de loi de X .

Exercice 9

On lance une pièce truquée pour laquelle la probabilité d'obtenir Pile est $\frac{2}{3}$. On pose $X = 1$ si l'on obtient Pile et $X = 0$ sinon.

1. Dresser le tableau de loi de X .
2. Quelle loi classique reconnaît-on ?

Exercice 10 ♦♦

À la roulette, il y a 37 cases numérotées de 0 à 36. Un joueur mise 1 euro sur un numéro.

- ▶ Si le numéro sort, il reçoit 36 euros (gain net : 35 euros).
- ▶ Sinon, il perd sa mise.

Soit X le gain algébrique du joueur.

1. Quelles sont les valeurs de X et leurs probabilités ?
2. Dresser le tableau de loi de X .

Exercice 11 ♦

On lance un dé équilibré. Soit X le résultat.

1. Calculer $E(X)$.
2. Interpréter cette valeur.

Exercice 12 ♦

Reprendre l'exercice 003 (urne : gain 1, 3 ou 5 euros). Calculer $E(X)$. En moyenne, combien gagne-t-on par tirage ?

Exercice 13 ♦

Soit X une variable aléatoire de loi :

x_i	-2	0	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

1. Calculer $E(X)$.
2. Calculer $V(X)$ par la formule de König-Huygens.
3. Calculer $\sigma(X)$.

Exercice 14 ♦♦

On lance un dé équilibré. Soit X le résultat.

1. Calculer $E(X^2)$.
2. En déduire $V(X)$ et $\sigma(X)$.
3. On pose $Y = 2X - 1$. Calculer $E(Y)$ en utilisant la linéarité de l'espérance.

Exercice 15 ♦

On lance une pièce équilibrée. Soit $X = 1$ si Pile et $X = 0$ si Face.

1. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
2. On pose $Y = 10X - 5$. Calculer $E(Y)$. Pour quelle valeur de la mise m le jeu « on gagne 10 euros si Pile, on perd m si Face » est-il équitable ?

Exercice 16 ♦♦

Reprendre l'exercice 010 (roulette, mise 1 euro sur un numéro).

1. Calculer $E(X)$.
2. Le jeu est-il équitable? Favorable au joueur? À la banque?
3. Sur 370 parties, combien le joueur perd-il en moyenne?

Exercice 17 ♦♦

On lance deux pièces équilibrées. Soit X le nombre de Pile.

1. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
2. Retrouver $E(X)$ en écrivant $X = X_1 + X_2$, où X_i vaut 1 si la pièce i donne Pile et 0 sinon, puis en utilisant la linéarité de l'espérance.

Exercice 18 ♦♦♦

Reprendre l'exercice 008 ($X = \text{maximum de deux dés}$).

1. Calculer $E(X)$.
2. Calculer $V(X)$.
3. En moyenne, le maximum est-il plus proche de 4 ou de 5?

Exercice 19 ♦

Dans un jeu, on gagne 5 euros avec probabilité $\frac{1}{3}$ et on perd 1 euro avec probabilité $\frac{2}{3}$.

1. Calculer l'espérance du gain.
2. Le jeu est-il favorable au joueur?

Exercice 20 ♦♦♦

Soit X une variable aléatoire telle que $E(X) = 3$. On pose $Y = 2X + 1$.

1. Calculer $E(Y)$.
2. Si $Z = -X + 5$, calculer $E(Z)$.
3. Si $T = 5X - 4$, calculer $E(T)$ et interpréter le rôle du terme constant.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 21 ♦

Calculer les coefficients binomiaux suivants.

1. $\binom{6}{2}$
2. $\binom{6}{4}$
3. $\binom{6}{0}$
4. $\binom{6}{6}$
5. Vérifier que $\binom{6}{2} = \binom{6}{4}$ (propriété de symétrie).

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 22 ◆

On lance 5 fois une pièce équilibrée. Soit X le nombre de Pile.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$.
2. Calculer $P(X = 3)$.
3. Calculer $P(X = 0)$ et $P(X = 5)$.

Approfondissement — Vers la Terminale**Exercice 23** ◆

On lance 4 fois un dé. Soit X le nombre de 6 obtenus. On a $X \sim \mathcal{B}(4, \frac{1}{6})$.

1. Calculer $P(X = 0)$.
2. Calculer $P(X = 2)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$.

Approfondissement — Vers la Terminale**Exercice 24** ◆◆

Un QCM contient 10 questions avec 4 propositions chacune (une seule correcte). Un élève répond au hasard. Soit X le nombre de bonnes réponses.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$.
2. Calculer $P(X = 0)$.
3. Calculer $P(X = 5)$.
4. La note est $2X$. Quelle note moyenne obtient-on en répondant au hasard ?

Approfondissement — Vers la Terminale**Exercice 25** ◆

Construire les lignes $n = 0$ à $n = 5$ du triangle de Pascal.

1. Écrire les 6 premières lignes.
2. Vérifier la relation $\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2}$.

Approfondissement — Vers la Terminale**Exercice 26** ◆◆

Une machine produit 5 % de pièces défectueuses. On prélève 10 pièces au hasard. Soit X le nombre de pièces défectueuses.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(10, 0,05)$.
2. Calculer $P(X = 0)$ (aucune pièce défectueuse).
3. Calculer $P(X = 1)$.
4. En déduire $P(X \leq 1)$. Interpréter.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 27

Soit $X \sim \mathcal{B}(8, \frac{1}{3})$.

1. Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$, $P(X = 3)$.
2. Calculer $P(X \leq 2)$.
3. Calculer $P(X \geq 3)$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 28

1. Démontrer la formule de Pascal : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ pour $1 \leq k \leq n-1$.
2. Démontrer que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.
3. En déduire que la somme des probabilités d'une loi $\mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$ vaut 1.

Exercice 29

Une expérience a un succès de probabilité 0,3. La variable X vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec.

1. Dresser le tableau de loi de X .
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 30

On lance trois fois une pièce équilibrée, de façon indépendante. La variable X compte le nombre de Pile.

1. Construire l'arbre des trois lancers, puis dresser le tableau de loi complet de X .
2. Représenter graphiquement cette loi (diagramme en bâtons).
3. Calculer $E(X)$ à partir du tableau.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 31

Soit $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$.

1. Calculer $E(X)$.
2. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 32

Soit $X \sim \mathcal{B}(20, 0,2)$. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 33 ♦♦

On sait que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $E(X) = 6$ et $V(X) = 4,2$. Déterminer n et p .

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 34 ♦♦

On sait que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $E(X) = 8$ et $V(X) = 6,4$. Déterminer n et p .

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 35 ♦♦♦

1. Démontrer que pour $1 \leq k \leq n : k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.
2. En utilisant cette identité, démontrer que si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$.
3. Application : vérifier pour $X \sim \mathcal{B}(4, \frac{1}{3})$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 36 ♦

On lance 100 fois une pièce équilibrée. Soit X le nombre de Pile.

1. Quelle est la loi de X ?
2. Combien de Pile attend-on en moyenne?
3. Calculer $\sigma(X)$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 37 ♦♦

Soit $X \sim \mathcal{B}(50, 0,4)$ et $Y \sim \mathcal{B}(100, 0,2)$.

1. Calculer $E(X)$ et $E(Y)$.
2. Calculer $V(X)$ et $V(Y)$.
3. Comparer les dispersions. Laquelle des deux variables est la plus concentrée autour de son espérance?

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 38 ♦♦♦

1. Démontrer que pour $X \sim \mathcal{B}(n, p) : E[X(X-1)] = n(n-1)p^2$.
2. En déduire $E(X^2) = n(n-1)p^2 + np$.
3. Montrer que $V(X) = np(1-p)$.
4. Vérifier pour $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{3})$.

Exercice 39 ◆

Une variable X vaut 1 avec probabilité $\frac{2}{5}$ et 0 avec probabilité $\frac{3}{5}$.

1. Calculer $E(X)$ directement à partir de la loi.
2. Calculer $V(X)$ avec la formule de König-Huygens.

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 40 ◆◆

Un contrôle qualité porte sur 50 pièces. Le taux de défaut est 10 %. Soit X le nombre de pièces défectueuses.

1. Quelle loi suit X ?
2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
3. En moyenne, combien de pièces défectueuses trouve-t-on?

Exercice 41 ◆

Un joueur paie 2 euros pour lancer un dé. S'il obtient un 6, il reçoit 7 euros. Sinon, il ne reçoit rien. Soit G le gain algébrique.

1. Dresser le tableau de loi de G .
2. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable au joueur?

Exercice 42 ◆

Un assureur propose un contrat : prime annuelle 40 euros, remboursement 500 euros en cas de sinistre. La probabilité de sinistre est $\frac{1}{20}$.

1. Soit B le bénéfice de l'assureur par contrat. Dresser le tableau de loi de B .
2. Calculer $E(B)$. Le contrat est-il rentable pour l'assureur?

Exercice 43 ◆◆

On lance deux dés. Si l'on obtient un double (deux résultats identiques), on gagne 18 euros. Sinon, on ne gagne rien.

1. Calculer la probabilité d'obtenir un double.
2. Soit m la mise. Exprimer $E(G)$ en fonction de m où G est le gain algébrique.
3. Quelle mise rend le jeu équitable?

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 44 ◆◆

Un lot contient 3 % de pièces défectueuses. On prélève 5 pièces. Le lot est refusé si au moins une pièce est défectueuse.

1. Quelle loi suit le nombre X de pièces défectueuses?
2. Calculer la probabilité que le lot soit accepté.

3. Calculer la probabilité que le lot soit refusé.

Exercice 45

On lance une pièce équilibrée. Si Pile, on gagne 3 euros. Si Face, on perd 2 euros.

1. Dresser le tableau de loi du gain G .
2. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable?
3. Après 100 parties, quel gain total moyen espère-t-on?

Exercice 46

On paie 5 euros pour lancer 3 dés. Pour chaque 6 obtenu, on reçoit 10 euros. Soit X le nombre de 6 et $G = 10X - 5$ le gain algébrique.

1. À l'aide de l'arbre des trois lancers, déterminer la loi de X .
2. Dresser le tableau de loi de G .
3. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il équitable?
4. Calculer $V(G)$ et $\sigma(G)$.

Exercice 47

Un assureur couvre un risque automobile. En cas de sinistre (probabilité $\frac{1}{50}$), il verse 5 000 euros.

1. Quelle prime annuelle minimale doit-il fixer pour que le contrat soit rentable en moyenne?
2. S'il fixe la prime à 150 euros et vend 1 000 contrats, quel est son bénéfice moyen?

Exercice 48

Un entrepreneur hésite à investir 10 000 euros dans un projet. Avec probabilité 0,6, le projet réussit et rapporte 8 000 euros de bénéfice. Avec probabilité 0,4, il échoue et l'investissement est perdu.

1. Définir la variable aléatoire G (gain algébrique) et dresser sa loi.
2. Calculer $E(G)$. L'investissement est-il intéressant en moyenne?
3. Calculer $\sigma(G)$. Commenter le risque.
4. Si l'entrepreneur peut répartir son investissement sur 5 projets indépendants identiques (2 000 euros chacun, gain proportionnel), est-ce une meilleure stratégie?

Approfondissement — Vers la Terminale

Exercice 49

Un vaccin a une efficacité de 90 %. On vaccine 8 personnes. Soit X le nombre de personnes effectivement protégées.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(8, 0,9)$.
2. Calculer $P(X = 8)$ (toutes protégées).
3. Calculer $E(X)$.

Exercice 50

On dispose de deux urnes. L'urne A contient 3 boules rouges et 2 bleues. L'urne B contient 1 boule rouge et 4 bleues. On choisit une urne au hasard (probabilité $\frac{1}{2}$ chacune), puis on tire une boule.

Le joueur paie 1 euro. S'il tire une boule rouge, il reçoit 4 euros. Sinon, il ne reçoit rien.

1. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge (formule des probabilités totales).
2. Dresser le tableau de loi du gain algébrique G .
3. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable ?
4. Le joueur peut-il choisir l'urne ? Si oui, laquelle choisir ?

Coup de pouce 1. Pour chaque face du dé, la probabilité est $\frac{1}{6}$. Pour $P(X \leq 3)$, additionne les probabilités des valeurs 1, 2 et 3.

Coup de pouce 1. Liste les issues PP, PF, FP, FF . Compte combien donnent $X = 0, X = 1$ et $X = 2$.

Coup de pouce 1. Il y a $2^3 = 8$ issues possibles. Pour $X = 1$, repère les issues avec exactement un P parmi trois positions.

Coup de pouce 1. Sur la première branche, les probabilités sont $\frac{3}{5}$ pour rouge et $\frac{2}{5}$ pour bleue. Au second tirage, il ne reste que quatre boules.

Coup de pouce 1. L'espérance est la moyenne pondérée : multiplie chaque valeur par sa probabilité et additionne.

Coup de pouce 1. Pour $V(X)$, calcule d'abord $E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$, puis applique $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

Coup de pouce 1. Pour $E(X^2)$, calcule $1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} + \dots + 6^2 \times \frac{1}{6}$.

Coup de pouce 1. Écris $X = X_1 + X_2$, où X_i vaut 1 si la pièce i donne Pile et 0 sinon, puis utilise la linéarité de l'espérance.

Approfondissement — Vers la Terminale.

Coup de pouce 1. Utilise $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ avec $n = 5, p = \frac{1}{2}, k = 3$.

Approfondissement — Vers la Terminale.

Coup de pouce 1. Chaque question est une épreuve de Bernoulli ($p = \frac{1}{4}$). Le coefficient $\binom{10}{5}$ se lit dans le triangle de Pascal ou se calcule.

Approfondissement — Vers la Terminale.

Coup de pouce 1. Pour $P(X = 0)$, tous les n tirages sont des échecs : $(1-p)^n$.

Approfondissement — Vers la Terminale.

Coup de pouce 1. Applique directement $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$.

Approfondissement — Vers la Terminale.

Coup de pouce 1. Utilise $1-p = \frac{V(X)}{E(X)}$ pour trouver p , puis $n = \frac{E(X)}{p}$.

Coup de pouce 1. Le gain algébrique = somme reçue – mise. Si le joueur ne reçoit rien, $G = 0 - 2 = -2$.

Coup de pouce 1. Un double : $(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)$, soit 6 issues sur 36.

Coup de pouce 1. Le gain est +3 si Pile et -2 si Face. Multiplie chaque gain par $\frac{1}{2}$ et additionne.

Coup de pouce 1. Condition de rentabilité : $E(B) = c - pI \geq 0$, donc $c \geq pI$.

Coup de pouce 1. Utilise la formule des probabilités totales : $P(R) = P(R|A)P(A) + P(R|B)P(B)$.

TD contextualisé — Le jeu du stand forain

Mise en situation

À une fête foraine, un stand propose le jeu suivant. On lance deux dés équilibrés et on paie 2 euros pour jouer.

- ▶ Si l'on obtient un double 6, on gagne 50 euros.
- ▶ Si l'on obtient exactement un seul 6 (parmi les deux dés), on gagne 5 euros.
- ▶ Sinon, on ne gagne rien.

Partie A — Construction de la loi du gain

Exercice 51 ♦

1. Parmi les 36 issues équiprobables du lancer de deux dés, combien donnent un double 6 ? Combien donnent exactement un seul 6 ? Combien ne donnent aucun 6 ?
2. On note G le gain algébrique du joueur (gain reçu moins mise). Quelles sont les valeurs possibles de G ?
3. Construire le tableau de loi de G . Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
4. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable au joueur ?
5. Si 100 personnes jouent, quel bénéfice moyen le forain peut-il espérer ?

Partie B — Modification des règles

Exercice 52 ♦♦

1. Le forain veut rendre le jeu équitable. Quelle mise m doit-il fixer pour que $E(G) = 0$?
2. Le forain veut garder la mise à 2 euros mais modifier le gain en cas de double 6. Quel montant M rend le jeu équitable ?
3. Calculer la variance et l'écart type de G avec les règles initiales. Interpréter.

TD fil rouge — L'assurance smartphone

Approfondissement — Vers la Terminale

Rappel de la situation

Un assureur propose un contrat annuel couvrant la casse d'un smartphone.

- ▶ Prime annuelle : 50 euros.
- ▶ Remboursement en cas de casse : 300 euros.
- ▶ Probabilité de casse dans l'année : $p = \frac{1}{10}$.

Partie A — Du point de vue de l'assuré

Exercice 53 ♦

1. Soit X le gain de l'assuré (remboursement éventuel moins la prime). Quelles sont les valeurs possibles de X ?
2. Déterminer la loi de probabilité de X (tableau de loi).
3. Calculer $E(X)$. Interpréter : le contrat est-il avantageux pour l'assuré ?
4. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$. Que signifie un écart type élevé pour l'assuré ?

Partie B — Du point de vue de l'assureur (1000 contrats)

Exercice 54 ♦♦

L'assureur vend 1000 contrats identiques. On note Y le nombre de sinistres parmi les 1000 assurés.

1. Justifier que $Y \sim \mathcal{B}(1000, \frac{1}{10})$.
2. Calculer $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.
3. Le bénéfice total de l'assureur est $B = 1000 \times 50 - 300 \times Y$. Calculer $E(B)$.
4. Interpréter : combien l'assureur espère-t-il gagner en moyenne ?
5. Pour que l'assureur ait un bénéfice positif, il faut $B > 0$, soit $Y < \frac{50\,000}{300} \approx 166,7$. Commenter : est-ce probable ?
6. Quelle prime minimale c doit-il fixer pour que $E(B) \geq 0$? Retrouver la condition $c \geq pI$.

Partie C — Approfondissement

Exercice 55 ◆◆◆

1. L'assureur envisage de couvrir aussi le vol (probabilité $\frac{1}{20}$, indépendant de la casse, indemnité 200 euros). Soit Z le nombre total d'indemnisations parmi 1000 contrats. Z suit-elle une loi binomiale ? Justifier.
2. Proposer un modèle simplifié et calculer la prime minimale pour que le contrat reste rentable.

VARIABLES ALÉATOIRES — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] On lance un dé équilibré. Soit X le résultat. Quelle est $P(X = 3)$?
 A. $\frac{1}{6}$
 B. $\frac{1}{3}$
 C. $\frac{3}{6}$
 D. $\frac{1}{5}$
2. [Q2] La somme des probabilités d'un tableau de loi vaut toujours :
 A. 0
 B. 1
 C. $\frac{1}{2}$
 D. Le nombre de valeurs prises par X
3. [Q3] On lance deux pièces. Soit X le nombre de Pile. Quelle est $P(X = 1)$?
 A. $\frac{1}{4}$
 B. $\frac{1}{3}$
 C. $\frac{1}{2}$
 D. $\frac{3}{4}$

Capacité C2

4. [Q4] On lance un dé équilibré. Quelle est l'espérance $E(X)$ du résultat ?
 A. 3
 B. 6
 C. 4
 D. 3,5
5. [Q5] Si $V(X) = 9$, alors $\sigma(X)$ vaut :
 A. 3
 B. 9
 C. 81
 D. 4,5

6. [Q6] Si $E(X) = 4$ et $V(X) = 5$, quelle est $E(X^2)$?

- A. 9
- B. 21
- C. 16
- D. 20

Capacité C3

7. [Q7] On répète trois fois, de façon indépendante, une épreuve dont le succès a probabilité $\frac{1}{2}$. Quelle est la probabilité d'obtenir trois succès ?

- A. $\frac{1}{6}$
- B. $\frac{3}{8}$
- C. $\frac{1}{8}$
- D. $\frac{1}{2}$

8. [Q8] On répète deux fois, de façon indépendante, une épreuve dont le succès a probabilité $\frac{1}{3}$. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement un succès ?

- A. $\frac{2}{9}$
- B. $\frac{2}{3}$
- C. $\frac{1}{9}$
- D. $\frac{4}{9}$

9. [Q9] Une épreuve a deux issues. On la répète trois fois. Combien l'arbre complet possède-t-il de chemins terminaux ?

- A. 8
- B. 3
- C. 6
- D. 9

Capacité C4

10. [Q10] On sait que $E(X) = 4$ et on pose $Y = 3X - 2$. Quelle est $E(Y)$?

- A. 12
- B. 10
- C. 6
- D. 2

11. [Q11] On sait que $E(X) = 5$ et on pose $Y = -2X + 7$. Quelle est $E(Y)$?

- A. -10
- B. 17
- C. -3
- D. 12

12. [Q12] On sait que $E(X) = -3$ et on pose $Y = -4X + 1$. Quelle est $E(Y)$?

- A. -13
- B. -2
- C. -11
- D. 13

Capacité C5

13. [Q13] Un joueur paie 3 euros et reçoit 15 euros s'il obtient un 6 au dé. Gain algébrique si 6 ?

- A. 12 euros
- B. 15 euros
- C. 3 euros
- D. 18 euros

14. [Q14] Un jeu a un gain moyen $E(G) = -0,5$ euro. Le jeu est :

- A. Équitable
- B. Défavorable au joueur
- C. Favorable au joueur

D. Impossible a déterminer

15. [Q15] Prime $c = 60$ euros, sinistre 1000 euros, probabilité $1/25$. Bénéfice moyen ?

- A. 60 euros
- B. -40 euros
- C. 20 euros
- D. 40 euros

Capacité C6

16. [Q16] Dans la fonction `simuler_variable(n, graine)` du chapitre, que designe n ?

- A. Le nombre de valeurs prises par X
- B. La graine du generateur
- C. Le nombre d'échantillons simulés
- D. La taille de l'échantillon simulé

17. [Q17] Une fonction renvoie la moyenne d'un échantillon de taille n dont la somme est stockée dans `somme`. Quelle ligne faut-il écrire ?

- A. `return somme / n`
- B. `return somme`
- C. `return somme / len(VALEURS)`
- D. `return n / somme`

18. [Q18] La loi vaut $P(X = -2) = 0,2$, $P(X = 1) = 0,5$, $P(X = 4) = 0,3$ et on partage $[0; 1[$ dans cet ordre. Quelle valeur la simulation renvoie-t-elle pour $u = 0,55$?

- A. -2
- B. 1
- C. 4
- D. 0,55

Capacité C7

19. [Q19] Pour la variable du chapitre, $\mu = 1,3$ et $\sigma = 2,1$. Pour un échantillon de taille $n = 100$, que vaut $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$?

- A. 0,21
- B. 4,2
- C. 0,42
- D. 2,1

20. [Q20] On simule des échantillons de taille n de plus en plus grande. L'écart typique entre la moyenne m d'un échantillon et l'espérance μ :

- A. augmente
- B. devient nul dès que $n > 30$
- C. reste constant
- D. diminue

21. [Q21] On simule N échantillons de taille n et on compte ceux pour lesquels $|m - \mu| \leq \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$. La proportion observée est proche de :

- A. 95 %
- B. 50 %
- C. 100 %
- D. 5 %

Clé de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	A
Q2	C1	B
Q3	C1	C
Q4	C2	D
Q5	C2	A
Q6	C2	B
Q7	C3	C
Q8	C3	D
Q9	C3	A
Q10	C4	B
Q11	C4	C
Q12	C4	D
Q13	C5	A
Q14	C5	B
Q15	C5	C
Q16	C6	D
Q17	C6	A
Q18	C6	B
Q19	C7	C
Q20	C7	D
Q21	C7	A

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- B — L'élève divise 1 par la valeur de X au lieu du nombre de faces. *Renvoi : C1, définition.*
- C — L'élève confond $P(X=3)$ et $P(X \leq 3)$. *Renvoi : C1, loi de probabilité.*
- D — L'élève divise par le nombre de faces restantes (5) au lieu du nombre total de faces (6).
Renvoi : C1, dénombrement des issues possibles.

► Q2

- A — L'élève retient seulement la borne inférieure 0 de chaque probabilité au lieu de sommer toutes les probabilités de la loi. *Renvoi : C1, propriété.*
- C — L'élève suppose à tort que la somme vaut 1/2 parce qu'il imagine deux issues équiprobables, alors que la somme d'une loi complète vaut 1. *Renvoi : C1, propriété.*
- D — Confusion entre somme des probabilités et cardinal de $X(\Omega)$. *Renvoi : C1, propriété.*

► Q3

- A — L'élève ne compte qu'une seule issue (PF ou FP) au lieu des deux. *Renvoi : C1, construction loi.*
- B — L'élève divise par 3 valeurs au lieu de 4 issues. *Renvoi : C1, construction loi.*
- D — L'élève calcule $P(X \geq 1)$ au lieu de $P(X=1)$. *Renvoi : C1, loi de probabilité.*

► Q4

- A — L'élève moyenne seulement les faces 1 à 5 : $(1+2+3+4+5)/5=3$, en oubliant la face 6.
Renvoi : C2, espérance.
- B — Confusion espérance et valeur maximale. *Renvoi : C2, espérance.*
- C — L'élève moyenne seulement les faces 2 à 6 : $(2+3+4+5+6)/5=4$, en oubliant la face 1.
Renvoi : C2, espérance.

► Q5

- B — L'élève confond variance et écart type. *Renvoi : C2, écart type.*
- C — L'élève met V au carré au lieu de prendre la racine. *Renvoi : C2, écart type.*
- D — L'élève divise V par 2. *Renvoi : C2, écart type.*

► Q6

- A — L'élève calcule $E(X) + V(X) = 9$. Renvoi : C2, Koenig-Huygens.
- C — L'élève donne $[E(X)]^2 = 16$. Renvoi : C2, Koenig-Huygens.
- D — L'élève calcule $E(X) \cdot V(X)$. Renvoi : C2, Koenig-Huygens.

► Q7

- A — L'élève divise 1 par deux fois le nombre d'épreuves, au lieu de multiplier les trois probabilités du chemin SSS. Renvoi : C3, arbre pondéré.
- B — L'élève compte trois positions possibles pour un échec ; il calcule ainsi la probabilité d'exactement deux succès. Renvoi : C3, nombre de succès.
- D — L'élève conserve la probabilité d'un seul succès et ne multiplie pas le long des trois branches du chemin SSS. Renvoi : C3, arbre pondéré.

► Q8

- A — L'élève calcule la probabilité d'un seul chemin, succès puis échec, et oublie le chemin échec puis succès. Renvoi : C3, arbre pondéré.
- B — L'élève additionne $1/3$ et $1/3$ au lieu de multiplier sur chaque chemin puis d'additionner les deux chemins favorables. Renvoi : C3, arbre pondéré.
- C — L'élève calcule la probabilité de deux succès : $(1/3)^2 = 1/9$. Renvoi : C3, nombre de succès.

► Q9

- B — L'élève donne le nombre de niveaux de l'arbre au lieu du nombre de chemins terminaux. Renvoi : C3, arbre pondéré.
- C — L'élève calcule 2 fois 3, alors que le nombre de chemins double à chaque niveau. Renvoi : C3, arbre pondéré.
- D — L'élève calcule 3 au carré, comme s'il y avait trois issues par épreuve au lieu de deux. Renvoi : C3, arbre pondéré.

► Q10

- A — L'élève calcule $3E(X)$ mais oublie le terme constant -2. Renvoi : C4, linéarité.
- C — L'élève calcule $2E(X) - 2$ en utilisant 2 comme coefficient de X. Renvoi : C4, linéarité.
- D — L'élève soustrait seulement 2 à $E(X)$ et oublie la multiplication par 3. Renvoi : C4, linéarité.

► Q11

- A — L'élève calcule $-2E(X) = -10$ mais oublie d'ajouter le terme constant 7. Renvoi : C4, linéarité.
- B — L'élève remplace le coefficient -2 par 2 et calcule $2E(X) + 7 = 17$. Renvoi : C4, linéarité.
- D — L'élève calcule $E(X) + 7 = 12$ et oublie le coefficient -2 devant X. Renvoi : C4, linéarité.

► Q12

- A — L'élève calcule $4E(X) - 1 = 4$ fois $(-3) - 1 = -13$ en changeant les deux signes de l'expression. Renvoi : C4, linéarité.
- B — L'élève calcule $E(X) + 1 = -2$ et oublie le coefficient -4 devant X. Renvoi : C4, linéarité.
- C — L'élève remplace le coefficient -4 par 4 et calcule $4E(X) + 1 = -11$. Renvoi : C4, linéarité.

► Q13

- B — Oubli de la mise dans le gain algébrique. Renvoi : C5, gain algébrique.
- C — Confusion mise et gain. Renvoi : C5, gain algébrique.
- D — Addition mise + gain brut. Renvoi : C5, gain algébrique.

► Q14

- A — Confusion $E(G) = 0$ (équitable) et $E(G) < 0$. Renvoi : C5, jeu équitable.
- C — Signe de $E(G)$ inverse. Renvoi : C5, interprétation espérance.
- D — L'élève pense que l'espérance ne suffit pas. Renvoi : C5, interprétation espérance.

► Q15

- A — L'élève donne la prime sans soustraire l'espérance du sinistre. Renvoi : C5, assurance.
- B — L'élève donne l'opposé du coût moyen du sinistre, $-pI = -40$, sans ajouter la prime de 60 euros. Renvoi : C5, assurance.
- D — L'élève calcule correctement le coût moyen du sinistre $pI = 40$ mais le confond avec le bénéfice moyen $c - pI$. Renvoi : C5, assurance.

► Q16

- **A** — L'élève confond la taille de l'échantillon avec le nombre de valeurs de la loi. *Renvoi : C6, taille d'un échantillon.*
- **B** — L'élève confond le paramètre de taille et la graine de reproductibilité. *Renvoi : C6, rôle de la graine.*
- **C** — L'élève confond n (taille d'un échantillon) et N (nombre d'échantillons). *Renvoi : C7, N échantillons.*

► **Q17**

- **B** — L'élève renvoie la somme et non la moyenne : il oublie de diviser. *Renvoi : C6, moyenne d'un échantillon.*
- **C** — L'élève divise par le nombre de valeurs de la loi au lieu de la taille de l'échantillon. *Renvoi : C6, taille d'un échantillon.*
- **D** — L'élève inverse le quotient. *Renvoi : C6, moyenne d'un échantillon.*

► **Q18**

- **A** — L'élève s'arrête au premier intervalle sans cumuler les probabilités. *Renvoi : C6, simulation par intervalles cumules.*
- **C** — L'élève compare u à la dernière probabilité au lieu du cumul. *Renvoi : C6, simulation par intervalles cumules.*
- **D** — L'élève renvoie le nombre tiré au hasard au lieu de la valeur de X associée. *Renvoi : C6, simuler une variable aléatoire.*

► **Q19**

- **A** — L'élève oublie le facteur 2 au numérateur. *Renvoi : C7, seuil 2 sigma sur racine de n .*
- **B** — L'élève oublie de diviser par racine de n . *Renvoi : C7, seuil 2 sigma sur racine de n .*
- **D** — L'élève renvoie sigma sans appliquer la formule. *Renvoi : C7, fluctuation des moyennes.*

► **Q20**

- **A** — L'élève pense que davantage de tirages disperse davantage la moyenne. *Renvoi : C7, fluctuation des moyennes.*
- **B** — L'élève croit à un seuil au-delà duquel la fluctuation disparaît. *Renvoi : C7, fluctuation des moyennes.*
- **C** — L'élève ne relie pas la dispersion de la moyenne à la taille de l'échantillon. *Renvoi : C7, fluctuation des moyennes.*

► **Q21**

- **B** — L'élève confond la proportion attendue avec une chance sur deux. *Renvoi : C7, proportion dans l'intervalle 2 sigma.*
- **C** — L'élève croit l'encadrement toujours vérifie. *Renvoi : C7, proportion dans l'intervalle 2 sigma.*
- **D** — L'élève donne la proportion des cas hors de l'intervalle. *Renvoi : C7, proportion dans l'intervalle 2 sigma.*

Corrigé

Exercice 1**(8 points) — C1, C2**

Barème indicatif : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 1 pt

Question 1 — Tableau de loi.

x_i	1	3	10
$P(X = x_i)$	$\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Vérification : $\frac{1}{2} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$. ✓**Question 2 — Espérance.**

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{3}{8} + 10 \times \frac{1}{8} = \frac{4+9+10}{8} = \frac{23}{8} = 2,875.$$

En moyenne, le gain par tirage est de 2,875 euros.

Question 3 — $E(X^2)$.

$$E(X^2) = 1 \times \frac{1}{2} + 9 \times \frac{3}{8} + 100 \times \frac{1}{8} = \frac{4+27+100}{8} = \frac{131}{8}.$$

Question 4 — Variance et écart type.

$$V(X) = \frac{131}{8} - \left(\frac{23}{8}\right)^2 = \frac{131}{8} - \frac{529}{64} = \frac{1048-529}{64} = \frac{519}{64} \approx 8,11.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{519}{64}} \approx 2,85.$$

Question 5 — Gain algébrique.

$$E(G) = E(X) - 3 = \frac{23}{8} - 3 = -\frac{1}{8} = -0,125.$$

$E(G) < 0$: le jeu est défavorable au joueur.

Exercice 2

(7 points) — C2, C3

Question 1. L'arbre comporte trois niveaux. À chaque nœud, la branche « atteint » porte $\frac{1}{3}$ et la branche « manque » $\frac{2}{3}$.

Question 2. $P(X = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$.

Question 3. Les trois chemins « atteint, atteint, manque » et ses deux permutations ont chacun pour probabilité $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{27}$. Donc $P(X = 2) = 3 \times \frac{2}{27} = \frac{2}{9}$.

Question 4.

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{8}{27}$	$\frac{12}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{1}{27}$

Ainsi $E(X) = 1$ et $E(X^2) = \frac{5}{3}$, donc $V(X) = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3}$.

Question 5. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}$.

Exercice 3

(5 points) — C5

Question 1. Doubles : $(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)$, soit 6 sur 36 : $P = \frac{1}{6}$.

Question 2. $G = 15 - 3 = 12$ si double $\left(\frac{1}{6}\right)$, $G = -3$ sinon $\left(\frac{5}{6}\right)$.

g_i	-3	12
$P(G = g_i)$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

Question 3. $E(G) = 12 \times \frac{1}{6} + (-3) \times \frac{5}{6} = 2 - \frac{5}{2} = -\frac{1}{2}$.

$E(G) = -0,5 < 0$: le jeu est défavorable au joueur.

Évaluation 1SPE-VARALEA-EV-A 55 min

Exercice 1

(8 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules bleues et 1 boule verte. On tire une boule au hasard. Le gain associé est : 1 euro si rouge, 3 euros si bleue, 10 euros si verte. Soit X le gain.

1. Dresser le tableau de loi de X . (2 pts — calculer)
2. Calculer $E(X)$. Interpréter. (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer $E(X^2)$. (1 pt — calculer)
4. En déduire $V(X)$ et $\sigma(X)$. (2 pts — calculer)
5. Le joueur paie 3 euros pour jouer. Soit $G = X - 3$ son gain algébrique. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable? (1 pt — raisonner)

Exercice 2**(7 points)****Capacités C2, C3***Compétences évaluées : calculer, raisonner.*

Un tireur atteint sa cible avec une probabilité $\frac{1}{3}$ à chaque tir. Il effectue 3 tirs indépendants. Soit X le nombre de cibles atteintes.

1. Construire l'arbre pondéré des trois tirs. (1 pt — raisonner)
2. Calculer $P(X = 0)$ (aucune cible atteinte). (1 pt — calculer)
3. Calculer $P(X = 2)$ en repérant les chemins favorables. (2 pts — calculer)
4. Dresser la loi de X , puis calculer $E(X)$ et $V(X)$ à partir de cette loi. (2 pts — calculer)
5. En déduire $P(X \geq 1)$. (1 pt — calculer)

Exercice 3**(5 points)****Capacité C5***Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.*

On lance deux dés. Si l'on obtient un double (deux résultats identiques), on reçoit 15 euros. La mise est de 3 euros.

1. Calculer la probabilité d'obtenir un double. (1 pt — calculer)
2. Définir la variable aléatoire G (gain algébrique) et dresser son tableau de loi. (2 pts — modéliser)
3. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il équitable? Favorable? Défavorable? (2 pts — calculer, communiquer)

Corrigé**Exercice 1****(8 points) — C1, C2, C4****Question 1 — Tableau de loi.**

x_i	2	5	8
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

Question 2 — Espérance.

$$E(X) = 2 \times \frac{1}{2} + 5 \times \frac{3}{10} + 8 \times \frac{1}{5} = 1 + \frac{3}{2} + \frac{8}{5} = \frac{10+15+16}{10} = \frac{41}{10} = 4,1.$$

En moyenne, on obtient 4,1 points par tirage.

Question 3 — Variance et écart type.

$$E(X^2) = 4 \times \frac{1}{2} + 25 \times \frac{3}{10} + 64 \times \frac{1}{5} = 2 + \frac{15}{2} + \frac{64}{5} = \frac{20+75+128}{10} = \frac{223}{10}.$$

$$V(X) = \frac{223}{10} - \left(\frac{41}{10}\right)^2 = \frac{2230-1681}{100} = \frac{549}{100} = 5,49.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{5,49} \approx 2,34.$$

Question 4.

$$E(Y) = 2E(X) - 3 = 2 \times 4,1 - 3 = 5,2.$$

Exercice 2

(7 points) — C2, C3

Question 1. L'arbre comporte quatre niveaux. À chaque nœud, la branche « réussi » porte $\frac{1}{4}$ et la branche « manqué » $\frac{3}{4}$.

Question 2. $P(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{256}$.

Question 3. Chacun des quatre chemins comportant exactement une réussite a pour probabilité $\frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{256}$. Donc $P(X = 1) = 4 \times \frac{27}{256} = \frac{27}{64}$.

Question 4.

x	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	$\frac{81}{256}$	$\frac{108}{256}$	$\frac{54}{256}$	$\frac{12}{256}$	$\frac{1}{256}$

On obtient $E(X) = 1$, $E(X^2) = \frac{7}{4}$, donc $V(X) = \frac{3}{4}$ et $\sigma(X) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Question 5. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{81}{256} = \frac{175}{256}$.

Exercice 3

(5 points) — C5

Question 1. Pas de sinistre : $B = 80$. Sinistre : $B = 80 - 2000 = -1920$.

Question 2.

b_i	-1920	80
$P(B = b_i)$	$\frac{1}{50}$	$\frac{49}{50}$

Question 3. $E(B) = 80 - 2000 \times \frac{1}{50} = 80 - 40 = 40$ euros.

$E(B) > 0$: le contrat est rentable pour l'assureur.

Question 4. Bénéfice total moyen : $500 \times 40 = 20\,000$ euros.

Évaluation 1SPE-VARALEA-EV-B 55 min

Exercice 1

(8 points)

Capacités C1, C2, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

Un sac contient 5 bonbons rouges (2 points chacun), 3 bonbons jaunes (5 points) et 2 bonbons verts (8 points). On tire un bonbon au hasard. Soit X le nombre de points.

1. Dresser le tableau de loi de X . (2 pts — calculer)
2. Calculer $E(X)$. Interpréter. (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$. (3 pts — calculer)
4. On pose $Y = 2X - 3$. Calculer $E(Y)$ par linéarité de l'espérance. (1 pt — calculer)

Exercice 2

(7 points)

Capacités C2, C3

Compétences évaluées : calculer, raisonner.

Un joueur de basket réussit un lancer franc avec probabilité $\frac{1}{4}$. Il effectue 4 lancers indépendants. Soit X le nombre de lancers réussis.

1. Construire l'arbre pondéré des quatre lancers. (1 pt — raisonner)
2. Calculer $P(X = 0)$. (1 pt — calculer)
3. Calculer $P(X = 1)$ en repérant les quatre chemins favorables. (2 pts — calculer)
4. Dresser la loi de X , puis calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$ à partir de cette loi. (2 pts — calculer)
5. Calculer $P(X \geq 1)$. (1 pt — calculer)

Exercice 3

(5 points)

Capacité C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un assureur propose un contrat annuel : prime de 80 euros. En cas de sinistre (probabilité $\frac{1}{50}$), il verse 2 000 euros.

1. Soit B le bénéfice de l'assureur par contrat. Quelles sont les valeurs de B ? (1 pt — modéliser)
2. Dresser le tableau de loi de B . (1 pt — calculer)
3. Calculer $E(B)$. Le contrat est-il rentable? (2 pts — calculer, communiquer)
4. Pour 500 contrats, quel bénéfice total moyen l'assureur espère-t-il? (1 pt — calculer)

Rappel — Probabilités de base

Expérience aléatoire : expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat.

Univers Ω : ensemble de toutes les issues possibles.

Événement : sous-ensemble de Ω . La probabilité d'un événement A vérifie $0 \leq P(A) \leq 1$ et $P(\Omega) = 1$.

Équiprobabilité : si toutes les issues sont également probables, $P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.

Exercice 56

On lance un dé équilibré à 6 faces.

1. Quel est l'univers Ω ?
2. Calculer $P(\text{obtenir un nombre pair})$.
3. Calculer $P(\text{obtenir un nombre supérieur à 4})$.

Corrigé

1. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 2. Nombres pairs : $\{2, 4, 6\}$, donc $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. 3. Supérieurs à 4 : $\{5, 6\}$, donc $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Rappel — Probabilités conditionnelles

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ si $P(B) > 0$.

Formule des probabilités totales : si $B_1, \dots, B_n$ forment une partition de Ω :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

Indépendance : A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Exercice 57 ◆

Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire deux boules successivement sans remise.

1. Calculer la probabilité que la première boule soit rouge.
2. Sachant que la première est rouge, calculer la probabilité que la deuxième soit rouge.

Corrigé

$$1. P(R_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}. \quad 2. P(R_2|R_1) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Approfondissement — Vers la Terminale

Rappel — Combinatoire de base

Nombre de façons de choisir k éléments parmi n (sans ordre) : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Rappel : $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$ et $0! = 1$.

Exercice 58 ◆

1. Calculer $\binom{4}{2}$ et $\binom{5}{3}$.
2. De combien de façons peut-on choisir 3 élèves parmi 7 ?

Corrigé

$$1. \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6. \quad \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = 10. \quad 2. \binom{7}{3} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3!} = \frac{210}{6} = 35.$$

Rappel — Suites et sommes

Somme des entiers : $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Notation sigma : $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

Somme géométrique : $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ si $q \neq 1$.

Exercice 59 ◆

1. Calculer $\sum_{k=1}^5 k$.
2. Calculer $\sum_{k=0}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^k$.

Corrigé

$$1. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. \quad 2. 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{16+8+4+2+1}{16} = \frac{31}{16}.$$

Rappel — Puissances

Règles :

► $a^m \times a^n = a^{m+n}$

- ▶ $(a^m)^n = a^{mn}$
- ▶ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
- ▶ $a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$)

Exercice 60

Calculer :

1. $\left(\frac{1}{2}\right)^4$
2. $\left(\frac{3}{4}\right)^2$
3. $2^3 \times 2^4$
4. $\left(\frac{2}{3}\right)^0$

Corrigé

1. $\frac{1}{16}$.
2. $\frac{9}{16}$.
3. $2^7 = 128$.
4. 1.

Exercice 61

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Soit X le nombre de points associé : 1 pour un As, 7 pour un 7, 8 pour un 8, 9 pour un 9, 10 pour un 10, Valet, Dame, Roi.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Combien de cartes donnent chaque valeur?
3. Dresser le tableau de loi de X .

Corrigé

1. $X \in \{1, 7, 8, 9, 10\}$.
2. 4 As, 4 sept, 4 huit, 4 neuf, 16 figures/dix.
- 3.

x_i	1	7	8	9	10
$P(X = x_i)$	$\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{16}{32} = \frac{1}{2}$

Vérification : $4 \times \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. ✓

Exercice 62Soit X la variable aléatoire de loi :

x_i	0	1	4
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

1. Calculer $E(X)$ pas à pas.
2. Calculer $E(X^2)$.
3. En déduire $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Corrigé

1. $E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$.
2. $E(X^2) = 0 + 1 \times \frac{1}{2} + 16 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + 4 = \frac{9}{2}$.
3. $V(X) = \frac{9}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{2} - \frac{9}{4} = \frac{9}{4}$. $\sigma(X) = \frac{3}{2} = 1,5$.

Exercice 63

On joue 3 fois à pile ou face avec une pièce équilibrée, de façon indépendante. Soit X le nombre de Pile.

1. Construire l'arbre des trois lancers.

- En regroupant les chemins selon le nombre de Pile, calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ et $P(X = 3)$.
- Vérifier que $\sum P(X = k) = 1$.

Corrigé

1. L'arbre a trois niveaux et huit chemins, chacun de probabilité $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$. 2. Un chemin comporte zéro Pile, trois en comportent un, trois en comportent deux et un en comporte trois. Ainsi $P(X = 0) = \frac{1}{8}$, $P(X = 1) = \frac{3}{8}$, $P(X = 2) = \frac{3}{8}$ et $P(X = 3) = \frac{1}{8}$. 3. $\frac{1+3+3+1}{8} = 1$. ✓

Exercice 64

Une variable aléatoire X vérifie $E(X) = 3$. On pose $Y = 2X - 5$.

- Calculer $E(Y)$.
- On pose $Z = -X + 4$. Calculer $E(Z)$.
- On pose $T = 5 - 3X$. Calculer $E(T)$.

Corrigé

1. $E(Y) = 2E(X) - 5 = 2 \times 3 - 5 = 1$. 2. $E(Z) = -E(X) + 4 = -3 + 4 = 1$. 3. $E(T) = 5 - 3E(X) = 5 - 3 \times 3 = -4$.

Exercice 65

Un jeu consiste à tirer une boule dans une urne contenant 5 boules : 2 gagnantes et 3 perdantes. La mise est 1 euro. Si la boule est gagnante, on reçoit 3 euros.

- Définir la variable aléatoire G (gain algébrique) et ses valeurs.
- Dresser le tableau de loi de G .
- Calculer $E(G)$ et conclure.

Corrigé

1. $G = 3 - 1 = 2$ (boule gagnante) ou $G = 0 - 1 = -1$ (boule perdante). 2.

g_i	-1	2
$P(G = g_i)$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$

3. $E(G) = 2 \times \frac{2}{5} + (-1) \times \frac{3}{5} = \frac{4-3}{5} = \frac{1}{5} = 0,2$. Le jeu est favorable au joueur.

Exercice 66

On reprend la loi utilisée dans les expérimentations :

x_i	-2	1	4
$P(X = x_i)$	0,2	0,5	0,3

- On partage $[0; 1]$ en trois intervalles de longueurs 0,2, 0,5 et 0,3, dans cet ordre. Quelle valeur de X obtient-on si le tirage au hasard donne $u = 0,15$? Et si $u = 0,8$?
- Un échantillon de taille $n = 5$ a donné les valeurs 1, 4, -2, 1, 1. Calculer sa moyenne m .
- Écrire, en une ligne, ce que renvoie une fonction `moyenne_echantillon(n, graine)` : la loi de X , un échantillon, ou la moyenne d'un échantillon?

Exercice 67

Pour la variable des expérimentations, $\mu = 1,3$ et $\sigma = 2,1$.

1. Calculer $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$ pour $n = 4$, puis pour $n = 49$.
2. Un échantillon de taille $n = 49$ a pour moyenne $m = 1,8$. L'écart $|m - \mu|$ est-il inférieur à $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}$?
3. On simule $N = 200$ échantillons et 186 vérifient cette condition. Quelle proportion cela représente-t-il ? Peut-on en conclure que la condition sera toujours vérifiée ?

Corrigé

1. X prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. Le dé est équilibré, donc chaque face a la probabilité $\frac{1}{6}$.

x_i	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

3. $\frac{1}{6} \times 6 = 1$. ✓
4. $P(X \leq 3) = 3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.
 $P(X \geq 5) = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

Corrigé

1. $\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$, chaque issue a probabilité $\frac{1}{4}$.
2. $X(PP) = 2, X(PF) = X(FP) = 1, X(FF) = 0$.

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

3. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Corrigé

1. X prend les valeurs 1, 3 et 5.
2. Il y a 6 boules au total.

x_i	1	3	5
$P(X = x_i)$	$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$	$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Vérification : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1$. ✓

3. $P(X \geq 3) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} = \frac{1}{2}$.

Corrigé

1. $S = 10 : (4, 6), (5, 5), (6, 4)$ soit 3 issues. $S = 11 : (5, 6), (6, 5)$ soit 2 issues. $S = 12 : (6, 6)$ soit 1 issue.

2. $P(X = 1) = P(S \geq 10) = \frac{3+2+1}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

$$P(X = 0) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

- 3.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

Corrigé

1. $\Omega = \{PPP, PPF, PFP, FPP, PFF, FPF, FFP, FFF\}$.

2. $X(PPP) = 3, X(PPF) = X(PFP) = X(FPP) = 2, X(PFF) = X(FPF) = X(FFP) = 1, X(FFF) = 0$.

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

3. $P(X \leq 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}. \quad P(X \geq 2) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}.$

4. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \checkmark$

Corrigé

1. La somme des probabilités vaut 1 :

$$P(X = 3) = 1 - 0,2 - 0,3 - 0,1 = 0,4.$$

2. $P(X \leq 2) = P(X = 1) + P(X = 2) = 0,2 + 0,3 = 0,5.$

Corrigé

1. $X \in \{0, 1, 2\}$.

2. L'arbre donne $P(X = 0) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}, P(X = 2) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$ et

$$P(X = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10} + \frac{3}{10} = \frac{3}{5}.$$

3.

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$

$$\frac{1}{10} + \frac{6}{10} + \frac{3}{10} = 1. \checkmark$$

Corrigé

1. $\{X \leq k\}$ signifie que les deux dés donnent au plus k . Chaque dé a k faces favorables sur 6, donc $P(X \leq k) = \frac{k}{6} \times \frac{k}{6} = \frac{k^2}{36}$.

2. $P(X = k) = P(X \leq k) - P(X \leq k - 1) = \frac{k^2}{36} - \frac{(k-1)^2}{36} = \frac{2k-1}{36}.$

3.

k	1	2	3	4	5	6
$P(X = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

Vérification : $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36$, donc $\sum = 1. \checkmark$

Corrigé

1.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

2. X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{2}{3} : X \sim \mathcal{B}\left(\frac{2}{3}\right).$

Corrigé

1. Si le numéro sort : $X = 36 - 1 = 35$ avec $P = \frac{1}{37}$.

Si le numéro ne sort pas : $X = -1$ avec $P = \frac{36}{37}$.

2.

x_i	-1	35
$P(X = x_i)$	$\frac{36}{37}$	$\frac{1}{37}$

Corrigé

$$1. E(X) = \sum_{k=1}^6 k \times \frac{1}{6} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}.$$

2. En moyenne, sur un grand nombre de lancers, le résultat moyen est 3,5.

Corrigé

$$E(X) = 1 \times \frac{3}{6} + 3 \times \frac{2}{6} + 5 \times \frac{1}{6} = \frac{3+6+5}{6} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3} \approx 2,33.$$

En moyenne, on gagne $\frac{7}{3} \approx 2,33$ euros par tirage.

Corrigé

$$1. E(X) = (-2) \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{4} = -\frac{1}{2} + 0 + \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$2. E(X^2) = 4 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{2} + 9 \times \frac{1}{4} = 1 + 0 + \frac{9}{4} = \frac{13}{4}.$$

$$V(X) = \frac{13}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{13}{4} - \frac{1}{16} = \frac{52-1}{16} = \frac{51}{16}.$$

$$3. \sigma(X) = \sqrt{\frac{51}{16}} = \frac{\sqrt{51}}{4} \approx 1,79.$$

Corrigé

$$1. E(X^2) = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6}.$$

$$2. V(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182-147}{12} = \frac{35}{12}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1,71.$$

3. Par linéarité de l'espérance, $E(Y) = 2E(X) - 1 = 7 - 1 = 6$.

Corrigé

$$1. E(X) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

2. $E(Y) = 10 \times \frac{1}{2} - 5 = 0$. Le jeu est équitable si la mise est $m = 5$ euros (car $Y = 10 - 5 = 5$ si Pile, $Y = 0 - 5 = -5$ si Face, et $E(Y) = 0$).

Corrigé

$$1. E(X) = 35 \times \frac{1}{37} + (-1) \times \frac{36}{37} = \frac{35-36}{37} = -\frac{1}{37} \approx -0,027.$$

2. $E(X) < 0$: le jeu est défavorable au joueur, favorable à la banque.

3. Sur 370 parties : perte moyenne = $370 \times \frac{1}{37} = 10$ euros.

Corrigé

$$1. E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} = 1.$$

$$E(X^2) = 0 + 1 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}.$$

$$V(X) = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}. \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71.$$

2. On a $X = X_1 + X_2$ et $E(X_1) = E(X_2) = \frac{1}{2}$. Par linéarité de l'espérance, $E(X) = E(X_1) + E(X_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. ✓

Corrigé

$$1. E(X) = \frac{1 \times 1 + 2 \times 3 + 3 \times 5 + 4 \times 7 + 5 \times 9 + 6 \times 11}{36} = \frac{1 + 6 + 15 + 28 + 45 + 66}{36} = \frac{161}{36} \approx 4,47.$$

$$2. E(X^2) = \frac{1 + 12 + 45 + 112 + 225 + 396}{36} = \frac{791}{36}.$$

$$V(X) = \frac{791}{36} - \left(\frac{161}{36}\right)^2 = \frac{791}{36} - \frac{25921}{1296} = \frac{28476 - 25921}{1296} = \frac{2555}{1296} \approx 1,97.$$

3. $E(X) \approx 4,47$: le maximum est en moyenne plus proche de 4,5, donc légèrement plus proche de 4 que de 5.

Corrigé

$$1. E(X) = 5 \times \frac{1}{3} + (-1) \times \frac{2}{3} = \frac{5-2}{3} = 1.$$

2. $E(X) = 1 > 0$: le jeu est favorable au joueur. En moyenne, il gagne 1 euro par partie.

Corrigé

$$1. E(Y) = 2E(X) + 1 = 2 \times 3 + 1 = 7.$$

$$2. E(Z) = -E(X) + 5 = -3 + 5 = 2.$$

3. $E(T) = 5E(X) - 4 = 5 \times 3 - 4 = 11$. Le terme constant -4 est ajouté après la multiplication de l'espérance par 5.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

$$1. \binom{6}{2} = \frac{6!}{2!4!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15.$$

$$2. \binom{6}{4} = \frac{6!}{4!2!} = 15.$$

$$3. \binom{6}{0} = 1.$$

$$4. \binom{6}{6} = 1.$$

$$5. \binom{6}{2} = \binom{6}{6-2} = \binom{6}{4} = 15. \quad \checkmark$$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli ($p = \frac{1}{2}$), les 5 lancers sont indépendants, X compte le nombre de succès : $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$.

$$2. P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$$

3. $P(X = 0) = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$. $P(X = 5) = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

$$1. P(X = 0) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296}.$$

$$2. P(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 6 \times \frac{1}{36} \times \frac{25}{36} = \frac{150}{1296} = \frac{25}{216}.$$

3. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296}$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. Chaque question est une épreuve de Bernoulli ($p = \frac{1}{4}$), les 10 réponses sont indépendantes.
 $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$.

$$2. P(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^{10} = \frac{59049}{1048576} \approx 0,056.$$

$$3. P(X = 5) = \binom{10}{5} \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 = 252 \times \frac{243}{1048576} = \frac{61236}{1048576} \approx 0,058.$$

4. $E(\text{note}) = 2E(X) = 2 \times 10 \times \frac{1}{4} = 5$ sur 20.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1.

$n = 0 :$			1			
$n = 1 :$		1		1		
$n = 2 :$	1		2		1	
$n = 3 :$	1	3		3	1	
$n = 4 :$	1	4	6	4	1	
$n = 5 :$	1	5	10	10	5	1

2. $\binom{3}{1} + \binom{3}{2} = 3 + 3 = 6 = \binom{4}{2}$. $\checkmark$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. La production est supposée assez grande pour que les tirages soient indépendants. Chaque pièce est défectueuse avec $p = 0,05$. Donc $X \sim \mathcal{B}(10, 0,05)$.

2. $P(X = 0) = (0,95)^{10} \approx 0,599$.

3. $P(X = 1) = \binom{10}{1}(0,05)(0,95)^9 = 10 \times 0,05 \times (0,95)^9 \approx 0,315$.

4. $P(X \leq 1) \approx 0,599 + 0,315 = 0,914$. Il y a environ 91,4 % de chances d'avoir au plus une pièce défectueuse dans l'échantillon.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

- $P(X = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^8 = \frac{256}{6561} \approx 0,039.$
- $P(X = 1) = 8 \times \frac{1}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^7 = \frac{8 \times 128}{6561} = \frac{1024}{6561} \approx 0,156.$
- $P(X = 2) = 28 \times \frac{1}{9} \times \frac{64}{729} = \frac{1792}{6561} \approx 0,273.$
- $P(X = 3) = 56 \times \frac{1}{27} \times \frac{32}{243} = \frac{1792}{6561} \approx 0,273.$
- $P(X \leq 2) = \frac{256+1024+1792}{6561} = \frac{3072}{6561} \approx 0,468.$
- $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) \approx 0,532.$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

- $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!}.$
 $= \frac{(n-1)! \cdot k + (n-1)! \cdot (n-k)}{k!(n-k)!} = \frac{(n-1)! \cdot n}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$
- Par la formule du binôme de Newton avec $a = b = 1$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k \cdot 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n.$
- Pour $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$: $\sum_{k=0}^n P(X = k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \frac{2^n}{2^n} = 1. \checkmark$

Corrigé

1.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	0,7	0,3

2. $E(X) = 0,3. \quad V(X) = 0,3 \times 0,7 = 0,21.$

Corrigé

1. L'arbre comporte huit chemins équiprobables. Un chemin donne zéro Pile, trois chemins exactement un Pile, trois chemins exactement deux Pile et un chemin trois Pile. Donc :

k	0	1	2	3
$P(X = k)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

- Diagramme en bâtons : un bâton de hauteur $\frac{1}{8}$ en $k = 0$ et $k = 3$, de hauteur $\frac{3}{8}$ en $k = 1$ et $k = 2$.
- $E(X) = 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{3}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = \frac{0+3+6+3}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}.$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

- $E(X) = np = 10 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{2}.$
- $V(X) = np(1-p) = 10 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{30}{16} = \frac{15}{8}.$
- $\sigma(X) = \sqrt{\frac{15}{8}} \approx 1,37.$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

$$E(X) = 20 \times 0,2 = 4. \quad V(X) = 20 \times 0,2 \times 0,8 = 3,2. \quad \sigma(X) = \sqrt{3,2} \approx 1,79.$$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

$$1 - p = \frac{V(X)}{E(X)} = \frac{4,2}{6} = 0,7, \text{ donc } p = 0,3.$$

$$n = \frac{E(X)}{p} = \frac{6}{0,3} = 20.$$

$$\text{Vérification : } E(X) = 20 \times 0,3 = 6 \checkmark \quad V(X) = 20 \times 0,3 \times 0,7 = 4,2 \checkmark.$$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

$$1 - p = \frac{6,4}{8} = 0,8, \text{ donc } p = 0,2.$$

$$n = \frac{8}{0,2} = 40.$$

$$\text{Vérification : } 40 \times 0,2 = 8 \checkmark \quad 40 \times 0,2 \times 0,8 = 6,4 \checkmark.$$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

$$1. k \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

$$2. E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{(n-1)-j} = np(p+1-p)^{n-1} = np.$$

$$3. E(X) = \sum_{k=0}^4 k \binom{4}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{4-k} \\ = 0 + 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{8}{27} \times 4 \dots$$

$$\text{Par la formule : } E(X) = 4 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}. \checkmark$$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

$$1. X \sim \mathcal{B}(100, \frac{1}{2}).$$

$$2. E(X) = 100 \times \frac{1}{2} = 50.$$

$$3. V(X) = 100 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 25, \text{ donc } \sigma(X) = 5.$$

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. $E(X) = 50 \times 0,4 = 20$. $E(Y) = 100 \times 0,2 = 20$. Mêmes espérances.
2. $V(X) = 50 \times 0,4 \times 0,6 = 12$. $V(Y) = 100 \times 0,2 \times 0,8 = 16$.
3. $\sigma(X) = \sqrt{12} \approx 3,46$ et $\sigma(Y) = 4$. X est plus concentrée (σ plus petit).

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. $E[X(X-1)] = \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.
En utilisant $k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2}$, on obtient :
 $E[X(X-1)] = n(n-1)p^2 \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} p^j (1-p)^{(n-2)-j} = n(n-1)p^2$.
2. $E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X) = n(n-1)p^2 + np$.
3. $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np[(n-1)p + 1 - np] = np(1-p)$.
4. $V(X) = 5 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{9} \approx 1,11$. ✓

Corrigé

1. $E(X) = 0 \times \frac{3}{5} + 1 \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$.
2. $E(X^2) = 0^2 \times \frac{3}{5} + 1^2 \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$, donc $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2}{5} - \frac{4}{25} = \frac{6}{25}$.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. $X \sim \mathcal{B}(50, 0,1)$.
2. $E(X) = 50 \times 0,1 = 5$. $V(X) = 50 \times 0,1 \times 0,9 = 4,5$. $\sigma(X) = \sqrt{4,5} \approx 2,12$.
3. En moyenne, on trouve 5 pièces défectueuses.

Corrigé

1. $G = 7 - 2 = 5$ si 6 (prob. $\frac{1}{6}$), $G = 0 - 2 = -2$ sinon (prob. $\frac{5}{6}$).

g_i	-2	5
$P(G = g_i)$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

2. $E(G) = 5 \times \frac{1}{6} + (-2) \times \frac{5}{6} = \frac{5-10}{6} = -\frac{5}{6} \approx -0,83$.
 $E(G) < 0$: le jeu est défavorable au joueur.

Corrigé

1. Pas de sinistre : $B = 40$ (prob. $\frac{19}{20}$). Sinistre : $B = 40 - 500 = -460$ (prob. $\frac{1}{20}$).

b_i	-460	40
$P(B = b_i)$	$\frac{1}{20}$	$\frac{19}{20}$

2. $E(B) = 40 - 500 \times \frac{1}{20} = 40 - 25 = 15$. Le contrat est rentable : l'assureur gagne en moyenne 15 euros par contrat.

Corrigé

1. Doubles : $(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)$, soit 6 sur 36 : $P = \frac{1}{6}$.
2. $E(G) = (18 - m) \times \frac{1}{6} + (-m) \times \frac{5}{6} = \frac{18-m-5m}{6} = \frac{18-6m}{6} = 3 - m$.
3. $E(G) = 0 \Leftrightarrow 3 - m = 0 \Leftrightarrow m = 3$ euros.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. $X \sim \mathcal{B}(5, 0,03)$.
2. $P(\text{accepté}) = P(X = 0) = (0,97)^5 \approx 0,859$.
3. $P(\text{refusé}) = 1 - (0,97)^5 \approx 0,141$, soit environ 14,1 %.

Corrigé

1.

g_i	-2	3
$P(G = g_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

2. $E(G) = 3 \times \frac{1}{2} + (-2) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Jeu favorable ($E(G) > 0$).
3. Gain total moyen : $100 \times \frac{1}{2} = 50$ euros.

Corrigé

1. Les 216 issues ordonnées sont équiprobables. Il y a respectivement 125, 75, 15 et 1 chemins comportant zéro, un, deux et trois résultats égaux à 6. La loi de X est donc donnée par la ligne de probabilités du tableau suivant.

2.

k	0	1	2	3
$G = 10k - 5$	-5	5	15	25
P	$\frac{125}{216}$	$\frac{75}{216}$	$\frac{15}{216}$	$\frac{1}{216}$

3. D'après le tableau, $E(X) = \frac{1}{2}$. Donc $E(G) = 10E(X) - 5 = 10 \times \frac{1}{2} - 5 = 0$. Le jeu est équitable.
4. À partir du tableau de loi de G ,

$$E(G^2) = 25 \times \frac{125}{216} + 25 \times \frac{75}{216} + 225 \times \frac{15}{216} + 625 \times \frac{1}{216} = \frac{125}{3}.$$

Comme $E(G) = 0$, on obtient $V(G) = E(G^2) - [E(G)]^2 = \frac{125}{3} \approx 41,7$ et $\sigma(G) = \sqrt{\frac{125}{3}} \approx 6,45$ euros.

Corrigé

1. $E(B) = c - 5000 \times \frac{1}{50} = c - 100 \geq 0 \Leftrightarrow c \geq 100$ euros.
2. Bénéfice moyen = $1000 \times 150 - 5000 \times 1000 \times \frac{1}{50} = 150\,000 - 100\,000 = 50\,000$ euros.

Corrigé

1. $G = 8000$ si succès ($p = 0,6$), $G = -10000$ si échec ($p = 0,4$).
2. $E(G) = 8000 \times 0,6 + (-10000) \times 0,4 = 4800 - 4000 = 800$ euros. L'investissement est intéressant en moyenne.
3. $E(G^2) = 64\,000\,000 \times 0,6 + 100\,000\,000 \times 0,4 = 38\,400\,000 + 40\,000\,000 = 78\,400\,000$.
 $V(G) = 78\,400\,000 - 640\,000 = 77\,760\,000$. $\sigma(G) \approx 8\,818$ euros. Le risque est élevé.
4. Avec 5 projets à 2 000 euros : gain par projet = 1 600 (succès) ou -2 000 (échec). L'espérance totale vaut $5 \times 160 = 800$ euros, comme pour le projet unique. Par indépendance, les variances s'ajoutent :

$$V_{\text{total}} = 5(1\,600^2 \times 0,6 + 2\,000^2 \times 0,4 - 160^2) = 15\,552\,000.$$

Ainsi, $\sigma_{\text{total}} = \sqrt{15\,552\,000} \approx 3\,944$ euros, soit l'écart type initial divisé par $\sqrt{5}$ environ : le risque est réduit par la diversification.

Approfondissement — Vers la Terminale

Corrigé

1. Chaque vaccination est une épreuve de Bernoulli ($p = 0,9$), les 8 sont indépendantes : $X \sim \mathcal{B}(8, 0,9)$.
2. $P(X = 8) = (0,9)^8 \approx 0,430$.
3. $E(X) = 8 \times 0,9 = 7,2$ personnes protégées en moyenne.

Corrigé

1. $P(R) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$.
2. $G = 4 - 1 = 3$ si rouge ($P = \frac{2}{5}$), $G = -1$ si bleue ($P = \frac{3}{5}$).

g_i	-1	3
$P(G = g_i)$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$

3. $E(G) = 3 \times \frac{2}{5} + (-1) \times \frac{3}{5} = \frac{6-3}{5} = \frac{3}{5} = 0,6$. Le jeu est favorable ($E(G) > 0$).
4. Urne A : $E_A = 3 \times \frac{3}{5} + (-1) \times \frac{2}{5} = \frac{7}{5} = 1,4$. Urne B : $E_B = 3 \times \frac{1}{5} + (-1) \times \frac{4}{5} = -\frac{1}{5}$. Choisir l'urne A.

Formulaire

Dérivées des fonctions de référence

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Ensemble de dérivabilité
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
x^3	$3x^2$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$

Règles de dérivation

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$$

$$(ku)' = ku'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Second degré

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et $\Delta = b^2 - 4ac$.

$$\text{Sommet : } x_S = -\frac{b}{2a}, \quad f(x_S) = -\frac{\Delta}{4a}$$

$$\Delta > 0 : x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 0 : x_0 = -\frac{b}{2a}$$

$$\Delta < 0 : \text{pas de racine réelle}$$

Forme factorisée ($\Delta > 0$) : $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Forme canonique : $f(x) = a(x - x_S)^2 + f(x_S)$.

Suites arithmétiques et géométriques

	Suite arithmétique	Suite géométrique
Définition	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \cdot u_n$
Terme général	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \cdot q^n$
Somme des termes	$S = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}$	$S = u_0 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$

Fonction exponentielle

$$\begin{aligned}
 e^0 &= 1 & e^{a+b} &= e^a \cdot e^b \\
 e^{-a} &= \frac{1}{e^a} & e^{a-b} &= \frac{e^a}{e^b} \\
 (e^a)^n &= e^{na} & (e^x)' &= e^x \\
 (e^u)' &= u' e^u
 \end{aligned}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R} : e^x > 0$.

Trigonométrie — Valeurs remarquables

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Identité fondamentale : $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

Probabilités

Probabilité conditionnelle :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0.$$

Formule des probabilités totales (partition $A_1, \dots, A_n$) :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P_{A_i}(B).$$

Indépendance : A et B sont indépendants si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Coefficients binomiaux

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}, \quad 0 \leq k \leq n.$$


Formule de Pascal :

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Loi binomiale $X \sim \mathcal{B}(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p).$$

ewpage



Mémo Python

Ce mémo regroupe les instructions Python utilisées dans les exercices d'algorithmique du manuel.

Types et opérations de base

```
x = 3          # affectation d'un entier
y = 2.5        # nombre à virgule flottante
s = "texte"    # chaîne de caractères
x + y          # addition
x * y          # multiplication
x ** 2         # puissance (x²)
x // 3         # quotient entier
x % 3          # reste de la division euclidienne
```

Affichage

```
print(x)        # affiche la valeur de x
print("Résultat :", x) # affiche du texte suivi de la valeur
print(f"x vaut {x}") # f-string (mise en forme)
```

Structures conditionnelles

```
if condition:
    instruction_1
elif autre_condition:
    instruction_2
else:
    instruction_3
```

Boucles

```
# Boucle for : répéter un nombre connu de fois
for i in range(n):          # i parcourt 0, 1, ..., n-1
    instruction

for i in range(a, b):       # i parcourt a, a+1, ..., b-1

# Boucle while : répéter tant qu'une condition est vraie
while condition:
    instruction
```

Fonctions

```
def nom_fonction(parametre_1, parametre_2):
```

♦ Corrigés

```

    """Description de la fonction."""
    resultat = parametre_1 + parametre_2
    return resultat

# Appel
valeur = nom_fonction(3, 5)

```

Listes

```

L = [1, 4, 9, 16]          # définition d'une liste
L[0]                      # premier élément (indice 0)
len(L)                    # nombre d'éléments
L.append(25)               # ajouter un élément en fin de liste

# Construction par compréhension
carres = [i**2 for i in range(1, 11)]

```

Modules utilisés dans le manuel

```

import math
math.sqrt(2)              # racine carrée
math.pi                   # valeur de pi
math.exp(1)               # exponentielle
math.log(x)               # logarithme népérien
math.factorial(n)         # factorielle

import random
random.random()           # nombre aléatoire dans [0, 1[
random.randint(a, b)      # entier aléatoire dans [a, b]

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(x, y)            # tracer une courbe
plt.scatter(x, y)         # nuage de points
plt.xlabel("x")           # légende axe des abscisses
plt.ylabel("y")           # légende axe des ordonnées
plt.title("Titre")        # titre du graphique
plt.grid()               # afficher la grille
plt.show()               # afficher la figure

ewpage

```

Apprendre, s'entraîner, se tester, progresser : la collection Nexus

Réussite accompagne chaque élève jusqu'à la maîtrise.

- 📖 Un cours structuré en strates : l'essentiel, les démonstrations au programme, les approfondissements signalés.
- 📌 Des méthodes pas à pas avec exemples résolus commentés et pièges à éviter.
- 🔥 Trois parcours d'exercices gradués et chronométrés, avec coups de pouce.
- 🔄 Une auto-évaluation par compétences et des sujets d'évaluation par chapitre.
- 📧 Des fiches de remédiation ciblées, reliées aux erreurs réellement diagnostiquées.
- » Python présent partout où le programme l'exige : activités, exercices et fil rouge.