

Mathématiques

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

Baccalauréat complet en une session

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

2 h 30

ÉVALUATION PONCTUELLE

coef. 8

CALCULATRICE

Partie 7 uniquement

MATÉRIEL

Aucun

CORRECTEUR

DATE



Module A

Épreuve anticipée de mathématiques

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 5 min

Question 1 1 pt · 1 min

MEA-1-AUT0-07

Une quantité augmente de 8 %. Par quel nombre faut-il la multiplier ?

- ☐ A. 0,92
- ☐ B. 1,08
- ☐ C. 8
- ☐ D. 1,8

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — coefficient de la baisse de 8 % au lieu de la hausse

C — taux lu comme un facteur

D — virgule placée sur le chiffre du taux plutôt que sur le centième

Question 2 1 pt · 1 min

MEA-1-AUT0G-07

Sur la courbe représentative d'une fonction f , on lit que le point de coordonnées $(3 ; 5)$ appartient à la courbe. Que vaut $f(3)$?

- ☐ A. 3
- ☐ B. 8
- ☐ C. 5
- ☐ D. on ne peut pas le savoir

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : C

A — abscisse rendue à la place de l'image

B — coordonnées additionnées

D — appartenance d'un point à la courbe non reliée à l'image

**Question 3** 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-01

Calculez $\frac{3}{4} + \frac{2}{3}$. Donnez la valeur exacte sous forme de fraction irréductible.

EXACT — Conduite d'une épreuve sans calculatrice : calcul exact, ordres de grandeur, vraisemblance · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — La somme vaut $\frac{17}{12}$.

1 point — Le dénominateur commun est trouvé mais l'addition des numérateurs est fausse.

1 point — Le résultat est donné sous forme décimale approchée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

Question 4 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-02

Sans calculatrice, donnez l'ordre de grandeur du produit $4,9 \times 10^3$ par $2,1 \times 10^2$.

EXACT — Conduite d'une épreuve sans calculatrice : calcul exact, ordres de grandeur, vraisemblance · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — L'ordre de grandeur est 10^6 : environ 5×10^3 multiplié par environ 2×10^2 donne environ 10^6 .

1 point — L'ordre de grandeur est correct mais aucune estimation n'est écrite.

1 point — Le calcul exact est mené sans conclure sur l'ordre de grandeur.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-ORDRE-GRANDEUR — **Ordre de grandeur non contrôlé** : Le résultat annoncé est hors de proportion avec les données et n'est pas mis en doute.



Partie 2

Notions du programme et transfert**2**

Temps conseillé : 40 min

Question 5 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-01

Un article coûte 80 €. Son prix augmente de 25 %. Quel est le nouveau prix ?

- ☐ A. 96 €
- ☐ B. 105 €
- ☐ C. 82 €
- ☐ D. 100 €

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — augmentation de 20 % appliquée au lieu de 25 %

B — coefficient 1,25 appliqué à 84 au lieu de 80

C — 25 % lus comme 2,5 %

Question 6 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-02

Un prix baisse de 20 %, puis augmente de 20 %. Quelle est l'évolution globale ?

- ☐ A. une baisse de 4 %
- ☐ B. aucune évolution
- ☐ C. une hausse de 4 %
- ☐ D. une baisse de 40 %

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — taux additionnés au lieu des coefficients multipliés

C — sens de l'évolution globale inversé

D — taux successifs additionnés en valeur absolue

**Question 7** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-03

Quelles sont les solutions de l'équation $(x - 3)(x + 5) = 0$?

- ☐ A. 3 et 5
- ☐ B. -3 et 5
- ☐ C. -3 et -5
- ☐ D. 3 et -5

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — signe du second facteur non traité

B — signes des deux racines inversés

C — signe du premier facteur non traité

Question 8 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-04

Une quantité a augmenté de 25 %. Quel taux d'évolution la ramène à sa valeur initiale ?

- ☐ A. -25 %
- ☐ B. -20 %
- ☐ C. -30 %
- ☐ D. -12,5 %

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — taux réciproque confondu avec l'opposé du taux appliqué

C — valeur approchée sans calcul du coefficient réciproque

D — taux divisé par deux

Question 9 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-05

Une population augmente de 10 % une année, puis diminue de 10 % l'année suivante. Quel est le coefficient multiplicateur global ?

- ☐ A. 0,99
- ☐ B. 1
- ☐ C. 1,01
- ☐ D. 0,9

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — évolutions supposées se compenser

C — sens de l'écart au 1 inversé

D — une seule des deux évolutions prise en compte

**Question 10** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-06

Quel est le signe de $(x - 2)(x + 1)$ pour x strictement compris entre -1 et 2 ?

- ☐ A. négatif
- ☐ B. positif
- ☐ C. nul
- ☐ D. il change de signe sur cet intervalle

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — produit de deux facteurs de signes contraires déclaré positif

C — confusion entre racine et signe

D — racines placées à l'intérieur de l'intervalle

Question 11 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTO-08

Quelle est la forme factorisée de $x^2 - 9$?

- ☐ A. $(x - 3)^2$
- ☐ B. $(x - 9)(x + 1)$
- ☐ C. $(x - 3)(x + 3)$
- ☐ D. $x(x - 9)$

AUTO — Automatismes de calcul : taux d'évolution, calcul numérique et algébrique · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — identité du carré d'une différence appliquée à une différence de carrés

B — racines cherchées par somme et produit sans vérification


D — facteur commun cherché là où il n'y en a pas

**Question 12** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-01

La droite d est tracée ci-dessous. Quelle est son équation réduite ?

Droite d dans un repère



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. $y = 3x - 2$
- ☐ B. $y = -2x - 3$
- ☐ C. $y = 2x + 3$
- ☐ D. $y = -2x + 3$

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — coefficient directeur et ordonnée à l'origine intervertis

B — signe de l'ordonnée à l'origine inversé

C — signe du coefficient directeur inversé

Question 13 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-02

Une droite passe par A(1; 2) et B(4; 11). Quel est son coefficient directeur ?

- ☐ A. $1/3$
- ☐ B. 9
- ☐ C. 3
- ☐ D. $13/5$

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — rapport des accroissements inversé

B — différence des ordonnées sans division


D — somme des coordonnées utilisée

**Question 14** 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-03

Le diagramme en boîte ci-dessous résume une série statistique. Que vaut sa médiane ?

Diagramme en boîte d'une série



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. 12
- ☐ B. 15
- ☐ C. 20
- ☐ D. 16

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — premier quartile lu comme médiane

C — troisième quartile lu comme médiane


D — milieu de la boîte calculé à la place de la lecture du trait intérieur

Question 15 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-04

La courbe représentative d'une fonction f est tracée ci-dessous. Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?

Courbe représentative de f



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. deux
- ☐ B. aucune
- ☐ C. une
- ☐ D. trois

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — changement de signe non repéré

C — une seule branche examinée

D — nombre de variations confondu avec le nombre de solutions

Question 16 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-05

La série 4 ; 6 ; 6 ; 8 ; 11 a pour moyenne :

- ☐ A. 6
- ☐ B. 7,5
- ☐ C. 7
- ☐ D. 8

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — médiane de la série donnée à la place de la moyenne ; c'est aussi son mode


B — milieu de l'étendue calculé à la place de la moyenne

D — troisième quartile lu à la place de la moyenne

Question 17 1 pt · 1 min

MEA-1-AUTOG-06

La courbe représentative d'une fonction h est tracée ci-dessous. Quel est le signe de $h(x)$ pour x appartenant à l'intervalle $[0 ; 4]$?

Courbe représentative de h 

Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

- ☐ A. positif sur tout l'intervalle
- ☐ B. négatif sur tout l'intervalle
- ☐ C. on ne peut pas le déterminer à partir de ce graphique
- ☐ D. nul en au moins une valeur

AUTOG — Automatismes graphiques et statistiques : lectures, droites, indicateurs · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — sens de lecture des ordonnées inversé

C — lecture du signe tenue pour impossible alors que la courbe est entièrement sous l'axe sur l'intervalle demandé

D — intersection avec l'axe des abscisses placée dans l'intervalle alors qu'elle lui est extérieure

**Question 18** 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-03

Une population augmente de 3 % par an pendant trois ans. Sans calculatrice, encadrez le taux d'évolution global entre deux entiers consécutifs de pourcentage, et justifiez les deux bornes.

EXACT — Conduite d'une épreuve sans calculatrice : calcul exact, ordres de grandeur, vraisemblance · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Le taux global t vérifie $9\% < t < 10\%$. Le coefficient global est $(1 + 0,03)^3$, que l'identité $(1 + a)^3 = 1 + 3a + 3a^2 + a^3$ développe exactement : $1 + 0,09 + 0,0027 + 0,000027 = 1,092727$. **Borne inférieure** : les trois termes qui suivent $3a$ sont strictement positifs, donc le coefficient dépasse 1,09

• trois hausses de 3 % font strictement plus que 9 %. **Borne supérieure** : $3a^2 + a^3 = 0,002727$, inférieur à 0,01, donc le coefficient reste sous 1,10. Le taux global vaut donc 9,2727 %.

1 point — La borne inférieure est établie — trois hausses de 3 % dépassent 9 % — mais la borne supérieure est affirmée sans calcul ni majoration.

1 point — Le développement de $(1 + 0,03)^3$ est mené correctement mais l'encadrement n'est pas conclu.

1 point — Le taux 9 % est donné comme valeur exacte, la composition des évolutions étant traitée comme une addition.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-TAUX-SOMME — **Taux successifs additionnés** : Le candidat additionne deux taux d'évolution successifs au lieu de multiplier les coefficients multiplicateurs.

MATH-ERR-ORDRE-GRANDEUR — **Ordre de grandeur non contrôlé** : Le résultat annoncé est hors de proportion avec les données et n'est pas mis en doute.

Question 19 2 pts · 1,5 min

MEA-1-EXACT-04

Un élève annonce qu'une somme de 200 € placée à 2 % par an dépasse 400 € au bout de dix ans. Ce résultat est-il vraisemblable ? Justifiez sans calculatrice.

EXACT — Conduite d'une épreuve sans calculatrice : calcul exact, ordres de grandeur, vraisemblance · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Non. Doubler exige un coefficient global de 2, or $1,02^{10} < 2$, et on le montre sans calculatrice : $1,02^2 = 1,0404 < 1,05$, donc $1,02^{10} = (1,02^2)^5 < 1,05^5$; puis $1,05^2 = 1,1025 < 1,11$ et $1,11^2 = 1,2321 < 1,24$, donc $1,05^4 < 1,24$ et $1,05^5 < 1,24 \times 1,05 = 1,302$. Le capital reste donc sous $200 \times 1,302 = 260,40$ €, très loin de 400 €. (Valeur exacte : $1,02^{10} \approx 1,219$, soit environ 243,80 €.)

1 point — La réponse « non » est donnée avec la seule minoration additive — dix hausses de 2 % font un peu plus de 20 % — sans majoration établie du coefficient.

1 point — La chaîne de majorations est engagée mais abandonnée avant de conclure sur le capital.

1 point — Le raisonnement est juste mais la conclusion n'est pas formulée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-ORDRE-GRANDEUR — **Ordre de grandeur non contrôlé** : Le résultat annoncé est hors de proportion avec les données et n'est pas mis en doute.

MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

**Question 20** 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-01

Dans un groupe de 200 personnes, 120 sont vaccinées. Parmi les vaccinées, 12 ont contracté la maladie ; parmi les non-vaccinées, 32 l'ont contractée. On choisit une personne au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit vaccinée et malade ? Donnez la valeur exacte sous forme de fraction irréductible.

PROBA — Probabilités conditionnelles, indépendance et répétition d'épreuves · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La probabilité est $12/200$, soit $3/50$.**1 point** — La fraction $12/200$ est donnée sans être réduite.**1 point** — Le calcul est juste mais la réponse est donnée en pourcentage sans fraction.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.**Question 21** 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-02

Dans un groupe de 200 personnes, 120 sont vaccinées. Parmi les vaccinées, 12 ont contracté la maladie ; parmi les non-vaccinées, 32 l'ont contractée. On choisit une personne vaccinée au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit malade ? Donnez la valeur exacte.

PROBA — Probabilités conditionnelles, indépendance et répétition d'épreuves · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La probabilité conditionnelle est $12/120$, soit $1/10$.**1 point** — Le rapport est posé correctement mais non réduit.**1 point** — La réponse 0,1 est donnée sans fraction ni justification du dénominateur.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.

**Question 22** 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-03

Une urne contient 3 jetons rouges et 2 jetons verts. On tire un jeton, on le remet, puis on en tire un second. Quelle est la probabilité d'obtenir deux jetons rouges ? Justifiez en une phrase l'emploi du produit.

PROBA — Probabilités conditionnelles, indépendance et répétition d'épreuves · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La probabilité est $(3/5) \times (3/5) = 9/25$, le tirage avec remise rendant les deux épreuves indépendantes.

1 point — Le résultat $9/25$ est donné sans justifier l'indépendance.

1 point — L'indépendance est justifiée mais le produit est mal calculé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-ARBRE — **Arbre pondéré mal renseigné** : Les probabilités portées sur les branches ne somment pas à 1 à chaque nœud, ou les branches conditionnelles sont interverties.

MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.

Question 23 2 pts · 2 min

MEA-1-PROBA-04

Deux évènements A et B vérifient $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Les évènements A et B sont-ils indépendants ? Justifiez.

PROBA — Probabilités conditionnelles, indépendance et répétition d'épreuves · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Oui : $P(A) \times P(B) = 0,4 \times 0,5 = 0,2 = P(A \cap B)$, donc A et B sont indépendants.

1 point — La conclusion est juste mais le critère n'est pas écrit.

1 point — Le critère est écrit correctement mais le produit est mal calculé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CONDITIONNELLE — **Probabilité conditionnelle confondue avec l'intersection** : Le candidat rend $P(A \text{ inter } B)$ là où $P_A(B)$ est demandé, ou intervertit les deux conditionnements.

MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

**Question 24** 2 pts · 2 min

MEA-1-ALGAN-01

Un atelier produit 5 pièces le premier jour, puis 3 pièces de plus chaque jour que la veille. Modélisez la production quotidienne par une suite, puis calculez la production du onzième jour en indiquant la relation employée.

ALGAN — Algèbre et analyse de la spécialité : suites, second degré, dérivation, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La production suit une suite arithmétique de premier terme 5 et de raison 3 : $u_n = 5 + 3n$ pour le jour de rang $n + 1$, donc le onzième jour $u_{10} = 5 + 10 \times 3 = 35$ pièces.

1 point — La suite est reconnue arithmétique mais le rang est décalé d'une unité.

1 point — Le résultat 35 est donné sans nommer la suite ni écrire la relation.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-MODELE — **Modèle d'évolution mal identifié** : Une croissance à taux constant est traitée comme linéaire, ou une croissance à pas constant comme exponentielle ; ou bien la situation n'est pas traduite en suite alors que la question le demande.

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

Question 25 2 pts · 2 min

MEA-1-ALGAN-02

Soit $f(x) = (x - 1)(x + 4)$. Donnez les racines de f puis le signe de $f(x)$ sur R .

ALGAN — Algèbre et analyse de la spécialité : suites, second degré, dérivation, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Les racines sont 1 et -4 ; $f(x)$ est négatif entre -4 et 1, positif à l'extérieur.

1 point — Les racines sont justes mais le signe est inversé.

1 point — Le signe est correct mais une seule racine est donnée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SIGNE-PRODUIT — **Signe d'un produit mal conduit** : Le tableau de signes d'une expression factorisée ne combine pas correctement les signes des facteurs.

**Question 26** 2 pts · 2 min

MEA-1-ALGAN-03

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Calculez $f'(x)$, puis donnez le sens de variation de f sur R .

ALGAN — Algèbre et analyse de la spécialité : suites, second degré, dérivation, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $f'(x) = 2x - 4$; f décroît sur $] -\infty ; 2]$ et croît sur $[2 ; +\infty[$, la dérivée s'annulant en 2.

1 point — La dérivée est juste mais les variations ne sont pas données.

1 point — Les variations sont justes mais la dérivée est fautive d'un terme.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

Question 27 2 pts · 2 min

MEA-1-ALGAN-04

Simplifiez l'expression $e^3 \times e^{-1} \div e^2$, puis justifiez la propriété employée.

ALGAN — Algèbre et analyse de la spécialité : suites, second degré, dérivation, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — L'expression vaut $e^0 = 1$, par la propriété $e^a \times e^b = e^{a+b}$ et $e^a \div e^b = e^{a-b}$.

1 point — Le résultat 1 est donné sans citer la propriété.

1 point — La propriété est citée mais l'exposant final est faux.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

**Question 28** 2 pts · 2 min

MEA-1-GEOM-01

Dans un repère orthonormé, $\vec{u}$ a pour coordonnées $(3; -1)$ et $\vec{v}$ a pour coordonnées $(2; 4)$. Calculez le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

GEOM — Géométrie et trigonométrie de la spécialité : produit scalaire, géométrie repérée · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + (-1) \times 4 = 2$.

1 point — La formule est écrite mais un signe est perdu.

1 point — Le calcul est mené sur les normes au lieu des coordonnées.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

Question 29 2 pts · 2 min

MEA-1-GEOM-02

Deux vecteurs non nuls ont pour coordonnées $(2; 3)$ et $(-3; 2)$. Sont-ils orthogonaux? Justifiez.

GEOM — Géométrie et trigonométrie de la spécialité : produit scalaire, géométrie repérée · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Oui : leur produit scalaire vaut $2 \times (-3) + 3 \times 2 = 0$, et deux vecteurs non nuls de produit scalaire nul sont orthogonaux.

1 point — La conclusion est juste mais le critère n'est pas énoncé.

1 point — Le critère est énoncé mais le produit scalaire est mal calculé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

**Question 30** 2 pts · 2 min

MEA-1-GEOM-03

Dans un repère orthonormé, $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$. Calculez la distance AB , en valeur exacte.

GEOM — Géométrie et trigonométrie de la spécialité : produit scalaire, géométrie repérée · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $AB = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{25} = 5$.

1 point — Le calcul est correct mais la racine n'est pas simplifiée.

1 point — Les différences de coordonnées sont justes mais la somme des carrés est fausse.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :


MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.

**Question 31** 2 pts · 2 min

MEA-1-GEOM-04

Le cercle trigonométrique ci-dessous porte les points images des réels $\pi/6$ et $\pi/3$. Lisez sur la figure, puis donnez en valeur exacte, $\cos(\pi/3)$ et $\sin(\pi/6)$.

Cercle trigonométrique et points images de $\pi/6$ et $\pi/3$



Données construites pour cette question ; elles ne représentent aucune situation réelle.

GEOM — Géométrie et trigonométrie de la spécialité : produit scalaire, géométrie repérée · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $\cos(\pi/3) = 1/2$ et $\sin(\pi/6) = 1/2$: l'abscisse du point image de $\pi/3$ et l'ordonnée du point image de $\pi/6$ se lisent toutes deux à la graduation 0,5, soit un demi en valeur exacte.

1 point — Une seule des deux valeurs est lue correctement.

1 point — Les deux lectures sont justes mais rendues sous forme décimale, 0,5, et non en valeur exacte.

1 point — L'abscisse et l'ordonnée sont interverties : le candidat rend $\cos(\pi/6)$ et $\sin(\pi/3)$.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALCUL-EXACT — **Valeur exacte remplacée par approchée** : Le candidat arrondit en cours de calcul, ou rend une décimale là où une fraction exacte est attendue.



Partie 3

Tâches au format de l'épreuve réelle

Temps conseillé : 24 min

3**Question 32** 9 pts · 12 min

MEA-1-RAIS-01

Une commune compte 8 000 habitants. Sa population augmente de 5 % par an.

1. **Modéliser** la population par une suite : définir la suite employée, écrire sa relation de récurrence **ou** son expression explicite, puis calculer la population après un an et après deux ans, en valeurs exactes. 2. Un élu affirme qu'au bout de dix ans la population aura augmenté de 50 %. Sans calculatrice, dire si cette affirmation est exacte et justifier. 3. Rédiger, en deux ou trois phrases, ce qu'il faudrait calculer pour connaître l'année où la population dépasse 12 000 habitants.

La calculatrice n'est autorisée à aucun moment de cette partie, comme à l'épreuve.

RAIS — Raisonnement et rédaction : justifier une étape, rédiger une réponse complète · niveau 1 · palier D3 · type C · bloc C — Tâches au format de l'épreuve réelle

DEMARCHE — Démarche

- 0 — Aucune démarche n'est engagée, ou aucun modèle n'est écrit et les valeurs sont données sans origine.
- 1 — Une piste pertinente est engagée puis abandonnée ; le modèle n'est pas écrit.
- 2 — Le modèle est écrit — suite définie, relation de récurrence ou expression explicite — et la démarche aboutit sur une question.
- 3 — Le modèle est écrit et la démarche est conduite jusqu'au bout sur les trois questions.

EXACT — Exactitude du calcul mené sans calculatrice

- 0 — Les calculs sont inexacts dès la première étape, ou la calculatrice est réclamée.
- 1 — Le calcul de la première année est exact, les suivants ne le sont pas.
- 2 — Les calculs sont exacts à une erreur près, qui n'affecte pas la conclusion.
- 3 — Tous les calculs sont exacts et les valeurs restent données sous forme exacte.

REDAC — Justification rédigée

- 0 — Seuls des résultats figurent, sans aucune étape écrite.
- 1 — Les étapes sont écrites mais aucune propriété n'est nommée.



- 2 — Les étapes sont écrites et le raisonnement sur le taux global est explicité.
- 3 — Chaque étape est écrite et justifiée, le modèle est énoncé en toutes lettres avant d'être employé, et la réponse à l'élue est formulée en une phrase complète.

Question 33 9 pts · 12 min

MEA-1-RAIS-04

Dans un lycée, 300 élèves sont inscrits à une sortie : 180 sont en première, les autres en terminale. Parmi les élèves de première, 45 ont choisi la randonnée ; parmi les élèves de terminale, 36 l'ont choisie.

1. Calculer la probabilité qu'un élève choisi au hasard soit en première **et** ait choisi la randonnée. Donner la valeur exacte sous forme de fraction irréductible. 2. Un délégué affirme : « le choix de la randonnée ne dépend pas du niveau de classe ». Dire si les données lui donnent raison, et justifier par un calcul. 3. On choisit successivement deux élèves au hasard, en remettant le premier dans la liste avant le second tirage. **Construire l'arbre pondéré** de cette répétition de deux épreuves — quatre chemins, chaque branche portant sa probabilité —, puis calculer la probabilité que les deux élèves aient choisi la randonnée et **expliquer en une phrase** ce qui autorise à multiplier les probabilités le long d'un chemin.

La calculatrice n'est autorisée à aucun moment de cette partie, comme à l'épreuve.

RAIS — Raisonnement et rédaction : justifier une étape, rédiger une réponse complète · niveau 1 · palier D3 · type C · bloc C — Tâches au format de l'épreuve réelle

DEMPROB — Démarche probabiliste

- 0 — Aucune démarche n'est engagée, ou les effectifs sont rapportés à un total qui ne correspond à aucune question.
- 1 — Une piste pertinente est engagée sur la première question puis abandonnée.
- 2 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout sur deux questions ; l'arbre est absent ou incomplet.
- 3 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout sur les trois questions ; l'arbre porte ses quatre chemins et toutes ses branches sont pondérées.

EXACT — Exactitude du calcul mené sans calculatrice

- 0 — Les fractions ne sont pas réduites et les quotients sont faux, ou la calculatrice est réclamée.
- 1 — Un quotient est exact, les autres ne le sont pas.
- 2 — Les quotients sont exacts mais l'une des fractions reste non réduite.
- 3 — Tous les quotients sont exacts et les valeurs sont données sous forme exacte et réduite.

**REDPROB — Justification rédigée du raisonnement probabiliste**

0 — Seuls des résultats figurent, sans aucune étape écrite.

1 — Les étapes sont écrites mais aucune propriété n'est nommée.

2 — Les étapes sont écrites et la comparaison qui fonde la réponse au délégué est explicitée.

3 — Chaque étape est écrite et justifiée, la réponse au délégué est formulée en une phrase complète, et la phrase de la troisième question nomme la remise et l'indépendance qu'elle entraîne.



Partie 4

Méthode et rédaction**4**

Temps conseillé : 4 min

Question 34 2 pts · 2 min

MEA-1-RAIS-02

Un élève écrit : « Le prix passe de 50 € à 60 €, donc il augmente de 10 %. » Repérez l'erreur de raisonnement et écrivez la phrase corrigée.

RAIS — Raisonnement et rédaction : justifier une étape, rédiger une réponse complète · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — L'élève confond la variation absolue et le taux : la hausse est de 10 € sur 50 €, soit 20 %.**1 point** — L'erreur est repérée mais le taux corrigé n'est pas calculé.**1 point** — Le taux 20 % est donné sans expliquer l'erreur.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-TAUX-SENS — **Taux d'évolution appliqué à l'envers** : Le candidat multiplie par $(1 + t)$ là où il fallait diviser, ou l'inverse, en passant de la valeur initiale à la valeur finale.MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.**Question 35** 2 pts · 2 min

MEA-1-RAIS-03

Une copie donne : « $f(x) = (x-2)(x+3)$, donc f est positive. » Quelle étape manque-t-il pour que cette conclusion soit justifiée ?

RAIS — Raisonnement et rédaction : justifier une étape, rédiger une réponse complète · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — Il manque l'étude du signe de chaque facteur et le tableau de signes du produit : f n'est positive qu'en dehors de l'intervalle des racines.**1 point** — Le manque est signalé sans dire ce qu'il faudrait écrire.**1 point** — Le tableau de signes est évoqué mais la conclusion reste fausse.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SIGNE-PRODUIT — **Signe d'un produit mal conduit** : Le tableau de signes d'une expression factorisée ne combine pas correctement les signes des facteurs.MATH-ERR-JUSTIF-ABSENTE — **Résultat donné sans justification** : La réponse est correcte mais aucune étape ni argument n'est écrit.

Module B

Spécialité mathématiques



Partie 5

Prérequis bloquants du niveau inférieur

5

Temps conseillé : 6 min

Question 36 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-01

Développer et réduire $(x - 3)(x + 5)$.

- ☐ A. $x^2 + 2x - 15$
- ☐ B. $x^2 + 8x - 15$
- ☐ C. $x^2 - 2x - 15$
- ☐ D. $x^2 + 2x + 15$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — signe de -3 non appliqué au double produit : $5x + 3x$ au lieu de $5x - 3x$

C — signe du double produit inversé

D — signe du produit des constantes non traité

Question 37 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-02

Résoudre l'équation $3x - 7 = 2$.

- ☐ A. $x = -3$
- ☐ B. $x = 5/3$
- ☐ C. $x = 9$
- ☐ D. $x = 3$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

A — terme constant passé sans changer de signe des deux côtés : $3x = -(7 + 2)$

B — terme constant retranché au lieu d'être ajouté : $3x = 7 - 2$

C — division par 3 omise

**Question 38** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-03

Simplifier l'écriture $\frac{2^3 \times 2^5}{2^4}$.

- ☐ A. 2^2
- ☐ B. 2^{15}
- ☐ C. 2^4
- ☐ D. 2^{12}

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : C

A — exposant du numérateur divisé par celui du dénominateur au lieu d'en être retranché : $(3 + 5)/4$

B — exposants multipliés au numérateur et dénominateur ignoré : 3×5

D — exposant du dénominateur ajouté au lieu d'être retranché

Question 39 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-04

Pour quelles valeurs de x l'expression $\frac{x-2}{x+1}$ n'est-elle pas définie ?

- ☐ A. $x = -1$
- ☐ B. $x = 2$
- ☐ C. $x = 1$
- ☐ D. $x = 2$ et $x = -1$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — valeur annulant le numérateur prise pour valeur interdite

C — signe de la valeur interdite non traité

D — numérateur et dénominateur traités ensemble

Question 40 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-05

Résoudre l'inéquation $-2x + 4 > 0$.

- ☐ A. $x < 2$
- ☐ B. $x > 2$
- ☐ C. $x > -2$
- ☐ D. $x < -2$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — sens de l'inégalité non changé lors de la division par un négatif

C — signe du quotient et sens de l'inégalité tous deux erronés

D — signe du quotient erroné

**Question 41** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-06

Écrire $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{2}$ avec a entier.

- ☐ A. $25\sqrt{2}$
- ☐ B. $10\sqrt{2}$
- ☐ C. $\sqrt{25} \times \sqrt{2}$
- ☐ D. $5\sqrt{2}$

CALC — Automatismes : calcul littéral, fractions, puissances, racines, équations et inéquations · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

A — racine du facteur carré non prise

B — facteur extrait par division au lieu de racine

C — forme non simplifiée, extraction non achevée



Partie 6

Notions du programme et transfert

6

Temps conseillé : 37 min

Question 42 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-01

Quel est le discriminant de $x^2 - 5x + 6$?

- ☐ A. 49
- ☐ B. 1
- ☐ C. -1
- ☐ D. 13

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — signe de $-4ac$ non appliqué : $25 + 24$ au lieu de $25 - 24$ C — soustraction inversée dans $b^2 - 4ac$ D — facteur 4 réduit à 2 dans $4ac$: $25 - 12$

Question 43 2 pts · 2 min

MATH-1-FONC-07

Résoudre dans R l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$.

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Les deux solutions sont $x = 2$ et $x = 3$.**1 point** — Une seule des deux solutions est donnée, sans erreur de calcul.**1 point** — Les deux solutions sont données avec un signe erroné.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SIGNE — **Erreur de signe** : Un signe est modifié au cours du calcul, le plus souvent lors du développement ou du passage d'un membre à l'autre.MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

**Question 44** 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-04

Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle I , alors sur I la fonction f est :

- ☐ A. croissante
☐ B. négative
☐ C. constante
☐ D. décroissante

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

- A — lien signe de la dérivée / sens de variation inversé
B — signe de la dérivée confondu avec le signe de la fonction
C — cas de la dérivée nulle appliqué à tort

Question 45 2 pts · 3 min

MATH-1-FONC-08

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Calculer $f'(x)$, puis déterminer la valeur de x pour laquelle la tangente à la courbe est horizontale.

FONC — Fonctions : variations, dérivation, tangente, second degré, exponentielle · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $f'(x) = 2x - 4$ et la tangente est horizontale pour $x = 2$.

- 1 point** — La dérivée est exacte mais la valeur de x n'est pas déterminée.
1 point — La valeur $x = 2$ est donnée sans que la dérivée soit écrite.
0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

- MATH-ERR-DERIV — **Formule de dérivation inexacte** : La dérivée obtenue ne correspond pas à la formule du produit, du quotient ou de la composée.
MATH-ERR-SIGNE — **Erreur de signe** : Un signe est modifié au cours du calcul, le plus souvent lors du développement ou du passage d'un membre à l'autre.
MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 46 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-01

Une suite est définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 3$. Quelle est sa nature ?

- ☐ A. géométrique de raison 3
☐ B. arithmétique de raison 3
☐ C. arithmétique de raison 5
☐ D. géométrique de raison 5

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — addition prise pour une multiplication
C — premier terme pris pour la raison
D — nature et raison toutes deux erronées

**Question 47** 2 pts · 2 min

MATH-1-SUIT-07

Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 4$ et pour raison $r = 3$. Calculer u_{10} .

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $u_{10} = 34$.

1 point — Le calcul est conduit correctement mais avec un décalage d'un rang (résultat 31 ou 37).

1 point — La formule $u_0 + nr$ est écrite correctement sans être appliquée numériquement.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-INDICE — **Indice de suite décalé** : Le rang employé n'est pas celui de la question, ou le premier terme est pris pour u_1 au lieu de u_0 .

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

Question 48 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-04

Une suite géométrique de raison $q = 0,5$ et de premier terme positif est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. constante
- ☐ C. alternée
- ☐ D. décroissante

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — sens de variation inversé pour une raison entre 0 et 1

B — cas $q = 1$ appliqué à tort

C — cas d'une raison négative appliqué à tort

**Question 49** 2 pts · 2 min

MATH-1-SUIT-08

Un capital de 2000 € est placé à 4 % par an. Écrire la relation de récurrence donnant le capital C_{n+1} en fonction de C_n pour tout entier naturel n , puis préciser la nature de la suite.

SUIT — Suites : arithmétiques, géométriques, sens de variation ; récurrence et limites en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $C_{n+1} = 1,04 \times C_n$, suite géométrique de raison 1,04.

1 point — La relation est exacte mais la nature de la suite n'est pas précisée.

1 point — La nature est correcte mais la relation est écrite avec 0,04 au lieu de 1,04.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-RAISON — **Raisons arithmétique et géométrique confondues** : La suite est traitée avec l'opération de l'autre type : addition au lieu de multiplication, ou l'inverse.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

Question 50 1 pt · 1 min

MATH-1-TRIG-01

Combien vaut $\pi/3$ en degrés ?

- ☐ A. 60°
- ☐ B. 30°
- ☐ C. 90°
- ☐ D. 120°

TRIG — Trigonométrie : cercle trigonométrique, radians, fonctions cosinus et sinus · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — conversion faite avec $\pi/6$

C — conversion faite avec $\pi/2$

D — tour complet employé au lieu de l'angle plat : $360/3$

**Question 51** 2 pts · 2 min

MATH-1-TRIG-03

Donner les valeurs exactes de $\cos(\pi/4)$ et $\sin(\pi/4)$.

TRIG — Trigonométrie : cercle trigonométrique, radians, fonctions cosinus et sinus · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

1 point — Une seule des deux valeurs est exacte.

1 point — Les deux valeurs sont données sous forme décimale approchée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CERCLE — **Position sur le cercle trigonométrique inexacte** : Le point associé à la mesure n'est pas placé au bon endroit du cercle, ou le signe de la ligne trigonométrique en découle faussé.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

Question 52 1 pt · 1 min

MATH-1-TRIG-02

Quel est le signe de $\cos(2\pi/3)$?

- ☐ A. positif
- ☐ B. nul
- ☐ C. négatif
- ☐ D. on ne peut pas le savoir

TRIG — Trigonométrie : cercle trigonométrique, radians, fonctions cosinus et sinus · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — point placé dans le premier quadrant au lieu du deuxième

B — confusion avec la valeur en $\pi/2$

D — lecture du cercle non maîtrisée

**Question 53** 2 pts · 2 min

MATH-1-TRIG-04

Résoudre $\cos(x) = \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

TRIG — Trigonométrie : cercle trigonométrique, radians, fonctions cosinus et sinus · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Les solutions sont $x = \pi/3$ et $x = 5\pi/3$.

1 point — Une seule des deux solutions est donnée.

1 point — Les deux solutions sont proposées mais l'une sort de l'intervalle demandé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CERCLE — **Position sur le cercle trigonométrique inexacte** : Le point associé à la mesure n'est pas placé au bon endroit du cercle, ou le signe de la ligne trigonométrique en découle faussé.

MATH-ERR-DOMAIN — **Domaine de définition ignoré** : Une valeur interdite figure dans l'ensemble des solutions, ou une propriété est appliquée hors de son domaine.

Question 54 1 pt · 1 min

MATH-1-GEO-01

Dans un repère, $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$. Quelles sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$?

- ☐ A. $(-3; -4)$
- ☐ B. $(3; 4)$
- ☐ C. $(5; 8)$
- ☐ D. $(4; 6)$

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée ; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — soustraction faite dans l'ordre inverse

C — coordonnées additionnées au lieu d'être soustraites

D — coordonnées du point B prises pour celles du vecteur

**Question 55** 2 pts · 2 min

MATH-1-GE0-03

Calculer le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(-1; 4)$.

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée ; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times (-1) + 3 \times 4 = 10$.

1 point — Le calcul est posé correctement mais le résultat numérique est erroné.

1 point — Le résultat est donné sous forme de couple de coordonnées.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SCALAIRE — **Expression du produit scalaire inexacte** : La formule employée n'est pas celle qui convient aux données, ou le produit scalaire est traité comme un vecteur.

MATH-ERR-SIGNE — **Erreur de signe** : Un signe est modifié au cours du calcul, le plus souvent lors du développement ou du passage d'un membre à l'autre.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

Question 56 1 pt · 1 min

MATH-1-GE0-02

Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si :

- ☐ A. leur produit scalaire est nul
- ☐ B. leur produit scalaire vaut 1
- ☐ C. leurs coordonnées sont proportionnelles
- ☐ D. leur somme est nulle

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée ; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — valeur particulière prise pour critère

C — critère de colinéarité employé pour l'orthogonalité

D — critère de vecteurs opposés employé

**Question 57** 2 pts · 2 min

MATH-1-GE0-04

Les vecteurs $\vec{u}(2 ; 3)$ et $\vec{v}(6 ; 9)$ sont-ils colinéaires ? Justifier par un calcul.

GEO — Produit scalaire, géométrie repérée ; vecteurs, droites et plans de l'espace en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Oui : le déterminant $2 \times 9 - 3 \times 6$ vaut 0, donc les vecteurs sont colinéaires.

1 point — La réponse « oui » est donnée avec une justification par proportionnalité, sans calcul posé.

1 point — Le calcul est posé correctement mais la conclusion n'est pas énoncée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-VECTEUR — **Coordonnées de vecteur inexactes** : Les coordonnées du vecteur sont obtenues en soustrayant les points dans le mauvais ordre, ou en additionnant au lieu de soustraire.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 58 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-01

Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

- ☐ **A.** $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
- ☐ **B.** $P(A \cap B) = 0$
- ☐ **C.** $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ **D.** $P(A) = P(B)$

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — somme employée pour l'intersection

B — indépendance confondue avec incompatibilité

D — indépendance confondue avec égalité des probabilités

**Question 59** 2 pts · 2 min

MATH-1-PROB-07

Une urne contient 3 boules rouges et 7 boules noires. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ?

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc
B — Notions du programme et transfert

2 points — $3/10$, soit 0,3.

1 point — Le rapport est posé correctement mais non simplifié ni converti.

1 point — La probabilité est donnée comme $3/7$.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

MATH-ERR-PROBA-COND — **Probabilité conditionnelle et intersection confondues** : $P(A \cap B)$ est employé là où $P(B | A)$ est attendu, ou l'inverse.

Question 60 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-04

Si $P(A) = 0,4$ et $P(B | A) = 0,5$, que vaut $P(A \cap B)$?

- ☐ A. 0,9
- ☐ B. 0,2
- ☐ C. 0,5
- ☐ D. 0,8

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc
B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — probabilités additionnées

C — probabilité conditionnelle prise pour l'intersection

D — quotient calculé au lieu du produit

**Question 61** 2 pts · 2 min

MATH-1-PROB-08

Dans une population, 30 % des personnes possèdent un vélo. Parmi elles, 60 % l'utilisent tous les jours. Quelle est la probabilité qu'une personne prise au hasard possède un vélo et l'utilise tous les jours ?

PROB — Probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires ; loi binomiale et dénombrement en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $0,3 \times 0,6 = 0,18$, soit 18 %.

1 point — Le produit est posé correctement mais le résultat numérique est erroné.

1 point — La réponse 0,6 est donnée, la conditionnelle étant prise pour l'intersection.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-PROBA-COND — **Probabilité conditionnelle et intersection confondues** : $P(A \cap B)$ est employé là où $P(B | A)$ est attendu, ou l'inverse.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.

Question 62 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-01

Que renvoie la fonction suivante pour $n = 4$?

```
def f(n):  
    s = 0  
    for i in range(n):  
        s = s + i  
    return s
```

- ☐ A. 10
- ☐ B. 4
- ☐ C. 6
- ☐ D. 0

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — borne supérieure incluse dans le parcours

B — valeur de n renvoyée au lieu de la somme

D — accumulateur non mis à jour

**Question 63** 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-02

Compléter la ligne manquante pour que la fonction renvoie le maximum de la liste L :

```
def maxi(L):  
    m = L[0]  
    for x in L:  
        if _____:  
            m = x  
    return m
```

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $x > m$ — la variante « $x \geq m$ » renvoie le même maximum et vaut les deux points.

1 point — $m > x$

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-PYTHON — **Sortie de programme inexacte** : La valeur annoncée en sortie ne correspond pas à l'exécution du code, souvent par erreur sur le nombre d'itérations.

MATH-ERR-INDICE — **Indice de suite décalé** : Le rang employé n'est pas celui de la question, ou le premier terme est pris pour u_1 au lieu de u_0 .

Question 64 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-05

Que renvoie cette fonction pour $L = [3, 1, 4, 1, 5]$?

```
def f(L):  
    c = 0  
    for x in L:  
        if x > 2:  
            c = c + 1  
    return c
```

- ☐ A. 5
- ☐ B. 2
- ☐ C. 14
- ☐ D. 3

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — longueur de la liste renvoyée, condition ignorée

B — condition lue « $x > 3$ » au lieu de « $x > 2$ »

C — somme des éléments calculée au lieu de leur nombre

**Question 65** 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-06

Cette fonction devait renvoyer la moyenne des éléments de L , mais elle est fautive. Indiquez la ligne à corriger et donnez sa version correcte.

```
def moyenne(L):  
    s = 0  
    for x in L:  
        s = s + x  
    return s
```

ALGO — Python : lire, compléter, prédire la sortie d'un programme court · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La dernière ligne est fautive : elle doit être « `return s / len(L)` ».

1 point — La ligne fautive est identifiée sans que la correction soit écrite.

1 point — La correction est écrite sans que la ligne soit identifiée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-PYTHON — **Sortie de programme inexacte** : La valeur annoncée en sortie ne correspond pas à l'exécution du code, souvent par erreur sur le nombre d'itérations.

MATH-ERR-CALC-NUM — **Calcul numérique inexact** : La démarche est correcte mais une opération arithmétique ne donne pas le résultat attendu.



Partie 7

Tâche au format de l'épreuve réelle**7**

Temps conseillé : 20 min

Question 66 12 pts · 20 min

MATH-1-RAIS-01

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x la longueur d'un côté.

1. Exprimer l'autre côté en fonction de x , puis l'aire $A(x)$ du rectangle. 2. Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale. 3. Donner cette aire maximale et vérifier la cohérence du résultat obtenu.

La calculatrice est autorisée pour cette partie.

RAIS — Raisonnement et rédaction : démontrer, justifier, rédiger une solution complète · niveau 1 · palier D3 · type C · bloc C — Tâche au format de l'épreuve réelle

DEMARCHE — Démarche

- 0 — Aucune démarche n'est engagée, ou la piste choisie ne peut pas mener au résultat.
- 1 — Une piste pertinente est engagée puis abandonnée avant d'aboutir.
- 2 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout d'une question sur les trois.
- 3 — La démarche est pertinente et conduite jusqu'au bout sur l'ensemble des questions.

EXACT — Exactitude des calculs

- 0 — Les calculs engagés sont inexacts dès la première étape.
- 1 — Un calcul sur trois est mené sans erreur.
- 2 — Les calculs sont exacts, à une erreur près qui n'affecte pas la suite.
- 3 — Tous les calculs sont exacts.

REDAC — Rédaction et justification

- 0 — Seuls des résultats figurent, sans aucune étape écrite.
- 1 — Les étapes sont écrites mais aucune propriété n'est nommée.



2 — Les étapes sont écrites et une propriété au moins est nommée à l'appui.

3 — Chaque étape est écrite et justifiée par la propriété qui l'autorise.

VERIF — Vérification

0 — Aucun contrôle : un résultat manifestement impossible est laissé tel quel.

1 — Un résultat est contrôlé, sans que l'incohérence relevée soit traitée.

2 — Les résultats sont contrôlés et une incohérence relevée est corrigée.

3 — Les résultats sont contrôlés, l'ordre de grandeur discuté et la réponse formulée en revenant à la question posée.



Partie 8

Méthode et rédaction**8**

Temps conseillé : 6 min

Question 67 2 pts · 3 min

MATH-1-RAIS-02

Voici les étapes d'une résolution, dans le désordre. Numérotez-les de 1 à 4 :

- conclure en revenant à la question posée ;
- identifier l'inconnue et écrire la mise en équation ;
- vérifier la cohérence du résultat ;
- résoudre l'équation obtenue.

RAIS — Raisonnement et rédaction : démontrer, justifier, rédiger une solution complète · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — L'ordre est : identifier et mettre en équation (1), résoudre (2), vérifier (3), conclure (4).

1 point — Deux étapes sont interverties ; les deux autres sont à leur place.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.

Question 68 2 pts · 3 min

MATH-1-RAIS-03

Un candidat écrit : « $x^2 = 16$ donc $x = 4$ ». Indiquez ce qui manque à cette résolution et donnez la réponse complète.

RAIS — Raisonnement et rédaction : démontrer, justifier, rédiger une solution complète · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — Il manque la seconde solution : $x = 4$ ou $x = -4$.

1 point — La réponse signale qu'une solution manque sans donner laquelle.

1 point — La réponse donne -4 sans reprendre les deux solutions ensemble.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

MATH-ERR-SIGNE — **Erreur de signe** : Un signe est modifié au cours du calcul, le plus souvent lors du développement ou du passage d'un membre à l'autre.

MATH-ERR-JUSTIF — **Résultat donné sans justification** : La réponse est exacte mais aucune étape, propriété ou calcul n'est écrit.