



Stage de pré-rentree — Entrée en 1re, Mathématiques

Kamel Ben Rhouma · 1re · Mathématiques · 2026-08-12

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les neuf domaines évalués : deux acquis, deux à consolider, deux à installer, deux à rectifier en priorité, un à situer.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Fonctions de référence · Calcul numérique

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Calcul littéral · Droites du plan

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Fonctions · Probabilités

Prêt à apprendre : on installe.

Réponses justes, mais hésitantes

Inéquations et signes · Pourcentages et évolutions

Presque acquis : on consolide.

Sans réponse, à situer au démarrage : Vecteurs.

Tes points d'appui

1. Calcul littéral — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
2. Tu peux t'appuyer sur les droites du plan : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.

Tes priorités pour le stage

1. Fonctions de référence — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
2. En calcul numérique, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
3. Fonctions — quelque chose manque, et tu le sais déjà : c'est une vraie lucidité. Il reste à installer les bons repères.
4. Ce qui manque en probabilités est identifié. Aucune fausse certitude à défaire : on installe, puis on entraîne.
5. Inéquations et signes — les réponses sont justes, mais l'hésitation se sent encore. On va transformer ce « je crois » en « je sais ».
6. Tu réussis sur les pourcentages, mais sans certitude complète : une consolidation courte suffira à ancrer le geste.
7. Vecteurs — aucune réponse apportée ici. Une question laissée vide nous renseigne aussi : on fera le point ensemble au démarrage.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Fonctions de référence **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur les fonctions de référence.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

Calcul numérique **CONFRONTER**

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée en calcul numérique.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Fonctions **INSTALLER**

Objectif : Installer les repères indispensables sur les fonctions.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

Probabilités **INSTALLER**

Objectif : Poser les définitions et les gestes de base en probabilités.

Démarche : Avancer du simple vers le composé : un repère, un exemple, un essai — puis répéter.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Inéquations et signes **CONSOLIDER**

Objectif : Stabiliser l'acquis encore fragile sur les inéquations.

Démarche : Organiser un entraînement espacé, sans réenseigner ce qui est déjà compris.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Pourcentages et évolutions **CONSOLIDER**

Objectif : Transformer la réussite hésitante sur les pourcentages en réflexe.

Démarche : Faire refaire en autonomie, à intervalle espacé, et faire nommer le geste qui réussit.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Vecteurs

DIAGNOSTIQUER

Objectif : Établir le niveau réel sur les vecteurs avant de choisir une remédiation.

Démarche : Commencer par un test ciblé, puis décider du travail à engager à partir des observations.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question sur les fonctions de référence dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Note deux ou trois réflexes que tu utilises en calcul numérique : les écrire permettra de voir lequel bifurque.
3. Relis la fiche de cours sur les fonctions et note ce qui reste flou : tes questions feront gagner du temps à tout le monde.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Trop de questions sans réponse cette fois pour évaluer ton auto-perception — on le regardera en séance.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Calcul littéral

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Développer et réduire $(2x - 3)^2$.

Réponse donnée : $4x^2 - 12x + 9$

Ce qu'il faut retenir : L'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ donne $(2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9$. Le double produit ne doit jamais être oublié.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Factoriser l'expression $x^2 - 9$.

Réponse donnée : $(x - 3)(x + 3)$

Ce qu'il faut retenir : $x^2 - 9$ est une différence de deux carrés : $x^2 - 3^2$. Elle se factorise en $(x - 3)(x + 3)$.

Inéquations et signes

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-2x + 6 \geq 0$.

Réponse donnée : $x \leq 3$

Ce qu'il faut retenir : On isole x : $-2x \geq -6$. En divisant par -2 , nombre négatif, le sens de l'inégalité s'inverse : $x \leq 3$.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Pour quelles valeurs de x le produit $(2x - 6)(x + 1)$ est-il strictement négatif ?

Réponse donnée : $-1 < x < 3$

Ce qu'il faut retenir : Les facteurs s'annulent en 3 et en -1 . Un tableau de signes montre que le produit est négatif uniquement entre ces deux valeurs : $-1 < x < 3$.

Fonctions

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 - 3x$. Que vaut $f(-2)$?

Réponse donnée : 2

Réponse attendue : 10

D'où vient l'erreur : Calcule $(-2)^2$ comme s'il valait -4 : ne met pas la valeur négative entre parenthèses.

Ce qu'il faut retenir : On remplace x par -2 : $(-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10$. Les parenthèses autour d'une valeur négative sont indispensables.

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

La courbe représentative d'une fonction f passe par le point de coordonnées (3 ; 7). On peut affirmer que :

Réponse donnée : 3 est l'image de 7 par f

Réponse attendue : 7 est l'image de 3 par f

D'où vient l'erreur : Intervertit les rôles de l'abscisse et de l'ordonnée.

Ce qu'il faut retenir : L'abscisse est l'antécédent, l'ordonnée est l'image. Le point (3 ; 7) traduit donc $f(3) = 7$: 7 est l'image de 3.

Fonctions de référence

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La fonction inverse, définie par $f(x) = 1/x$, est :

Réponse donnée : décroissante sur $\mathbb{R}$

Réponse attendue : décroissante sur $] -\infty ; 0[$ et décroissante sur $] 0 ; +\infty[$

D'où vient l'erreur : Recolle les deux branches et affirme une décroissance sur $\mathbb{R}$, alors que la fonction n'est pas définie en 0.

Ce qu'il faut retenir : La fonction inverse est décroissante sur chacun des deux intervalles, mais pas sur leur réunion : elle n'est pas définie en 0, et on ne peut pas comparer une valeur négative et une valeur positive de f .

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit x un réel tel que $0 < x < 1$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : $x^2 > x$

Réponse attendue : $x^2 < x$

D'où vient l'erreur : Généralise à tort la propriété vraie uniquement pour $x > 1$.

Ce qu'il faut retenir : Entre 0 et 1, élever au carré diminue la valeur : par exemple $0,5^2 = 0,25$. On a donc $x^2 < x$ sur cet intervalle.

Vecteurs

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Dans un repère, on donne $A(1 ; 2)$ et $B(4 ; -3)$. Quelles sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : (3 ; -5)

Ce qu'il faut retenir : Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ s'obtiennent en soustrayant celles de A à celles de B : $(4 - 1 ; -3 - 2) = (3 ; -5)$.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Les vecteurs $u(2 ; -3)$ et $v(-4 ; 6)$ sont :

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : colinéaires

Ce qu'il faut retenir : Le déterminant vaut $2 \times 6 - (-3) \times (-4) = 12 - 12 = 0$. Les vecteurs sont donc colinéaires : v est égal à -2 fois u .

Droites du plan

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Quel est le coefficient directeur de la droite passant par A(1 ; 3) et B(4 ; 9) ?

Réponse donnée : 2

Ce qu'il faut retenir : Le coefficient directeur est le rapport de l'écart des ordonnées sur l'écart des abscisses : $(9 - 3)/(4 - 1) = 6/3 = 2$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La droite d'équation $y = -3x + 5$:

Réponse donnée : est décroissante et coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 5

Ce qu'il faut retenir : Dans l'équation réduite $y = mx + p$, m est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Ici $m = -3$, négatif, donc la droite est décroissante, et elle coupe l'axe des ordonnées en 5.

Pourcentages et évolutions

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Un article coûtait 120 dinars ; il coûte désormais 90 dinars. Quel est le pourcentage de réduction ?

Réponse donnée : 25 %

Ce qu'il faut retenir : Le taux d'évolution se calcule à partir de la valeur de départ : $(90 - 120)/120 = -0,25$, soit une réduction de 25 %.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Quel coefficient multiplicateur correspond à une baisse de 15 % ?

Réponse donnée : 0,85

Ce qu'il faut retenir : Une baisse de 15 % revient à conserver 85 % de la valeur : le coefficient multiplicateur vaut $1 - 0,15 = 0,85$.

Probabilités

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

On lance un dé équilibré à six faces. Soit A l'événement « obtenir un nombre pair » et B l'événement « obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ». Que vaut $P(A \cup B)$?

Réponse donnée : 5/6

Réponse attendue : 2/3

D'où vient l'erreur : Additionne les deux probabilités sans retrancher celle de l'intersection.

Ce qu'il faut retenir : $A \cup B$ correspond aux issues 2, 4, 5 et 6, soit 4 issues sur 6. On peut aussi écrire $P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 3/6 + 2/6 - 1/6 = 4/6 = 2/3$.

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

On lance deux fois un dé. Quel est l'événement contraire de « obtenir au moins un six » ?

Réponse donnée : obtenir exactement un six

Réponse attendue : n'obtenir aucun six

D'où vient l'erreur : Confond la négation de « au moins un » avec le cas d'un seul succès.

Ce qu'il faut retenir : La négation de « au moins un » est « aucun ». L'événement contraire de « obtenir au moins un six » est donc « n'obtenir aucun six ».

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Simplifier l'expression $(2^3 \times 2^5)/2^4$.

Réponse donnée : $2''$

Réponse attendue : 2^4

D'où vient l'erreur : Multiplie les exposants lors du produit au lieu de les additionner.

Ce qu'il faut retenir : On additionne les exposants au produit et on soustrait celui du dénominateur : $2^{(3+5-4)} = 2^4$, soit 16.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

L'écriture simplifiée de $\sqrt{50}$ est :

Réponse donnée : $25\sqrt{2}$

Réponse attendue : $5\sqrt{2}$

D'où vient l'erreur : Extrait le facteur 25 de la racine sans en prendre la racine carrée.

Ce qu'il faut retenir : On repère le carré parfait 25 dans 50 : $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = 5\sqrt{2}$.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

