

消毒铺巾评分表(F2)

考核者: _____ 考核时间: _____

[illegible]

穿手术衣（前交叉式）、戴手套评分表(F3A)

考核者: _____ 考核时间: _____

[illegible]

穿手术衣（包背式）、戴手套评分表(F3B)

考核者: _____ 考核时间: _____

[illegible]

换药评分表(F4)

考核者：_____考核时间：_____

[illegible]

缝合、打结评分表(F5)

考核者: 考核时间:

[illegible]

拆线评分表(F6)

考核者: _____ 考核时间: _____

[illegible]

浅静脉穿刺采血评分表(F7)

考核者: _____ 考核时间: _____

[illegible]

简易呼吸器使用评分表(F8)

考核者: _____ 考核时间: _____

[illegible]

单人徒手心肺复苏评分表(E)

考核者: _____ 考核时间: _____

[illegible]

四、职业素质	1.对周围人员指令明确，与家属沟通合理。	2										
	2.操作时动作迅速准确，不慌乱。	4										
	3.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	4										
合计		100										

心脏体格检查（视触叩听）评分表(C1)

考核者：_____考核时间：_____

评分标准		分值	考生 1	考生 2	考生 3	考生 4	考生 5
一、准备	完成以上检查时考生站位正确，告知被检者体位、姿势正确	3					
二、视诊							
方法和内容	考生视线与胸廓同高，观察心前区有无隆起或凹陷；再俯视有无 异常搏动，观察心尖搏动的位置、强度与范围。	3					
报告检查结果	心前区有无隆起或凹陷，有无异常搏动，心尖搏动的位置、强度、范围。	4					
三、触诊							
方法和内容	心尖搏动及心前区搏动：先用右手全手掌置于心前区，然后用示指、中指指腹并拢触诊心尖搏动	4					
	震颤：用手掌尺侧（小鱼际）触诊各瓣膜听诊区，再沿胸骨左缘第 2、3、4 肋间进行触诊	4					
	心包摩擦感：于胸骨左缘第 3、4 肋间或心前区，用小鱼际或并拢四指的掌面进行 触诊。嘱被检者屏住呼吸，取坐位前倾，判断有无摩擦感	4					
报告检查结果	心尖搏动的具体位置，有无增强或减弱；心前区有无异常搏动， 有无触及震颤和心包摩擦感	4					
四、叩诊（要求叩出被检者心脏相对浊音界，体表标记，并测量胸骨中线与左锁骨中线距离）							
心脏相对浊音界叩诊方法	被检者平卧位时，考生板指与肋间平行；被检者坐位时，考生扳指与肋间垂直	2					
	考生左手中指第 2 指节紧贴于叩诊部位，其他手指不能与体表接触，右手中指指 端垂直叩击左手中指第 2 指指骨的远端；叩诊时以腕关节与掌指关节的活动为主，叩击后右手中指应立即抬起，叩诊的力度要适中、均匀，同一部位可连续叩击 2～3 次，板指每次移动的距离不宜过大；当叩诊音由清音变为浊音时做标记	7					
心脏相对浊音界叩诊顺序	按照先左后右，由外向内，自下而上的原则叩诊	3					
	左心界从心尖搏动最强点外侧 2～3cm 处开始叩诊，心尖搏动不能触及时，则从左 侧第 5 肋间锁骨中线外 2～3cm 处开始，逐个肋间向上叩诊，直至第 2 肋间。	3					
	右心界先叩出肝上界；再从肝上界的上一肋间开始，依次向上叩至第 2 肋间。	3					
	测量胸骨中线与左锁骨中线的距离，并报告测量结果。	4					

	测量各肋间相对心浊音界至胸骨中线的垂直距离，并判断心界是否正常。	4					
五、听诊							
心脏瓣膜听诊区及心包摩擦音听诊部位	二尖瓣区（心尖区）：心尖搏动最强点。	3					
	肺动脉瓣区：胸骨左缘第 2 肋间。	3					
	主动脉瓣区：胸骨右缘第 2 肋间。	3					
	主动脉瓣第二听诊区：胸骨左缘第 3 肋间。	3					
	三尖瓣区：胸骨左缘第 4、5 肋间。	3					
	心包摩擦音听诊区：心前区或胸骨左缘第 3、4 肋间。	3					
心脏瓣膜听诊区听诊顺序和时间	顺序：通常按逆时针方向依次听诊：从心尖区（二尖瓣区）开始-肺动脉瓣区- 主动脉瓣区一主动脉瓣第二听诊区一三尖瓣区。	5					
	时间：心尖区听诊时间不少于 30 秒，如有心律失常，需听 1 分钟以上。	3					
	报告检查结果：报告心率、节律、心音，有无额外心音，有无心脏杂音和心包摩擦音。	6					
职业素质	与被检者沟通时态度和蔼，体检前和体检结束后能向被检者告知。	5					
	体检中动作规范、力度适中、认真细致，有体现关爱被检者的动作，能体现爱 伤意识。	5					
	着装（工作服）整洁，仪表举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	5					
合计		100					

肺及胸膜检查（视触叩听）评分表(C2)

考核者：_____考核时间：_____

评分标准		分值	考生 1	考生 2	考生 3	考生 4	考生 5
一、准备	完成以上检查时考生站位正确，告知被检者体位、姿势正确	3					
二、视诊							
内 容	呼吸运动类型：以腹式呼吸为主或胸式呼吸为主。	3					
	呼吸频率：观察呼吸频率（不少于 30 秒）及呼吸深度。	3					
	呼吸节律：节律是否均匀、整齐。	3					
报告检查结果	被检者的呼吸运动类型（腹式或胸式呼吸），呼吸频率，呼吸 深浅度，呼吸节律。	4					
三、触诊							
语音震颤（仅查前胸）	检查方法：考生双手掌或手掌尺侧缘（小鱼际）平放于被检者前胸壁，两侧对称， 嘱被检者发同等强度的"yi"长音，自上而下，从内到外，双手交叉，反复比较 左右两侧对应部位语音震颤的异同。	5					
	报告检查结果：语音震颤有无增强或减弱	3					
胸膜摩擦感检查	检查方法：考生将手掌平放于被检者两侧前下胸部。嘱被检者深慢呼吸，注意吸 气相和呼气相有无如皮革互相摩擦的感觉，重复前述检查；嘱被检者屏住呼吸， 注意胸部有无摩擦感	5					
	报告检查结果：有无触及胸膜摩擦感	3					
四、叩诊							
间接叩诊法	检查方法：将左手中指第 2 指节紧贴于叩诊部位，其他手指不能与体表接触，右 手中指指端垂直叩击左手中指第 2 节指骨的远端；叩诊时以腕关节与掌指关节的 活动为主，叩击后右手中指应立即抬起；同一部位可连续叩击 2~3 下	7					
	检查顺序：叩诊自锁骨上窝开始，沿锁骨中线、腋前线自第 1 肋间从上至下逐一 肋间进行叩诊，两侧对应部位对比叩诊；依次检查前胸、侧胸、背部。背部叩诊 时，叩诊肩胛间区、肩胛下区；叩肩胛间区时，板指应与脊柱平行	7					
	报告检查结果：双肺叩诊为清音或其他改变	3					
肺下界及肺下	肺下界检查及结果：嘱被检者均匀呼吸，沿右肩胛线自上而下进行叩诊，逐个肋 间进行，当叩诊音由清音	5					

界移动度检查 （仅查右肩胛 线）	变为浊音时为肺下界，做标记并报告结果						
	肺下界移动度检查及结果：平静呼吸时在右肩胛线上叩出肺下界后，嘱被检者深 吸气后屏气；自此向下叩诊，由清音变浊音时做标记；嘱被检者恢复平静呼吸， 然后深呼气后屏气，考生自上（肩胛下角处）而下叩至浊音（或由下往上叩至浊 音变清音），做标记；测量两标记间的距离即为右肺下界移动度，并报告结果	8					
五、听诊							
内容和方法	正常呼吸音，异常呼吸音，啰音（可口述）	3					
	语音共振：嘱被检者用一般声音强度重复发“yi”长音（或耳语“1、2、3”），考 生用听诊器体件在被检者前、后胸壁由上而下、左右两侧对称部位对比听诊	4					
	胸膜摩擦音：将听诊器体件分别置于被检者两侧前下胸部进行听诊，嘱被检者深 呼吸，注意吸气相和呼气相有无胸膜摩擦的声音，嘱被检者屏气，听诊摩擦音有 无消失	4					
原则和顺序	要求被检者均匀而平静地呼吸，至少听 1~2 个呼吸周期。左右两侧对称部位进行 比较，由肺尖开始，自上而下， 由前胸到侧胸、背部进行听诊。。	7					
报告检查结果	双肺呼吸音是否清晰，有无增强或减弱，有无异常呼吸音、啰 音，有无胸膜摩擦音，语音共振有无增强或减弱	5					
职业素质	与被检者沟通时态度和蔼，体检前和体检结束后能向被检者告知。	5					
	体检中动作规范、力度适中、认真细致，有体现关爱被检者的动作，能体现爱 伤意识。	5					
	着装（工作服）整洁，仪表举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	5					
合计		100					

腹部体格检查（视触叩听）评分表(C3)

考核者：_____考核时间：_____

评分标准		分值	考生 1	考生 2	考生 3	考生 4	考生 5
一、完成以上检查时考生站位正确，告知被检者体位、姿势正确		3					
二、视诊内容及结果：腹部外形、腹式呼吸、腹壁静脉、胃肠型和蠕动波以及腹壁其 他情况（皮疹、色素、腹纹、瘢痕、疝），报告检查结果。		3					
三、听诊							
肠鸣音	检查方法：听诊器体件置于右下腹或脐周，听诊时间不少于 1 分钟。	3					
	报告检查结果：每分钟实测到的肠鸣音次数（正常为 4～5 次/分），肠鸣音是否正 常，有无活跃、亢进、减弱或消失。	3					
血管杂音	检查方法：将听诊器体件分别置于被检者上腹部、脐周部和中、下腹部两侧。	3					
	报告检查结果：有无腹主动脉、肾动脉和髂动脉血管杂音，有无静脉血管杂音。	4					
振水音	检查方法：以听诊器体件置于上腹部或耳凑近被检者上腹部，右手四指并拢，于 上腹部（胃部）冲击振动。	3					
	报告检查结果：是否闻及振水音（即气、液相撞的声音）。	3					
四、触诊							
腹壁紧张度和压痛、反跳痛检查	腹壁紧张度：先将右手置于被检者腹壁上，感受被检者腹壁紧张程度，然后以轻柔动作开触诊。	3					
	腹部压痛、反跳痛：先将右手按压腹壁，观察并询问被检者有无疼痛反应，当出 现疼痛后，手指在原处停留片刻，然后迅速抬起，观察被检者有无疼痛加重。一 般先从左下腹开始检查，原则上最后检查病痛部位。	5					
	麦氏点检查：用右手平压在脐与右髂前上棘连线中外 1/3 交界处，观察被检者的 表情，并了解有无疼痛。如无压痛，需用并拢的 2～3 个手指（示、中、环指）压 于原处稍停片刻，然后迅速抬起，了解有无疼痛骤然加重。	3					

	报告检查结果：有无腹壁紧张和腹部压痛、反跳痛及部位，麦氏点有无压痛及反 跳痛。	3					
肝脏触诊	检查方法：右手手指并拢，置于被检者脐水平处（或右侧髂窝），用示、中指末端 桡侧进行触诊；配合呼吸向前上迎触下移的肝下缘，直至触及肝下缘或右肋缘。 分别在右锁骨中线和前正中中线两条线上进行触诊。	7					
	报告检查结果：肝脏肋下及剑突下是否触及。	3					
Murphy 征	检查方法：左手掌平放于被检者右胸下部，拇指指腹勾压于右侧腹直肌外缘和肋 缘交界处或右锁骨中线与肋缘交界处（胆囊点），告知被检者做深吸气，若被检者 出现触痛，并因疼痛而屏住呼吸称为 Murphy 征阳性	7					
	报告检查结果：Murphy 征阳性或阴性	3					
脾脏触诊(仰卧位或侧卧位姿势检查任选一种)	仰卧位检查方法：左手置于被检者左胸下部（第 9~11 肋处）的后方，将脾脏托 起，右手手指并拢，从脐部开始，用示、中指末端桡侧进行滑动触诊，与左侧肋 缘大致垂直方向，配合被检者腹式呼吸，直至触及脾下缘或左肋缘	7					
	侧卧位检查方法：被检者取右侧卧位，左下肢屈曲，左手置于被检者左下胸（第 9~ 11 肋处）的后方，将脾脏托起，右手置于脐部，手指并拢，用示、中指末端桡侧 进行滑动触诊，与左侧肋缘大致垂直方向，配合被检者腹式呼吸，直至触及脾下 缘或左肋缘						
	报告检查结果：脾脏是否触及	3					
五、叩诊							
肝区叩击痛	检查方法：左手平放在被检者肝区，右手握拳，叩击左手手背，叩诊力度应适中， 同时询问被检者的感觉。	3					
	报告检查结果：肝区叩击痛阳性或阴性。	3					
腹部移动性浊音检查	检查方法：沿被检者脐水平线，可先向左侧叩诊，直至出现浊音后，左手板指不 离开腹壁，请被检者右侧卧位，原位叩诊，检查是否有叩诊音变化；之后自该处 反方向叩诊直至再度出现浊音；请被检者左侧卧或平卧位，同样方法叩诊。	7					
	报告检查结果：移动性浊音阳性或阴性。	3					
职业素质	与被检者沟通时态度和蔼，体检前和体检结束后能向被检者告知。	5					
	体检中动作规范、力度适中、认真细致，有体现关爱被检者的动作，能体现爱 伤意识。	5					
	着装（工作服）整洁，仪表举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	5					
合计		100					

体格检查（血压测量、单侧腋窝淋巴结检查、下肢皮肤水肿检查、小腿和膝关节检查、Babinski 征检查）评分表 (D1)

考核者：_____考核时间：_____

评分标准		分值	考生 1	考生 2	考生 3	考生 4	考生 5
一、完成以上检查时考生站位正确，告知被检者体位、姿势正确		5					
二、测量血压（间接测量法）							
测量方法	测量前，打开血压计开关，检查水银柱是否在“0”点；被检者取坐位或仰卧位，保持肘部与心脏在同一水平	3					
	气袖缠于上臂，其下缘在肘窝上约 2～3cm,气袖中央位于肱动脉表面，松紧度 适宜。确定肱动脉搏动位置，将听诊器体件置于肱动脉搏动处（不能将体件塞于 气袖下）	4					
	向袖带内充气，边充气边听诊至肱动脉搏动音消失后，水银柱再升高 30mmHg, 缓慢放气（水银柱下降速度约为 2～6mmHg/秒），双眼平视水银柱，根据听诊动 脉搏动音变化和水银柱位置读出收缩压、舒张压数值	4					
报告结果	测量两次，取平均值（可口述）（1 分）；报告顺序正确，先报收缩 压，后报舒张压（1 分）；经考官验证考生测定的血压值正确（2 分）	4					
三、单侧腋窝淋巴结检查							
检查部位	（1）腋尖群：位于腋窝顶部；	2					
	（2）中央群：位于腋窝内侧壁近肋骨及前锯肌处；	2					
	（3）胸肌群：位于胸大肌下缘深部；	2					
	（4）肩胛下群：位于腋窝后皱装深部；	2					
	（5）外侧群：位于腋窝外侧壁。	2					
检查顺序	腋尖群—中央群—胸肌群—肩胛下群—外侧群	2					
检查方法	考生左手握被检者左手，将其上臂稍外展；右手示、中、环指并拢，稍弯曲，由浅入深触诊被检者左侧腋窝淋巴结；以左手检查右侧腋窝，步骤同左 侧	3					

报告检查结果	是否触及淋巴结	2					
四、下肢皮肤水肿检查							
检查部位的选择	下肢胫骨前、足背及踝部（选择其中之一即可	4					
检查方法	用手指按压检查部位，待手指松开后观察按压部位皮肤有无凹陷及其 凹陷程度，注意双侧对比	4					
报告检查结果	是否有水肿，程度如何	2					
五、小腿和膝关节检查（包括浮髌实验）							
双侧小腿和膝关节视诊	双侧小腿和膝关节视诊被检者双侧小腿有无皮损或溃烂、皮下出血、表浅静脉曲张、 水肿，有无粗细不等、肿胀等；双侧膝关节有无畸形、肿胀等（4分）。报告检查结 果（1分）。	5					
双侧小腿和膝关节触诊	按压被检者胫前皮肤，观察有无凹陷，按压膝关节，观 察膝关节有无压痛，周围有无包块；考生一手置于被检者膝盖前方，另一手握住 小腿做膝关节屈伸动作，感受膝部是否有摩擦感（4分）。报告检查结果（1分）	5					
浮髌试验	考生左手拇指和其余手指分别固定在被检者膝关节上方两侧，并加压 压迫髌上囊，右手拇指和其余手指分别固定在被检者膝关节下方两侧，以一手示 指按压髌骨，手指不能离开髌骨表皮，了解髌骨有无浮动感，髌骨若有浮动感， 则为浮髌试验阳性（4分）。报告检查结果（1分）	5					
膝关节活动度	被检者膝关节屈曲，观察小腿后部与大腿后部能否相贴，关节能 否伸直（2分）。报告检查结果（1分）	3					
六、Babinski 征检查（需检查双侧反射）							
检查方法	左手扶持被检者踝关节，右手用钝针或棉签等钝性器具沿足底外侧缘 由后向前划至小趾跖趾关节处转向拇趾侧。需检查双侧进行对比（仅检查单侧扣 5 分）	10					
阳性表现	Babinski 征阳性表现为拇趾背伸，其余四趾呈扇形张开	5					
报告检查结果	Babinski 征阳性或阴性	5					
七、职业素质	（-）与被检者沟通时态度和蔼，体检前和体检结束后能向被检者告知。	5					
	（-）体检中动作规范、力度适中、认真细致，有体现关爱被者的动作，能体现爱 伤意识。	5					
	（三）着装（工作服）整洁，仪表举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	5					
合计		100					

体格检查（眼球运动检查、滑车上淋巴结检查、甲状腺检查、乳房触诊检查、跟腱反射、Hoffmann 征检查）评分表(D2)

考核者：_____考核时间：_____

评分标准		分值	考生 1	考生 2	考生 3	考生 4	考生 5
一、完成以上检查时考生站位正确，告知被检者体位、姿势正确		5					
二、眼球运动检查							
检查方法	目标物（如棉签、笔尖或用示指尖）置于被检者眼前 30～40cm 处，告知被检者头部不要转动，眼球随目标物移动	4					
检查顺序	目标物按左、左上、左下，右、右上、右下 6 个方向的顺序进行移动，观察被检者眼球运动情况	4					
报告检查结果	眼球运动是否正常或某一方向运动受限	3					
三、滑车上淋巴结检查							
检查部位	上臂内侧，肱二头肌与肱三头肌之间的间沟内	5					
检查方法	考生左手扶托被检者左前臂，右手示、中、环指并拢，于检查部位由浅及深进行滑动触诊。检查被检者右侧时，用左手进行触诊	5					
报告检查结果	是否触及滑车上淋巴结	4					
四、甲状腺检查							
视诊	甲状腺大小，是否对称	3					
甲状腺侧叶触诊	后面触诊：告知被检者取坐位，考生站在其后；一手示、中指施压于甲状软骨一侧，将气管推向对侧；另一手拇指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺，示、中指触诊甲状腺；嘱被检者做吞咽动作，重复检查。用同样方法检查另一侧甲状腺。	5					
	前面触诊：告知被检者取坐位，考生面对被检者；考生一手拇指施压于甲状软骨一侧，将气管推向对侧；另一手示、中指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺，拇指触诊；嘱被检者做吞						

	咽动作，重复检查。用同样方法检查另一侧甲状腺。						
甲状腺峡部触诊	考生面对被检者用拇指或站在被检者后面用示指，自胸骨上切迹向上触摸，可触到气管前甲状腺组织，判断有无增厚，嘱被检者做吞咽动作，重复检查	5					
听诊	用听诊器体件直接放在甲状腺表面进行听诊，两侧都需检查。	3					
报告检查结果	甲状腺是否肿大，有无结节、震颤，听诊有无血管杂音。	4					
五、乳房触诊检查							
检查方法	先由健侧开始，后检查患侧；手指和手掌平置在乳房上，用手指指腹轻施压力，以旋转或来回滑动进行触诊；检查左侧乳房时由外上象限开始，右手顺时针方向由浅入深、连续触诊，直至4个象限检查完毕，最后触诊乳晕、乳头；用左手以同样的手法检查右侧乳房，从外上象限开始，沿逆时针方向由浅入深、连续进行触诊（须查双侧，只查单侧得3分）。	5					
报告检查结果	双侧乳房大小、位置、硬度、弹性、有无触（压）痛，有无包块；乳头有无触痛，有无硬结、弹性消失，挤压有无异常分泌物。	3					
六、跟腱反射、Hoffmann 征检查							
跟腱反射							
检查方法（仰卧位姿势1、 仰卧位姿势2、 跪位姿势、 俯卧位姿势 四种检查方法任选一种）	①仰卧位姿势1检查：被检者取仰卧位，屈曲髓、膝关节并外旋外展下肢，考生左手扶持被检者前半足底，将被检者足部背屈、与小腿成直角，考生用叩诊锤叩击跟腱。	5					
	②仰卧位姿势2检查：被检者取仰卧位，抬起下肢、与床面约成45°,考生左手扶持被检者前半足底，将被检者足部背屈、与小腿成直角，考生用叩诊锤叩击跟腱。						
	③跪位姿势检查：被检者背向考生双膝跪于床面，双足悬垂于床外，考生用叩诊锤叩击跟腱。						
	④俯卧位姿势检查：被检者取俯卧位，膝关节屈曲90°,考生左手按持被检者前半足底、被检者足部与小腿成直角，考生用叩诊锤叩击跟腱。						
报告正常表现	正常表现为叩击跟腱时，引发腓肠肌收缩，足向跖面屈曲。	4					
报告检查结果	双侧跟腱反射是否存在、对称，有无亢进、减弱或消失。	3					
Hoffmann 征检查							
检查方法	考生左手握持被检者腕部，右手中指与示指夹住被检者中指第一和第二指节间的关节并稍上提、腕部处于轻度过伸位，检查者以拇指迅速弹刮被检者中指指甲。用同样方法检查另一侧。	5					
报告阳性表现	Hoffmann 征阳性表现为除中指外的其余四指掌屈反应：	5					
报告检查结果	双侧 Hoffmann 征阳性或阴性（成人正常表现为阴性）：	3					
七、职业素质	（-）与被检者沟通时态度和蔼，体检前和体检结束后能向被检者告知：	5					
	（二）体检中动作规范、力度适中、认真细致，有体现关爱被检者的动作，能体现爱伤意识。	5					
	（三）着装（工作服）整洁，仪表举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	5					
合计		100					

体格检查（瞳孔对光反射检查、锁骨上淋巴结检查、气管位置检查、脊柱叩击痛检查、脑膜刺激征检查）评分表(D3)

考核者: _____ 考核时间: _____

评分标准		分值	考生 1	考生 2	考生 3	考生 4	考生 5
一、完成以上检查时考生站位正确，告知被检者体位、姿势正确		5					
二、瞳孔对光反射检查							
直接对光反射	用手电筒自外向内移动照射被检者一侧瞳孔，观察该侧瞳孔变化，快速移开光源后再次观察该侧瞳孔变化；用上述方法检查另一侧瞳孔。	4					
间接对光反射	手或遮挡物在被检者鼻梁处遮挡光线，用手电筒自外向内移动照射一侧瞳孔，观察对侧瞳孔变化，快速移开光源后再次观察对侧瞳孔变化；用上 述方法检查另一侧瞳孔。	6					
报告检查结果	被检者双眼直接、间接对光反射灵敏、迟钝或消失。	3					
三、锁骨上淋巴结检查							
检查部位	锁骨上窝淋巴结位于锁骨与胸锁乳突肌所形成的夹角处。	4					
检查方法	考生用三指（示、中、环指）并拢，手指指腹紧贴检查部位，由浅入深进行滑动触诊，左 手触诊被检者声锁骨上淋巴结,右手触诊被检者左锁骨上淋巴结。	5					
报告检查结果	是否触及淋巴结。	4					
四、气管位置检查							
检查方法	考生右手示指与环指分别置于被检者两侧胸锁关节，然后将中指置于 气管之上，观察中指是否在示指与环指中间（或以中指置于气管与两侧胸锁乳突 肌之间的间隙，根据两侧间隙是否等宽来判断气管有无偏移）。	5					
报告检查结果	气管位置有无偏移（正常人气管位置居中）。	3					
五、脊柱叩击痛检查							

检查方法	直接叩击法：考生以中指或叩诊锤依次轻叩各个椎体棘突	4					
	间接叩击法：嘱被检者挺直头颈部及脊柱。考生将左手置于被检者头顶部，右 手半握拳以小鱼际部位叩击左手背	6					
报告检查结果	各部位有无疼痛	3					
六、脑膜刺激征检查							
检查方法	（1）颈强直：被检者去枕仰卧，考生左手置于被检者枕部，托扶并左右转动被检者 头部，观察或感觉被动运动时颈部的阻力，并询问有无疼痛；右手轻按被检者胸 前，左手托扶被检者枕部并作屈颈动作，体会被检者颈部有无抵抗感。	6					
	（2）Kemig 征（须检查双侧反射，若只查一侧不能得满分）：左手固定被检者右侧或左 侧膝关节，右手托持于被检者右侧或左侧足跟部，屈曲髓、膝关节使之均呈 90。，右 手抬高被检者小腿使之伸膝，正常人可伸达 135°以上。询问被检者有无疼痛感。	6					
	（3）Brudzinski 征：去枕，左手托扶被检者枕部并作屈颈动作，右手轻按被检者胸前， 观察被检者髓、膝关节有无屈曲动作。	6					
报告阳性表现	（1）颈强直阳性表现为被动屈颈时抵抗力增强。	4					
	（2） Kemig 征阳性表现为伸膝受阻伴有疼痛或下肢屈肌牵拉痉挛。	4					
	（3） Brudzinski 征阳性表现为双侧膝关节和髋关节屈曲。	4					
报告检查结果	被检者脑膜刺激征为阳性或阴性（成人正常表现为阴性）。	3					
七、职业素质	（一）与被检者沟通时态度和蔼，体检前和体检结束后能向被检者告知。	5					
	（二）体检中动作规范、力度适中、认真细致，有体现关爱被检者的动作，能体现爱 伤意识。	5					
	（三）着装（工作服）整洁，仪表举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	5					
合计		100					

体格检查（眼集合反射检查、颈前淋巴结检查、甲状腺检查、上肢肌力及肌张力检查、膝反射检查）评分表(D4)

考核者：_____考核时间：_____

评分标准		分值	考生 1	考生 2	考生 3	考生 4	考生 5
一、完成以上检查时考生站位正确，告知被检者体位、姿势正确		5					
二、眼集合反射检查（须报告正常表现）							
辐辏反射	嘱被检者注视距离 1 米远处目标（通常用考生的示指尖），将目标物缓慢逐渐移近距离眼球约 5~10cm，观察眼球活动	6					
调节反射	嘱被检者注视距离 1 米远处目标，将目标物快速移至距离眼球约 5~10cm,观察瞳孔变化	6					
报告检查结果	报告被检者的实际检查情况	3					
报告正常表现	随目标物移近，正常表现为眼球内聚，瞳孔缩小	3					
三、颈前淋巴结检查							
检查部位	上臂内侧，肱二头肌与肱三头肌之间的间沟内	5					
检查方法	考生左手扶托被检者左前臂，右手示、中、环指并拢，于检查部位由浅及深进行滑动触诊。检查被检者右侧时，用左手进行触诊	5					
报告检查结果	是否触及滑车上淋巴结	4					
四、甲状腺检查							
视诊	甲状腺大小，是否对称	4					
甲状腺侧叶触诊	后面触诊：告知被检者取坐位，考生站在其后；一手示、中指施压于甲状软骨一侧，将气管推向对侧；另一手拇指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺，示、中指触诊甲状腺；嘱被检者做吞咽动作，重复检查。用同样方法检查另一侧甲状腺。	7					

	前面触诊：告知被检者取坐位，考生面对被检者；考生一手拇指施压于甲状软骨一侧，将气管推向对侧；另一手示、中指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺， 拇指触诊；嘱被检者做吞咽动作， 重复检查。用同样方法检查另一侧甲状腺。						
甲状腺峡部触诊	考生面对被检者用拇指或站在被检者后面用示指，自胸骨上 切迹向上触摸，可触到气管前甲状腺组织， 判断有无增厚，嘱被检者做吞咽动作， 重复检查。	5					
听诊	用听诊器体件直接放在甲状腺表面进行听诊， 两侧均需检查	4					
报告检查结果	甲状腺是否肿大， 有无结节、震颤，听诊有无血管杂音	4					
五、上肢肌力及肌张力检查							
肌力检查	嘱被检者作上肢伸屈动作， 考生从相反方向.给予阻力，测试被检者对 阻力的克服能力，并注意两侧对比。	5					
肌张力检查	嘱被检者放松肌肉，考生根据感知肌肉的硬度及伸屈其上肢时感知 肌肉对被动伸屈的阻力作出判断。	5					
报告检查结果	双侧上肢肌力及肌张力是否正常。	3					
六、膝反射检查							
检查方法	①仰卧位姿势检查:考生左手置于被检者腘窝处，托起被检者膝关节，使之屈曲 120°~135°；右手持叩诊锤叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱。	6					
	②坐位姿势 1 检查:被检者坐位， 小腿自然悬垂，膝关节屈曲 90° ,考生左手置于 被检者髌骨上方，右手持叩诊锤叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱。						
	③坐位姿势 2 检查：被检者坐位并自然屈曲膝关节成 90° ， 将一侧下肢架于另一侧下肢之上、放松（架二郎腿姿势），考生位于被检者右侧、右手持叩诊锤叩击髌骨 下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱。						
报告正常表现	膝反射正常表现为叩击股四头肌肌腱时，引发股四头肌收缩， 小腿伸展动作。	3					
报告检查结果	双侧膝反射是否存在、对称，有无亢进、减弱或消失。	3					
七、职业素质	与被检者沟通时态度和蔼，体检前和体检结束后能向被检者告知。	5					
	体检中动作规范、力度适中、认真细致，有体现关爱被检者的动作能体现爱伤意识。	5					
	着装（工作服）整洁，仪表举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。	5					
合计		100					