

1、一粘连性小肠梗阻患者在住院观察期间出现持续性腹痛阵发性加剧。查体：腹部压痛，肌紧张不明显，未触及痛性包块，肠鸣音 1 次/min，音调不高，未听到气过水声。此时最恰当的处理是

- A、 密切观察腹部体征变化
- B、 腹部 X 线照片检查
- C、 解痉，抗感染及对症治疗
- D、 积极剖腹手术治疗
- E、 经胃肠管抽液减压

答案： D

2、为明确上例诊断，最有价值的检查是

- A、 尿找抗酸杆菌
- B、 腹部平片
- C、 逆行肾盂造影
- D、 肾活检
- E、 中段尿培养

答案： D

3、主侧半球的哪个部位受损会造成感觉性失语

- A、 颞上回后部
- B、 额中回后部
- C、 颞中、下回后部
- D、 顶叶的中央后回
- E、 顶叶缘上回

答案： A

4、急性药物性肝炎的胆汁淤积型主要表现为

- A、 黄疸和瘙痒
- B、 肝细胞坏死
- C、 肝大
- D、 脾大
- E、 腹腔积液

答案： A

5、肾性高血压的发病机制中不包括

- A、 钠水潴留
- B、 激肽合成减少
- C、 肾素-血管紧张素系统激活
- D、 前列腺素合成减少
- E、 交感-肾上腺髓质系统激活

答案： E

6、子宫峡位于

- A、 子宫与输卵管之间
- B、 子宫体与子宫颈之间
- C、 子宫颈阴道上部与子宫颈阴道部之间
- D、 子宫颈与阴道之间
- E、 子宫体与子宫颈阴道部之间

答案： B

7、患者, 女性, 35 岁。头部受到外界剧烈碰撞, 出现 10 分钟的意识障碍, 同时脑外伤后遗忘时间达 36 小时。由上可判断下列哪项指标预后不良

- A、 记忆障碍
- B、 智能障碍
- C、 人格改变
- D、 行为改变
- E、 头疼

答案： B

8、腰椎的形态结构特征为

- A、 横突末端有横突肋凹
- B、 椎体横断面呈心形
- C、 椎孔似圆形
- D、 关节突的关节面几乎呈矢状位
- E、 棘突较细长, 向后下方倾斜, 彼此呈叠瓦状排列

答案： D

9、病毒灭活是指在理化因素作用下使病毒失去

- A、 抗原性
- B、 感染性
- C、 血凝特性
- D、 诱生干扰素的能力
- E、 融合细胞特性

答案： B

10、一患者因注射抗毒素发生血清病,最佳的处理措施是

- A、 输全血
- B、 输白蛋白
- C、 停止注射抗毒素
- D、 注射抗生素
- E、 输血小板

答案: C

11、衡量心肌自律性高低的指标是

- A、 动作电位幅度
- B、 0期去极化速度
- C、 最大复极电位水平
- D、 4期自动去极化速度
- E、 复极化的时程

答案: D

12、下列哪项不是子宫内膜癌的易发因素

- A、 冠心病
- B、 肥胖
- C、 绝经延迟
- D、 高血压
- E、 糖尿病

答案: A

13、Grey Turner 征见于

- A、 Addison 病
- B、 多发性神经纤维瘤
- C、 急性出血性胰腺炎
- D、 血色病
- E、 妊娠

答案: C

14、皮质醇增多症时,下列哪项不正确

- A、 抑制脂肪合成
- B、 抑制蛋白质合成
- C、 嗜酸性粒细胞增多
- D、 血浆肾素活性降低
- E、 抑制垂体促性腺激素

答案: C

15、血浆渗透压的变化()时,即可引起血管升压素分泌的调节

- A、 不足 1%
- B、 不足 2%
- C、 不足 3%
- D、 不足 5%
- E、 5%以上

答案: B

16、下列哪项不属于感知综合障碍

- A、 非真实感
- B、 空间知觉障碍
- C、 视物变形症
- D、 内感性不适
- E、 时间感知综合障碍

答案: D

17、下列属于违反手术室无菌原则的是

- A、 切开空腔脏器前用纱布保护周围组织
- B、 术前,术中及关闭切口前进行器械和敷料的清点
- C、 手术参观人员可与器械台保持 20cm 距离
- D、 可疑污染的物品应当污染物品处理
- E、 缝合皮肤前需对皮肤消毒一次

答案: C

18、精神分裂症最多见的幻觉是

- A、 视幻觉
- B、 听幻觉
- C、 触幻觉
- D、 嗅幻觉
- E、 味幻觉

答案: B

19、胸部外伤伤员,下列哪种情况放胸腔闭式引流

- A、 创伤性窒息
- B、 严重血气胸
- C、 胸壁软化
- D、 肺挫伤
- E、 肺爆震伤

答案: B

20、损伤一侧大脑皮质躯体运动区可导致

- A、 对侧肢体瘫痪和肌张力减退
- B、 对侧肢体瘫痪并伴有感觉障碍
- C、 对侧肢体震颤并伴有肌张力增强
- D、 同侧共济运动障碍和感觉障碍
- E、 对侧肢体瘫痪和肌张力增强

答案： E

21、下列哪项不是糖尿病酮酸症中毒的诱因

- A、 手术创伤
- B、 突然中断胰岛素治疗
- C、 急性感染
- D、 诊断延误
- E、 少食

答案： E

22、以下哪种是引起儿童继发性肾病综合征的常见原因

- A、 微小病变肾病
- B、 过敏性紫癜肾炎
- C、 原发性高血压
- D、 糖尿病肾病
- E、 急进性肾炎

答案： B

23、天然的特异性细胞因子抑制物是

- A、 IL-1R α
- B、 IL-2R
- C、 IL-4R
- D、 IL-6R
- E、 IL-8R

答案： A

24、我国规定的传染病管理报告制度中,下列错误的是

- A、 法定传染病分 3 类 35 种
- B、 甲类 2 种病
- C、 乙类 22 种病
- D、 丙类 11 种病
- E、 传染性非典型肺炎属于甲类传染病

答案： E

25、轻度二尖瓣狭窄是指

- A、瓣口面积 3.0cm^2 以上
- B、瓣口面积 2.5cm^2 以上
- C、瓣口面积 2.0cm^2 以上
- D、瓣口面积 1.5cm^2 以上
- E、瓣口面积 1.0cm^2 以上

答案： D

26、下列关于压力感受性反射的描述, 正确的是

- A、感受器是颈动脉体和主动脉体
- B、感受器能直接感受血压的变化
- C、在心动周期中, 传入冲动频率随血压波动发生周期性变化
- D、反射中枢是延髓孤束核
- E、当传入冲动增多时, 所有传出神经的冲动都减少

答案： C

27、肾病综合征必需诊断条件是

- A、血尿、高血压
- B、肾功能损害
- C、水肿
- D、大量蛋白尿和低蛋白血症
- E、高脂血症

答案： D

28、蜱传回归热包柔体感染出现 IgM 型抗体的时间

- A、3 天
- B、5 天
- C、1 周
- D、2 周
- E、3 周

答案： C

29、目前, 我国治疗普通型流脑首选的药物是

- A、磺胺类药
- B、青霉素
- C、氯霉素
- D、氨苄西林
- E、头孢菌素

答案： B

30、血中哪种物质浓度升高刺激醛固酮的分泌

- A、 氯离子浓度
- B、 氢离子浓度
- C、 钠离子浓度
- D、 钾离子浓度
- E、 ACTH

答案： D

31、低排低阻型休克可见于

- A、 失血性休克
- B、 创伤性休克
- C、 烧伤性休克
- D、 心源性休克
- E、 感染性休克

答案： D

32、供氧不足时, 3-磷酸甘油醛脱氢产生的 $\text{NADH}+\text{H}^+$ 的主要去路是

- A、 参加脂肪酸的合成
- B、 使丙酮酸还原生成乳酸
- C、 维持 GSH 处于还原状态
- D、 经 α -磷酸甘油穿梭进入线粒体氧化
- E、 苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体氧化

答案： B

33、小量咯血是指每日咯血量

- A、 $<50\text{ml}$
- B、 $<100\text{ml}$
- C、 $<200\text{ml}$
- D、 $<300\text{ml}$
- E、 $<500\text{ml}$

答案： B

34、不属于钩体病肺弥漫性出血型诱因的是

- A、 赫氏反应
- B、 钩体毒力强
- C、 病后未及时治疗
- D、 患者免疫力低
- E、 应用皮质激素后患者抵抗力降低

答案： E

35、血管外溶血红细胞的最主要破坏场所是

- A、 肝
- B、 脾
- C、 循环血流中
- D、 骨髓
- E、 纤维蛋白条索间的网孔

答案： B

36、使细胞内环化腺苷酸 cAMP 水平升高的因素有

- A、 蛋白激酶 A
- B、 磷酸二酯酶
- C、 磷脂酶 C
- D、 腺苷酸环化酶
- E、 蛋白激酶 C

答案： D

37、妊娠期妇女心排出量最多的时期是

- A、 妊娠 20~22 周
- B、 妊娠 24~26 周
- C、 妊娠 28~30 周
- D、 妊娠 32~34 周
- E、 妊娠 36~37 周

答案： D

38、引起冠脉舒张的主要因素是

- A、 $\text{PaO}_2 \uparrow$
- B、 $\text{pH} \uparrow$
- C、 $\text{PaCO}_2 \downarrow$
- D、 $\text{PaO}_2 \downarrow$
- E、 $\text{pH} \downarrow$

答案： D

39、下面不属于意识障碍的是

- A、 嗜睡
- B、 谵妄
- C、 睁眼昏迷
- D、 闭锁综合征
- E、 无动性缄默

答案： D

40、以下哪种病因引起的急性肾损伤好发于儿童

- A、 系统性红斑狼疮
- B、 溶血尿毒综合征
- C、 ANCA 相关性血管炎
- D、 微小病变性肾病
- E、 急性链球菌感染后肾小球肾炎

答案： B

41、伤寒小结的组成主要是

- A、 伤寒细胞、中性粒细胞
- B、 多核巨细胞、上皮样细胞
- C、 上皮样细胞、淋巴细胞
- D、 巨噬细胞、伤寒细胞
- E、 淋巴细胞、浆细胞

答案： D

42、肱骨髁上伸直型闭合性骨折最易出现的副损伤是

- A、 肱动脉损伤
- B、 正中神经损伤
- C、 尺神经损伤
- D、 桡神经损伤
- E、 肘关节前脱位

答案： A

43、关于预防外科感染,下列叙述不正确的是

- A、 注意个人卫生,避免创伤
- B、 应用免疫疗法,预防破伤风
- C、 手术时注意无菌操作,防止伤口感染
- D、 加强对糖尿病患者的护理
- E、 经常服用保健药品,预防外科感染

答案： E

44、下列哪项不易引起急性胰腺炎的发生

- A、 酒精中毒
- B、 胆石症
- C、 原发性高脂血症
- D、 甲状旁腺功能亢进症
- E、 糖尿病

答案： E

45、在肾素-血管紧张素系统中,具有极强缩血管效应的是

- A、 肾素
- B、 血管紧张素 I
- C、 血管紧张素 II
- D、 血管紧张素 III
- E、 血管紧张素转换酶

答案: C

46、下列只有一个血清型的病毒是

- A、 流感病毒
- B、 腺病毒
- C、 麻疹病毒
- D、 鼻病毒
- E、 副流感病毒

答案: C

47、下列哪项不符合 Sheehan 综合征的临床表现

- A、 生殖器萎缩
- B、 皮肤黏液性水肿
- C、 无乳或汗少
- D、 皮肤色素加深
- E、 闭经不孕

答案: D

48、下列哪种类型的休克导致机体分解代谢增强最为明显

- A、 失血性休克
- B、 过敏性休克
- C、 感染性休克
- D、 神经源性休克
- E、 心源性休克

答案: C

49、溃疡病发病机理的种种说法中占主要地位的是



- A、胆汁反流
- B、慢性胃炎
- C、胃血管痉挛
- D、慢性胃炎,胃排空过速
- E、胃酸增高,胃黏膜屏障破坏

答案: E

50、慢性肺源性心脏病发生右心衰竭时,首先应作的处理是

- A、积极控制感染,改善呼吸功能
- B、适量应用利尿剂及补钾
- C、按常规剂量应用强心药
- D、积极选用止咳化痰药物
- E、用酚妥拉明或硝普钠血管扩张剂

答案: A

51、为尽快明确霍乱病例的诊断,应检测

- A、大便常规
- B、大便悬滴及制动试验
- C、大便培养
- D、大便涂片找细菌
- E、大便检测特异性抗原

答案: B

52、关于肾的位置描述,正确的是

- A、位于腹膜后间隙前
- B、右肾略高于左肾
- C、肾门高度约位于第2腰椎体平面

- D、 第 12 肋斜越左肾后面中部
- E、 两肾下端距离较近

答案： D

53、斜方肌麻痹时, 不能做下列哪项动作

- A、 充分外展肩关节
- B、 充分屈肩关节
- C、 使肩胛骨向脊柱靠近
- D、 使肩胛骨贴近胸廓
- E、 充分内收肩关节

答案： C

54、肝性脑病发病机制最确实有据的学说为

- A、 氨中毒学说
- B、 色氨酸
- C、 γ -氨基酸/苯二氮草复合体学说
- D、 锰的毒性
- E、 假性神经递质

答案： A

55、纠正尿毒症性贫血最有效的措施是

- A、 输新鲜血
- B、 输库存血
- C、 输血浆
- D、 注射促红细胞生成素
- E、 输血浆代用品

答案： D

56、原发性肝癌是指

- A、 胆管上皮发生的癌
- B、 肝细胞和肝内胆管上皮发生的癌
- C、 肝细胞发生的癌
- D、 肝细胞和肝外胆管上皮发生的癌
- E、 来自库普弗细胞的恶性肿瘤

答案： B

57、有关慢性肾炎, 下面说法哪项不对

- A、 成人多见
- B、 病程 1 年以上, 可达几十年

- C、 有血尿、蛋白尿、高血压、水肿等
- D、 多数病人有急性肾炎史
- E、 晚期时肾萎缩,肾衰竭

答案: D

58、下列不符合子宫内膜异位症的临床表现是

- A、 痛经
- B、 月经量增多
- C、 不孕
- D、 性交痛
- E、 病变局限在女性生殖系统内

答案: E

59、胆囊穿孔的治疗应是

- A、 紧急手术,引流腹腔
- B、 胆囊造影术
- C、 肝叶切除术
- D、 紧急手术解除梗阻,减压并引流胆道
- E、 胆总管-空肠吻合术

答案: A

60、顶盖前区参与

- A、 内脏反射
- B、 瞳孔对光反射
- C、 角膜反射
- D、 浅反射
- E、 听觉反射

答案: B

61、一个大学生刚刚参加工作,对工作环境 and 人际环境都有很多不适应,这位大学生哪种调整不恰当

- A、 调整认知态度
- B、 合理运用防御机制
- C、 接受社会支持
- D、 调整自我期望
- E、 要求单位调整岗位

答案: E

62、恙虫病的主要传染源是

- A、 鼠类
 - B、 恙螨
 - C、 鼠蚤
 - D、 体虱
 - E、 患者
- 答案： A

63、患儿呈长头畸形可能为

- A、 额状缝早闭
 - B、 冠状缝早闭
 - C、 矢状缝早闭
 - D、 鳞状缝早闭
 - E、 人状缝早闭
- 答案： C

64、下列哪组趋化因子受体是 HIV 在巨噬细胞和 T 淋巴细胞上的辅助受体

- A、 CCR2、CXCR4
 - B、 CCR1、CXCR2
 - C、 CCR5、CXCR4
 - D、 CCR5、CX3CR1
 - E、 XCR1、CCR5
- 答案： C

65、胃的供血动脉中起自肝固有动脉的是

- A、 胃左动脉
 - B、 胃右动脉
 - C、 胃后动脉
 - D、 胃短动脉
 - E、 胃网膜右动脉
- 答案： B

66、尿崩症患者易出现

- A、 低容量性高钠血症
 - B、 低容量性低钠血症
 - C、 等渗性脱水
 - D、 高容量性低钠血症
 - E、 低钠血症
- 答案： A

67、下列不属于继发性高血压的是

- A、 急进型高血压
- B、 嗜铬细胞瘤
- C、 原发性醛固酮增多症
- D、 皮质醇增多症
- E、 肾动脉狭窄性高血压


答案： A

68、解热镇痛药适用于治疗

- A、 慢性钝痛
- B、 内脏绞痛
- C、 分娩止痛
- D、 外伤剧痛
- E、 术后剧痛

答案： A

69、主动脉粥样硬化巨检如图, 镜下观如图所示, 该病变最佳名称为



- A、 脂纹
- B、 纤维斑块
- C、 粥样斑块
- D、 粥样性溃疡
- E、 动脉瘤形成

答案： D

70、下列符合机体在炎热环境下的表现的是

- A、 肌紧张增强
- B、 皮肤血流量增加
- C、 交感神经的紧张度增强
- D、 机体表层的隔热器作用增强
- E、 四肢热量逆流交换作用加强


答案： B

71、戊型肝炎患者应采取以下哪种隔离措施

- A、 严密隔离
- B、 消化道隔离
- C、 接触隔离
- D、 血液-体液隔离
- E、 昆虫隔离

答案： B

72、最常见的引起上消化道出血的原因是



- A、 胆道出血
- B、 胃炎
- C、 胃癌
- D、 食管胃底静脉曲张
- E、 消化道溃疡

答案： E

73、颅内动脉瘤最好发的部位是

- A、 Willis 环动脉分叉处
- B、 颈内动脉
- C、 大脑中动脉
- D、 大脑前动脉
- E、 大脑后动脉

答案： A

74、临床上最常见的急性肾衰竭的病因是

- A、 重症肾盂肾炎
- B、 急性间质性肾炎
- C、 大量出血
- D、 重症肾小球肾炎

E、 急性肾小管坏死

答案： E

75、病人出现下列哪项,医生可以宣布死亡

A、 心跳停止

B、 呼吸停止

C、 各种反射消失

D、 机体作为一个整体的功能永久性停止

E、 体内所有细胞解体死亡

答案： D

76、关于中毒型细菌性痢疾的发病机制,叙述错误的是

A、 个别机体对痢疾杆菌产生的内毒素敏感,而产生强烈的变态反应

B、 内毒素直接作用于全身小血管痉挛,引起急性微循环障碍

C、 肠黏膜病变重出现脓血便

D、 内毒素引起重要脏器功能衰竭

E、 脑微循环障碍,引起脑水肿

答案： B

77、牛乳成分与母乳成分相比较,哪项是不正确的

A、 蛋白质含量多,且以酪蛋白为主

B、 含饱和脂肪酸较多

C、 乳糖含量低于母乳

D、 牛奶矿物质盐类较少

E、 铁含量少,吸收率低

答案： D

78、感觉性失语主要损害优势半球的

A、 颞下回后部

B、 顶下小叶

C、 额下回后部

D、 缘上回

E、 颞上回后部

答案： E

79、关于细菌性痢疾的病理改变,叙述错误的是

A、 细菌性痢疾的肠道病变主要在结肠

B、 乙状结肠和直肠病变最显著

C、 病变可导致肠穿孔

- D、急性期病变为弥漫性纤维蛋白渗出性炎症
- E、结肠黏膜可覆盖灰白色假膜

答案： C

80、妊娠高血压综合征时,应用硫酸镁最早出现的中毒反应是

- A、呼吸减慢
- B、心率减慢
- C、尿量减少
- D、腱反射消失
- E、腱反射亢进

答案： D

81、患者经针刺或反复大声叫喊后能醒来,做简短模糊的回答,外界刺激停止立即入睡,这种意识状态称为

- A、清醒
- B、昏睡
- C、嗜睡
- D、浅昏迷
- E、深昏迷

答案： B

82、肝区叩击痛对下列诊断最有意义的是

- A、肝硬化
- B、脂肪肝
- C、肝内胆管结石
- D、门静脉血栓
- E、肝脓肿

答案： E

83、下列关于出血性疾病的皮肤黏膜出血情况,描述不正确的是

- A、可由血小板数量或功能异常引起
- B、可由止血与凝血功能障碍引起
- C、可引起全身性皮肤黏膜自发性出血
- D、严重伤后出血不止
- E、受轻伤后出血不止

答案： D

84、对早期肾结核,合适的处理是

- A、尽早作肾切除

- B、 积极抗结核及保守治疗
- C、 结肠膀胱术
- D、 一侧肾造瘘
- E、 空洞引流术

答案： B

85、在传染病感染过程的各种表现中,最易识别的是

- A、 潜伏性感染
- B、 隐性感染
- C、 病原体被清除
- D、 病原携带状态
- E、 显性感染

答案： E

86、下面情况易致低血钾的是

- A、 严重腹泻
- B、 高热
- C、 创伤
- D、 急性肾衰少尿期
- E、 缺氧

答案： A

87、关于胸、腰椎骨折或脱位的治疗,错误的是

- A、 椎体压缩不到 1/3 者,可仰卧硬板床,使脊柱过伸,1~2 天后即逐渐进行背肌锻炼
- B、 椎体后部有压痛,椎板、关节突有骨折,不宜用双踝悬吊法复位,以免引起脊髓损伤
- C、 青少年及中年患者,可用两桌法过伸复位
- D、 患者心、肺、肝、肾功能不良时,不宜应用以上两法
- E、 骨折脱位有关节交锁并截瘫者,可在局麻下切开复位并内固定

答案： B

88、一患者患有小脑肿瘤,其最可能有的症状是

- A、 肌张力增高
- B、 反射消失
- C、 偏瘫
- D、 静止性震颤
- E、 共济失调

答案： E

89、狂犬病的病变部位主要在

- A、 咽喉部
- B、 口腔黏膜
- C、 中枢神经系统
- D、 咬伤的部位
- E、 周围神经系统

答案： C

90、对腹后外侧核说法正确的是

- A、 为内侧丘系的终止核
- B、 接受视觉传入冲动
- C、 管理对侧头面部感觉
- D、 接受舌前 2/3 味觉
- E、 位于内侧膝状体腹侧

答案： A

91、采用非手术治疗颈椎病,下列错误的是

- A、 自我保健疗法
- B、 颈托和颈围以限制颈椎过度活动
- C、 理疗可加速炎性水肿消退、松弛肌肉
- D、 颈枕带牵引适用于各型颈椎病
- E、 药物治疗,有固定较小痛点时可局部注射皮质类固醇制剂

答案： D

92、脂肪大量动员时肝内生成的乙酰 CoA 主要转变为

- A、 葡萄糖
- B、 胆固醇
- C、 脂肪酸
- D、 酮体
- E、 丙二酰 CoA

答案： D

93、治疗全身性深部真菌感染的首选药是

- A、 灰黄霉素
- B、 制霉菌素
- C、 两性霉素 B
- D、 克霉唑
- E、 咪康唑

答案： C

94、重症肌无力危象是指

- A、 急起的严重吞咽困难
- B、 急起的严重全身无力
- C、 急起的严重构音不清
- D、 急起的呼吸肌麻痹和呼吸衰竭
- E、 并发严重的感染

答案： D

95、婴幼儿腹泻输液治疗中,有关钾的补充不正确的是

- A、 患儿入院重度脱水,急查血钾 $<3.5\text{mmol/L}$,应立刻静滴氯化钾
- B、 不静脉推注氯化钾
- C、 氯化钾输注液中浓度一般不高于 0.3%
- D、 每日氯化钾剂量约为 $3\sim 4\text{mmol/kg}$
- E、 细胞内钾恢复慢,故常需补钾 $4\sim 6$ 日,甚至更长

答案： A

96、关于上矢状窦的说法错误的是

- A、 位于大脑镰的上缘
- B、 前方止于盲孔
- C、 后方注入窦汇
- D、 蛛网膜粒突入此窦
- E、 不属于硬脑膜窦

答案： E

97、留置导尿管 3 天以上引起尿路感染的机会可达

- A、 0.5
- B、 0.6
- C、 0.7
- D、 0.8
- E、 0.9

答案： E

98、风心病患者,心房颤动 3 年,心率 $60\sim 70$ 次/min,应考虑采取的措施是

- A、 口服地高辛
- B、 长期口服华法林或阿司匹林
- C、 维拉帕米
- D、 电复律
- E、 口服奎尼丁

答案： B

99、发热时糖代谢变化为

- A、 糖原分解↑,糖异生↑,血糖↑,乳酸↑
- B、 糖原分解↓,糖异生↓,血糖↓,乳酸↓
- C、 糖原分解↑,糖异生↑,血糖↑,乳酸↓
- D、 糖原分解↓,糖异生↓,血糖↓,乳酸↑
- E、 糖原分解↑,糖异生↓,血糖↑,乳酸↑

答案: A

100、阿司匹林用于防治血栓形成的机理是

- A、 直接抑制磷脂酶
- B、 减少花生四烯酸的堆积
- C、 抑制 PG 合成酶,使 TXA₂合成减少
- D、 直接抑制 PGI₂生成
- E、 直接对抗 PG

答案: C

101、抗利尿激素在下列哪一部位合成

- A、 腺垂体
- B、 垂体后叶
- C、 垂体柄
- D、 下丘脑
- E、 肾脏

答案: D

102、呼吸系统分为上下呼吸道,其分界处为

- A、 喉部
- B、 声带
- C、 环状软骨下缘
- D、 总气管分叉部
- E、 会厌软骨下缘

答案: C

103、先天性胆道闭锁的手术治疗宜选择在出生后

- A、 2 个月内
- B、 3 个月内
- C、 4 个月内
- D、 5 个月内
- E、 6 个月内

答案: A

104、呼吸运动可影响心脏杂音强度的是

- A、 主动脉瓣关闭不全
- B、 三尖瓣关闭不全
- C、 二尖瓣关闭不全
- D、 二尖瓣狭窄伴关闭不全
- E、 主动脉瓣狭窄伴关闭不全

答案： B

105、一般情况下正常成人每天出入水量约为

- A、 1000~1500ml
- B、 1500~2000ml
- C、 2000~2500ml
- D、 2500~3000ml
- E、 3000~4000ml

答案： C

106、42 岁的原告李某与丈夫张某婚后 6 年不育, 双方商议决定通过人工授精的方式生子。李某怀孕期间, 张某因患癌症去世。去世前张某留下遗嘱, 称日后妻子所生孩子是通过人工授精所生, 他坚决不要; 现有一套房产, 张母曾出资 1.5 万元, 以张名义购买, 张某决定将房产归还父母。围绕这份遗嘱, 婆媳发生纠纷。李某携 15 个月大的儿子, 将公婆告上法庭, 并向法庭出示有其丈夫签名的“不孕夫妇人工授精申请书”及“协议书”, 要求为人工授精的儿子讨回继承权。基于本案例的分析, 合理的是

- A、 既然李某儿子与丈夫无血缘关系, 就不应是合法后代
- B、 遗产划分应优先考虑遗嘱, 按照遗嘱, 李某和儿子对此房产无继承权
- C、 人工授精之子与张某无血缘关系故不应视为婚生子女
- D、 尽管人工授精之初是夫妻双方的共同意愿, 但现在张某反悔, 故李某所生孩子便不享有继承权
- E、 人工授精是夫妻双方的共同意愿, 尽管李某所生儿子与张某无血缘关系, 但却是二人的合法后代, 理应享有继承权

答案： E

107、患者, 男, 28 岁, 1 型糖尿病病史 10 年, 因出尿频、口渴、严重心慌入院。血液检查: 血钾 5.7mmol/L、碳酸氢钠 13mmol/L、血尿素氮 11mmol/L、血糖 39mmol/L。该患者的肾脏损伤类型为

- A、 近曲小管损伤
- B、 急性肾后性肾衰竭
- C、 慢性肾衰竭
- D、 急性肾性肾衰竭

E、尿毒症

答案： C

108、患儿，男，8个月。平日多汗，易惊，两日来间断抽搐就诊，发作时意识丧失，两眼上翻，手足紧握抽动，可自行缓解入睡，醒后精神可，最适宜的处理是

A、 补钙→止惊→补维生素 D

B、 止惊→补钙→补维生素 D

C、 补维生素 D→补钙→止惊

D、 止惊→补维生素 D→补钙

E、 补钙→补维生素 D→止惊

答案： B

109、患者，男，42岁，药物引起急性肝衰竭，近两日出现意识错乱、行为失常，以下关于患者肝性脑病程度分级正确的是

A、 I度

B、 II度

C、 III度

D、 IV度

E、 V度

答案： B

110、患者，女，42岁。右上腹疼痛1年，常在进食油脂重食物后发作。昨晚吃炖猪蹄后1小时出现右上腹痛，向右肩部放射，呕吐2次，腹部检查最可能发现压痛的部位是

A、 肋脊点

B、 McBurney点

C、 上输尿管点

D、 季肋点

E、 胆囊点

答案： E

111、患儿，男，7岁。1岁后发绀逐渐加重，胸骨左缘第2~3肋间有Ⅱ~Ⅲ级收缩期杂音，为明确诊断，最有价值的检查是

A、 心动电流图

B、 动脉血氧饱和度

C、 心脏功能负荷试验

D、 胸部X线片

E、 心导管造影

答案： E

112、患者,女,32岁,双手指遇寒冷后顺序出现苍白、青紫和潮红3年,逐渐加重,每次发作时间为15~30分钟,临床上考虑为雷诺综合征,以下描述哪项正确

- A、 发作时常有剧痛
- B、 多有指尖溃疡
- C、 桡动脉搏动减弱
- D、 发作时伴有手麻木
- E、 发作间歇期,皮温正常

答案: D

113、患儿,女,3岁。高热3天,T 39.5℃,诉咽痛和眼部刺痛,恶心呕吐伴腹泻、腹痛,检查咽充血明显,两眼滤泡性结合膜炎,颈部和耳后淋巴结肿大,心肺腹检查无特殊。可能的诊断为

- A、 流行性感
- B、 麻疹早期
- C、 猩红热早期
- D、 咽结合膜热
- E、 急性阑尾炎

答案: D

114、一患儿因肠梗阻入院手术,术中医师将膀胱当做囊肿切除,造成患儿储尿、排尿功能严重受损。该事件中,医师的主观心态是

- A、 直接故意
- B、 间接故意
- C、 疏忽大意的过失
- D、 过于自信的过失
- E、 未必就有过错

答案: C

115、初产妇,足月妊娠,临产16小时。产科检查:宫口开大7cm,S-1,枕后位,对角径11.5cm,坐骨棘间径9cm,骶棘韧带容2指,坐骨结节间径9cm。骨盆类型最可能是

- A、 扁平骨盆
- B、 骨盆入口平面狭窄
- C、 均小骨盆
- D、 中骨盆平面狭窄
- E、 畸形骨盆

答案: D

116、患者,男,54岁。意识不清3小时。查体:昏迷,呼吸缓慢,双侧瞳孔缩小,对光反射存在。该患者最可能的诊断是

- A、颠茄类中毒
- B、有机磷农药中毒
- C、酒精中毒
- D、氰化物中毒
- E、一氧化碳中毒

答案: B

117、患者,男,20岁。郊游时,右足疼痛,30分钟后无力行走,体检示:BP90/60mmHg,牙关紧闭,足背可见I双点状,牙痕,伴红肿。最好的解毒方法是

- A、抗蛇毒血清
- B、抗生素
- C、破伤风抗毒素
- D、止血带结扎伤口上方近心端
- E、止血带结扎伤口上方离心端

答案: A

118、某有机酸,其氧化脱羧产物是合成脂肪酸的原料;经转氨酶催化作用可转变为一种脂肪族氨基酸;在无氧条件下可转变为含羟基的三碳有机酸。该物质最可能是

- A、1,3-二磷酸甘油酸
- B、丙酮酸
- C、柠檬酸
- D、 α -酮戊二酸
- E、乳酸

答案: B

119、患者,男,42岁,有高血压史。4小时前因劳累而感头痛,烦躁,心悸,多汗,恶心,面色苍白,视力模糊,收缩压33.8kPa(260mmHg),舒张压18.6kPa()。以下治疗最适宜的是

- A、氢氯噻嗪口服
- B、普萘洛尔口服
- C、静脉输液
- D、硝普钠静滴
- E、安定肌注

答案 D

答案:

120、患者,男,28岁。半年来时有腹泻与便秘,3个月来腹部有隐痛,近2天大量便鲜血,直肠指检和腹部诊断没有发现肿物,X线钡餐灌肠示降结肠壁僵直,可见充盈缺损。最可能的诊断是

- A、乙状结肠癌
- B、克罗恩病
- C、降结肠癌
- D、溃疡性结肠炎
- E、肠结核

答案: C

121、患儿,男,8岁,平时有偏食习惯。入学后上课难集中精神听课,学习成绩欠佳,体检面色稍苍白,浅淋巴结及肝脾不大,RBC $3.6 \times 10^{12}/L$,Hb 101g/L,MCV 72f1,网织红细胞 0.015,白细胞和血小板正常。最可能的诊断是

- A、地中海贫血
- B、营养性巨幼细胞贫血
- C、铅中毒
- D、感染性贫血
- E、营养性缺铁性贫血

答案: E

122、患者,女,43岁。右颌部放射性撕裂样疼痛3年。每周发作超过1次,阵发性疼痛常为寒冷刺激诱发,多次神经影像学检查未见头部器质性病变。假定无治疗禁忌证,合理的治疗是

- A、氯硝安定 1mg,口服,每日三次
- B、安定 5mg,口服,每日两次
- C、丙戊酸钠 250mg,口服,每日三次
- D、消炎痛 10mg,口服,每日三次
- E、卡马西平 100mg,口服,每日两次

答案: E

123、患者,男,24岁,农民。乏力,食欲缺乏,尿黄10天,出现行为异常3天。体检:意识欠清,皮肤、巩膜深度黄染,肝上界于第6肋间,下界肋下未触及。ALT 1000U/L,STB 256.5 $\mu\text{mol/L}$,CB 170 $\mu\text{mol/L}$,UCB 86.5 $\mu\text{mol/L}$ 。该患者最可能的诊断是

- A、急性黄疸型肝炎
- B、急性重型肝炎
- C、亚急性重型肝炎
- D、慢性重型肝炎
- E、淤胆型肝炎

答案： B

124、患者,女,36岁,消瘦伴有畏热多汗,性情急躁,心悸,多考虑哪种疾病导致的消瘦

- A、 肾上腺皮质功能减退症
- B、 希恩综合征
- C、 1型糖尿病
- D、 甲状腺功能亢进症
- E、 神经精神疾病

答案： D

125、患者,女,36岁,上腹部饥饿痛1周。查体:神志清, BP100/70mmHg, 心率78/min。胃镜检查如图。最佳治疗是



- A、 6-氨基己酸静脉滴注
- B、 氨甲苯酸肌注
- C、 奥美拉唑静脉滴注
- D、 去甲肾上腺素口服
- E、 制酸剂口服\

答案： E

126、一足月儿娩出过程不顺利,生后 Apgar 评分 1 分钟、5 分钟及 10 分钟分别为 2、3、6 分,生后 8 小时小儿肌张力高,有吸吮、咂嘴等动作,阵发性口周发绀。最可能的诊断是

- A、 化脓性脑膜炎
- B、 缺氧缺血性脑病
- C、 低血糖
- D、 破伤风
- E、 胆红素脑病

答案： B

127、患儿,5个月,诊断为狭颅症,常合并下列畸形,除外

- A、 脊柱裂
- B、 眼裂
- C、 腭裂
- D、 唇裂
- E、 并指

答案: B

128、患儿7个半月,生后1个月来门诊健康咨询,患儿早产,行母乳喂养,母孕后期有小腿抽筋。患儿除有时睡眠不安外,无其他症状。体检:一般状态好,未见异常体征。血清钙 2.2mmol/L (10mg/dl)。指导其母需采取的措施是

- A、 肌注维生素D₃ 30万单位
- B、 口服鱼肝油
- C、 喂维生素D强化牛奶
- D、 口服维生素D每日400IU
- E、 口服活性钙

答案: D

129、患者,男,51岁。昨晚饮酒较多,今晨被发现死于床上。尸检时发现两侧胁腹部青紫斑。该患者最可能的死因是

- A、 急性心肌梗死
- B、 急性出血坏死型胰腺炎
- C、 脑出血
- D、 急性中毒性痢疾
- E、 消化道出血

答案: B

130、患者,女,近日胸痛乏力,午后低热,胸片发现左下胸部大片密度增高影,进一步确诊是否为胸腔积液的首选检查是

- A、 断层摄影
- B、 选择性支气管造影
- C、 纤维支气管镜检查
- D、 肺CT扫描
- E、 超声波检查

答案: E

131、患者,男,36岁,慢性腹泻5年,大便有少量脓血,纤维结肠镜检查直肠、乙状结肠散在小溃疡,治疗上首选

- A、 氢化可的松保留灌肠
- B、 口服泼尼松
- C、 口服诺氟沙星
- D、 口服甲硝唑
- E、 口服 SASP

答案： E

132、患儿,女,9个月。高热、咳嗽4天,体温39~40℃,面色苍白、发灰,双肺呼吸音粗,未闻及啰音,白细胞 $5.1 \times 10^9/L$,胸部X线右下肺可见大小不等的片状阴影,若作病原学检查,首选下列哪项

- A、 病毒分离
- B、 双份血清抗体检测
- C、 细菌对流免疫电泳
- D、 免疫荧光法病毒抗原检测
- E、 噬珠溶解试验

答案： D

133、某患者在医患交谈时不愿说出自己的问题,担心让别人知道,出现缄默不语。这时,医生应采用

- A、 启发式发问
- B、 灌注式发问
- C、 连续性发问
- D、 针对性发问
- E、 诱导性发问

答案： A

134、患者,男,37岁。于搬货后出现腰痛、左下肢疼痛,咳嗽时加重,休息后缓解,无关节肿胀。该患者最可能的诊断是

- A、 腰肌纤维组织炎
- B、 腰肌劳损
- C、 腰椎间盘突出
- D、 髋关节结核
- E、 强直性脊柱炎

答案： C

135、患者,女,50岁。查体时叩击髌韧带,观察膝跳反射,与该反射感觉传导相关的结构是

- A、 孤束
- B、 内侧纵束

- C、 薄束
- D、 楔束
- E、 脊髓丘脑束

答案： C

136、患者,女,25岁。人工流产吸宫术中,出现头晕、胸闷,考虑为人工流产综合征。下列临床表现,不符合的是

- A、 心动过速
- B、 心律不齐
- C、 血压下降
- D、 面色苍白,出汗
- E、 昏厥与抽搐

答案： A

137、患儿,女,3岁,咳嗽、低热1周,今出现抓耳朵,喊耳朵疼,并发现有分泌物自外耳道流出,怀疑中耳炎并发鼓膜穿孔。幼儿容易患中耳炎的原因是

- A、 幼儿抵抗力低
- B、 幼儿咽鼓管短而平,管径大
- C、 幼儿咽鼓管主要为软骨部构成
- D、 幼儿咽鼓管主要由骨部构成
- E、 幼儿咽鼓管始终处于开放状态

答案： B

138、患儿,女,3岁。发现眼睑水肿1周入院。查体:T 36.8℃,HR 120次/min,BP 85/55mmHg,尿常规蛋白定性(++++)。以下检查结果与患儿病情最相符的是

- A、 血肌酐 500 μmol/L
- B、 24小时尿蛋白定量 1.8g/d
- C、 C3 为 0.3g/L
- D、 血清胆固醇 4.2mmol/L
- E、 血浆白蛋白 35g/L

答案： B

139、新生儿出生时窒息,经抢救后呼吸心率均达正常,一般状况好,但因外周血象 WBC $19 \times 10^9/L$,N 0.66,L 0.34,核左移,转入新生儿病房观察,给予抗菌治疗7天后 WBC $12 \times 10^9/L$ 。可能的诊断是

- A、 新生儿败血症
- B、 新生儿肺炎
- C、 新生儿宫内感染

D、 新生儿上呼吸道感染

E、 胎粪吸入综合征

答案： C

140、 患者, 72 岁, 8 年前开始经常咳嗽、 咳痰, 近 1 年来症状加重, 今晨排便时, 突然出现气急, 呼吸困难。 查体: 呼吸 30 次/min, 口唇发绀, 气管轻度右偏, 桶状胸, 左肺叩呈鼓音、 呼吸音消失。 首先应急诊进行的检查是

A、 纤维支气管镜检查

B、 肺功能测定

C、 痰培养+药敏

D、 X 线胸部检查

E、 心电图

答案： D

141、 患儿, 男, 9 岁, 因外伤导致左侧肘关节肿胀, X 线检查肱骨内上髁附近有明显的骨折线, 患者手部尺侧皮肤感觉消失, 拇指不能内收, 其他四指不能内收, 最可能受损的神经是

A、 桡神经

B、 尺神经

C、 腋神经

D、 正中神经

E、 肌皮神经

答案： B

142、 患者, 男, 35 岁, 近半年恶心, 食欲差, 近 1 周呕吐。 10 年前曾验尿常规: 蛋白++, RBC1~2 个/HP。 查体: BP23/12. 2kPa(), 皮肤粗糙, 无黄疸, 双肺无明显啰音, HR80 次/min, 律齐, 肝脾未及, 双下肢无水肿。 Hb60g/L, WBC4. 5×10⁹/L, 血小板 95×10⁹/L。 最可能的疾病是

A、 再生障碍性贫血

B、 高血压病

C、 营养缺乏性贫血

D、 慢性肾功能不全

E、 肝炎

答案 D

答案：

143、 患者, 男, 40 岁, 4 个月前因股骨头坏死行手术治疗。 右下肢肿胀、 疼痛 3 天入院, B 超显示股深至胫后静脉广泛血栓形成, 医生决定进行抗凝和溶栓治疗。 下列药物中, 不属于抗凝药物的是

- A、 普通肝素
- B、 低分子肝素
- C、 尿激酶
- D、 华法林
- E、 阿加曲班

答案： C

144、足月新生儿, 出生后第 9 天, 黄疸加重, 体温不升, 拒乳, 呕吐嗜睡, 有时尖叫, 查体精神差, 面色发灰, 双眼凝视, 口角歪斜, 前囟饱满, 心肺正常, 脐部见脓性分泌物, 血白细胞 $40.1 \times 10^9/L$, 血清钙 2.2mmol/L , 此患儿最可能的诊断是

- A、 新生儿颅内出血, 脐炎
- B、 新生儿败血症, 脐炎, 低钙血症
- C、 新生儿败血症, 脐炎
- D、 新生儿低钙血症, 脐炎
- E、 新生儿败血症, 化脓性脑膜炎, 脐炎

答案： E

145、患者, 女, 52 岁, 反复呕血 2 年, 1 天前突然又呕血, 胃镜确诊为食管曲张静脉出血。体格检查: 贫血貌, 血压 $11/8\text{kPa}$, 蛙状腹, 脾肋下 3cm 。肝功能 SGPT: 120U (赖氏法), A/G 比值为 $0.82:1$, 总胆红素 $() 35 \mu\text{mol/L}$ 。最宜采用

- A、 静脉注射止血药
- B、 口服去甲肾上腺素
- C、 脾切除, 贲门周围血管离断术
- D、 限制性门腔分流术
- E、 三腔管压迫止血

答案 E

答案： B

146、患者, 男, 66 岁。因胸闷 2 小时入院, 完善冠脉造影, 考虑诊断为急性心肌梗死。除常见的肌酶增高外, 可以增高的指标还有

- A、 TAT
- B、 AT
- C、 PT
- D、 APTT
- E、 TT

答案： A

147、患者女, 75 岁, 退休。入院后被诊为阿尔茨海默病, 现不知自己的姓名和年龄, 不认识亲人, 只能发出一些不可理解的声音, 活动很少。诊断该患者目前已处于

- A、 轻度
- B、 中度
- C、 偏重度
- D、 重度
- E、 极重度

答案： D

148、患者,男,35岁,肝区痛3个月。肝脾未触及,无腹水征。检查:WBC $4.3 \times 10^9/L$,S62%,AFP(-)。经护肝等治疗无效,且症状加重,出现腹泻、发热等。胸透见膈下有限局性隆起。首先应考虑

- A、 慢性肝炎
- B、 肝硬化
- C、 原发性肝癌
- D、 肝脓肿(阿米巴性)
- E、 肝结核

答案： C

149、患者,女,25岁,低热,腹泻2个月。查体:腹平软,右下腹轻压痛,无反跳痛,未扪及肿块,移动性浊音阴性。下列哪项检查最能明确此患者的诊断

- A、 选择性肠系膜下动脉造影
- B、 结肠镜
- C、 电子胃镜
- D、 X线钡剂灌肠
- E、 X线全程钡餐

答案： B

150、患者,男,24岁,打架造成身体多处创伤。以下哪项对开放性伤口的处理是不正确的

- A、 清洁伤口可以直接缝合
- B、 污染伤口可行清创术,直接缝合或延期缝合
- C、 伤口内的异物必须全部取出
- D、 深入体内的创伤在手术中必须仔细探查和修复
- E、 感染伤口先要引流,然后再作其他处理

答案： C

151、患者,男,58岁,突然头疼呕吐,伴意识丧失30分钟。查体:神志清楚,颈部抵抗,克氏征阳性。右侧眼睑下垂,右侧瞳孔4mm,对光反射消失。最可能的诊断是

- A、 脑梗死

- B、蛛网膜下腔出血
- C、高血压脑出血
- D、颅内动静脉畸形出血
- E、颅脑肿瘤

答案： B

152、患者,男,40岁。腹泻1天,4~5次/天,无明显腹痛及里急后重感。大便镜检:RBC1~3个/HP,WBC0~2个/HP,结肠阿米巴滋养体0~1个/HP,涂片见排列成鱼群状菌。对该患者确诊最有帮助的检查为

- A、普通大便培养
- B、大便悬滴检查
- C、大便涂片、染色
- D、大便碱性蛋白胨培养
- E、血清中和抗体

答案： D

153、腰椎间盘突出症,感觉减退出现在外踝部及足背外侧,踝反射异常,压迫的神经根是

- A、腰3神经根
- B、腰4神经根
- C、腰5神经根
- D、骶1神经根
- E、骶2神经根


答案： D

154、患者,女,29岁,已婚。停经13周,阴道少量暗红色出血2周。妇科检查:宫底于耻上未及,多普勒 Doppler 经腹部未测到胎心。为明确诊断,最主要的辅助检查是

- A、尿妊娠试验
- B、血 HCG 测定
- C、重复用多普勒听胎心
- D、B超检查
- E、休息、保胎治疗、同时用羊膜镜检查

答案： D

155、患者,男,25岁,右腰部疼痛伴血尿,有外伤史,CT扫描如图所示,应诊断为



- A、右肾挫伤并包膜下血肿
- B、右肾血管平滑肌瘤
- C、右肾癌
- D、右肾梗死
- E、右肾脓肿

答案: A

156、患者,男,60岁,多年高血压病史,2天来因情绪波动,突感头痛加剧,伴恶心,呕吐,视物模糊。检查:BP30.7/17.3kPa230/139mmHg,心率90次/min,期前收缩2~4次/min,肺叩清,颈软。目前应采取的治疗措施最佳的是

- A、静滴普罗帕酮
- B、静注呋塞米
- C、静滴硝普钠
- D、静注安定
- E、静注利多卡因

答案: C

157、患者,女,32岁,有反复关节红肿病史,因活动后心悸、突发呼吸困难及咳粉红色泡沫痰入院。查体:心尖区舒张期隆隆样杂音,双肺布满水泡音。ECG示心动过速,二尖瓣型P波。最可能的诊断是

- A、风心病,二尖瓣狭窄,左房代偿期
- B、风心病,二尖瓣狭窄,左房失代偿期
- C、风心病,二尖瓣狭窄,右心衰竭期
- D、风心病,二尖瓣狭窄,全心衰竭期
- E、风心病,二尖瓣狭窄,左心衰竭期

答案: B

158、患儿,男,1个月,因多发皮疹入院。皮疹呈圆形,外周有丘疹,带有鳞屑,掌跖部有大疱。患儿母亲吸毒,母血RPR阳性。该患儿最有可能的诊断是

- A、梅毒
- B、HIV垂直感染
- C、风疹病毒感染
- D、淋病

E、 疱疹病毒

答案： A

159、患者,男,50岁,突起呼吸困难,咳粉红色泡沫痰,测其血压为26.4/13.6kPa()。应选的药物是

A、 异丙肾上腺素

B、 硝普钠

C、 利舍平

D、 洛贝林

E、 卡托普利

答案 B

答案:

160、患儿,4岁,生后发现口唇发绀,长期活动耐量下降,曾因反复肺部感染住院治疗4次,查体发现,胸骨左缘第4~5肋间闻及3/6级收缩期杂音,杂音固定,无传导,患儿最可能的诊断为

A、 室间隔缺损

B、 房间隔缺损

C、 动脉导管未闭

D、 卵圆孔未闭

E、 肺动脉瓣狭窄

答案: A

161、患者,女,48岁,因肝癌需行肝左叶切除术。关于肝的分叶的描述,正确的是

A、 两个半肝,5个叶

B、 两个半肝,3个叶

C、 两个半肝,4个叶

D、 两个半肝,6个叶

E、 两个半肝,2个叶

答案: A

162、患者,男,60岁,无痛性血尿3个月,膀胱镜检查左输尿管口喷血尿,最大可能是

A、 左肾积水

B、 左肾结石

C、 左肾盂癌

D、 左肾胚胎癌

E、 左输尿管结石

答案： C

163、下列 ERCP 检查最佳的诊断是



- A、 胆囊结石
- B、 胆总管结石
- C、 肝内胆管结石
- D、 肝内外胆管结石
- E、 胆囊息肉

答案： B

164、某女,18 岁,自幼内向、胆小。1 年来在人多场合不自在,局促不安,脸红、心悸、呼吸急促、心烦、自觉无地自容,因而不愿社交。面对异性上述症状更为严重。目前病人无法继续上学,避免在家里,内心非常痛苦,希望尽快返回学校,继续读书。该病例最可能的诊断的是

- A、 焦虑症
- B、 强迫症
- C、 恐惧症
- D、 抑郁症
- E、 神经衰弱

答案： C

165、患者,男,18 岁,因车祸致右股骨转子间骨折及多发性肋骨骨折,入院后仅给予胸带固定及右下肢皮肤牵引处理。对此患者最应警惕和设法防止的并发症是

- A、 股骨头缺血性坏死
- B、 脂肪栓塞
- C、 重要血管神经损伤
- D、 坠积性肺炎
- E、 损伤性骨化

答案： D

166、患者,女,20岁。左上腹外伤10小时,自觉腹痛。查体:血压95/60mmHg,神志清楚,左上腹压痛、反跳痛,叩诊移动性浊音(±)。腹腔穿刺未抽出液体。以下处理错误的是

- A、 B超
- B、 再腹穿
- C、 严密观察
- D、 静脉补液
- E、 给予哌替啶止痛

答案： E

167、患者,女,28岁,已婚。停经2个多月,阴道不规则出血2周,G₀P₀。妇科检查:宫颈蓝,子宫增大如孕3个多月,附件(-),尿HCG(+).超声检查如图,呈落



雪状图像改变。最可能的诊断是

- A、 子宫内膜癌
- B、 葡萄胎
- C、 子宫肌瘤
- D、 子宫内膜增殖症
- E、 子宫内膜炎

答案： B

168、患儿,女,14岁,2周前发生恶心、呕吐、腹泻,近3天出现心悸、气短、胸痛。体格检查体温38℃,心率70次/min,心界不大,心电图显示二度Ⅱ型房室传导阻滞。最可能的诊断是

- A、 风湿性心肌炎
- B、 急性病毒性心肌炎
- C、 心包炎
- D、 胸膜炎
- E、 急性胆囊炎

答案： B

169、患者右侧额纹消失、右侧眼睑不能闭合、右侧鼻唇沟变浅、露齿时口角偏向左侧。病变可能是

- A、 右侧中枢性面神经麻痹
- B、 左侧中枢性面神经麻痹
- C、 右侧周围性面神经麻痹
- D、 左侧周围性面神经麻痹
- E、 双侧周围性面神经麻痹

答案： C

170、产妇, 30 岁, 第一胎产后 5 天。急性腹痛伴发热 3 天, 腹部包块增大迅速已达脐部。婚后因不孕曾行妇科检查, 诊断为“子宫肌瘤”。最可能的诊断是

- A、 产褥感染
- B、 卵巢瘤蒂扭转
- C、 子宫肌瘤玻璃样变性
- D、 子宫肌瘤囊性变
- E、 子宫肌瘤红色变性

答案： E

171、患者, 女, 29 岁, 5 天前出现腹部疼痛伴恶心呕吐, 12 小时后感右下腹疼痛, 为持续性。经服中西药, 病情未见好转。查体: T38.3℃, 腹部微胀, 右下腹肌紧张, 可触及直径约 6cm, 边界不清, 触痛肿块, 肠鸣音弱, 血白细胞 $18.5 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 83%。可能的诊断是

- A、 卵巢囊肿蒂扭转
- B、 宫外孕破裂
- C、 阑尾周围脓肿
- D、 盲肠癌
- E、 肠套叠


答案： C

172、患者, 男, 35 岁, 突然发生剧烈头痛、恶心、呕吐和脑膜刺激征, 怀疑蛛网膜下腔出血, 需要抽取脑脊液进行诊断, 腰椎穿刺抽取脑脊液应在

- A、 骶管裂孔处
- B、 第五腰椎与第一骶椎棘突间隙
- C、 第三腰椎与第四腰椎棘突间隙
- D、 第一腰椎与第二腰椎棘突间隙
- E、 第十二胸椎与第一腰椎棘突间隙

答案： C

173、患者,男,55岁,黏液血便2个月,脐周及下腹隐痛不适,腹平软,无压痛及



肿块。大便隐血(+++),肠镜如图,诊断为

- A、 直肠癌
- B、 直肠炎性息肉
- C、 直肠腺瘤样息肉
- D、 直肠绒毛样息肉
- E、 克罗恩病

答案: A

174、患者,男,20岁,第一次乘坐飞机,飞机升空中感觉耳部发闷、疼痛,听觉下降。乘务员嘱其做咀嚼运动后好转。与鼓膜两侧气压平衡无关的结构是

- A、 鼓室
- B、 咽鼓管
- C、 鼻咽
- D、 外耳道
- E、 乳突窦

答案: E

175、患儿,男,2岁。哭闹不安,伴恶心呕吐2小时。检查:右中腹部触到6cm×2.5cm条状包块,表面光滑、硬、固定。X线照片充气透视:右上腹有倒杯状影。最恰当的处理是

- A、 空气灌肠复位
- B、 注镇痛剂
- C、 剖腹探查
- D、 禁食补液
- E、 腹部热敷

答案: A

176、患者因颅内血肿入院,经影像学检查判断血肿位于颅前窝,患者有可能出现什么症状

- A、 视觉受损
- B、 眼球外展受限
- C、 对光反射消失
- D、 嗅觉障碍
- E、 面部浅感觉障碍

答案： D

177、患者,男,36岁,因腹胀2年来诊,临床疑为肠结核,哪项不符合

- A、 低热、盗汗、乏力
- B、 右下腹疼痛
- C、 黏液脓血便
- D、 腹部包块
- E、 胸片有肺结核

答案： C

178、在幼儿园,别的小朋友玩小丽的玩具她就打他们。每次她打别的孩子时,老师就让她停止玩耍并关在一间小房间里反省。于是,小丽就不再打别的孩子。这是

- A、 正性惩罚
- B、 负性惩罚
- C、 正强化
- D、 负强化
- E、 分化

答案： B

179、健康婴儿,能大笑,开始能发出“爸爸”“妈妈”无意识的复音,脊柱出现了第2个弯曲,对“再见”还不懂,不能独站,其年龄可能是

- A、 3~4个月
- B、 5~6个月
- C、 7~8个月
- D、 9~10个月
- E、 11~12个月

答案： C

180、患者,女,46岁,因头痛误服敌鼠钠盐。1周后皮肤出现大片淤斑,肉眼血尿。在当地应用氢化可的松 300mg/d,及氨甲苯酸治疗3天,出血反有加重,转院后用大剂量维生素K₁治疗1周,痊愈。敌鼠钠盐中毒引起出血机理主要与以下哪项异常有关

- A、 血小板数量减少
- B、 血小板功能异常
- C、 毛细血管脆性增加
- D、 凝血因子II、VII、IX、X合成减少
- E、 凝血因子VIII、IX、XI减少

答案： D

181、患者,女,24岁,已婚,体检发现心尖区局限性隆隆样DM,第一心音亢进呈拍击样,为避免病情加重其首要措施是

- A、 避免过劳,避免妊娠
- B、 预防和治疗链球菌感染
- C、 经皮穿刺二尖瓣球囊成形术
- D、 地高辛加强心肌收缩力
- E、 硝酸甘油,减轻心脏负荷

答案: B

182、患者,男,53岁。近3个月出现走路不稳,走路似踩棉花样,尤以夜间为重。查体发现双下肢位置觉、震动觉消失,Romberg征阳性,肌力正常,双侧跟腱反射消失,跖反射无反应。其病变定位在

- A、 皮质脊髓侧束
- B、 脊髓后索
- C、 小脑
- D、 前庭神经
- E、 锥体外系统

答案: B

183、患者,男,60岁,咳嗽30年,近3年行走时气促,半月前因受凉,咳嗽、呼吸困难加剧入院,经治疗自觉明显好转,但仍有活动后气促,血气分析 pH7.41、PaO₂8.3kPa()、SaO₂91%,此例的给氧原则最好应为

- A、 高浓度、短期给氧
- B、 高浓度,高流量持续给氧
- C、 低浓度、间断给氧
- D、 低浓度、低流量、持续给氧
- E、 不需给氧

答案 E

答案:

184、患儿,男,3岁,晨起后腹泻,今日共排水样大便7次。查体:精神萎靡不振,嗜睡,眼窝凹陷,口舌干燥,皮肤弹性差。患儿精神萎靡不振的发生机制是

- A、 代谢性酸中毒使 γ -氨基丁酸生成 $\downarrow$
- B、 代谢性碱中毒使 γ -氨基丁酸生成 $\downarrow$
- C、 代谢性酸中毒使 γ -氨基丁酸生成 $\uparrow$
- D、 代谢性碱中毒使 γ -氨基丁酸生成 $\uparrow$
- E、 呼吸性酸中毒使 γ -氨基丁酸生成 $\uparrow$

答案: C

185、患者,女,65岁,既往糖尿病、高血压病史,晨起被家人发现昏迷送诊,家中发现地西洋空瓶(100片)。查体:意识不清,双侧瞳孔等大,直径约2mm,对光反射存在,HR65次/min, BP110/75mmHg, SP0₂94%,神经定位体征未引出。以下对该患的处理,哪项不正确

- A、立即洗胃
- B、应用氟马西尼
- C、完善头颅CT检查
- D、完善心电图检查
- E、化验血糖等生化检查

答案: A

186、患者,男,37岁,在某星期六的早晨,与朋友踢足球时,足部损伤后被送往医院。一系列影像显示骨折累及距小腿关节(踝关节)。损伤主要影响的运动是

- A、足的背屈和跖屈
- B、足的背屈、跖屈、内翻和外翻
- C、足的内翻和外翻
- D、足的背屈和外翻
- E、足的跖屈和内翻

答案: A

187、2岁男孩,突然发热、呕吐及腹泻1天,排出大量水样便,其所在幼儿园也有数名幼儿出现类似症状,但教师中无类似病例。初步判断最可能的感染病原体是

- A、A组轮状病毒
- B、肠侵袭性大肠埃希菌
- C、痢疾志贺菌
- D、柯萨奇病毒
- E、诺如病毒

答案: A

188、患者,男,70岁。家属发现其昏迷不醒,屋内可闻及煤气味。查体:口唇呈樱桃红,血中COHb浓度49%。头颅CT正常。最可能的昏迷原因为

- A、脑卒中
- B、一氧化碳中毒
- C、安眠药中毒
- D、乙醇中毒
- E、有机磷中毒

答案: B

189、患者,女,25岁。尿频、尿急、尿痛3个月,一般抗炎治疗无效,目前每次尿量30ml。IVP:右肾未显影。为早期确诊,还应给予哪项检查

- A、尿沉渣查抗酸杆菌
- B、尿结核杆菌培养
- C、尿动物接种
- D、膀胱镜检查
- E、同位素肾图

答案: A

190、患者因面部针刺样疼痛就诊,经检查发现其疼痛部位位于眼裂以上,每次疼痛持续数秒,且可由眨眼激发。诊断为三叉神经痛。请问具体是三叉神经哪一支分支引起的

- A、眼神经
- B、上颌神经
- C、下颌神经
- D、面神经
- E、舌咽神经

答案: A

191、患者,女,32岁,主诉反复白带增多。妇科检查:宫颈细颗粒状红色区占整个宫颈面积的2/3,余均正常,宫颈刮片阴性。首选措施是

- A、阴道冲洗
- B、局部上药
- C、冷冻疗法
- D、宫颈锥切
- E、子宫切除术

答案: C

192、患者,女,28岁,因颈外侧部切割伤大出血引起休克,已作抢救。反映补充血容量成功的最好临床指标是

- A、口渴减轻
- B、动脉血氧分压上升
- C、血红蛋白浓度上升
- D、尿量增加
- E、呼吸频率、脉率减慢

答案: D

193、初产妇, 25 岁, 孕 39 周。合并风湿性心脏病, 心功能 II 级, 胎心 152 次/min。消毒内诊: 枕右前位, 头盆相称, 骨产道无异常, 决定阴式分娩。其产程处理中, 下列正确的是

- A、 产妇取平卧位休息
- B、 出现心衰征象时吸氧
- C、 第二产程鼓励产妇屏气用力
- D、 胎肩娩出后腹部压沙袋
- E、 产后常规注射麦角新碱预防产后出血


答案: D

194、患者, 男, 25 岁。被撞伤右胸后觉胸痛, 深呼吸时疼痛加重, 无明显呼吸困难及发绀, 胸片示右侧第 3、4 肋骨单处骨折, 右肺压缩约 30%。其治疗方案应是

- A、 胸膜腔穿刺抽气
- B、 闭式胸膜腔引流术
- C、 输血、输液治疗
- D、 给氧
- E、 镇静止痛、保守治疗

答案: E

195、患者, 男, 28 岁, 摔伤后肩部剧痛, 活动受限, 结合影像学检查, 最可能的诊



断是

- A、 柯莱斯骨折
- B、 肱骨头骨折
- C、 肱骨外科颈骨折
- D、 加莱阿齐骨折
- E、 蒙泰贾骨折

答案: B

196、新生儿第一胎, 早破水, 生后第二天开始发绀、拒奶, 体温不升, 黄疸, 白细胞 $15 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 70%, 血型 O 型, 胆红素 $205 \mu\text{mol/L}$, 最可能的诊断是

- A、 新生儿溶血病
- B、 新生儿肺炎
- C、 低血糖

D、 颅内出血

E、 败血症

答案： E

197、下肢深部静脉炎患者,突发胸痛、胸闷、咯血、气短。胸片示右侧近胸膜处三角形片状阴影,诊断为肺梗死。该患者在听诊时最应出现的体征是

A、 支气管语音

B、 胸语音

C、 羊鸣音

D、 胸膜摩擦音

E、 硬币叩击征

答案： D

198、患者,女,55岁,慢性心力衰竭,胸闷气促1个月,治疗慢性心力衰竭时,哪种药物可能引发高钾血症

A、 磷酸二酯酶抑制剂

B、 螺内酯

C、 β 受体阻滞剂

D、 利尿剂

E、 洋地黄

答案： B

199、患者,男,33岁,4个月前无明显诱因出现腰痛,为持续性钝痛,之后出现双下肢麻木,逐渐左下肢不能动。查体:左下肢肌力Ⅱ级,双下肢腱反射亢进, L_1 以下深浅感觉障碍,胸正侧位片示 T_{11-12} 间隙增宽

A、 $T_{11-T_{12}}$ 硬脊膜外占位病

B、 $T_{11-T_{12}}$ 硬脊膜内髓外占位病

C、 $T_{11-T_{12}}$ 髓内占位病

D、 L_1 硬脊膜外占位病

E、 L_1 硬脊膜内髓外占位病

答案： A

200、患者,女,40岁,心悸、胸闷半年,1个月前昏厥2次,住院时心率38次/min左右,用阿托品治疗,症状未见改善,心电图如图所示。最好采取的治疗措施是



施是

- A、 异丙肾上腺素静脉滴注
- B、 阿托品静脉滴注
- C、 安装永久性人工心脏起搏器
- D、 麻黄碱
- E、 肾上腺糖皮质激素

答案: C

201、患者,男,63岁。因背部疼痛、虚弱和呼吸短促被送往急诊室。检查发现在膈肌主动脉裂孔处有腹主动脉瘤。下列结构最有可能被压缩的是

- A、 迷走神经和奇静脉
- B、 食管及迷走神经
- C、 奇静脉和胸导管
- D、 胸导管与迷走神经
- E、 下腔静脉和膈神经

答案: C

202、患者,男,63岁,慢性间质型肾炎病史25年。该患者近日出现消化道出血症状,其发生机制与下列哪项因素有关

- A、 消化道尿素增多
- B、 细菌感染
- C、 肠道 pH 改变
- D、 肠道菌群失调
- E、 黏膜细胞坏死

答案: A

203、患儿 7 个月, Hb 80g/L, 红细胞 $3.5 \times 10^{12}/L$ (350 万/ mm^3), 白细胞 $10 \times 10^9/L$ (1 万/ mm^3), 血小板 $200 \times 10^9/L$ (20 万/ mm^3), MCV 78fl, MCH 25pg, MCHC 30%, 现应选的治疗最适宜的为

- A、 输全血
- B、 肌注维生素 B₁₂
- C、 口服叶酸
- D、 口服铁剂
- E、 口服维生素 B₆

答案: D

204、患儿, 女, 1 岁。人工喂养, 面色苍白 2 个月, 营养发育差, 睑结膜苍白, 心前区可闻 2 级收缩期杂音, 肝脾轻度肿大, 手有颤抖。Hb 5.5g/dl, RBC 250 万/ mm^3 。RBC 大小不等, 大细胞中空淡染, 最可能的诊断是

- A、 营养性缺铁性贫血
- B、 再生障碍性贫血
- C、 慢性失血性贫血
- D、 慢性溶血性贫血
- E、 营养性混合性贫血

答案: E

205、男患, 62 岁, 退休干部, 近三个月来表现为悲观, 心情压抑, 没有兴趣, 自责, 认为自己拖累了家人, 认为自己退休前犯了很多罪, 欲去派出所自首, 该病人存在的属于抑郁发作时常见的精神病性症状为

- A、 罪恶妄想
- B、 被害妄想
- C、 虚无妄想
- D、 关系妄想
- E、 幻听

答案: A

206、产妇, 产后 4 天, 主诉以下, 何项不是正常产褥现象

- A、 低热
- B、 出汗多
- C、 阴道流血量少于月经
- D、 腹部阵发性绞痛, 伴呕吐
- E、 乳房胀痛, 双腋窝硬结

答案: E

207、患者,女,主诉头痛,以前额部疼痛为主,与体位关系明显,立位时头痛加重,卧位时头痛减轻或消失。腰穿见脑脊液流出缓慢。其最可能的诊断是

- A、 低颅压性头痛
- B、 偏头痛
- C、 紧张性头痛
- D、 颈椎病
- E、 高颅压性头痛

答案: A

208、经产妇,35岁,2年前自然分娩一男婴,出生后因新生儿重度窒息而死亡。现妊娠38周,LOA,定期产检。为预防再发病,咨询中医生告诉孕妇,下述除外哪项均是新生儿窒息的病因

- A、 胎儿宫内窘迫
- B、 呼吸阻塞
- C、 胎儿肺发育不良
- D、 分娩过程中应用哌替啶
- E、 产程中应用吗啡

答案: D

209、患者,男,25岁,因高热一周入院。确诊先天性心脏病,室间隔缺损,未经手术治疗,一年来有吸毒史,体检眼睑膜有淤点,足底可见紫红色结节,有压痛,尿常规少量蛋白。最可能见于

- A、 艾滋病(AIDS)
- B、 上呼吸道感染
- C、 感染性心内膜炎
- D、 斑疹伤寒
- E、 急性肾小球肾炎

答案: C

210、患者,女,40岁,便秘10余年,加重半年,排便需要刺激性泻药,且伴左下腹胀,排出粪便后可缓解,进食量较前减少,体重有所增加。结肠镜检查未发现异常,首先考虑肠易激综合征,但还需除外

- A、 结肠癌
- B、 甲状腺功能减低症
- C、 结肠冗长
- D、 先天性巨结肠
- E、 习惯性便秘

答案: B

211、患者,女,25岁,产后3周,左乳房胀痛,皮温高,伴高热,查左乳房外上象限压痛,有波动感,该患者诊断首先考虑

- A、 乳腺纤维腺瘤
- B、 乳腺癌
- C、 乳房脓肿
- D、 乳腺囊性增生症
- E、 乳腺结核

答案: C

212、患儿,男,10个月。单纯母乳喂养,虚胖,中度贫血,头部震颤。处理首先应

- A、 口服叶酸
- B、 肌注维生素 B₁₂
- C、 口服铁剂
- D、 输血
- E、 口服多种维生素

答案: B

213、患者,女,48岁,3次分娩史。半年来,咳嗽、下楼梯时常出现尿失禁症状,类型应是

- A、 急迫性尿失禁
- B、 压力性尿失禁
- C、 充盈性尿失禁
- D、 真性尿失禁
- E、 容量性尿失禁

答案: B

214、一患者体检发现眼球向下及向外运动受限。据此推测损伤以下哪条神经

- A、 动眼神经
- B、 滑车神经
- C、 展神经
- D、 交感神经
- E、 面神经

答案: B

215、患者,男,17岁,血尿酸 830 $\mu\text{mol/L}$,既往1型糖尿病。查体:身高 165cm,体重 80kg,血压 120/70mmHg。以下哪项处理是不恰当的

- A、 建议低嘌呤饮食
- B、 减体重
- C、 降尿酸药物治疗

D、口服降血糖药

E、检查血脂情况

答案： D

216、患者,女,17岁。在一次车祸中头部受重伤,入院3天后,医生告诉患者家属:“患者已处于脑死亡状态,她不能康复了,等于事实上的死亡。”并建议拆掉呼吸机。但患者父母不能承认这一事实,因为看到女儿在呼吸机的帮助下可以呼吸,并能感觉到女儿的脉搏,所以坚决不同意撤掉呼吸机。在这种情况下,医生最合乎道德的行为是

A、向患者父母解释脑死亡,劝说患者父母尽快同意撤掉呼吸机

B、因为脑死亡是一种科学的死亡标准,所以不用征求患者父母的同意,医生可以自行拔掉呼吸机

C、向患者父母解释脑死亡,患者父母同意与否医生都能拔掉呼吸机

D、因为脑死亡还有争论,所以医生不能自行拔掉呼吸机

E、请公证机关公证死亡

答案： A

217、患者,男,26岁,全身水肿、尿少半个月。血压160/100mmHg,尿蛋白(+++),RBC+/HP,BUN12mmol/L,Cr160 μ mol/L。下列哪项诊断可能性最小

A、急性肾炎

B、急进性肾炎

C、狼疮性肾炎

D、隐匿性肾炎

E、慢性肾炎急性发作

答案： D

218、患者,男,26岁首次住院,入院诊断为精神分裂症,而且是首次使用抗精神病药物。此时把抗精神病药物加到治疗量所需时间通常为

A、3天

B、7天

C、2周左右

D、3周左右

E、4周左右

答案： C

219、患者,女,29岁,孕2产0。现孕32周,被诊断为急性普通型肝炎。下述各项不正确的是

A、积极护肝治疗

B、避免应用损害肝脏的药物

- C、 预防感染
- D、 加强营养
- E、 立即终止妊娠

答案： E

220、一学生既想参加比赛锻炼自己,又怕得不到名次被人讥笑,此时其面临的冲突属于

- A、 双趋冲突
- B、 双避冲突
- C、 趋避冲突
- D、 双重趋避冲突
- E、 多重趋避冲突

答案： C

221、患儿,男,10个月。体重7.5kg,腹泻6天,中度脱水并酸中毒,脱水纠正后突发惊厥,先考虑

- A、 低血镁
- B、 低血钠
- C、 低血钙
- D、 碱中毒
- E、 高血钠

答案： C

222、初孕妇,孕24周,近1周来腹部迅速增大,腹胀明显,呼吸困难,不能平卧1天入院。查体:血压120/80mmHg,心率100次/min,律齐,无杂音,双下肢水肿,外阴部静脉曲张,呼吸24次/min。宫高36cm,腹围98cm,胎心音轻而遥远,胎位不清。应首先考虑何项诊断

- A、 双胞胎
- B、 急性心衰
- C、 急性羊水过多
- D、 胎盘早剥
- E、 子宫破裂

答案： C

223、患儿,男,18个月。因低热咳嗽2天,气喘1天入院体格检查:T 37.8℃,咽充血,两肺中小水泡音,心率120次/分,未闻杂音。对本例诊断最可能是

- A、 急性支气管炎
- B、 支气管肺炎
- C、 支气管哮喘

D、 上呼吸道感染

E、 急性咽喉炎

答案： B

224、患者,女,25岁。发现心悸、盗汗、易怒1年,伴有饮食量增加、消瘦。查体:BP110/90mmHg,重度突眼,甲状腺弥漫性肿大,深入胸骨后上纵隔内,心率116次/min。测血 T_3 、 T_4 值高于参考值上限一倍。该患者的诊断是

A、 Graves病

B、 结节性甲状腺肿

C、 高功能腺瘤

D、 亚急性甲状腺炎

E、 慢性淋巴细胞性甲状腺炎

答案： A

225、患儿,女,3岁。出生后头围逐渐增大,伴有头皮静脉怒张,落日眼,智力发育低于同龄儿童,头颅CT检查提示三脑室以上对称性扩大。不适合的治疗方法为

A、 脑室-腹腔分流术

B、 Toykildson手术

C、 脑室-心房分流术

D、 脑室-上矢状窦分流术

E、 腰大池腹腔分流术

答案： E

226、患者,男,44岁。冬季发病,发热、乏力、眼红、头痛4天。查体: $T40^{\circ}\text{C}$,结膜充血,胸背部见散在鲜红色充血性斑丘疹,腓肠肌无压痛,脑膜刺激征阳性。为避免病情加重。在实验室检查确诊前,首选哪种抗生素治疗

A、 青霉素

B、 氯霉素

C、 多西环素

D、 红霉素

E、 左氧氟沙星

答案： C

227、患者,男,58岁,诊断为急性肝功能衰竭,以下症状与肝脏合成能障碍相关的是

A、 低钾血症

B、 低血糖

C、 高胆红素血症

- D、 凝血功能异常
- E、 醛固酮水平升高

答案： D

228、患者,女,76岁。患急性胆囊炎经非手术治疗5天,目前疼痛加剧,无黄疸,全身虚弱,右上腹广泛压痛、反跳痛,肌紧张,T39℃,白细胞 $20 \times 10^9/L$ 。宜施行

- A、 胆囊切除加腹腔引流
- B、 胆囊切除及胆总管探查引流
- C、 胆囊造瘘
- D、 胆囊造瘘及胆总管探查引流
- E、 胆囊切除术

答案： C

229、患者,男,40岁。因车祸失血600ml,首先考虑输注

- A、 全血
- B、 血浆
- C、 晶体液
- D、 白蛋白
- E、 浓缩红细胞

答案： C

230、患者,男,35岁,右上腹部钝性损伤1小时。查体:血压70/45mmHg,面色苍白,脉搏120次/min。腹部饱满,全腹压痛、反跳痛、肌紧张。血常规:血红蛋白80g/L。诊断首先应考虑

- A、 脾破裂
- B、 胰腺损伤
- C、 十二指肠损伤
- D、 肝破裂
- E、 小肠损伤

答案： D

231、一患者术后突然出现右侧胸痛,咳嗽,咯少量血痰。胸片示:右肺下野可见模糊片影。最可能出现下列哪项体征

- A、 右侧出现耳语音
- B、 右侧触觉语颤增强
- C、 右侧听觉语颤增强
- D、 右肺听到湿啰音
- E、 右肺听到干啰音

答案： D

232、老年男性,二楼坠落,臀部着地 1 小时。查体:T40℃,P120 次/min,伴有烦躁不安、呼吸困难。X 线示坐骨支骨折。根据患者情况,该患最危险的并发症是

- A、 骨盆腔内出血
- B、 膀胱破裂
- C、 尿道断裂
- D、 骶丛神经损伤
- E、 直肠损伤

答案： A

233、患者,女,65 岁。阵发性腹痛半年,间歇便秘 4~6 天一次,量少,偶带血便。9 个月前因胃息肉行毕 I 式胃大部分切除术。查体:左下腹轻压痛,未触及肿块,肠鸣音活跃,直肠指诊无异常。X 线检查:结肠气钡双重对比造影乙状结肠中部见约 5cm 长管腔变窄,壁僵硬,中心见不规则溃疡。应诊断

- A、 肠结核
- B、 慢性痢疾
- C、 肠粘连
- D、 乙状结肠癌
- E、 溃疡型结肠炎

答案： D

234、患者,女,23 岁。妊娠 5 个月,近 1 个月来心悸,甲状腺Ⅱ°肿大,可闻血管杂音,心率 124 次/min,律整,疑为“甲状腺功能亢进”,为明确诊断,最有价值的检查为

- A、 基础代谢率测定
- B、 甲状腺摄 ^{131}I 率
- C、 甲状腺激素结合试验
- D、 血清总 T_3 测定
- E、 FT_3/FT_4

答案： E

235、患儿,3 岁。患病毒性脑炎,发病第 3 天突然惊厥,已持续 1 分钟未停,应首先进行的措施是

- A、 肌肉注射安定
- B、 肌肉注射苯巴比妥
- C、 静脉注射安定
- D、 静脉注射甘露醇
- E、 静脉注射地塞米松

答案： C

236、患者,女,42岁,被诊断患有颈椎椎管狭窄,行两个椎骨的椎板切除术。下列哪一个韧带最有可能被切除

- A、 前纵韧带
- B、 齿状韧带
- C、 黄韧带
- D、 项韧带
- E、 十字交叉韧带

答案： C

237、某患者近3个月出现烦渴,多饮,多尿,乏力等。就诊实验室检测尿糖呈阳性。此患者出现多尿症状的主要原因是

- A、 肾血流量增加
- B、 小管液渗透压升高
- C、 有效滤过压增大
- D、 血管升压素释放减少
- E、 肾小球滤过率增加

答案： B

238、患者,女,28岁。双侧乳房胀痛3年余,与月经周期有关。检查乳房发现多个结节状肿块,边界不清,可推动。对这种疾病描述,错误的是

- A、 患者可有乳头溢液
- B、 该病可仅见于一侧乳房
- C、 其发病与体内女性激素代谢障碍有关,尤其是雌激素、孕激素比例失调
- D、 该病病因为乳腺非典型增生
- E、 乳房胀痛多于月经前3~5天加重,月经来潮后减轻或消失

答案： D

239、患者,女,32岁,人工流产术后20小时出现右下腹部剧痛伴呕吐就诊。查体:体温37.3℃,脉搏96次/min,痛苦面容,下腹软,右下腹有压痛。妇科检查:子宫饱满,活动差,其右侧扪及拳头大小活动欠佳肿块,近子宫处压痛明显。实验室检查:白细胞总数 $13 \times 10^9/L$ 。本病例的诊断应是

- A、 右侧输卵管妊娠
- B、 右侧盆腔炎性包块
- C、 右侧盆腔脓肿
- D、 右侧卵巢囊肿蒂扭转
- E、 阑尾周围脓肿

答案： D

240、患者,男,54岁,因“间歇性上腹部不适4年,餐后加重,嗝气”来诊。胃镜检查:胃体上部大弯侧黏膜较苍白,该区活检示重度异型增生。应采取的治疗方法为

- A、西咪替丁
- B、多潘立酮
- C、多潘立酮+法莫替丁
- D、奥美拉唑
- E、手术治疗

答案: E

241、初产妇,25岁,妊娠40周,规律宫缩16小时。检查:左枕前位,估计胎儿体重3000g,胎心140次/min,宫口开大7cm,胎膜已破,宫缩逐渐减弱。恰当的处理

- A、静注地西洋
- B、肌注缩宫素
- C、静注缩宫素
- D、静注麦角新碱
- E、立即剖宫产

答案: C

242、患者,男,16岁,10天前从4米高处坠落,面色苍白,四肢湿冷,心率为129次/分,血压为76/60mmHg。请问导致患者面色苍白的体液因子是

- A、腺苷
- B、乳酸
- C、血管紧张素II
- D、组胺
- E、PGI₂

答案: C

243、患者,男,35岁,发现右侧甲状腺肿物3个月,生长较快。体检右甲状腺可触及一个3.5cm×2.5cm大小的肿物质硬界清随吞咽上下移动。左甲状腺不大,未及肿物;颈部未及肿大淋巴结。若确诊甲状腺癌,下列哪种病理类型预后最差

- A、乳头状腺癌
- B、滤泡状腺癌
- C、未分化癌
- D、髓样癌
- E、甲状腺瘤恶变

答案: C

244、患者,男,86岁,反复胸闷、心悸30年,心前区剧烈疼痛12小时入院,心电图除aVR导联外,普遍性ST段压低,当日TnI升高,该患者的诊断为

- A、不稳定心绞痛
- B、急性非ST抬高心肌梗死
- C、急性心包炎
- D、急性肺动脉栓塞
- E、主动脉夹层

答案: B

245、患者,女,26岁,腹泻1年,每日2~3次,进食蔬菜、蛋白后腹泻加重,多次查粪常规,可见红、白细胞,严重时可见肉眼脓血便,粪培养多次阴性,为明确诊断,最有效的诊断方法是

- A、依靠临床表现
- B、X线钡剂灌肠
- C、腹部超声
- D、肠镜
- E、血清免疫球蛋白

答案: D

246、患儿,女,5个月。广西籍。面色苍白2个月,母乳喂养,肝肋下2cm,脾肋下3cm, RBC $3.0 \times 10^{12}/L$, Hb 60g/L, MCV 56fl, 网织红细胞0.025, WBC和PLT正常,其最可能的诊断是

- A、营养性缺铁性贫血
- B、营养性巨幼红细胞性贫血
- C、地中海贫血
- D、肺含铁血黄素沉着症
- E、铅中毒

答案: C

247、患者,女,右下腹突发性疼痛伴恶心呕吐1天,6个月前上环时发现右侧卵巢囊性肿物4cm×5cm×5cm。查体:T38℃,下腹部压痛反跳痛,以右下腹为重,子宫正常大,右侧附件未触及包块,左侧附件正常。WBC $12 \times 10^9/L$, N90%。最可能的诊断是

- A、卵巢囊肿扭转
- B、卵巢囊肿扭转合并感染
- C、卵巢囊肿破裂合并感染
- D、卵巢囊肿自发破裂
- E、子宫浆膜下肌瘤扭转

答案: D

248、患者,女,45岁,半年来有上腹饱胀感,近1月来症状加重伴有发热,血红蛋白68g/L,白细胞 $80 \times 10^9/L$,血小板 $14 \times 10^9/L$,骨髓原(幼)淋巴细胞占40%。Bcr/Ab1融合基因阳性。应诊断为

- A、急性淋巴细胞白血病
- B、慢性粒细胞白血病
- C、慢性淋巴细胞白血病
- D、慢性粒细胞性白血病急性变(淋巴细胞变)
- E、慢性粒细胞白血病加速期

答案: D

249、患儿,女,8岁,发热,干咳6天。体温波动在 $38 \sim 39.5^\circ\text{C}$ 之间,咳嗽少痰,食欲可,在外院静脉点滴头孢二代抗生素,效果差。查体:一般状况可,双肺呼吸音粗,无明显干湿啰音,心、腹(-)。血常规基本正常。为明确病原诊断,应进一步做的检查是

- A、ESR
- B、ASO
- C、结核抗体
- D、支原体抗体
- E、CRP

答案: D

250、患者,女,35岁,因入睡困难、早醒5年多就诊。查体正常,医生给予地西泮治疗。地西泮对睡眠时相的影响是

- A、明显缩短慢波睡眠
- B、明显延长慢波睡眠
- C、延长快波睡眠
- D、缩短快波睡眠
- E、缩短快波睡眠和慢波睡眠

答案: B

251、患者,女,50岁,有风湿性心脏病史。近期上呼吸道感染后觉心悸、气促,



心电图如图所示。首先考虑

- A、心房颤动
- B、心房扑动3:1~4:1下传

- C、 心房扑动 2：1~4：1 下传
- D、 心房颤动 2：1~4：1 下传
- E、 房性心动过速

答案： C

252、核酸分子杂交是分子生物学的常用实验技术,碱基配对是核酸分子杂交的基础。下面关于核酸分子杂交的叙述不正确的是

- A、 不同来源的两条单链 DNA,只要它们有大致相同的互补碱基序列,它们即可结合,形成局部双螺旋
- B、 DNA 也可与 RNA 杂交形成双螺旋
- C、 RNA 也可与其编码的多肽链结合形成杂交分子
- D、 杂交技术可用于核酸结构与功能的研究
- E、 核酸分子杂交可以鉴定两种核酸分子间的序列相似性

答案： C

253、初产妇,24 岁,妊娠 40 周,LOA。合并先心病,现已规律宫缩。在产程中,对于心脏负担最重的,应属

- A、 潜伏期
- B、 活跃期
- C、 第二产程
- D、 第三产程
- E、 产褥期

答案： C

254、患者,男,40 岁,左前胸第 4 肋间刀伤后被送进急诊室,呼吸浅弱,血压 8/6kPa(),颈静脉怒张,胸腔穿刺未抽出血和气,首选治疗是

- A、 紧急手术
- B、 快速输血输液
- C、 大流量氧吸入
- D、 胸腔闭式引流
- E、 继续观察

答案 A

答案：

255、患者,女,21 岁,2 年来反复喘息发作。近 1 年来发作频繁,夜间重,双肺散在呼气性哮鸣音,心音正常。心率 110 次/min,呼吸频率 32 次/min,胸片双肺纹理增粗,WBC $11 \times 10^9/L$,嗜酸粒细胞 7%。该患诊断支气管哮喘的主要根据是

- A、 反复发作的喘息史
- B、 喘息发作以夜间为主

- C、 胸片肺纹理增粗
- D、 喘息发作时双肺呼气性哮鸣音
- E、 白细胞增加,嗜酸粒细胞增加

答案: D

256、患者,男,43岁,近1个月来感烦渴、多饮、多尿,尿比重偏低。下列不予考虑的疾病是

- A、 肾性尿崩症
- B、 完全性尿崩症
- C、 部分性尿崩症
- D、 中枢性尿崩症
- E、 嗜铬细胞瘤

答案: E

257、患者,男,35岁,因腹痛、脓血便2个月入院。患者2个多月前出差回来后突然发热达38℃,无寒战,同时有腹痛、腹泻,大便每日10余次,为少量脓血便,伴里急后重;曾到附近医院,化验大便有多数白细胞,口服几次庆大霉素和黄连素好转。以后虽间断服用黄连素,但仍有黏液性便,左下腹不适,自觉日渐乏力,遂来诊。化验:大便常规为黏液脓性便,白细胞20~30个/HP,偶见成堆脓球,尿常规(-)。初步诊断:慢性菌痢。引起该病的病原菌能够合成的代谢产物是

- A、 硫化氢
- B、 凝固酶
- C、 溶血素
- D、 几丁质
- E、 热原质

答案: E

258、患者,男,62岁,因肝癌行肝部分切除术,术后处理不恰当的是

- A、 取高半坐位
- B、 排气后进食
- C、 早期床上活动
- D、 鼓励咳嗽、咳痰
- E、 7~9天拆线

答案: A

259、有一位髋关节屈曲内收位受伤患者,伤后髋剧痛,患肢短缩,髋关节屈曲、内收内旋畸形,弹性固定,最可能的诊断是

- A、 股骨颈骨折
- B、 髋关节后脱位

- C、 髌臼骨折
- D、 髌关节中心性脱位
- E、 髌关节前脱位

答案： B

260、患者,男,19岁。4天前自觉心窝部不适,隐痛,伴恶心,食欲减退;3天前右下腹持续性疼痛加重伴发热, $T38.0^{\circ}\text{C}$ 。查体:右下腹可触及 $5.0\text{cm}\times 6.0\text{cm}$ 大小的包块,压疼(+)。WBC $15.3\times 10^9/\text{L}$ 。下列处置错误的是

- A、 抗生素
- B、 手术切除病灶
- C、 中药消炎
- D、 理疗
- E、 B超动态观察


答案： B

261、患者,女,23岁,在地震倒塌的房屋中被发现,多处出血,呼吸急促,面色苍白,四肢湿冷,意识不清,心率 137 次/min, 血压 85/36mmHg, 血气分析显示 $\text{pH}7.37$, $\text{HCO}_3^-16\text{mmol/L}$, $\text{PaCO}_228\text{mmHg}$ 。该患者可能出现的酸碱平衡紊乱是

- A、 代谢性酸中毒、呼吸性碱中毒
- B、 代谢性酸中毒、呼吸性酸中毒
- C、 呼吸性酸中毒
- D、 代谢性碱中毒、呼吸性碱中毒
- E、 代谢性碱中毒

答案： A

262、患者,男,82岁,喘憋1周,加重1天。查体:心率 56 次/分,呼吸 20 次/分, 血压 137/64mmHg。既往有冠心病,高血压。心电图诊断正确的是



- A、 窦性心动过缓,U波明显
- B、 房颤,交界区逸搏
- C、 房扑,U波明显

- D、房颤,U波明显
 - E、房颤,3度房室传导阻滞,交界区逸搏
- 答案: E

263、患者,女,19岁,因咳嗽、发热、乏力就诊。拍胸片发现右肺有片状阴影,痰标本抗酸染色阳性,诊断为肺结核病。以下说法正确的是

- A、常见病原体为牛型结核分枝杆菌
 - B、可经呼吸道途径传播
 - C、可经蚊虫叮咬传播
 - D、原发肺结核病灶易形成空洞
 - E、继发肺结核只能是外源性感染
- 答案: B

264、患者,女,22岁,未婚。有性生活史,平素月经规则。因“停经47天,下腹痛2小时伴少量阴道流血”急诊入院。查体:面色苍白,血压60/40mmHg,心率120次/min,腹肌紧张,右下腹压痛及反跳痛。妇科检查:宫颈有举痛,子宫正常大小,质软,右附件区增厚,压痛明显,尿HCG(+). B超提示:右附件见混合性包块,盆腔中量积液。该病例最可能诊断为

- A、先兆流产
 - B、异位妊娠
 - C、黄体破裂
 - D、不全流产
 - E、急性阑尾炎
- 答案: B

265、患儿,7个月,身高62cm,体重4.1kg,头围42cm,前囟1.5cm×1.5cm,不会爬,本例最大可能是

- A、呆小病
 - B、侏儒症
 - C、佝偻病
 - D、营养不良
 - E、头小畸形
- 答案: D

266、女婴,20天,出生时发现枕部包块,直径约1cm,实质感,透光实验(-),啼哭时张力不变,该患儿最有可能的诊断是

- A、先天性脑积水
- B、颅裂
- C、脑水肿

D、 狭颅症

E、 脑膜瘤

答案： B

267、患者有丛林接触史,腿部皮肤被叮咬,局部出现溃疡,突发高热、皮疹。用变形杆菌 OX_k株作抗原与患者血清进行定量凝集试验,抗体效价为 1:320。该患者以上表现可能是由何种病原体引起

A、 普氏立克次体

B、 恙虫病立克次体

C、 斑疹伤寒立克次体

D、 鹦鹉热衣原体

E、 贝纳氏柯克斯体

答案： B

268、患者,女,30岁。产后大出血后继发闭经2年,妇科检查子宫明显小于正常,雌孕激素序贯治疗有撤退性出血,静脉注射黄体生成素释放激素 50 μg,1小时后黄体生成素未见上升。应首先诊断为

A、 子宫性闭经

B、 卵巢性闭经

C、 垂体性闭经

D、 下丘脑性闭经

E、 大脑皮层性闭经

答案： C

269、北京患者12月发病,表现为畏寒、寒战、高热、大汗而后缓解,隔日发作1次,已1周。患者同年8月曾往海南旅游15天。血常规:白细胞 $5.0 \times 10^9/L$,中性粒细胞 0.68,淋巴细胞 0.32,血色素 100g/L,血培养(-)。最可能的原因是

A、 伤寒

B、 疟疾

C、 急性血吸虫病

D、 败血症

E、 结核

答案： B

270、影响性生活的疾病是

A、 血友病基因携带者

B、 强直性肌营养不良

C、 处女膜闭锁

D、 直系血亲和三代以内旁系血亲

E、 再生障碍性贫血

答案： C

271、大面积烧伤和严重脱水导致休克共同的始动环节是

- A、 外周阻力增高
- B、 血管床容量增加
- C、 血容量减少
- D、 心率减慢
- E、 心输出量降低

答案： C

272、心包填塞导致休克的始动环节是

- A、 外周阻力增高
- B、 血管床容量增加
- C、 血容量减少
- D、 心率减慢
- E、 心输出量降低

答案： E

273、过敏和脊髓麻醉导致休克共同的始动环节是

- A、 外周阻力增高
- B、 血管床容量增加
- C、 血容量减少
- D、 心率减慢
- E、 心输出量降低

答案： B

274、球部溃疡的疼痛特点是

- A、 疼痛→进餐疼痛,无间歇,无规律
- B、 进餐疼痛→缓解→进餐疼痛
- C、 疼痛→进餐缓解,空腹及夜间疼痛
- D、 进餐疼痛→呕吐
- E、 脂餐→夜间痛

答案： C

275、胃溃疡的疼痛特点是

- A、 疼痛→进餐疼痛,无间歇,无规律
- B、 进餐疼痛→缓解→进餐疼痛
- C、 疼痛→进餐缓解,空腹及夜间疼痛

D、 进餐疼痛→呕吐

E、 脂餐→夜间痛

答案： B

276、胃癌的疼痛特点是

A、 疼痛→进餐疼痛,无间歇,无规律

B、 进餐疼痛→缓解→进餐疼痛

C、 疼痛→进餐缓解,空腹及夜间疼痛

D、 进餐疼痛→呕吐

E、 脂餐→夜间痛

答案： A

277、乳腺癌最常见的转移方式是

A、 直接蔓延

B、 淋巴道转移

C、 血道转移

D、 种植转移

E、 气道种植

答案： B

278、乳腺癌晚期转移最主要的方式是

A、 直接蔓延

B、 淋巴道转移

C、 血道转移

D、 种植转移

E、 气道种植

答案： C

279、能还原高铁血红蛋白的是

A、 解磷定

B、 亚甲蓝

C、 氧气

D、 阿托品

E、 螯合剂

答案： B

280、阻断毒蕈碱受体的是

A、 解磷定

B、 亚甲蓝

- C、 氧气
- D、 阿托品
- E、 螯合剂

答案： D

281、使磷酰化胆碱酯酶复活的是

- A、 解磷定
- B、 亚甲蓝
- C、 氧气
- D、 阿托品
- E、 螯合剂

答案： A

282、治疗金属中毒的是

- A、 解磷定
- B、 亚甲蓝
- C、 氧气
- D、 阿托品
- E、 螯合剂

答案： E

283、急性心肌梗死患者出现心衰和乳头肌断裂

- A、 胸骨左缘第 3~4 肋间可闻及收缩期杂音
- B、 心前区收缩期杂音和收缩期喀喇音
- C、 腹部血管杂音
- D、 主动脉瓣区舒张期杂音
- E、 心包摩擦音

答案： B

284、急性心肌梗死患者发生室间隔穿孔

- A、 胸骨左缘第 3~4 肋间可闻及收缩期杂音
- B、 心前区收缩期杂音和收缩期喀喇音
- C、 腹部血管杂音
- D、 主动脉瓣区舒张期杂音
- E、 心包摩擦音

答案： A

285、患者,男,58 岁。声嘶 1 周,胸片见右上肺不张伴肺门部块状影。最可能的诊断是

- A、 肺结核球
- B、 肺血管瘤
- C、 肺错构瘤
- D、 肺炎性假瘤
- E、 肺癌

答案： E

286、患者,男,47岁。四肢骨关节疼痛伴杵状指形成1个月,在骨科就诊摄胸片见右下肺后基底段2.5cm直径肿块影。最可能的诊断是

- A、 肺结核球
- B、 肺血管瘤
- C、 肺错构瘤
- D、 肺炎性假瘤
- E、 肺癌

答案： E

287、患者,女,21岁,因左肩背部疼痛剧烈1周入院。查体发现同侧上睑下垂,瞳孔右大于左,胸片提示左上肺尖段占位病变。最可能的诊断是

- A、 肺结核球
- B、 肺血管瘤
- C、 肺错构瘤
- D、 肺炎性假瘤
- E、 肺癌

答案： E

288、病毒诱导成纤维细胞产生的主要物质是

- A、 α -干扰素
- B、 β -干扰素
- C、 γ -干扰素
- D、 IL-1
- E、 IL-2

答案： B

289、病毒诱导成T细胞产生的主要物质是

- A、 α -干扰素
- B、 β -干扰素
- C、 γ -干扰素
- D、 IL-1
- E、 IL-2

答案： C

解析： C

(291~293 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 不可逆抑制
- B. 竞争性抑制
- C. 非竞争性抑制
- D. 反竞争性抑制
- E. 反馈抑制

290、砷化物对巯基酶的抑制作用是

- A、 不可逆抑制
- B、 竞争性抑制
- C、 非竞争性抑制
- D、 反竞争性抑制
- E、 反馈抑制

答案： A

291、氨甲蝶呤对四氢叶酸合成的抑制是

- A、 不可逆抑制
- B、 竞争性抑制
- C、 非竞争性抑制
- D、 反竞争性抑制
- E、 反馈抑制

答案： B

292、磺胺药对二氢叶酸还原酶的抑制是

- A、 不可逆抑制
- B、 竞争性抑制
- C、 非竞争性抑制
- D、 反竞争性抑制
- E、 反馈抑制

答案： B

293、胆道出血表现为

- A、 上消化道出血呈周期性发作
- B、 继剧烈呕吐之后发生
- C、 临床上以便血为主
- D、 出血来势凶猛, 主要是呕血
- E、 年龄较大, 首次呕血或吐咖啡样液体

答案： A

294、食道曲张静脉破裂出血表现为

- A、 上消化道出血呈周期性发作
- B、 继剧烈呕吐之后发生
- C、 临床上以便血为主
- D、 出血来势凶猛,主要是呕血
- E、 年龄较大,首次呕血或吐咖啡样液体

答案： D

295、结肠癌出血一般表现为

- A、 上消化道出血呈周期性发作
- B、 继剧烈呕吐之后发生
- C、 临床上以便血为主
- D、 出血来势凶猛,主要是呕血
- E、 年龄较大,首次呕血或吐咖啡样液体

答案： C

296、贲门黏膜撕裂主要表现为

- A、 上消化道出血呈周期性发作
- B、 继剧烈呕吐之后发生
- C、 临床上以便血为主
- D、 出血来势凶猛,主要是呕血
- E、 年龄较大,首次呕血或吐咖啡样液体

答案： B

解析： B

(298~300 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 肺血栓栓塞症
- B. 原发性肺动脉高压
- C. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
- D. 肺炎
- E. 主动脉夹层

297、患者,男,25岁。发热寒战3天,体温38.5℃,咳嗽有严重胸痛,铁锈痰。该患者最可能的诊断是

- A、 肺血栓栓塞症
- B、 原发性肺动脉高压
- C、 冠状动脉粥样硬化性心脏病
- D、 肺炎

E、 主动脉夹层

答案： D

298、患者,男,50岁。突然出现胸闷,心绞痛样胸痛,舌下服硝酸甘油后迅速缓解。该患者最可能的诊断是

A、 肺血栓栓塞症

B、 原发性肺动脉高压

C、 冠状动脉粥样硬化性心脏病

D、 肺炎

E、 主动脉夹层

答案： C

299、患者,女,48岁。突然出现胸痛、血压 70/40mmHg,伴呼吸困难,痰中带血,双侧不对称性下肢肿胀。该患者最可能的诊断是

A、 肺血栓栓塞症

B、 原发性肺动脉高压

C、 冠状动脉粥样硬化性心脏病

D、 肺炎

E、 主动脉夹层

答案： A

300、低钙血症最早期临床表现为

A、 腱反射亢进

B、 腱反射消失

C、 手足抽搐

D、 肌肉疼痛

E、 口周、指尖麻木感

答案： E

1、下列哪项是分离性(转换)性障碍常见的诱因

- A、 器质性疾病
- B、 生活事件, 内心冲突
- C、 睡眠障碍
- D、 强烈的情感体验
- E、 创伤性事件

答案: B

2、关于医院感染败血症的描述, 错误的是

- A、 多有严重基础疾病
- B、 多见于长期使用免疫抑制剂患者
- C、 临床表现典型
- D、 白细胞增高或正常
- E、 预后差

答案: C

3、关于甲亢性周期性瘫痪的描述下列不符的是

- A、 在我国少见
- B、 男性居多
- C、 本病发作与甲亢的严重程度无关
- D、 发作多发生在觉醒时、运动或饱食后
- E、 心律失常较多

答案: A

4、急性梗阻性化脓性胆管炎的最佳治疗是

- A、 应尽量保守, 避免急诊手术
- B、 须及时作胆囊引流手术
- C、 须紧急作胆管引流手术
- D、 待病情稳定后择期作彻底手术
- E、 须紧急作胆囊切除术

答案: C

5、自然界游离核苷酸中的磷酸最常位于

- A、 戊糖的 C-2' 上
- B、 戊糖的 C-3' 上

- C、戊糖的 C-5' 上
- D、戊糖的 C-2' 及 C-3'
- E、戊糖的 C-2' 及 C-5' 上

答案： C

6、转诊的传染病病例发生诊断变更、死亡时,转诊医疗机构应当填写卡片并向病人现住址所在地县级疾病预防控制机构报告。该卡片是

- A、转诊卡
- B、订正卡
- C、变更卡
- D、确诊卡
- E、报告卡

答案： B

7、导致早期自然流产的最常见原因是

- A、母体全身疾病
- B、生殖器官异常
- C、胚胎染色体异常
- D、环境因素
- E、母体内分泌异常

答案： C

8、脑型疟疾与中毒性菌痢鉴别的要点为

- A、季节
- B、症状
- C、脑膜刺激征
- D、脑脊液变化
- E、肛拭或灌肠大便常规检查

答案： E

9、与食物中毒相关的葡萄球菌产生的致病物质是

- A、TSST-1
- B、肠毒素
- C、表皮剥脱毒素
- D、葡萄球菌溶素
- E、血浆凝固酶

答案： B

10、一般正常小儿前囟的闭合时间为

- A、 6 个月
- B、 8 个月
- C、 12~18 个月
- D、 24~30 个月
- E、 30~36 个月

答案： C

11、一侧动眼神经麻痹时不会出现

- A、 眼球不能外展
- B、 眼球不能内收
- C、 复视
- D、 眼睑下垂
- E、 瞳孔扩大, 光反射消失

答案： A

12、内源性和外源性凝血的主要区别是

- A、 前者发生在体内, 后者在体外
- B、 前者发生在血管内, 后者在血管外
- C、 前者只需要体内因子, 后者需外加因子
- D、 前者只需血浆因子, 后者还需组织因子
- E、 前者启动快, 后者启动慢

答案： D

13、精神分裂症的发病机制理论中, 涉及最主要神经递质是

- A、 多巴胺
- B、 去甲肾上腺素
- C、 乙酰胆碱
- D、 5-羟色胺
- E、 γ 氨基丁酸

答案： A

14、急性心包炎早期具有诊断价值的症状或体征是

- A、 奇脉
- B、 血压下降, 脉压减少
- C、 心包摩擦音
- D、 Kussmaul 征(+)
- E、 Ewart 征(+)

答案： C

15、有关肾功能不全者使用 ACE 抑制剂错误的是

- A、ACE 抑制剂具有降低血压的肾脏保护作用
- B、ACE 抑制剂能减少尿蛋白
- C、ACE 抑制剂能延缓肾功能恶化
- D、血肝酐大于 $178 \mu\text{mol/L}$ 的非透析治疗患者不宜使用
- E、应用 ACE 抑制剂要防治高血钾

答案： D

16、可治疗心房纤颤的药物是

- A、利多卡因
- B、美西律
- C、苯妥英钠
- D、胺碘酮
- E、普鲁卡因胺

答案： D

17、代谢性酸中毒的临床表现中,下列错误的是

- A、呼吸深而快
- B、呼出气中带有酮味
- C、面部潮红
- D、Chvostek 征阳性
- E、脉搏加快

答案： D

18、关于催眠治疗, 以下哪项说法不够确切

- A、催眠师具有较高的权威性
- B、催眠治疗必须是在高暗示性的人上才能施术
- C、要求被催眠者放松、安静, 消除杂念
- D、催眠治疗必须是在被催眠者进入催眠状态后进行
- E、所有人都可以接受催眠治疗

答案： E

19、医疗机构应当对麻醉药品和精神药品处方进行专册登记, 加强管理。精神药品处方保存期限是

- A、至少半年
- B、至少 1 年
- C、至少 2 年
- D、至少 3 年
- E、至少 4 年

答案： C

20、下列关于肝脏的描述均正确,但除外

- A、 肝脏位置因体位、呼吸而改变
- B、 右肋缘下正常时触不到肝脏
- C、 右肋缘下触到肝脏即是肝大
- D、 直立与吸气时,肝稍下降
- E、 单靠触诊不能完全判断肝大

答案: C

21、关于生物氧化,叙述错误的是

- A、 总是伴有 ATP 的生成
- B、 可在细胞的线粒体内进行
- C、 可在细胞的内质网内进行
- D、 在温和条件下进行
- E、 需要一系列酶催化

答案: C

22、金黄色葡萄球菌的层粘连蛋白受体能

- A、 使病变易于局限
- B、 容易形成溃疡
- C、 容易形成窦道
- D、 容易形成转移性脓肿
- E、 使组织容易受损

答案: D

23、正常红细胞的平均寿命为

- A、 1~2 周
- B、 1~2 个月
- C、 60~80 天
- D、 100~120 天
- E、 150~180 天

答案: D

24、UIP 全称是

- A、 寻常性间质性肺炎
- B、 特发性间质性肺炎
- C、 脱屑性间质性肺炎
- D、 急性间质性肺炎
- E、 非特异性间质性肺炎

答案: A

25、胸腔积液的体征主要与哪种因素有关

- A、 积液形成的缓急
- B、 积液的性质
- C、 原发病变
- D、 单侧或双侧
- E、 积液量

答案： E

26、病理反射中价值最大的是

- A、 Babinski 征
- B、 Oppenheim 征
- C、 Gordon 征
- D、 Gonda 征
- E、 Chaddock 征

答案： A

27、厌恶疗法的原理是

- A、 条件反射
- B、 交互抑制
- C、 精神分析原理
- D、 自我强化
- E、 心理防御机制

答案： A

28、鉴别肝源性水肿和心源性水肿最有意义的体征是

- A、 腹水
- B、 颜面部水肿
- C、 肝大
- D、 双下肢凹陷性水肿
- E、 颈静脉怒张

答案： E

29、损伤控制性外科理念下在进行首次简短剖腹手术时需要解决的问题是

- A、 一次性彻底解决胃肠道及其他系统的损伤
- B、 恢复腹壁和消化道完整性
- C、 消化道重建
- D、 通过肠造口解除梗阻及腹腔敞开解除腹腔高压
- E、 追求完美手术

答案： D

30、符合中枢性眩晕特点的表述不正确的是

- A、前庭神经核或小脑病变可引起
- B、椎-基底动脉供血不足是常见原因
- C、眼震幅度大、方向不一致
- D、伴严重的耳鸣、耳聋
- E、呕吐、出汗、面色苍白等自主神经症状较轻

答案： D

31、多根多处肋骨骨折引起纵隔扑动的主要原因是

- A、伤侧胸膜腔负压消失
- B、健侧胸膜腔负压消失
- C、伤侧肺萎缩
- D、健侧肺萎缩
- E、呼吸时两侧胸膜腔内压力不平衡

答案： E

32、营养性巨幼细胞贫血的血象变化中,下列哪点具有早期诊断意义

- A、网织红细胞正常或减少
- B、血涂片红细胞大小不均,大者偏多,中央淡染区不显
- C、红细胞下降较血红蛋白下降明显
- D、白细胞大多减少,中性粒细胞分叶过多
- E、MCV>94fL, MCH>32pg, MCHC 正常

答案： D

33、出生后()睾丸可能自行下降

- A、6个月以内
- B、12个月以内
- C、6~12个月
- D、12~24个月
- E、2岁以后

答案： B

34、为确保输卵管结扎术安全有效,下列何项是错误的

- A、有腰腹痛,白带增多,附件增厚、压痛者,暂缓手术
- B、神经官能症或对手术有极大顾虑者,暂缓手术
- C、非孕妇女结扎应选在月经干净后4~7天进行
- D、结扎前须确认输卵管,并追踪至伞端
- E、人流后,刮宫术后可立即行结扎术

答案： C

35、肾小球滤过膜包括

- A、 内皮细胞层+基底膜
- B、 内皮细胞层+系膜基质+上皮细胞层
- C、 内皮细胞层+肾间质+上皮细胞层
- D、 内皮细胞层+基底膜+上皮细胞层
- E、 内皮细胞层+基底膜+系膜基质

答案： D

36、原发性胆汁性肝硬化诊断时下述并非必需的是

- A、 显著皮肤瘙痒, 黄色瘤存在
- B、 肝脏中度肿大
- C、 HBsAg(+)
- D、 IgM 上升
- E、 抗线粒体抗体高滴度阳性

答案： C

37、心理科学诞生的标志是

- A、 希波克拉底提出气质体液说
- B、 弗洛伊德提出精神分析理论
- C、 冯特在莱比锡建立第一个心理实验
- D、 詹姆斯等人提出新心理学理论
- E、 巴甫洛夫提出高级神经活动类型学

答案： C

38、有关溶血性黄疸, 哪种说法错误

- A、 黄疸一般为轻度
- B、 血清总胆红素增加, 以非结合胆红素增加为主
- C、 尿胆原增加
- D、 尿胆红素实验阳性
- E、 血中尿胆原增加

答案： D

39、挤压综合征引起肾衰竭的机制是

- A、 肾脏缺血
- B、 肾小球滤过膜损伤
- C、 肾小管阻塞
- D、 肾小管上皮细胞凋亡
- E、 系膜细胞收缩

答案： C

40、先天性心脏病大多已能手术矫治,但合并以下哪项改变时,不宜手术

- A、心力衰竭
- B、室上性心动过速
- C、动力型肺动脉高压
- D、梗阻型肺动脉高压
- E、亚急性细菌性心内膜炎

答案: D

41、急进型高血压时,增生性小动脉硬化及坏死性细动脉炎主要发生于

- A、大脑
- B、肾
- C、心
- D、肾上腺
- E、脾

答案: B

42、卫星现象可用于鉴别

- A、百日咳鲍特菌
- B、流感嗜血杆菌
- C、白喉棒状杆菌
- D、金黄色葡萄球菌
- E、甲型链球菌

答案: B

43、我国大陆于哪年发现首例艾滋病

- A、1981年
- B、1982年
- C、1983年
- D、1984年
- E、1985年

答案: E

44、全身适应综合征抵抗期时,体内起主要作用的激素是

- A、胰岛素
- B、胰高血糖素
- C、垂体加压素
- D、醛固酮
- E、糖皮质激素

答案: E

45、合成卵磷脂及磷脂酰肌醇时均需要下列哪种物质

- A、 丝氨酸
- B、 蛋氨酸
- C、 CTP
- D、 H_2O
- E、 甘油二酯

答案： C

46、关于伤寒沙门菌感染的免疫性, 正确的描述是

- A、 伤寒沙门菌的 H 抗体属于 IgM 类抗体
- B、 伤寒沙门菌的 O 抗体属于 IgG 类抗体
- C、 特异性的体液抗体不辅助杀菌作用
- D、 特异性细胞免疫是主要防御机制
- E、 特异性体液免疫是主要防御机制

答案： D

47、狭窄性腱鞘炎治疗首选

- A、 局部按摩
- B、 理疗
- C、 针灸
- D、 局部封闭
- E、 手术治疗

答案： D

48、下列各项为影响呼吸音强弱的因素, 但应除外

- A、 性别
- B、 年龄
- C、 呼吸深浅
- D、 肺组织弹性大小
- E、 听诊的方法

答案： E

49、真核基因转录中起正性调节作用的是

- A、 启动子
- B、 操纵子
- C、 增强子
- D、 衰减子
- E、 沉默子

答案： C

50、新生儿血液中检测出下列哪类抗体可诊断为子宫内感染

- A、 IgG
- B、 IgA
- C、 IgM
- D、 IgE
- E、 IgD

答案： C

51、铁剂用于治疗

- A、 溶血性贫血
- B、 再生障碍性贫血
- C、 小细胞低色素性贫血
- D、 巨幼红细胞性贫血
- E、 恶性贫血

答案： C

52、入口平面狭窄时主要引起

- A、 原发性宫缩乏力
- B、 胎儿先露不能衔接
- C、 宫颈水肿
- D、 宫内窘迫
- E、 胎头长期受压而致颅内出血

答案： B

53、有关颈总动脉的描述错误的是

- A、 头颈部出血可压迫此动脉
- B、 左侧者发自头臂干
- C、 分叉处的后壁上有颈动脉小球
- D、 分支为颈内、外动脉
- E、 两侧均经胸锁关节后方

答案： B

54、以下哪一项不符合双相情感障碍

- A、 躁狂与抑郁可交替发作
- B、 可首发为躁狂综合征
- C、 发病多与遗传因素有关
- D、 多发现为慢性迁延的病程
- E、 经充分治疗者产可彻底缓解

答案： D

55、急性血源性骨髓炎最早发生的部位是

- A、 短管骨干骺端
- B、 扁平骨
- C、 关节骨骺
- D、 长管骨干骺端
- E、 长管骨骨干

答案： D

56、陷窝细胞常见于霍奇金淋巴瘤的哪种组织学类型

- A、 结节性淋巴细胞为主型
- B、 淋巴细胞为主型
- C、 淋巴细胞减少型
- D、 混合细胞型
- E、 结节硬化型

答案： E

57、KUB 上阴性的结石是

- A、 草酸钙结石
- B、 磷酸镁铵结石
- C、 尿酸结石
- D、 胱氨酸结石
- E、 磷酸钙结石

答案： C

58、关于宫颈黏膜炎的正确描述是

- A、 又称宫颈管阴道炎
- B、 宫颈外口少有脓性物
- C、 病变局限于宫颈管黏膜
- D、 宫颈阴道部外观很光滑
- E、 不使宫颈肥大

答案： D

59、药动学是研究

- A、 药物作用随剂量变化的规律
- B、 药物作用随时间变化的规律
- C、 药物的体内过程及体内药物浓度随时间变化的规律
- D、 药物作用随药物化学结构变化的规律
- E、 吸收、分布、代谢、排泄

答案： C

60、下列哪种疾病时血小板减少属于血小板生成障碍

- A、 系统性红斑狼疮 (SLE)
- B、 过敏性药物损伤
- C、 脾大
- D、 DIC
- E、 再生障碍性贫血

答案： E

61、关于肾的构造, 错误的描述是

- A、 肾实质可分浅层的皮质和深层的髓质两部分
- B、 肾髓质由许多小的管道组成
- C、 肾锥体基底朝向皮质, 尖朝向肾窦
- D、 肾乳头开口于肾盂
- E、 肾锥体之间的皮质为肾柱

答案： D

62、患儿, 女, 6 岁, 面颈部及两手掌Ⅱ° 烧伤, 其烧伤面积约为

- A、 0.05
- B、 0.08
- C、 0.1
- D、 0.12
- E、 0.17

答案： D

63、视神经

- A、 外包三层膜, 为相应脑膜的延续
- B、 经眶上裂入颅中窝
- C、 为双极神经元的中枢突组成
- D、 完全受损, 伤侧全盲且瞳孔对光反射消失
- E、 连于端脑

答案： A

64、下述符合正常产褥子宫复旧的规律的是

- A、 产后 1 个月, 子宫体恢复正常大小
- B、 产后 10 天宫颈内口恢复至未孕状态
- C、 产后 7 天, 腹部检查扪不到宫底
- D、 产后子宫底每天下降 1~2 厘米
- E、 子宫颈的复旧比子宫体慢

答案： D

65、4 个月小儿烦躁、夜惊, 枕秃, 最合适的检查是

- A、 尿钙测定
- B、 Ca、 P、 AKP
- C、 25-(OH)-D
- D、 摄左腕 X 线骨片
- E、 骨碱性磷酸酶

答案: C

66、恶性淋巴瘤累及颈、腹股沟淋巴结, 肝和肺, 伴有发热, 盗汗, 体重减轻。临床分期属

- A、 III_a
- B、 III_b
- C、 IV_a
- D、 IV_b
- E、 II_b

答案: D



67、根据图示, 红斑肢痛症的临床特征为

- A、 肢端相继出现苍白、青紫与潮红
- B、 肢端出现红肿或青紫
- C、 肢端出现阵发性红、肿、热、痛
- D、 肢端出现苍白、发绀及麻木
- E、 足背动脉搏动微弱或消失

答案: C

68、流感病毒的基因组特点是

- A、 一条完整的单负链 RNA
- B、 分节段的单负链 RNA
- C、 完整的双链 DNA
- D、 分节段的双链 RNA
- E、 分节段的单链 DNA

答案: B

69、稽留热常见于

- A、 风湿热
- B、 疟疾

- C、 伤寒
- D、 布鲁菌病
- E、 渗出性胸膜炎

答案： C

70、对于中央型肺癌, 错误的是

- A、 发生在段支气管至主支气管
- B、 约占 3/4
- C、 较多见鳞状上皮细胞癌
- D、 较多见小细胞肺癌
- E、 较多见腺癌

答案： E

71、输卵管妊娠最常见的原因是

- A、 输卵管发育异常
- B、 慢性输卵管炎
- C、 盆腔肿块压迫或牵引输卵管
- D、 宫内节育器的影响
- E、 输卵管结扎术后

答案： B

72、斑疹伤寒首选哪种抗生素治疗

- A、 四环素
- B、 红霉素
- C、 庆大霉素
- D、 氯霉素
- E、 头孢拉定

答案： A

73、关于股骨头坏死, 首选的辅助检查是

- A、 X 线检查
- B、 CT 检查
- C、 MRI 检查
- D、 超声检查
- E、 骨扫描检查

答案： A

74、限制性内切核酸酶以 GGG▼CGCCC 方式切割产生的末端突出部分含

- A、 1 个核苷酸

- B、 2 个核苷酸
- C、 3 个核苷酸
- D、 4 个核苷酸
- E、 5 个核苷酸

答案： B

75、下列哪一种疾病须与缩窄性心包炎鉴别

- A、 限制型原发性心肌病
- B、 扩张型原发性心肌病
- C、 肥厚型梗阻性心肌病
- D、 病毒性心肌炎
- E、 风湿性心瓣膜病

答案： A

76、妊娠期子宫的变化, 错误的是

- A、 当宫缩时, 子宫血流量并不减少
- B、 妊娠早期子宫血流量为 50ml/min
- C、 妊娠早期子宫血流主要供应子宫肌层和蜕膜
- D、 足月时子宫的血流量约为 450~650ml/min
- E、 妊娠足月子宫血流 80%~85%供应胎盘

答案： A

77、哪项描述符合瘢痕组织的特点

- A、 细胞间有丰富的液体成分
- B、 组织内有大量的毛细血管
- C、 组织色泽鲜红、质地柔软
- D、 组织质地较硬、缺乏弹性
- E、 组织内有较多的炎性细胞

答案： D

78、头面部的疼痛的主要传导神经是

- A、 三叉神经
- B、 面神经
- C、 交感神经
- D、 视神经
- E、 听神经

答案： A

79、呼吸系统分为上下呼吸道, 其分界处为

- A、 喉部
- B、 声带
- C、 环状软骨下缘
- D、 总气管分叉部
- E、 会厌软骨下缘

答案： C

80、抑癌基因是一类抑制细胞过度生长、增殖从而遏制肿瘤形成的基因。对于正常细胞, 调控生长的基因(如原癌基因)和调控抑制生长的基因(如抑癌基因)的协调表达是调节控制细胞生长的重要分子机制之一。这两类基因相互制约, 维持正负调节信号的相对稳定。抑癌基因的丢失或失活也可能导致肿瘤发生。癌症是原癌基因激活和抑癌基因失活双重事件导致的。第一个被克隆的抑癌基因是

- A、 *p16*
- B、 *Rb*
- C、 *p53*
- D、 *DCC*
- E、 *APC*

答案： B

81、人体对各种损害因素所引起的全身性炎症反应称

- A、 败血症
- B、 AIDS
- C、 ARDS
- D、 毒血症
- E、 SIRS

答案： E

82、单纯性甲状腺肿最常用的治疗是

- A、 补钾
- B、 补碘
- C、 甲状腺激素治疗
- D、 手术
- E、 应用抗生素

答案： B

83、下列说法错误的是

- A、 胆囊炎多表现为持续性腹痛
- B、 幽门梗阻者一般呕吐后疼痛会缓解

- C、 钻顶样疼痛一般见于胆道蛔虫症
- D、 胃、十二指肠穿孔多为慢性胀痛
- E、 结肠病变,疼痛多在排便后减轻

答案: D

84、避孕套(阴茎套)避孕方法具有的优点,下列不正确的是

- A、 方法简便
- B、 适用于轻度早泄者
- C、 可预防性传播性疾病
- D、 女性对配偶精液过敏者
- E、 若正确而持续使用,第1年意外妊娠率为0

答案: E

85、嗜铬细胞瘤主要位于

- A、 肾上腺皮质
- B、 肾上腺
- C、 交感神经节
- D、 膀胱内
- E、 肾上腺髓质

答案: E

86、经清创缝合的伤口3~5天后,患者高热,伤处红肿、跳痛,此时应

- A、 继续观察
- B、 加大抗生素剂量
- C、 局部冷敷
- D、 局部热敷
- E、 拆除缝线,引流

答案: E

87、作为抗原提呈细胞,B细胞通过下列哪种分子提供T细胞活化的第二信号

- A、 CD28
- B、 B7-1/B-2
- C、 CD40
- D、 CD40L
- E、 MHC II类分子

答案: B

88、出生半年的脑积水患儿,颅内压增高的主要表现是

- A、 头痛

- B、 呕吐
- C、 视盘水肿
- D、 头围明显增大
- E、 抽搐发作

答案： D

89、 蜱传回归热的潜伏期为

- A、 2~15 天
- B、 3~4 天
- C、 5~7 天
- D、 7~8 天
- E、 10~12 天

答案： A

90、 常规心电图可做诊断的窦房阻滞是

- A、 一度窦房传导阻滞
- B、 三度窦房传导阻滞
- C、 二度窦房传导阻滞
- D、 以上三项均是
- E、 以上三项均不是

答案： C

91、 ALI/ARDS 典型的血气改变是

- A、 PO_2 升高, pH 升高
- B、 PO_2 降低 ,pH 降低
- C、 PO_2 降低 ,pH 升高
- D、 PO_2 升高 ,pH 降低
- E、 正常

答案： C

92、 下列有关 ABO 血型系统的叙述, 正确的是

- A、 新生儿血浆中存在 IgG 型抗 A 或抗 B 抗体
- B、 新生儿血浆中存在 IgM 型抗 A 或抗 B 抗体
- C、 新生儿红细胞上 A 或 B 抗原的含量与成人相同
- D、 新生儿血浆中存在的抗 A 或抗 B 抗体是自己产生的
- E、 新生儿体内的 A 或 B 抗原只存在于红细胞上

答案： A

93、 维生素 B₂ 是下列哪种辅酶或辅基的组成成分

- A、 NAD^+
- B、 NADP^+
- C、 CoASH
- D、 TPP
- E、 FAD

答案： E

94、妊娠合并急性病毒性肝炎之处理,下述何项是错误的

- A、 早妊期治疗后行人工流产以防畸形
- B、 中晚期不宜终止妊娠
- C、 注意防止妊娠高血压综合征发生
- D、 注意缩短第一、第二产程
- E、 应用四环素预防感染

答案： E

95、以下是医生运用血压计正确的测血压方法,但哪项是错误的

- A、 患者采取坐位,安静休息 10 分钟以后
- B、 肘部应与心脏同一水平,上臂伸直并稍外展
- C、 袖带气囊部分对准肱动脉,紧贴皮肤缚于上臂
- D、 袖带下缘应距肘弯横纹上 2cm 处
- E、 再将听诊器胸件放于袖带下肱动脉上

答案： E

96、心功能不全时,神经-体液调节机制激活的代偿反应中最重要的是

- A、 醛固酮水平升高
- B、 交感神经系统兴奋
- C、 儿茶酚胺释放增多
- D、 心房钠尿肽合成增加
- E、 交感神经系统和肾素-血管紧张素系统激活

答案： E

97、不属于结肠上区的间隙是

- A、 肝肾隐窝
- B、 右肝上前间隙
- C、 左肝下前间隙
- D、 网膜囊
- E、 右结肠旁沟

答案： E

98、下列哪项检查对新生儿缺氧缺血性脑病的诊断无帮助

- A、 脑电图
- B、 头颅摄片
- C、 头颅 CT
- D、 头颅磁共振
- E、 头颅超声

答案： B

99、溃疡性结肠炎腹痛和腹泻明显时,应用较大剂量阿托品治疗,最可能引起的改变是

- A、 机械性肠梗阻
- B、 肠穿孔
- C、 中毒性巨结肠
- D、 结肠大量出血
- E、 腹痛加重

答案： C

100、我国门静脉高压症的最常见病因为

- A、 乙肝后肝硬化
- B、 丙肝后肝硬化
- C、 酒精性肝硬化
- D、 血吸虫性肝硬化
- E、 门静脉海绵样变性

答案： A

101、外源性致热原的特点,正确的是

- A、 分子量小
- B、 致热性可被蛋白酶类水解
- C、 可通过血脑屏障
- D、 能激活单核-吞噬细胞系统
- E、 在体内最终由肝、肾灭活和排泄

答案： D

102、双合诊检查,不包含哪项检查

- A、 外阴
- B、 阴道
- C、 宫颈
- D、 子宫
- E、 附件

答案： A

103、大量体液丢失后只滴注葡萄糖液会导致

- A、 水中毒
- B、 高渗性脱水
- C、 低渗性脱水
- D、 等渗性脱水
- E、 高血糖症

答案： C

104、站立位胸膜腔最低位置是

- A、 左肺胸膜下界
- B、 肋膈窦
- C、 心脏切迹
- D、 斜裂
- E、 右肺前界

答案： B

105、椎动脉型颈椎病的主要诊断依据为

- A、 痛温觉分离,肌萎缩
- B、 四肢麻木,出现病理反射
- C、 出现四肢瘫,有脊髓腔梗阻现象
- D、 头痛、头晕、颈后伸或侧弯时眩晕加重,甚至猝倒
- E、 颈肩痛反复发作,手部有放射性痛,牵拉试验阳性

答案： D

106、患者,女,50岁。甲状腺多发结节3年。颈部超声提示:甲状腺双侧叶多发囊性、实性结节。实验室检查: T_3 、 T_4 、TSH正常。在随访过程中,手术治疗指征不包括

- A、 甲状腺结节增大伴憋气
- B、 甲状腺结节的数量增加
- C、 出现甲状腺功能亢进
- D、 出现胸骨后甲状腺肿
- E、 结节边界不清并细小钙化

答案： B

107、患者,男,60岁,无痛性间歇性全程血尿。查体:呈贫血貌,消瘦,双肾区无隆起,下腹部有轻度压痛。下列最好的诊断方法是

- A、 膀胱造影
- B、 膀胱双合诊
- C、 膀胱镜检查

D、尿脱落细胞检查

E、B 型超声波检查

答案： C

108、患者,女,68 岁,外阴瘙痒 1 个月。阴道分泌物发现线索细胞,考虑诊断为

A、滴虫性阴道炎

B、真菌性阴道炎

C、细菌性阴道炎

D、淋菌性阴道炎

E、慢性宫颈炎

答案： C

109、1 型糖尿病患者局部反复注射胰岛素后导致注射部位出现红肿、出血和坏死,明确非感染所致,最可能的原因是局部发生了

A、I 型超敏反应速发相反应

B、I 型超敏反应迟发相反应

C、II 型超敏反应

D、III 型超敏反应

E、IV 型超敏反应

答案： D

110、患者,男,49 岁,心悸气短,并有晕厥史 6 个月。X 光片心影大小正常,彩色超声显示左房内团状回声,心电图正常。最适合的处理是

A、强心利尿治疗

B、冠状动脉造影

C、尽早体外循环下手术治疗

D、溶栓治疗

E、介入治疗

答案： C

111、患者,男,32 岁,诊断吉兰-巴雷综合征一周,出现呼吸困难,发绀 5 天,血气分析结果为:pH7.30, PaCO₂70mmHg, PaO₂55mmHg。下列阐述哪项是错误的

A、该患者出现呼吸泵衰竭

B、该患者存在高碳酸血症

C、该患者由于换气功能障碍导致低氧血症

D、该患者存在低氧血症

E、该患者存在呼吸性酸中毒


答案： C

112、患儿,男,1岁。3天前无明显诱因出现斜视伴复视,查体头围较正常同龄婴儿增大,前囟膨隆。该患儿最有可能的诊断是

- A、 甲亢
- B、 先天性脑积水
- C、 畸形
- D、 颅裂
- E、 脑水肿

答案: B

113、图为慢性右心衰竭患者尸检肝脏表现,不包括下列哪项病变



- A、 肝细胞脂肪变性
- B、 肝细胞萎缩
- C、 胆小管增生
- D、 肝小叶中央静脉和肝窦扩张充血
- E、 肉眼观察切面呈红黄相间的花纹

答案: C

114、患者,男,36岁,扩张型心肌病,活动后气促半年,平地慢走5分钟出现胸闷气促,休息后可缓解。查体:心浊音界向左侧扩大,心尖部可闻及3/6级收缩期杂音,肝颈反流征阳性,双下肢水肿。超声心动图发现全心扩大,伴中度二尖瓣关闭不全,LVEF为29%,肺动脉收缩压为60mmHg。目前该患者为哪种类型心力衰竭

- A、 慢性左心衰竭

- B、 慢性右心衰竭
- C、 慢性全心衰竭
- D、 急性左心衰竭
- E、 急性右心衰竭

答案： C

115、新生儿第一胎,早破水,生后第二天开始发绀、拒奶,体温不升,黄疸,白细胞 $15 \times 10^9/L$,中性粒细胞 70%,血型 O 型,胆红素 $205 \mu\text{mol/L}$,最可能的诊断是

- A、 新生儿溶血病
- B、 新生儿肺炎
- C、 低血糖
- D、 颅内出血
- E、 败血症

答案： E

116、一脑出血的患者,呼之能睁眼,该患者 Glasgow 睁眼反应评分为

- A、 0 分
- B、 1 分
- C、 2 分
- D、 3 分
- E、 4 分

答案： D

117、患者,女,48 岁。反复心悸,持续时间不等。体格检查示心率 150 次/分,心律不齐,第一心音强弱不等。下列哪种情况患者不能使用胺碘酮

- A、 P 波等电位线消失
- B、 RR 间期不等
- C、 QTc 560ms
- D、 QRS 波时限 130ms
- E、 心动过速时可见“R-ON-T”现象

答案： C

118、患儿,男,1 岁。3 天前发热高达 41°C ,流涕,今晨热退,但发现其颈部和背部出现红色斑丘疹,首先应考虑

- A、 风疹
- B、 幼儿急疹
- C、 麻疹
- D、 药物疹
- E、 猩红热

答案： B

119、初产妇, 27 岁, 孕 28 周, 其夫婚检时发现 HBsAg 阳性, 肝功正常。孕妇欲确诊是否感染乙肝及对胎儿有无影响, 应检查

- A、 ALT
- B、 HBsAg
- C、 肝脏 B 超
- D、 乙肝两对半
- E、 肝脏 CT

答案: D

120、患者, 女, 32 岁, 患风心病, 二尖瓣狭窄及关闭不全, 有慢性心力衰竭, 经常每日服地高辛 0.125mg。10 天前开始气短, 水肿加重, 心率 120 次/min, 心律绝对不规则。首先采用的治疗措施是

- A、 毛花苷 C
- B、 呋塞米
- C、 直流电复律
- D、 扩血管药物
- E、 维拉帕米

答案: A

121、患者, 男, 40 岁, 10 年前被告知有风心病, 目前心功能尚好, 体检时发现胸骨左缘 2~3 肋间舒张期叹气样杂音。拟诊断风心病主动脉瓣关闭不全。但最需认真鉴别的是

- A、 Austin-Flint 杂音
- B、 Graham-Steell 杂音
- C、 器质性肺动脉瓣狭窄杂音
- D、 器质性肺动脉瓣关闭不全杂音
- E、 二尖瓣关闭不全杂音

答案: B

122、脑外伤 1 个月后的 1 例患者, 虽然可自发睁眼, 貌似清醒, 但呼之不应, 不能与外界交流。这种状态最可能为

- A、 闭锁综合征
- B、 无动性缄默
- C、 去皮质强直
- D、 去脑强直状态
- E、 嗜睡

答案: B

123、患者,男,42岁,有高血压史。4小时前因劳累而感头痛,烦躁,心悸,多汗,恶心,面色苍白,视力模糊,收缩压 33.8kPa(260mmHg),舒张压 18.6kPa()。以下治疗最适宜的是

- A、 氢氯噻嗪口服
- B、 普萘洛尔口服
- C、 静脉输液
- D、 硝普钠静滴
- E、 安定肌注

答案 D

答案:

124、患儿,男,8岁,平时有偏食习惯。入学后上课难集中精神听课,学习成绩欠佳,体检面色稍苍白,浅淋巴结及肝脾不大,RBC $3.6 \times 10^{12}/L$,Hb 101g/L,MCV 72fL,网织红细胞 0.015,白细胞和血小板正常。最可能的诊断是

- A、 地中海贫血
- B、 营养性巨幼细胞贫血
- C、 铅中毒
- D、 感染性贫血
- E、 营养性缺铁性贫血

答案: E

125、患者,女,23岁。因原发性甲状腺功能亢进症在气管内插管全麻下行甲状腺双侧次全切除术,术后清醒拔出气管插管后出现呼吸困难,伴有失音,无手足麻木。查体:T 37.3℃,P 92次/min,R 28次/min,BP 130/70mmHg,面红无发绀,颈部不肿,引流管畅通,有少许血液流出。引起该患者呼吸困难最可能的原因是

- A、 双侧喉返神经损伤
- B、 甲亢危象
- C、 喉上神经损伤
- D、 伤口出血
- E、 甲状旁腺损伤

答案: A

126、患儿,4岁。生长发育正常,胸骨左缘3~4肋间闻及2/6级柔和收缩期吹风样杂音,卧位较坐位响亮。最可能的诊断是

- A、 室间隔缺损
- B、 房间隔缺损
- C、 动脉导管未闭
- D、 生理性杂音
- E、 肺动脉狭窄

答案： D

127、患者,男,56岁,2年前患者反复出现多关节疼痛,疼痛时伴晨僵,查体在肘关节鹰嘴突周围可见大小不一、质硬、无压痛的皮下小结。该患者的皮下结节可能是

- A、 风湿结节
- B、 痛风结节
- C、 结节性红斑
- D、 动脉炎结节
- E、 Osler 结节

答案： C

128、患者,女,32岁。曾足月分娩1次,流产2次,产后即出现闭经,妇科检查未发现异常。该患者闭经与以下病史中,关系最密切的是

- A、 月经初潮16岁
- B、 其母38岁即闭经
- C、 5年前分娩,曾发生产后大出血
- D、 20岁时因乳腺纤维瘤作过手术
- E、 1年前曾先后作过两次人工流产

答案： C

129、患者,男,30岁,工作中突然头痛、头昏、伴有恶心。以往经常血压升高在16.9~26/14.3~16.9kPa(130~200/110~130mmHg)之间,无高血压家族史。查体:血压24/16.5kPa(),上腹部闻及血管性杂音。引起高血压的最可能病因是

- A、 嗜铬细胞瘤
- B、 原发性高血压
- C、 肾动脉狭窄
- D、 慢性肾炎引致高血压
- E、 原发性醛固酮增多症

答案 C

答案:

130、患者,女,70岁,有慢性咳喘史20余年,咳喘加重1周。查体:神清,唇发绀,桶状胸,剑突下可见心尖冲动;双肺可闻湿性啰音;心率112次/min,节律不齐,心音强弱不等;肝肋下1cm触及,双下肢水肿++。实验室检查:血WBC $11 \times 10^9/L$,N80%,L20%,尿蛋白+。胸片见双肺纹理增多,ECG提示心房颤动。问下列哪种治疗最恰当

- A、 立即用高浓度吸氧
- B、 积极抗感染,保持呼吸道通畅

- C、立即用呋塞米静脉注射,消除水肿
- D、立即用毛花苷C纠正房颤
- E、立即注射地塞米松

答案: B

131、患者,女,35岁,近1年来头痛,体重增加,鞋号略增大、月经稀少。查体:血压24/14kPa(),皮肤稍干,舌体偏大。蝶鞍像显示:鞍底呈双边现象。下述激素检查一般不会出现异常的是

- A、PRL
- B、ACTH
- C、ADH
- D、LH、FSH
- E、GH

答案C

答案:

132、患者,男,17岁,全身水肿乏力3周,尿少3

天,BP16/10kPa(120/75mmHg),Hb160g/L,ESR60mm/h,尿蛋白(++++) ,RBC0~2个/HP,白蛋白2.0g/dl,血肌酐550 μ mol/L,尿蛋白定量5.6g/d,选择哪种药物治疗最合适

- A、利尿剂
- B、泼尼松
- C、输血浆
- D、肝素抗凝疗法
- E、环磷酰胺

答案: B

133、患者,女,26岁,1年以来腹泻,每日2~3次,进食蔬菜、蛋白后腹泻加重;多次查大便常规,可见红细胞、白细胞,严重时可见肉眼脓血便,大便培养多次(-)。为明确诊断,最有效的诊断方法是

- A、依靠临床表现
- B、大便常规及培养
- C、X线钡剂灌肠
- D、电子结肠镜检查
- E、血清免疫球蛋白

答案: D

134、患者,女,55岁,。绝经5年,偶有外阴瘙痒3年。妇科检查:外阴皮肤和黏膜变白、变薄,失去弹性,阴蒂和小阴唇萎缩如图。可能的诊断



- A、 外阴鳞状上皮增生
- B、 外阴硬化性苔藓
- C、 外阴白癜风
- D、 外阴白化病
- E、 其他皮肤病

答案: B

135、患者,男,60岁,咳嗽痰中带血2个月来院检查,摄片见右上肺野周围孤立性圆形块影3cm×4cm大小,有厚壁偏心性空洞,内壁凹凸不平,首先考虑诊断

- A、 肺结核
- B、 肺癌
- C、 肺脓肿
- D、 肺囊肿
- E、 肺内良性肿瘤

答案: B

136、患者,男,45岁,一个月前因直肠癌进行过手术。术后情况尚可。近一周来患者情绪低落,常常独自流泪,对自己的生命非常悲观,睡眠浅,易早醒,经常存在生不如死的感觉。该患者的心理情绪状态是

- A、 焦虑反应
- B、 恐惧反应
- C、 失眠反应
- D、 抑郁反应
- E、 神经反应

答案: D

137、患者,男,25岁,车祸骨折手术,用吗啡镇痛。患者不会出现下列哪种不良反应

- A、 颅内压增高
- B、 胆囊内压力明显增高
- C、 抑制消化液的分泌
- D、 腹泻

E、 恶心、呕吐

答案： D

138、患者,女,25岁。近日反复出现皮肤出血点,以双下肢为著。日前曾有发热咽痛,现已痊愈。以下哪项不参与该患者止血过程

A、 血管壁

B、 血小板

C、 凝血因子

D、 炎症因子

E、 纤溶因子

答案： D

139、患者,女,23岁,新婚,近2天突然出现发热,腰痛,尿频、尿急、尿痛,下列哪种细菌是导致病变最常见的病因

A、 葡萄球菌

B、 大肠杆菌

C、 变形杆菌

D、 肠球菌

E、 绿脓杆菌

答案： B

140、患者,女性,20岁,因“反复发作性紧张、恐惧,伴胸闷、气促1月”来诊。近1月来10余次发作,反复查各类辅助检查均未见异常。针对该患者的情况,以下治疗方案最合理的是

A、 单用奥氮平治疗

B、 阿普唑仑联合多塞平治疗

C、 艾司唑仑联合奥氮平治疗

D、 阿普唑仑联合氟西汀治疗

E、 电休克治疗

答案： D

141、患者,女,38岁,已婚,因故实施输卵管结扎手术,结扎部位常选择在

A、 输卵管子宫部

B、 输卵管峡

C、 输卵管壶腹

D、 输卵管漏斗

E、 输卵管伞

答案： B

142、患者,男,62岁。黄磷接触史,突发急性黄疸,近两日出现昏睡,就近的乡诊所给予肥皂水洗胃,该患者意识障碍加重。其原因最可能是

- A、低血糖
- B、血氨水平升高
- C、低钾血症
- D、代谢性酸中毒
- E、低钠血症


答案: B

143、一位65岁退休的女士,去墨西哥度假并食用当地食物。36小时后,她出现了大量的水样腹泻伴腹痛。她被诊断为大肠埃希菌相关性腹泻。下列哪种大肠埃希菌产生耐热和不耐热肠毒素

- A、EIEC
- B、ETEC
- C、EHEC
- D、EPEC
- E、EAEC

答案: B

144、如图所示为室性并行心律,下列不是室性并行心律的心电图特点的是



- A、QRS波群宽大畸形
- B、室性期前收缩的较长间距与最短间距成整倍数关系
- C、室性融合波

D、偶联间期不恒定

E、心室夺获

答案： E

145、患儿,3岁。身高60cm,喜静、便秘。体检:智力低下,面色苍黄,鼻梁宽平,舌厚大,经常伸出口外,皮肤粗糙,腕部摄片见骨化中心一个,最可能诊断是

A、垂体性侏儒症

B、甲状腺功能减低症

C、佝偻病

D、先天愚型

E、软骨发育不良

答案： B

146、患者,女,24岁。脐周隐痛伴腹泻1周,大便呈糊状,无黏液脓血,近半月发热,盗汗,钡剂灌肠示回盲部激惹症。为确诊应首选的检查是

A、剖腹探查

B、结肠镜检查

C、大便常规检查

D、结核菌素试验

E、腹部平片

答案： B

147、患者,女,47岁,右腰部疼痛1年,右侧腹部有一高密度阴影,诊断考虑为上尿路结石,需要排除的疾病不包括

A、腰椎钙化

B、静脉石

C、胆囊结石

D、肠系膜淋巴结钙化

E、粪石

答案： A

148、患儿,8个月,2周来显著多汗,睡眠不安,夜惊,纳差,精神欠活泼,方颅,前囟3cm×3cm,未出牙,肋膈沟,串珠肋。四肢肌活力稍差,为诊断首先应做的检查是

A、头颅CT+脑脊液检查

B、血钙、磷测定+颅骨X片

C、血钙、磷,碱性磷酸酶+长骨X片

D、血钙、磷测定+降钙素测定

E、甲状旁腺激素+血镁测定

答案： C

149、患者,男,腹痛,腹泻 2 月余,心肺无异常,腹软,左中腹压痛,为明确诊断,首先应检查

- A、 电子结肠镜
- B、 腹部 B 超
- C、 钡剂灌肠
- D、 粪便隐血
- E、 腹部平片

答案： A

150、怀孕 9 个多月的孕妇梁某,因出现分娩征兆住进了某医院妇产科,顺利产下一男婴。按规定产妇梁某分娩后需在分娩室内观察一定时间,该时间是

- A、 2 小时
- B、 3 小时
- C、 4 小时
- D、 5 小时
- E、 6 小时

答案： A

151、患者,女,25 岁,既往健康。2 小时前打扫室内清洁时突然出现咳嗽、胸闷、呼吸困难。查体:两肺满布干啰音。该例诊断应为

- A、 慢性喘息型支气管炎
- B、 慢性阻塞性肺疾病
- C、 支气管哮喘
- D、 心源性哮喘
- E、 气胸

答案： C

152、20 岁外伤患者,X 线摄片发现第 12 胸椎椎体前方压缩 1/3,双下肢感觉运动好,大小便正常。最适宜采取的治疗方法是

- A、 腰部垫厚枕,加强功能锻炼
- B、 石膏背心固定
- C、 手术复位,内固定
- D、 两桌法过伸复位加石膏背心固定
- E、 双踝悬吊法复位加石膏背心固定

答案： D

153、患者,男,35岁。来诊主诉全身水肿3周,血压20/14kPa(150/105mmHg),尿蛋白5.0g/L,尿红细胞5~8/HP,血浆白蛋白15g/L,尿FDP(++)。给予激素治疗,判断疗效最主要靠

- A、水肿减轻程度
- B、血压下降程度
- C、尿FDP下降程度
- D、蛋白尿减轻程度
- E、血尿减轻程度

答案: D

154、患者,女,26岁。人工流产吸宫术后15天,仍有不规则阴道流血,经抗生素和宫缩剂治疗无效。首先应考虑为

- A、吸宫不全
- B、子宫复旧不全
- C、月经不调
- D、子宫内膜炎
- E、宫颈粘连

答案: A

155、患者,女,36岁。结婚10年未孕,月经量较多,经期较长,深部性交痛8年。妇科检查:子宫略有增大。B型超声示:子宫后位,前壁2.0cm,后壁3.2cm。血CA125 40U/ml。最可能的诊断是

- A、功血
- B、不孕症
- C、子宫肌瘤
- D、盆腔炎
- E、子宫内膜异位症

答案: E

156、患者,男,23岁,低热、盗汗、乏力、食欲缺乏、消瘦3月余,最可能的诊断是

- A、肺结核
- B、慢性肠炎
- C、糖尿病
- D、甲状腺功能亢进症
- E、慢性胃炎

答案: A

157、患者,男,60岁。于8月6日早上开始发热,体温41℃,傍晚时开始持续抽搐并迅速发生深度昏迷,瞳孔忽大忽小,呈叹息样呼吸,既往有糖尿病病史。化验乙脑特异性IgM抗体阳性。目前诊断应属于下列哪一型

- A、 轻型
- B、 普通型
- C、 重型
- D、 极重型
- E、 非典型

答案: D

158、患儿,男,12岁,上呼吸道感染后10余天,出现肉眼血尿、颜面水肿,血压130/90mmHg,血肌酐 $150\mu\text{mol/L}$,血清补体C3下降。最可能的诊断是

- A、 急性肾炎(链球菌感染后肾炎)
- B、 急进性肾炎
- C、 慢性肾炎急性发作型
- D、 IgA肾病
- E、 遗传性肾炎

答案: A

159、患者,女,24岁。停经65天,B超检查如图所示,应诊断为



- A、 早孕
- B、 宫内积血
- C、 葡萄胎
- D、 绒癌
- E、 子宫肌瘤

答案: A

160、女性患者,25岁,疑人害半年。经2个月药物治疗后症状好转,下列哪项可以判断出患者自知力恢复良好

- A、 认为是自己想通了,于是不再怀疑他人
- B、 认为自己好了,不需要继续服药
- C、 认为之前压力太大,经过调整后状态变好
- D、 认为之前害自己的人可能还会害自己

E、认为之前的想法很荒谬,他人不可能害自己

答案: E

161、患者,女,68岁,结肠癌术后第一天,关于患者机体代谢情况,以下错误的是

- A、蛋白质分解加速
- B、机体出现高代谢和分解代谢
- C、处理葡萄糖能力增强
- D、脂肪动员加速
- E、机体处于负氮平衡

答案: C

162、患者,女,37岁。5个月前因妊娠2个月而行人工流产术,术后无月经来潮,测基础体温呈双相曲线,盆腔检查无异常发现。最可能原因是

- A、再次妊娠
- B、下丘脑-垂体功能抑制
- C、多囊卵巢综合征
- D、卵巢功能衰竭
- E、宫腔粘连

答案: E

163、患儿,女,14岁。周期性下腹痛半年,无月经来潮。B超检查结果见示意图,



以下正确的是

- A、生殖器发育过程中正常管道形成受阻所致
- B、生殖器发育过程中副中肾管衍化物发育不全所致
- C、生殖器发育过程中副中肾管衍化物融合障碍所致
- D、胚胎发育过程中暴露于高雄激素所致
- E、雌激素不敏感综合征

答案: A

164、高血压病脑出血死亡患者,心脏重550g,左心室壁厚1.6cm,乳头肌和肉柱增粗,心腔不扩张,应诊断为

- A、心脏肥大(代偿期)
- B、心脏肥大(失代偿期)
- C、肥厚性心肌病

- D、 心脏脂肪变性
- E、 心肌脂肪组织浸润


答案： A

165、患者,男,48岁。既往无胃病史,半年来自觉乏力,食欲减退,间断出现黑便,无呕血,体重下降约10kg。查体:上腹部膨隆,轻压痛,肝脾未触及,移动性浊音(-),大便潜血(+)。此患者首先怀疑诊断为

- A、 胃癌
- B、 食管静脉曲张破裂出血
- C、 慢性萎缩性胃炎
- D、 应激性溃疡出血
- E、 消化性溃疡出血

答案： A

166、患者,男,55岁,黏液血便2个月,脐周及下腹隐痛不适,腹平软,无压痛及



肿块。大便隐血(+++),肠镜如图,诊断为

- A、 直肠癌
- B、 直肠炎性息肉
- C、 直肠腺瘤样息肉
- D、 直肠绒毛样息肉
- E、 克罗恩病

答案： A

167、患者,女,26岁,已婚。平素月经规律,现停经50天,尿HCG(+),无阑尾炎病史。突感右下腹疼3天,伴发热38~38.7℃。检查时发现腹肌紧张,右下腹压痛明显。最不可能的诊断是

- A、 右侧输卵管妊娠
- B、 右卵巢肿瘤扭转合并感染
- C、 妊娠合并急性阑尾炎
- D、 妊娠合并急性淋菌性盆腔炎
- E、 妊娠合并右侧输尿管结石

答案： E

168、患者,女,28岁。慢性盆腔炎病史3年,近3天高热伴下腹痛。妇科检查:子宫正常大小,左附件区触及7cm×7cm×7cm大小包块,伴压痛,双附件未及明显异常。静脉使用抗生素72小时无效。该患者下一步处理最佳的是

- A、理疗
- B、手术治疗
- C、抗生素
- D、后穹隆切开
- E、中药

答案: B

169、患者,女,55岁。高血压20年,不规则服药。某日晨突发头痛,意识不清,30分钟后送到医院。查体:昏迷,血压190/120mmHg,双眼向右侧凝视,左足外旋位。该患者最可能的诊断是

- A、晕厥
- B、脑出血
- C、脑血栓形成
- D、蛛网膜下脑出血
- E、心肌梗死

答案: B

170、患者,女,65岁,阵发性房颤1年,近期出现房颤发作频繁伴头晕,黑蒙,诊断最可能的是

- A、病态窦房结综合征
- B、房颤伴三度房室传导阻滞
- C、房颤致血流动力学紊乱
- D、房颤伴频发室性期前收缩
- E、房颤伴频发室上性期前收缩

答案: A

171、患者,男,50岁,车祸外伤2小时,伤后出现恶心,呕吐,剧烈腹痛,抬入诊室。查体:腹部饱满,全腹压痛、反跳痛、肌紧张。此时最适宜的辅助检查是

- A、呕吐物涂片检查
- B、大便潜血试验
- C、诊断性腹腔穿刺
- D、腹腔断层摄片
- E、腹部CT或磁共振检查

答案: C

172、患者,男,56岁。因诊断为肾病综合征,采用泼尼松进行治疗。长期应用皮质激素类药物可能引起

- A、高血钙
- B、低血钾
- C、高血钾
- D、高血磷
- E、低血糖

答案: B

173、患者,女,65岁,既往糖尿病、高血压病史,晨起被家人发现昏迷送诊,家中发现地西洋空瓶(100片)。查体:意识不清,双侧瞳孔等大,直径约2mm,对光反射存在,HR65次/min, BP110/75mmHg, SpO_2 94%,神经定位体征未引出。以下对该患的处理,哪项不正确

- A、立即洗胃
- B、应用氟马西尼
- C、完善头颅CT检查
- D、完善心电图检查
- E、化验血糖等生化检查

答案: A

174、患者,男,64岁,高胆固醇血症,近半年来频发心前区疼痛,为高心肌梗死危险人群,选择下列哪一种药作为一线治疗药物

- A、鱼油
- B、考来烯胺
- C、烟酸
- D、普罗布考
- E、洛伐他丁

答案: E

175、患者,男,35岁。表现自我感觉良好,非常高兴。说话时语音高昂,眉飞色舞,表情丰富,经常使病友们开怀大笑。此患者可能存在的症状为

- A、思维奔逸
- B、思维迟缓
- C、情感低落
- D、情感高涨
- E、情感不稳

答案: D

176、患者,男,35岁,因车祸致颅脑损伤,累及下丘脑,出现下丘脑综合征。下列症状中,下丘脑受损不会出现的是

- A、 过度贪食伴极度肥胖
- B、 哭笑无常、易激怒
- C、 体温过低
- D、 近期记忆丧失
- E、 性欲低下

答案: D

177、患者,女,20岁。旅行归来的次日出现低热,食欲缺乏,然后水样便达15次之多,无里急后重感,腹痛为轻中度,伴有恶心和乏力。有轻度脱水,体温38℃。便常规:镜下未见红、白细胞。血常规:白细胞 $5.6 \times 10^9/L$,中性粒细胞占0.8。此患者最有可能的感染是

- A、 沙门菌感染
- B、 肠产毒素型大肠埃希菌
- C、 霍乱弧菌
- D、 肠出血型大肠埃希菌
- E、 志贺菌感染

答案: B

178、患儿,男,5岁。持续发热2周,体温38.5℃左右,伴头痛,呕吐,曾用青霉素治疗5天无效,其父有慢性咳嗽史。查体:精神萎靡,消瘦,心肺无异常,颈稍抵抗,布鲁津斯基征、凯尔尼格征阳性。脑脊液示:细胞 $332 \times 10^6/L$,中性粒细胞55%,淋巴细胞45%,糖2.2mmol/L。本例最可能诊断为

- A、 结核性脑膜炎
- B、 不典型化脓性脑膜炎
- C、 不规则治疗后的肺炎双球菌脑膜炎
- D、 病毒性脑炎
- E、 颅内肿瘤

答案: E

179、患者,男,23岁,检查发现:患者颈5~胸1的脊髓白质前连合受损,患者会出现何种表现

- A、 双上肢所有感觉缺失或减退
- B、 一侧上肢所有感觉缺失或减退
- C、 病变平面以下躯体痛、温觉减退,而深感觉和触觉保留
- D、 病变平面以下躯体所有感觉缺失或减退
- E、 双上肢痛温觉缺失或减退而深感觉和触觉保留

答案: A

180、某患者口唇色素沉着明显,尿 17-羟皮质醇增高,血 ACTH 明显增高,小剂量及大剂量地塞米松均不能抑制。其最可能的病因是

- A、 Cushing 综合征
- B、 肾上腺腺瘤
- C、 异位 ACTH 综合征
- D、 肾上腺癌
- E、 长期服用泼尼松者

答案: C

181、患者,青年女性,因系统性红斑狼疮长期服用激素治疗,近半年来自觉左髋部疼痛明显,就诊于医院,行 X 线检查示:股骨头外形完整,关节间隙正常,股骨头负重区关节软骨下骨的骨质中可见 1~2cm 宽的弧形透明带,诊断为股骨头坏死。下列治疗方式中,应选用

- A、 非手术疗法,避免负重,可扶拐,带坐骨支架、用助行器行走
- B、 股骨头钻骨及植骨术
- C、 带血供髂骨移植术
- D、 经转子间旋转截骨术
- E、 人工关节置换术

答案: A

182、患者,男,27 岁,教师。3 年前戒毒,近 1 年来双下肢麻木、乏力,进行性加重,近 1 个月不能行走,便秘,排尿不畅。当地颅脑及胸腰椎 CT(-)。检查:双下肢肌力 4°,胸 10 以下痛觉减退,关节位置及音叉觉正常,下肢腱反射亢进,Babinski(+).腰穿 CSF 压力 160mmH₂O,细胞 35×10⁶/L,蛋白 1275mg/L,按脊髓炎治疗无效。查血 RPR 1:32,TPHA 1:2560;腰穿 CSF 细胞 25×10⁶/L,蛋白 1344mg/L,RPR 1:2,TPHA 1:1280。该患者最有可能是什么疾病

- A、 化脓性脊髓炎
- B、 脊髓钩端螺旋体病
- C、 脊髓血管梅毒
- D、 病毒性脊髓炎
- E、 结核性脊髓炎

答案: C

183、患者,男,60 岁,作业时引起火灾造成前躯干Ⅲ度烧伤面积达 10%,伤后 7 天,出现寒战高热,体温达 39.5℃,创面溶痂,有脓性分泌物,创面分泌物细菌培养为金黄色葡萄球菌。这个时候应采取的最佳治疗是


- A、 半暴露疗法,局部敏感抗生素湿敷
- B、 包扎疗法,局部应用敏感抗生素
- C、 切痂,去除坏死组织,全身应用抗感染治疗

D、 包扎疗法,同时全身应用敏感抗生素

E、 暴露疗法

答案: C

184、患者,女,50岁。因肺炎入院,抗炎3天体温仍未退,呼吸困难,痰中带血,伴胸痛,右下肢肿胀,胸部CT见图。最可能的疾病是



A、 肺血栓栓塞症

B、 冠状动脉硬化性心脏病

C、 原发性肺动脉高压

D、 肺炎

E、 肺结核

答案: A

185、患者,女,67岁,患糖尿病10余年。因全身水肿就诊,血气分析结果:pH 7.30, PaCO_2 34mmHg, HCO_3^- 16mmol/L, 血 Na^+ 140mmol/L, Cl^- 104mmol/L, K^+ 4.5mmol/L。该患者发生的酸碱失衡是

A、 呼吸性酸中毒

B、 AG正常型代谢性酸中毒

C、 AG增高型代谢性酸中毒

D、 血氯增高型代谢性酸中毒

E、 代谢性酸中毒合并代谢性碱中毒

答案: C

186、患者,男,18岁。在一次考试中突然两眼向前瞪视,呼之不应,持续数秒钟恢复,可继续答题,但对发作过程无回忆。以后反复有类似发作,频繁时每日发作数次。本患可诊断为

A、 癔症

B、 失神发作

C、 局限性癫痫

D、 精神运动性发作

E、 肌阵挛发作

答案: B

187、患者,女,24岁。10天前因“停经41天,尿HCG(+)”行吸宫流产术,术中未见绒毛,出血不多。今晨突然晕倒在地。查体:体温37.3℃,血压75/50mmHg,脉搏100次/min,下腹压痛及反跳痛明显,阴道少量流血,宫颈举痛明显,宫口闭,子宫稍大,稍软,右侧似有一包块,边缘不清,压痛。查WBC $9.7 \times 10^9/L$,N70.3%。最有可能的诊断是

- A、 人工流产不全
- B、 流产后右附件炎
- C、 右输卵管妊娠破裂
- D、 宫颈粘连
- E、 急性阑尾炎

答案: C

188、患者,女,26岁。腹泻伴果酱色粪便3个月就诊。粪便细菌培养(-),纤维结肠镜检查见直肠及乙状结肠和部分降结肠充血水肿明显,质脆易出血,黏膜活检见隐窝脓肿。首选治疗是

- A、 诺氟沙星
- B、 地芬诺酯
- C、 西咪替丁
- D、 肾上腺皮质激素
- E、 水杨酸偶氮磺胺吡啶(SASP)

答案: E

189、患者,女,44岁,既往喜饮酒,每餐饮酒约2两,因体检发现肝功能异常而戒酒2日,2日后因大量出汗、血压升高伴有恶心来诊,该患者的表现属于

- A、 单纯性戒断反应
- B、 酒精性幻觉反应
- C、 戒断性惊厥反应
- D、 戒断性共济失调反应
- E、 震颤谵妄反应

答案: A

190、患者,女,27岁,风湿性心脏病二尖瓣狭窄、心房颤动。超声显示左房增大,二尖瓣瓣膜轻度肥厚,瓣口面积 1.0cm^2 。心脏听诊不应该听到

- A、 第一心音亢进
- B、 开瓣音
- C、 肺动脉瓣区收缩期杂音
- D、 三尖瓣区收缩期吹风样杂音
- E、 心尖部有收缩期前增强的杂音

答案: E

191、患者,男,68岁。2年前开始出现尿频,夜间明显,随后出现排尿费力,逐渐加重。近半年来尿频明显,并有尿急,排尿痛,肉眼血尿,有时有尿流中断现象。应首先考虑为

- A、膀胱肿瘤
- B、尿道狭窄合并肾结核
- C、前列腺增生
- D、慢性细菌性膀胱炎合并膀胱结石
- E、前列腺增生合并膀胱结石

答案: E

192、患者,女,24岁,近1个月乏力,食欲减退,近半个月出现右侧胸部胀痛。胸水常规示比重1.018,蛋白35g/L, Rivalta(+), 细胞数 $300/\mu\text{l}$, L72%。胸片如图




。诊断应首先考虑

- A、 癌性胸腔积液
- B、 漏出性胸腔积液
- C、 化脓性胸膜炎
- D、 SLE 所致胸腔积液
- E、 结核性胸腔积液

答案： E

193、患者,男,58岁,急性心肌梗死2周,近3天反复晕厥3次,心电图如图



,该患

治疗方案首选

- A、 尽早行 PTCA 支架术
- B、 大量扩冠药基础上观察
- C、 大剂量异丙肾上腺素静点
- D、 心脏临时起搏器植入
- E、 阿托品口服

答案： D

194、患者女,35岁,公司职员。诊断为广泛性焦虑症,近3月规律服用帕罗西汀治疗,病情逐渐缓解。患者害怕药物有副反应,想停药。医师建议其进一步的治疗方案正确的是

- A、 考虑患者病情逐渐好转,可停药后观察,继续心理治疗
- B、 患者应继续巩固治疗至少2~6月,维持治疗至少12个月
- C、 患者应维持治疗6~12个月,病情好转就可停药
- D、 焦虑症主要的治疗为认知行为治疗,服药时间过长则增加患者心理负担,加重焦虑情绪,减药要慎重,减药需在一周内缓慢减药
- E、 广泛性焦虑障碍主要与患者的心理素质、精神疾病知识欠缺和过分要求完美有关。故应主要进行健康教育,服药容易引起患者心理依赖

答案： B

195、患者,男,56岁,反复发作气喘3年,近2日感冒后咳嗽,气急,两肺闻及哮鸣及湿啰音。下述治疗对缓解目前病情没有帮助的是

- A、 静脉滴注先锋霉素VI
- B、 静脉滴注硫酸镁
- C、 口服溴己新
- D、 吸入色甘酸钠

E、 静脉注入氨茶碱

答案： D

196、男性, 50 岁, 焦虑障碍患者。若患者出现说话含糊不清, 站立不稳, 查体: 共济失调, 眼球震颤, 精神状况检查患者表现情绪不稳, 且有冲动攻击行为。首先考虑的诊断是

A、 酒精中毒

B、 酒精戒断

C、 镇静催眠药中毒

D、 镇静催眠药戒断

E、 合并躯体疾病

答案： C

197、患者, 男, 20 岁。夜间骑自行车, 头朝下跌于壕沟, 发生四肢不全瘫。X 线片显示齿状突骨折伴半脱位。此时在治疗上最先采取的措施是

A、 石膏围领固定

B、 切开复位内固定

C、 吊带牵引

D、 寰枕固定术

E、 颅骨牵引固定

答案： E

198、患者, 男, 30 岁。发热 4 天, 肛门右侧胀痛, 排便时疼痛加剧。检查: 肛门右旁红肿, 指压痕(+)。最恰当的处理是

A、 静点抗生素

B、 减少活动, 卧床休息

C、 坐浴热敷

D、 止痛

E、 穿刺有脓切开引流

答案： E

199、患者, 女, 25 岁, 产后 3 周, 左乳房胀痛, 皮温高, 伴高热, 查左乳房外上象限压痛, 有波动感, 该患者诊断首先考虑

A、 乳腺纤维腺瘤

B、 乳腺癌

C、 乳房脓肿

D、 乳腺囊性增生症

E、 乳腺结核

答案： C

200、一孕妇,停经 36 周,1 个月前血压正常,近 1 周出现下肢水肿,伴头晕眼花,视力模糊。查体:BP21.3/14.6kPa(160/110mmHg),尿蛋白(++),尿雌三醇 10mg/24h,胎心良。下列产科处理,正确的是

- A、立即剖宫产
- B、积极治疗 1 周,考虑终止妊娠
- C、积极治疗 24~48 小时,上述症状缓解,考虑终止妊娠
- D、积极治疗,等待自然分娩
- E、立即人工破膜及静滴催产素引产

答案: C

201、患者,男,47 岁,因腹痛、腹胀伴呕吐 3 天入院。患者有口渴、乏力。检查:脉搏 126 次/分,血压 86/58mmHg,皮肤弹性减退,眼窝凹陷,血钠 125mmol/L,尿量减少不明显,尿比重 1.005,尿钠降低。下列最可能的诊断是

- A、高渗性脱水
- B、等渗性脱水
- C、低渗性脱水
- D、水中毒
- E、低钾血症

答案: C

202、3 岁小儿突然高热伴咳嗽 5 天,经红霉素治疗无效,体温仍高,烦躁不安,呼吸 52 次/min,心率 160 次/min,胸片示有圆形密度增高阴影,伴液气胸。本例应立即给予何种治疗

- A、退热药
- B、镇静药
- C、胸腔穿刺引流
- D、强心剂
- E、利尿剂

答案: C

203、患者上腹部疼痛 10 小时后转移至右下腹痛,恶心不吐;4 天后发现右下腹有一界限不清,不活动、压痛性包块,发热 38℃,WBC 14×10^9 /L。最恰当的处理是

- A、抗感染治疗
- B、手术腹部引流
- C、纤维结肠镜检查
- D、作钡剂灌肠检查
- E、剖腹探查包块切除

答案: A

204、患者,女,72岁,主因眩晕、努嘴、半身不自主运动一天就诊。诊断为间脑出血并发症手足徐动舞蹈样半身舞蹈症。出血位置可能位于

- A、背侧丘脑
- B、底丘脑
- C、上丘脑
- D、下丘脑
- E、后丘脑

答案: B

205、7天新生儿,母乳喂养,吃奶正常。TBil 153 $\mu\text{mol/L}$,应采取什么治疗

- A、光照疗法
- B、换血疗法
- C、肾上腺皮质激素
- D、苯巴比妥钠
- E、不需治疗

答案: E

206、卵巢癌患者术后病理报告提示:大网膜、肠系膜及肝表面、横膈表面均有癌转移,最大直径为1.5cm,余未见转移。该患者分期应

- A、IIIb期
- B、IIIa期
- C、IIIc期
- D、IIc期
- E、IV期

答案: C

207、上消化道出血患者,呕血约1500ml,给予输全血,30分钟后呼吸困难,腰背酸痛、头痛、呕吐,排出少许淡酱油色尿。查体:血压80/65mmHg,脉搏121次/min,组织出血点,双肾区轻度叩痛。化验检查:血浆游离血红蛋白30mg%。最可能的原因是

- A、发热反应
- B、过敏反应
- C、溶血反应
- D、出血倾向
- E、细菌污染反应

答案: D

208、患儿,男,8岁。自幼口唇及指趾青紫,活动耐力差,喜蹲位休息,体检:身材矮小,心前区隆起,心率100次/分,胸骨左缘第三肋间隙有III级喷射性杂音,P₂

减弱,杵状指趾,甲床青紫。入院当日下午,于哭啼后突然昏厥,抽搐。主管医生体检后,立即注射吗啡,患儿抽搐停止,医生给予上述处理最可靠的依据是

- A、 克氏征阳性
- B、 巴宾斯基征氏阳性
- C、 P_2 减弱
- D、 胸骨左缘杂音消失
- E、 心率 >180 次/分

答案: D

209、胎儿娩出后阴道流血量多,约 200ml,色鲜红,持续性,子宫收缩好。最恰当的处理是

- A、 按摩子宫
- B、 娩出胎盘,检查软产道
- C、 输血
- D、 肌注缩宫素
- E、 注射抗生素

答案: B

210、某新生儿孕 36 周,因羊膜早破分娩,生后第 2 天出现黄疸,并进行性加重,四肢及口周发绀,不吃奶,体温不升, WBC $16 \times 10^9/L$, 母亲 O 型血, 患儿 AB 型血, 血清胆红素 $256 \mu mol/L$ (15mg/dl)。最可能的诊断是

- A、 新生儿 ABO 溶血病
- B、 新生儿肺炎
- C、 新生儿核黄疸
- D、 新生儿颅内出血
- E、 新生儿败血症

答案: E

211、患者,女,62 岁,农民。右前臂结节、溃疡、淋巴结肿大 2 个月余,有木刺刺伤史,当地医院给予头孢他啶及局部换药治疗,症状无缓解。取皮肤组织进行真菌培养,菌落灰褐色皱膜状,显微镜下可见有隔菌丝及梨状小分生孢子,口服碘化钾治疗后症状缓解。该患者最可能感染的真菌是

- A、 红色毛癣菌
- B、 白假丝酵母菌
- C、 申克孢子丝菌
- D、 新型隐球菌
- E、 烟曲霉

答案: C

212、患者,男,60岁,行二尖瓣人工瓣膜置换术,术中鼻咽温 27.2℃,灌注流量 2.6L/(min·m²),平均动脉压 90mmHg,混合静脉氧饱和度 78%,此时应采取的措施

- A、降低流量
- B、提高流量
- C、加深麻醉
- D、增加气体流量
- E、维持不变

答案: C

213、患者,女,16岁,学生,活动后心悸气短 3~4 年,不能参加体育课,听诊胸骨左缘 2~3 肋间可以听到 3/6 级收缩期杂音,呈吹风样,P₂亢进分裂,心电图不完全右束支阻滞,右室大,X 光片肺血多,右房右室大,拟入院手术治疗。门诊初步诊断是

- A、动脉导管未闭
- B、室间隔缺损
- C、房间隔缺损
- D、法鲁氏三联症
- E、肺动脉瓣狭窄

答案: C

214、患者,男,28岁,左小腿被汽车压伤,具备下列哪项可诊断为骨折

- A、局部高度肿胀和淤斑
- B、疼痛与压痛明显
- C、下肢不能主动活动
- D、反常活动
- E、明显跛行

答案: D

215、患儿,女,8岁,因黄疸、贫血、脾大入院。实验室检查:红细胞半衰期 15 天,红细胞渗透脆性试验异常,提示渗透性脆性升高。最有可能的诊断是

- A、遗传性球形红细胞增多症
- B、阵发性睡眠性血红蛋白尿症
- C、丙酮酸激酶缺乏症
- D、珠蛋白生成障碍性贫血
- E、自身免疫性溶血性贫血

答案: A

216、患者,女,63岁,间歇无痛全程肉眼血尿1个月。查体:左肾下极可及,B超提示左肾占位病变,IVP肾盂肾盏受压,尿细胞学(-),膀胱镜检查可见左输尿管口喷血,最可能诊断的疾病是

- A、左肾癌
- B、左肾结石
- C、左肾盂肿瘤
- D、左肾母细胞瘤
- E、左肾囊肿

答案: A

217、患者,男,64岁。排尿不畅1年余。直肠指检:前列腺增大,表面光滑,按压前列腺,无明显压痛。该患者最可能的诊断是

- A、正常前列腺
- B、前列腺肥大
- C、前列腺癌
- D、急性前列腺炎
- E、慢性前列腺炎

答案: B

218、患者,男,20岁。发作性肢体抽搐2个月余,表现为左手拇指抽动,以后发展到整个手部、前臂,但其中有一次抽动发展到肩部时,即有意识障碍伴全身抽搐,小便失禁,2~3分钟后停止。此患者是

- A、强直-阵挛性发作
- B、精神运动性发作
- C、局限性运动发作
- D、局限性发作持续状态
- E、部分继发全面性发作

答案: E

219、患者,女,45岁,无症状肉眼血尿2周,膀胱镜检查发现膀胱左侧壁有一1.0cm×1.2cm之菜花状肿瘤,蒂看不清,肿瘤周围之膀胱黏膜充血,最佳治疗方法应是

- A、腔内化疗
- B、放射治疗+免疫治疗
- C、膀胱肿瘤电灼或激光治疗
- D、膀胱部分切除
- E、膀胱全切除术

答案: D

220、足月新生儿,产钳助产,羊水混浊,出生时无呼吸。心率 96 次/分,躯干红,四肢青紫,四肢略屈曲,弹足底无反应, Apgar 评分应为

- A、 2 分
- B、 3 分
- C、 4 分
- D、 5 分
- E、 6 分

答案: B

221、患者,男,40 岁,农场工人。主诉全身无力,每日体温规律性升高再降低,夜里盗汗。取患者外周血,培养两周后发现革兰阴性小杆菌。该患者感染的病原体最有可能的是

- A、 羊布鲁氏菌
- B、 空肠弯曲菌
- C、 大肠埃希菌
- D、 肠炎沙门菌
- E、 痢疾志贺菌

答案: A

222、患者,男,19 岁,感冒发热 1 周,耳部疼痛,发闷,听力下降。大夫欲行鼓膜检查。检查该患者外耳道和鼓膜时,应将耳郭拉向

- A、 后上方
- B、 前上方
- C、 后下方
- D、 前下方
- E、 后方

答案: A

223、患者,女,22 岁。受凉后出现咽痛、发热 1 周。查体示咽充血,扁桃体 II 度肿大。医生建议查血清抗“O”抗体,其检测结果增高的临床意义,下列哪项是错误的

- A、 近期 A 群溶血性链球菌感染及链球菌感染相关疾病
- B、 抗体由高滴度逐步下降时,可认为疾病好转
- C、 抗体滴度恒定在高水平时,多为相关疾病的活动期
- D、 特异性高,无假阳性
- E、 假阴性可见于金葡菌感染或铜绿假单胞菌感染时

答案: D

224、男, 32 岁, 近 3 月上床后近 2 小时方能入睡, 每周 3~4 次, 只能睡眠 2~4 小时, 晨起后感觉疲乏, 精神不振, 对睡眠质量要求高, 担心病情加重。出现心情不好, 焦虑, 烦躁。最可能的诊断为

- A、 神经衰弱
- B、 失眠症
- C、 嗜睡症
- D、 睡眠-觉醒节律障碍
- E、 焦虑症

答案: B

225、患者, 女, 28 岁。因急性肠梗阻 12 小时入院。患者全身乏力, 口渴。查体: 脉搏 104 次/min, 血压 96/63mmHg, 皮肤弹性减退, 眼窝凹陷, 体重减轻。实验室检查: 血钠 142mmol/L, 尿比重升高。下列最可能的诊断是

- A、 高渗性脱水
- B、 盐中毒
- C、 低渗性脱水
- D、 水中毒
- E、 等渗性脱水

答案: E

226、患者, 男, 52 岁。幼年有麻疹病史, 常伴有脓痰和少量咯血。曾经支气管造影检查证实右下叶后基底段及内侧段支气管扩张。近 4~5 年来症状加重, 伴气急。1 个月前肺功能测定 FEV₁ 占肺活量 38%。近 2 天来咯血不止, 24 小时总量超过 600ml。治疗措施不合适的是

- A、 预防窒息
- B、 支气管镜局部用药或球囊压迫止血
- C、 选择性支气管动脉栓塞
- D、 手术治疗
- E、 氧疗

答案: D

227、患者, 女, 26 岁, 反复晕厥 4 天, 无二便失禁, 偶有胸痛, 既往口服避孕药 2 年。查体: 脉搏 100 次/min, 血压 95/60mmHg, 双肺呼吸音清, 律齐, 心电图示 V₁~V₆ 的 T 波倒置, D-二聚体明显升高。最可能的诊断是

- A、 急性非 ST 段抬高性心肌梗死
- B、 脑血管性晕厥
- C、 急性肺血栓栓塞症
- D、 心绞痛
- E、 胸膜炎

答案： C

228、患儿,男,7岁。因水肿伴尿少,血尿3天入院,查体:烦躁,气促,心率120次/分,呼吸36次/分,可及少量湿啰音,颜面及下肢明显水肿,尿常规:RBC 30~40个/HP。目前应采取措施是

- A、 镇静剂
- B、 甘露醇
- C、 止血剂
- D、 洋地黄药物
- E、 呋塞米

答案： E

229、患儿,男,5岁。双眼睑水肿1周伴少尿。查体:RR 28次/分,BP 90/60mmHg,HR 110次/分,律齐,双下肢凹陷性水肿,阴囊水肿,尿常规蛋白500mg/dl,RBC 3~5个/HP。最先考虑的治疗是

- A、 口服糖皮质激素
- B、 肌注或静脉推注呋塞米,改善水肿
- C、 静滴糖皮质激素
- D、 先给予低分子右旋糖酐再予呋塞米
- E、 给予ACEI降蛋白

答案： D

230、患儿,女,5岁,在当地一家快餐店参加生日聚会。约48小时后,她出现发热,剧烈腹痛伴血便,次日因为持续腹痛腹泻、少尿到急诊科就诊。最有可能导致该患儿患病的病原体是

- A、 肠出血性大肠杆菌
- B、 伤寒沙门菌
- C、 肠致病型大肠埃希菌
- D、 葡萄球菌
- E、 志贺菌

答案： A

231、患儿3岁,法洛四联症拟行矫治术。术前心功能3级,术前为预防发生发绀性缺氧危象,下列不正确的是

- A、 普萘洛尔能防止漏斗部痉挛
- B、 普萘洛尔治疗后诱导更平稳
- C、 入手术室后发生危象,可给美托洛尔0.5~1mg
- D、 普萘洛尔应在术前24小时停药
- E、 普萘洛尔治疗后,诱导时易引起心脏停搏

答案： B

232、尿路急性梗阻早期,由于肾盂内压增高,肾内“安全阀”开放,可起到保护肾组织的作用。下列哪项没有保护肾组织的作用

- A、 膀胱输尿管反流
- B、 肾盂静脉反流
- C、 肾盂肾窦反流
- D、 肾盂淋巴反流
- E、 肾盂肾小管反流

答案： A

233、患者,男,32岁。患风湿性关节炎4年,因受凉感冒,医生为该患者开处方醋酸泼尼松片+阿司匹林片,该处方最易引起的不良反应为

- A、 诱发、加重溃疡
- B、 诱发、加重感染
- C、 糖尿病
- D、 骨质疏松
- E、 高血压

答案： A

234、患者,男,30岁。烦渴、多饮、多尿2个月。尿量每天8000ml,禁饮水7小时血渗透压305mOsm/(kg·H₂O),尿量110ml/h,尿渗透压205mOsm/(kg·H₂O),尿比重1.006。皮下注射垂体后叶素3mg后,第2小时尿量25ml,尿渗透压480mOsm/(),尿比重1.012。目前的诊断考虑

- A、 抗利尿激素分泌不适当综合征
- B、 完全性中枢性尿崩症
- C、 部分性中枢性尿崩症
- D、 肾性尿崩症
- E、 精神性多饮

答案 B

答案：

235、患者,女,28岁,因劳力性心慌气急5年,近3个月加重来诊。查体:T 36.8℃,P 108次/min,R 28次/min,唇甲轻度发绀,心尖区可听到隆隆样舒张期杂音。该患者最可能的诊断是

- A、 冠状动脉粥样硬化性心脏病
- B、 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
- C、 肥厚性梗阻性心肌病
- D、 高血压心脏病

E、 缩窄性心包炎

答案： B

236、 患儿, 女, 4 岁, 晨起后腹泻, 今日共排水样大便 7 次。查: 嗜睡、精神萎靡不振, 眼窝下陷, 口舌干燥, 皮肤弹性差。根据病史, 该患者可能出现下列哪种酸碱失衡

A、 代谢性酸中毒

B、 代谢性碱中毒

C、 呼吸性酸中毒

D、 呼吸性碱中毒

E、 代谢性酸中毒合并代谢性碱中毒

答案： A

237、 患儿, 男, 13 岁, 因发热、咽痛就诊。体温 39.5℃, 咽部红肿, 诊断为上呼吸道感染, 给予对乙酰氨基酚片降体温, 此药的半衰期为 4 小时, 静脉注射给药后约经多长时间血药浓度可降至初始浓度的 5%以下

A、 4 小时

B、 8 小时

C、 20 小时

D、 24 小时

E、 40 小时

答案： C

238、 经产妇, 30 岁, 前两次妊娠均合并妊娠期高血压疾病, 娩出胎儿均超过 4000g, 并且均于分娩后不久死亡。现妊娠 30 周, 又出现下肢水肿和蛋白尿。本例应首先考虑母亲患有

A、 妊娠期高血压疾病

B、 妊娠合并慢性肾炎

C、 妊娠合并糖尿病

D、 慢性肾炎

E、 原发高血压合并妊娠

答案： C

239、 患者, 男, 26 岁。咳嗽、高热 3 天, 1 周前有淋浴受凉史。自述咳痰为铁锈色, 可能是哪种细菌感染

A、 肺炎链球菌

B、 乙型溶血性链球菌


C、 肺炎克雷伯菌

D、 铜绿假单胞菌

E、金黄色葡萄球菌

答案： A

240、心电图所示,可诊断为



- A、 窦性心动过速
- B、 阵发性室上性心动过速
- C、 室性心动过速
- D、 阵发性室上性心动过速伴室内差异性传导
- E、 心房颤动

答案： C

241、患者,男,48岁,因饱餐后突发上腹部剧痛2小时急诊入院。腹部X片示膈下半月形游离气体。该患者入院时可能的体位是

- A、 被动体位
- B、 辗转体位
- C、 强迫侧卧位
- D、 强迫仰卧位
- E、 强迫俯卧位

答案： D

242、患者因急性肠梗阻开腹探查证实为降结肠癌,且近端肠管扩张充血水肿严重,充满干便块,下列各种术式不合理的是

- A、 横结肠造瘘,二期肠切除吻合
- B、 左半结肠切除,一期吻合术
- C、 肿瘤不能切除时行横结肠乙状结肠吻合术
- D、 局部肠段切除后近端肠造瘘

E、盲肠造瘘,二期左半结肠切除

答案: B

243、患儿,女,10岁,郊游时误食毒蘑菇,随后尿液出现蛋白,该患者属于哪种类型的病变

A、肾前性急性肾功能损伤

B、肾性急性肾功能损伤

C、肾后性急性肾功能损伤

D、肾小球滤过膜损伤

E、肾小管阻塞

答案: B

244、患者,女,42岁。阴道不规则流血2个月余,阴道分泌物脓血性,有臭味。阴道内触及鸡蛋大小实质性肿块,其周围均有宫颈包绕,子宫正常大。本例的诊断应是

A、癌

B、宫颈腺囊肿

C、宫颈巨大息肉

D、子宫内膜癌

E、子宫黏膜下肌瘤

答案: C

245、患者,女,25岁,近2年反复出现尿频,尿急,伴右腰阵发性剧痛,且放射至下腹部。近1个月两次排全程血尿,四环素治疗未能根治,尿涂片发现革兰氏阴性杆菌。为明确诊断,哪项检查最有意义

A、尿高渗培养

B、肌酐清除率测定

C、膀胱镜检

D、静脉肾盂造影

E、尿结核菌培养

答案: D

246、患者,男,25岁。腹痛腹胀4小时,其间呕吐数次,经药物治疗后缓解。次日腹胀逐渐加重,全身乏力。查体:腹部隆起,腹软,无压痛和反跳痛,无移动性浊音,肠鸣音减弱。ECG示T波低平。下列最可能的诊断是

A、低钙血症

B、低钠血症

C、低镁血症

D、低钾血症

E、低磷血症

答案： D

247、患儿,男,10岁。无明显诱因出现头晕、疲乏、双颈肿物,全身皮肤散在出血点,入院后骨髓细胞学检查示“急性淋巴细胞性白血病”,应用联合化疗方案治疗缓解,继续给予甲氨蝶呤 MTX 和 6MP 等维持治疗。甲氨蝶呤为叶酸类似物,可抑制二氢叶酸还原酶活性,减少四氢叶酸的生成,干扰一碳单位代谢,从而抑制核苷酸的合成和细胞增殖。甲氨蝶呤的这种抑制属于

- A、竞争性抑制作用
- B、非竞争性抑制作用
- C、反竞争性抑制作用
- D、反馈抑制作用
- E、不可逆抑制作用

答案： A

248、患者,女,30岁,血压持续升高,经常为 23.9~25.3/14.6~16.0kPa(),已1年余,除诉头昏、头痛等症状外,并感四肢无力,有麻木感,尿量增多。下述可作为诊断原发性醛固酮增多症的主要依据的是

- A、无高血压家族史
- B、腹部可闻及血管杂音
- C、尿 VMA 24 小时值明显增高
- D、伴顽固性低血钾
- E、血糖增高

答案 D

答案：

249、患者,女,32岁。哺乳期。乳房胀痛,无红肿,体温 37.9℃。患侧腋窝淋巴结肿大、压痛。可能的诊断是

- A、乳腺纤维腺瘤
- B、乳腺癌
- C、乳腺囊性增生病
- D、急性乳腺炎
- E、乳腺结核

答案： D

250、患者,女,28岁,因双手指关节疼痛2年入院,偶伴肘、肩关节疼痛。化验:尿蛋白++++,红细胞+,血红蛋白 100g/L,白细胞 $3.5 \times 10^9/L$,血小板 $800 \times 10^9/L$,C3 0.55mg/L,最可能的诊断是

- A、系统性红斑狼疮

- B、 类风湿性关节炎
- C、 原发性肾病综合征
- D、 骨关节炎
- E、 过敏性紫癜

答案： A

251、在一次饮酒聚会活动中,小王共饮用了 2000ml52%vol 白酒,出现了痛哭流涕、头晕、精神暴躁等症状,请问以下说法正确的是

- A、 酒精可以解除人体的自我压迫,小王现在是“真情流露”
- B、 小王已经到了酒精性肝硬化的阶段
- C、 小王出现了急性酒精中毒
- D、 小王出现了酒精性脂肪肝
- E、 小王出现了酒精性肝纤维化

答案： C

252、患者,男,44岁,上腹部疼痛急诊入院,超声显示胆囊多发结石,此时患者止痛应选用

- A、 可待因+美沙酮
- B、 哌替啶+阿托品
- C、 吗啡+纳洛酮
- D、 二氢埃托啡+吗啡
- E、 阿司匹林+哌替啶

答案： B

253、患者,女,68岁。近4年来,每年冬季咳嗽、咳白色黏痰,伴气喘。近1周症状加重,无发热。此患者可能出现的异常体征

- A、 支气管呼吸音
- B、 支气管肺泡呼吸音
- C、 支气管呼吸音+湿啰音
- D、 哮鸣音
- E、 语音震颤增强

答案： C

254、青年男患诊断布鲁菌病,应用利福平治疗后过敏,应用何种药物治疗

- A、 多西环素
- B、 复方新诺明
- C、 多西环素联合复方新诺明
- D、 头孢菌素联合青霉素
- E、 喹诺酮类药物

答案： C

255、患者,女,27岁。停经50天,腹痛、阴道流血3小时就诊。既往有2次自然流产史。该患者最应进行以下哪项检测

- A、血小板计数
- B、血小板功能
- C、凝血因子活性测定
- D、凝血酶原时间测定
- E、抗心磷脂抗体测定

答案: E

256、患者,女,56岁,因盆腔肿瘤切除术后12小时出现少尿(17ml/h)。血尿素氮15mmol/L,肌酐 $178\mu\text{mol/L}$,尿比重1.025,尿钠13mmol/L。尿量减少最可能的原因是

- A、肾后性急性肾衰竭
- B、急性肾小管坏死
- C、慢性肾衰竭
- D、肾前性急性肾衰竭
- E、急性间质性肾炎

答案: D

257、患者突发心悸,心电图示心率160次/分,QRS波时间0.10秒,未见P波,R-R绝对不齐。最可能为

- A、房室交界性逸搏心率
- B、阵发性室上性心动过速
- C、阵发性室性心动过速
- D、窦性心动过速
- E、心房纤颤

答案: E

258、患者,男,19岁。患慢性粒细胞白血病3年余。曾用白消安治疗,近1年停用。现高热,骨关节剧烈疼痛入院。骨髓检查原粒细胞占0.52。除积极化疗外,对该患疼痛的处理,你认为最为合适的是

- A、耐心说服不用任何止痛药
- B、尽量限制止痛药的应用
- C、适当应用止痛药
- D、不用吗啡类镇痛剂,避免成瘾
- E、单纯应用镇静剂

答案: C

259、患者,男,56岁。曾患乙型病毒性肝炎。半年前开始反复出现腹胀、食欲缺乏,查体手掌大小鱼际处发红,颈部可见一血管痣。患者该体征的形成原因可能是

- A、雄激素减少
- B、醛固酮增多
- C、抗利尿激素分泌增多
- D、雄激素的灭活减少
- E、雌激素增多

答案: E

260、患者,女,31岁,胃部分切除术后十二指肠残端瘘3周,目前食欲不佳,全身乏力,精神差,起立时有晕倒。体查:脉搏96次/分,血压78/62mmHg。化验:血钠124mmol/L,血钾3.2mmol/L。下列最可能的水、电解质紊乱是

- A、低渗性脱水,高钾血症
- B、低渗性脱水,低钾血症
- C、等渗性脱水,低钾血症
- D、等渗性脱水,高钾血症
- E、高渗性脱水,低钾血症

答案: B

261、患者,女,19岁,已婚,因尚未来月经收入院治疗。体型、容貌女性型,乳房发育正常,外阴未见异常,肛查触及子宫,双侧附件区未见异常。曾行黄体酮治疗,无撤药性出血,雌孕激素序贯治疗也未引起子宫出血。本病发病应在

- A、下丘脑
- B、垂体
- C、肾上腺
- D、卵巢
- E、子宫

答案: E

262、患者,男,30岁,右下腹持续疼痛,伴发热1天。查体见全腹紧张,右下腹压痛明显,且有反跳痛,肠鸣音弱,初步诊断为腹部器官病变伴发急性腹膜炎,请问,可能发生病变的器官是

- A、膀胱
- B、输尿管结石
- C、阑尾
- D、肾
- E、直肠

答案: C

263、患者,女,36岁。劳力性心累气短半月,既往关节肿痛史。超声提示二尖瓣重度粘连,未见钙化,开放受限。查体:血压110/75mmHg,脉搏85次/分,心率145次/分,心律不齐,心音强弱不等。如触及震颤,则应为

- A、胸骨左缘第2肋间收缩期震颤
- B、胸骨右缘第2肋间收缩期震颤
- C、胸骨左缘第3、4肋间收缩期震颤
- D、心尖收缩期震颤
- E、心尖舒张期震颤

答案: E

264、患儿,9个月,身高80cm,体重15kg,每天户外活动2小时,近日出现多汗、烦躁、夜惊,查体:枕秃,轻度肋缘外翻。该患儿患佝偻病的可能原因是

- A、未补钙
- B、未加辅食
- C、生长过速
- D、未补充鱼肝油
- E、患有某些疾病

答案: C

265、患儿,男,5岁。发热伴腹泻5天,胸闷心悸2天,心率52次/分,心律略不齐,ECG示Ⅱ度房室传导阻滞,血清肌钙蛋白T(+),诊断为

- A、感染性心内膜炎
- B、风湿性心脏病
- C、病毒性心肌炎
- D、中毒性心肌炎
- E、心肌病

答案: C

266、患者,女,52岁。绝经6年后出现阴道流血半月。查体:右附件区扪及胎儿头大小实性肿物,阴道脱落细胞检查示雌激素高度影响,子宫内膜活检为单纯性增生。本例最可能的诊断是

- A、纤维瘤
- B、浆液性囊腺瘤
- C、良性畸胎瘤
- D、黏液性囊腺瘤
- E、卵泡膜细胞瘤

答案: E

267、患者,男,60岁,因双髋关节反复疼痛2年多,无明显外伤史,行X线摄片如图示,最可能的诊断是



- A、双髋关节退行性骨关节病
- B、双髋关节创伤性关节炎
- C、双髋关节特发性骨关节病
- D、双髋关节结核
- E、双髋关节化脓性关节炎

答案: A

268、患者,女,33岁,宫颈癌 I a1 手术范围应是

- A、全子宫全切术
- B、激光
- C、宫颈锥切术
- D、子宫根治术
- E、子宫根治术+双卵巢切除

答案: A

269、患者,女,26岁。停经5个月,阴道少量出血10天。今晨突然腹痛剧烈伴肛坠,恶心,血压60/40mmHg,下腹有明显压痛及反跳痛,并有移动性浊音,宫颈举痛(+),后穹隆穿刺抽出5ml暗红色不凝血。应选择下列哪项处理

- A、扩容
- B、输血
- C、给血管活性药物

- D、 立即手术
- E、 边抗休克, 边开腹手术

答案: E

270、患者, 女, 58 岁。外阴瘙痒 2 年, 检查见外阴皮肤粗糙污秽, 阴道口见豆渣样分泌物。以下最有助于明确诊断的病史为

- A、 滴虫感染史
- B、 糖尿病史
- C、 药物过敏史
- D、 高血压病史
- E、 白塞氏病史

答案: B

271、含 4 个裂殖子的是

- A、 卵囊
- B、 滋养体
- C、 I 型裂殖体
- D、 II 型裂殖体
- E、 配子体

答案: D

272、有性生殖阶段形成

- A、 卵囊
- B、 滋养体
- C、 I 型裂殖体
- D、 II 型裂殖体
- E、 配子体

答案: E

273、具有感染性的是

- A、 卵囊
- B、 滋养体
- C、 I 型裂殖体
- D、 II 型裂殖体
- E、 配子体

答案: A

274、滋养体经过 3 次核分裂发育成为

- A、 卵囊

- B、 滋养体
- C、 I 型裂殖体
- D、 II 型裂殖体
- E、 配子体

答案： C

275、含 8 个小核的是

- A、 卵囊
- B、 滋养体
- C、 I 型裂殖体
- D、 II 型裂殖体
- E、 配子体

答案： B

276、属于未成熟 DC 的是

- A、 隐蔽细胞
- B、 滤泡 DC
- C、 朗格汉斯细胞
- D、 并指状 DC
- E、 浆细胞样 DC

答案： C

277、属于成熟 DC 的是

- A、 隐蔽细胞
- B、 滤泡 DC
- C、 朗格汉斯细胞
- D、 并指状 DC
- E、 浆细胞样 DC

答案： D

278、属于迁移期 DC 的是

- A、 隐蔽细胞
- B、 滤泡 DC
- C、 朗格汉斯细胞
- D、 并指状 DC
- E、 浆细胞样 DC

答案： A

279、不属于经典 DC 的是

- A、 隐蔽细胞
- B、 滤泡 DC
- C、 朗格汉斯细胞
- D、 并指状 DC
- E、 浆细胞样 DC

答案： E

280、不属于 APC 的是

- A、 隐蔽细胞
- B、 滤泡 DC
- C、 朗格汉斯细胞
- D、 并指状 DC
- E、 浆细胞样 DC

答案： B

281、患者,女,25岁,尿频、尿急、尿痛伴腰痛,右肾区有叩痛。尿沉渣可见白细胞管型,中段尿培养大肠杆菌 $>10^5/\text{ml}$ 。该患者可能的诊断是

- A、 肾盂肾炎
- B、 膀胱炎
- C、 尿道炎
- D、 肾小球肾炎
- E、 肾结核

答案： A

282、患者,女,42岁,尿频、尿急、尿痛、下腹痛,膀胱区有压痛。尿沉渣白细胞 >10 个/HP,尿培养为变形杆菌 $10^4/\text{ml}$ 。该患者可能的诊断是

- A、 肾盂肾炎
- B、 膀胱炎
- C、 尿道炎
- D、 肾小球肾炎
- E、 肾结核

答案： B

283、慢性宫颈炎白带呈

- A、 灰黄色泡沫状稀薄白带
- B、 脓性白带
- C、 凝乳块状白带
- D、 灰色均质鱼腥味白带
- E、 血性白带

答案： B

284、滴虫性阴道炎白带呈

- A、 灰黄色泡沫状稀薄白带
- B、 脓性白带
- C、 凝乳块状白带
- D、 灰色均质鱼腥味白带
- E、 血性白带

答案： A

285、外阴阴道假丝酵母菌病白带呈

- A、 灰黄色泡沫状稀薄白带
- B、 脓性白带
- C、 凝乳块状白带
- D、 灰色均质鱼腥味白带
- E、 血性白带

答案： C

286、患者,女,32岁,已婚育。因数次同房后出血,检查发现宫颈重度糜烂,宫颈细胞学和 HPV 检查均未见异常。正确的处理是

- A、 子宫锥形切除术
- B、 宫颈激光治疗
- C、 全子宫切除术
- D、 广泛子宫切除+盆腔淋巴结清扫
- E、 全子宫加双附件加大网膜切除

答案： B

287、患者同前,检查确定为宫颈 CIN3 级,正确的处理方式

- A、 子宫锥形切除术
- B、 宫颈激光治疗
- C、 全子宫切除术
- D、 广泛子宫切除+盆腔淋巴结清扫
- E、 全子宫加双附件加大网膜切除

答案： A

288、上述患者活检疑似局部微小浸润,患者尚有生育要求,正确的处理是

- A、 子宫锥形切除术
- B、 宫颈激光治疗
- C、 全子宫切除术
- D、 广泛子宫切除+盆腔淋巴结清扫
- E、 全子宫加双附件加大网膜切除

答案： A

289、前述患者,经活检确诊为宫颈癌 I B 期,正确的处理是

- A、 子宫锥形切除术
- B、 宫颈激光治疗
- C、 全子宫切除术
- D、 广泛子宫切除+盆腔淋巴结清扫
- E、 全子宫加双附件加大网膜切除

答案： D

290、催乳素瘤最常用的药物是

- A、 溴隐亭
- B、 赛庚啶
- C、 奥曲肽
- D、 生长激素
- E、 醋酸可的松

答案： A

291、垂体性侏儒症最适宜选用

- A、 溴隐亭
- B、 赛庚啶
- C、 奥曲肽
- D、 生长激素
- E、 醋酸可的松

答案： D

292、希恩综合征最常选用的药物是

- A、 溴隐亭
- B、 赛庚啶
- C、 奥曲肽
- D、 生长激素
- E、 醋酸可的松

答案： E

293、GH 瘤可选用

- A、 溴隐亭
- B、 赛庚啶
- C、 奥曲肽
- D、 生长激素

E、 醋酸可的松

答案： C

294、乳母每次泌乳时,分泌浓度先高后低的营养成分是

A、 碳水化合物

B、 脂肪

C、 蛋白质

D、 矿物质

E、 维生素 D

答案： C

295、乳母每次泌乳时,分泌浓度先低后高的营养成分是

A、 碳水化合物

B、 脂肪

C、 蛋白质

D、 矿物质

E、 维生素 D

答案： B

296、母乳中含量低,婴儿需要额外补充的营养素是

A、 碳水化合物

B、 脂肪

C、 蛋白质

D、 矿物质

E、 维生素 D

答案： E

297、麻疹病人应隔离至

A、 出疹后 5 天

B、 出疹后 10 天

C、 发病后 2 周

D、 发病后 10 天

E、 发病后 40 天

答案： A

298、麻疹合并肺炎病人应隔离至

A、 出疹后 5 天

B、 出疹后 10 天

C、 发病后 2 周

D、 发病后 10 天

E、 发病后 40 天

答案： B

299、流行性腮腺炎病人应隔离至

A、 出疹后 5 天

B、 出疹后 10 天

C、 发病后 2 周

D、 发病后 10 天

E、 发病后 40 天

答案： D

300、脊髓灰质炎病人应隔离至

A、 出疹后 5 天

B、 出疹后 10 天

C、 发病后 2 周

D、 发病后 10 天

E、 发病后 40 天

答案： E

1、第二信使二酯酰甘油 DAG 的来源是由

- A、 甘油三酯水解而成
- B、 磷脂酰肌醇-4, 5-二磷酸(PIP_2)水解生成
- C、 卵磷脂水解产生
- D、 在体内合成
- E、 由胆固醇转化而来的

答案： B

2、出现去大脑僵直现象是由于

- A、 切除了大部分脑干网状结构抑制区
- B、 切除了大部分脑干网状结构易化区
- C、 切断了网状结构和皮层运动区及纹状体之间的联系
- D、 切断了网状结构和小脑之间的联系
- E、 切断了网状结构和前庭核之间的联系

答案： C

3、下列关于前列腺检查的内容, 错误的是

- A、 被检查者取肘膝卧位
- B、 检查者以示指进行肛诊, 向背侧触诊
- C、 正常成人前列腺质韧, 有弹性
- D、 前列腺分左、右两叶, 之间可触及正中沟
- E、 前列腺肥大时正中沟消失

答案： B

4、可用于治疗癌症呕吐的药物是

- A、 氯噻嗪
- B、 氯氮平
- C、 氯胺酮
- D、 甲氯芬酯
- E、 氯丙嗪

答案： E

5、B 细胞表面的抗原识别受体是

- A、 CD21
- B、 CD40

- C、 BCR
- D、 CD19
- E、 Ig α /Ig β

答案： C

6、慢性肾衰竭早期尿的变化特征是

- A、 少尿
- B、 多尿、夜尿
- C、 高渗尿
- D、 血尿
- E、 蛋白尿

答案： B

7、关于尺神经正确的是

- A、 发自臂丛外侧束
- B、 支配前臂所有屈肌
- C、 经肱骨下端尺神经沟下行进入前臂
- D、 损伤后不影响拇指的任何功能
- E、 肱骨外侧髁骨折时易受损

答案： C

8、关于气道高反应性 AHR, 不正确的是

- A、 是哮喘发生的重要因素
- B、 是气道炎症的结果
- C、 有家族倾向
- D、 其本质是一种变态反应
- E、 在急性气管-支气管炎中也可见到

答案： D

9、对放疗最敏感的卵巢肿瘤

- A、 颗粒细胞瘤
- B、 纤维瘤
- C、 无性细胞瘤
- D、 内胚窦瘤
- E、 畸胎瘤

答案： C

10、保钠排钾作用最强的肾上腺皮质激素是

- A、 醛固酮

- B、 皮质醇
- C、 皮质酮
- D、 去氧皮质酮
- E、 可的松

答案： A

11、 下列关于肌紧张的叙述, 错误的是

- A、 缓慢持续牵拉肌肉时发生的牵张反射
- B、 是维持躯体姿势的最基本的反射活动
- C、 其感受器为肌梭
- D、 主要是屈肌表现明显
- E、 是多突触反射

答案： D

12、 必须在知情同意过程中告知受试者有权随时退出研究, 这主要是依据

- A、 有利原则
- B、 不伤害原则
- C、 公正原则
- D、 尊重原则
- E、 保护原则

答案： D

13、 继发性肺结核是

- A、 较少见的一个临床类型
- B、 此型不包括干酪样肺炎
- C、 是临床上最常见的一个类型
- D、 此型不会出现咯血
- E、 结核球不是此型的表现

答案： C

14、 关于脊柱的侧面观特征不正确的是

- A、 有 4 个生理性的弯曲
- B、 腰曲和骶曲在胚胎时已形成
- C、 颈曲凸向前
- D、 颈曲支持头的抬起
- E、 胸曲凹向后

答案： B

15、 组成肌腱袖的肌不包括

- A、 肩胛下肌
- B、 冈上肌
- C、 冈下肌
- D、 三角肌
- E、 小圆肌

答案： D

16、以下肺炎易合并脓胸的是

- A、 金黄色葡萄球菌肺炎
- B、 腺病毒肺炎
- C、 支原体肺炎
- D、 衣原体肺炎
- E、 呼吸道合胞病毒肺炎

答案： A

17、肝脏是人体重要的生命器官,多种物质在肝内合成,下述哪种物质不是由肝脏合成的

- A、 白蛋白
- B、 纤维蛋白原
- C、 肌酐
- D、 尿素
- E、 胆固醇

答案： C

18、苯丙酮尿症的临床特点下列错误的是

- A、 智力低下
- B、 脑电图多数异常
- C、 血中酪氨酸升高
- D、 黄褐色毛发
- E、 鼠尿味样尿

答案： C

19、检测细菌能否产生 H_2S 时,应选择的培养基是

- A、 SS 培养基
- B、 庖肉培养基
- C、 罗氏培养基
- D、 双糖铁培养基
- E、 巧克力色培养基

答案： D

20、有关休克患者体位,合理的是

- A、平卧,头转向一侧
- B、平卧,头低位
- C、低半坐位卧式
- D、 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 头高脚低斜坡卧位
- E、下肢抬高 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$,头部和躯干同时抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 左右

答案: E

21、患者延迟就医最常采用的防御机制是

- A、投射
- B、升华
- C、否认
- D、压抑
- E、合理化

答案: C

22、晚期血吸虫病实质上是血吸虫性肝纤维化,可出现黄疸、上消化道出血、肝性脑病、腹水等临床表现,预后较差。晚期血吸虫病与严格意义上的肝硬化相比,最根本的不同点在于

- A、无明显的假小叶形成
- B、无肝功能失代偿
- C、无严重的门静脉高压
- D、无 I 型胶原增生
- E、肝脏质地软

答案: A

23、用 IFN- α 治疗效果显著的是

- A、再生障碍性贫血
- B、类风湿关节炎
- C、毛细胞白血病
- D、多发性硬化症
- E、血小板减少

答案: C

24、以下关于房水及其循环的描述中正确的是

- A、房水为无色透明的液体,无折光作用
- B、房水由虹膜产生,充满眼房内
- C、房水可为角膜和晶状体提供营养
- D、房水循环受阻可降低眼内压

E、房水经瞳孔由眼前房进入后房

答案： C

25、下列有关酮体的描述错误的是

- A、酮体是肝脏输出能源的一种形式
- B、酮体可作为脑和肌肉组织的重要能源
- C、脂肪动员减少时肝内酮体生成增多
- D、酮体是水溶性物质
- E、丙酮可由呼吸道呼出

答案： C

26、开始体外循环转流的标准是

- A、ACT>300s
- B、ACT>380s
- C、ACT>480s
- D、ACT>560s
- E、ACT>600s

答案： C

27、高血压病引起的主要病理改变为

- A、主动脉硬化
- B、周身微血管硬化
- C、小动脉玻璃样变
- D、冠状动脉粥样硬化
- E、主动脉夹层动脉瘤

答案： C

28、病历中下列描述精神疾病主诉错误的是

- A、凭空闻人语 1 年,加重 2 月
- B、出现妄想半年
- C、少语少动 1 月
- D、兴奋与心情差交替发作 5 年,再发心情差 1 月
- E、行为怪异、脾气大半年

答案： B


29、连续性杂音最常发生于

- A、二尖瓣狭窄与关闭不全
- B、主动脉瓣狭窄与关闭不全
- C、肺动脉瓣狭窄与关闭不全

- D、三尖瓣狭窄与关闭不全
- E、动脉导管未闭

答案： E

30、图为休克死亡者,在肺组织切片中可见



- A、混合血栓
- B、红色血栓
- C、透明血栓
- D、白色血栓
- E、附壁血栓

答案： C

31、室性期前收缩之后常出现代偿间歇的原因是

- A、窦房结传来的节律性兴奋落在室性期前兴奋的有效不应期内
- B、窦房结的节律性兴奋少发放一次
- C、窦房结的节律性兴奋延迟发放
- D、室性期前兴奋的有效不应期特别长
- E、窦房结的节律性兴奋传出速度大大减慢

答案： A

32、新生儿硬肿症患儿,体温 32℃,其主要治疗是

- A、纠正酸中毒
- B、应用红霉素
- C、复温
- D、应用东莨菪碱
- E、应用激素

答案： C

33、单纯行胸膜纤维板剥除术,最适用于

- A、急性脓胸渗出期
- B、慢性脓胸的早期
- C、慢性脓胸的后期

- D、慢性脓胸伴有肺病变
- E、脓胸合并支气管胸膜瘘者

答案： B

34、丝虫病引起的淋巴管炎可导致

- A、阴囊湿疹
- B、阴囊水肿
- C、阴囊象皮肿
- D、阴囊疝
- E、鞘膜积液

答案： C

35、高温环境下,预防中暑,下列哪项是不正确的

- A、避免强烈日光长时间直射人体
- B、保持室内通风
- C、减少室外剧烈运动
- D、穿紧身绝缘服装
- E、多饮含盐饮料

答案： D

36、急性药物性肝炎的肝细胞损伤型临床表现类似

- A、病毒性肝炎
- B、脂肪肝
- C、肝纤维化
- D、肝硬化
- E、肝癌

答案： A

37、防治输血时的发热反应中,错误的一项是

- A、用一次性处理输血器
- B、用无热原技术配制保液
- C、口服阿司匹林 1g
- D、苯海拉明 25mg 肌注
- E、异丙嗪 25mg 肌注

答案： D

38、下列哪项不是急性输卵管妊娠破裂的特征

- A、子宫稍大,可有漂浮感
- B、子宫一侧可触及压痛包块

- C、 宫颈举痛明显
- D、 突发腹痛后阴道大量流血
- E、 查体可有移动性浊音

答案： D

39、下列关于酮体的叙述错误的是

- A、 肝脏可以生成酮体,但不能氧化酮体
- B、 酮体是脂肪酸部分氧化分解的中间产物
- C、 合成酮体的起始物质是乙酰 CoA
- D、 酮体包括 β -羟丁酸
- E、 机体仅在病理情况下才产生酮体

答案： E

40、婴儿出现听觉定向反应最早的时间为

- A、 1 个月
- B、 2 个月
- C、 3~4 个月
- D、 5~6 个月
- E、 7 个月

答案： C

41、初产妇临产后 4 小时胎头仍未入盆,此时测量哪一条径线最有价值

- A、 对角径
- B、 出口横径
- C、 后矢状径
- D、 坐骨棘间径
- E、 骶棘韧带宽度

答案： A

42、关于小脑幕切迹疝, 错误的是

- A、 剧烈头痛、喷射性呕吐与进食无关
- B、 病初患侧瞳孔变小、对光反射迟钝
- C、 病变对侧肢体肌力减弱
- D、 可出现生命体征紊乱
- E、 急性脑疝患者必有视神经盘水肿

答案： E

43、关于正常产道下列正确的是

- A、 中骨盆平面横径是最短的横径

- B、 入口平面是横径短而前后径长
- C、 骨盆轴的上段向下向后, 中段向下, 下段向下向前
- D、 骨盆倾斜度正常值为 45°
- E、 出口平面是前后径短而横径长

答案: D

44、菌痢的粪便特点是

- A、 黏液脓血样
- B、 果酱样
- C、 血液与粪质混匀
- D、 黄色或米泔水样
- E、 粪质较多

答案: A

45、不孕伴痛经患者多发生于

- A、 子宫内膜异位症
- B、 多囊卵巢综合征
- C、 卵巢囊肿
- D、 子宫肌瘤
- E、 生殖道结核

答案: A

46、由泛酸组成的辅酶参与

- A、 脱羧反应
- B、 羧化反应
- C、 脱氢反应
- D、 转酰基作用
- E、 转氨基作用

答案: D

47、关于幽门螺杆菌 Hp, 下列最准确的是

- A、 常见于正常胃黏膜
- B、 常侵犯至细胞内
- C、 炎症程度与该菌数量不成比例
- D、 胶体铋 (De-No1) 对此菌无作用
- E、 不直接破坏上皮细胞

答案: E

48、利福平的抗菌机制

- A、 抑制 DNA 螺旋酶
- B、 抑制二氢叶酸还原酶
- C、 抑制 DNA 依赖的 RNA 多聚酶
- D、 抑制细菌分枝菌酸合成
- E、 抑制细菌蛋白质合成

答案： C

49、下列最有助于心源性肝硬化的诊断的是

- A、 腹部移动浊音阳性
- B、 肘静脉压升高
- C、 转氨酶升高
- D、 白/球蛋白比例降低
- E、 心尖区 2/6 级收缩期杂音

答案： B

50、将大肠杆菌的碳源由葡萄糖转变为乳糖时,细菌细胞内不发生

- A、 乳糖转变为半乳糖
- B、 cAMP 浓度升高
- C、 半乳糖与阻遏蛋白结合
- D、 RNA 聚合酶与启动序列结合
- E、 阻遏蛋白与操纵序列结合

答案： E

51、下列哪项不是法洛四联症的主要临床表现

- A、 青紫
- B、 顽固性心力衰竭
- C、 杵状指
- D、 脑缺氧发作
- E、 蹲踞动作

答案： B

52、《医疗事故处理条例》规定,发生重大医疗过失行为的,医疗机构应当向所在地卫生行政部门报告,时限是

- A、 6 小时内
- B、 10 小时内
- C、 12 小时内
- D、 24 小时内
- E、 36 小时内

答案： C

53、对妊娠菌痢患者,宜选用的抗菌药物是

- A、庆大霉素
- B、四环素
- C、头孢曲松
- D、环丙沙星
- E、SMZ-TMP

答案: C

54、胆囊切除时,胆总管探查指征不包括

- A、阻塞性黄疸病史
- B、胆总管直径 1.5cm 以上
- C、术中胆管造影示胆管结石
- D、术中扪到胆管结石
- E、胆囊单发大结石

答案: E

55、儿童中度铅中毒的血铅范围是

- A、50~99μg/L
- B、100~199μg/L
- C、150~199μg/L
- D、200~249μg/L
- E、250~449μg/L

答案: E

56、肝大常见于下列疾病,但除外

- A、肝炎
- B、肝淤血
- C、脂肪肝
- D、早期肝硬化
- E、肺气肿

答案: E

57、最容易引起颅骨侵蚀的颅内肿瘤是

- A、胶质细胞瘤
- B、松果体瘤
- C、神经纤维瘤
- D、血管瘤
- E、脑膜瘤

答案: E

58、人体处于紧急状态下,出现注意力不集中、思维不清晰、回忆能力下降等表现,这属于

- A、 综合性应激反应
- B、 躯体性应激反应
- C、 情绪性应激反应
- D、 认知性应激反应
- E、 行为性应激反应

答案: D

59、情绪可通过哪些系统的生理反应对人体的健康产生影响

- A、 呼吸系统、循环系统和泌尿系统
- B、 神经系统、内分泌系统和免疫系统
- C、 呼吸系统、循环系统和免疫系统
- D、 神经系统、循环系统和泌尿系统
- E、 呼吸系统、内分泌系统和免疫系统

答案: B

60、妄想性障碍的特点是

- A、 起病缓急,以妄想为主要特征,一般不出现人格衰退和智能缺损
- B、 起病缓慢,以妄想为主要特征,一般出现人格衰退和智能缺损
- C、 起病缓慢,以妄想为主要特征,一般不出现人格衰退和智能缺损
- D、 起病缓急,以妄想为主要特征,一般出现人格衰退和智能缺损
- E、 起病缓慢,以幻觉为主要特征,一般不出现人格衰退和智能缺损

答案: C

61、关于预防外科感染,下列叙述哪项不正确

- A、 注意个人卫生,避免创伤
- B、 应用免疫疗法,预防破伤风
- C、 手术时注意无菌术,防止伤口感染
- D、 加强对糖尿病患者的护理
- E、 经常服用中药,预防感染

答案: E

62、下列关于玻璃体的描述中,正确的是

- A、 玻璃体位于虹膜与晶状体之间
- B、 富含血管神经
- C、 玻璃体前面凹陷称玻璃体凹
- D、 玻璃体对视网膜起营养作用
- E、 玻璃体发生混浊时,不影响视力

答案： C

63、过敏性休克治疗首选

- A、 血管收缩药
- B、 血管扩张药
- C、 输液、输血
- D、 盐皮质激素
- E、 心得安

答案： A

64、遗传咨询的原则不包括

- A、 自主原则
- B、 知情同意原则
- C、 倾向性原则
- D、 守密和尊重隐私原则
- E、 公平原则

答案： C

65、男性尿道分为

- A、 前列腺部、膜部、阴茎部
- B、 前列腺部、膜部、尿道球部
- C、 前列腺部、膜部、海绵体部
- D、 前列腺部、膜部、后尿道
- E、 前列腺部、海绵体部

答案： C

66、休克 I 期引起微循环变化的主要因子是

- A、 儿茶酚胺
- B、 心肌抑制因子
- C、 PGI_2
- D、 腺苷
- E、 缓激肽

答案： A

67、细胞膜对 Na^+ 通透性增加时, 静息电位将

- A、 增大
- B、 减小
- C、 不变
- D、 先增大后减小

E、先减小后增大

答案： B

68、新生儿确诊巨细胞病毒肺炎,应选用的药物治疗是

A、阿昔洛韦

B、红霉素

C、氨苄西林

D、更昔洛韦

E、干扰素

答案： D

69、关于正常骨产道,下列叙述正确的是

A、骨盆入口平面前后径比横径大

B、中骨盆平面前后径比横径小

C、骨盆入口平面是骨盆最宽平面

D、中骨盆平面是骨盆最小平面

E、站立时,骨盆入口平面与地面是平行的

答案： D

70、重度主动脉瓣狭窄最常见的临床表现为

A、心绞痛与房室传导阻滞

B、房室传导阻滞与晕厥

C、心绞痛与晕厥

D、快速心律失常和心衰

E、猝死与心源性休克

答案： C

71、导致尿毒症不断恶化最常见的诱因是

A、高蛋白饮食

B、使用抗生素

C、感染

D、心力衰竭

E、高血压

答案： C

72、当上肢上举固定时,可作引体向上活动的肌是

A、斜方肌

B、背阔肌

C、肩胛提肌

- D、 菱形肌
- E、 竖脊肌

答案： B

73、酚妥拉明扩张血管主要是因为

- A、 阻断 NA 能神经末梢突触前膜 α_2 受体
- B、 兴奋血管平滑肌 β_2 受体
- C、 阻断血管平滑肌 M 受体
- D、 阻断血管平滑肌 α_1 受体
- E、 兴奋血管平滑肌 M 受体

答案： D

74、血清钙的正常参考值为

- A、 0.97~1.61mmol/L
- B、 1.29~1.94mmol/L
- C、 2.25~2.75mmol/L
- D、 3.9~5.6mmol/L
- E、 9.0~11.0mmol/L

答案： C

75、诊断肝癌最有意义的肝脏体征是

- A、 肝脏有不同程度压痛
- B、 肝大
- C、 肝脏质地变硬
- D、 肝震颤
- E、 肝表面可听到吹风样血管杂音

答案： E

76、下列疾病中 S₁增强的是

- A、 大面积心肌梗死
- B、 扩张型心肌病
- C、 心肌炎
- D、 二尖瓣狭窄
- E、 大量心包积液

答案： D

77、糖尿病控制不好时可发生生长落后。智能发育延缓,肝大。称为

- A、 Turner 综合征
- B、 Somogyi 现象

C、 Klinefelter 综合征

D、 清晨现象

E、 Mauriac 综合征

答案： E

78、艾滋病的主要传播途径是

A、 经空气、飞沫、尘埃传播

B、 经水、食物、苍蝇传播

C、 经吸血节肢动物传播

D、 经血液、体液、血液制品传播

E、 土壤传播

答案： D

79、下列不属于遗传咨询范畴的是

A、 儿科相关疾病咨询

B、 青春期咨询

C、 婚前咨询

D、 孕前咨询

E、 产前咨询

答案： B

80、特发性全面强直-阵挛发作的首选治疗药物是

A、 丙戊酸钠

B、 卡马西平

C、 苯妥英钠

D、 乙琥胺

E、 苯巴比妥

答案： A

81、感染性发热的确诊需要依靠哪项检查

A、 血常规检查

B、 影像检查

C、 病原体检查

D、 自身抗体检测

E、 活体组织检查

答案： C

82、以下哪种物质不是肝脏糖异生原料

A、 甘油

- B、 乙酰乙酸
- C、 谷氨酸
- D、 丙酮酸
- E、 乳酸

答案： B

83、关于血清学诊断, 错误的是

- A、 是一种用已知抗原检测抗体的免疫学检查方法
- B、 常用于抗原性较强的病原菌感染性疾病的诊断
- C、 是一种以效价为测量单位的半定量试验
- D、 适用于病程短的传染病的诊断
- E、 可用于人群免疫水平的调查

答案： C

84、肺心病发生右室肥大的主要原因是

- A、 肺循环阻力增加
- B、 心肌缺氧
- C、 细菌毒素对心肌的毒性作用
- D、 心律失常
- E、 营养不良

答案： A

85、按血肿引起颅内压增高或早期脑疝所需时间, 急性型颅内血肿的发生时间为

- A、 6 小时内
- B、 12 小时内
- C、 24 小时内
- D、 3 天内
- E、 1 周内

答案： D

86、下列最符合鳞状细胞癌的特征的是

- A、 发生于原有单层扁平上皮的覆盖部位
- B、 呈外生性生长
- C、 癌细胞的排列及形态仍保留单层扁平上皮的某些特征
- D、 癌珠形成
- E、 主要经淋巴道转移

答案： C

87、下列哪项不是羊水栓塞的诱因

- A、前置胎盘
- B、子宫破裂
- C、母子血型不合
- D、胎盘早剥
- E、人工破膜

答案： C

88、不符合假小叶病变特点的描述是

- A、肝细胞索围绕中央静脉呈放射状排列
- B、缺少中央静脉
- C、中央静脉偏位或有 2 个以上
- D、肝细胞排列紊乱
- E、出现汇管区

答案： A

89、肝病时诊断 DIC 必备的指标是

- A、AT-III 含量及活性
- B、纤维蛋白原
- C、D-二聚体
- D、纤溶酶原
- E、血浆 FVIII：C 活性

答案： E

90、结石常诱发的泌尿系恶性肿瘤为

- A、睾丸癌
- B、肾癌
- C、肾盂癌
- D、前列腺癌
- E、膀胱癌

答案： C

91、下列检查中,除哪一项外均可用于霍乱的诊断

- A、大便悬滴检查
- B、大便碱性蛋白胨水培养
- C、大便涂片革兰氏染色镜检
- D、凝集试验检查血清中凝集素
- E、含巧克力琼脂平皿分离培养

答案： E

92、关于胎盘物质交换及转运方式,下列哪项是错误的

- A、 主动转运
- B、 母胎界面有胎盘屏障作用
- C、 简单扩散
- D、 易化扩散
- E、 IgG 不能通过胎盘屏障

答案： E

93、下列哪项不是缺氧时氧解离曲线右移的原因

- A、 血液 H^+ 浓度升高
- B、 血浆 CO_2 分压升高
- C、 血液温度升高
- D、 血红蛋白与氧的亲合力增加
- E、 红细胞内 2,3-DPG 增加

答案： D

94、低热的体温在

- A、 $37.2 \sim 38^\circ C$
- B、 $37.3 \sim 38^\circ C$
- C、 $37.3 \sim 38.1^\circ C$
- D、 $37.2 \sim 38.1^\circ C$
- E、 $37.1 \sim 38^\circ C$

答案： B

95、溶源性转换是指

- A、 供体菌染色体基因与受菌染色体基因的重组
- B、 供体菌质粒 DNA 与受体菌染色体 DNA 的重组
- C、 噬菌体的基因与细菌染色体 DNA 的重组
- D、 细菌染色体的基因发生突变
- E、 两种细菌原生质体融合后发生染色体基因的重组

答案： C

96、合成甘油三酯能力最强的组织是

- A、 肝脏
- B、 脂肪组织
- C、 小肠
- D、 肾脏
- E、 肌肉组织

答案： A

97、对于原癌基因激活机制中基因易位的叙述, 错误的是

- A、 可在染色体易位过程中发生
- B、 原癌基因移至强启动子下游附近
- C、 原癌基因移至强增强子附近
- D、 强启动子插入原癌基因
- E、 原癌基因移至强启动子上游附近

答案： D

98、ARDS 最重要的临床特征是

- A、 双肺渗出性病变
- B、 呼吸困难与体位无关
- C、 顽固性低氧血症
- D、 混合性呼吸困难
- E、 呼吸频率显著增加

答案： C

99、一名男孩, 4 岁, 其母给患儿洗澡时发现腹部形状异常, 来就诊, 经检查诊断为肾胚胎瘤 Wilms 瘤, 下列错误的是

- A、 贫血, 发热
- B、 恶病质状态
- C、 高血压
- D、 腹部包块
- E、 严重血尿

答案： E

100、盆腔检查又称为

- A、 阴道检查
- B、 妇科检查
- C、 双合诊
- D、 直肠-腹诊
- E、 阴道-腹诊

答案： B

101、小儿尿路感染的致病菌中最多见的细菌为

- A、 变形杆菌
- B、 大肠杆菌
- C、 绿脓杆菌
- D、 产碱杆菌
- E、 肠链球菌

答案： B

102、诊断宫颈炎相关的辅助检查, 不包括

- A、 阴道分泌物湿片白细胞计数
- B、 宫颈管分泌物涂片革兰氏染色白细胞计数
- C、 宫颈脱落细胞学检查
- D、 宫颈分泌物淋菌培养
- E、 宫颈分泌物核酸检测沙眼衣原体

答案: C

103、下列关于甲状腺肿大的叙述均正确, 但除外哪一项

- A、 女性在青春发育期可略增大
- B、 女性在更年期可略增大
- C、 不能看出肿大, 能触及者为 I 度肿大
- D、 能看出肿大, 又能触及, 但在胸锁乳突肌内为 II 度肿大
- E、 能看出肿大, 又能触及, 超过胸锁乳突肌为 III 度肿大

答案: B

104、慢性睾丸肿痛多见于

- A、 流行性腮腺炎后
- B、 隐睾症
- C、 白血病睾丸浸润
- D、 精索静脉曲张
- E、 睾丸结核

答案: E

105、下列疾病可见胃泌素增高的是

- A、 十二指肠球部溃疡
- B、 慢性胰腺炎
- C、 浅表性胃炎
- D、 萎缩性胃体胃炎
- E、 萎缩性胃窦胃炎

答案: D

106、“请你比较一下, 你的孩子在哪些情况下容易烦躁不安: 是你反复重复某句话的意思时, 还是放手让孩子自行决定的时候?” 属于哪种言语性干预技术

- A、 差异性提问
- B、 假设提问
- C、 前馈提问
- D、 循环提问
- E、 积极赋义和改释

答案： A

107、患儿,男,5岁。3天前无诱因出现发热,体温最高 39.5℃;2天前出现皮疹,呈密集而均匀红色细小丘疹,初见颈部,24小时内遍及全身,周身皮肤潮红,伴痒感。查血常规:WBC $8.23 \times 10^9/L$, L% 10.6%, N% 80.1%, Hb 131g/L, PLT $333 \times 10^9/L$ 。患儿可能出现的舌部体征为

- A、地图舌
- B、裂纹舌
- C、草莓舌
- D、牛肉舌
- E、镜面舌

答案： C

108、患儿,男,1岁。高热1周,精神不振,咳嗽频繁,面色灰白,阵发性喘憋,可见鼻扇和三凹征,双肺下稍叩浊,呼吸音减低,双肺下闻及小水泡音。实验室检查:WBC $9.0 \times 10^9/L$,胸部X线片示双肺片状密度较淡阴影,伴明显肺气肿,最可能的诊断为

- A、支原体肺炎
- B、肺炎链球菌肺炎
- C、金黄色葡萄球菌肺炎
- D、腺病毒肺炎
- E、霉菌性肺炎

答案： D

109、患儿,男,10岁。昨晚曾吃海虾等食物,今晨开始发热,腹泻,初为水样便,继而黏液脓血便,每次腹泻前均有腹痛。呕吐2次, T 39℃,大便镜检 WBC 30~35个/HP, RBC 14~18个/HP。吞噬细胞 1~2个/HP,最可能的诊断是

- A、嗜盐菌肠炎
- B、急性细菌性痢疾
- C、急性肠炎
- D、沙门菌感染
- E、大肠杆菌肠炎

答案： B

110、患者,女,34岁。4个月内抽搐痉挛5次,发作后不能用语言表达自己的意思,但能听懂别人的语言。CT及MRI显示左额叶占位病均匀一致强化,周围硬脑膜有强化。最可能的诊断是

- A、胶质瘤
- B、脑膜瘤

- C、 海绵状血管瘤
- D、 转移瘤
- E、 颅内淋巴瘤

答案： B

111、女性, 16 岁, 学生。4 天前参加一门功课考试, 因考试成绩不理想被家长批评后, 出现记不清时间, 称现在是 4 天前的日期, 说“明天有考试”。该患者应诊断为

- A、 抑郁症
- B、 焦虑症
- C、 精神分裂症
- D、 痴呆
- E、 分离(转换)性障碍

答案： E

112、某女, 30 岁, 因当众受到丈夫指责, 突然出现双上肢肌肉抽动、阵挛, 持续 20 分钟缓解, 发作期间无大小便失禁, 无口舌咬伤, 事后可叙述发作期的一些感受, 病史中类似症状曾发生过数次, 最佳治疗方案是

- A、 抗惊厥药物治疗
- B、 抗精神病药物治疗
- C、 暗示疗法
- D、 行为疗法
- E、 支持性心理治疗

答案： C

113、患者, 男, 30 岁, 体检发现有二尖瓣狭窄, 超声心动图显示左心房扩大为 45mm, 余房室大小正常。二尖瓣瓣膜较薄, 开放呈圆穹状, 瓣口面积为 1.0cm^2 。此时体征除了有心尖部隆隆样舒张期杂音外, 还可闻及

- A、 第三心音
- B、 收缩期喀喇音
- C、 开瓣音
- D、 Austin-Flint 杂音
- E、 第四心音

答案： C

114、患者, 男, 20 岁, 鼻部外伤后出现嗅觉功能异常。有可能受损的部位是

- A、 上鼻甲
- B、 中鼻甲
- C、 下鼻甲

D、 鼻中隔下部

E、 鼻前庭

答案： A

115、患儿,女,14岁,车祸入院手术,用吗啡止痛。使用吗啡时不会出现下列哪项作用

A、 镇痛、镇静

B、 瞳孔缩小

C、 镇咳

D、 呼吸抑制

E、 止泻

答案： E

116、松果体瘤患者出现大量排尿,尿比重在 1.005 以下,尿在 4000ml/d 以上,可能是因为肿瘤侵犯了

A、 下丘脑脊髓束

B、 乳头被盖束

C、 乳头丘脑束

D、 前脑内侧束

E、 视上核或视上核垂体束

答案： E

117、患者,男,66岁,吸烟,糖尿病,突发剧烈胸痛,伴有胸闷气短2小时就诊,BNP 3105pg/ml。最有可能引起急性左心衰竭的疾病是

A、 单纯收缩期高血压

B、 感染性心内膜炎

C、 重度二尖瓣狭窄伴房颤

D、 急性广泛前壁心肌梗死

E、 肥厚型梗阻性心肌病

答案： D

118、患者,女,62岁。诊断脑血栓形成。神志清醒,偏瘫,偏身感觉障碍和偏盲。最常见于

A、 大脑前动脉闭塞

B、 大脑中动脉闭塞

C、 小脑后下动脉闭塞

D、 大脑后动脉闭塞

E、 椎-基底动脉闭塞

答案： B

119、患者,男,68岁,甲状腺功能亢进症,治疗心率失常的药物不适合使用

- A、胺碘酮
- B、普罗帕酮
- C、美西律
- D、普洛萘尔
- E、地尔硫草

答案: A

120、患者,男,24岁。颈部淋巴结肿大2个月余,左胸腔积液1个月。脾大肋下4.0cm。骨髓穿刺涂片查到12%淋巴肉瘤细胞。该患者的最可能的诊断为

- A、霍奇金病
- B、急性白血病
- C、非霍奇金淋巴瘤
- D、恶性组织细胞病
- E、多发性骨髓瘤

答案: C

121、患者,女,25岁,创伤后右上臂中段肿胀,畸形,右腕不能背伸,拇指不能背伸和外展,其他手指掌指关节不能伸直。下列治疗方案中哪项最恰当

- A、手法复位小夹板外固定,不探查桡神经
- B、切开复位内固定,同时探查桡神经
- C、手法复位外固定,观察3个月,若手功能无恢复再探查桡神经
- D、右上肢骨牵引,不探查桡神经
- E、手法复位外展架固定,不探查桡神经

答案: C

122、患者,女,55岁,慢性心力衰竭,胸闷气促1个月。以下治疗措施中,除哪项外,其他均可以减轻心脏负荷

- A、硝酸盐制剂
- B、利尿
- C、休息
- D、控制钠盐摄入
- E、控制钾盐摄入

答案: E

123、王某,胃次全切除后3年,近日感头昏、乏力,Hb60g/L,RBC 1.5×10^{12} /L,MCV 120fL,网织红细胞0.015,此患者最可能的诊断是

- A、巨幼红细胞性贫血
- B、缺铁性贫血

- C、 再生障碍性贫血
- D、 感染性贫血
- E、 溶血性贫血

答案： A

124、患者,男,68岁,反复咳嗽痰多5年,多在冬季发病,近一周出现黏液脓痰,痰量增多,并伴喘息。最可能的诊断为

- A、 慢性支气管炎急性发作期
- B、 重症哮喘
- C、 支气管扩张症
- D、 细菌性肺炎
- E、 急性气管-支气管炎

答案： A

125、患者,男,20岁。肩抬重物,突感下腹坠痛,发现右腹股沟区有3cm×3cm团块,硬,有触痛,不能推动。最可能的诊断是

- A、 腹股沟直疝嵌顿
- B、 股疝嵌顿
- C、 滑动疝嵌顿
- D、 腹股沟斜疝嵌顿
- E、 腹股沟淋巴结炎


答案： D

126、患者,男,40岁。诊断为肝硬化4年,2天来有性格改变就诊。查血氨偏高,考虑有肝性脑病可能。关于肝性脑病的氨代谢,下述哪项不正确

- A、 暴发性肝功能衰竭所致肝性脑病血氨往往更高
- B、 大多数门腔分流术的患者血氨往往都增高
- C、 动脉血和脑脊液中氨含量明显相关
- D、 便秘时会引起血氨增高
- E、 结肠呈碱性环境时产氨增多

答案： A

127、患者,男,64岁,突感胸部剧痛2小时,呈撕裂样,并向背部放射,有高血压病史10年,含服硝酸甘油3片不能缓解,CT检查如图所示。首先应考虑的诊断



是

- A、 主动脉夹层
- B、 急性胆囊炎
- C、 急性胰腺炎
- D、 急性胸膜炎
- E、 急性心肌梗死

答案: A

128、患者,男,30岁,3年来下肢间断水肿,近日疲乏,无力,恶心,呕吐来急诊。查血压21.8/13.2kPa,160/100mmHg,Hb70g/L。为进一步明确诊断,首先应检查

- A、 血BUN
- B、 血 K^+ , Na^+ , Cl^-
- C、 CO_2CP
- D、 肝功
- E、 血甘油三酯

答案: A

129、患儿,男,生后1周,系35周早产儿。出生体重2.3kg,出生无异常。生后母乳喂养,食欲较佳,二便正常。目前体重为2.4kg,家长来儿保门诊咨询有关补充维生素D开始时间及剂量,以下哪项最合适

- A、 应立即开始,每天用维生素D 400IU
- B、 应立即开始,每天用维生素D 800IU
- C、 再过1周后添加,每天用维生素D 400IU
- D、 再过1周后添加,每天用维生素D 800IU
- E、 再过2周后添加,每天用维生素D 400IU

答案: B

130、孕妇 35 岁, 曾经流产 2 次, 未得活婴。此次停经 56 天, 确诊妊娠, 高度忧虑流产再发。医生告诉她简单判断胎儿在宫内存活状态的最佳方法是

- A、 基础体温测定
- B、 宫颈黏液结晶检查
- C、 B 超动态监测
- D、 定期阴道检查
- E、 动态监测尿 hCG

答案: C

131、小李由于不育而就诊, 医生检查后发现其为先天性输精管缺失患者。下列关于输精管的描述错误的是

- A、 起于附睾尾
- B、 末端变细与精囊排泄管汇合形成射精管
- C、 睾丸部位于睾丸前缘
- D、 精索部为男性节育手术理想位置
- E、 腹股沟部位于腹股沟管内

答案: C

132、患儿, 男, 1 岁。既往健康, 突然哭闹, 阵发性面色苍白, 伴有呕吐, 右上腹可触及腊肠形、表面光滑、稍可移动、有轻压痛的肿块。此时最有可能发现且对诊断最有价值的体征是

- A、 腹膜刺激征
- B、 腹部听诊肠鸣音亢进
- C、 肝浊音界消失
- D、 大便呈果酱色
- E、 直肠指诊可触及息肉

答案: D

133、患者, 女, 70 岁。极度肥胖伴糖尿病, 现确诊为宫颈癌早期。最佳的治疗方式

- A、 单纯全宫后化疗
- B、 全宫加双附件切除后化疗
- C、 放疗
- D、 尽量行根治术
- E、 免疫疗法

答案: C

134、男婴, 4 个月, 出生时腰骶部包块诊断为囊状脊柱裂, 2 小时前, 因跌倒致包块处脑脊液外溢, 内容物外漏, 此时最佳的处理是

- A、快速补液
- B、送分泌物培养
- C、急诊手术
- D、清创包扎
- E、行腰部平片

答案： C

135、患者,女,20岁,左胸前被撞伤,并处于休克状态,经输液等抗休克治疗后,病情很快好转,X线检查示第9、10肋骨骨折。2天后发生休克。最可能引起休克的原因是

- A、气胸
- B、肝破裂
- C、脾破裂
- D、胃破裂
- E、肠破裂


答案： C

136、一战士,冲锋中突然被气浪掀倒。自述出现短暂的胸闷,耳鸣、耳聋外耳道有血迹,无呼吸困难,体表无伤口,对该患者采取的措施中,错误的是

- A、呼吸支持
- B、密切观察
- C、掌握输液速度
- D、中耳内滴注药物
- E、耳内禁止填塞冲洗

答案： D

137、患者,女,43岁,左侧腰部不适2年余,结合图像,最可能的诊断是



- A、左肾髓样脂肪瘤
- B、左肾盂憩室
- C、左肾囊肿
- D、左肾积水
- E、左肾错构瘤

答案： C

138、患者,男,52岁,刺激性咳嗽,痰中带血3个月,胸片见右肺上叶部分不张,多次痰查癌细胞阴性。为确诊,应首选下列哪项检查

- A、再次痰查找癌细胞
- B、B超下肿块穿刺活检
- C、胸部CT检查
- D、纤维支气管镜检查
- E、抗感染治疗3个月后复查胸片

答案: D

139、患者,男,80岁,患胃肠炎,在输液时突发气短,不能平卧、咳嗽,咳大量白色泡沫样痰,两肺满布湿性啰音,T波V₅倒置,可能性最大的疾病是

- A、肺心病心力衰竭
- B、风心病,二尖瓣关闭不全,左心衰肺水肿
- C、风心病,二尖瓣狭窄,左心衰肺水肿
- D、冠心病,左心衰,肺水肿
- E、肺梗死

答案: D

140、患者,男,23岁。5天前参加夏收后出现畏寒、发热,伴全身肌痛、乏力,咯血痰伴心慌、气急4小时入院。查体:心率134次/min,律整,双肺可闻湿啰音。白细胞 $15 \times 10^9/L$,中性粒细胞80%。X线检查:双肺弥漫性点状片状阴影。最佳用药方案是

- A、异烟肼+利福平+链霉素
- B、地西洋+氢化可的松+毛花苷丙+青霉素
- C、青霉素+庆大霉素
- D、毛花苷丙+呋塞米
- E、苯唑青霉素+丁胺卡那霉素

答案: B

141、患者,男,49岁,双手遇冷变紫变白半年,手指皮肤变厚发硬3月,伴吞咽困难、辅助检查ACA(+),诊断CREST综合征,关于该综合征说法不正确的是

- A、可有颈部受累
- B、内脏受累出现晚
- C、可有手指软组织钙化
- D、10年生存率50%以下
- E、可有毛细血管扩张


答案: D

142、患儿,男,12岁,昨晚在外就餐,今晨开始畏寒、发热,腹痛,腹泻伴明显里急后重;大便8次,初为稀便,继之为黏液脓血便。此病例的诊断

- A、阿米巴痢疾
- B、急性细菌性痢疾
- C、急性中毒性细菌性痢疾
- D、急性胃肠炎
- E、慢性细菌性痢疾

答案: B

143、患者,男,65岁,中上腹痛腹胀,消瘦,乏力、食欲缺乏,影像检查如图,最可能的诊断是



- A、胃间质瘤
- B、萎缩性胃炎
- C、肥厚性胃炎
- D、胃窦癌
- E、胃淋巴瘤

答案: D

144、患者,男,68岁,因心肌梗死住内科治疗。早餐后突感脐周和上腹部绞痛,患者脸色苍白,大汗淋漓;1小时后疼痛减轻,右下腹有压痛;不久出现全腹膨隆,肠鸣音消失,明显休克体征。最可能的诊断是



- A、急性胆囊炎

- B、横结肠癌
- C、急性盲肠憩室炎
- D、急性阑尾炎合并穿孔
- E、肠系膜上动脉栓塞

答案： E

145、2岁儿童无发绀,但胸骨左缘3~4肋间听到3~4级全收缩期杂音。检查无异常所见,胸片及心电图正常,这些发现与下列哪种先天性心脏病相符

- A、法洛四联症
- B、室间隔缺损
- C、三尖瓣闭锁
- D、大血管转位
- E、动脉导管未闭

答案： B

146、患者,男,30岁,发现双下肢水肿6天。检查:血压150/95mmHg。Hb120g/L;尿蛋白(++++) ,RBC4~6个/HP,24小时尿蛋白定量4.5g;血ALB 28g/L, BUN 10mmol/L, Cr 126 μ mol/L。最可能的诊断是

- A、高血压病肾病
- B、肾病综合征
- C、急性肾炎
- D、急进性肾炎
- E、隐匿性肾炎

答案： B

147、患者,男,24岁,不慎跌入80℃热水池中,水深淹没患者臀部,初步估计烧伤面积为

- A、30%~35%
- B、35%~40%
- C、40%~45%
- D、45%~50%
- E、>60%

答案： D

148、患者,男,56岁,既往有乙型肝炎病史,近几个月来乏力,食欲缺乏,右肋部疼痛,并自感右肋下有一包块,进行性长大。查体:消瘦,肝脏肋下3指,剑突下4指,质较硬,该患者应首先采取的检查为

- A、X线钡餐检查
- B、胃镜检查

- C、 B 超检查
- D、 CT 检查
- E、 结肠镜检查

答案： C

149、早产儿, 生后 4 小时出现进行性呼吸困难, 伴呼气性呻吟, 面色青灰。胸片示: 两肺均匀透过度减低。此患儿最可能是

- A、 新生儿窒息
- B、 新生儿湿肺
- C、 新生儿肺炎
- D、 新生儿呼吸窘迫综合征
- E、 新生儿颅内出血

答案： B

150、患者, 女, 58 岁, B 超发现甲状腺区占位, 病检示甲状腺髓样癌, 伴甲状旁腺增生。该患者最有可能存在的表现是

- A、 胰高糖素瘤
- B、 泌乳素瘤
- C、 口腔黏膜神经瘤
- D、 嗜铬细胞瘤
- E、 生长激素瘤

答案： B

151、患者, 男, 56 岁, 全程间歇性无痛肉眼血尿 2 个月。膀胱镜检查于右侧壁距右输尿管开口 1.8cm 处有 1.5cm×2.0cm 大小的肿物, 有蒂, 可随水流漂动。活检为移行上皮乳头状癌, 限于固有层, 双合诊无异常。诊断为膀胱肿瘤, 初步分期为

- A、 Tis
- B、 T₁
- C、 T₂
- D、 T₃
- E、 T₄

答案： B

152、患者, 女, 18 岁, 头晕乏力 1 年余, 记忆力减退, 月经不规则量多, 可见反甲, Hb75g/L, 白细胞及血小板计数及形态正常。下列治疗最恰当的是

- A、 叶酸
- B、 维生素 B₁₂
- C、 硫酸亚铁

D、 丙酸睾酮

E、 输血

答案： C

153、患者,男,76岁,患脑卒中多年。患者病前开朗乐观,近几年来变得沉默寡言,孤僻,不愿与人交往。该患者最有可能发生的是

A、 感觉改变

B、 知觉改变

C、 情绪改变

D、 个性改变

E、 意志改变

答案： D

154、患者,女,50岁。中腹部疼痛12小时,扩散至全腹2小时,查右下腹部有压痛、反跳痛及肌紧张。腹透(-)。血常规:WBC $21 \times 10^9/L$, N 87%。尿中红细胞 $2 \sim 4$ /中倍。最应考虑的疾病是

A、 急性胰腺炎

B、 右侧输卵管妊娠破裂

C、 急性胆囊炎

D、 右侧输尿管结石

E、 急性阑尾炎穿孔

答案： E

155、患者,男,34岁。四肢无力,尿便失禁1个月。查体:左侧 Horner 征(+),四肢肌力3级,双上肢肌张力减弱,腱反射消失,双下肢肌张力正常,腱反射活跃,双下肢病理征(+),C₆。以及各种感觉消失。该患者最可能的病变部位是在

A、 高颈髓

B、 颈膨大

C、 胸髓

D、 腰膨大

E、 脊髓圆锥

答案： B

156、患者,男,17岁,全身水肿3周。血压 $17/10.5 kPa$ ($127/80 mmHg$),尿蛋白(++++) ,管型 $2 \sim 5$ 个/HP, RBC $2 \sim 4$ 个/HP,尿蛋白定量 $5.9 g/d$,胆固醇 $500 mg/dl$,白蛋白 $23 g/L$,球蛋白 $20 g/L$,血尿素氮 $25 mg/dl$ 相当于 $8.5 mmol/L$,血肌酐 $110 \mu mol/L$,尿 C3 阴性。下列哪种疾病最符合上述表现

A、 急进性肾小球肾炎

B、 慢性肾小球肾炎

- C、 急性肾小球肾炎
- D、 肾病综合征
- E、 紫癜性肾炎

答案： D

157、患儿,男,4岁,因“颈后方被锐器刺伤2小时”急诊入院。患儿入院时血压50/30mmHg,心率169次/min,血氧饱和度为60%。查体发现颈后方横行长约6cm开放伤口,锐器已拔出。该患儿的休克为哪种类型

- A、 失血性休克
- B、 感染性休克
- C、 心源性休克
- D、 过敏性休克
- E、 神经源性休克

答案： E

158、患者,男,54岁。大便秘结,便中带血3个月。查体:直肠指检于肛门外口见紫红色柔软包块,用力时可突出增大。该患者最可能的诊断是

- A、 直肠息肉
- B、 直肠癌
- C、 肛周脓肿
- D、 痔疮
- E、 直肠感染

答案： D

159、患者起病急,高热,多为弛张热,伴寒战、严重头痛及全身肌肉酸痛,经实验室检查诊断为贝纳氏柯克斯体感染。下列疾病由贝纳氏柯克斯体引起的是

- A、 波浪热
- B、 出血热
- C、 猩红热
- D、 战壕热
- E、 Q热

答案： E

160、患者因丘脑肿瘤引起的丘脑综合征入院,经头颅CT显示肿瘤位于背侧丘脑腹后外侧核,患者可能出现的症状是

- A、 变温症
- B、 同侧半躯干四肢浅感觉传导障碍
- C、 对侧半躯干四肢浅感觉传导障碍
- D、 同侧半躯干四肢深感觉传导障碍

E、对侧半躯干四肢深感觉传导障碍

答案： E

161、患儿,男,7岁,跌倒时肘关节过伸造成伸直型髁上骨折,肱骨髁上骨折的部位是

- A、 肱骨外上髁处
- B、 肱骨内上髁处
- C、 肱骨下端和体交界处
- D、 肱骨上端和体交界处
- E、 肱骨体

答案： C

162、患儿,女,10岁。平时乏力,多汗,食欲差。查体:体重 25kg,心肺正常。PPD 皮试硬结 18mm,ESR 34mm/h,胸片示右肺门增大,隐约可见一结节影,边缘模糊。下列治疗最适合的是

- A、 青霉素+利福平
- B、 异烟肼+利福平
- C、 异烟肼+链霉素
- D、 青霉素+链霉素
- E、 异烟肼

答案： B

163、新生儿,其母因第二产程延长,行低位产钳助娩。出生时呼吸微弱呈喘息状,心率 80 次/min,全身苍白,咽反射消失,四肢肌肉松弛。其 Apgar 评分为

- A、 1 分
- B、 2 分
- C、 3 分
- D、 4 分
- E、 5 分

答案： B

164、患者,男,50岁,10天前发冷、发热,T 39.5℃,右胸痛、咳嗽,咯脓痰 350ml/d,臭味,有结核病密切接触史。为进一步明确诊断,应首先做的检查是

- A、 肺 CT 检查
- B、 肺放射核素扫描
- C、 胸部 X 线正侧位片
- D、 纤维支气管镜检查
- E、 痰细菌学及细胞学检查

答案： C

165、健康 2 个月男婴, 体重 5kg, 无法进行母乳喂养时, 下列哪种方式喂养正确

- A、 配方奶粉 80g/d
- B、 配方奶粉 100g/d
- C、 配方奶粉 120g/d
- D、 配方奶粉 140g/d
- E、 豆制代乳品

答案: B

166、患儿, 男, 1 岁, 游戏时突发哭闹不安, 面色苍白, 阵发性发作, 发作间歇嬉戏如常, 近 1 天排果酱样便, 诊断首先考虑为

- A、 肠扭转
- B、 肠蛔虫病
- C、 肠套叠
- D、 肠炎
- E、 肠伤寒


答案: C

167、患者, 男, 58 岁。因冠心病心绞痛住院, 缓解后出院。出院后 2 个月来偶有前胸不适感, 来门诊复查。患者体胖, 血清总胆固醇 7.5mmol/L, 心电图示慢性冠状动脉供血不足。为预防心绞痛发生, 下列措施最为有益的是

- A、 合理安排工作和生活
- B、 减肥和降血脂
- C、 适当的体力活动和体育运动
- D、 减少饮酒和吸烟
- E、 注意休息和减轻工作

答案: B

168、患者, 男, 37 岁。视力模糊, 部分视野缺失, 伴有头痛、恶心数月, MRI 检查如图, 最可能的诊断为



- A、 颅咽管瘤
- B、 脑膜瘤

- C、蛛网膜囊肿
- D、垂体瘤
- E、表皮样囊肿

答案： D

169、患者,女,33岁。20年来阵发性一侧头痛,左右不定,伴呕吐,每次疼痛持续1~10小时,常于月经期发作。头痛发作前,眼前有暗点、亮光,约持续10~15分钟。于眼症状消失后即出现头痛。神经系统检查未见异常。脑CT及脑MRI均未见异常。首选诊断为

- A、蛛网膜下腔出血
- B、三叉神经痛
- C、偏头痛
- D、脑出血
- E、脑肿瘤

答案： C

170、患者,男,45岁。车祸伤后出现尿痛,血尿3小时。查体:阴茎和阴囊部出现蝴蝶形血肿。该患者最可能的诊断是

- A、急性膀胱炎
- B、急性前列腺炎
- C、尿道破裂
- D、急性附睾炎
- E、睾丸外伤

答案： C

171、患者,男,45岁,因急性肠梗阻开腹探查,发现梗阻原为右肝曲结肠癌,肝无异常,选择哪种术式

- A、盲肠造瘘
- B、回肠横结肠吻合
- C、回肠造瘘
- D、根治性右半结肠切除一期吻合
- E、根治性右半结肠切除二期吻合

答案： E

172、患者,女,35岁。因为性交后阴道出血2天来门诊,妇科检查可见宫颈中度糜烂,表面脓血性分泌物。可能患有的疾病不包括

- A、宫颈炎
- B、宫颈CIN
- C、宫颈癌

- D、 宫颈息肉
- E、 子宫内膜癌

答案： D

173、患者,女,38岁,因突然右侧剧烈腰痛伴肉眼血尿就诊,既往有风湿性心脏病心房颤动病史。尿常规示蛋白(++),红细胞满视野,白细胞5~8个/HP。临床首先考虑

- A、 肾动脉栓塞
- B、 肾静脉栓塞
- C、 肾动脉血栓形成
- D、 肾静脉血栓形成
- E、 输尿管结石

答案： A

174、患者,女,34岁,反复腹泻2月,近半月呈黏液脓血便,3~5次/日,伴左下腹痛,里急后重感。查体:左下腹压痛,便培养(-),钡剂灌肠见直肠和乙状结肠肠壁边缘呈毛刺样改变。最可能的诊断是

- A、 肠结核
- B、 溃疡性结肠炎
- C、 克罗恩病
- D、 慢性细菌性痢疾
- E、 肠激惹综合征

答案： B

175、患者,男,26岁。发热2周入院,外周血白细胞 $35 \times 10^9/L$,中性粒细胞占80%,未见原始细胞。肝、脾、淋巴结无肿大,NAP积分增高。该患者最有可能的诊断是

- A、 慢性髓细胞白血病
- B、 急性髓细胞白血病
- C、 类白血病反应
- D、 传染性单核细胞增多症
- E、 恶性淋巴瘤

答案： C


176、孕妇,40岁,孕1产0,妊娠20周,有糖尿病史20年。查体:眼底检查见絮状物,视网膜水肿。B型超声检查为胎儿双顶径40mm,S/D值为5。该胎儿发育的结局是

- A、 发育加速,巨大儿的可能性最大
- B、 发育正常,新生儿体重正常偏低可能性最大

- C、发育正常,新生儿体重正常偏高
- D、发育受阻,出现胎儿发育迟缓
- E、胎儿以后会出现畸形

答案: D

177、患者,女,38岁,风湿性心脏病史20年,心电图如图所示,本图为V₁导联,根据其心电图特征,请说出她患的哪一种心律失常



- A、室性期前收缩
- B、室性心动过速
- C、心房颤动
- D、心房扑动
- E、三度房室传导阻滞

答案: C

178、患者,女,14岁。由于身材肥胖而被同学嘲笑是肥妹,近来出现严重的节食现象。若患者考虑诊断为神经性厌食症,下列哪项依据正确

- A、患者体重指数小于或等于18.5
- B、体重低于正常的10%以上
- C、患者虽骨瘦如柴仍觉得自己比较肥胖,拒绝进食
- D、由于食欲低下,导致不想进食,体重下降
- E、进食后自发的呕吐,导致体重明显下降

答案: C

179、某老年患者,晚期癌痛使用吗啡治疗,嘱家属注意不良反应。与吗啡使用无关的不良反应是

- A、呼吸抑制
- B、止咳作用
- C、体位性低血压
- D、腹泻稀便症状
- E、支气管收缩

答案: D

180、患者,女,70岁,拔牙后伤口渗血不止3天。既往有高血压、冠心病病史,长期服用阿司匹林等药物。下列哪项表现最符合患者病情

- A、血红蛋白增高

- B、 凝血因子Ⅷ活性减低
- C、 PAgT/PAdT 减低
- D、 血块收缩试验增高
- E、 vWF:Ag 增高

答案： C

181、患者,女,30岁,垂体瘤术后2小时,神志清楚,宜采取的体位是

- A、 15°~30° 头高脚低卧位
- B、 高半坐位
- C、 下肢抬高 15°~20°
- D、 俯卧位
- E、 侧卧位

答案： A

182、初孕妇,35岁,妊娠32周,因“头晕、眼花,双下肢水肿1周”入院。查体:血压150/110mmHg,宫高40cm,腹围105cm,腹壁皮肤发亮,张力大,有液体震颤感,胎位不清,胎心音遥远。B超检查羊水指数20cm。应首选考虑何项诊断

- A、 子痫前期,羊水过少
- B、 子痫前期,32周妊娠
- C、 32周妊娠,羊水过少
- D、 32周妊娠,羊水过多
- E、 子痫前期,32周妊娠,羊水过多少

答案： E

183、患者,女,15岁。月经周期不规律,血量多,此次月经持续10多天未净,量仍多。下列止血措施,最合适的是

- A、 肌注丙酸睾酮
- B、 肌注苯甲酸雌二醇
- C、 口服克罗米芬
- D、 雌孕激素序贯疗法
- E、 肌注黄体酮

答案： B

184、患者,男,39岁,发现澳抗阳性17年,未规律复查,近半年来反复发作右上腹胀痛,近1周加重伴腹胀,超声检查发现右肝巨大占位、无腹水。对此患者进行体格检查,不会出现下述哪项阳性体征

- A、 皮肤巩膜黄染
- B、 可见肝掌、蜘蛛痣
- C、 腹壁可见浅表静脉曲张

D、 肋下触及肿大的脾脏

E、 移动性浊音阳性

答案： E

185、 产妇产后第 2 天, 下腹阵痛, 出汗较多, 无恶心、 呕吐。 查体: 体温 37.6℃, 脐下 3 横指可触及一硬块, 白细胞为 $12 \times 10^9/L$, 中性粒细胞为 0.78。 可能的诊断是

A、 卵巢囊肿蒂扭转

B、 产后子宫内膜炎

C、 产后宫缩痛

D、 急性盆腔炎

E、 产后尿潴留

答案： C

186、 宫颈如菜花状, 阴道穹隆消失, 子宫正常, 双侧宫旁增厚, 弹性差, 但未达盆壁, 宫颈活检为鳞状细胞癌。 临床分期应为

A、 I A

B、 I B

C、 II A

D、 II B

E、 III A

答案： D

187、 腰椎间盘突出症, 拇趾背伸力减弱, 是哪条神经根受累及

A、 第 2 腰神经

B、 第 3 腰神经

C、 第 4 腰神经

D、 第 5 腰神经

E、 第 1 骶神经

答案： D

188、 患者, 女, 26 岁, 农忙时节时不慎将乐果污染了衣服及皮肤。 首先处理应为

A、 注射阿托品

B、 静脉注射解磷定

C、 输液

D、 给氧

E、 脱去污染衣服, 清洗接触部位皮肤

答案： E

189、 患者因脑出血入院, 经诊断为腹后内侧核出血, 该患者可能出现哪种症状

- A、 同侧半躯干四肢深感觉丧失
- B、 对侧半躯干四肢深感觉丧失
- C、 对侧头面部浅感觉丧失
- D、 对侧头面部深感觉丧失
- E、 同侧头面部深感觉丧失

答案： C

190、患者,女,35岁。人工流产术后7天,阴道少量流血,分泌物呈脓血性,有臭味。近5天发热伴下腹疼痛,渐加重。查体:体温39.6℃,痛苦病容,腹痛拒按,子宫略大而软,压痛,右侧附件区可触及一边界不清囊性肿块,约5cm×4cm×4cm,压痛明显,左侧附件区轻度压痛。血白细胞 $18 \times 10^9/L$,中性粒细胞91%,血红蛋白105g/L。该患者首先考虑的诊断为

- A、 急性盆腔炎,盆腔脓肿形成
- B、 右侧卵巢囊肿继发感染
- C、 流产合并阑尾炎
- D、 右侧输卵管妊娠
- E、 右侧卵巢肿瘤蒂扭转

答案： A

191、患者,男,28岁,苍白,齿龈出血,鼻出血2个月,发热1周。肝大肋下1.2cm,Hb45g/L,WBC $4.5 \times 10^9/L$ 。骨髓:原始+幼稚细胞79.5%,Auer小体可见,红细胞生成受抑,巨核细胞减少,幼稚细胞过氧化酶染色强阳性。最恰当的治疗为

- A、 VP方案
- B、 VLP方案
- C、 羟基脲
- D、 DA方案
- E、 苯丁酸氮芥

答案： D

192、患者,男,50岁。持续高热,剧烈头痛入院,用青霉素、链霉素治疗3天,无明显效果。发病第5日于胸、肩、背等处发现直径2~4mm的圆形鲜红色丘疹,经进一步检查诊断为斑疹伤寒,宜选用

- A、 庆大霉素
- B、 磺胺嘧啶
- C、 头孢拉定
- D、 林可霉素
- E、 四环素

答案： E

193、患者,男,58岁,胫骨中下1/3粉碎开放骨折,切开复位内固定后1个月开始行走,最易出现的问题是

- A、骨筋膜间室综合征
- B、骨折周围软组织粘连
- C、胫骨短缩
- D、胫骨骨髓炎
- E、骨折延迟愈合

答案: E

194、患者,男,45岁。有胃溃疡史10年,近3个月疼痛加剧,无节律性,伴嗳气,无反酸及呕吐,口服氢氧化铝凝胶和法莫替丁无效。查体:浅表淋巴结无肿大,腹平软,上腹部轻压痛,可触及包块。最有可能的诊断是

- A、胃溃疡复发
- B、胃溃疡癌变
- C、伴穿透性溃疡
- D、伴幽门梗阻
- E、复合性溃疡

答案: B

195、患者,男,60岁,因血尿就诊。医生为其做膀胱镜检查,下镜时需调整阴茎方位以使尿道耻骨前弯消失减轻损伤。关于男性尿道的耻骨前弯,错误的描述是

- A、是阴茎根与体之间的弯
- B、此弯曲凹向下
- C、此弯曲位于耻骨联合前方
- D、由尿道膜部和尿道海绵体构成
- E、向上提阴茎时,此弯曲消失

答案: D

196、某幼儿在玩耍时,突然出现烦躁不安、唇发绀、呼吸困难,查体呈三凹征,考虑可能的原因是

- A、气管异物
- B、呼吸衰竭
- C、大量胸腔积液
- D、自发性气胸
- E、急性支气管炎

答案: A

197、孕妇,36岁,妊娠16周。实验室检查RPR阳性,其传播途径可能为

- A、 呼吸道传播
- B、 消化道传播
- C、 间接接触传播
- D、 粪口传播
- E、 性接触传播

答案： E

198、患者,男,50岁,因急性腹膜炎行剖腹探查术后第6天,体温上升至38℃,伴有腹泻及里急后重,下列哪项检查最简便准确

- A、 大便常规化验
- B、 直肠指诊
- C、 立位腹平片
- D、 腹腔穿刺
- E、 腹部CT检查

答案： B

199、患者,女,27岁,产后4周,右乳房胀痛1周,伴寒战高热。查体:T39℃,HR110次/min,右乳房红肿,压痛(+),波动(+),穿刺抽出脓液,下列何种处理是错误的

- A、 切开引流的切口应按轮辐方向
- B、 为了充分引流,切口在脓腔的最低部位引流的同时,另加切口作对口引流
- C、 若有乳瘘,可终止哺乳
- D、 为了防止感染的扩散,引流时不能用手指深入脓腔
- E、 脓肿切开引流的同时,需要全身应用抗生素

答案： D

200、患者,男,47岁。3小时前在劳动中无明显诱因突然出现上腹部剧烈刀割样疼痛,迅速遍及全腹,不敢直腰走路。肝浊音界消失,全腹有明显的腹膜刺激征,肠鸣音消失。最可能的诊断是

- A、 胃十二指肠溃疡穿孔
- B、 胆囊穿孔腹膜炎
- C、 急性阑尾炎穿孔腹膜炎
- D、 绞窄性肠梗阻
- E、 急性重症胰腺炎

答案： A

201、患者,男,47岁。过去有乙型肝炎病史伴反复GPT升高,钡透示食管胃底静脉曲张,B超及AFP测定证实为肝癌脾大。关于该患者门静脉高压症的病因,下列哪项是错误的

- A、肝外门静脉受压
- B、门静脉癌栓
- C、肝硬化
- D、肝静脉主干受压
- E、Retzius 静脉(腹膜后交通支)阻塞

答案： E

202、年轻男性,发热 5 天,每天体温维持在 39℃~41℃,24 小时内体温波动相差不超过 1℃。体检发现腹部玫瑰疹,肝脾大。最可能的诊断为

- A、大叶肺炎
- B、流行性出血热
- C、风湿热
- D、疟疾
- E、伤寒

答案： E

203、患者,男,62 岁,既往高血压病史 15 余年,长期吸烟。从 3 个月前开始,爬楼梯或快步行走时反复出现胸骨后压榨样疼痛,每次持续 5~10 分钟,休息后自行缓解。患者疼痛时采取的体位可能是

- A、自主体位
- B、被动体位
- C、强迫坐位
- D、强迫停立位
- E、强迫蹲位

答案： D

204、患者,女,45 岁,严重骨盆骨折,经补液等治疗患者循环稳定,T38.0℃,BP120/80mmHg,HR95 次/min。但排尿减少,考虑急性肾衰竭。拟进行抗感染治疗,可选择的药物为

- A、阿昔洛韦
- B、庆大霉素
- C、两性霉素 B
- D、青霉素钾
- E、青霉素钠

答案： E

205、患者,男,19 岁。发热、头痛 3 天,自觉乏力明显。查体:T38℃,P120/min,R 36/min,BP9.3/6.6kPa(70/48mmHg),中心静脉压 0.44kPa。神志清,急性热病容,球结膜充血,前胸部散在出血点,心肺(-),肝肋下 1cm,双肾

区叩击痛阳性。血常规:白细胞计数 $12 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 70%, 异型淋巴细胞 10%。尿蛋白(+++)。下列措施中, 应首先采用的是

- A、 大剂量抗生素抗感染
- B、 血管活性药升压
- C、 扩充血容量
- D、 肾上腺皮质激素
- E、 肝素抗凝血治疗

答案: C

206、某患者左侧口角流涎。查体:左侧额纹变浅, 眼裂变大, 左侧口角下垂, 鼻唇沟变浅, 左侧舌前 2/3 味觉减退。病变为

- A、 左侧面神经茎乳孔
- B、 左侧面神经内耳
- C、 左侧面神经管部
- D、 左侧面神经膝状神经节
- E、 左侧桥小脑脚

答案: C

207、患者, 女, 25 岁, 面部刀刺伤 12 小时, 刀口长 4cm, 深 0.7cm, 最适当的治疗措施是

- A、 清创缝合
- B、 延期缝合
- C、 换药
- D、 理疗
- E、 热敷

答案: A

208、患者, 女, 48 岁。月经紊乱 1 年, 停经 70 天后出现持续阴道流血 10 余天, 伴有大血块。妇科检查:子宫及附件未发现异常。止血首选

- A、 雄激素
- B、 孕激素
- C、 雌、孕激素序贯疗法
- D、 雌激素
- E、 诊断性刮宫术

答案: E

209、患者, 男, 18 岁, 学生, 因“发热、乏力 7 天, 食欲缺乏、恶心、呕吐 5 天, 尿黄、身黄 2 天”入院。查体:体温 37.1°C , 巩膜轻度黄染, 颌下淋巴结轻度肿大, 肝于肋下 2cm 可及, 质软, 脾未及。周围血液红细胞计数为 $4.62 \times 10^{12}/L$, 白

细胞计数为 $6 \times 10^9/L$, 分类计数 N 0.75, L 0.22。实验室检查:ALT 1500U/L, AST 1300U/L, TB $70 \mu\text{mol/L}$, DB $35 \mu\text{mol/L}$ 。本例最可能诊断是

- A、慢性病毒性肝炎
- B、急性病毒性肝炎
- C、重型肝炎
- D、肝炎肝硬化
- E、淤胆型肝炎

答案: B

210、经疫苗接种者举报发现,某疫苗接种单位的医疗卫生人员在实施接种前,未依照《疫苗流通和预防接种管理条例》规定告知、询问受种者或者其监护人有关情况,其所在地的县级人民政府卫生主管部门欲追究其法律责任。其行为可能承担的以下法律责任中,不必承担的是

- A、责令改正
- B、警告
- C、拒不改正的,对主要负责人给予警告处分
- D、没收违法所得
- E、对负有责任的医疗卫生人员责令暂停执业活动

答案: D

211、学生在训练时,站立不稳倒地,枕部触于垫上,出现双上肢麻木,活动无力,头稍歪向一侧,不敢转动。可能为何种损伤

- A、寰椎前脱位
- B、枢椎齿突基底骨折
- C、寰椎单侧半脱位
- D、寰椎后弓骨折
- E、寰椎后脱位

答案: C

212、患者,女,28岁,已婚,平素月经规则。停经47天,突感右下腹疼痛2小时来院就诊。既往有盆腔炎。查体见:面色苍白,恶心,出汗,阴道少量出血,体温不高。测尿HCG(+)。下列选项中哪一项出现的可能性最小

- A、诊断可能为输卵管妊娠破裂
- B、妇科检查:子宫稍大,软,宫颈举痛,后穹隆饱满
- C、血压下降,脉搏增快
- D、后穹隆穿刺为脓性液体
- E、血 β -HCG升高

答案: D

213、患者,男,68岁,因进行性吞咽困难就诊。经食管镜检查,发现距中切牙约25厘米处有一肿块,进行活检,诊断为食管癌。请问该患者的肿块位于食管哪个部位

- A、食管颈部
- B、食管第1个狭窄
- C、食管第2个狭窄
- D、食管第3个狭窄
- E、食管腹部

答案: C

214、患者,女,35岁。孕6个月,因接触性出血行活检,诊断为宫颈癌ⅠA2期。最佳治疗方案为

- A、先剖宫取胎,然后给予体外及腔内放疗
- B、维持妊娠至33周,在行剖宫产的同时行全子宫切除及盆腔淋巴结清扫术
- C、尽快行全子宫切除及盆腔淋巴结清扫术
- D、先行体外照射,待胎儿自然流产后再行腔内放疗
- E、维持妊娠至足月,经阴道分娩,如果不需要生育者,可于产后6个月行全子宫切

答案: B

215、患者,男,40岁,劳累后心前区闷痛,气短,有时突感呼吸困难。查体:心界向左下扩大,胸骨左缘第4肋间闻及粗糙响亮收缩期杂音,含硝酸甘油后,心前区痛加重。最可能的诊断为

- A、二尖瓣关闭不全
- B、主动脉瓣狭窄
- C、扩张型心肌病
- D、肥厚型梗阻性心肌病
- E、冠心病

答案: D

216、患者,男,45岁,确诊为胃癌,手术探查发现胃窦部6cm×4cm×4cm肿块,与肝左外叶及横结肠均有小区域浸润,胃大小弯淋巴结肿大。此时最应选择的术式是

- A、胃空肠吻合术
- B、姑息性胃大部切除术
- C、胃癌根治术加左外叶肝切除术
- D、胃癌根治术加左外叶肝切除术加横结肠肠段切除术
- E、立即关腹,术后进行联合化疗

答案: D

217、初孕妇, 28 岁, 孕 40 周, 双胎妊娠。胎盘功能检查提示有减退情况, 下一步处理应是

- A、 及早终止妊娠
- B、 期待疗法
- C、 给予保胎药物
- D、 等待自然发动宫缩
- E、 予维生素 D

答案: A

218、患者, 女, 18 岁, 持续性低热, 腹痛糊状便及闭经 1 个月。查体: 腹部饱满略紧张, 全腹轻压痛及反跳痛, 右下腹隐约触及不规则肿物, 较固定, 腹部移动性浊音阳性。最可能诊断是

- A、 结肠癌
- B、 结核性腹膜炎
- C、 克罗恩病
- D、 右侧卵巢囊肿
- E、 阑尾脓肿

答案: B

219、患者, 女, 28 岁。停经 2 个月, 下腹阵痛伴阴道大量出血, 面苍白, 脉细弱, 120 次/min, 血压 10/7kP 相当于 (75/55mmHg, 宫口开大, 有肉样组织堵住宫口, 子宫如 50 天妊娠大小, 双附件正常。最恰当的处理是

- A、 立刻刮宫
- B、 静脉滴入缩宫素
- C、 肌注缩宫素后刮宫
- D、 纠正休克同时行刮宫术
- E、 纠正休克后再行刮宫术

答案: D

220、患者, 女, 25 岁, 突发寒战高热, 腰痛、尿频、尿痛 1 周。T39.5℃, 两侧肋腰点压痛, 普通尿培养阴性。应首选哪项检查

- A、 腹部平片
- B、 静脉肾盂造影
- C、 肾图
- D、 尿高渗性培养
- E、 肾活检

答案: D

221、患者,男,65岁,偶发血尿1个月来诊,需要排除膀胱肿瘤。膀胱肿瘤的好发部位是

- A、膀胱尖
- B、膀胱底
- C、膀胱体
- D、膀胱颈
- E、膀胱三角

答案: E

222、患者,女,停经3个月后出现腹痛伴阴道出血。妇科检查示子宫增大,质软。双侧附件区均可扪及4cm×5cm囊性、活动好、无压痛之肿块。分泌物为血性,尿HCG阳性。则双侧附件肿块最有可能是

- A、双侧输卵管积水
- B、双侧输卵管卵巢囊肿
- C、双侧卵巢巧克力囊肿
- D、双侧卵巢黄素样囊肿
- E、双侧卵巢浆液性囊肿

答案: D

223、患者,男,27岁。便后出少量鲜血1年半,有时排便时有肿物脱出肛门外。直肠指诊:距肛门3.5cm处可触及一圆形柔软,带长蒂肿物,活动度大。应采取的最恰当的治疗方法是

- A、中药治疗
- B、电灼法
- C、抗生素保留灌肠
- D、蒂部掐断后取出
- E、切除法

答案: E

224、患者,女,20岁。因“反复发作性紧张、恐惧,伴胸闷、气促1个月”来诊。近1个月来患者拒绝外出、害怕独处,这一现象是

- A、预期性焦虑
- B、回避行为
- C、惊恐发作
- D、被害妄想
- E、关系妄想

答案: B

225、患者虽有心脏病,但经医生检查被允许妊娠,现妊娠已 16 周。为预防心力衰竭发生,下述除了哪项外均正确

- A、 每日保证 10 小时睡眠
- B、 避免过度劳动,情绪过度激动
- C、 不限制食盐摄入量
- D、 积极防止并纠正贫血
- E、 预防维生素缺乏

答案: C

226、患者,男,70 岁。患高血压合并左心衰,长期口服 ACEI 类药物及利尿剂,1 周前自行调整用药剂量后自觉乏力、腹胀。今日来院复查,行血电解质检查,最符合该患者目前情况的检查结果是

- A、 血钾 3.0mmol/L
- B、 血钠 150mmol/L
- C、 血氯 115mmol/L
- D、 血钙 2.09mmol/L
- E、 血磷 1.7mmol/L

答案: A

227、患者,男,20 岁。腰骶、腰背部疼痛 2 年,伴晨僵,弯腰受限。查体见脊柱生理弯曲消失。最可能的疾病是

- A、 脊椎结核
- B、 类风湿关节炎
- C、 强直性脊柱炎
- D、 腰椎间盘突出症
- E、 脊椎肿瘤

答案: C

228、患者,女,30 岁,四肢皮肤反复出现出血点,淤斑 1 年余,肝脾未触及。血红蛋白 95g/L,白细胞 $4.5 \times 10^9/L$ 。为确诊应首选的检查是

- A、 出血时间
- B、 凝血时间
- C、 毛细血管脆性试验
- D、 骨髓穿刺
- E、 血块收缩试验

答案: D

229、一位慢性胆囊炎患者突发左上腹剧痛 12 小时入院。查体:T 38.5℃, 明显腹胀, 左上腹压痛阳性, 无反跳痛、肌紧张, 肠鸣音减弱。血淀粉酶 1200U-Somogyi 法, 血 WBC $12 \times 10^9/L$, 中性 0.87。该患者不宜采用的治疗是

- A、 禁食
- B、 胃肠减压
- C、 注射哌替啶
- D、 注射抗生素
- E、 H_2 受体拮抗剂


答案: C

230、一男性患者, 30 岁。淋雨后出现咳嗽, 咯铁锈色痰, 发热, 右侧胸痛。查体:BP 130/80mmHg, 右肺中上野叩诊实音。该患者最不可能出现下列哪种体征

- A、 右肺可闻及胸膜摩擦音
- B、 右肺触觉语颤增强
- C、 右肺可闻及管状呼吸音
- D、 肺泡呼吸音增强
- E、 呼吸浅快

答案: D

231、根据所示图像, 最可能的诊断是



- A、 左肾恶性肿瘤
- B、 左肾盂恶性肿瘤

- C、左肾囊肿
- D、左肾盂旁囊肿
- E、左肾脓肿

答案： A

232、患者,女,27岁。3个月来出现左上睑下垂,继之左眼球活动受限,3周后右上睑也下垂,说话含混不清,上述症状早上起来时较轻,下午晚上加重。查体:肌疲劳试验阳性。胸部CT示胸腺增生,血清乙酰胆碱受体抗体阳性。此患者治疗所需药物中哪一种是改善症状的对症治疗

- A、维生素
- B、免疫球蛋白
- C、免疫抑制剂
- D、皮质类固醇激素
- E、抗胆碱酯酶药物

答案： E

233、患者,男,45岁,酗酒后8小时出现中上腹疼痛,放射至两侧腰部,伴恶心、呕吐。体检腹部有压痛、肌紧张及两侧腰腹部出现蓝棕色斑,血压75/55mmHg,脉搏110次/min。最可能的诊断是

- A、急性胆囊炎
- B、急性胃炎
- C、急性肠梗阻
- D、急性胰腺炎
- E、急性胆管炎


答案： D

234、患者,男,56岁,因胸痛,发热,咳嗽3天来院就诊,1个月前有AMI史。查体:右胸腋窝下闻及胸膜摩擦音,胸骨左缘3~4肋间闻及心包摩擦音。心脏超声和X线胸片示胸腔和心包少量积液,左肺下有一片状模糊影。该患的诊断最可能是

- A、急性渗出性心包炎
- B、渗出性胸膜炎
- C、肺炎合并反应性胸膜炎
- D、心肌梗死后综合征
- E、浆膜腔积液

答案： D

235、患者,男,45岁,腹部胀痛不适,胃纳减退,体重减轻,中腹部可触肿块。影像检查如图,应诊断为



- A、急性胰腺炎
- B、慢性胰腺炎
- C、胰腺体尾部癌
- D、胰岛细胞瘤
- E、腹膜后淋巴结结核

答案: C

236、患者,女,21岁,半年前和同事一起外出游玩,因洗温泉时被同事笑话她“腿粗、没有腰”,遂开始减肥,每日仅吃早午两餐,进食少量蔬菜和奶,不吃主食和肉类,两个月内体重由56kg下降至44kg,但仍觉自己太胖。母亲很担心她的情况,强迫她吃晚餐,但有一次其母亲发现晚餐后她躲在卫生间里抠喉咙催吐。患者身高168cm,目前体重仅40.5kg,但仍诉自己胖死了。查体:皮肤菲薄、干燥,停经3个月。实验室检查示RBC $3.02 \times 10^{12}/L$, Hb 93g/L, HCT 30.8%, MCV 76.80fl, MCH 22.7pg, TBIL $29.40 \mu\text{mol}/L$, DBIL $7.60 \mu\text{mol}/L$, IBIL $21.8 \mu\text{mol}/L$ 。肝胆胰脾彩超示胆囊多发息肉样病变,胆囊炎,胆囊结石。初步诊断为:神经性厌食。此诊断属于诊断分类中的

- A、病因学诊断
- B、实验室诊断
- C、影像学诊断
- D、症状学诊断
- E、病史诊断

答案: D

237、患者,男,30岁,体检发现心尖部低调舒张期杂音,胸骨左缘第3肋间与胸骨右缘第2肋间可闻递减型舒张期杂音,血压18.6/6.7kPa相当于140/50mmHg。为明确诊断,首选的检查是

- A、心电图
- B、胸部 X 线
- C、超声心动图
- D、放射核素心室造影
- E、CT(计算机 X 线体层扫描)

答案： C

238、某患诊断慢性肺心病,近日出现尿少、腹胀,肝于右肋下 2.0cm 可及,疑有右心衰竭。下列检查中最有意义的是

- A、观察颈静脉有无怒张
- B、压迫右上腹部观察有无肝颈静脉反流征
- C、右心漂浮导管测肺动脉压
- D、测肘静脉压
- E、测尿量和比重


答案： D

239、患儿,8 个月,足月顺产,皮肤白,生后 3 个月头发渐黄,6 个月时出现发作性频发四肢抽搐。目前不认母亲,不能独坐,脑电图检查异常,本例诊断最大可能是

- A、癫痫
- B、白化病
- C、苯丙酮尿症
- D、先天性甲状腺功能低下
- E、脑发育不全

答案： C

240、患者,女,50 岁,左下颈部扪及一质硬、表面高低不平的包块,约半年,肿块逐渐增大,现感吞咽困难。如图所示 CT,最可能的诊断为



- A、甲状腺癌
- B、食管癌
- C、喉癌
- D、甲状腺原发淋巴瘤

E、 颈部神经鞘瘤

答案： A

241、患者,男,45岁,因咳嗽、发热、头痛、咽喉痛4天就诊。查体:咽红充血,体温38.5℃。白细胞 $9 \times 10^9/L$,X线胸片显示左下肺薄片状阴影,冷凝集试验(+)。最可能的诊断是

- A、 呼吸道合胞病毒肺炎
- B、 肺炎链球菌肺炎
- C、 肺炎衣原体肺炎
- D、 肺炎支原体肺炎
- E、 流感嗜血杆菌肺炎

答案： D

242、患者,男,65岁。着凉后出现发热、咳嗽、咳痰、呼吸困难。既往慢性阻塞性肺疾病病史15年。该患者不可能出现的体征是

- A、 桶状胸
- B、 听诊可闻及湿啰音
- C、 叩诊呈过清音
- D、 气管居中
- E、 管性呼吸音

答案： E

243、患儿,3岁,以“高热2天,昏迷伴抽搐1天”之主诉来院。查体:T40.2℃,深度昏迷,呼吸节律不齐,瞳孔缩小,颈项强直,脑膜刺激征阳性。血常规:WBC $22 \times 10^9/L$,N0.90,L0.10,PLT $110 \times 10^9/L$ 。下列处理哪项是错误的

- A、 快速静脉推注甘露醇
- B、 吸O₂
- C、 降温
- D、 镇静
- E、 立即腰穿送脑脊液检查

答案： E

244、患者,男,77岁,排尿不畅8年,反复发生尿潴留,多次留置导尿。查体:膀胱上界达脐下2指,直肠指诊前列腺明显增大,质韧,中间沟消失。化验血肌酐240μmol/L。下列哪项处理是错误的

- A、 先留置尿管引流
- B、 先用α受体阻滞剂改善排尿功能
- C、 应行尿动力学检查
- D、 肾功能改善后可行经尿道前列腺电切术

E、腹部B超检查

答案： B

245、患者，女，60岁，下腹持续性痛5小时，伴恶心、呕吐，病来无排便、排气，急诊就诊。查体：左、右下腹及下腹正中压痛阳性，轻度反跳痛、肌紧张，立位腹平片示：下腹少量小肠积气，并可见一处气液平面。你认为下列诊断哪项最不可能

- A、急性化脓性阑尾炎
- B、急性附件炎
- C、急性肠梗阻
- D、急性肠系膜血管缺血性疾病
- E、急性胰腺炎

答案： E

246、患者，女，25岁，妊娠26周。颈部增粗伴憋气1个月。查体：P100次/min，BP100/70mmHg。甲状腺Ⅲ度肿大，气管偏左。实验室检查：T₃、T₄高于正常。首选的治疗方法是

- A、口服甲状腺素片
- B、口服丙硫氧嘧啶
- C、外放射治疗
- D、同位素¹³¹I治疗
- E、手术治疗

答案： E

247、患者，男，30岁，海南人。10月22~25日突然出现畏寒、发热，体温38.5℃，伴有头痛、眼眶痛及眼结膜充血。自10月25日起病情突然加重，体温39℃，皮肤出现大片紫癜及淤斑，并出现黑便，粪便潜血试验阳性，血常规显示血小板数目为 $10 \times 10^9/L$ ，尿常规正常。该患者最可能感染的病原体是

- A、登革病毒
- B、汉坦病毒
- C、钩端螺旋体
- D、伤寒沙门菌
- E、脑膜炎奈瑟菌

答案： A

248、患者误服大量安定后被人发现送至医院，到达医院后查体所见：对外界刺激无如何反应，四肢肌张力低，双侧瞳孔散大，对光反射消失，双侧病理征阴性。这种意识状态最可能为

- A、深昏迷

- B、 中昏迷
- C、 浅昏迷
- D、 意识模糊
- E、 闭锁综合征

答案： A

249、患者,男,28岁,反复右下腹痛4年。在肠结核和克罗恩病的鉴别诊断中,更有助于克罗恩病诊断的是

- A、 间歇性低热
- B、 水泻
- C、 右下腹包块
- D、 病期有缓解与复发趋势
- E、 抗结核治疗1周无效

答案： D

250、患者,女,34岁。因昏迷而被送往急诊,被怀疑有药物过量服用。动脉血气:pH 7.15, HCO_3^- 28mEq/L, PCO_2 80mmHg, PaO_2 65mmHg。该患者可能发生了

- A、 急性呼吸性酸中毒并发严重的低氧血症
- B、 呼吸性碱中毒失代偿期
- C、 代谢性碱中毒部分代偿期
- D、 抽取的是静脉血
- E、 代谢性酸中毒部分代偿期

答案： A

251、十二指肠球部溃疡患者近2天来每天解成形黑便一次,量约50g,下列组合处理最佳的是

- A、 禁食,输液,冷盐水洗胃,雷尼替丁注射
- B、 流质,输液,口服去甲肾上腺素,硫糖铝
- C、 禁食,输液,注射酚磺乙胺,雷尼替丁注射
- D、 流质,输液,硫糖铝,雷尼替丁口服
- E、 禁食,输液,注射酚磺乙胺,冷盐水洗胃

答案： D

252、患者,男,40岁,目前诊断为精神分裂症,与脑器质性精神障碍最主要鉴别在于前者

- A、 自知力丧失
- B、 起病缓慢
- C、 有智力障碍
- D、 意识清醒
- E、 出现幻视

答案： D

253、患者,男,25岁。感冒后1周发生全身水肿,伴尿少、血压增高。尿RBC+/HP,尿蛋白(+++),定量检查为2.5g/24小时。白蛋白34g/L,BUN10mmol/L,Cr180 μ mol/L。不支持下列哪种疾病

- A、慢性肾炎
- B、慢性肾炎急性发作
- C、肾病综合征
- D、急性肾炎
- E、急进性肾炎

答案： C

254、患者,女,40岁。阴道不规则流血半年,进行性头痛2月。突然偏瘫,失语,失明。既往5年前患过葡萄胎。查体:子宫稍大,稍软,附件无异常。为明确诊断,首选的检查是

- A、脑脊液检查
- B、头部CT
- C、血hCG水平测定
- D、宫腔镜
- E、诊断性刮宫

答案： C

255、患者,女,30岁。妊娠3个月,甲状腺I度肿大,易激动。下列各项中除哪项外都可以作为确诊是否有甲亢的检查项目

- A、甲状腺激素结合试验
- B、甲状腺摄¹³¹I率
- C、甲状腺超声检查
- D、游离T₄指数
- E、FT₃,FT₄测定

答案： B

256、患者,女,50岁。突发头痛,逐渐加重,伴有呕吐,经对症治疗,发病后第3天头痛有所缓解。之后未予以注意,继续工作,于发病后2周出现左眼上睑下垂,左瞳孔散大,视物重影。最可能的诊断为

- A、左颈内动脉分叉部动脉瘤伴破裂出血
- B、左颈内动脉C₅段动脉瘤伴破裂出血
- C、左颈内动脉后交通动脉瘤伴破裂出血
- D、左侧眼动脉瘤伴破裂出血
- E、前交通支动脉瘤伴破裂出血

答案： C

257、患者,男,45岁,反复呕血伴黑便3年,胃镜提示食管胃底静脉曲张,腹部CT提示肝硬化、门静脉高压症,曾行多次内镜下治疗。现再次呕血急诊入院,化验提示TBIL $57\mu\text{mol/L}$,凝血酶原时间16秒,首选的治疗措施为

- A、 内镜下治疗
- B、 脾切除+贲门周围血管离断术
- C、 脾肾分流术
- D、 TIPSS
- E、 门腔静脉分流术

答案： D

258、患者,男,45岁,骑电车不小心摔倒,右脚踝局部肿胀、疼痛;X线诊断为单纯外踝撕脱骨折。外踝位于

- A、 胫骨下端内下的突起
- B、 胫骨下端外下的突起
- C、 腓骨下端的膨大
- D、 腓骨头下方缩窄的部分
- E、 腓骨上端的膨大

答案： C

259、患者,男,76岁,糖尿病史7年。中午睡觉醒来后发现右侧肢体无力,次日症状加重。查体:血压140/90mmHg,右鼻唇沟变浅,伸舌偏右,右上肢肌力3级,右下肢肌力4级,右侧上肢和面部感觉减退。心电图示房性期前收缩。该患者最可能的诊断是

- A、 脑出血
- B、 脑血栓形成
- C、 脑栓塞
- D、 颅内硬膜外血肿
- E、 脑炎

答案： B

260、患者,男,17岁,检查发现心脏杂音4年,活动时心慌、气促3年。血压130/20mmHg,主动脉瓣区舒张期杂音,心脏正位片如图所示,该患者最可能的诊断是



断是

- A、二尖瓣狭窄
- B、主动脉瓣狭窄
- C、二尖瓣关闭不全
- D、主动脉瓣关闭不全
- E、三尖瓣关闭不全

答案: D

261、患者,女,16岁,全身肿水肿1个月,血压21/14kPa(160/100mmHg),双下肢凹陷性水肿,尿检蛋白(++++) ,红细胞5个/HP,血浆白蛋白16g/L,尿FDP(+). 给予激素治疗,判断其是否对治疗敏感,最主要观察

- A、水肿减轻的程度
- B、血压下降的程度
- C、尿FDP下降的程度
- D、蛋白尿减轻的程度
- E、血尿减轻的程度

答案: D

262、患者,男,80岁。既往体健,晨练后突发左下腹痛1天,且肛门停止排便排气,不伴呕吐。查体:明显腹胀,以左下腹为甚,未扪及肿块,肠鸣音6次/min,直肠指检阴性。首先考虑的诊断是

- A、乙状结肠扭转
- B、肠套叠
- C、小肠扭转
- D、左半结肠肿瘤
- E、肠系膜血管栓塞

答案: A

263、患者,男,65岁,3年前曾行阑尾切除术。现腹痛、腹胀、停止排气排便3天,立位腹平片示右下腹可见两个小肠气液平面。应诊断为

- A、 阑尾残株炎
- B、 克罗恩病
- C、 溃疡性结肠炎
- D、 粘连性肠梗阻
- E、 胆囊炎

答案: D

264、患者,男性,32岁,近1年来进入电梯、公交车、高铁后,只要看到门一关上就立刻紧张不安,呼吸急促,心慌,故尽量回避乘坐上述工具,上下班都骑自行车,上下楼全部不行走楼梯而不坐电梯。不进入上述交通工具时则完全正常。该患者最可能的诊断是

- A、 惊恐障碍
- B、 特定恐惧
- C、 广泛性焦虑障碍
- D、 创伤后应激障碍
- E、 广场恐惧症

答案: E

265、患者,女,17岁,因患淋巴瘤而入院治疗。入院后沉默寡言,不愿和医生及其他病友接触。据父母称患者入院前性格开朗、外向。该患者目前最可能的心理问题是

- A、 焦虑
- B、 悲观
- C、 抵触
- D、 抑郁
- E、 愤怒

答案: D

266、中年女性患者,拟于体外循环下行左房黏液瘤摘除术,给予肝素抗凝,转机前ACT应

- A、 >250s
- B、 >300s
- C、 >400s
- D、 >480s
- E、 >600s

答案: D

267、患者,女,53岁,左乳外上象限扪及4cm×4cm质硬肿块,与皮肤、胸肌无粘连,左腋窝扪及数枚质硬淋巴结,左侧腋窝扪及肿大、质硬、融合的淋巴结,左侧锁骨上区扪及一枚质硬淋巴结。活检穿刺细胞学检查见癌细胞,其余体检未见异常,该乳腺癌患者按TNM分期是

- A、T₂N₂M₀
- B、T₂N₃M₀
- C、T₃N₂M₀
- D、T₃N₃M₀
- E、T₃N₂M₁

答案: B

268、患者,女,55岁,因呕吐新鲜血约1500ml入院,心率136次/min,血压73/25mmHg,四肢湿冷,表情淡漠,口唇发绀。根据微循环学说,推测患者的休克处于哪个时期

- A、微循环缺血期
- B、休克代偿期
- C、微循环淤血期
- D、微循环衰竭期
- E、微循环难治期

答案: C

269、患者,男,35岁,有肝炎史10年。近感肝区痛加重。血ALT 40U/L,AFP 100μg/ml,HBsAg(+),B超示肝右后叶内侧有4~5cm³低密度区。下一步应首先做的检查或处置是

- A、肝CT扫描
- B、血管造影
- C、腹腔镜检查
- D、手术探查
- E、1月后重复B超及AFP等检查

答案: A

270、患者,男,27岁。突发上腹痛,伴恶心、呕吐,急查尿常规红细胞满视野,白细胞5~10/HP,血常规正常。考虑右输尿管结石,最适当的急诊处理方法是

- A、大量饮水
- B、口服抗菌药物
- C、消炎,解痉,止痛
- D、ESWL
- E、手术探查

答案: C

271、应激时与糖皮质激素作用无关的是

- A、 促进蛋白质合成
- B、 抑制炎症介质和细胞因子的产生
- C、 糖皮质激素受体数目减少
- D、 维持儿茶酚胺、胰高血糖素和生长激素对脂肪的动员作用
- E、 维持循环系统对儿茶酚胺的反应性

答案： A

272、应激时糖皮质激素浓度升高的情况下出现其功能不足的原因是

- A、 促进蛋白质合成
- B、 抑制炎症介质和细胞因子的产生
- C、 糖皮质激素受体数目减少
- D、 维持儿茶酚胺、胰高血糖素和生长激素对脂肪的动员作用
- E、 维持循环系统对儿茶酚胺的反应性

答案： C

273、处于慢性应激状态容易罹患肿瘤的原因是

- A、 促进蛋白质合成
- B、 抑制炎症介质和细胞因子的产生
- C、 糖皮质激素受体数目减少
- D、 维持儿茶酚胺、胰高血糖素和生长激素对脂肪的动员作用
- E、 维持循环系统对儿茶酚胺的反应性

答案： B

274、患者,女,42岁,因皮肤黄染,伴头昏、乏力入院。查体:巩膜轻度黄染,脾肋下3cm,抗人球蛋白试验阳性,Hb70g/L,网织红细胞8%。可能的诊断是

- A、 缺血性贫血
- B、 叶酸、维生素B₁₂缺乏贫血
- C、 自身免疫性溶血性贫血
- D、 海洋性贫血
- E、 阵发性睡眠性血红蛋白尿

答案： C

275、患者,女,18岁,头昏、乏力伴月经量增多2年,血清铁6 μ mol/L,血清铁饱和度12%,血清铁结合力410 μ mol/L,血清铁蛋白7 μ g/L。可能的诊断是

- A、 缺血性贫血
- B、 叶酸、维生素B₁₂缺乏贫血
- C、 自身免疫性溶血性贫血
- D、 海洋性贫血

E、阵发性睡眠性血红蛋白尿

答案： A

276、患者,男,24岁,头昏、乏力2年,常劳累或感冒后尿液呈酱油色。查体:贫血貌,巩膜轻度黄染,肝脾不肿大,Hb65g/L,网织红细胞12%,酸溶血试验阳性。可能的诊断是

A、缺血性贫血

B、叶酸、维生素B₁₂缺乏贫血

C、自身免疫性溶血性贫血

D、海洋性贫血

E、阵发性睡眠性血红蛋白尿

答案： E

277、人工流产后月经明显减少,应选择哪项检查

A、卵巢功能检查

B、输卵管通畅试验

C、穿透力试验

D、男方精液检查

E、宫腔镜检查

答案： E

278、一不孕患者怀疑输卵管粘连,应选择哪项检查

A、卵巢功能检查

B、输卵管通畅试验

C、穿透力试验

D、男方精液检查

E、宫腔镜检查

答案： B

279、一不孕患者月经正常,女性激素测定未见异常,输卵管通畅,应选择哪项检查

A、卵巢功能检查

B、输卵管通畅试验

C、穿透力试验

D、男方精液检查

E、宫腔镜检查

答案： D

280、高K⁺性代谢性酸中毒可有

- A、 酸性尿
- B、 碱性尿
- C、 酸碱度正常尿
- D、 反常性酸性尿
- E、 反常性碱性尿

答案： E

281、低 K^+ 性代谢性碱中毒可有

- A、 酸性尿
- B、 碱性尿
- C、 酸碱度正常尿
- D、 反常性酸性尿
- E、 反常性碱性尿

答案： D

282、与体位变化有明显关系的是

- A、 典型偏头痛
- B、 普通型偏头痛
- C、 丛集性头痛
- D、 紧张性头痛
- E、 低颅压性头痛

答案： E

283、常在某一段时间内反复密集发作的是

- A、 典型偏头痛
- B、 普通型偏头痛
- C、 丛集性头痛
- D、 紧张性头痛
- E、 低颅压性头痛

答案： C

284、常伴有焦虑或抑郁症状的是

- A、 典型偏头痛
- B、 普通型偏头痛
- C、 丛集性头痛
- D、 紧张性头痛
- E、 低颅压性头痛

答案： D

285、发作前常有闪光、暗点或视野缺损等症状的是

- A、 典型偏头痛
- B、 普通型偏头痛
- C、 丛集性头痛
- D、 紧张性头痛
- E、 低颅压性头痛

答案： A

286、乙肝疫苗属于

- A、 减毒活疫苗
- B、 死疫苗
- C、 类毒素
- D、 外毒素
- E、 病原体的部分成分

答案： E

287、麻疹疫苗属于

- A、 减毒活疫苗
- B、 死疫苗
- C、 类毒素
- D、 外毒素
- E、 病原体的部分成分

答案： A

288、破伤风疫苗属于

- A、 减毒活疫苗
- B、 死疫苗
- C、 类毒素
- D、 外毒素
- E、 病原体的部分成分

答案： C

289、平静腹式呼吸时起主要作用的是

- A、 膈肌
- B、 肋间内肌
- C、 肋间外肌
- D、 腹肌
- E、 斜角肌

答案： A

290、平静胸式呼吸时起主要作用的是

- A、 膈肌
- B、 肋间内肌
- C、 肋间外肌
- D、 腹肌
- E、 斜角肌

答案： C

291、当腹部活动受限时,有助于用力呼气的是

- A、 膈肌
- B、 肋间内肌
- C、 肋间外肌
- D、 腹肌
- E、 斜角肌

答案： B

292、自己会走是

- A、 2~3 个月
- B、 4~5 个月
- C、 7~8 个月
- D、 10~11 个月
- E、 12~14 个月

答案： E

293、开始能发出“爸爸”“妈妈”等复音是

- A、 2~3 个月
- B、 4~5 个月
- C、 7~8 个月
- D、 10~11 个月
- E、 12~14 个月

答案： C

294、患者,女,25岁,已婚。发现右乳房无痛性肿块3个月,未见明显增长。肿块位于外上象限,1.5cm×1.5cm,质韧,表面光滑,活动好,腋窝淋巴结未触及。应选何种治疗

- A、 乳腺癌改良根治术
- B、 化学药物治疗
- C、 对症治疗,定期复查
- D、 肿块连同周围少量正常组织切除,病理检查
- E、 放射治疗

答案： D

295、患者,女,60岁,发现左乳房无痛性肿块月余。肿块位于外上象限,2cm×2cm,质硬,表面不光滑,与皮及深部组织无粘连,腋窝及锁骨上下触及淋巴结。患者无高血压、心肌梗死病史,血压及心电图基本正常,手术后诊为乳腺癌,可首先考虑何种治疗

- A、 乳腺癌改良根治术
- B、 化学药物治疗
- C、 对症治疗,定期复查
- D、 肿块连同周围少量正常组织切除,病理检查
- E、 放射治疗

答案: B

296、患者,女,46岁。右乳房无痛性肿块2个月,位于外上象限,2.5cm×2.5cm,质硬,表面不光滑,与皮及深部无粘连,右腋窝触及一个杏仁大淋巴结,活动,经穿刺细胞学检查诊为乳腺癌。首选的主要治疗方法是

- A、 乳腺癌改良根治术
- B、 化学药物治疗
- C、 对症治疗,定期复查
- D、 肿块连同周围少量正常组织切除,病理检查
- E、 放射治疗

答案: A

297、患者,女,47岁。双乳房胀痛8个月,月经前胀痛明显,月经来潮后胀痛减轻。双乳房外上象限触及边界不清的肿块,部分有结节,质韧,腋窝淋巴结未触及。应选择何种治疗

- A、 乳腺癌改良根治术
- B、 化学药物治疗
- C、 对症治疗,定期复查
- D、 肿块连同周围少量正常组织切除,病理检查
- E、 放射治疗

答案: C

298、帕金森病的病变部位是

- A、 黑质、黑质纹状体通路
- B、 纹状体、大脑皮质,脑干、小脑等
- C、 豆状核
- D、 尾状核加壳核
- E、 丘脑底核

答案: A

299、舞蹈样动作的病变部位是

- A、 黑质、黑质纹状体通路
- B、 纹状体、大脑皮质,脑干、小脑等
- C、 豆状核
- D、 尾状核加壳核
- E、 丘脑底核

答案： D

300、扭转痉挛的病变部位是

- A、 黑质、黑质纹状体通路
- B、 纹状体、大脑皮质,脑干、小脑等
- C、 豆状核
- D、 尾状核加壳核
- E、 丘脑底核

答案： C

1、肺心病时,下列哪种病变最不容易见到

- A、 肺动脉圆锥膨隆
- B、 心尖钝圆、肥厚,主要由右心室构成
- C、 心脏横径增大,形成横位心
- D、 室上嵴增厚、增粗
- E、 右心室向心性肥大

答案: E

2、急性肝衰竭的治疗措施中,下列哪项不可取

- A、 选用泻剂或乳果糖,限制蛋白摄入
- B、 限制水分摄入,调整电解质酸碱失衡
- C、 利用甘露醇,降低颅内压
- D、 抗感染治疗
- E、 腹膜透析

答案: E

3、内脏痛最主要的特点是

- A、 尖锐的刺痛
- B、 潜伏期和持续时间长
- C、 定位不明确
- D、 伴有情绪和心血管反应
- E、 对牵拉性刺激不敏感

答案: C

4、营养不良患儿皮下脂肪消失的顺序是

- A、 面颊—腹部—胸背—臀部—四肢
- B、 胸背—臀部—四肢—腹部—面颊
- C、 腹部—胸背—臀部—四肢—面颊
- D、 腹部—面颊—胸背—臀部—四肢
- E、 胸背—臀部—四肢—面颊—腹部

答案: C

5、透析3年的患者的饮食治疗原则是

- A、 低脂、优质高蛋白、低磷
- B、 低脂、优质低蛋白、高磷

- C、 低脂、优质低蛋白、低磷
- D、 高热量、高蛋白、高磷
- E、 高热量、优质低蛋白、正常磷

答案： A

6、儿童能量代谢中特有的是

- A、 基础代谢
- B、 生长所需
- C、 食物热力作用
- D、 排泄消耗
- E、 活动消耗

答案： B

7、脑出血后显示典型 CT 图像和时间为

- A、 病后即示高密度病灶
- B、 病后 24~48h 示高密度病灶
- C、 病后即示低密度病灶
- D、 病后 24~48h 示低密度病灶
- E、 病后 2~3 周示高密度病灶

答案： A

8、关于神经症的流行病学情况,下面说法正确的是

- A、 国内报道患病率在 5%左右
- B、 不属于高发疾病
- C、 男性高于女性
- D、 以 20~30 岁年龄段患病率最高
- E、 国内 1982 年流调资料患病率为 2.2%

答案： E

9、关于后纵隔肿瘤,下列不正确的是

- A、 多为神经源性肿瘤
- B、 可出现神经压迫症状
- C、 胸部 CT 可显示肿瘤与邻近组织器官的关系
- D、 放射性核素 ^{131}I 扫描有助于鉴别诊断
- E、 可以出现吞咽困难

答案： D

10、糖尿病治疗原则是

- A、 早期,长期,饮食疗法,防治并发症

- B、 长期, 综合, 药物治疗, 改善患者生活质量
- C、 早期, 综合, 血糖监测, 糖尿病教育
- D、 早期, 长期, 综合, 治疗措施个体化
- E、 长期治疗, 消除糖尿病症状, 治疗措施个体化, 饮食控制

答案: D

11、关于卵泡的发育过程, 下列哪项错误

- A、 卵巢皮质内的绝大多数卵泡未发育至成熟便退化、成为闭锁卵泡
- B、 原始卵泡逐渐发育至成熟卵泡
- C、 成熟卵泡破裂排出卵细胞
- D、 卵子未受精、黄体退化
- E、 排卵后白体形成、并逐步转变成黄体

答案: E

12、恙虫病病原体分离的方法为

- A、 取标本血培养, 涂片染色鉴定
- B、 取标本骨髓培养, 涂片染色鉴定
- C、 取标本大便培养, 涂片染色鉴定
- D、 取标本小便培养, 涂片染色鉴定
- E、 取标本接种于小白鼠腹腔内, 涂片染色鉴定

答案: E

13、残疾者最常见的心理行为问题是

- A、 焦虑不安
- B、 自卑抑郁
- C、 忧虑担心
- D、 愤怒不平
- E、 恐惧害怕

答案: B

14、血管炎综合征中最常见的为

- A、 过敏性紫癜
- B、 川崎病
- C、 风湿热
- D、 类风湿
- E、 皮炎

答案: A

15、慢性型免疫性血小板减少性紫癜多见于

- A、 妇女、多胎妊娠者
- B、 婴幼儿
- C、 儿童
- D、 青年女性
- E、 青年男性

答案： D

16、肝性昏迷患者昏迷期最适宜的饮食是

- A、 高热,高碳水化合物,高维生素,低蛋白质
- B、 高热,高糖,低脂,低盐低蛋白质
- C、 高热,高糖,高维生素,无蛋白质流汁食物
- D、 高热,高糖,高蛋白,少纤维食物
- E、 高热,高糖,高维生素,低脂,少量蛋白质食物

答案： C

17、下面对去皮质综合征描述错误的是

- A、 是大脑皮质广泛性病变导致的神经功能障碍
- B、 皮质下功能通常保留
- C、 可表现为貌似清醒
- D、 可保持觉醒-睡眠周期
- E、 喂食后可有有目的的咀嚼

答案： E

18、某患者复钙试验延长,吸附血浆能纠正,贮存血清不能纠正,最可能的诊断是

- A、 因子Ⅵ缺乏
- B、 因子Ⅶ缺乏
- C、 因子Ⅷ缺乏
- D、 因子Ⅸ缺乏
- E、 因子Ⅹ缺乏

答案： C

19、腹外斜肌腱膜形成的结构不包括

- A、 耻骨梳韧带
- B、 腹股沟管皮下环
- C、 联合腱
- D、 腹白线
- E、 腔隙韧带

答案： C

20、白细胞分类计数时,应在油镜下选择哪个部位有秩序地检查

- A、涂片头体部染色较好处
- B、涂片体、尾交界处染色较好处
- C、涂片体部染色较好处
- D、涂片尾部染色较好处
- E、涂片的两侧染色较好处

答案: B

21、由于血型不匹配输血引起的溶血性黄疸,其特点是

- A、尿胆红素阴性
- B、尿胆素原下降
- C、粪胆素原下降
- D、血清结合胆红素明显升高
- E、血清未结合胆红素下降

答案: A

22、心房颤动最多见于

- A、冠心病
- B、风心病二尖瓣狭窄
- C、高血压性心脏病
- D、缩窄性心包炎
- E、扩张性心脏病

答案: B

23、疑为冠心病心绞痛最可靠的确诊手段为

- A、静息心电图
- B、动态心电图
- C、超声心动图
- D、心肌酶学检查
- E、冠状动脉造影

答案: E

24、肱骨外上髁炎首选的治疗方法是

- A、加强功能锻炼
- B、局部封闭
- C、肘关节制动
- D、抗生素消炎
- E、手术治疗

答案: B

25、肾功能急骤恶化,尿素氮及血肌苷呈进行性升高、贫血,符合何种病表现

- A、 肾病综合征
- B、 急性肾小球肾炎
- C、 慢性肾小球肾炎
- D、 急进性肾炎
- E、 慢性肾衰竭

答案: D

26、为诊断子宫内膜癌,作分段诊刮术,下列操作最正确的是

- A、 先探宫腔,再分别取四壁的子宫内膜
- B、 先作宫颈活检,再探宫腔后,取子宫内膜
- C、 先取宫颈管内膜,再探宫腔后,取子宫内膜
- D、 先刮取子宫内膜,然后探宫腔
- E、 先刮颈管内膜,再刮宫腔内膜,最后探宫腔

答案: C

27、颅底骨折的诊断主要是依据

- A、 颅底 X 线片
- B、 CT
- C、 MRI
- D、 PET
- E、 临床表现

答案: E

28、对于垂体的描述,哪项是错误的

- A、 位于蝶骨体上面的垂体窝内
- B、 借漏斗向上连于下丘脑
- C、 可分为腺垂体和神经垂体两部分
- D、 神经垂体可分泌垂体素
- E、 腺垂体可分泌多种激素

答案: D

29、内侧丘系描述正确的是

- A、 发自脊髓胸核
- B、 发自薄束核和楔束核
- C、 是交叉前的纤维
- D、 终于同侧上丘核
- E、 传导躯干四肢的温、痛觉

答案: B

30、下面关于镇静催眠药的说法错误的是

- A、 主要有两大类:巴比妥类和苯二氮卓类
- B、 此类药物能抑制中枢神经系统的活动
- C、 巴比妥类较苯二氮卓类安全性好
- D、 中毒症状表现与醉酒状态相似
- E、 突然停药会导致戒断症状

答案: C

31、下列哪项是前列腺增生的手术指征

- A、 前列腺体积大于 40ml
- B、 膀胱残余尿 30ml
- C、 最大尿流率 16ml/s
- D、 尿动力提示膀胱逼尿肌功能减退
- E、 反复血尿,5 α 还原酶抑制剂治疗无效

答案: E

32、滑车神经麻痹出现

- A、 眼球向内下运动受限
- B、 眼球向外上运动受限
- C、 眼球向外下运动受限
- D、 眼球向内上运动受限
- E、 眼球向下运动受限

答案: C

33、不引起弥散量下降的是

- A、 COPD
- B、 肺结核
- C、 IPF
- D、 弥漫性肺泡出血
- E、 气胸

答案: D

34、与麻疹患者密切接触后的易感者应尽早采取的措施是

- A、 注射抗毒素
- B、 接种麻疹疫苗
- C、 服用抗生素
- D、 注射丙种球蛋白
- E、 服用中草药

答案: D

35、下列哪项不是洋地黄中毒的易发原因

- A、 严重心力衰竭
- B、 低钾血症
- C、 低钙血症
- D、 心肌炎
- E、 肾功能不全

答案： C

36、关于子宫肌瘤,下述正确的是

- A、 肌瘤组织中雌孕激素受体含量正常
- B、 肌瘤组织中雌、孕激素受体含量较低
- C、 肌瘤组织中雌孕激素受体含量较高
- D、 肌瘤组织中仅雌激素受体含量较低
- E、 肌瘤组织中仅孕激素受体含量较低

答案： C

37、充盈膀胱与卵巢囊肿最有鉴别意义的体征是

- A、 囊性感与实体感
- B、 有无移动性浊音
- C、 触诊形态
- D、 按之有无尿意
- E、 排尿或导尿后肿块体积变化

答案： E

38、下列哪项不是感染性发热的热型

- A、 稽留热
- B、 伪装热
- C、 回归热
- D、 间歇热
- E、 弛张热

答案： B

39、失血性休克患者,就诊后首选的治疗方案是

- A、 间羟胺(阿拉明)10mg 加入 5%葡萄糖溶液 100ml, 静脉滴注
- B、 毛花苷 C 0.4mg, 缓慢静脉注射
- C、 等渗盐水 1500ml, 45 分钟内静脉输入
- D、 5%碳酸氢钠 200ml, 静脉滴注
- E、 甲泼尼龙 1.8g 加入 5%葡萄糖溶液 100ml, 静脉滴注

答案： C

40、甲氨蝶呤抗代谢作用机制是

- A、 阻止嘧啶核苷酸合成
- B、 抑制 DA 多聚酶
- C、 抑制二氢叶酸还原酶
- D、 抑制核苷酸还原酶
- E、 抑制拓扑异构酶

答案： C

41、左膈下脓肿最常见的原因是

- A、 十二指肠溃疡穿孔
- B、 胆囊炎
- C、 阑尾穿孔
- D、 脾脓肿
- E、 胃溃疡穿孔

答案： E

42、HIV 感染后, 导致机体免疫功能受损, 下列哪项不是主要机制

- A、 病毒感染对 T 细胞的直接破坏
- B、 被感染 T 细胞膜因其表达 gp120, 而与其他细胞相互融合, 细胞被破坏
- C、 HIV 可以感染干细胞, 使免疫细胞生成减少
- D、 HIV 感染 B 细胞, 能使其大量破坏, 抗体生成减少
- E、 单核-吞噬细胞功能受损

答案： D

43、下列符合进行性血胸的表现的是

- A、 输血补液后血压可以维持
- B、 血红蛋白, 红细胞计数和血细胞比容变化不大
- C、 脉搏增快, 血压正常
- D、 胸膜腔引流量 1 小时超过 200ml
- E、 胸穿刺抽不出血液, X 线检查显示胸膜腔阴影继续增大

答案： E

44、下列肿瘤中最容易经血道转移的是

- A、 宫颈鳞状细胞癌
- B、 肠黏液腺癌
- C、 乳腺浸润性导管癌
- D、 绒毛膜癌
- E、 肺大细胞癌

答案： D

45、针对基本转录因子 TF II D 成分 TBP 设计的抑制剂可抑制下列哪个过程

- A、 DNA 复制
- B、 转录后加工
- C、 翻译
- D、 翻译后加工
- E、 转录

答案： E

46、关于生物氧化能量的释放, 正确的是

- A、 生物氧化过程中总能量变化与反应途径无关
- B、 生物氧化过程中总能量变化与反应途径有关
- C、 胞液是生物氧化和产能的主要部位
- D、 只能通过氧化磷酸化生成 ATP
- E、 生物氧化释放的能量只能用来产热供能

答案： A

47、间日疟、三日疟与一般恶性疟常用的治疗方案是

- A、 氯喹+乙胺嘧啶
- B、 氯喹+伯氨喹
- C、 青蒿素+奎宁
- D、 奎宁+伯氨喹
- E、 奎宁+乙胺嘧啶

答案： B

48、婴儿维生素 D 缺乏性手足搐搦症最常见的症状是

- A、 惊厥
- B、 喉痉挛
- C、 癫痫发作
- D、 屏气发作
- E、 震颤

答案： A

49、下述物质收缩血管的作用最强的是

- A、 血管紧张素
- B、 内皮素
- C、 白三烯
- D、 TXA_2
- E、 PGI_2

答案： B

50、活跃期延长是指时间超过

- A、 2 小时
- B、 4 小时
- C、 8 小时
- D、 10 小时
- E、 12 小时

答案： C

51、处方由调剂处方药品的医疗机构妥善保存。普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限是

- A、 半年
- B、 1 年
- C、 2 年
- D、 3 年
- E、 4 年

答案： B

52、酶促反应速率 V 达到最大反应速率 $V_{\max}$ 的 80% 时, 底物浓度 $[S]$ 为

- A、 $1K_m$
- B、 $2K_m$
- C、 $3K_m$
- D、 $4K_m$
- E、 $5K_m$

答案： D

53、伤寒患者肥达反应试验阳性常开始于病程的

- A、 第 1 周
- B、 第 2 周
- C、 第 3 周
- D、 第 4 周
- E、 第 5 周

答案： A

54、内脏大神经

- A、 属于副交感神经节前纤维
- B、 属于交感神经节前纤维
- C、 属于交感神经节后纤维
- D、 属于内脏感觉纤维
- E、 属于副交感节后纤维

答案： B

55、下列哪项不是血液性缺氧时缺氧的机制

- A、 血红蛋白与氧的亲合力增高
- B、 毛细血管床的平均氧分压降低
- C、 组织利用氧的能力降低
- D、 血红蛋白与氧的亲合力降低
- E、 血红蛋白的数量减少

答案： C

56、战场上某战士受伤昏迷,战友准备将其运下火线,搬运原则错误的是

- A、 多采用担架或徒手搬运
- B、 缺乏搬运工具时,必须就地取材
- C、 为了保持呼吸道通畅,搬运时可采用半卧位或侧卧位
- D、 必须防避敌人火力
- E、 对脊柱损伤者,由于情况紧急,应采用搂抱的搬运方法

答案： E

57、对于子宫破裂的预防,下列哪项不恰当

- A、 严格缩宫素引产指征
- B、 健全三级保健网,宣传孕妇保健知识
- C、 做好产前检查,及时发现胎位异常
- D、 密切观察产程,避免忽略性肩难产发生
- E、 为避免子宫破裂发生,多采用剖宫产

答案： E

58、有关 HIV 感染临床 II 期的描述,下列哪项是错误的

- A、 没有任何临床症状
- B、 血中检测不出 HIV
- C、 血中检不出 gp120 及 gp41
- D、 有传染性
- E、 血中检出 p24 抗体

答案： B

59、肝硬化患者糖代谢障碍的常见模式是

- A、 低血糖
- B、 空腹血糖增高
- C、 糖耐量减退
- D、 糖耐量正常

E、血清胰岛素水平降低

答案： C

60、肺气肿患者

A、肺弹性阻力增大

B、吸气困难明显

C、呼气困难明显

D、吸气时程延长

E、呼气时程缩短

答案： C

61、主动脉瓣关闭不全的心脏 X 线表现为

A、心影正常

B、心影烧瓶样

C、心影呈梨形心

D、心影呈普大形

E、心影呈靴形心

答案： E

62、诊断气胸最重要的检查方法是

A、支气管镜

B、肺功能检查

C、胸部 B 超

D、胸腔内侧压

E、X 线胸片检查

答案： E

63、脾切除术短期内可取得明显疗效的疾病是

A、自身免疫性溶血性贫血

B、地中海贫血

C、慢性粒细胞白血病

D、丙酮酸激酶缺乏症

E、遗传性球形红细胞增多症

答案： E

64、体外实验中,用葡萄糖逐渐替代浸浴液中的 Na^+ ,神经元或神经纤维动作电位的幅度将

A、逐渐增大

B、逐渐减小

- C、 不发生改变
- D、 先增大后减小
- E、 先减小后增大

答案： B

65、对发现肝癌子瘤和瘤栓有价值的检查是

- A、 肝血管造影
- B、 B 超
- C、 CT
- D、 MRI
- E、 数字减影肝动脉造影 (DSA)

答案： D

66、IgA 肾病的最显著特点是

- A、 血清 IgA 水平增高
- B、 复发性血尿
- C、 弥漫性系膜增多
- D、 系膜区 IgA 沉积
- E、 血清 C3 下降

答案： D

67、关于肛管的叙述, 错误的是

- A、 以齿状线区分内、外痔
- B、 白线是肛门内、外括约肌的分界线
- C、 肛窦易积存粪便
- D、 肛直肠线为肛柱下端的连线
- E、 在齿状线下方有一宽约 1cm 的环形区为肛梳

答案： D

68、骨肉瘤是指

- A、 骨原发性的恶性肿瘤, 有反应性骨质增生
- B、 肉瘤细胞直接形成肿瘤性骨样组织或骨组织的肿瘤
- C、 骨组织起源的肉瘤
- D、 骨组织中肉瘤的总称
- E、 骨组织来源的未分化肿瘤

答案： B

69、关于臂丛神经正确的描述是

- A、 位于腋窝内的是臂丛锁骨上部

- B、 下、中干的后股合成后束
- C、 上、中干的前股合成外侧束
- D、 下、中干的前股合成内侧束
- E、 3 个束先位于腋动脉的第 1 段的外侧

答案： C

70、下列哪项提示存在意识障碍

- A、 诉凭空听见骂自己的声音
- B、 滔滔不绝, 说话难以打断
- C、 看见地上的绳子以为是蛇
- D、 感觉体内有虫子在爬
- E、 感觉自己的手臂变长了

答案： C

71、单纯性肥胖患儿一般不会发生下列哪种情况

- A、 高血压
- B、 孤僻自卑等心理障碍
- C、 肥胖-换气不良综合征
- D、 营养性贫血
- E、 低生长激素血症

答案： D

72、关于精神病学的学科地位, 以下哪种说法正确

- A、 精神病学是生物医学的分支学科
- B、 精神病学是行为医学的分支学科
- C、 精神病学是社会科学的分支学科
- D、 精神病学是临床医学的分支学科
- E、 精神病学是心理学的分支学科

答案： D

73、关于小红细胞常见于以下情况, 但应除外

- A、 缺铁性贫血
- B、 小细胞低色素性贫血
- C、 铁粒幼细胞性贫血
- D、 遗传性球形细胞增多症
- E、 巨幼细胞性贫血

答案： E

74、外显子是指

- A、 基因表达中的调控序列
- B、 DNA 链中的断裂基因
- C、 能够被翻译的编码序列
- D、 修饰时被剪除
- E、 不能转录的序列

答案： C

75、患者,女,35岁。半年前弯腰提物时突然腰痛,并向左侧臀部放射。查体:腰椎凸向左侧,腰活动困难,左侧腰骶部压痛,直腿抬高 30° 阳性。X 线片示腰椎向左侧弯曲。可诊断为

- A、 棘间韧带损伤
- B、 急性腰肌损伤
- C、 腰椎类风湿关节炎
- D、 腰椎间盘突出
- E、 腰椎管狭窄

答案： D

76、下列哪项数值描述是错误的

- A、 初生新生儿 Hb 110g/L 为中度贫血
- B、 新生儿血容量约占体重的 10%, 平均 300ml
- C、 婴儿期网织红细胞较成人高, 约为 0.04~0.06
- D、 1 岁时 HbF<0.05
- E、 小儿血小板数与成人相似, 约为 $(150\sim250)\times10^9/L$

答案： C

77、下列哪项不是败血症易发的诱因

- A、 中性粒细胞减少或缺乏
- B、 长期应用广谱抗菌药物
- C、 短期小剂量应用肾上腺皮质激素
- D、 人工呼吸机的应用
- E、 严重的原发基础病

答案： C

78、下列哪项不属于美国疾病控制与预防中心()关于 HIV 感染分类的IV期表现

- A、 慢性淋巴性间质性肺炎
- B、 持续性全身淋巴结肿大综合征
- C、 进行性痴呆
- D、 卡氏肺孢子虫

E、 体质性疾病

答案 B

答案： CD

79、交替脉常见于

A、 心包积液

B、 肺源性心脏病

C、 左心衰竭

D、 休克

E、 伤寒

答案： C

80、斑疹伤寒首选哪种抗生素治疗

A、 四环素

B、 红霉素

C、 庆大霉素

D、 氯霉素

E、 头孢拉定

答案： A

81、关于狭颅症治疗的叙述不正确的是

A、 手术治疗可切除过早闭合的骨缝

B、 手术治疗可切除大骨块以达到减压和有利于脑的发育

C、 出现视神经萎缩和智能障碍, 施行手术功能就能恢复

D、 出生后 6 个月以内手术者预后较好

E、 手术越早效果越好

答案： C

82、正常骨产道的特点是

A、 站立时骨盆入口平面与地面平行

B、 骨盆轴的上段向下向后, 中段向下, 下段向下向前

C、 最短的横径是骨盆入口平面横径

D、 最短的前后径是中骨盆前后径

E、 对角径等于入口前后径

答案： B

83、线粒体外脂肪酸合成的限速酶是

A、 脂酰 CoA 合成酶

B、 乙酰 CoA 羧化酶

- C、肉碱脂酰转移酶 I
- D、肉碱脂酰转移酶 II
- E、 β -酮脂酰还原酶

答案： B

84、治疗休克的首要措施是

- A、补充血容量
- B、去除休克病因
- C、纠正酸中毒
- D、应用缩血管升压药
- E、应用心脏兴奋剂

答案： A

85、肝癌淋巴结转移最多的是

- A、肝门淋巴结
- B、胰旁淋巴结
- C、胃旁淋巴结
- D、主动脉旁淋巴结
- E、锁骨上淋巴结

答案： A

86、骨折愈合的最终阶段应是

- A、骨性骨痂形成
- B、骨改建
- C、纤维性骨痂连接
- D、骨样组织中有钙盐沉着
- E、完成了软骨化骨过程

答案： B

87、牛乳中所含的糖类主要为

- A、甲型乳糖
- B、乙型乳糖
- C、麦芽糖
- D、葡萄糖
- E、寡糖

答案： A

88、肾实质的结构不包括

- A、肾锥体

- B、 肾乳头
- C、 肾小盏
- D、 乳头孔
- E、 肾柱

答案： C

89、消化性溃疡的预防措施中, 错误的是

- A、 戒除烟酒
- B、 避免服用对胃有刺激的药物
- C、 消除胆汁反流
- D、 呋喃唑酮维持量, 预防复发
- E、 在好发季节特别注意有规律的饮食起居

答案： D

90、首过消除主要发生在

- A、 口服给药
- B、 肌肉注射
- C、 静脉注射
- D、 直肠给药
- E、 吸入给药


答案： A

91、下列不属于原发性肾小球疾病的是

- A、 慢性肾小球肾炎
- B、 急性肾小球肾炎
- C、 紫癜性肾炎
- D、 急进性肾小球肾炎
- E、 微小病变型肾病综合征

答案： C

92、良性前列腺增生最主要的症状是



- A、 血尿
- B、 尿潴留
- C、 尿频
- D、 进行性排尿困难
- E、 尿失禁

答案： D

93、关于脾功能亢进正确的是

- A、 仅见于门静脉高压引起代偿性脾大
- B、 巨脾仅见于血吸虫病性肝硬化
- C、 周围血细胞减少唯一原发因素是由于脾脏破坏过多所致
- D、 临床主要表现为红细胞降低明显
- E、 脾切除效果良好,可使周围血象不同程度地恢复

答案： E

94、风湿性心脏病产生二尖瓣关闭不全的病理改变应除外

- A、 瓣膜卷缩、增厚
- B、 瓣膜交界融合
- C、 瓣膜面积缩小
- D、 瓣环扩大
- E、 瓣叶活动受限制

答案： B

95、肝功能受损害时避免使用下列药物,但除外

- A、 四环素
- B、 氯霉素
- C、 两性霉素 B
- D、 青霉素类和头孢菌素类
- E、 磺胺类药物

答案： D

96、下列哪项不属于肾前性少尿的病因

- A、 重度失水
- B、 消化道大出血
- C、 肝肾综合征
- D、 心功能不全
- E、 慢性肾炎

答案： E

97、1 岁小儿的体格发育应达到以下指标,但有一项除外

- A、 体重 9kg
- B、 身长 75cm
- C、 头围 49cm
- D、 出牙 6 只
- E、 腕部 X 线出现骨化中心二个

答案： C

98、有关 LDL 的叙述, 不正确的是

- A、 富含 ApoA- I 和 apoB100
- B、 可经受体途径降解
- C、 胆固醇和胆固醇酯含量丰富
- D、 主要在肝脏降解
- E、 由 VLDL 转变生成

答案： A

99、下列哪个疾病最适合采用厌恶疗法

- A、 焦虑症
- B、 肥胖症
- C、 强迫症
- D、 恐惧症
- E、 酒瘾者

答案： E

100、与休克微循环淤血期微循环后阻力增加无关的是

- A、 血流变慢
- B、 NO 产生减少
- C、 红细胞聚集
- D、 白细胞贴壁
- E、 血小板黏附聚集

答案： B

101、急性渗出性心包炎最突出的症状是

- A、 胸痛
- B、 吞咽困难
- C、 上腹闷胀
- D、 呼吸困难
- E、 声音嘶哑

答案： D

102、妊娠期贫血诊断标准是

- A、 妊娠期贫血的诊断同非妊娠妇女
- B、 我国的诊断标准为 $Hb < 110g/L$, $RBC < 3.5 \times 10^{12}/L$
- C、 妊娠期贫血的程度一般分为 3 度
- D、 中度贫血: $RBC (2.0 \sim 3.0) \times 10^{12}/L$, $Hb 61 \sim 90g/L$
- E、 血细胞比容 < 0.3 可以诊断妊娠期贫血

答案: E

103、副交感神经的低级中枢位于

- A、 间脑和骶 2~4 脊髓节段
- B、 脑干和胸 1~腰 2 脊髓节段
- C、 脑干和骶 2~4 脊髓节段
- D、 胸 1~腰 3 脊髓节段
- E、 脑干

答案: C

104、急性硬膜下血肿 CT 检查多表现为

- A、 双凸镜形密度增高影
- B、 新月形密度增高影
- C、 新月形等密度影
- D、 新月形密度减低影
- E、 圆形密度增高影


答案: B

105、应激时儿茶酚胺释放增多对机体有利的影响包括

- A、 心率减慢
- B、 腹腔内脏血管扩张
- C、 支气管收缩, 口径变小
- D、 促进糖原合成
- E、 血液重新分布

答案: E

106、患者, 女, 53 岁, 右侧轻度腰背酸痛, 行 CT 检查, 如图所示, 可能的诊断为



- A、 右肾上腺髓样脂肪瘤
- B、 右肾上腺腺瘤
- C、 右肾上腺嗜铬细胞瘤

- D、 右腹膜后脂肪瘤
- E、 右肾血管平滑肌脂肪瘤

答案： A

107、患者,男,24岁,是一位木工,遭受了整个小指的挤压伤。下列哪一种肌最有可能幸免

- A、 指深屈肌
- B、 指伸肌
- C、 骨间掌侧肌
- D、 骨间背侧肌
- E、 蚓状肌

答案： D

108、患者,男,62岁。患高血压6年余,近1月来血压经常持续在22.1/13kPa()左右。因在院外治疗效果不明显来我院门诊。有明确阳性家族史。经全面检查诊断为高血压病。对该患者病情的预后判断,下列说法错误的是

- A、 可能经历一个良性缓慢性过程
- B、 不易发生心力衰竭
- C、 病情进展可引起心脑血管并发症
- D、 存在冠心病的危险因素
- E、 其死因以脑血管意外为最多

答案 B

答案：

109、患者,男,64岁。因头晕黑蒙1年来诊。查体:心率42次/min,心律整齐,心音强弱不等,可及大炮音。该患者考虑

- A、 二尖瓣狭窄
- B、 三度房室传导阻滞
- C、 高血压
- D、 主动脉瓣狭窄
- E、 频发室性期前收缩

答案： B

110、患者,女,30岁,持续高血压3年,常为23.9~25.3/14.6~16kPa(),感四肢无力,麻木,尿量增多。为确诊高血压的原因,最有价值的检查是

- A、 血儿茶酚胺测定
- B、 血钾,尿钾测定
- C、 尿VMA测定

- D、 血糖, 尿糖
- E、 血清 T₃, T₄, TSH

答案 B

答案:

111、初产妇, 24 岁, 孕足月。第二产程 2 小时 30 分钟, 胎盘娩出后, 有间歇性阴道出血并有血块排出, 量超过 500ml, 查体: 子宫轮廓不清。首先应考虑为

- A、 阴道静脉破裂
- B、 凝血机制障碍
- C、 胎盘残留
- D、 宫颈裂伤
- E、 子宫收缩乏力

答案: E

112、患儿, 7 个月, 腹泻已 3~4 天, 每天大便次数为 8~9 次, 呈稀水样, 伴呕吐 1~2 次/日。入院体检呈中度脱水, 皮肤略干燥, 弹性差, 心音低钝, 此患儿入院时最重要的处理是

- A、 调整与适当限制饮食
- B、 纠正水、电解质紊乱
- C、 控制肠内外感染
- D、 给止吐药
- E、 给消化药

答案: B

113、患者, 女, 53 岁。发作性眩晕 3 小时。患者于转头后突然出现眩晕, 四肢无力, 摔倒在地, 四肢无法活动, 持续约 5 分钟后恢复正常, 无大小便失禁。发作时查体: 血压 145/91mmHg, 神志清, 四肢肌力 0 级, 肌张力低。间歇期查体无异常, 脑电图正常。该患者最可能的诊断是

- A、 癫痫
- B、 短暂脑缺血发作
- C、 位置性眩晕
- D、 高血压脑病
- E、 癔症

答案: B

114、患者, 男, 58 岁, 4 月前滑倒右手撑地造成右桡骨远端粉碎骨折。经闭合复位后石膏固定, 今日拆除石膏后发现右手诸手指屈伸均明显受限, 主要原因为

- A、 骨折时合并正中神经、尺神经损伤
- B、 骨折时合并右手屈伸肌腱损伤

- C、石膏压迫引起右手缺血挛缩
- D、石膏固定后右手指锻炼不够, 关节僵硬
- E、骨折时合并右手诸关节的损伤

答案: D

115、患者, 女, 58 岁。患有慢性阻塞性肺疾病 15 年, 加重 1 周入院。入院时神志清楚, 动脉血气分析示 $\text{PaCO}_2 50\text{mmHg}$, $\text{PaO}_2 45\text{mmHg}$ 。吸入 40% 浓度氧后, 患者呼之不应, 查动脉血气分析示 $\text{PaCO}_2 90\text{mmHg}$, $\text{PaO}_2 75\text{mmHg}$ 。患者出现意识障碍的原因是

- A、感染加重
- B、气道阻力增加
- C、呼吸中枢受到抑制
- D、脑血管意外
- E、感染中毒性脑病

答案: C

116、患者, 男, 21 岁, 干咳、盗汗 1 个月伴消瘦, CT 如图。应先考虑为



- A、右上肺结核并纵隔淋巴结核
- B、纵隔型肺癌并纵隔淋巴结核转移
- C、淋巴瘤
- D、右上肺上沟瘤
- E、右上肺不张

答案: A

117、伤员左胸挤压伤, 伤后出现呼吸困难, 气管右移, 左胸部广泛皮下气肿, 左侧呼吸音消失, $\text{BP} 16/9.33\text{kPa}$ (), 考虑诊断是

- A、外伤性血胸
- B、血心包
- C、脓胸
- D、肋骨骨折
- E、张力性气胸

答案 E

答案:

118、某年秋季,山西某地连续报告流行性乙型脑炎病例数十例,病例呈散发,主要集中于农村地区,以下对该病的最主要预防措施是

- A、 隔离乙脑感染病人
- B、 人群注射 Sabin 疫苗
- C、 人群注射 Salk 疫苗
- D、 对流行区幼猪进行疫苗接种
- E、 防鼠灭鼠

答案: D

119、患者,男,25岁,反复水肿、蛋白尿,最近1周出现发热、腰痛、尿频、尿急,尿蛋白3g/d,尿红细胞5~10个/HP,尿白细胞6~12个/HP,尿培养为肠道球菌。最恰当的治疗是

- A、 先按肾小球肾炎治疗
- B、 先按肾盂肾炎治疗
- C、 肾小球肾炎、肾盂肾炎同时兼治
- D、 只用支持疗法
- E、 只用对症疗法

答案: B

120、患者,女,36岁。以“右侧耳后痛2天,口角向左歪斜1天”为主诉来诊。查体:面部感觉正常,无眼震,四肢肌力正常。最可能伴有的体征为

- A、 右侧眼睑闭合不能
- B、 左侧眼睑闭合不能
- C、 左侧眼球外展受限
- D、 右眼球外展受限
- E、 两眼向右凝视障碍

答案: A

121、孕妇,33岁,妊娠25周,阴道分泌物CT培养阳性。其感染的组织层次为

- A、 柱状上皮
- B、 鳞状上皮
- C、 浅肌层
- D、 真皮层
- E、 基底层

答案: A

122、年轻女性,反复发作咳嗽、胸闷 4 年,常在春夏之交发作,夜间重,并有鼻痒、喷嚏等症。听诊双肺较多干性啰音,呼气延长。最可能的诊断为

- A、 肺气肿
- B、 气胸
- C、 胸腔积液
- D、 支气管哮喘
- E、 慢性支气管炎

答案: D

123、患者,男,67 岁,诊断慢性酒精中毒所致 Wernicke 脑病,治疗首选

- A、 氧疗
- B、 维生素 B₁
- C、 维生素 B₂
- D、 甘露醇
- E、 纳洛酮

答案: B

124、患者,女,59 岁,发现蛋白尿 20 年,肌酐升高 5 年余。患者目前进行血液透析,每周 2 次。为防止透析器堵塞,应选择的抗凝药物是

- A、 水蛭素
- B、 链激酶
- C、 华法林
- D、 肝素
- E、 阿司匹林

答案: D

125、患者,男,27 岁,有高血压,高脂血症病史多年。近几个月来,反复心前区疼痛,每次持续 10 余分钟,需进一步检查。以下检查不必要的是

- A、 心电图
- B、 心电图负荷试验
- C、 超声心动图
- D、 血脂测定
- E、 心脏 CT 检查

答案: E

126、患者,女,55 岁。因门静脉高压、呕血、黑便入院治疗,可用的药物是

- A、 去甲肾上腺素
- B、 肾上腺素
- C、 多巴胺

D、 异丙肾上腺素

E、 酚妥拉明

答案： A

127、一不孕症患者子宫输卵管碘油造影如图,其进一步检查应为



A、 宫腔镜检查

B、 宫、腹腔镜检查

C、 BBT

D、 男方精液检查

E、 宫颈黏液、精液相结合试验

答案： B

128、患者,男,20岁。咽疼发烧1日后出现肉眼血尿,无明显尿疼,略有尿频,第3日尿常规检查 RBC20~30个/HP, WBC1~2个/HP,尿蛋白(+),B超示双肾大小形态正常。查体:BP17.33/12.00kPa 相当于130/90mmHg,双下肢微肿。首先考虑下述哪一诊断

A、 泌尿系感染

B、 急性肾小球肾炎

C、 IgA肾病

D、 泌尿系结石

E、 膀胱肿瘤

答案： C

129、患者因头痛、恶心呕吐入院,经诊断为脑水肿引起的颅内高压。该患者除了上述症状之外还有可能出现

A、 嗅觉障碍

B、 听觉障碍

C、 味觉障碍

D、 面瘫

E、 瞳孔对光反射减弱

答案： E

130、患者,男,28岁,右肋疼痛、乏力4年,因呕血、便血、昏迷15小时急诊入院。有肝炎史,1个月前少量呕血、黑便。查体:T 36.4℃,P 140次/min,BP

12.0/7.5kPa(90/56mmHg), R 32 次/min。有鼾声,深度昏迷。面色晦暗,手背、颈部有多数蜘蛛痣。肝掌,巩膜不黄,瞳孔稍散大,角膜反射消失。眼睑水肿。有特殊肝臭味。大便潜血强阳性。肝功:转氨酶 14 单位,高田氏反应(+++),GPT 220U/L, A/G=1.8/3。血氨 $140.3 \mu\text{mol/L}$ ($239 \mu\text{g/dl}$)。血氨增高的主要原因为

- A、 肝的酮体合成途径异常
- B、 肝的糖代谢异常
- C、 肝的尿素合成途径障碍
- D、 肝的生物转化障碍
- E、 肝的蛋白质合成功能异常

答案: C

131、患者,男,25岁。饭后劳动时突然上腹部持续性剧痛,向背部放射,频繁呕吐,起病后12小时急诊入院。查体: $T37.8^{\circ}\text{C}$, $P120 \text{ 次/min}$, $BP86/60\text{mmHg}$,脐左上方可扪及一局限性包块,局部肌肉稍紧张。实验室检查: $WBC18.2 \times 10^9/L$, $N86\%$,血清淀粉酶126索氏单位。腹部透视:可见突出孤立肠袢,大的气液平面。其诊断最可能是

- A、 急性胰腺炎
- B、 急性胆囊炎
- C、 溃疡病穿孔
- D、 急性小肠扭转
- E、 胆道蛔虫病

答案: D

132、患者,女,35岁。右颈前肿块4个月。肿块生长快,无疼痛。查体:甲状腺右叶肿块,大小 $4\text{cm} \times 3\text{cm}$,质地硬,表面不光滑,吞咽时上下移动度小。对诊断最有意义的体检结果是

- A、 气管向左侧移位
- B、 喉镜下见声带充血水肿
- C、 局部听诊闻及血管杂音
- D、 颈前浅静脉怒张
- E、 右颈部淋巴结肿大

答案: E

133、患者,女,55岁,。绝经5年,偶有外阴瘙痒3年。妇科检查:外阴皮肤和黏膜变白、变薄,失去弹性,阴蒂和小阴唇萎缩如图。可能的诊断



- A、 外阴鳞状上皮增生
- B、 外阴硬化性苔藓
- C、 外阴白癜风
- D、 外阴白化病
- E、 其他皮肤病

答案: B

134、患者,男,40岁,既往无呼吸道病史。两周前受凉后寒战高热、咳嗽、胸痛,1周后咳嗽,咯大量脓臭痰,伴少量咯血。查体:一般状态差,心率102次/min,右肺肩胛下可闻水泡音。诊断最可能是

- A、 肺癌
- B、 胸膜结核
- C、 肺脓肿
- D、 支气管囊肿
- E、 肺炎球菌肺炎

答案: C

135、患者,男,30岁,建筑工人,2小时前从5米高处坠落,颈部着地,四肢不能活动,颈部以下皮肤感觉减退。平片示颈椎5、6椎体脱位,首先应该进行的治疗是

- A、 颈椎牵引
- B、 颈托固定
- C、 手法复位
- D、 急症手术治疗
- E、 大剂量甲强龙冲击治疗

答案: E

136、患者,女,67岁,突发脑出血后,出现左侧舌肌瘫痪,经检查为椎动脉延髓支阻塞,请问该患者可能损伤了哪个结构

- A、 左侧舌下神经根
- B、 左侧舌咽神经根
- C、 左侧迷走神经

D、 右侧舌下神经根

E、 右侧舌咽神经根

答案： A

137、患者,男,26岁,不幸遭遇车祸导致骨盆骨折,医生检查后怀疑尿道受损。

男性骨盆骨折时最常见的尿道损伤部位是

A、 尿道海绵体部

B、 尿道球部

C、 尿道前列腺部

D、 尿道膜部

E、 前尿道

答案： D

138、塌方将一煤矿工人的骨盆部砸伤。3小时后方被救出。查体:神智清,面色

苍白,血压测不清。以下检查最必要的是

A、 骨盆分离试验

B、 是否有腹膜刺激症状

C、 腹部听诊

D、 腹腔诊断性穿刺

E、 尿道口是否有血液滴出

答案： D

139、老年患者跌倒后右髋部疼痛,步行至医院拍X光片检查证实为“右股骨颈

外展嵌插型骨折”。正确的治疗措施为

A、 持续皮牵引6~8周

B、 急诊手术内固定

C、 小夹板外固定

D、 石膏外固定

E、 不必处理,顺其自然

答案： A

140、某位医生,常常运用医患关系传统模式进行医疗活动。这位医生不关心的

问题是

A、 疾病的诊断

B、 科学知识的解释


C、 标准技术的应用

D、 疾病的处理

E、 患者的满意程度

答案： E

141、患者,男,59岁,咳嗽,咳痰,痰中带血2月余,CT检查如图,最可能的诊断



是

- A、肺结核
- B、中央型肺癌
- C、硅沉着病
- D、肺炎
- E、肺错构瘤

答案: B

142、患者老年女性,因“牙龈出血、下肢皮肤淤点1周”就诊。查血常规示血小板减少,凝血检查正常。请问该患者血小板计数水平最有可能是

- A、 $<100 \times 10^9/L$
- B、 $<80 \times 10^9/L$
- C、 $<70 \times 10^9/L$
- D、 $<50 \times 10^9/L$
- E、 $<30 \times 10^9/L$

答案: E

143、患者,女,49岁。绝经1年,子宫稍小,右侧触及 $6\text{cm} \times 6\text{cm} \times 4\text{cm}$ 囊性不均肿物,活动欠佳,左附件正常。剖腹探查见少量血性腹水,细胞学检查找到可疑癌细胞,卵巢肿瘤切除快速切片组织学检查,提示为腺癌。最恰当的治疗是

- A、全子宫切除术及右侧附件切除术
- B、全子宫切除术及双侧附件切除术
- C、全子宫切除双附件及盆腔淋巴结清除术
- D、全子宫双侧附件及大网膜切除术
- E、全子宫双侧附件及大网膜切除术,术后化疗

答案: E

144、患者,男,28岁,因尿频尿急尿痛4个月、加重伴尿失禁1周就诊。尿常规检查提示白细胞(++),尿潜血(+++),多种抗生素治疗无明显缓解。该患者的诊断最有可能是

- A、急性膀胱炎
- B、泌尿系结核

- C、 间质性膀胱炎
- D、 慢性膀胱炎
- E、 腺性膀胱炎

答案： B

145、患者,男,66岁,劳累性胸闷1年。胸骨左缘第3~4肋间可闻及3级粗糙的吹风样收缩期杂音。心电图提示左室肥大, $V_1 \sim V_2$ 导联呈QS型。首选下列哪项检查

- A、 平板运动试验
- B、 冠状动脉造影
- C、 动态心电图
- D、 超声心动图
- E、 心肌核素扫描

答案： D

146、患者胸部损伤后,随呼吸运动有气体进出胸壁伤口,下述诊断正确的是

- A、 进行性血胸
- B、 开放性气胸
- C、 肺泡性窒息
- D、 创伤性窒息
- E、 张力性气胸

答案： B

147、患者,女,36岁,孕50天。检查发现弓形虫IgM阳性,IgG阴性。此时最正确的处理措施是

- A、 进一步检查
- B、 乙酰螺旋霉素治疗
- C、 乙胺嘧啶治疗
- D、 观察等待弓形虫IgG抗体出现
- E、 终止妊娠

答案： E

148、患者,女,55岁,反复发作心悸,发作时心电图提示为房性心动过速,下列哪项不是自律性房性心动过速的特点

- A、 心动过速的P波与窦性P波形态不同
- B、 心动过速可被刺激迷走神经所终止
- C、 常伴有房室传导阻滞
- D、 心房程序电刺激通常不能诱发和终止心动过速
- E、 心动过速开始与终止时存在加温现象

答案： B

149、患者以往体健,昨晚发热, T38℃, 尿频、尿急、尿痛、腰部酸痛。查尿常规脓细胞(+++), 红细胞(+++), 尿蛋白(++), 尿培养大肠杆菌生长, 考虑急性肾盂肾炎, 以下哪项是不该出现的体征

- A、 双输尿管区压痛
- B、 膀胱区压痛
- C、 双肋腰点压痛
- D、 双肾区叩痛
- E、 双下肢凹陷性水肿

答案: E

150、初孕妇, 26 岁, 孕 18 周, 有先天性心脏病(室间隔缺损), 心功能Ⅱ级, 来产前登记。关于孕期保健, 下列不正确的是

- A、 避免过度劳动
- B、 防治上呼吸道感染
- C、 治疗妊娠并发症
- D、 防治贫血
- E、 体重增加每周可 1kg

答案: E

151、患者, 男, 30 岁, 长期饮酒, 突然呕大量咖啡色胃内容物。查体: 收缩压 80mmHg, 脉细数, 面色苍白, 四肢湿冷。急救中应首先

- A、 插入三腔双囊管
- B、 静脉点滴止血药物
- C、 输血
- D、 内镜止血
- E、 胃肠减压

答案: C

152、患者, 男, 55 岁, 教师。讲课时突然昏倒在讲台, 呼之不应急送医院。体检: 血压 26/10kPa, 昏迷, 左侧瞳孔 5mm, 右侧瞳孔 3mm, 右侧肢体无力, 呼吸深慢。下列处理不妥的是

- A、 20%甘露醇静脉滴注
- B、 保持呼吸道通畅
- C、 为明确诊断, 立刻行腰穿检查
- D、 调整血压
- E、 观察生命体征

答案: C

153、患者, 男, 16 岁, 患有急性血行播散型肺结核。其最可能的临床表现是

- A、起病缓慢,有低热、乏力、咳痰
- B、病程经过较长,有咳痰、咯血、体重减轻
- C、病人常有高热,伴咳嗽气短,大量脓血痰
- D、起病急,高热,伴咳嗽气短
- E、咳嗽、血痰、气促,常无明显中毒症状

答案: D

154、患儿,10个月。吐泻4天,大便为蛋花汤样,含少许黏液,无脓血。精神萎靡,皮肤弹性较差,眼窝明显凹陷,口腔黏膜干燥,四肢稍凉,尿量明显减少,血钠132mmol/L,此患儿最可能的诊断为婴儿腹泻并最可能合并

- A、低张性重度脱水
- B、等张性中度脱水
- C、等张性重度脱水
- D、等张性轻度脱水
- E、低张性轻度脱水

答案: B

155、患者,男,30岁,工人。挤压综合征又输库存血,血钾6.9mmol/L,CO₂CP20mmol/L,治疗方案应首选

- A、5%NaHCO₃60~100ml 静脉注射后再滴注100~200ml
- B、1.25%NaHCO₃60~100ml 静脉注射后再滴注100~200ml
- C、50%葡萄糖100ml 静脉注射
- D、25%葡萄糖200ml+Insulin 12U 静脉点滴
- E、阳离子交换树脂15g,口服4次

答案: A

156、患者,女,29岁。停经50天,阴道流血一周,尿HCG(+),行诊断性刮宫,病理报告示蜕膜及绒毛组织。则可诊断

- A、流产
- B、输卵管妊娠
- C、葡萄胎
- D、功血
- E、急性盆腔炎

答案: A

157、患者,男,36岁,诊断风心病,二尖瓣狭窄多年,症状不明显,今日咯血400ml,下列治疗最恰当(既往无肺及支气管疾病史)的是

- A、垂体后叶素
- B、毛花苷C

- C、 硝酸甘油
- D、 可待因
- E、 卡巴克洛

答案： C

158、一患者血压为 180/105mmHg, 胸骨后反复疼痛 3 周, 心率 128 次/min, 心电图提示:房性期前收缩及阵发性心房颤动。治疗首选哪个药物

- A、 口服坎地沙坦
- B、 口服美托洛尔
- C、 含服硝苯地平
- D、 口服培哌普利
- E、 静脉滴注维拉帕米

答案： B

159、患者, 男, 60 岁, 阵发头昏头痛、心悸、气促已 5 年, 血压 21.3/14.6kPa(160/110mmHg), 血清尿素氮 9mmol/L, 肌酐 220mmol/L, 尿蛋白(++)。治疗时下列药物不宜使用的是

- A、 钙通道阻滞剂
- B、 血管紧张素转换酶抑制剂
- C、 α 受体阻滞剂
- D、 β 受体阻滞剂
- E、 血管扩张剂

答案： D

160、男孩, 体健, 已接种一剂卡介苗, 二剂乙肝, 一剂脊髓灰质炎疫苗, 该婴儿的年龄为

- A、 1 个月
- B、 2 个月
- C、 3 个月
- D、 4 个月
- E、 5 个月

答案： B

161、患者, 男, 15 岁, 因少尿、颜面水肿 3 天来门诊, 10 天前曾有咽痛, 既往体健。查体: 血压 19/12kPa 相当于 147/90mmHg, 心肺无异常。尿常规: 蛋白++, 红细胞+++。下列哪项最有助于诊断

- A、 血肌酐
- B、 补体 C3
- C、 血红蛋白

D、 血浆白蛋白

E、 尿蛋白定量

答案： B

162、患者,女,35岁,月经正常,因左侧乳腺癌根治术治疗,术后病理结果浸润性导管癌,3cm×2cm大小,腋窝淋巴结无转移,ER(-),PR(-),HER-2(-),术后首选的治疗方案是

A、 内分泌治疗

B、 放疗

C、 化疗

D、 生物免疫治疗

E、 中药

答案： C

163、患者,女,24岁,寒战,高热、咳嗽、胸痛、咯血、尿少,色红,巩膜轻度黄染,皮肤多量淤点淤斑,血压75/50mmHg,血红蛋白70g/L,白细胞 $21 \times 10^9/L$,血片可见裂体细胞,FDP 32mg/L(),血纤维蛋白原1.2g/L-正常值2~4g/L,本例最可能的诊断是

A、 重症肺炎并发溶血性贫血

B、 感染性休克并发DIC

C、 败血症并发血小板减少

D、 肾衰竭

E、 肝功能衰竭

答案 B

答案：

164、患者,女,25岁,下腹部疼痛、伴坠胀感3天,加重1天入院。查体:腹部压痛、反跳痛、肌紧张。腹部彩超示:盆腔积液。临床诊断急性化脓性腹膜炎。

下列哪项是正确的

A、 最常见的病原菌是金黄色葡萄球菌

B、 原发性腹膜炎应早期手术治疗

C、 继发性腹膜炎的常见原因为阑尾炎穿孔、女性生殖器官感染

D、 诊断空腔脏器穿孔引起的急性腹膜炎,唯一依据是膈下游离气体

E、 肝、脾破裂是急性化脓性腹膜炎的常见病因

答案： C

165、患者,女,32岁。阵发性劳力性呼吸困难3年,咳痰带血丝1个月。M型超声心动图检查可见二尖瓣前叶呈城墙样改变,后叶同向运动。下列体征具有诊断意义的是

- A、 心尖区 3 级收缩期杂音, 向腋下传导
- B、 肺动脉瓣区第二心音亢进伴有分裂
- C、 胸骨左缘第 2 肋间 Graham-Steell 杂音
- D、 心尖区隆隆样舒张中晚期杂音
- E、 心尖区隆隆样舒张早期杂音


答案: D

166、一患者受凉后咳嗽、高热、咯铁锈色痰, 胸痛, 随呼吸运动而加重, 屏住呼吸时减轻。胸片示右肺下野外带近胸膜处均匀一致大片状影。此患者在听诊时最易出现的体征为

- A、 羊鸣音
- B、 硬币叩击征
- C、 胸膜摩擦音
- D、 捻发音
- E、 哨笛音

答案: C

167、患者, 男, 39 岁, 从高处坠落后颈部剧痛 6 小时, 结合影像学检查, 最可能的



诊断是

- A、 脊椎结核
- B、 化脓性脊柱炎
- C、 脊椎转移瘤
- D、 脊椎骨折
- E、 脊椎退行性变

答案: D

168、患者, 男, 60 岁, 突然夜间发作呼吸困难, 查体: 双肺满布呼气性哮鸣音。下面哪一项对鉴别诊断意义不大

- A、 血气分析
- B、 超声心动图
- C、 胸部 X 线
- D、 PEF
- E、 既往病史

答案： A

169、患者,女,已婚,36岁。出现尿频、尿急、尿痛症状6年。近期夜尿增多,尿蛋白(++),血液检查发现血钾浓度 2.9mmol/L 。该患者可能的诊断是

- A、 肾性急性肾衰竭
- B、 非少尿型急性肾衰竭
- C、 肾前性急性肾衰竭
- D、 慢性肾衰竭早期
- E、 急性肾后性肾衰竭

答案： D

170、患者男性,20岁。3年前因参与抢劫被判刑5年,现在服刑。半月前与室友争吵后突然出现大声哭啼、喊叫,在地上打滚、捶胸顿足,并以头撞墙。四肢抽动。历时约2~3分钟渐渐自行缓解,醒后不能完全诉说当时的经历。最可能的诊断是

- A、 抑郁症
- B、 分离(转换)性障碍
- C、 精神分裂症
- D、 焦虑症
- E、 恐惧症

答案： B

171、患者,女,32岁。曾足月分娩1次,流产2次,产后即出现闭经,妇科检查未发现异常。该患者闭经与以下病史中,关系最密切的是

- A、 月经初潮16岁
- B、 其母38岁即闭经
- C、 5年前分娩,曾发生产后大出血
- D、 20岁时因乳腺纤维瘤作过手术
- E、 1年前曾先后作过两次人工流产

答案： C

172、患者,男,18岁。因发热14天、皮疹9天入院就诊,伴咽痛,按感冒治疗未见好转。查体:浅表淋巴结肿大,肝脾大,IgM异嗜性抗体阳性。最可能的诊断是

- A、 肠热症
- B、 巨细胞病毒单核细胞增多症
- C、 链球菌咽峡炎
- D、 传染性单核细胞增多症
- E、 急性感染性淋巴细胞增多症

答案： D

173、患者,女,18岁,拟诊白血病,需进行骨髓穿刺来检查骨髓象。穿刺抽取红骨髓,适合穿刺抽取的骨骼为

- A、 股骨
- B、 髌骨
- C、 肱骨
- D、 椎骨
- E、 肩胛骨

答案: B

174、患者,女,15岁,3月前一次摔伤后发现右膝关节上方肿痛。经休息后未见好转,逐渐加重,疼痛明显,来诊。检查右大腿下段肿胀,表面皮肤静脉肿胀充血,皮温高,触诊实质性硬。X光检查:右股骨干骺端骨皮质破坏,与周围分界不清,有大块软组织肿物影内有放射状骨针。最大可能诊断为

- A、 创伤性骨化
- B、 股骨骨结核
- C、 疲劳骨折
- D、 股骨骨髓炎
- E、 恶性骨肿瘤

答案: E

175、慢性髓性白血病患者异基因造血干细胞移植后1年,PCR-bcr/abl 从阴性(0)转为阳性(5%),骨髓形态仍为缓解状态,首选治疗是

- A、 伊马替尼
- B、 联合化疗
- C、 羟基脲
- D、 观察
- E、 供者淋巴细胞输注(DLI)

答案: A

176、患者,男,55岁,溃疡病史5年余,今来门诊请教医生,如何从饮食方面防治溃疡病症状复发。医生的建议中不应包括

- A、 饮食规律,避免过饥过饱
- B、 忌粗糙与刺激性较大的食物或饮料
- C、 症状明显时,短期给予流质饮食,少食多餐
- D、 若在用抗酸解痉剂的前提下饮食可不受任何限制
- E、 有呕血时应暂时禁食

答案: D

177、患者,男,35岁。发现右侧甲状腺肿物3个月,生长较快。体检右甲状腺可触及一个3.5cm×2.5cm大小的肿物,质硬,界清,随吞咽上下移动;左甲状腺不大,未及肿物;颈部未及肿大淋巴结。若确诊甲状腺癌,下列哪项检查意义最小

- A、 甲状腺肿物的大小
- B、 肿物生长的速度
- C、 肿物的质地
- D、 肿物活动度
- E、 有无压迫症状

答案: A

178、初产妇,35岁,不完全臀位,妊39周。胎心140次/min,胎膜未破,宫口开大1cm。估计胎儿体重3800g。最恰当的处理是

- A、 等待自然分娩
- B、 剖宫产
- C、 静点催产素
- D、 抬高臀部
- E、 待宫口开全行臀位助产

答案: B

179、患者,男性,29岁,经常对一些常见的事情和现象反复的思考,刨根究底,自知毫无意义,但不能自控。该症状为

- A、 强迫思维
- B、 强迫性怀疑
- C、 强迫性意向
- D、 强迫性回忆
- E、 强迫性联想

答案: A

180、一脑出血患者,神志不清,留置导尿8天,每日行膀胱冲洗,突然出现发热,尿色混浊。急检尿常规:白细胞15~20个/HP,红细胞3~5个/HP。恰当的处理是

- A、 拔除导尿管,并给予强有力抗生素治疗
- B、 及时更换导尿管,并给予强有力抗生素治疗
- C、 行耻骨上腹腔造瘘引流
- D、 暂不宜治疗,直至导尿管拔除后再治疗之
- E、 用强有力的抗生素在局部行膀胱冲洗

答案: B

181、患者,男,22岁,左前胸第4肋间刀刺伤半小时来院,血压9.3/6.7kPa(),脉弱130次/min,应首选哪项治疗措施

- A、 静脉滴注升压药
- B、 开胸探查术
- C、 胸腔穿刺
- D、 胸腔闭式引流术
- E、 气管插管, 给氧

答案 B

答案:

182、患者,男,20岁,头昏、乏力8个月。查:贫血貌,脾肋下3cm。血红蛋白80g/L,红细胞 $3.2 \times 10^{12}/L$,红细胞渗透性脆性试验明显减低。家中其母亲有贫血病史,根据上述情况,以下检查最为重要的是

- A、 网织红细胞计数
- B、 抗人球蛋白试验
- C、 血红蛋白电泳
- D、 酸溶血试验
- E、 高铁血红蛋白还原试验

答案: C

183、患儿,男,7天10小时,因脐部渗血1天入院。足月顺产,纯母乳喂养,1天前出现脐部渗血,排黑便1次,无发热,无呕吐,精神、食欲可。查体:T $36.8^{\circ}C$,RR 38次/分,HR 125次/分。反应可,皮肤无淤点淤斑,脐部渗血,鲜红色,脐轮无红肿,腹软不胀,肠鸣音4次/分,首先考虑诊断为

- A、 脐炎
- B、 新生儿出血症
- C、 脐血管畸形
- D、 血小板减少性紫癜
- E、 应激性溃疡

答案: B

184、患儿,5个月。在外院拟诊为小儿腹泻、中度脱水,经补液后脱水征消失,但突然出现呼吸变浅,反应差,腹胀而转来院。体格检查:体温 $37^{\circ}C$,心率140次/分,精神萎靡,面色苍白,前囟平,皮肤弹性尚可,心音低钝、腹胀,肠鸣音1~2次/分,膝反射消失。最可能的诊断是

- A、 败血症
- B、 重症肌无力
- C、 中毒性心肌炎
- D、 中毒性肠麻痹
- E、 低钾血症

答案: E

185、慢性肺源性心脏病患者,近3日出现嗜睡,头痛,计算力、定向力障碍。查体:R 28次/min,多汗,颞浅静脉充盈,颈静脉怒张。双肺散在干、湿啰音。急检动脉血气分析:pH7.34, PaO₂57mmHg, PaCO₂80mmHg, HCO₃⁻20mmol/L, BE-2mmol/L, 诊断考虑为

- A、呼吸性酸中毒失代偿
- B、呼吸性酸中毒代偿期
- C、呼吸性酸中毒并代谢性酸中毒
- D、呼吸性酸中毒并代谢性碱中毒
- E、呼吸性酸中毒并呼吸性碱中毒

答案: A

186、患者,男,38岁,因阻塞性黄疸而住院。大便为白陶土色,无腹痛,不发热,胆囊肿大,肝于右肋下3cm可触及。下述病情判断中哪项缺乏依据

- A、符合库瓦济埃(Courvoisier)定律
- B、胆道已完全梗阻
- C、梗阻位于肝总管或肝门部
- D、肝内胆管扩张
- E、伴有胆汁淤积

答案: C

187、患者,女,30岁,月经减少1年就诊,伴怕冷、乏力、便秘。查体:反应迟钝,颜面水肿,眉毛稀疏,舌体大,HR50次/分。需要完善下列哪项检查确诊

- A、性激素水平
- B、肾功能
- C、甲状腺功能
- D、妇科B超
- E、血常规

答案: C

188、患者,男,52岁。上腹饱胀不适3个月,时有上腹隐痛,向背部放射,乏力,体重下降,大便不成形,有油珠。应首选的检查是

- A、纤维结肠镜检查
- B、肝、胆、胰B超或CT
- C、肝功能检查
- D、钡剂灌肠
- E、腹腔动脉造影

答案: B

189、患者,男,50岁,因右侧下颌第一磨牙牙龈肿痛就医。与传导该痛觉相关的结构是

- A、 孤束
- B、 内侧丘系
- C、 外侧丘系
- D、 脊髓丘系
- E、 三叉丘系

答案: E

190、患者男,33岁,公司经理。近半年反复出现发作性的出现胸闷、呼吸困难、全身大汗,肌肉紧张,坐立不安,四肢无力。感觉到无法呼吸快要死掉的感觉。反复拨打120急救,急诊吸氧和输液处理好转,有时发作5~10分钟后也可逐渐缓解。缓解期间仍非常担心再次发作,烦躁。该患者的错误的诊治方案是

- A、 患者有呼吸困难,需要完善胸片、血气分析等检查,以除外肺部等疾病
- B、 患者有心率增快、胸闷、濒死感等,需要完善心肌酶谱、心电图等检查以除外心脏系统疾病
- C、 患者全身大汗、四肢无力等,需要在发作时尽快查血糖,除外低血糖发作
- D、 患者有发作性出现呼吸困难,濒死感,惊恐状状态。发作后简单处理就可好转,并有预期性焦虑的症状。病程有半年。可以诊断为惊恐障碍
- E、 精神活性物质的使用及戒断也会出现类似的情况,需询问相关的病史,以便明确诊断

答案: D

191、患者,女,15岁。目前诊断为精神分裂症青春型,下列哪项与患者病情特点最不符合

- A、 存片段幻觉
- B、 联想散漫
- C、 情感高涨
- D、 急性起病
- E、 预后较差

答案: C

192、患者,男,25岁。四肢无力4天。检查发现四肢为下运动神经元性瘫痪,四肢远端可疑痛觉减退。神经传导速度测定明显减慢,初步考虑为急性炎性脱髓鞘性多发性神经病,在病史询问中最有诊断意义的是

- A、 长期饮酒史
- B、 有机磷农药中毒
- C、 病前1~4周有上呼吸道或消化道感染症状
- D、 长期吸烟

E、 近期曾服驱虫药物

答案： C

193、患者,女,20岁。因进行性呼吸困难3个月来诊。查体发现 BP 90/70mmHg,心界双侧扩大,随体位改变,心率 120 次/min,律齐,心音低弱遥远,无病理性杂音。患者不可能出现

- A、 水冲脉
- B、 颈静脉怒张
- C、 奇脉
- D、 肝大
- E、 移动性浊音

答案： A

194、患者,男,60岁,2型糖尿病病史10年。自行停用胰岛素后出现流涕,呕吐,腹泻,血气分析可见酸中毒。该患者最可能出现的呼吸节律改变是

- A、 潮式呼吸
- B、 叹气样呼吸
- C、 抑制性呼吸
- D、 端坐呼吸
- E、 Kussmaul 呼吸

答案： E

195、患者,女,24岁。10天前因“停经41天,尿HCG(+)”行吸宫流产术,术中未见绒毛,出血不多。今晨突然晕倒在地。查体:体温 37.3℃,血压 75/50mmHg,脉搏 100 次/min,下腹压痛及反跳痛明显,阴道少量流血,宫颈举痛明显,宫口闭,子宫稍大,稍软,右侧似有一包块,边缘不清,压痛。查 WBC $9.7 \times 10^9/L$,N70.3%。最有可能的诊断是

- A、 人工流产不全
- B、 流产后右附件炎
- C、 右输卵管妊娠破裂
- D、 宫颈粘连
- E、 急性阑尾炎

答案： C

196、男性青年农民病前于海鲜馆吃海鲜后,呕吐腹泻水样便,难以计数,无腹痛,不发烧,无尿。查体:神志淡漠,眼窝凹陷,声音嘶哑,脉细而快,血压测不出。该病例诊断首先应考虑为

- A、 中毒性菌痢
- B、 沙门氏菌属食物中毒

- C、病毒性肠炎
- D、副霍乱
- E、嗜盐菌食物中毒

答案： D

197、患者,女,36岁。平素月经规则,出现阴道流血,首先考虑的疾病为

- A、子宫肌瘤
- B、子宫颈癌
- C、子宫内膜癌
- D、与妊娠有关的疾病
- E、宫内节育器

答案： D

198、患者,女,62岁,因肿瘤压迫中脑被盖后出现右侧除外直肌和上斜肌外的所有眼球外肌麻痹,瞳孔散大,左上、下肢及躯干意识性本体觉和精细触觉障碍,请问该患者可能损伤了哪些结构

- A、右动眼神经、右内侧丘系
- B、右动眼神经、右脊髓丘脑束
- C、左展神经、左内侧丘系
- D、左动眼神经、左内侧丘系
- E、右展神经、右内侧丘系

答案： A

199、患者,男,26岁。1年前住院诊断肥厚性梗阻型心肌病。2天前因突晕倒又来我院急诊室。查体:胸骨左缘第3~4肋间有喷射性杂音,并随不同条件有明显变化。变化的机理不正确的是

- A、运动时,增加心肌收缩力,杂音增强
- B、屏气试验(用力时)时,前后负荷均减少,杂音减弱
- C、下蹲时,前后负荷均增加,杂音减弱
- D、立位时,前负荷减少,杂音增强
- E、使用 β -受体阻滞剂,减弱心肌收缩力,杂音减弱

答案： B

200、某婴孕42⁺周分娩,出生体重4100g,脐带绕颈。Apgar评分1分钟6分,该患儿不应该诊断为

- A、新生儿窒息
- B、高危儿
- C、巨大儿
- D、正常新生儿

E、 过期产儿

答案： D

201、患者,女,43岁,慢性乙型肝炎20年。近期恶心、食欲减退,查体:心肺无异常,脾肋下3cm,双下肢凹陷性水肿。该患者不会出现的情况是

- A、 凝血因子缺乏
- B、 血红蛋白减少
- C、 雌激素增加
- D、 醛固酮增加
- E、 肾上腺皮质激素减少

答案： D

202、患者,女,18岁,劳力性心悸、气促3年,近日咯血,不能平卧。查体:发绀,颈静脉充盈,心尖区可闻舒张期隆隆样杂音。心脏B超示左房右室内径增大。ESR 33mm/h,抗“O”正常。诊断最可能为

- A、 风心病二尖瓣狭窄左心衰
- B、 风心病二尖瓣狭窄左心衰并右心衰
- C、 右房黏液瘤
- D、 急性风湿热并全心衰
- E、 急性病毒性心肌炎并全心衰

答案： B

203、患者,女,55岁,因黄疸皮肤瘙痒5个月入院。查体:眼睑内眦有黄斑瘤,肝脾大。化验:TBIL173 $\mu\text{mol/L}$, CB98 $\mu\text{mol/L}$, ALT46U/L, ALP360U/L, $\gamma\text{-GT}$ 180U/L, B超提示胆管无扩张,抗线粒体抗体阳性,最可能的诊断为

- A、 血色病所致肝硬化
- B、 肝炎后肝硬化
- C、 原发性胆汁性肝硬化
- D、 继发性胆汁性肝硬化
- E、 酒精性肝硬化

答案： C

204、患者,男,20岁。夜间骑自行车,头朝下跌于壕沟,发生四肢不全瘫。X线片显示齿状突骨折伴半脱位。此时在治疗上最先采取的措施是

- A、 石膏围领固定
- B、 切开复位内固定
- C、 吊带牵引
- D、 寰枕固定术
- E、 颅骨牵引固定

答案： E

205、初孕妇, 24 岁, 末次月经不清。产科检查: 腹围 94cm, 宫高 33cm(宫底在脐与剑突之间), 胎头入盆, 胎心位于脐右下方。其孕周最可能为

- A、 孕 40 周
- B、 孕 28 周
- C、 孕 32 周
- D、 孕 36 周
- E、 孕 24 周

答案： A

206、患儿, 女, 6 岁。发现走路呈鸭步、上楼困难 3 年, 诊断为假肥大型肌营养不良, 关于进行性肌营养不良, 下述哪项是不正确的

- A、 假肥大型肌营养不良男女患病机会均等
- B、 Duchenne 肌营养不良大多伴有心肌损害
- C、 面肩肱型肌营养不良多以面肌无力萎缩起病
- D、 肢带型肌营养不良多属常染色体隐性遗传
- E、 眼咽型肌营养不良多属常染色体显性遗传

答案： A

207、患者, 男, 65 岁, 经常冬季时咳喘发作, 肺功能检查(吸入支气管扩张药后): FEV₁/FVC62%, FVC 占预计值 79%, RVC/TLC45%, 最可能的诊断是

- A、 急性支气管炎
- B、 肺间质纤维化
- C、 支气管哮喘
- D、 大叶性肺炎
- E、 慢性阻塞性肺疾病

答案： E

208、年轻男性, 既往体健, 突发咯血 400~500ml, 查体及胸片未见明显异常, 最可能的诊断是

- A、 肺栓塞
- B、 支气管肺癌
- C、 肺脓肿
- D、 支气管扩张症
- E、 肺结核

答案： D

209、患者,女,15岁,左侧手掌因为刀伤后导致拇指不能内收,可能损伤的神经是

- A、 桡神经
- B、 尺神经
- C、 正中神经
- D、 肌皮神经
- E、 腋神经

答案: B

210、患者,女,26岁,剖宫产后腹膜腔感染积液,液体在直立位时易积聚在何部位

- A、 直肠膀胱陷凹
- B、 膀胱子宫陷凹
- C、 直肠子宫陷凹
- D、 耻骨后间隙
- E、 膀胱旁窝

答案: C

211、患者,女,35岁,无肾病病史,突发肾小球肾炎,检查发现患者急性感染溶血性链球菌,已能检测出抗体。推测该患者肾小球肾炎的发病机制为

- A、 溶血性链球菌直接感染肾脏所致
- B、 细菌中的超抗原诱发炎症反应所致
- C、 链球菌感染所产生抗体与具有共同抗原的肾组织发生交叉反应
- D、 抗双链 DNA 抗体沉积于肾小球
- E、 特发性自身免疫病

答案: C

212、在人体实验中涉及弱势人群,必须提供额外的保护。但同时也不能简单地将弱势人群排除在研究之外,这是()原则的体现

- A、 尊重
- B、 公平
- C、 有利
- D、 不伤害
- E、 知情

答案: B

213、患者,女,29岁。初婚生育一胎,再婚后2年未孕,性交后精子穿透力试验示精子不活动。可能的不孕因素是

- A、 输卵管因素
- B、 子宫因素
- C、 宫颈因素
- D、 免疫因素
- E、 男方因素

答案： D

214、患者,男,45岁,反复发作性咳嗽10余年,多为干咳,与雾霾天气、接触刺激性气味或“感冒”有关,可自行或经治疗后缓解。最可能的诊断为

- A、 慢性支气管炎
- B、 左心衰竭
- C、 变态反应性肺浸润
- D、 慢性阻塞性肺疾病
- E、 支气管哮喘

答案： E

215、患者,男,16岁,无诱因反复大量肉眼血尿,近半月低热。查体:右肾可触及,轻叩痛。KUB右肾影大,有壳状钙化影,IVP右肾上盏缺如,中盏有弧形压迹,中下盏会聚。血沉40mm/h,血RBC $8.30 \times 10^{12}/L$ 。最可能的诊断是

- A、 肾癌
- B、 肾盂癌
- C、 肾结核
- D、 输尿管肿瘤
- E、 肾挫伤

答案： A

216、初孕妇,孕40周,临产20小时,估计胎儿3800g,宫口开全2小时,胎头S⁻²。产妇诉下腹痛,膀胱区隆起,有压痛,导尿有红细胞。最正确的处理是

- A、 立即行剖宫产
- B、 即行吸引器助产
- C、 静脉滴注催产素
- D、 产钳助产
- E、 再观察1小时

答案： A

217、患者,女,30岁,月经量多已2年,近3个月来感乏力、头晕、心悸,检查血红蛋白60g/L,白细胞 $6.0 \times 10^9/L$,血小板 $140 \times 10^9/L$,镜下可见红细胞体积缩小,中央淡染区扩大,治疗该患者首选

- A、 肌内注射维生素B₁₂

- B、口服铁剂
- C、输血
- D、脾切除
- E、口服叶酸

答案： B

218、孕妇, 28 岁, 停经 2 个半月, 阴道少量流血 7 天, 伴下腹隐隐作痛就诊。查体: 阴道少量积血, 宫口闭, 子宫体 2 个半月妊娠大小, 双附件阴性。下列哪项处理是错误的

- A、中药保胎治疗
- B、尿妊娠试验
- C、B 超检查
- D、立即刮宫
- E、肌注黄体酮

答案： D

219、患者, 女, 24 岁。阴道分泌物增多 2 周, 经检查确诊为沙眼衣原体感染性宫颈炎。治疗可选用以下药物, 除了

- A、四环素
- B、一代头孢菌素
- C、红霉素
- D、阿奇霉素
- E、氧氟沙星

答案： B

220、患者, 男, 35 岁, 幼年曾患百日咳, 反复咳嗽、咳痰 20 年, 5 年前曾因大量咯血住院治疗, 近 2 年咯血愈加频繁, 10 天前因严重咯血入院, 经治疗后症状好转。一般情况良好, 支气管碘油造影示左下肺叶各段支气管囊性扩张。下一步应建议患者

- A、长期抗感染治疗
- B、抗结核治疗
- C、止咳、化痰治疗
- D、手术治疗
- E、停止任何治疗, 门诊随访

答案： D

221、患者, 女, 28 岁, 左大腿下段被机器砸伤。X 线摄片提示股骨下 1/3 骨折。采用骨牵引治疗时将膝关节放在屈曲位的原因是

- A、使股四头肌保持一定张力, 有利骨折复位

- B、 使腓肠肌处于放松位置, 有利骨折复位
- C、 使比目鱼肌处于放松位置, 有利骨折复位
- D、 使腘动静脉松弛, 防止骨折端对其刺激损伤
- E、 使坐骨神经松弛, 防止损伤

答案: B

222、患者, 女, 35 岁。多食、多汗、消瘦半年, 心率 106 次/分, 颈部可见肿大。该患者查体最可能出现的体征是

- A、 甲状腺结节性肿大, 无震颤或杂音
- B、 甲状腺弥漫性肿大, 伴有震颤
- C、 甲状腺肿大并结节感, 质地硬
- D、 颈静脉怒张
- E、 Oliver 征

答案: B

223、患者, 女, 72 岁, 因摔伤致左下肢疼痛、无法活动。入院心电图提示:HR58 次/min, P 波与 QRS 波无关, P 波频率大于 QRS 波频率, PP 间距和 RR 间距各自规则。考虑心电图诊断为

- A、 窦性心动过缓
- B、 一度房室传导阻滞
- C、 二度 I 型房室传导阻滞
- D、 二度 II 型房室传导阻滞
- E、 三度房室传导阻滞

答案: E

224、患者, 男, 36 岁, 心悸怕热, 手颤乏力一年, 大便不成形, 3~4 次/日, 体重下降 12kg。查体:P90 次/min, BP128/90mmHg, 皮肤潮湿, 双手细颤, 眼球突出, 甲状腺弥漫 II 度肿大, 闻及血管杂音, 心率 104 次/min, 律不齐, 心音强弱不等, 腹平软, 肝脾未触及, 双下肢无水肿。心律不齐最可能是

- A、 窦性心律不齐
- B、 阵发性期前收缩
- C、 心房颤动
- D、 心房扑动
- E、 二度房室传导阻滞

答案: C

225、患者, 女, 24 岁, 近 1 周来低热, 盗汗伴右胸胀痛, 气促感, 胸片示右肺中量积液, 胸水常规:比重 1.020, 李凡他试验(+), 蛋白 30g/L, 细胞总数 $500/\text{mm}^3$, WBC $300/\text{mm}^3$, 单核 70%。最可能的诊断是

- A、 癌性胸膜炎,胸腔积液
- B、 结核性脓胸
- C、 化脓性胸膜炎
- D、 结核性渗出性胸膜炎
- E、 漏出性胸水

答案: D

226、患者,男,70岁,患高血压20年,进行性心慌、气短。下列哪项对诊断左心功能不全有帮助

- A、 主动脉瓣区第二心音亢进
- B、 右肺部散在干、湿啰音
- C、 阵发性夜间呼吸困难
- D、 双下肢水肿
- E、 心包叩击音

答案: C

227、某肝硬化腹水患者,近来低热腹痛,且腹水量增加。腹水常规:李凡他试验(+),白细胞 $0.5 \times 10^9/L$,中性粒细胞 80%。最可能合并哪种疾患

- A、 结核性腹膜炎
- B、 门静脉血栓形成
- C、 自发性腹膜炎
- D、 原发性肝癌
- E、 肝肾综合征

答案: C

228、患者,男,40岁。右上腹胀痛2个月。肝下缘在右肋弓下3cm;HBsAg阳性,B超检查见肝右叶有一直径5cm的占位病变,AFP检查结果为1200ng/ml,该患者诊断为肝癌的可能性比较大。正常时关于肝的下缘位置的描述正确的是

- A、 肝的下界右侧与右肋弓一致
- B、 肝的下界右侧在右肋弓下方1cm
- C、 肝的下界右侧在右肋弓下方2cm
- D、 肝的下界在剑突下不能触及
- E、 肝的下界左侧在左肋弓下2cm

答案: A

229、学生甲从医学院口腔专业2014年6月毕业,于2016年7月28日向当地区级卫生行政部门申请个体行医,未获批准。根据《中华人民共和国执业医师法》,申请个体行医的条件是

- A、 经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满五年

- B、 经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满三年
- C、 经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满一年
- D、 毕业后在医疗、预防、保健机构中试用三年
- E、 毕业后在医疗、预防、保健机构中试用二年

答案： A

230、患者,男,46岁,蒙古族,有牛羊接触史和12年前患肝炎史。近3个月上腹饱胀,持续疼痛,低热。查体:轻度黄疸,肝大,肋下4cm,质硬,B型超声示右侧肝后叶2cm×3cm低回声区。下列化验最有助于鉴别诊断的是

- A、 LDH
- B、 γ -GT
- C、 AKP
- D、 GPT
- E、 AFP

答案： E

231、患者,女,32岁。阵发性心悸3个月。发作时心电图示:心室率240次/分,Ⅱ、Ⅲ、aVF导联P波倒置,QRS波群正常,并与P波保持固定关系。预防室上性心动过速最有效的方法是

- A、 口服维拉帕米
- B、 口服胺碘酮
- C、 口服地高辛
- D、 射频消融术
- E、 口服美托洛尔

答案： D

232、患者,女,绝经5年,近3个月阴道排出血性液体,量多。查体:阴道及宫颈充血明显,宫颈萎缩,子宫正常大小,附件(-)。下一步做哪项检查可确诊

- A、 阴道,宫颈涂片做细胞学检查
- B、 子宫腔冲洗液细胞学检查
- C、 阴道镜检查
- D、 分段诊刮组织病理学检查
- E、 腹腔镜检查

答案： D

233、患者,女,41岁。因严重肺部感染出现休克症状,尿量每小时仅为15ml,此时应禁用

- A、 山莨菪碱
- B、 异丙肾上腺素

- C、多巴胺
- D、阿托品
- E、去甲肾上腺素

答案： E

234、患者,男,28岁,因外伤造成腰1压缩性骨折合并截瘫,骨折后1周出现体温升高,最可能的原因是

- A、骨折后血肿吸收热
- B、泌尿系感染
- C、脊髓损伤造成中枢调节功能失调
- D、自主神经功能紊乱
- E、肌肉瘫痪散热少


答案： B

235、患儿,男,生后因胎盘前置 Apgar 评分 2 分,医生紧急处理,首先应该采取的措施是

- A、肌注洛贝林
- B、给以纯氧
- C、人工呼吸
- D、保温
- E、立即清除呼吸道分泌物

答案： E

236、患者,男,55岁,腹部胀痛不适1月余,CT检查如图,最可能的诊断是



- A、结肠结核
- B、结肠淋巴瘤
- C、结肠转移瘤
- D、假膜性结肠炎
- E、横结肠癌

答案： E

237、一急性下壁右室心梗患者,血压 80/60mmHg, 心率 62 次/min, 四肢冷, 出汗, 中心静脉压 9cmH₂O, 尿比重 1.024。首要的治疗是

- A、 血管扩张类药物
- B、 洋地黄类药物强心
- C、 扩容补充血容量
- D、 利尿剂增加尿量
- E、 血管收缩药物

答案： C

238、患者,女,52岁,右乳外上象限肿块2年余,肿块质硬、边界不清。局部皮肤破溃,患侧乳头内陷。符合该患者疾病的诊断是

- A、 乳腺增生症
- B、 乳腺癌
- C、 乳腺纤维腺瘤
- D、 乳腺导管内乳头状瘤
- E、 乳腺脓肿

答案： B

239、患者,女,38岁,头昏,乏力,面色苍白2年,加重1周住院。血液检查:血红蛋白52g/L,白细胞 $8.9 \times 10^9/L$,血小板 $129 \times 10^9/L$,网织红细胞30%,Ham(酸溶血)试验(+).体检时下列体征不可能出现的是

- A、 巩膜黄染
- B、 2级收缩期杂音
- C、 脾大
- D、 浅表淋巴结肿大
- E、 下肢溃疡

答案： D

240、患者,女,26岁,来诊,近半年来胸闷,曾晕倒2次,体检示轻度贫血,可闻及心尖区舒张期隆隆样杂音,伴第一心音亢进。下一步最适宜的检查是

- A、 吞钡摄心脏正侧位片
- B、 超声心动图
- C、 心电图和心向量图
- D、 血常规和骨髓象检查
- E、 心血管造影

答案： B

241、患者,男,60岁,脾切除术后1周,出现高热,体温逐步上升,伴左肋下疼痛。查体:腹平坦,左上腹深压痛。为明确诊断,简便适宜的检查方法是

- A、 X线上消化道气钡双重造影检查
- B、 B型超声波检查

- C、 腹平片
- D、 腹腔穿刺检查
- E、 CT 或 MRI 检查

答案： B

242、患者,女,30岁。有克罗恩病病史5年。近日突然出现剧烈腹痛,伴恶心、呕吐胃内容物,发热,3天未排大便。其原因可能是

- A、 克罗恩病复发
- B、 并发肠梗阻
- C、 并发癌变
- D、 瘻管形成
- E、 发生急性阑尾炎

答案： B

243、患者,男,58岁,因二尖瓣关闭不全于体外循环下行二尖瓣置换术,低温时发生室颤,最不可能的因素是哪项

- A、 酸中毒
- B、 碱中毒
- C、 高钠
- D、 低钾
- E、 高钙

答案： C

244、患儿,男,3岁。身高65cm,平日安静少动,腹胀经常便秘。体检:智力低下,舌厚而大,皮肤粗糙,腕部骨化中心一个, $T_4 \downarrow$,TSH $\uparrow$,首选治疗是

- A、 生长激素
- B、 甲状腺素片连服1年
- C、 维生素D+钙片
- D、 甲状腺素片,服至青春期
- E、 甲状腺素片,终身服药

答案： E

245、患者,男,34岁,2年来反复镜下血尿,偶见红细胞管型。尿蛋白定量1.3g/d,血肌酐 $102 \mu\text{mol/L}$,尿素氮 5.4mmol/L ,ALB 30g/L ,IgA 0.6g/L ,抗“O”600U。为了明确诊断,最有价值的进一步检查是

- A、 膀胱镜检查
- B、 肾活检
- C、 尿查抗酸杆菌
- D、 逆行肾盂造影

E、 清洁中段尿细菌培养

答案： B

246、青年农民, 发热、乏力、周身酸痛、食欲减退 7 天, 眼黄 2 天, 于 8 月 20 日入院。查体: 体温 38.7℃, 结膜充血, 巩膜中度黄染, 肝肋下 2cm, 脾未及。实验室检查: WBC $13 \times 10^9/L$, N0.75, L0.25。ALT138U/L, TBIL65 $\mu\text{mol/L}$ 。尿蛋白(+), 尿镜检红细胞(++), 白细胞(++)。最可能的诊断是

- A、 疟疾
- B、 钩体病
- C、 流行性出血热
- D、 伤寒
- E、 急性病毒性肝炎

答案： B

247、患者, 男, 20 岁, 头痛、头晕一个月, 高热鼻出血一周, 全身浅表淋巴结不大, 肝可触及边, 脾不大, 红细胞 $1.8 \times 10^{12}/L$, 白细胞 $3.5 \times 10^9/L$, 血小板 $80 \times 10^9/L$ 。骨髓象: 增生减低, 红系和粒系各阶段比例大致正常, 未见巨核细胞, 可见组织嗜碱细胞。最可能的诊断为

- A、 急性白血病
- B、 再生障碍性贫血
- C、 特发性血小板减少性紫癜
- D、 粒细胞减少症
- E、 营养不良性贫血合并感染

答案： B

248、患者, 男, 25 岁, 低热、胸腔积液, 经抗结核治疗好转, 来门诊请教医生, 说他在按医嘱完成全疗程抗结核治愈后, “下一步该怎么办”。回答他最恰当的是

- A、 规律用药完成全疗程治愈后, 不必担心复发
- B、 因治疗时曾用过肝毒性药物, 以后可能出现肝功异常
- C、 因长期用过神经毒性药物, 以后可能出现手脚麻木现象
- D、 应定期 X 线复查, 及时发现病情病变化, 最好坚持 5 年
- E、 为增强免疫预防复发, 应接种卡介苗

答案： D

249、患者, 男, 25 岁, 上呼吸道感染后 4 天见肉眼血尿, 无皮疹水肿, BP14.7/10.7kPa, 首先怀疑

- A、 急性肾炎
- B、 过敏性紫癜肾

- C、 隐匿性肾炎、IgA 肾病
- D、 泌尿系结石
- E、 肾结核

答案： C

250、患者,女,28岁,低热、骨关节肿胀3天。入院检查:关节腔积液腺苷脱氨酶活性明显增高。该患者可能的诊断为

- A、 结核性关节炎
- B、 反应性关节炎
- C、 系统性红斑狼疮
- D、 强直性脊柱炎
- E、 类风湿性关节炎

答案： A

251、患者,男,40岁,车祸后,锁骨内侧端前方出现疼痛、肿胀、有压痛,首先考虑胸锁关节脱位,X线片确诊为胸锁关节脱位。胸锁关节的组成包括

- A、 由锁骨的胸骨端与胸骨的锁切迹及第1肋软骨的上面构成
- B、 由锁骨的肩峰端与胸骨的锁切迹及第1肋软骨的上面构成
- C、 由锁骨的肩峰端与胸骨的颈静脉切迹及第1肋构成
- D、 由锁骨的胸骨端与胸骨角及第1肋构成
- E、 由锁骨的肩峰端与胸骨柄构成

答案： A

252、患者,男,62岁。体重进行性增加8个月,1年前诊为“肺癌”,曾化疗。查体:多血质面容,右下肺闻及湿啰音,血皮质醇升高且昼夜节律消失,小剂量地塞米松抑制试验后血皮质醇228nmol/L,大剂量地塞米松抑制试验抑制率56%。最可能的诊断是

- A、 Cushing病
- B、 异位ACTH综合征
- C、 肾上腺皮质癌
- D、 肾上腺增生
- E、 以上都不是

答案 B

253. 55岁患者,慢性咳嗽20多年,近5年来气促逐渐加重。查体:桶状胸,肺泡呼吸音减弱,呼气延长。X线胸片肺透亮度增加,膈肌低平。为判断患者有无心脏并发症,下列检查中意义最大的是

- A. ECG
- B. 心脏超声多普勒
- C. 测肘静脉压
- D. 叩诊心脏相对与绝对浊音界
- E. 听诊三尖瓣区有无收缩期杂音

答案： B

253、患儿,女,3岁。身高94cm,体重16kg,因发现心脏杂音就诊,听诊发现该杂音位于心尖区柔和的2/6级收缩期杂音,局限,受呼吸、体位和运动影响。该女孩的杂音可见于

- A、 房间隔缺损
- B、 室间隔缺损
- C、 动脉导管未闭
- D、 生理性杂音
- E、 肺动脉狭窄

答案： D

254、患者,女,54岁,行右侧乳癌改良根治术,术后除了监测患者体温、脉搏、呼吸、血压等生命体征外,还应常规监测的体征是

- A、 肌力
- B、 呼气末二氧化碳分压
- C、 疼痛
- D、 肠鸣音
- E、 意识

答案： C

255、患儿,4个月,多汗,夜惊,枕秃,查血钙正常,血磷稍低,钙磷乘积稍降低,碱性磷酸酶增高,骨骼检查无异常,应给予的治疗是

- A、 口服维生素D制剂5000~10000U/d,持续1个月
- B、 口服维生素D制剂,1万~2万U/d,持续1个月
- C、 口服维生素D制剂,400~500U/d,持续至2岁
- D、 维生素D₃60万U肌注,每周1次,连注3次
- E、 维生素D₃30万U肌注,每周1次,连注3次

答案： A

256、患者,女,27岁。停经50天,腹痛、阴道流血3小时就诊。既往有2次自然流产史。该患者最应进行以下哪项检测

- A、 血小板计数
- B、 血小板功能
- C、 凝血因子活性测定
- D、 凝血酶原时间测定
- E、 抗心磷脂抗体测定

答案： E

257、患者,女,26岁。停经60天,腹痛伴少量阴道流血3天,发热1天。月经周期5~7天/28天。查体:T38.2℃,P90次/min,BP100/70mmHg,急性病容。妇科检查:阴道少量暗红色血,宫口松,子宫增大如孕50天,压痛明显,双附件区增厚,压痛明显。血常规:WBC $13.2 \times 10^9/L$,中性粒细胞90%。最佳处理是

- A、立即行清宫术
- B、控制感染+保胎治疗
- C、B超检查后决定是否保胎
- D、控制感染后滴注缩宫素
- E、控制感染后行刮宫术

答案: E

258、患者,男,18岁,胸闷呼吸困难1天。查体:瘦长体型,右侧胸廓饱满,胸片提示右侧气胸,纵隔左移。现在最适宜的诊疗措施是

- A、吸氧
- B、胸腔闭式引流
- C、胸带加压包扎
- D、呼吸机辅助呼吸
- E、急诊剖胸探查

答案: B

259、患者,男,58岁,因甲状腺肿瘤行甲状腺次全切除术,术后患者感觉头面部汗腺分泌障碍,上睑下垂,应当考虑下列哪一结构受损伤

- A、颈交感干
- B、内脏大神经
- C、内脏小神经
- D、动眼神经
- E、眼神经

答案: A

260、患者,男,25岁,活动后心悸、气促4年,偶感心前区疼痛。查体:血压18.6/5.3kPa(),心界向左下扩大,胸骨左缘第3肋间闻舒张期叹气样杂音。最可能的诊断为

- A、冠心病心绞痛
- B、动脉导管未闭
- C、风心病,主动脉瓣关闭不全
- D、心肌炎
- E、肥厚梗阻性心肌病

答案 C

答案:

261、患者,男,35岁,因胸闷气短,下肢水肿入院,入院胸部X线检查发现心右缘弧度明显增大,心右缘由哪部分心腔构成

- A、左心房
- B、左心室
- C、右心房
- D、右心室
- E、右心房和右心室

答案: C

262、患儿,女,13岁,学生。3天前突然高热达39℃,伴发冷和寒战,同时出现剧烈头痛,频繁喷射性呕吐,无上腹部不适,进食少,二便正常。皮肤散在少量出血点,伴随脑膜刺激征。既往体健,无胃病和结核病史,无药物过敏史。取淤斑涂片镜检可见G⁻双球菌。患儿可能患有的疾病为

- A、脑膜炎球菌感染引起的流脑
- B、乙脑病毒感染引起的流乙脑
- C、A群链球菌感染引起的猩红热
- D、肺炎链球菌感染引起的脑膜炎
- E、金黄色葡萄球菌感染引起的食物中毒

答案: A

263、患者,男,42岁,近3个月来有口渴多饮,但无多食,消瘦,2次空腹血糖8.6mmol/L(154.8mg/dl),8.9mmol/L(160mg/dl)。为确诊,首选应做

- A、口服葡萄糖耐量试验(OGTT)
- B、静脉法葡萄糖耐量试验
- C、皮质素葡萄糖耐量试验
- D、控制饮食2个月后再做OGTT
- E、不需再做其他试验

答案: E

264、患者,男,50岁,气喘、干咳3月,痰中带血半月,曾用抗生素、氨茶碱、泼尼松等治疗无效,气喘渐重。既往无咳嗽史。查体:气促,不能平卧,听诊双肺上中部可闻及吸气性喘鸣,左上肺尤为明显,心率110次/min,律齐无杂音。以下哪项诊断可能性最大

- A、慢性喘息型支气管炎
- B、支气管哮喘
- C、心源性哮喘
- D、支气管扩张
- E、支气管肺癌

答案: E

265、患者,男,56岁。胃溃疡致上消化道出血,呼吸加快,脉搏 147 次/min,血压 67/44mmHg,此时的处理方案应是

- A、先用升压药纠正休克
- B、立即行手术治疗
- C、先纠正休克,待情况好转后再行手术治疗
- D、胃镜治疗
- E、在积极抗休克的同时进行手术治疗

答案: E

266、患者,女,35岁,上腹部隐痛不适伴消瘦1月。胃镜提示胃癌。CT扫描如图所示:右侧肾上腺区可见一占位性病灶。应诊断为



- A、右肾上腺腺瘤
- B、右肾上腺腺癌
- C、右肾上腺转移瘤
- D、右肾上腺嗜铬细胞瘤
- E、右肾上腺错构瘤

答案: C

267、患者,男,40岁。大量饮酒4小时未排尿,回家途中向前摔倒后,立即出现下腹部剧痛,无法自解小便。查体:P85次/min, BP110/75mmHg。腹部压痛、反跳痛及肌紧张,以下腹部较重,移动性浊音阳性。导尿管可顺利插入,引流出少量血性液体,注入100ml生理盐水,回抽出40ml。腹腔穿刺抽出血性液。诊断首先考虑

- A、膀胱破裂
- B、输尿管损伤
- C、脾损伤并肾损伤
- D、后尿道损伤
- E、肾挫伤

答案: A

268、患者,女,22岁。左侧乳房外上象限可扪及一肿块,约1.5cm×1.0cm,质似硬橡皮球,边界清楚,可推动。对于该病描述,错误的是

- A、月经对肿块大小无影响
- B、可服用药物消除肿物
- C、妊娠前后发现的肿物应手术切除

D、手术应将肿物及其包膜整块切除

E、肿块常规需做病理检查

答案： B

269、根据患者 BMR 检测结果 $225.6\text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 下列正确的是[正常 BMR 参考值为 $146.9\text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$]

A、 BMR 值在正常范围

B、提示有肾上腺皮质功能亢进

C、提示有肾上腺皮质功能低下

D、提示有甲状腺功能亢进

E、提示有甲状腺功能低下

答案： D

270、多发性肌炎

A、抗-TG 和抗-TM 阳性

B、抗平滑肌抗体阳性

C、抗线粒体抗体阳性

D、抗乙酰胆碱受体抗体阳性

E、抗 Jo-1 抗体阳性

答案： E

271、桥本甲状腺炎

A、抗-TG 和抗-TM 阳性

B、抗平滑肌抗体阳性

C、抗线粒体抗体阳性

D、抗乙酰胆碱受体抗体阳性

E、抗 Jo-1 抗体阳性

答案： A

272、原发性胆汁性肝硬化

A、抗-TG 和抗-TM 阳性

B、抗平滑肌抗体阳性

C、抗线粒体抗体阳性

D、抗乙酰胆碱受体抗体阳性

E、抗 Jo-1 抗体阳性

答案： C

273、自身免疫性肝炎

A、抗-TG 和抗-TM 阳性

- B、 抗平滑肌抗体阳性
- C、 抗线粒体抗体阳性
- D、 抗乙酰胆碱受体抗体阳性
- E、 抗 Jo-1 抗体阳性

答案： B

274、一位 31 岁妇女因心慌、多汗、消瘦伴月经不调 2 个月来诊。半个月前患病毒性肝炎, 查体: 甲状腺 I 度肿大, 心率 100 次/min。应做的检查是

- A、 甲状腺摄 ^{131}I 率
- B、 血清 TT₃、TT₄ 测定
- C、 血清胆固醇测定
- D、 血清 FT₃、FT₄ 测定
- E、 T₃ 抑制试验

答案： D

275、妊娠 3 个月妇女, 因心慌、低热、腹泻半个月而住院, 体检, 心率 120 次/min, 大便化验正常。应做的检查是

- A、 甲状腺摄 ^{131}I 率
- B、 血清 TT₃、TT₄ 测定
- C、 血清胆固醇测定
- D、 血清 FT₃、FT₄ 测定
- E、 T₃ 抑制试验

答案： D

276、无尿

- A、 每日尿量<400ml
- B、 每日尿量<300ml
- C、 每日尿量<200ml
- D、 每日尿量<100ml
- E、 每日尿量<30~50ml

答案： E

277、学龄儿童少尿

- A、 每日尿量<400ml
- B、 每日尿量<300ml
- C、 每日尿量<200ml
- D、 每日尿量<100ml
- E、 每日尿量<30~50ml

答案： A

278、婴幼儿少尿

- A、 每日尿量<400ml
- B、 每日尿量<300ml
- C、 每日尿量<200ml
- D、 每日尿量<100ml
- E、 每日尿量<30~50ml

答案： C

279、大面积烧伤后,突然出现上消化道出血或上腹痛症状,可能是并发了

- A、 柯林溃疡
- B、 十二指肠溃疡
- C、 库欣溃疡
- D、 复发性溃疡
- E、 吻合口溃疡

答案： A

280、胃大部切除术后,经常上腹痛、黑便,药物治疗无效,可能是并发了

- A、 柯林溃疡
- B、 十二指肠溃疡
- C、 库欣溃疡
- D、 复发性溃疡
- E、 吻合口溃疡

答案： E

281、患者,男,20岁。中上腹间歇性疼痛1年,伴反酸,胃液分析BAO及MAO均高于正常人水平,可能是并发了

- A、 柯林溃疡
- B、 十二指肠溃疡
- C、 库欣溃疡
- D、 复发性溃疡
- E、 吻合口溃疡

答案： B

282、患者,女,45岁。既往无胃病史,因为感冒曾服用感冒药数粒,今晨突然呕吐咖啡色液体300ml,可能是并发了

- A、 柯林溃疡
- B、 十二指肠溃疡
- C、 库欣溃疡
- D、 复发性溃疡

E、 吻合口溃疡

答案： C

283、可产生自溶酶的化脓性球菌是

A、 淋病奈瑟菌

B、 脑膜炎奈瑟菌

C、 A 群链球菌

D、 金黄色葡萄球菌

E、 肺炎链球菌

答案： B

284、可经性接触传播的病原体是

A、 淋病奈瑟菌

B、 脑膜炎奈瑟菌

C、 A 群链球菌

D、 金黄色葡萄球菌

E、 肺炎链球菌

答案： A

285、引起新生儿“脓漏眼”的病原体是

A、 淋病奈瑟菌

B、 脑膜炎奈瑟菌

C、 A 群链球菌

D、 金黄色葡萄球菌

E、 肺炎链球菌

答案： A

286、一名 60 岁具有凝血障碍的女患者,无明显外伤史,近期头痛,CT 示双侧额顶叶新月形低密度影

A、 急性硬膜下血肿

B、 亚急性硬膜下血肿

C、 慢性硬膜下血肿

D、 急性硬膜外血肿

E、 亚急性硬膜外血肿

答案： C

287、患者,男,25 岁,外伤后 3 小时,CT 示左额顶叶新月形高密度影

A、 急性硬膜下血肿

B、 亚急性硬膜下血肿

- C、 慢性硬膜下血肿
- D、 急性硬膜外血肿
- E、 亚急性硬膜外血肿

答案： A

288、患者,男,30岁,外伤后5天,头痛,恶心呕吐,CT示左颞叶梭形略高密度影

- A、 急性硬膜下血肿
- B、 亚急性硬膜下血肿
- C、 慢性硬膜下血肿
- D、 急性硬膜外血肿
- E、 亚急性硬膜外血肿

答案： E

289、急性肾功能不全少尿期易发生

- A、 高钠血症
- B、 高钾血症
- C、 低钾血症
- D、 高钙血症
- E、 血尿素氮降低

答案： B

290、慢性肾功能不全晚期易发生

- A、 高钠血症
- B、 高钾血症
- C、 低钾血症
- D、 高钙血症
- E、 血尿素氮降低

答案： B

291、慢性肾功能不全早期容易发生

- A、 高钠血症
- B、 高钾血症
- C、 低钾血症
- D、 高钙血症
- E、 血尿素氮降低

答案： C

292、患者,男,40岁,患慢性肾炎10年,近日乏力,血压

16/10.8kPa(120/80mmHg),尿蛋白(++),血尿素氮11.2mmol/L(30mg/dl),肌酐132 μ mol/L(15mg/dl)。首选治疗为

- A、 限制蛋白摄入
- B、 口服氧化淀粉
- C、 腹膜透析
- D、 血液透析
- E、 肾移植

答案： A

293、患者,女,50岁,慢性肾盂肾炎20年,乏力、恶心、呕吐1月余。既往3个月前患有浸润性肺结核,尿蛋白(+)。血压21.2/13.5kPa相当于160/100mmHg,血尿素氮35.7mmol/L,肌酐709 μ mol/L。最有效治疗为

- A、 限制蛋白摄入
- B、 口服氧化淀粉
- C、 腹膜透析
- D、 血液透析
- E、 肾移植

答案： D

294、患者,男,70岁,高血压病30年,脑出血偏瘫2个月,心电图示心肌缺血,频发室性期前收缩,肾功能严重受损,生化已达尿毒症指标。最适宜治疗为

- A、 限制蛋白摄入
- B、 口服氧化淀粉
- C、 腹膜透析
- D、 血液透析
- E、 肾移植

答案： C

295、大面积烧伤可导致

- A、 高渗性脱水
- B、 低渗性脱水
- C、 等渗性脱水
- D、 水肿
- E、 水中毒

答案： C

296、低蛋白血症可导致

- A、 高渗性脱水
- B、 低渗性脱水
- C、 等渗性脱水
- D、 水肿
- E、 水中毒

答案： D

297、低渗性脱水时输液过多过快可导致

- A、 高渗性脱水
- B、 低渗性脱水
- C、 等渗性脱水
- D、 水肿
- E、 水中毒

答案： E

298、原发性腹膜炎的病原菌感染多为

- A、 大肠杆菌
- B、 溶血性链球菌
- C、 葡萄球菌
- D、 绿脓杆菌
- E、 混合感染

答案： B

299、继发性腹膜炎的病原菌感染多为

- A、 大肠杆菌
- B、 溶血性链球菌
- C、 葡萄球菌
- D、 绿脓杆菌
- E、 混合感染

答案： E

300、患者,女,55岁,胸闷气促1个月,关于该患者的诊断,通常用超声波检查不能确定诊断的心脏病变有

- A、 心包积液
- B、 肥厚型梗阻性心肌病
- C、 二尖瓣狭窄
- D、 病毒性心肌炎
- E、 二尖瓣关闭不全

答案： D

1、红细胞内主要的抗氧化物是

- A、 NADH
- B、 COQH
- C、 GSH
- D、 FADH₂
- E、 FMNH₂

答案： C

2、典型的器官特异性自身免疫病是

- A、 系统性红斑狼疮
- B、 桥本甲状腺炎
- C、 皮炎
- D、 类风湿性关节炎
- E、 硬皮病

答案： E

3、下列关于 tRNA 叙述, 错误的是

- A、 通常由几百个核苷酸组成, 分子量较大
- B、 含有假尿嘧啶
- C、 磷酸与核糖的比值为 1
- D、 含有胸腺嘧啶
- E、 含有二氢尿嘧啶

答案： A

4、关于胆红素, 哪项说法是错误的

- A、 在生理条件下它是难溶于水的脂溶性物质
- B、 主要由衰老破坏的红细胞中血红素代谢而来
- C、 在血中与清蛋白结合成血胆红素的形式运输
- D、 在肝细胞内主要与葡萄糖醛酸结合
- E、 正常人尿中会出现胆红素

答案： E

5、肾积水时的病理生理变化, 错误的是

- A、 尿液从肾脏排出受阻
- B、 肾内压力升高

- C、 肾盂扩张
- D、 肾实质萎缩
- E、 最终变为固缩肾

答案： E

6、妊娠糖尿病的高危因素与下列哪一种因素无关

- A、 肥胖
- B、 家族糖尿病史
- C、 孕妇身高
- D、 孕妇出生体重
- E、 有死胎或巨大儿史

答案： C

7、中心法则阐明的遗传信息表达方式是

- A、 蛋白质→RNA→DNA
- B、 RNA→DNA→蛋白质
- C、 RNA→蛋白质→DNA
- D、 DNA→RNA→蛋白质
- E、 DNA→蛋白质→RNA

答案： D

8、尿道造影适用于

- A、 急性前列腺炎
- B、 输精管结核
- C、 射精功能障碍
- D、 隐匿性精索静脉曲张
- E、 隐睾

答案： C

9、继发性肺结核最常见的是

- A、 肺门淋巴结结核
- B、 血行播散性肺结核
- C、 浸润型肺结核
- D、 慢性纤维空洞型肺结核
- E、 结核性胸膜炎

答案： C

10、临床上用于慢性乙型病毒性肝炎治疗的细胞因子首选

- A、 IFN- α

- B、 IFN- β
- C、 IFN- γ
- D、 TGF- β
- E、 TNF- α

答案： A

11、关于认知评价, 正确的是

- A、 个体觉察到的情景对他人影响的认知过程
- B、 个体觉察到的情景对自身影响的认知过程
- C、 个体感受到的情绪对他人影响的行为过程
- D、 个体感受到的情绪对自身影响的行为过程
- E、 个体对自身在刺激情景下的应对手段

答案： B

12、非系统性眩晕可见于哪种疾病

- A、 良性位置性眩晕
- B、 前庭神经元炎
- C、 后循环缺血
- D、 多系统萎缩-C 型
- E、 痛性眼肌麻痹

答案： E

13、当培养液内色氨酸浓度较大时, 色氨酸操纵子将处于

- A、 诱导表达
- B、 阻遏表达
- C、 基本表达
- D、 组成表达
- E、 协调表达

答案： B

14、某患者被确诊为乳腺癌, 以下哪期不属于患者的心理反应时期

- A、 否认-怀疑期
- B、 焦虑-抑郁期
- C、 休克-恐惧期
- D、 愤怒-沮丧期
- E、 接受-适应期

答案： B

15、甲状腺的淋巴注入的淋巴结是

- A、 颌下淋巴结
- B、 下颌下淋巴结
- C、 耳后淋巴结
- D、 咽后淋巴结
- E、 气管旁淋巴结

答案： E

16、枕先露时,胎头矢状缝与左斜径一致,大囟门在骨盆入口右前方,胎方位是

- A、 枕左前
- B、 枕右前
- C、 枕左后
- D、 枕右后
- E、 枕左横

答案： C

17、8周以内妊娠时,容易发生完全流产,最主要的原因是

- A、 胎盘绒毛发育尚不成熟,与子宫蜕膜联系不牢固
- B、 胎盘已形成
- C、 胎盘绒毛与蜕膜层联系牢固
- D、 孕激素分泌过多
- E、 孕卵发育异常

答案： A

18、糖尿病酮症酸中毒的特征性表现为

- A、 皮肤黏膜干燥
- B、 呼吸深大
- C、 血压下降
- D、 昏迷
- E、 呼出气有烂苹果味

答案： E

19、关于下尿路感染,下述说法错误的是

- A、 尿中有蛋白管型
- B、 无明显发热
- C、 腰部无明显压痛
- D、 尿频,尿急,尿痛
- E、 尿中有多量白细胞、少量红细胞

答案： A

20、常用分离巨噬细胞的方法是

- A、补体结合试验
- B、ADCC 效应
- C、E 花环形成
- D、对玻璃和塑料制品的黏附性
- E、凝集反应

答案： D

21、可以使非糖物质转化为活性葡萄糖的是

- A、糖的有氧氧化
- B、磷酸戊糖途径
- C、糖酵解
- D、三羧酸循环
- E、糖异生

答案： E

22、急性白血病与再生障碍性贫血的鉴别最有意义的检查是

- A、血细胞计数
- B、外周血找幼稚细胞
- C、网织红细胞计数
- D、骨髓象检查
- E、有否肝脾淋巴结肿大

答案： D

23、舌咽神经分布的区域不包括

- A、舌前 2/3
- B、咽壁
- C、鼓室
- D、颈动脉窦
- E、颈动脉小球

答案： A

24、下列哪种物质有利于铁的吸收

- A、牛奶
- B、蛋
- C、咖啡
- D、茶
- E、维生素 C

答案： E

25、关于人巨细胞病毒的描述, 正确的是

- A、 有多个血清型
- B、 人类是其唯一宿主
- C、 有敏感的动物模型
- D、 体外培养尚未成功
- E、 对脂溶剂不敏感

答案： B

26、可导致外阴瘙痒的全身因素,除了

- A、 糖尿病
- B、 缺乏维生素 A
- C、 缺乏维生素 B
- D、 缺乏维生素 C
- E、 黄疸

答案： D

27、关于氨基酸代谢的错误论述是

- A、 氨基酸的吸收是耗能的主动转运
- B、 氨基酸经脱氨基后生成 α -酮酸和氨
- C、 转氨基作用是各种氨基酸共有的代谢途径
- D、 氨基酸脱氨基的主要方式是联合脱氨基作用
- E、 通过氨基酸脱羧,可以合成一些重要的含氮化合物

答案： C

28、基本肾单位应包括

- A、 肾小球+肾小囊+肾小管
- B、 肾小球+集合管
- C、 肾小球+肾小管+集合管
- D、 肾小球毛细血管丛
- E、 入球动脉+出球动脉+直血管

答案： A

29、血浆鱼精蛋白副凝试验()检测

- A、 纤维蛋白原
- B、 纤维蛋白单体
- C、 纤维蛋白降解产物
- D、 凝血酶原
- E、 纤溶酶

答案 C

答案：

30、小脑幕切迹疝受挤压的结构是

- A、 海马和齿状回
- B、 海马
- C、 大脑枕叶
- D、 海马旁回和钩回
- E、 小脑扁桃体

答案： D

31、下列不是病理性肾结核的特点的是

- A、 主要在肾小球周围毛细血管丛内形成多发性微小结核病灶
- B、 这种早期结核病变可以全部自行愈合
- C、 临床上常不出现症状
- D、 不引起影像学改变
- E、 在尿中查不到结核分枝杆菌

答案： E

32、人本主义学者马斯洛提出了

- A、 潜意识学说
- B、 人格冲突说
- C、 需要层次说
- D、 行为强化说
- E、 社会学习学说

答案： C

33、下列属于脂肪动员产物的是

- A、 甘油
- B、 3-磷酸甘油
- C、 3-磷酸甘油醛
- D、 1, 3-二磷酸甘油酸
- E、 2, 3-二磷酸甘油酸

答案： A

34、治疗单纯部分发作首选的药物是

- A、 丙戊酸钠
- B、 苯巴比妥
- C、 卡马西平
- D、 苯妥英钠
- E、 乙琥胺

答案： C

35、下面哪项内容不是对行为治疗的描述

- A、 基于实验心理学的成果
- B、 帮助病人消除不良行为
- C、 关注病人对事物的理解
- D、 促进良好行为的产生
- E、 可操作性相对较强

答案： C

36、衣原体在细胞内的繁殖型是

- A、 革兰阳性圆形体
- B、 革兰阴性圆形体
- C、 内基小体
- D、 原体
- E、 始体

答案： E

37、小婴儿发生室上性心动过速时容易诱发心力衰竭,应及时予以纠正。其室上性心动过速的心电图特点是

- A、 心室率>160bpm, 有 ST-T 改变
- B、 心室率>180bpm, P-R 间期可以不等
- C、 心室率>250bpm, QRS 波宽大畸形
- D、 心室率 120~180bpm, QRS 波形态同窦性
- E、 心室率 200~300bpm, R-R 间期规则匀齐

答案： E

38、通过促使肌浆网释放 Ca^{2+} 而引起心肌细胞内钙超载物质是

- A、 磷脂酰肌醇
- B、 三磷酸肌醇(IP3)
- C、 甘油二酯
- D、 2,3-DPG
- E、 cAMP

答案： B

39、下列对诊断急性肾小球肾炎最有价值的是

- A、 血沉增快
- B、 抗“O”增高
- C、 尿沉渣可见红细胞管型
- D、 C3 补体下降
- E、 蛋白尿

答案： C

40、下列先天性心脏病中最可能自然闭合的是

- A、 第 1 孔型房间隔缺损
- B、 第 2 孔型房间隔缺损
- C、 室间隔膜周部的缺损
- D、 漏斗部室间隔缺损
- E、 主肺动脉间隔缺损

答案： C

41、开始保护会阴最正确的时期是

- A、 胎头着冠以后
- B、 胎头开始拨露
- C、 看见胎头以后
- D、 胎头拨露、后联合紧张时
- E、 宫口开全, 消毒后

答案： D

42、稳定型心绞痛患者为了控制心绞痛症状, 通常首先考虑的药物是

- A、 非双氢吡啶类钙拮抗剂
- B、 单硝酸异山梨酯
- C、 β 受体阻滞剂
- D、 双氢吡啶类钙拮抗剂
- E、 抗血小板药物

答案： C

43、糖皮质激素可治疗

- A、 角膜溃疡
- B、 真菌感染
- C、 接触性皮炎
- D、 水痘
- E、 肾上腺皮质功能亢进

答案： C

44、氟喹诺酮类作用机制是

- A、 抑制细菌的转肽酶而影响细菌黏肽合成
- B、 抑制细菌二氢叶酸合成酶
- C、 抑制细菌 DNA 回旋酶, 阻碍 DNA 复制产生抗菌作用
- D、 抑制细菌蛋白合成

E、破坏细菌的细胞壁

答案： C

45、下列哪项不符合布鲁菌病急性期的治疗原则

A、 关节疼痛剧烈者可应用镇痛剂

B、 抗菌治疗多采用联合用药, 剂量足, 疗程够

C、 中毒症状明显者可适当应用肾上腺皮质激素

D、 尽早采用菌苗疗法

E、 应选择能进入细胞内的药物, 抗生素可选用多西环素、利福平、氟喹诺酮类药物

答案： D

46、脑中氨的主要去路是

A、 扩散入血

B、 合成尿素

C、 合成嘌呤

D、 合成谷氨酰胺

E、 合成必需氨基酸

答案： D

47、基因表达过程中仅在原核生物中出现而并不出现在真核生物的是

A、 tRNA 的稀有碱基

B、 σ 因子

C、 冈崎片段

D、 DNA 连接酶

E、 起始密码子 AUG

答案： B

48、下列哪一种疾病不引起二尖瓣狭窄

A、 老年人二尖瓣环钙化

B、 肺源性心脏病

C、 二尖瓣先天性畸形

D、 风湿热后

E、 类风湿关节炎

答案： B

49、关于肾小球肾炎的发病机制, 目前认为关系最密切的是

A、 抗原抗体复合物形成

B、 T 淋巴细胞致敏

- C、 机体免疫功能低下
- D、 抗体直接损伤
- E、 B淋巴细胞致敏

答案： A

50、有机磷酸酯类中毒, 必须马上用胆碱酯酶复活药抢救, 是因为

- A、 胆碱酯酶不易复活
- B、 胆碱酯酶复活药起效慢
- C、 被抑制的胆碱酯酶很快“老化”
- D、 需要立即对抗乙酰胆碱作用
- E、 该药药效持续时间短, 需迅速注射

答案： C

51、最易合并感染性心内膜炎的是

- A、 室间隔缺损
- B、 法洛四联症
- C、 动脉导管未闭
- D、 房间隔缺损
- E、 肺动脉狭窄

答案： A

52、如腹水量少于 1000ml, 最合适的检查体位是

- A、 左侧卧位
- B、 肘膝位
- C、 坐位
- D、 俯卧位
- E、 右侧卧位

答案： B

53、关于异位妊娠的诊断, 下述哪项最为重要

- A、 病史
- B、 腹部检查及阴道检查
- C、 后穹隆穿刺
- D、 hCG 测定
- E、 诊刮

答案： D

54、连于胃小弯的韧带是

- A、 脾胃韧带

- B、胃膈韧带
- C、胃结肠韧带
- D、脾肾韧带
- E、肝胃韧带

答案： E

55、下列哪种疾病不引起肾病综合征

- A、急慢性肾小球肾炎
- B、糖尿病肾病
- C、慢性肾盂肾炎
- D、系统性红斑狼疮肾炎
- E、过敏性紫癜肾炎

答案： C

56、对食物过敏的最佳预防方法是

- A、脱敏治疗
- B、免疫生物疗法
- C、过敏反应试验
- D、避免接触过敏原
- E、服用抗过敏药

答案： D

57、横结肠造口手术后患者施行瘻口关闭术,进行手术区皮肤消毒时,涂擦消毒剂的顺序是

- A、由于术区中心部向四周涂擦
- B、由手术区外周向瘻口周围涂擦
- C、由手术区的上方涂向下方
- D、由手术区的一侧涂向另一侧
- E、无需按一定的顺序

答案： B

58、在人体肠道正常菌群中,占绝对优势的是

- A、链球菌
- B、大肠埃希菌
- C、变形杆菌
- D、白色念珠菌
- E、无芽孢厌氧菌

答案： E

59、前列腺增生症的手术治疗指征是

- A、 排尿困难较重
- B、 偶有血尿
- C、 有反复尿潴留史, 残尿量 50ml 以上
- D、 直肠指检前列腺明显增大
- E、 并发有膀胱炎症

答案: C

60、一有髓神经纤维动作电位的锋电位持续时间约 2 毫秒, 从理论上讲, 它 1 秒内所产生的动作电位次数不可能超过多少次

- A、 100
- B、 200
- C、 300
- D、 400
- E、 500

答案: E

61、诊断维生素 D 缺乏的金标准是

- A、 骨龄
- B、 甲状腺功能检测
- C、 骨碱性磷酸酶
- D、 血清 25-(OH)D₃测定
- E、 尿钙

答案: D

62、婴儿 6 个月时应接种以下哪一种疫苗

- A、 卡介苗
- B、 乙肝疫苗
- C、 脊髓灰质炎疫苗
- D、 白百破疫苗
- E、 麻疹疫苗

答案: B

63、预防妊娠高血压疾病的发生及发展, 以下哪项是错误的

- A、 妊娠晚期体重每周超过 1000g 为妊娠水肿
- B、 定期产前检查
- C、 妊娠早期了解基础血压
- D、 重视产妇主诉
- E、 避免精神紧张

答案: A

64、吞噬细胞主要包括

- A、 NK 细胞和单核-巨噬细胞
- B、 单核-巨噬细胞和中性粒细胞
- C、 中性粒细胞和树突状细胞
- D、 NK 细胞和中性粒细胞
- E、 中性粒细胞和 APC

答案： B

65、青霉素类药共同具有

- A、 耐酸、口服有效
- B、 耐 β -内酰胺酶
- C、 抗菌谱广
- D、 主要应用于革兰阳性菌感染
- E、 可能发生过敏性休克, 并有交叉过敏反应

答案： E

66、羊水过多的临床特点是

- A、 慢性羊水过多常出现呼吸困难
- B、 慢性羊水过多时, 羊水在数日内增多
- C、 急性羊水过多常发生在妊娠 28 周后
- D、 羊水过多孕妇易并发妊娠高血压疾病
- E、 急性羊水过多孕妇多能扪清胎位

答案： D

67、关于皮质脊髓侧束正确的是

- A、 在脊髓外侧索前部下行
- B、 是小部分在延髓椎体交叉的纤维
- C、 其下行纤维终止于中间神经元
- D、 起于中央前回大锥体细胞
- E、 一侧脊髓损伤出现同侧肢体随意运动障碍

答案： E

68、椎-基底动脉系统主要供应

- A、 大脑后 2/5, 丘脑后部, 脑干
- B、 小脑, 脑干, 丘脑后部
- C、 脑干, 小脑
- D、 脑干, 大脑后 2/5, 小脑
- E、 脑干, 大脑后 2/5, 小脑, 丘脑后部

答案： D

69、HSV 分型的特异性抗原决定簇是

- A、 gB
- B、 gC
- C、 gD
- D、 gE
- E、 Gg

答案： E

70、人的心理实质是

- A、 心脏的功能
- B、 思维的结果
- C、 个性的反映
- D、 脑的功能
- E、 对事物整体属性的反映

答案： D

71、肺心病的心电图改变中, 错误的是

- A、 右心房肥大
- B、 极度顺钟向转位
- C、 肺性 P 波
- D、 肢体导联 QRS 波群低电压
- E、 左心房肥大

答案： E

72、钩端螺旋体病的主要流行季节是

- A、 1~2 月份
- B、 3~4 月份
- C、 5~6 月份
- D、 7~10 月份
- E、 11~12 月份

答案： D

73、病人求医过程中, 引起愤怒反应最常见的因素是

- A、 医院环境不好
- B、 医疗负担过重
- C、 疾病无法治愈
- D、 医患之间冲突
- E、 病人期望过高

答案： D

74、剑突下突发突止的钻顶痛和绞痛,最可能的诊断是

- A、胆道结石
- B、胆管癌
- C、胆道蛔虫
- D、胰腺结石
- E、十二指肠溃疡病

答案: C

75、患者,男,48岁,近4年诊断为“临界性高血压”。这类患者的主要临床表现为

- A、早期发生左心功能不全
- B、血压波动,有时血压正常
- C、易出现直立性低血压
- D、常合并冠心病与脑动脉硬化
- E、常呈一过性脑缺血(TIA)表现

答案: B

76、胸片无改变的 SARS 疑似患者,多久之内须要复查 X 线片

- A、6 小时
- B、12 小时
- C、1~2 天
- D、5~6 天
- E、15 天

答案: C

77、治疗洋地黄中毒所致的阵发性室性心动过速,最有效的是

- A、苯妥英钠和钾盐
- B、乙胺碘呋酮(胺碘酮)和钾盐
- C、异搏定(维拉帕米)和钾盐
- D、普罗帕酮和钾盐
- E、奎尼丁和钾盐

答案: A

78、正常女性的染色体核型为

- A、44, XX
- B、46, XX
- C、46, XY
- D、47, XY
- E、45, XX

答案： B

79、预后最差的乳腺癌类型是

- A、 乳头状癌
- B、 髓样癌
- C、 炎性乳腺癌
- D、 胶样癌
- E、 腺癌

答案： C

80、下列图像的最佳诊断是



- A、 肝破裂
- B、 胰腺损伤
- C、 小肠破裂
- D、 脾破裂
- E、 结肠破裂

答案： D

81、法洛四联症患儿突然晕厥最可能的原因是

- A、 长期缺氧所致
- B、 血液黏滞、血流变慢而引起脑血栓
- C、 肺动脉漏斗部狭窄的基础上, 突然发生该处肌部痉挛
- D、 合并脑膜炎
- E、 主动脉骑跨严重程度

答案： C

82、下列选项中不属于小脑核的是

- A、 栓状核
- B、 球状核
- C、 红核
- D、 顶核
- E、 齿状核

答案： C

83、不属于人工被动免疫方式的是

- A、 注射胸腺素
- B、 注射免疫核糖核酸
- C、 注射胎盘丙种球蛋白
- D、 注射人血清丙种球蛋白
- E、 通过胎盘从母体获得抗体

答案： B

84、脊髓副交感神经低级中枢位于

- A、 胸腰部的脊髓侧角中
- B、 全部骶节中的骶副交感核
- C、 骶 2~4 节中的骶副交感核
- D、 全部腰节中的中间外侧核
- E、 腰 2~4 节中的中间外侧核

答案： C

85、下列哪项检查对缺铁性贫血的诊断最有意义

- A、 血红蛋白减少
- B、 血清铁减少
- C、 总铁结合力升高
- D、 骨髓可染铁, 内外铁阴性
- E、 小细胞低色素性贫血

答案： D

86、有关 Calot 三角, 下列哪项是错误的

- A、 由胆囊管、肝总管、肝下缘构成
- B、 胆囊动脉在此区穿过
- C、 肝右动脉在此区穿过
- D、 副右肝管在此区穿过
- E、 胆道手术在此区不易发生误伤

答案： E

87、肾母细胞瘤区别于泌尿系其他肿瘤的要点是

- A、 虚弱婴幼儿腹部有巨大包块
- B、 有血尿、尿频、尿痛
- C、 常早期转移至颅骨和肝
- D、 血中肾素活性升高
- E、 血中 EPO 升高

答案： A

88、肾前性急性肾衰竭最常见的原因是

- A、 四氯化碳中毒
- B、 肾盂肾炎
- C、 肾内血栓形成
- D、 尿路梗阻
- E、 有效循环血量减少

答案： E

89、关于动脉粥样硬化的危险因素, 以下正确的是

- A、 女性患病晚于男性, 因为绝经期前女性高密度脂蛋白低于男性
- B、 饮酒和吸烟均为致病的重要危险因素
- C、 载脂蛋白 B 降低、载脂蛋白 A 升高促发
- D、 收缩压增高引起动脉硬化的意义不如舒张压增高明显
- E、 常染色体显性遗传所致家族性高脂血症可导致本病

答案： E

90、GFR 测定的参考方法是

- A、 肌酐清除率
- B、 对氨基马尿酸清除率
- C、 尿素清除率
- D、 尿酸清除率
- E、 菊粉清除率

答案： E

91、耳、肾毒性最小的氨基糖苷类药物是

- A、 链霉素
- B、 卡那霉素
- C、 庆大霉素
- D、 新霉素
- E、 奈替米星

答案： E

92、以下哪项是系统性硬化病的病理特点

- A、 血管壁炎症浸润, 血管壁纤维素样增生、内皮细胞增生
- B、 血管壁炎症致血栓形成, 自身抗体造成大量组织损坏
- C、 滑膜增生, 炎性细胞浸润
- D、 末梢循环障碍, 小动脉内血栓形成
- E、 血管病变、胶原增殖、纤维化

答案： E

93、关于中央型肺癌的特点,应除外

- A、 由段以上支气管发生
- B、 位于肺门部
- C、 多是小细胞肺癌
- D、 较易被纤维支气管镜检查发现
- E、 巨大癌块环绕癌变支气管

答案: C

94、以下哪项不是经典型苯丙酮尿症的典型症状

- A、 智力低下
- B、 尿液有鼠尿臭味
- C、 肌无力
- D、 色素减退
- E、 精神行为异常

答案: C

95、谵妄时最多见的幻觉是

- A、 听幻觉
- B、 内脏幻觉
- C、 视幻觉
- D、 触幻觉
- E、 嗅幻觉

答案: C

96、线粒体的研究是从 1857 年开始的,瑞士解剖学家及生理学家阿尔伯特·冯·科立克在肌肉细胞中发现了颗粒状结构。美国化学家莱昂诺尔·米歇利斯推断线粒体参与某些氧化反应。德国生物化学家奥托·海因里希·沃伯格成功完成线粒体的粗提取且分离得到一些催化与氧有关的反应的呼吸酶被授予诺贝尔生理学或医学奖。下列完全发生在线粒体中的反应是

- A、 糖酵解
- B、 糖异生
- C、 磷酸戊糖途径
- D、 糖的有氧氧化
- E、 三羧酸循环

答案: E

97、机体主要通过下面哪个系统或器官维持体液平衡,保持内环境稳定

- A、 神经系统
- B、 内分泌系统

- C、 下丘脑-垂体后叶-血管加压素系统
- D、 肾
- E、 肾素-醛固酮系统

答案： C

98、左胸部外伤后,医生高度怀疑是心包积血,下列哪一项是错误的

- A、 心包腔内压力升高
- B、 回心血量减少
- C、 心排出量减少
- D、 动脉血压下降
- E、 中心静脉压下降

答案： E

99、胸部开放性损伤,下述哪项是正确的

- A、 胸部创口裂开深达肋间肌
- B、 伤侧肋骨骨折断端外露
- C、 损伤后气胸,伤侧肺压缩 60%
- D、 伤侧皮下气肿并血气胸
- E、 壁层胸膜穿通,空气经伤口出入胸膜腔

答案： E

100、与氨基糖苷类抗生素同时应用会加重耳毒性的药物

- A、 头孢匹罗
- B、 螺内酯
- C、 呋塞米
- D、 青霉素 G
- E、 氢氯噻嗪

答案： C

101、军团菌肺炎抗菌治疗首选

- A、 红霉素
- B、 氯霉素
- C、 青霉素
- D、 先锋霉素
- E、 氧氟沙星

答案： A

102、女性患者,乳房上部有一个结节,请问该处的淋巴管最容易注入的是

- A、 胸肌淋巴结

- B、 膈上淋巴结
- C、 尖淋巴结
- D、 胸骨旁淋巴结
- E、 锁骨下淋巴结

答案： C

103、根据《医疗事故处理条例》规定,对需要进行技术鉴定的医疗事故纠纷,医学会应当受理的情形是

- A、 患者向医学会提出申请的
- B、 患者所在单位或基层组织向医学会提出申请的
- C、 涉及医疗纠纷的医疗机构向医学会提出申请的
- D、 医疗纠纷当事人委托的律师事务所提出申请的
- E、 发生纠纷医疗机构所在地卫生行政部门交办的

答案： E

104、女性生殖管道始基是

- A、 副中肾管
- B、 生殖嵴
- C、 中肾管
- D、 性索
- E、 泌尿生殖窦

答案： A

105、心电图 ST 段下移呈鱼钩形改变应考虑

- A、 低血钾
- B、 低血钙
- C、 洋地黄作用
- D、 高钾血症
- E、 心肌梗死

答案： C

106、患者,男,40 岁。上腹部不适,黑便。胃镜检查:胃窦部黏膜严重充血,水肿,小弯侧有多处糜烂及黏膜下出血点。病理切片中有中性粒细胞,淋巴细胞浸润,血管破坏及出血。曾因关节痛服用过吲哚美辛等药物。考虑最为适宜的诊断是

- A、 急性糜烂出血性胃炎
- B、 胃窦部多发性溃疡
- C、 萎缩性胃炎
- D、 胃泌素瘤
- E、 肥厚性胃炎

答案： A

107、患者,女,24岁,1年来血压经常在 27.9/17.3kPa (210/130mmHg)左右,查体:上腹部闻及清楚的血管杂音。尿蛋白(++)。为解决诊断,下列哪项检查最有意义

- A、肾脏超声
- B、肾脏 CT
- C、同位素肾图
- D、静脉肾盂造影
- E、肾动脉造影

答案: E

108、患者,女,39岁,近两个多月来乏力、厌食,面部及四肢出现水肿,气短,夜间有时不能平卧。BP19/13.3kPa (143/100mmHg),胸片提示两隔肋角变钝,尿蛋白(+++),尿镜检 RBC20~25 个/HP,血 BUN18mmol/L,Scr403 μ mol/L,血浆蛋白 68g/L,血清白蛋白 24g/L。最可能的诊断是

- A、链球菌感染后肾小球肾炎
- B、高血压病并心功能不全
- C、慢性肾炎肾功能不全氮质血症期
- D、狼疮性肾炎
- E、紫癜性肾炎

答案: C

109、患儿高热呈弛张型,有时达 40℃,指关节梭形肿张,并有虹膜睫状体炎,最可能的诊断是

- A、风湿热
- B、幼年型类风湿病
- C、败血症型关节炎
- D、骨关节炎
- E、中毒性滑膜炎

答案: B

110、患者,女,42岁,8年前左乳房外上方发现肿块,当时切除活检报告“乳房纤维囊性增生病”,近一个多月来又发现切口下一硬块,边界不清,无痛,逐渐增大。最恰当的处理应是

- A、门诊随访
- B、中药治疗
- C、抗雌激素药物治疗
- D、穿刺活检
- E、手术切除

答案: E

111、20 岁在校大学生,寒假前往北方某地游玩,突发头痛、恶心呕吐,伴有腹部痉挛性疼痛和水样便,无发热。电镜下粪便中可见大量球形病毒颗粒,具有双层衣壳,形似车轮状。对于该病毒的特性描述正确的是

- A、基因组分 11 个节段
- B、不会引起动物腹泻
- C、胰酶作用可使其感染性消失
- D、致病机制是导致肠黏膜出血性坏死
- E、目前无有效疫苗加以预防

答案: A

112、患者,女,30 岁。以“低位肠梗阻 10 天”诊断入院。BP 10/8kPa 相当于 80/60mmHg, P 120 次/min,皮肤湿冷,舌质干燥,眼窝凹陷,浅静脉萎缩,血钠 120mmol/L, CO₂CP20mmol/L。最佳补液方案为

- A、快速补充等渗盐后加碳酸氢钠
- B、快速补充等渗盐后加 5%氯化钠
- C、快速补充乳酸钠-复方氯化钠、羟乙基淀粉后加 5%氯化钠
- D、先补充 5%氯化钠后改为乳酸钠-复方氯化钠
- E、先补充 5%氯化钠后改为等渗盐水

答案: C

113、患者,女,54 岁,于睡眠中痛醒,夜间胸骨后剧痛半小时,为压榨性,并向左臂放射。患者曾先后含硝酸甘油 4 片,疼痛稍减轻,但烦躁不安,出汗。近 2 年血压偏高,未治疗。查体:体温 36.5℃, 血压 12.0/8.0kPa 相当于 90/60mmHg, 脉率 100 次/min;心界不大,律齐,第一心音低钝,未闻奔马律及杂音;双肺少许湿性啰音;肝脾未扪及。最可能的诊断是

- A、不稳定型心绞痛
- B、气胸
- C、急性肺动脉栓塞
- D、急性心肌梗死
- E、急性心包炎

答案: D

114、患者,女,26 岁,已婚,因闭经半年就诊。患者 2 年前月经量渐少,半年前闭经。妇科检查:盆腔基本正常,基础体温双相型。应首先采用何种方法确定闭经的原因

- A、测血 FSH 值
- B、染色体检查
- C、孕激素试验
- D、雌激素试验

E、 诊断性刮宫

答案： C

115、患者,女,18岁。患上呼吸道感染1周后,感心悸,气短,乏力,心率98次/分。心电图示P-R间期为0.22s,应诊断为

- A、 窦性心动过速
- B、 窦性心律不齐
- C、 二度Ⅰ型房室传导阻滞
- D、 二度Ⅱ型房室传导阻滞
- E、 一度房室传导阻滞

答案： E

116、患者心搏骤停,经心肺复苏后自主循环恢复,但呼之不应,疼痛刺激无任何反应,脑干反射消失,双侧病理征阴性。这种意识状态最可能为

- A、 闭锁综合征
- B、 浅昏迷
- C、 去皮质状态
- D、 中昏迷
- E、 深昏迷

答案： E

117、患者,男,16岁,肥胖,多毛,大剂量地塞米松能被抑制,血皮质醇浓度增高且昼夜节律消失,最可能的诊断是

- A、 单纯性肥胖
- B、 Cushing 综合征
- C、 肾上腺皮质腺瘤
- D、 Cushing 病
- E、 异位 ACTH 综合征

答案： D

118、患儿,男,8岁,左侧阴囊包块,平卧时消失,透光试验阳性,最可能的诊断是

- A、 精液囊肿
- B、 睾丸肿瘤
- C、 腹股沟斜疝
- D、 交通性鞘膜积液
- E、 睾丸鞘膜积液

答案： D

119、患者,男,70岁。诊断为前列腺增生症,下列哪项不是手术治疗的指征

- A、 非手术治疗无效
- B、 反复出现急性尿潴留, 及肉眼血尿
- C、 反复泌尿系感染且合并膀胱结石
- D、 慢性尿潴留合并肾功能损害
- E、 排尿困难, 且前列腺大小为 5cm×5cm×6cm

答案: E

120、患者, 男, 60 岁, 大动脉发生硬化, 以下哪个指标的变化是正确的

- A、 收缩压下降
- B、 舒张压升高
- C、 脉压增大
- D、 大动脉容量减少
- E、 脉搏传播速度减慢

答案: C

121、进行性梗阻性黄疸患者伴上腹胀痛, 经 B 超检查胆总管直径 1.8cm, 胆囊高度肿大, 壁薄, 肝内胆管轻度扩张。除 CT 检查外, 哪项检查意义最大

- A、 十二指肠低张造影
- B、 ERCP
- C、 PTC
- D、 选择性血管造影(腹腔动脉造影)
- E、 核素扫描

答案: E

122、患儿, 男, 6 岁。高热嗜睡, 呕吐 3 天伴有精神症状, 强哭强笑, 右上肢抽搐。查体: 脑膜刺激征阳性, 右下肢肌力 3 级, 右侧巴宾斯基征阳性, 脑脊液: 白细胞 $200 \times 10^6/L$, 淋巴细胞 90%, 中性粒细胞 10%, 蛋白 0.7g/L (70mg/dl), 糖及氯化物正常。最可能的诊断是

- A、 结核性脑膜炎
- B、 病毒性脑膜炎
- C、 真菌性脑膜炎
- D、 化脓性脑膜炎
- E、 脑脓肿

答案: D

123、患者, 女, 30 岁。停经 42 天, 右下腹疼痛伴不规则阴道出血 10 余天, 刮出物送病检为子宫内膜蜕膜样改变。最大可能的诊断

- A、 功血
- B、 流产

- C、 子宫内膜炎
- D、 异位妊娠
- E、 月经期

答案： D

124、患者,男,50岁。右侧腹股沟可还纳性包块5年,突发右下腹阵发性绞痛,伴恶心、呕吐,肛门停止排气排便3天。查体:T39.8℃,BP12/10kPa相当于90/75mmHg,右侧腹股沟区有一8cm×6cm大小包块,局部触痛明显,阴囊红肿。下列哪项处理最为适宜

- A、 补液,胃肠减压
- B、 观察生命体征,如有休克则行手术
- C、 立即手术
- D、 抗生素应用
- E、 回纳包块入腹腔,严密观察生命体征

答案： C

125、患者,男,29岁。因败血症休克接受静脉滴注去甲肾上腺素治疗时不慎出现药液外漏,引起皮肤苍白和疼痛。为防止局部组织缺血坏死,应皮下浸润注射

- A、 酚妥拉明
- B、 阿托品
- C、 育亨宾
- D、 普萘洛尔
- E、 美卡拉明

答案： A

126、患者,男,28岁。患者会不由自主的不断重复想象做过的事情或走过的路等整个详细的经过,虽觉得没有意义,但仍无法摆脱,感到痛苦。该症状为

- A、 强迫思维
- B、 强迫性怀疑
- C、 强迫性意向
- D、 强迫性回忆
- E、 强迫性联想

答案： D

127、患者,女,40岁。因风湿性心脏病出现心衰,心功能Ⅱ级,并有下肢水肿;经地高辛治疗后,心功能有改善,但水肿不见好转。检查发现血浆醛固酮水平高,此时最好选用

- A、 呋塞米
- B、 氢氯噻嗪

- C、 螺内酯
- D、 吲达帕胺
- E、 卡托普利

答案： C

128、患者,男,32 岁。服用中药 1 周后体检发现肝功能异常。既往无肝炎病史。胆肝 B 超正常。TBIL171 $\mu\text{mol/L}$, ALP340U/L, ALT210U/L, AST70U/L, HBsAg(-), 抗 HCV(-), 抗 HAVIgM(-), ANA(-)。最可能的诊断是

- A、 原发性胆汁性肝硬化
- B、 原发性硬化性胆管炎
- C、 药物性肝病
- D、 原发性肝癌
- E、 病毒性肝炎

答案： C

129、患儿,男,1 岁。发热、咳嗽 5 天入院。查体:呼吸 42 次/分,双肺闻及中细湿啰音,胸部 X 线示两下肺模糊片影,最可能的诊断是

- A、 大叶性肺炎
- B、 腺病毒肺炎
- C、 支原体肺炎
- D、 毛细支气管炎
- E、 支气管肺炎

答案： E

130、患者,男,54 岁。发热、胸痛 1 月余,继往有酗酒史,请结合 CT 图像,选择最可能的诊断



- A、 脓胸
- B、 肺脓肿
- C、 大叶性肺炎
- D、 肺孢子虫病
- E、 肺癌

答案： A

131、初产妇, 32 岁, 产后失眠、焦虑、情绪不稳定。关于产褥期抑郁症, 以下说法不正确的是

- A、 产后 2 周内容容易出现
- B、 可表现为轻度抑郁
- C、 抑郁严重者需服用抗抑郁药物
- D、 应给予心理上的关怀、鼓励和安慰
- E、 孕前往往有抑郁症病史

答案: E

132、患者, 女, 40 岁。不规则阴道流血 3 个月, 阴道顶端及宫颈均为硬、脆易出血的组织代替。宫体前位, 大小正常, 欠活动, 双侧附件区增厚, 硬, 未达盆壁。宫颈活检为鳞状上皮癌。其最适合的治疗是

- A、 宫颈癌根治术及盆腔淋巴结清扫
- B、 次广泛性子宫切除术
- C、 化疗+放疗
- D、 放疗
- E、 化疗后子宫全切除术

答案: D

133、患者, 男, 40 岁, 活动后出现心前区痛, 眩晕, 超声心动图检查为室间隔厚度与左室后壁之比 >1.3 。最适宜的治疗是

- A、 硝酸甘油
- B、 罂粟碱
- C、 地西洋(安定)
- D、 普萘洛尔
- E、 索米痛片

答案: D

134、患者, 65 岁, 慢性支气管炎和阻塞性肺气肿病史 10 余年, 近 1 年来反复因肺部感染致呼吸衰竭住院治疗。患者目前胸闷、气促明显, 生活不能自理, 未吸氧时动脉血气分析 $\text{PaO}_2 55\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 50\text{mmHg}$ 。正在医生指导下接受呼吸康复治疗。为减轻肺动脉高压、改善生命质量, 首选下列哪项治疗

- A、 长期家庭氧疗
- B、 应用降肺动脉压药物
- C、 应用间歇正压通气
- D、 应用膈肌起搏器
- E、 应用阿米脱林, 提高 PaO_2

答案: A

135、患儿,男,3个月,诊断为脊柱裂,其合并畸形产生的症状如下,除外

- A、脑积水
- B、Chiari 畸形
- C、脊柱侧弯
- D、皮毛窦
- E、脊髓炎

答案: E

136、患者主诉心悸。常规心电图示窦性心律,75次/min,多次检查有时出现宽大 QRS 波群,时间 0.12 秒,前后的 R-R 间期为 1.6 秒。心电图诊断最可能为

- A、窦性心律,房室传导阻滞
- B、窦性心律,房性期前收缩
- C、窦性心律,室性期前收缩
- D、心房颤动,室性期前收缩
- E、窦性心律,右束支传导阻滞

答案: C

137、患者,女,25岁,甲状腺弥漫性肿大,无突眼。甲状腺摄¹³¹I率:3小时20%,24小时55%。T₃抑制试验3小时20%,24小时40%。最宜采用以下哪种治疗方案

- A、甲状腺干制剂
- B、泼尼松
- C、碘糖丸
- D、甲巯咪唑
- E、无需治疗

答案: D

138、患者,男,18岁,咳嗽头晕1个月,胸片和CT检查示前纵隔囊实性肿物,可见钙化。最可能的诊断是

- A、胸腺瘤
- B、淋巴瘤
- C、畸胎瘤
- D、胸内甲状腺瘤
- E、神经源性肿瘤

答案: C

139、患儿,男,4岁,反复水肿1月余,尿蛋白镜检(+++),血白蛋白28g/L,血胆固醇10.4mmol/L,该患儿的诊断可能是

- A、 肾病综合征
- B、 急性肾小球肾炎
- C、 慢性肾小球肾炎
- D、 急进性肾小球肾炎
- E、 IgA 肾病

答案： A

140、患儿,女,6岁,4年前曾诊断为肾小管酸中毒()和低钾性瘫痪,并开始临床治疗。近期复查:血肌酐正常,EPO含量正常,24h尿钙排泄增加。该患儿可能出现下列何种病变

- A、 佝偻病
- B、 肢端肥大
- C、 肾性贫血
- D、 高钙血症
- E、 PTH分泌增加

答案 A

答案： A

141、一病人脑血管意外入院治疗,经检查右侧大脑中动脉中央支闭塞,患者会出现下列哪种症状

- A、 右耳听力丧失
- B、 左耳听力丧失
- C、 左眼视野鼻侧和右眼视野颞侧偏盲
- D、 右眼视野鼻侧和左眼视野颞侧偏盲
- E、 双眼左侧视野同向性偏盲

答案： E

142、患者,男,40岁,发现血压升高,并已排除了继发性高血压。以下可判断为1级高血压的是

- A、 收缩压 21.3kPa (160mmHg)
- B、 舒张压 13.3kPa (100mmHg)
- C、 病程 5 年
- D、 未发现心脑血管肾损害
- E、 服降压药效果好

答案： D

143、患者,男,38岁,发作性心悸伴气短3小时,急检心电图各导联均未见正常P波,而V₁导联有明显的f波,频率为460次/min,心室率绝对不规则。下列体征具有诊断意义的是

- A、S₁、S₂同时减弱伴奇脉
- B、A₂减弱伴水冲脉
- C、S₁强弱不等伴短绌脉
- D、S₁减弱伴重搏脉
- E、P₂增强伴交替脉

答案： C

144、患者,男,54岁,体重超重11%,有典型三多一少症状4个月。入院前监测:空腹血糖14.55mmol/L,餐后血糖18.88mmol/L,未治疗。入院时随机血糖15.6mmol/L;尿常规示尿糖(+++),酮体(+);血钾3.25mmol/L;OGTT示空腹血糖6.59mmol/L,餐后2小时血糖16.93mmol/L,糖化血红蛋白12.5%;超声提示轻度脂肪肝,血管超声符合动脉粥样硬化性改变。可初步诊断为下列哪一种疾病

- A、1型糖尿病
- B、2型糖尿病
- C、妊娠糖尿病
- D、糖原累积症
- E、特殊类型糖尿病

答案： B

145、患儿,男,1岁。3天前无明显诱因出现斜视伴复视,查体头围较正常同龄婴儿增大,前囟膨隆。该患儿最有可能的诊断是

- A、甲亢
- B、先天性脑积水
- C、畸形
- D、颅裂
- E、脑水肿

答案： B

146、患儿,女,10岁。持续发热12日,体温38~39℃,每日腹泻3~5次,稀便,肝肋下1cm,脾肋下1.5cm。血分析:WBC $5.1 \times 10^9/L$,N 55%,L 45%。肥达反应:“H”1:80,“O”1:160。肝功能ALT80U/L。尿分析:尿胆原(+),胆红素(-)。抗-HBs(+).其最可能的诊断是

- A、病毒性肝炎
- B、伤寒
- C、疟疾
- D、钩体病
- E、金黄色葡萄球菌败血症

答案： B

147、患者,男,35岁,腹部挫伤2小时,腹痛呈持续性,进行性加重。查体:脉搏110次/min,血压90/60mmHg。腹部饱满,腹式呼吸受限,全腹压痛、反跳痛、肌紧张。叩诊移动性浊音(-),听诊肠鸣音弱。腹腔诊断性穿刺抽出2ml浑浊不凝血。最适合的治疗方式是

- A、 禁食,严密观察
- B、 行全面周密检查
- C、 多学科会诊
- D、 抢救休克同时,急诊剖腹探查
- E、 输血补液,待休克纠正后手术

答案: D

148、某高血压患者在情绪激动时突然发生讲话含糊不清、右侧肢体无力及活动不灵,半小时后送来医院时,曾呕吐1次,测血压为180/120mmHg,患者示意左侧头痛,检查发现右侧中枢性面舌瘫,右侧上下肢肌力均为2级,右偏身感觉障碍。此患者首先要考虑的诊断为

- A、 小脑半球出血
- B、 蛛网膜下腔出血
- C、 脑室出血
- D、 左侧基底节区出血
- E、 脑干出血

答案: D

149、患者,男,63岁,痰中带血2天,不发热,X线检查如图,最可能的诊断是



- A、 左肺上沟瘤
- B、 左上肺癌
- C、 左肺炎性假瘤
- D、 左肺结核瘤
- E、 左肺炎症

答案: B

150、患者,男,30岁,自述心慌、气短10天,X胸片示心脏呈烧瓶状,超声心动图显示心包内液性暗区,体检可发现下述体征,除了

- A、颈静脉怒张
- B、肝大
- C、奇脉
- D、动脉血压升高
- E、脉压减小

答案: D

151、患者,女,24岁,近3个月来月经增多,皮肤及牙龈间断出血来诊。查体:牙龈及皮肤淤斑,肝脾未触及,胸骨无压痛。化验:Hb100g/L。骨髓示:巨核细胞明显增多,成熟型减少。最可能的诊断是

- A、慢性再障
- B、急性再障
- C、急性淋巴细胞白血病
- D、原发性血小板减少性紫癜
- E、DIC

答案: D

152、患者,男,42岁,患肝硬化5年。3、4天前分别放腹水1500ml,近3天患者烦躁,易激动,有时言语不清。今日患者随地大小便,双上肢扑翼样震颤阳性。目前该患者饮食中蛋白质应该()最为适宜

- A、暂时不给
- B、限制在80g/d以下
- C、限制在40g/d以下
- D、限制在20g/d以下
- E、不予限制

答案: A

153、患儿,男,12岁,常于体育活动时感心悸,气促,甚至有时发生晕厥,但无发绀、发热、咳嗽等。听诊肺动脉瓣区有3级粗糙的喷射状收缩期杂音,向左颈传导,肺动脉瓣区第二心音降低。最可能的诊断为

- A、二尖瓣狭窄
- B、法洛四联症
- C、动脉导管未闭
- D、肺动脉口狭窄
- E、主动脉瓣狭窄

答案: D

154、患者,女,60岁。因外阴瘙痒就诊于妇科,经外用药物治疗,症状可好转,但常复发,为进一步诊治,应首选

- A、涂片查真菌
- B、细菌培养
- C、血常规检查
- D、血糖测定
- E、涂片查细菌

答案: D

155、患儿,7个月。发热、呕吐,水样便,每天7~8次,已3天。查体:体温38.5℃,轻度脱水貌,咽部充血,心、肺正常,肠鸣音亢进。大便镜检脂肪球(++)。最可能的诊断为

- A、上呼吸道感染
- B、生理性腹泻
- C、真菌性肠炎
- D、病毒性肠炎
- E、侵袭性细菌所致肠炎

答案: D

156、患者,男,25岁,阴茎皮疹2周,无瘙痒、疼痛等不适。诊断一期梅毒。下列皮损中最有诊断价值的皮损是

- A、红斑
- B、丘疹
- C、溃疡
- D、色素沉着
- E、脓疱

答案: C

157、患儿,女,9个月。腹泻2天,轻度脱水,轻度酸中毒,在无明显呕吐、腹胀时,第一天补液首选

- A、3:2:1溶液静脉滴注
- B、2:1溶液静脉滴注
- C、4:3:2溶液静脉滴注
- D、ORS溶液
- E、2:3:1溶液静脉滴注

答案: D

158、患者,女,35岁。性生活后阴道出血6个月,妇检如图,宫颈口见菜花状肿物。最可能诊断为



- A、 宫颈息肉
- B、 慢性子宫颈炎
- C、 宫颈肥大
- D、 宫颈腺囊肿
- E、 宫颈癌

答案: E

159、患者,女,78岁。胸片显示心影增大,心腰部由钝角变为近似直角,呈“靴形”。可能引起这种X线变化的疾病是

- A、 心肌炎
- B、 高血压病
- C、 肺动脉高压
- D、 室间隔缺损
- E、 甲状腺功能亢进

答案: B

160、患儿5岁,阵发性头痛3个月,因突然剧烈头痛、反复呕吐半天急诊入院。查体:神志清醒,双瞳孔正常,颈项强直。半小时后突然呼吸停止,心跳存在。其诊断是

- A、 病毒性脑膜炎
- B、 急性脑水肿
- C、 急性脑膜炎
- D、 枕骨大孔疝
- E、 小脑幕切迹疝

答案: D

161、患者,男,60岁。于8月6日早上开始发热,体温41℃,傍晚时开始持续抽搐并迅速发生深度昏迷,瞳孔忽大忽小,呈叹息样呼吸,既往有糖尿病病史。化验乙脑特异性IgM抗体阳性。目前诊断应属于下列哪一型

- A、 轻型

- B、普通型
- C、重型
- D、极重型
- E、非典型

答案： D

162、患者,男,45岁,因“高热、左膝关节肿痛1周”入院。有静脉药瘾史。血培养耐甲氧西林金黄色葡萄球菌阳性。宜选用哪一种抗菌药物

- A、青霉素
- B、万古霉素
- C、头孢曲松
- D、左氧氟沙星
- E、阿米卡星

答案： B

163、患者,男,66岁,偶有便血2个月。查体:一般状况好,直肠指检离肛门6cm,可触及直径2.5cm硬结,活动,病理检查诊断为高分化腺癌最适宜的手术方式是

- A、经肛门镜局部切除后外照射
- B、经纤维结肠镜局部电灼
- C、腹会阴联合直肠根治术
- D、经腹腔直肠癌切除术
- E、保留肛门括约肌拉下式直肠癌切除术

答案： C

164、关于漏出性胸腔积液,不正确的是

- A、胸液蛋白/血清蛋白 <0.5
- B、多为单侧性
- C、胸液LDH/血清LDH <0.6
- D、多见于心力衰竭,肝硬化与肾病
- E、亦可见良性与恶性肿瘤

答案： B

165、患者,男,55岁,诊断急性肝衰竭,近两日出现昏睡,考虑肝性脑病,以下关于肝性脑病的治疗错误的是

- A、暂时禁止蛋白质摄入
- B、给予支链氨基酸
- C、肥皂水灌肠
- D、口服乳果糖
- E、口服甲硝唑

答案： C

166、患儿,1岁半。至今不会独立行走,不会叫爸妈。体检:两眼距离增宽,鼻梁低平,眼裂小,两眼外眦上斜,外耳小,舌常伸出口外,通贯手,小指向内弯曲。其可能性最大的诊断是

- A、 软骨发育不良
- B、 先天性甲状腺功能减低症
- C、 21 三体综合征
- D、 苯丙酮尿症
- E、 佝偻病活动期

答案: C

167、5个半月纯母乳喂养儿,体重10kg。您建议最先添加的辅食是

- A、 苹果泥
- B、 营养米粉
- C、 蛋黄
- D、 肉泥
- E、 麦粉

答案: B

168、患者,男,33岁,诊断胸壁冷脓肿,已行正规抗结核治疗6月,目前主要的治疗方法

- A、 脓肿切开引流
- B、 正规抗结核治疗
- C、 脓肿完整切除
- D、 局部热敷
- E、 局部使用抗生素

答案: C

169、患儿,18小时,33周早产,生后2小时出现气促、发绀、呼气性呻吟,进行性加重,头罩吸氧无效,呼吸暂停2次入院。最可能的诊断是

- A、 新生儿湿肺
- B、 吸入性肺炎
- C、 新生儿肺透明膜病
- D、 气胸
- E、 颅内出血

答案: C

170、患者,女,32岁,发热伴皮肤黏膜黄染,右上腹不适2周,肝脾大,HB 65g/L, WBC $15 \times 10^9/L$, BPC $114 \times 10^9/L$,网织红细胞16%。尿胆原(+++),尿胆红素(-)。Coombs 试验(+)。诊断应考虑为

- A、 急性胆囊炎、胆石症
- B、 急性病毒性肝炎
- C、 肝炎合并继发性贫血
- D、 自身免疫性溶血性贫血
- E、 再生障碍性贫血

答案： D

171、患者,女,30岁,诊断胸壁冷脓肿,有低热、盗汗表现,PPD+++ ,未行正规抗结核治疗,目前最主要的治疗方式是

- A、 脓肿切开引流
- B、 正规抗结核治疗
- C、 脓肿完整切除
- D、 局部热敷
- E、 局部使用抗生素

答案： B

172、患者,30岁,近1周右胸痛,发热,轻咳,有少量黏液痰,逐渐出现气促,查体:气管左移,右下胸部叩浊,随体位变动,呼吸音消失。X线胸片示右下肺大片致密阴影,上界呈弧状。为明确诊断,应进行下列哪项检查最为适宜

- A、 结核菌素试验
- B、 胸部超声波检查
- C、 肺CT扫描
- D、 痰菌或痰脱落细胞检查
- E、 抽胸水检查

答案： E

173、患者,女,18岁。反复出现右眼视物模糊、暗点、闪光,约30分钟后出现右额颞部搏动样疼痛,伴恶心、呕吐、畏光、畏声,头痛可持续1~2天,休息后可缓解,脑CT正常。考虑诊断为

- A、 紧张型头痛
- B、 基底型偏头痛
- C、 丛集性头痛
- D、 有先兆偏头痛
- E、 眼肌麻痹性偏头痛

答案： D

174、患者,男,75岁,因发热,咳嗽2个月,X线胸透发现左肺上叶空洞,痰涂片找到抗酸杆菌,用异烟肼、利福平、链霉素治疗月余,今日上午突然咯鲜血400ml,急诊就诊。查体:血压124/73mmHg,脉搏100次/min,口唇有血迹,左肺有水泡音。应首先考虑选用的方法是

- A、 静脉注射垂体后叶素
- B、 氧气吸入
- C、 肌注卡巴克洛
- D、 静滴酚磺乙胺
- E、 输血

答案： A

175、患者,男,45岁,拔牙术后,突然畏寒高热,体温39℃左右,伴右侧胸痛、咳嗽,少量黏痰,10天后转脓性,痰量增至200毫升/日。体检右下肺叩诊浊音,听诊可闻支气管呼吸音及湿啰音。诊断最可能的是

- A、 肺炎球菌肺炎
- B、 肺炎支原体肺炎
- C、 干酪性肺炎
- D、 肺脓肿
- E、 肺癌伴感染

答案： D

176、一患者突感心悸,气短,心电图为P-R间期逐渐延长,最后脱落,一组QRS波群宽度<0.12秒,最可能是

- A、 窦性心动过速
- B、 室性期前收缩
- C、 房性期前收缩
- D、 II° I型房室传导阻滞
- E、 II° II型房室传导阻滞


答案： D

177、患者,男,68岁。进行性贫血1年,剧烈腰痛3个月,近日因喷嚏导致肋骨骨折。肝、脾未触及。血红蛋白90g/L,白细胞 $3.4 \times 10^9/L$,血小板 $70 \times 10^9/L$ 。红细胞沉降率120mm/h,尿蛋白(+++),血清蛋白电泳出现M蛋白,IgG增高,骨髓异常浆细胞60%。腰椎X线片示骨质疏松和圆形穿凿样溶骨损害。本例最可能诊断为

- A、 反应性浆细胞增多
- B、 淋巴瘤
- C、 良性单克隆丙种球蛋白增多症
- D、 原发性巨球蛋白血症
- E、 多发性骨髓瘤

答案： E

178、患者,女,85岁,背部疼痛、脊柱后凸1个月余,结合影像学检查,最可能的诊断是



- A、椎体骨折
- B、脊椎结核
- C、脊柱转移瘤
- D、化脓性脊柱炎
- E、脊椎退行性变

答案: A

179、患者,女,20岁。旅行归来的次日出现低热,食欲缺乏,然后水样便达15次之多,无里急后重感,腹痛为轻中度,伴有恶心和乏力。有轻度脱水,体温38℃。便常规:镜下未见红、白细胞。血常规:白细胞 $5.6 \times 10^9/L$,中性粒细胞占0.8。此患者最有可能的感染是

- A、沙门菌感染
- B、肠产毒素型大肠埃希菌
- C、霍乱弧菌
- D、肠出血型大肠埃希菌
- E、志贺菌感染

答案: B

180、患者,男,26岁。间断腹泻6个月,大便3~4次/d,带黏液及脓血,无发热及体重下降。结肠镜示乙状结肠以下弥漫性充血水肿,黏膜颗粒样改变,质脆易出血,病理可见隐窝脓肿,曾连续服用环丙沙星3周无效。关于此疾病的特点,以下说法正确的是

- A、局限于回肠末端
- B、炎症可浸及黏膜全层
- C、老年人多见
- D、加重可诱发中毒性巨结肠
- E、易形成瘘管

答案: D

181、患者,男,70岁,前列腺肥大手术意外出血、休克,经抢救后恢复。尿检氨基酸(+),尿钠含量高,出现低钠血症。该患者可能出现了哪些损伤

- A、近曲小管损伤
- B、髓攀损伤
- C、远曲小管损伤
- D、集合管损伤
- E、肾小球损伤

答案: A

182、患者,女,37岁,哮喘急性发作时体检发现过度充气体征,与肺气肿相似,此时最好的鉴别方法是

- A、X线检查
- B、肺通气功能检测
- C、高分辨率CT
- D、急性发作期前后肺功能及胸片对比
- E、支气管舒张试验

答案: E

183、患者,女,40岁,体检中发现其宫颈细胞有高度上皮间瘤样病变。有多个性伴侣和衣原体感染,已有5年未做过阴道细胞涂片检查。与该病例最有可能存在关联性的病毒是

- A、副黏病毒
- B、黄病毒
- C、人乳头瘤病毒
- D、细小DNA病毒
- E、风疹病毒

答案: C

184、孕妇,25岁,G₁P₀,妊娠6周。在人工流产术中突然头晕胸闷,血压下降,脉搏变慢,考虑为人工流产综合征。可能的原因是

- A、吸宫不全
- B、羊水栓塞
- C、精神过度紧张
- D、术中出血过多
- E、机械刺激子宫或宫颈引起迷走神经反射

答案: E

185、患者,女,25岁,G₁P₀。婚后工具避孕,因查体患“卵巢囊肿”行囊肿剔除术,术后证实为卵巢巧克力囊肿。经治医生告其预防该病复发的事宜,正确的是

- A、 假孕疗法
- B、 口服丹那唑 1 年
- C、 争取尽早妊娠
- D、 宫内节育器避孕
- E、 口服短效避孕药

答案： C

186、患者,女,18岁,诊断为弥漫性甲状腺肿,其治疗方案是

- A、 手术
- B、 ^{131}I 治疗
- C、 服碘
- D、 服用小剂量甲状腺素片
- E、 服用抗甲状腺药物

答案： D

187、一心脏病患者,原有快速心房颤动,在住院洋地黄治疗过程中,心衰未见好转同时发现心率 70 次/min,律齐,下列心电图最可能的是

- A、 P-QRS-T 顺序出现
- B、 P 波消失,有 f 波, R-R 间期略不等
- C、 P 波消失,有 f 波, R-R 间期相等, QRS 为室上性
- D、 偶有窦 P, QRS 宽大畸形, R-R 略不等
- E、 P-R 相等, R-R 相等, P-P 频率>R-R 频率, P 与 QRS 无关

答案： C

188、某患者用硝酸甘油治疗心绞痛近来效果降低,医生嘱加服 N-乙酰半胱氨酸,其目的是

- A、 增加硝酸甘油的生物利用度,防止过快降解
- B、 使硝酸甘油缓慢释放,延长疗效
- C、 降低硝酸甘油的不良反应
- D、 提供巯基,延缓硝酸甘油耐受性产生
- E、 祛痰,防止黏痰形成

答案： D

189、患者,男,62岁,于2周前无明显诱因出现间歇无痛性肉眼血尿。B超示:膀胱内实质性占位病变。初步诊断为膀胱癌。行手术切除膀胱时需结扎的膀胱上动脉起自

- A、 髂外动脉
- B、 髂内动脉
- C、 阴部内动脉
- D、 闭孔动脉

E、 脐动脉

答案： E

190、患者,女,45岁,因“外阴瘙痒1年”入院。妇检见外阴多个灰白色斑块,活检示:见Paget细胞,表皮基底膜完整。目前诊断为

A、 CIN

B、 VIN

C、 外阴癌

D、 外阴上皮非瘤样病变

E、 外阴良性肿瘤

答案： B

191、患者,男,46岁,晨起心窝部不适,伴恶心未吐,下午2点感到右腹部疼痛,周身乏力。查体:右下腹麦氏点有轻度肌紧张和压痛,并有明显的反跳痛。其反跳痛系

A、 交感神经受刺激

B、 副交感神经受刺激

C、 脊神经受刺激

D、 胃肠痉挛

E、 腹壁血管收缩

答案： C

192、患者,男,6岁,幼儿园吃饭踏入汤桶,造成双足烫伤,脚面可见水疱,其基底潮红,经治疗后患儿好转,患儿愈合后创面不可能发生的是

A、 脱屑

B、 色素沉着

C、 疼痛瘙痒

D、 疤痕挛缩

E、 功能正常

答案： D

193、患者,男,35岁,一周前从东南亚入境,3天前因突然剧烈呕吐、腹泻而入院。腹泻物呈米泔样,便检发现穿梭状运动的细菌。请问致病菌可能是

A、 肠侵袭性大肠埃希菌

B、 伤寒沙门菌

C、 变形杆菌

D、 猪霍乱沙门菌

E、 霍乱弧菌

答案： E

194、患者,女,22岁,农民,反复脓血便半年,左下腹压痛。肠镜检查见30cm处肠黏膜充血,水肿,呈颗粒状,触之易出血。应首选哪项治疗

- A、柳氮磺胺吡啶口服
- B、地塞米松静注
- C、庆大霉素口服
- D、阿托品口服
- E、手术治疗

答案: A

195、患者,男,38岁,急性白血病。化疗后全血细胞减少,出现发热,血浆降钙素原水平200ng/ml,血压90/50mmHg,考虑感染性休克可能。以下哪种检查结果不会出现

- A、血浆组织型纤溶酶原激活剂测定减低
- B、ATTP延长
- C、纤维蛋白原下降
- D、3P试验阴性
- E、D-二聚体增高

答案: A

196、患者,女,30岁。阴道少量不规则出血一周,于2016年7月10日来诊。平素月经规律5/28天,LMP2016年5月25日。既往体健,G₂P₁,放置IUD 8年。一般查体无异常。妇科检查:外阴经产型,阴道畅。少量暗红色血,宫颈口见尾丝,子宫前位,常大,质软,活动好,无压痛。左附件压痛(+),未及包块,右附件(-)。尿HCG(+).B超示宫腔线清晰,宫内未见孕囊,可见IUD。应考虑哪项或哪些诊断

- A、异位妊娠
- B、异常子宫出血
- C、异位妊娠,宫内IUD
- D、宫内IUD,异常子宫出血
- E、绒癌,宫内IUD


答案: C

197、患儿,男,9个月。腹泻3天,大便10次/日,量多,呈蛋花汤样,精神萎靡,眼泪少,尿少,血清钠133mmol/L,皮肤弹性差,唇红,呼吸深快。应诊断为

- A、中度等渗性脱水,呼吸性酸中毒
- B、重度低渗性脱水,代谢性酸中毒
- C、中度低渗性脱水,呼吸性酸中毒
- D、中度等渗性脱水,代谢性酸中毒
- E、重度等渗性脱水,代谢性酸中毒

答案： D

198、患者,男,27岁。头痛、眼球震颤、走路不稳半年余,近1周出现呕吐,MRI检查如图,最可能的诊断为



- A、 脑膜瘤
- B、 转移瘤
- C、 髓母细胞瘤
- D、 血管网状细胞瘤
- E、 皮样囊肿

答案： D

199、患者,男,26岁,服白酒4两后头痛来诊,兴奋健谈,饶舌,易激惹。化验血中乙醇浓度16mmol/L。患者属于中毒哪种状态

- A、 急性酒精过量
- B、 急性酒精中毒兴奋期
- C、 急性酒精中毒共济失调期
- D、 急性酒精中毒昏迷期
- E、 急性酒精中毒幻觉期

答案： B

200、患者左胸背部刀刺伤后胸闷,呼吸困难,呼吸30次/min,心率140次/min,血压90/60mmHg。伤口仍流血不止,颈静脉怒张。气管偏向右侧,左侧叩诊呈鼓音,呼吸音消失。首先要采取的紧急处理是

- A、 输液,输血并观察
- B、 抗休克的同时紧急剖胸探查
- C、 胸腔闭式引流
- D、 胸腔穿刺抽液
- E、 胸腔粗针穿刺抽气

答案： E

201、患儿,男,4个月,夜间睡眠不安。多汗,枕秃,血钙2.25mmol/L,血磷1.0mmol/L,碱性磷酸酶25布氏单位,下列疾病可出现以上临床表现的是

- A、 佝偻病活动早期
- B、 佝偻病活动期
- C、 佝偻病恢复期
- D、 佝偻病后遗症期
- E、 软骨营养障碍

答案： A

202、患者,女,58岁,绝经6年,不规则阴道流血伴阴道流黄水1年。妇科检查:宫颈稍肥大,质正常,糜烂样改变,宫体前倾,稍大,硬度正常,活动。下列措施有最助于确定诊断的是

- A、 阴道细胞涂片检查
- B、 分段诊刮
- C、 超声检查
- D、 宫颈活检
- E、 宫颈细胞学涂片检查

答案： B

203、患者,男,40岁。10年前有风湿性关节炎史。近2周来有心悸、气促,伴夜间阵发性呼吸困难。查体:心尖部第一心音减弱,可闻及4/6级全收缩期吹风样杂音和舒张期隆隆样杂音,最可能是

- A、 风湿性心脏病,二尖瓣狭窄伴关闭不全
- B、 风湿性心脏病,二尖瓣狭窄伴肺动脉瓣狭窄
- C、 风湿性心脏病,二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄
- D、 风湿性心脏病,二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全
- E、 风湿性心脏病,二尖瓣狭窄伴三尖瓣狭窄

答案： A

204、患者,男,58岁,右上腹痛伴发热2月余。近来食欲缺乏,腹胀加重。查体:体温38℃,肝肋下5cm,中等硬度,表面稍不平,压痛阳性,脾肋下3cm,质硬。甲胎蛋白阴性。为明确诊断,下列哪项检查最有意义

- A、 碱性磷酸酶测定
- B、 放射性核素扫描检查
- C、 超声检查
- D、 血常规检查
- E、 5'-核苷酸磷酸二酯酶测定

答案： C

205、患者,女,30岁,腹胀大3年。查体:腹如足月妊娠大小,无压痛,肝脾触不清,叩诊腹中部浊音,两侧鼓音,浊音不随体位改变。下列诊断可能性最大的是

- A、肝硬化腹水
- B、巨大卵巢囊肿
- C、结核性腹膜炎
- D、原发性肝癌
- E、自发性腹膜炎

答案： B

206、患者突然高热,右侧胸痛,下列哪项有助于单纯少量胸腔积液与单纯肺炎实变的鉴别

- A、呼吸运动
- B、气管位置
- C、叩诊音
- D、胸膜摩擦音
- E、肺泡呼吸音

答案： D

207、患者,女,30岁。妊娠21周,合并尖锐湿疣。妇检外阴如图所指示,尖锐湿疣是由人类乳头瘤病毒感染引起的,主要感染型为



- A、HPV6, HPV11
- B、HPV16, HPV18
- C、HPV31, HPV33
- D、HPV35, HPV39
- E、HPV45, HPV51

答案： A

208、某患者血液标本“二对半”的检测结果为:HBsAg(+),抗-HBs(-), HBeAg(+), 抗-HBe(-), 抗-HBc(+). 最有可能的诊断是

- A、乙型肝炎潜伏期
- B、乙型肝炎急性期
- C、乙型肝炎恢复期
- D、HBV 病毒既往感染
- E、接种过乙肝疫苗

答案： B

209、患者,女,29岁,已婚。下腹隐痛2年余,月经5~6/28~30天,末次月经2015年1月13日。于2月20日出现阵发性下腹痛,伴肛门坠胀感,至今已6天,阴道少许流血3天。查体:腹软,有压痛及反跳痛,移动性浊音阴性,子宫稍大,宫颈举痛阳性,后穹隆饱满,右附件区压痛,增厚。尿HCG弱(+)。白细胞 $10.0 \times 10^9/L$,N74%。为明确诊断,首先应做的处理是

- A、后穹隆穿刺
- B、剖腹探查
- C、腹腔镜检
- D、腹腔穿刺
- E、诊断性刮宫

答案: A

210、初孕妇,孕30周,自感近日上楼或散步时心悸气促,恐患有心脏病就诊。下述何项不是妊娠期心脏病的诊断依据

- A、舒张期杂音
- B、II级收缩期杂音
- C、房室传导阻滞
- D、心脏明显扩大
- E、心电图提示心肌损害

答案: B

211、患者,男,60岁,持续胸骨后压榨性疼痛2小时入院。查体:心率102次/min,心律齐,心尖区2/6级吹风样收缩期杂音,BP20/12KPa()。EKG:窦性心律,心电轴左偏 -30° , V_1 、 V_2 呈QS型, V_1 、 V_2 ST段弓背向上抬高0.4mV。该患者梗死部位最可能在

- A、左室前壁
- B、左室前间壁
- C、左室隔面
- D、左室前侧壁
- E、左室高侧壁

答案 B

答案:

212、患者,女,60岁,最近记忆力下降,以前的事情回忆不起来,最近的事也总是很难记住,列举一类名词能力差,命名不能,情感淡漠,运动系统正常。经医生诊断为阿尔茨海默病即Alzheimer disease,AD。与该疾病发生机制相关的是

- A、分子病
- B、DNA的损伤修饰
- C、蛋白质的构象病

D、 翻译的异常启动

E、 基因突变

答案： C

213、患者, 47 岁, 患 2 型糖尿病 10 年, 现因头晕、心悸, 前往医院诊治, 医生诊断为糖尿病伴发高血压和窦性心动过速。医生给予格列本脲和普萘洛尔治疗。请问格列本脲的作用是

A、 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素而降低血糖

B、 属于 α 葡萄糖苷酶抑制剂

C、 新型胰岛素类似物

D、 可以阻止胰岛的衰退

E、 促进乳酸释放

答案： A

214、患儿, 4 个月。因表情较呆滞, 舌大而厚, 喜伸舌来门诊, 经甲状腺功能测定和甲状腺 γ 显像, 诊断为先天性甲状腺功能减退症, 病因为异位甲状腺。医生分析该患儿预后错误的是

A、 新生儿期开始治疗, 智能和体格发育基本正常

B、 诊断后立即给予突击量甲状腺素, 预后较好

C、 治疗开始越早, 效果越好

D、 生后 3 个月开始治疗, 智力可能有一定程度异常

E、 异位甲状腺所致者预后最好

答案： B

215、患者, 男, 52 岁, 3 年前开始乏力, 尿色深黄, 消瘦, 因有严重贫血和黄疸入院。检查肝大肋下 4cm, 脾大肋下 2cm, 红细胞数 $1.02 \times 10^{12}/L$, Hb54g/L, 血小板 $56 \times 10^9/L$, 网织红细胞 0.136, 尿胆原(+), 尿胆红素(-), 抗人球蛋白试验直接法(+), 酸溶血试验(Ham) (-)。最可能的诊断是

A、 阵发性睡眠性血红蛋白尿症

B、 慢性乙型肝炎

C、 自身免疫性溶血性贫血

D、 再生障碍性贫血

E、 Evan's 综合征

答案： E

216、患者, 男, 27 岁。有支气管扩张病史, 近 1 周来咳嗽加剧, 咳黄脓痰, 痰量较多, 偶有少量咯血。查体: 右下肺可闻湿啰音。近日痰量减少, 且出现发热, 体温 $38.3^{\circ}C$ 。首先应考虑

A、 突发感染加重

- B、混合感染,尤其是合并厌氧菌感染
- C、并发肺脓肿
- D、支气管引流不畅
- E、抗生素选用不当

答案: D

217、患儿,男,6岁。发热5天、皮疹2天,神纳差,10天前右手由外伤。体检:T 39.5℃,心肺无异常,躯干部见猩红热样皮疹,肝肋下1.5cm,质地中等,轻压痛,右手有约2cm伤口,有脓性分泌物少许,疑诊败血症,可能的致病菌为

- A、金黄色葡萄球菌
- B、大肠杆菌
- C、厌氧菌
- D、表皮葡萄球菌
- E、β型A组溶血性链球菌

答案: A

218、经产妇,29岁,妊娠35周,重度子痫前期。临产宫口开全,胎心监护频发晚期减速,会阴侧切经阴道分娩,胎盘娩出后见胎盘母体陈旧性血块压迹,患者阴道流血多。首先考虑为何种原因

- A、宫颈裂伤
- B、会阴伤口上延
- C、宫缩乏力
- D、胎膜残留
- E、凝血功能障碍

答案: E

219、患儿,3岁,近来经常在玩耍中突然停顿、两眼直视、面无表情,几秒钟即止,每天发作几十次,查体正常,脑电图显示发作性棘波、尖波,应使用下列哪种药物治疗

- A、苯妥英钠
- B、苯巴比妥
- C、卡马西平
- D、乙琥胺
- E、氯丙嗪

答案: D

220、患者,女,25岁,医生对其进行精神状况检查时,下列哪项反应提示精神分裂症的诊断

- A、提到工作不顺利时唉声叹气

- B、提到躯体不适时紧张担心
- C、提到目睹的车祸时四肢发抖、出汗
- D、提到自己被人跟踪时表现愉快
- E、提到自己的工作计划时兴高采烈,自我感觉良好

答案: D

221、患者,男,25岁。突发右侧胸痛、胸闷、呼吸困难,下列最可能出现的体征是

- A、胸壁静脉曲张
- B、皮下气肿
- C、右侧肋间隙变窄
- D、胸壁压痛
- E、胸骨叩击痛

答案: B

222、患者处于清醒状态,但缺乏始动性而不吃不喝,不语少动,对外界刺激无反应、无欲望,及其淡漠。这种状态提示最可能的病变部位是

- A、双侧颞叶
- B、双侧枕叶
- C、双侧顶叶
- D、双侧额叶
- E、双侧岛叶

答案: D

223、女性,22岁,服务员。同男友交往3年,对方提出分手,出现情绪不稳,失眠,噩梦,头昏痛。某晚半夜突然尖叫一声,意识丧失,四肢抽动,小便失禁,持续2~3分钟,自行停止,清醒后对发作过程不能回忆。最可能的诊断是

- A、恐惧症
- B、躯体形式障碍
- C、焦虑症
- D、抑郁症
- E、分离(转换)性障碍

答案: E

224、患者,女,40岁,已生育。1年前曾患葡萄胎,行两次清宫。近3个月出现阴道不规则流血。近1周咳嗽,痰内带血丝。查体:子宫稍大,软。X线胸片示右肺上野见直径3cm球形阴影。尿HCG阳性。应选择的治疗方法

- A、化疗同时子宫全切
- B、子宫全切后化疗

- C、 化疗后子宫全切
 - D、 化疗
 - E、 广泛性子宫切除
- 答案： D

225、患者,女,30岁,持续发热10天,体温呈稽留热。查体:精神萎靡,反应淡漠,体温39.5℃,心率76次/分,肝肋下1.5cm,脾肋下2cm。白细胞 $3.2 \times 10^9/L$ 。肥达反应O 1:320,H 1:320。ALT 80U/L,血胆红素 $24 \mu mol/L$ 。该患者最可能的诊断是

- A、 急性黄疸性肝炎
 - B、 急性血吸虫病
 - C、 伤寒合并中毒性肝炎
 - D、 钩端螺旋体病
 - E、 病毒性肝炎合并胆道感染
- 答案： C

226、某患者血pH7.31,PaCO₂4.0kPa相当于30mmHg,AB14mmol/L,其酸碱平衡紊乱的类型是

- A、 代谢性酸中毒
 - B、 呼吸性酸中毒
 - C、 代谢性碱中毒
 - D、 呼吸性碱中毒
 - E、 呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒
- 答案： A

227、患儿,女,1岁,诊断为先天性脑积水。7天前行脑室-腹腔分流术,术后第1天复查CT脑室较术前缩小。现患儿突发恶心呕吐,意识状态恶化,急查CT示脑室扩张。目前考虑患儿一般情况恶化的原因最可能是

- A、 脑内血肿
 - B、 分流管梗阻
 - C、 分流管移位
 - D、 过度引流
 - E、 脑水肿
- 答案： B


228、患者,女,27岁,发现甲状腺结节3个月,近1个月来出现Horner综合征,喉镜检查发现右侧声带麻痹,最可能的诊断是

- A、 严重甲亢
- B、 甲状腺瘤并囊内出血

- C、 结节性甲状腺肿恶变
- D、 桥本甲状腺炎
- E、 甲状腺癌

答案： E

229、患者,男,45岁,胸骨后隐痛伴四肢无力3个月余,请结合影像学检查,选出最可能的诊断



- A、 胸内甲状腺肿
- B、 纵隔畸胎瘤
- C、 胸腺瘤
- D、 淋巴瘤
- E、 间皮囊肿

答案： C

230、患者,女,26岁,因发热、咳嗽、眼结膜炎、米糠样皮疹在市传染病院诊断为麻疹,否认麻疹接触史,否认幼时患过麻疹。其有3月龄婴儿,平时因带娃喂奶等与婴儿密切接触。针对该婴儿可采取的预防措施是

- A、 抗病毒治疗
- B、 接种减毒活疫苗
- C、 注射丙种球蛋白
- D、 接种灭活疫苗
- E、 防止硬蜱叮咬

答案： C

231、患者,男,21岁,外伤后出现休克,神志淡漠,少尿。其发病机制是

- A、 肾小球滤过率降低
- B、 肾小管坏死
- C、 肾内 DIC
- D、 输尿管收缩
- E、 肾素分泌减少

答案： A

232、患者,女,20岁,突发右下腹阵发性绞痛伴恶心呕吐,有低热,轻度尿频,尿呈茶色。最应考虑为

- A、右输尿管结石
- B、急性盆腔炎
- C、急性阑尾炎
- D、急性肠系膜淋巴结炎
- E、右侧卵巢囊肿蒂扭转

答案: A

233、患者,女,32岁,肠梗阻3天,无力,脱水征明显, BP80/50mmHg, P120次/min, Na^+ 120mmol/L, K^+ 3.0mmol/L, CO_2CP 18mmol/L, 其补液首先应是

- A、纠正低钠
- B、纠正低钾
- C、纠正酸中毒
- D、补充血容量
- E、补充水

答案: D

234、患者,男,35岁,在进行小鼠实验操作时,突然出现头晕,面部出现红疹,立即停止实验并离开动物操作室。休息,饮温开水,逐渐好转。该患者可能的致病因素是

- A、生物性因素
- B、免疫因素
- C、物理性因素
- D、遗传性因素
- E、先天性因素

答案: B

235、患儿,男,1岁。生后2个月出现便秘,3~4天排便1次,平时食欲差,不活泼,少汗,偶有呕吐。查体:面色苍黄,稍肿,心肺无异常,腹部膨满,有脐疝。本例最可能的诊断是

- A、先天性巨结肠
- B、功能性便秘
- C、高钙血症
- D、肠梗阻
- E、甲状腺功能低下

答案: E

236、患者,男,38岁。发热3天,诊断钩端螺旋体病。用青霉素80万U肌内注射,4小时后寒战,热度更高,脉搏加快,呼吸急促。应首先考虑

- A、 过敏性休克
- B、 并发肺炎
- C、 合并败血症
- D、 Herxheimer 反应
- E、 并发肺炎和心肌炎

答案: D

237、某市居民陈某被自家的宠物狗咬伤,遂立即到附近的社区卫生服务中心接种狂犬病疫苗。一段时间后,陈某身体出现不适,经检验,陈某所接种的狂犬疫苗给其造成了一定程度上的神经损伤。根据《疫苗流通和预防接种管理条例》规定,应当给予陈某一次性补偿的单位是

- A、 省级人民政府财政部门
- B、 县级人民政府财政部门
- C、 省级疾病预防控制中心
- D、 接诊的医疗机构
- E、 疫苗生产企业

答案: E

238、患者,男,36岁,因头晕胸痛半月来诊。血压160/35mmHg,胸片提示靴型心。下列体征不可能出现的是

- A、 毛细血管搏动征
- B、 水冲脉
- C、 胸骨右缘2肋间的收缩期震颤
- D、 胸骨左缘3/4肋间的舒张早期递减性杂音
- E、 枪击音

答案: C

239、患者,男,62岁,腹泻,便血。经结肠镜检查诊断为大肠息肉和憩室,大肠息肉和憩室好发于

- A、 升结肠
- B、 横结肠
- C、 降结肠
- D、 乙状结肠
- E、 盲肠

答案: D

240、患者,男,25岁,农民。10月30日因“突然高热、头痛、腰痛,伴有呕吐及腹泻”就诊,反复发热4天,多次用扑热息痛后退热。半天前出现头晕、尿少,意识清楚。查白细胞 $19 \times 10^9/L$, N88%, Hb135g/L, 血小板 $60 \times 10^9/L$ 。尿中可见絮状物。首先考虑的诊断是

- A、钩端螺旋体病
- B、流行性出血热
- C、败血症
- D、肾盂肾炎
- E、流脑

答案: B

241、孕妇,38岁,G₁P₀,孕34周,腰痛并尿频尿痛,既往无类似发作史。查体:体温39℃,右侧肾区叩痛阳性,尿蛋白(+),白细胞20~30个/HP,尿比重1.022。病变最可能是

- A、妊娠合并肾结石
- B、妊娠合并膀胱炎
- C、妊娠合并肾炎
- D、妊娠合并急性肾盂肾炎
- E、轻度子痫前期

答案: D

242、用髓鞘碱性蛋白(MBP)配以佐剂免疫小鼠,可以诱导产生针对MBP等自身抗原特异性T细胞,小鼠出现类似人多发性硬化症(MS)的多数中枢神经系统功能障碍的症状,导致实验性变态反应性脑脊髓炎()。与小鼠发病无关的因素是

- A、脑部血脑屏障被破坏
- B、免疫耐受状态打破,自身抗原活化自身反应性CD4⁺T细胞
- C、Treg细胞生成障碍,导致Treg数量减少和功能障碍
- D、活化的CD4⁺T细胞分化为Th1和Th17,组织浸润并分泌大量的IFN- γ 和IL-17等细胞因子
- E、在活化T细胞的辅助下,自身反应性B产生大量的抗髓鞘抗原的自身抗体

答案 C

答案: AE

243、患者,男,40岁,因头痛、头晕伴恶心、呕吐就诊,经检查诊断为第四脑室肿瘤。下列选项中,该患者不可能出现的是

- A、不能随意运动
- B、身体平衡不能维持
- C、全身肌紧张减弱
- D、意向性震颤

E、 走路蹒跚,步态不稳

答案: A

244、一患者行甲状腺次全切除术后出现声音嘶哑。喉镜检查显示左侧声带麻痹,分析手术中可能损伤的结构是

A、 舌下神经

B、 喉上神经

C、 舌咽神经

D、 左侧喉返神经

E、 右侧喉返神经

答案: D

245、神经系统查体时,发现患者肢体在被动伸曲时起始阻力明显增加,终末时阻力突发减弱。考虑损伤以下哪个部位

A、 锥体束

B、 锥体外系

C、 小脑

D、 周围神经

E、 脊髓前角

答案: A

246、孕妇,26岁,第一胎,妊娠36周。近5天出现全身水肿,伴头痛、视力模糊。血压21/15kPa(158/113mmHg),尿蛋白(++)。收入院后每日静滴硫酸镁24g。在治疗中。最早出现下列哪一项体征时应立即停药

A、 呼吸减慢

B、 心率减慢

C、 体温升高

D、 膝反射消失

E、 全身肌张力减退

答案: D

247、患者,女,34岁。阵发性腹痛4天,伴有恶心、呕吐,起病以来肛门未排便排气。患者3年前因胆囊结石行胆囊切除术,正值月经中期。查体:脉搏120次/min,血压90/60mmHg,腹饱满,右侧腹部较对侧膨隆,有压痛、反跳痛及肌紧张。右下腹腔穿刺抽出少量暗红色液体。血红蛋白110g/L。最可能的诊断是

A、 绞窄性肠梗阻

B、 宫外孕,输卵管妊娠破裂

C、 急性阑尾炎穿孔,腹膜炎

D、 卵巢囊肿蒂扭转

E、十二指肠溃疡穿孔

答案： A

248、一脑出血的患者,让其睁眼时能自动睁眼,该患者 Glasgow 睁眼反应评分为

A、 0 分

B、 4 分

C、 3 分

D、 2 分

E、 1 分

答案： B

249、患儿,男,8个月。腹泻、呕吐1天,补液后排尿,此时输液瓶中尚有不合钾的液体200ml,此液体中最多可加10%氯化钾多少毫升

A、 2ml

B、 4ml

C、 6ml

D、 8ml

E、 10ml

答案： C

250、患者,女,40岁,反复头晕,乏力,发热及牙龈出血3个月,肝脾不大,白细胞 $2.0 \times 10^9/L$,血红蛋白45g/L,血小板 $23 \times 10^9/L$ 。骨髓增生不良,巨核细胞未见。Ham试验阴性,最可能的诊断是

A、 骨髓增生异常综合征(MDS)

B、 再生障碍性贫血

C、 阵发性睡眠性血红蛋白尿

D、 恶性组织细胞增生症

E、 脾功能亢进

答案： B

251、患者,男,42岁,左上腹撞伤,当时仅感局部疼痛,未行治疗。2周后搬重物时突发腹痛。查体:血压85/45mmHg,左上腹压痛明显。血常规:血红蛋白60g/L。最佳的治疗方案是

A、 脾切除术

B、 卧床,输血补液,严密观察

C、 脾修补术

D、 脾部分切除术

E、 脾止血术

答案： A

252、患者,男,46岁。满腹剧痛10小时,腹部检查发现腹式呼吸运动减弱,腹部稍隆起,触诊全腹腹肌紧张,压痛和反跳痛。该患者最可能的诊断是

- A、 急性腹膜炎
- B、 急性阑尾炎
- C、 急性胰腺炎
- D、 肝硬化
- E、 结核性腹膜炎

答案： A

253、患者,男,45岁。右腰钝痛3年,未经诊治。2周前B超可见右肾区有鹿角结石,有轻度积水,肾图,右肾轻度受损,IVU左肾正常,双输尿管正常,最好的治疗方法应为

- A、 经皮肾镜碎石
- B、 体外震波碎石
- C、 肾切除术
- D、 肾盂切开取石
- E、 肾实质切开取石

答案： A

254、患者,女,25岁。外阴红肿、瘙痒、有脓性分泌物,伴尿频、尿痛3天。采集患者分泌物,涂片镜检,中性粒细胞内外均可见G⁻双球菌。临床诊断为淋病。该患可能经何种途径感染

- A、 粪-口途径
- B、 呼吸道
- C、 性接触
- D、 蚊虫叮咬
- E、 输血

答案： C

255、患者,男,24岁,因心悸,胸痛,劳动时呼吸困难1月,起立时晕眩1周入院。查体:血压正常,无发绀,心界稍扩大,胸骨左缘第3肋间闻及较粗糙的喷射性收缩期杂音,运动后增强。心电图示:II、III、avL、V₄、V₅有病理性Q波,左心肥厚,5天后复查心电图仍为上述改变。最可能的诊断为

- A、 急性心肌梗死
- B、 急性心肌炎
- C、 限制型心肌病
- D、 肥厚型梗阻性心肌病

E、 扩张型心肌病

答案： D

256、一新生儿室暴发脓毒血症,脓汁标本经涂片、革兰染色镜检发现大量葡萄球菌。为确定该菌是否有致病力,应检查

A、 血浆凝固酶

B、 触酶

C、 DNA 聚合酶

D、 尿素酶

E、 磷酸酯酶

答案： A

257、患者,女,30岁,停经1年余,疑诊催乳素瘤而进行血清催乳素检查。一般认为其值()可确诊

A、 $<100 \mu\text{g/L}$

B、 $<200 \mu\text{g/L}$

C、 $>200 \mu\text{g/L}$

D、 $<300 \mu\text{g/L}$

E、 $>300 \mu\text{g/L}$

答案： C

258、患者,女,21岁,入学体检来我院门诊。医生告诉她患有风心病二尖瓣狭窄,但患者说无任何自觉症状。为预防心衰的发生,下列处理正确的是

A、 严格限制体力活动

B、 严格限制钠盐摄入

C、 积极防治链球菌感染

D、 每日口服地高辛维持治疗

E、 尽早行手术治疗

答案： C

259、患者,男,36岁,心悸怕热,手颤乏力1年,大便不成形,3~4次/日,体重下降12kg。查体:P90次/min, BP128/90mmHg,皮肤潮湿,双手细颤,眼球突出,甲状腺弥漫Ⅱ度肿大,闻及血管杂音,心率104次/min,律不齐,心音强弱不等,腹平软,肝脾未触及,双下肢无水肿。该患者治疗首先的是

A、 丙硫氧嘧啶

B、 立即行甲状腺大部切除

C、 ^{131}I 治疗

D、 普萘洛尔

E、 复方碘溶液

答案： A

260、初孕妇, 25 岁, 妊娠 36 周。近期出现皮肤瘙痒严重, 并伴有巩膜黄染, 血清病毒学检查未见异常。ALT80U/L。最可能的诊断是

- A、 妊娠期急性脂肪肝
- B、 药物性肝炎
- C、 妊娠合并重症肝炎
- D、 妊娠肝内胆汁郁积症
- E、 妊娠期高血压疾病引起的肝损害

答案： D

261、患儿, 男, 12 岁, 近期饮水多, 尿多, 口干易渴, 食量增加, 体重下降, 血压正常, 但心跳过速。尿糖升高, 血糖测试显著升高。诊断 1 型糖尿病。治疗首选哪种药物

- A、 米格列醇
- B、 胰岛素
- C、 罗格列酮
- D、 阿卡波糖
- E、 氯磺丙脲

答案： B

262、患者, 女, 65 岁, 既往有高血压病史 8 年, 4 小时前突然剧烈头痛, 头晕, 伴有呕吐, 抽搐, 测血压 28/16kPa 相当于 210/120mmHg。治疗首选

- A、 静滴硝普钠
- B、 口服复方降压片
- C、 静脉注射地西泮(安定)
- D、 静脉注射呋塞米
- E、 口服卡托普利

答案： A

263、患者, 男, 56 岁, 肝硬化 3 年, 近日胃镜检查示Ⅲ度食道静脉曲张, 有红斑征, 食道中下段黏膜充血, 散在小糜烂灶。该患者的治疗措施不恰当的是

- A、 普通饮食
- B、 防止剧咳
- C、 保持大便通畅
- D、 口服奥美拉唑
- E、 口服普萘洛尔(心得安)

答案： A

264、患者,男,18岁,肩部外伤,疼痛、活动受限,结合图像,最可能的诊断是



- A、 肩关节孟下脱位
- B、 肩关节喙突下脱位
- C、 肩关节锁骨下脱位
- D、 肩锁关节脱位
- E、 肩关节未见脱位

答案: A

265、患者,女,28岁,已婚。安放宫内节育器2年,停经48天,阴道少量流血3天,突然右下腹剧烈撕裂样疼痛。查体:血压80/40mmHg,右下腹压痛、反跳痛明显。妇科检查:后穹隆饱满,宫软举痛(+),宫口闭,子宫正常大小呈漂浮感,双附件触诊不满意。诊断最可能为

- A、 急性阑尾炎
- B、 输卵管妊娠
- C、 黄体破裂
- D、 卵巢囊肿扭转
- E、 先兆流产

答案: B

266、患者,女,25岁,心悸,气短2年,突然咯血2小时来诊。查体:BP9.9/11.9kPa(),心率96次/min,律不齐,心尖瓣可闻及舒张期隆隆样杂音,肺动脉瓣第二音亢进,双肺底可闻及湿啰音。治疗应首先选择

- A、 毛花苷C缓慢静注
- B、 呋塞米静注
- C、 垂体后叶素静注
- D、 酚磺乙胺静注
- E、 阿托品皮下注射

答案 B

答案:

267、患者,女,21岁,颈部淋巴结肿大,无压痛,请结合CT检查选出最可能的诊断



- A、淋巴瘤
- B、淋巴结核
- C、结节病
- D、转移性淋巴结肿大
- E、间皮囊肿

答案: A

268、中年男性,下肢大隐静脉曲张20年,合并小腿内踝上方慢性溃疡3年,潘氏试验证实深静脉通畅,下列哪项治疗是错误的

- A、硬化剂治疗
- B、先行治疗小腿溃疡,待溃疡愈合后行手术治疗
- C、不等溃疡愈合即行手术治疗
- D、弹力袜保守治疗
- E、抬高患肢,换药,应用抗生素

答案: C

269、患者,男,49岁,工人,进硬食后突然呕血约400ml,有饮酒史20年,平素厌食,其油腻饮食后出现恶心、呕吐、腹胀、无反酸。查体:面色晦暗,脾肋下3cm,腹壁静脉曲张,呕血。最可能的原因是

- A、食管胃底静脉曲张破裂出血
- B、十二指肠溃疡出血
- C、食管炎出血
- D、胃溃疡出血
- E、胃癌

答案: A

270、患者,女,65岁。长期外阴瘙痒,久治不愈。为明确诊断,可行

- A、阴道镜检查

- B、 外阴 PCR 检查
- C、 外阴活检
- D、 碘试验
- E、 药物试验性治疗

答案： C

271、参与嘌呤合成的是

- A、 丝氨酸
- B、 精氨酸
- C、 甘氨酸
- D、 酪氨酸
- E、 谷氨酸

答案： C

272、尿素循环中出现的是

- A、 丝氨酸
- B、 精氨酸
- C、 甘氨酸
- D、 酪氨酸
- E、 谷氨酸

答案： B

273、可在体内合成黑色素的是

- A、 丝氨酸
- B、 精氨酸
- C、 甘氨酸
- D、 酪氨酸
- E、 谷氨酸

答案： D

274、胎头到达中骨盆为适应骨盆纵轴而旋转,使其矢状缝与中骨盆及出口前后径相一致的动作称

- A、 内旋转
- B、 仰伸
- C、 俯屈
- D、 下降
- E、 衔接

答案： A

275、胎头双顶径进入骨盆入口平面,胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平称

- A、 内旋转
 - B、 仰伸
 - C、 俯屈
 - D、 下降
 - E、 衔接
- 答案： E

276、胎头沿骨盆轴前进的动作称

- A、 内旋转
 - B、 仰伸
 - C、 俯屈
 - D、 下降
 - E、 衔接
- 答案： D

277、肺结核表现为

- A、 X线大片状阴影,呈肺叶和肺段分布
 - B、 X线呈大片状阴影,内有空洞伴液平
 - C、 X线右上空洞,周围有斑片状阴影
 - D、 X线右下偏心空洞,内壁凸凹不平
 - E、 X线左下单个薄壁空腔阴影
- 答案： C

278、肺癌表现为

- A、 X线大片状阴影,呈肺叶和肺段分布
 - B、 X线呈大片状阴影,内有空洞伴液平
 - C、 X线右上空洞,周围有斑片状阴影
 - D、 X线右下偏心空洞,内壁凸凹不平
 - E、 X线左下单个薄壁空腔阴影
- 答案： D

279、肺脓肿表现为

- A、 X线大片状阴影,呈肺叶和肺段分布
 - B、 X线呈大片状阴影,内有空洞伴液平
 - C、 X线右上空洞,周围有斑片状阴影
 - D、 X线右下偏心空洞,内壁凸凹不平
 - E、 X线左下单个薄壁空腔阴影
- 答案： B

280、帕里诺综合征

- A、 双眼球向病灶侧凝视
 - B、 双眼球向病灶对侧凝视
 - C、 双眼发作性转向上方
 - D、 双眼向上垂直运动不能
 - E、 同侧眼球向外运动受限
- 答案： D

281、动眼危象

- A、 双眼球向病灶侧凝视
 - B、 双眼球向病灶对侧凝视
 - C、 双眼发作性转向上方
 - D、 双眼向上垂直运动不能
 - E、 同侧眼球向外运动受限
- 答案： C

282、一侧大脑半球大面积梗死可出现

- A、 双眼球向病灶侧凝视
 - B、 双眼球向病灶对侧凝视
 - C、 双眼发作性转向上方
 - D、 双眼向上垂直运动不能
 - E、 同侧眼球向外运动受限
- 答案： A

283、急性胆囊炎

- A、 发热伴结膜充血
 - B、 发热伴昏迷
 - C、 发热伴寒战
 - D、 发热伴肝脾大
 - E、 发热伴皮疹
- 答案： C

284、流行性出血热

- A、 发热伴结膜充血
 - B、 发热伴昏迷
 - C、 发热伴寒战
 - D、 发热伴肝脾大
 - E、 发热伴皮疹
- 答案： A

285、淋巴瘤

- A、 发热伴结膜充血
- B、 发热伴昏迷
- C、 发热伴寒战
- D、 发热伴肝脾大
- E、 发热伴皮疹

答案： D

286、中毒性菌痢

- A、 发热伴结膜充血
- B、 发热伴昏迷
- C、 发热伴寒战
- D、 发热伴肝脾大
- E、 发热伴皮疹

答案： B

287、白喉毒素致病机制是

- A、 破坏细胞膜使细胞裂解
 - B、 抑制易感细胞的蛋白质合成
 - C、 阻断上、下神经元之间抑制性介质的传递, 导致肌肉痉挛
 - D、 抑制神经末梢释放乙酰胆碱, 影响神经冲动的传递, 导致肌肉弛缓型麻痹
 - E、 激活细胞内腺苷环化酶, 使 cAMP 的水平增高, 使黏膜细胞的分泌功能增强
- 答案： B

288、破伤风痉挛毒素致病机制是

- A、 破坏细胞膜使细胞裂解
 - B、 抑制易感细胞的蛋白质合成
 - C、 阻断上、下神经元之间抑制性介质的传递, 导致肌肉痉挛
 - D、 抑制神经末梢释放乙酰胆碱, 影响神经冲动的传递, 导致肌肉弛缓型麻痹
 - E、 激活细胞内腺苷环化酶, 使 cAMP 的水平增高, 使黏膜细胞的分泌功能增强
- 答案： C

289、肉毒毒素机制是

- A、 破坏细胞膜使细胞裂解
 - B、 抑制易感细胞的蛋白质合成
 - C、 阻断上、下神经元之间抑制性介质的传递, 导致肌肉痉挛
 - D、 抑制神经末梢释放乙酰胆碱, 影响神经冲动的传递, 导致肌肉弛缓型麻痹
 - E、 激活细胞内腺苷环化酶, 使 cAMP 的水平增高, 使黏膜细胞的分泌功能增强
- 答案： D

290、急性前壁心肌梗死中最常见的心律失常是

- A、 房性期前收缩
- B、 交界性期前收缩
- C、 室性期前收缩
- D、 房室传导阻滞
- E、 心房颤动

答案： C

291、急性下壁心肌梗死最易发生的心律失常是

- A、 房性期前收缩
- B、 交界性期前收缩
- C、 室性期前收缩
- D、 房室传导阻滞
- E、 心房颤动

答案： D

292、注射庆大霉素造成肾小管坏死,其病因属于

- A、 肾前性
- B、 肾后性
- C、 肾性
- D、 混合性
- E、 功能性

答案： C

293、心脏疾病,心输出量降低,导致组织低灌注、持续发展致肾小管坏死,病因属于

- A、 肾前性
- B、 肾后性
- C、 肾性
- D、 混合性
- E、 功能性

答案： A

294、胎儿娩出后,子宫不协调痉挛性收缩可造成

- A、 胎盘剥离不全
- B、 胎盘粘连
- C、 胎盘残留
- D、 胎盘嵌顿
- E、 胎盘植入

答案： D

295、胎盘未完全剥离时,过早挤揉子宫可造成

- A、 胎盘剥离不全
- B、 胎盘粘连
- C、 胎盘残留
- D、 胎盘嵌顿
- E、 胎盘植入

答案: C

296、对周围性瘫痪最有诊断意义的是

- A、 肌张力增高
- B、 肌肉明显萎缩
- C、 Babinski 征阳性
- D、 腱反射减低
- E、 浅反射消失

答案: B

297、对中枢性瘫痪最有诊断意义的是

- A、 肌张力增高
- B、 肌肉明显萎缩
- C、 Babinski 征阳性
- D、 腱反射减低
- E、 浅反射消失

答案: C

298、缺乏苯丙氨酸羟化酶可致

- A、 白化病
- B、 尿黑酸血症
- C、 苯丙酮尿症
- D、 缺铁性贫血
- E、 巨幼红细胞贫血

答案: C

299、缺乏酪氨酸酶可致

- A、 白化病
- B、 尿黑酸血症
- C、 苯丙酮尿症
- D、 缺铁性贫血
- E、 巨幼红细胞贫血

答案: A

300、缺乏四氢叶酸可致

- A、 白化病
- B、 尿黑酸血症
- C、 苯丙酮尿症
- D、 缺铁性贫血
- E、 巨幼红细胞贫血

答案： E

1、反竞争性抑制作用的描述正确的是

- A、 抑制剂既与酶相结合又与酶-底物复合物相结合
- B、 抑制剂只与酶-底物复合物相结合
- C、 抑制剂使酶促反应的 K_m 值降低, V_{max} 增高
- D、 抑制剂使酶促反应的 K_m 值升高, V_{max} 降低
- E、 抑制剂不改变酶促反应的 K_m 值, 只降低 V_{max}

答案: B

2、心电图对区别心肌梗死和心绞痛最有意义的改变是

- A、 ST 段上升
- B、 T 波呈冠状 “T” 倒置
- C、 合并心律失常
- D、 T 波异常高耸
- E、 病理性 Q 波

答案: E

3、8%的糖牛乳 100ml 可供能量约为

- A、 32kcal
- B、 66kcal
- C、 86kcal
- D、 100kcal
- E、 140kcal

答案: D

4、诊断性腹腔穿刺不应用于

- A、 小儿及老年人
- B、 精神状态不正常者
- C、 昏迷患者
- D、 诊断已明确的患者
- E、 诊断不明确的患者

答案: D

5、轻度高血压患者可首选

- A、 血管紧张素转换酶抑制剂
- B、 β 受体阻断剂

- C、利尿药
- D、钙拮抗剂
- E、中枢性降压药

答案： C

6、某地区流动人口较多,要防止麻疹发病,最有效的措施是

- A、肌内注射丙种球蛋白
- B、易感者按时接种麻疹减毒活疫苗
- C、患者停留过的房间应及时消毒
- D、易感者不到人群密集的场所
- E、对麻疹患者早发现,早隔离,早治疗

答案： B

7、中心静脉压能直接反映

- A、心包内压力
- B、主动脉压力
- C、左心房压力
- D、左心室压力
- E、肺静脉压力

答案： A

8、精神分裂症最多见的幻觉是

- A、视幻觉
- B、听幻觉
- C、触幻觉
- D、嗅幻觉
- E、味幻觉

答案： B

9、胃腺细胞中分泌盐酸的是

- A、主细胞
- B、壁细胞
- C、G细胞
- D、D细胞
- E、黏液细胞

答案： B

10、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)时,肺的病理变化不包括

- A、严重的肺间质水肿和肺泡水肿

- B、肺泡腔内液含蛋白含量增高, II 型上皮细胞坏死
- C、大片肺组织坏死
- D、白细胞浸润
- E、出血、肺不张、微血栓等


答案: C

11、关于慢性支气管炎的治疗, 下列哪项是错误的

- A、急性发作期控制感染, 抗生素治疗一般疗程 7~10 天
- B、迁延期患者应停止用祛痰镇咳药
- C、对年老体弱无力咳嗽者不应选用烈性镇咳药
- D、感染控制后及时停用广谱抗菌药物
- E、解痉平喘常选用的药物是氨茶碱、沙丁胺醇等

答案: B

12、如图所示, 姜片虫感染人体的形式是



- A、虫卵
- B、毛蚴
- C、囊蚴
- D、尾蚴
- E、胞蚴

答案: C

13、神经性呕吐的特点是

- A、常伴有明显器质性病变
- B、不能自控的反复食后呕吐
- C、体重明显减轻
- D、害怕体重增加或影响身材
- E、自发的反复呕吐

答案: E

14、DC 通过分泌何种细胞因子激活 Th1 细胞

- A、 IL-12
- B、 IL-10
- C、 IL-2
- D、 IL-3
- E、 IL-4

答案： A

15、关于生理性黄疸,下列哪项描述是不正确的

- A、 血总胆红素 $\leq 12.0\text{mg/dl}$ (足月儿) 或 $\leq 15\text{mg/dl}$ (早产儿)
- B、 未结合胆红素 $>2\text{mg/dl}$
- C、 结合胆红素 $<1.5\sim 2\text{mg/dl}$
- D、 血清胆红素浓度每日上升不超过 5mg/dl
- E、 尿胆红素阳性

答案： E

16、颈部强直征最常见于

- A、 颈肌扭伤
- B、 颈椎结核
- C、 软组织炎症
- D、 各种脑膜炎
- E、 颈椎肿瘤

答案： D

17、败血症治疗使用抗生素不当的是

- A、 早期,足量
- B、 等待培养结果后用药
- C、 要及时作抗生素敏感试验
- D、 可联合用药
- E、 真菌败血症停用广谱抗生素

答案： B

18、鉴别甲型溶血性链球菌与肺炎链球菌最可靠的方法是

- A、 糖发酵试验
- B、 革兰染色镜检
- C、 菌落特征
- D、 胆汁溶菌试验
- E、 血琼脂平板上溶血特征

答案： D

19、糖酵解的最重要的关键酶是

- A、 葡萄糖激酶
- B、 己糖激酶
- C、 丙酮酸激酶
- D、 6-磷酸果糖激酶-1
- E、 磷酸甘油酸激酶

答案： D

20、持续性肾缺血和肾毒物作用引起的急性肾衰竭,其肾脏损害的突出表现是

- A、 肾脏循环障碍
- B、 肾小球病变
- C、 肾小管坏死
- D、 肾间质纤维化
- E、 肾小管阻塞

答案： C

21、内毒素的主要成分为

- A、 肽聚糖
- B、 蛋白质
- C、 糖蛋白
- D、 LPS
- E、 核酸

答案： D

22、下列结构中不属于结构模体的是

- A、 锌指
- B、 Ω 环
- C、 螺旋-环-螺旋
- D、 碱性亮氨酸拉链
- E、 螺旋-转角-螺旋

答案： B

23、分析杂音主要注意以下几点,但除外

- A、 杂音的最响部位
- B、 杂音出现的时期
- C、 杂音伴有附加心音
- D、 杂音的传导方向
- E、 杂音性质和强度

答案： C

24、原核基因表达调控涉及衰减子的是

- A、 乳糖操纵子的阻遏蛋白
- B、 阿拉伯糖操纵子的阻遏蛋白
- C、 色氨酸操纵子的阻遏蛋白
- D、 大肠杆菌的 Lex 阻遏蛋白
- E、 沙门氏菌鞭毛素基因阻遏蛋白

答案： C

25、引发亚急性硬化性全脑炎 (SSPE) 的病因是

- A、 麻疹病毒引起的持续性感染
- B、 疱疹病毒引起的潜伏感染
- C、 脊髓灰质炎病毒引起的慢性感染
- D、 流行性乙型脑炎病毒引起的急性感染
- E、 狂犬病病毒引起的慢发感染

答案： A

26、按疼痛的持续时间分类, 术后疼痛应属于

- A、 急性疼痛
- B、 亚急性疼痛
- C、 慢性疼痛
- D、 锐痛
- E、 钝痛

答案： A

27、心脏破裂的正确处理是

- A、 一经诊断, 做心包穿刺减压
- B、 快速大量输血补液
- C、 立即实施手术抢救
- D、 作心脏超声进一步确诊
- E、 实施心肺复苏

答案： C

28、在不育症评价中尤其应该注重检查输精管情况的是

- A、 睾丸容积正常、精液量正常
- B、 精液量少、pH 呈酸性、无精子
- C、 精液 pH 呈弱碱性、量正常
- D、 少精子症, 伴有精索静脉曲张
- E、 弱精子症, 精液量正常

答案： B

29、足月新生儿生理性黄疸不正确的是

- A、 黄疸在出生后 2~3 天出现, 4~6 天为重
- B、 以结合胆红素增高为主
- C、 出现黄疸期间小儿一般情况好
- D、 血清总胆红素在 10mg/dl 以下
- E、 生后 10~14 天黄疸消退

答案: B

30、引起代谢性碱中毒常见的病因是

- A、 严重腹泻
- B、 严重呕吐
- C、 使用螺内酯等利尿剂
- D、 正常人摄入 NaHCO_3 1000mmol/d
- E、 高血钾

答案: B

31、关于抗体在移植排斥中的作用, 正确的是

- A、 抗体与抗原结合后直接激活补体参与移植排斥
- B、 抗体通过 TLR 作用参与移植排斥
- C、 增强抗体可导致急性移植排斥反应
- D、 阻断抗体 Fc 段可保护移植物不被排斥
- E、 参与 ADCC 作用的抗体多为 IgM

答案: A

32、以下不符合无菌原则的选项是

- A、 左手已戴好无菌手套可以碰未戴无菌手套的右手
- B、 穿无菌手术衣时, 衣服外面勿对向自己
- C、 若前一次为污染手术, 参加下一台手术时需要重新洗手
- D、 手术人员洗手消毒后, 双手不应放在腰部以下
- E、 没有戴无菌手套的手, 只允许接触手套套口的向外翻折的部分

答案: A

33、中性粒细胞的主要功能是

- A、 产生抗体
- B、 吞噬异物
- C、 参与止血
- D、 释放细胞毒素
- E、 释放组胺

答案: B

34、胃癌血行扩散最常见的部位为

- A、 骨骼
- B、 肺
- C、 卵巢
- D、 皮肤
- E、 肝脏

答案： E

35、自由基损伤细胞的早期表现是

- A、 膜脂质过氧化
- B、 蛋白质交联
- C、 糖键氧化
- D、 促进生物活性物质生成
- E、 减少 ATP 生成

答案： A

36、急性感染病程一般在

- A、 3 天以内
- B、 1 周以内
- C、 10 天以内
- D、 2 周以内
- E、 3 周以内

答案： E

37、在胸部损伤中, 损伤最常见的类型是

- A、 血胸
- B、 气胸
- C、 胸主动脉破裂
- D、 心脏压塞
- E、 肋骨骨折

答案： E

38、实验室检查结果为:红细胞平均体积 (MCV) 78f1, 红细胞平均血红蛋白 (MCH) 26pg, 红细胞平均血红蛋白浓度 (MCHC) 28%。可见于下列哪一种贫血

- A、 巨幼细胞性贫血
- B、 缺铁性贫血
- C、 再生障碍性贫血
- D、 溶血性贫血
- E、 消化道急性失血后引起的失血性贫血

答案： B

39、溃疡的好发部位为

- A、 贲门食管联合部
- B、 多位于与泌酸区比邻的胃窦小弯
- C、 胃体部小弯侧
- D、 胃底部大弯侧
- E、 胃窦部大弯侧

答案： B

40、下列不是手术室常用消毒方法的是

- A、 40%甲醛
- B、 电离辐射
- C、 紫外线消毒法
- D、 乳酸消毒法
- E、 0.1%次氯酸钠溶液消毒

答案： B

41、有抗动脉粥样硬化作用的脂蛋白是

- A、 CM
- B、 LDL
- C、 VLDL
- D、 oxLDL
- E、 HDL

答案： E

42、流行性乙型脑炎的传播途径

- A、 呼吸道
- B、 消化道
- C、 神经
- D、 虫媒传染
- E、 皮肤接触传染

答案： D

43、治疗消化性溃疡,抑酸药中疗效最好的是

- A、 米索前列醇
- B、 法莫替丁
- C、 派吡氮平
- D、 奥美拉唑
- E、 丙谷胺

答案： D

44、以下能够产生自溶酶的细菌是

- A、 艰难梭菌
- B、 变形杆菌
- C、 脑膜炎奈瑟菌
- D、 结核分枝杆菌
- E、 百日咳鲍特菌

答案： C

45、治疗失眠症有效且常用的药物是

- A、 抗精神病药
- B、 促脑代谢药
- C、 抗抑郁药
- D、 镇静催眠药
- E、 情绪稳定剂

答案： D

46、属于面神经的功能包括

- A、 支配胸锁乳突肌
- B、 支配肩胛提肌
- C、 支配舌前 2/3 的味觉
- D、 支配舌前 2/3 的痛温觉
- E、 支配舌后 1/3 的味觉

答案： C

47、下列有关病毒疫苗的描述不正确的是

- A、 减毒活疫苗通常选择对人毒力低的变异株
- B、 减毒活疫苗有回复毒力的可能性
- C、 灭活疫苗通常可诱导机体产生 IgA 抗体
- D、 灭活疫苗可诱导机体产生 IgG 抗体
- E、 减毒活疫苗有活化体内其他潜伏病毒的可能

答案： C

48、CT 检查不适于诊断下列哪种疾病

- A、 肝硬化
- B、 肝癌
- C、 胰腺炎
- D、 早期胃癌
- E、 肝囊肿

答案： D

49、B₁细胞主要存在于

- A、 腹膜腔和派氏集合淋巴结中
- B、 肠道固有层和派氏集合淋巴结中
- C、 腹膜腔和脾脏中
- D、 扁桃体和腹膜腔中
- E、 肠道固有层和腹膜腔中

答案： E

50、接受病毒刺激后可产生大量 I 型干扰素的免疫细胞是

- A、 髓样树突状细胞
- B、 浆细胞样树突状细胞
- C、 滤泡树突状细胞
- D、 B 淋巴细胞
- E、 巨噬细胞

答案： B

51、血液净化(透析)是救治急性肾衰的有效手段, 下列哪项为其指征

- A、 休克
- B、 DIC
- C、 血肌酐 $>300\mu\text{mol/L}$
- D、 血钾 $>6.5\text{mmol/L}$
- E、 低钠血症

答案： D

52、有一侧肾结核患者, 右肾已无功能, 左肾轻度肾积水, 膀胱大小正常, 其最佳处理方法是

- A、 积水侧肾造瘘
- B、 先做患侧肾切除, 再做左侧输尿管膀胱移植
- C、 右侧肾切除, 结肠扩大膀胱
- D、 先引流左侧积水肾, 再切除无功能的右肾
- E、 暂行保守治疗

答案： B

53、癫痫性精神障碍发作间隙思维障碍的特征性表现形式为

- A、 妄想
- B、 思维黏滞
- C、 思维中断
- D、 思维插入
- E、 思维云集

答案： B

54、关于疟疾的发病机制,下列哪项正确

- A、 三日疟原虫侵袭各年龄的红细胞
- B、 恶性疟原虫主要侵袭衰老红细胞
- C、 间日疟与卵形疟原虫仅侵袭幼稚红细胞
- D、 血中带原虫的红细胞数量恶性疟原虫最少
- E、 三日疟原虫的红细胞内期裂体增殖多在内脏微血管内进行,易致内脏损害

答案： C

55、我国引起肝硬化的最主要原因是

- A、 酒精中毒
- B、 中毒性肝炎
- C、 病毒性肝炎
- D、 慢性肠道感染
- E、 血吸虫病

答案： C

56、管理角膜感觉的神经

- A、 视神经
- B、 面神经
- C、 眼神经
- D、 动眼神经
- E、 上颌神经

答案： C

57、下列哪项不是早产的原因

- A、 子宫畸形
- B、 宫颈内口松弛
- C、 胎儿生长受限
- D、 妊娠期高血压疾病
- E、 多胎妊娠

答案： C

58、受损平面以下深感觉障碍,病变可能累及

- A、 脊髓丘脑侧束
- B、 脊髓丘脑前束
- C、 薄、楔束
- D、 皮质脊髓束

E、 后角

答案： C

59、不符合肿瘤性生长的特点是

- A、 与机体的需要不协调
- B、 致瘤因素消除后就不继续生长
- C、 生长旺盛
- D、 不同程度失去分化成熟能力
- E、 相对自主性生长

答案： B

60、中度有机磷杀虫药中毒血胆碱酯酶活力值

- A、 0.8
- B、 70%~50%
- C、 50%~30%
- D、 70%以上
- E、 30%以下

答案： C

61、关于伤寒沙门菌感染的免疫性, 正确的描述是

- A、 伤寒沙门菌的 H 抗体属于 IgM 类抗体
- B、 伤寒沙门菌的 O 抗体属于 IgG 类抗体
- C、 特异性的体液抗体不辅助杀菌作用
- D、 特异性细胞免疫是主要防御机制
- E、 特异性体液免疫是主要防御机制

答案： D

62、人们对于人体实验看法不一。有人认为, 人体实验非常麻烦, 甚至是世界上人道主义的灾难; 也有人认为, 医学发展离不开人体实验, 用少数受试者的代价换取多数人的健康是可以得到辩护的。这体现的是

- A、 人体实验具有多元价值冲突
- B、 人体实验是客观的
- C、 人们的观念往往是错误的
- D、 人体实验规范难度很大
- E、 人体实验众说纷纭

答案： A

63、损伤控制性外科的治疗程序是

- A、 简短剖腹探查手术、ICU 复苏、确定性手术

- B、 ICU 复苏、确定性手术
- C、 完整剖腹探查手术、ICU 复苏
- D、 ICU 复苏、全面剖腹探查手术、确定性手术
- E、 确定性手术、ICU 复苏

答案： A

64、当呼吸幅度减小而呼吸频率加快时,受影响最大的是

- A、 肺通气量
- B、 无效腔气量
- C、 肺泡通气量
- D、 功能余气量
- E、 肺扩散容量

答案： C

65、下列临床表现在肾损伤中最少见的是

- A、 休克
- B、 伤侧腰腹部疼痛
- C、 伤侧腰腹部肿块
- D、 尿频、尿急
- E、 肉眼血尿

答案： D

66、重组 DNA 技术中实现目的基因与载体 DNA 拼接的是

- A、 DNA 聚合酶
- B、 RNA 聚合酶
- C、 DNA 连接酶
- D、 RNA 连接酶
- E、 限制性核酸内切酶

答案： C

67、可合成甲状腺素、儿茶酚胺及黑色素的氨基酸是

- A、 甲硫氨酸
- B、 色氨酸
- C、 组氨酸
- D、 谷氨酸
- E、 酪氨酸

答案： E

68、关于周围动脉瘤的发病原因, 以下哪项是错误的

- A、 某些先天性疾病,如马方综合征等可以引起周围动脉瘤
- B、 老年人,尤其是发达国家的老年人,动脉粥样硬化是一个主要病
- C、 青年人多由于损伤导致周围动脉瘤,但仅锐性损伤可导致动脉瘤
- D、 青年人亦可由于感染、动脉炎性疾病等导致周围动脉瘤
- E、 有时介入技术会导致医源性周围动脉瘤

答案: C

69、肝性脑病患者不受刺激部位生理特性影响的诱发电位是

- A、 视觉诱发电位
- B、 听觉诱发电位
- C、 嗅觉诱发电位
- D、 事件相关电位
- E、 感觉诱发电位

答案: E

70、引起慢性肺源性心脏病最常见的原因是

- A、 支气管哮喘
- B、 支气管扩张症
- C、 慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿
- D、 肺尘埃沉着病
- E、 慢性纤维空洞型肺结核

答案: C

71、引起心内膜炎常见的细菌是

- A、 粪链球菌
- B、 甲型溶血性链球菌
- C、 肺炎链球菌
- D、 B群链球菌
- E、 A群链球菌

答案: B

72、手臂消毒法能清除

- A、 皮肤毛囊内的细菌
- B、 皮肤皮脂腺内的细菌
- C、 皮肤汗腺内的细菌
- D、 皮肤表面的细菌
- E、 皮肤表面及深层的细菌

答案: D

73、动眼神经麻痹表现不包括

- A、 眼睑下垂
- B、 眼球向下内方斜视
- C、 瞳孔散大
- D、 眼球向下外方斜视
- E、 复视

答案： B

74、诊断尿路感染的最重要依据是

- A、 有尿频、尿急、尿痛症状
- B、 腰痛和肾区叩击痛
- C、 有真性细菌尿
- D、 有白细胞尿
- E、 有蛋白尿

答案： C

75、下列疾病引起发热均为感染性, 但应除外

- A、 细菌侵入机体后
- B、 病毒侵入机体后
- C、 支原体侵入机体后
- D、 感染后低热
- E、 寄生虫侵入机体后

答案： D

76、染色体异常是肿瘤细胞的一大特征。如果一种异常的染色体较多地出现在某种肿瘤细胞内, 就称为

- A、 特异染色体
- B、 特征染色体
- C、 标记染色体
- D、 干系染色体
- E、 众数染色体

答案： C

77、有关血浆脂蛋白的叙述正确的是

- A、 CM 在脂肪组织中合成
- B、 HDL 是从 LDL 中转变来
- C、 VLDL 可转变成 LDL
- D、 LDL 和 HDL 竞争肝外受体
- E、 HDL 运输胆固醇到肝外利用

答案： C

78、子宫前倾是指

- A、 宫体朝向耻骨
- B、 宫体朝向尾骨
- C、 宫体朝向骶骨
- D、 宫体朝向髂骨
- E、 宫体朝向坐骨

答案： A

79、1岁以内的先天性马蹄内翻足患儿应采取的治疗为

- A、 全身麻醉下矫正足跟内翻下垂
- B、 石膏矫正
- C、 Denis-Browne 轻便夹板
- D、 反复多次行手法矫正,使患足外翻、外展及背伸
- E、 软组织松解手术治疗

答案： D

80、ARDS 时氧合指数

- A、 $\leq 100\text{mmHg}$
- B、 $\leq 150\text{mmHg}$
- C、 $\leq 200\text{mmHg}$
- D、 $\leq 300\text{mmHg}$
- E、 $\leq 400\text{mmHg}$

答案： D

81、下列哪项不是败血症易发的诱因

- A、 中性粒细胞减少或缺乏
- B、 长期应用广谱抗菌药物
- C、 短期小剂量应用肾上腺皮质激素
- D、 人工呼吸机的应用
- E、 严重的原发基础病

答案： C

82、出现卵巢囊肿蒂扭转时,正确的处理是

- A、 急症手术,回复扭转的肿瘤
- B、 急症手术,先钳夹肿瘤蒂部后切除肿瘤和蒂
- C、 行患侧肿瘤剥除术
- D、 改变体位帮助扭转缓解
- E、 行全子宫和患侧附件切除

答案： B

83、关于关节突关节的描述中,下列哪项正确

- A、 参与构成椎间孔的前壁
 - B、 前方有黄韧带
 - C、 后方与椎动脉相邻
 - D、 由脊神经前分支支配
 - E、 由上位椎骨的上关节突和下位椎骨的下关节突构成,颈部松弛易脱位
- 答案: B

84、小脑幕裂孔疝时,出现意识障碍损害部位是

- A、 大脑皮层
 - B、 丘脑
 - C、 中脑
 - D、 脑桥
 - E、 延髓
- 答案: C

85、肺炎球菌肺炎引起缺氧的主要原因是

- A、 气道阻力增加
 - B、 PaCO_2 升高
 - C、 弥漫性换气功能障碍
 - D、 限制性通气功能障碍
 - E、 病变处 V/Q 比例失调
- 答案: E

86、坏血病是由下列哪一种维生素缺乏所引起的

- A、 核黄素
 - B、 维生素 B₁
 - C、 维生素 C
 - D、 维生素 PP
 - E、 硫辛酸
- 答案: C

87、情绪认知理论认为决定情绪性质的关键因素是

- A、 认知过程
 - B、 生理状况
 - C、 环境刺激
 - D、 行为模式
 - E、 应激源
- 答案: A

88、登革热发热期降温最好使用

- A、 温水擦浴
- B、 醇浴
- C、 冰敷
- D、 口服解热镇痛药
- E、 肌内注射解热镇痛药

答案： C

89、低动力型感染性休克的主要特点有

- A、 心输出量减少、外周阻力增高,中心静脉压降低
- B、 心输出量减少、外周阻力降低,中心静脉压降低
- C、 心输出量不变、外周阻力增高,中心静脉压增高
- D、 心输出量增加、外周阻力降低,中心静脉压增高
- E、 心输出量减少、外周阻力不变,中心静脉压降低

答案： A

90、脂肪大量动员时肝内生成的乙酰 CoA 主要转变为

- A、 葡萄糖
- B、 胆固醇
- C、 脂肪酸
- D、 酮体
- E、 丙二酰 CoA

答案： D

91、下列说法正确的是

- A、 屏状核与岛叶皮质之间的白质称最外囊
- B、 屏状核与岛叶皮质之间的白质称外囊
- C、 大脑内的弓状纤维主要联系同侧半球各叶
- D、 皮质核束经内囊后肢下行
- E、 下纵束和扣带属于连合纤维

答案： A

92、以下哪一类不属于抗抑郁药

- A、 苯二氮草类药物
- B、 三环类抗抑郁药
- C、 四环类抗抑郁药
- D、 单胺氧化酶抑制剂
- E、 选择性 5-HT 再摄取抑制剂

答案： A

93、疫苗接种的目的不包括

- A、 减少死亡和发病
- B、 减少隐性感染
- C、 预防再感染
- D、 保护健康
- E、 建立人工免疫屏障

答案： B

94、有关原发性高血压的叙述,下列错误的是

- A、 高血压病常引起左心室肥大
- B、 高血压常引起下肢坏疽
- C、 高血压可继发糖尿病
- D、 高血压晚期的肾脏常为颗粒性固缩肾
- E、 脑出血是高血压病的主要致死原因

答案： C

95、参与 T 细胞与 APC 细胞间非特异性相互作用的 T 细胞表面分子有

- A、 LFA-1
- B、 CD80
- C、 CD86
- D、 CD40
- E、 LFA-3

答案： A

96、生殖器结核最先侵犯的部位是

- A、 卵巢
- B、 子宫内膜
- C、 阴道
- D、 输卵管
- E、 外阴

答案： D

97、下列哪项提示滑车神经受损

- A、 眼上睑下垂
- B、 眼球向内活动受限
- C、 眼球向下及外展运动减弱
- D、 眼球向上活动受限
- E、 视野变小

答案： C

98、上皮性卵巢癌, 最易转移的部位是

- A、 脑
- B、 肝
- C、 腹腔
- D、 肾
- E、 肺


答案： C

99、室性心动过速心电图特点下面哪项是不准确的

- A、 3 个或 3 个以上室性期前收缩连续出现
- B、 QRS 波群形态畸形, 时限超过 0.12 秒, T 波和 QRS 波群主波方向相反
- C、 心室率通常在 150~250 次/分, 心律规则或略不规则
- D、 P 波与 QRS 波之间多有固定关系, 房室多无分离
- E、 有时可见室性融合波或心室夺获现象

答案： D

100、骨盆骨折后膀胱破裂最好的检查是



- A、 液体排出量低于液体入量
- B、 膀胱镜检
- C、 静脉肾盂造影
- D、 血尿
- E、 膀胱造影

答案： E

101、与甲状腺髓样癌有关的激素是

- A、 甲状腺素
- B、 促甲状腺素
- C、 胰高血糖素
- D、 促甲状腺激素释放激素
- E、 降钙素

答案： E

102、慢性肺源性心脏病最多见的病因是

- A、 慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿
- B、 多发肺小动脉栓塞
- C、 严重胸廓及脊柱畸形
- D、 重症肺结核
- E、 支气管哮喘

答案： A

103、颈椎病的鉴别诊断中,肩周炎不可能出现

- A、 三角肌萎缩
- B、 斜方肌痉挛
- C、 肩痛及上臂痛
- D、 前臂和手疼痛
- E、 大范围活动时,疼痛加剧

答案： D

104、以下哪种溃疡造成的幽门梗阻是必须手术解除的

- A、 痉挛性
- B、 炎症性
- C、 水肿性
- D、 瘢痕性
- E、 感染性

答案： D

105、补体固有成分中含量最少的

- A、 C3
- B、 C8
- C、 C1q
- D、 C5
- E、 D 因子

答案： E

106、小王长期少量饮酒,体检发现脂肪肝,以下哪项不是小王患脂肪肝的促进因素

- A、 合并 2 型糖尿病
- B、 合并心脑血管疾病
- C、 合并癫痫
- D、 合并体形肥胖
- E、 合并病毒性肝炎

答案： C

107、患者,男,50岁,乏力头昏半年,Hb62g/L,PLT 63×10^9 /L,血IgG 45g/L,尿本周蛋白 2g/24h,X线片示颅骨及骨盆有溶骨改变,该患最易出现自发性骨折的部位是

- A、 锁骨
- B、 胸椎
- C、 腰椎
- D、 肱骨
- E、 肋骨

答案： E

108、患儿,男,12岁。发热、咽痛2周后出现晨起眼睑和颜面水肿,随后出现全身水肿,尿呈泡沫状,无呼吸困难,无皮肤黏膜和巩膜黄染和尿黄。该患儿首先要做的检查是

- A、 血清肌酐
- B、 尿常规
- C、 肝功能
- D、 甲状腺功能
- E、 心脏彩超

答案： B

109、患者,男,60岁,糖尿病史20年,近半年来感双足趾端麻木。查体:消瘦,双手骨间肌萎缩,肌力IV级,病理反射阴性。下列哪项诊断可能性大

- A、 运动系统改变与糖尿病无关
- B、 糖尿病微血管病变
- C、 糖尿病自主神经病变
- D、 糖尿病并发脑血管意外
- E、 糖尿病周围神经病变

答案： E

110、患者,女性,18岁,近半年来回避人际交往,一见到人就满头大汗,面红耳赤,低头不语,迅速转身走开。医生询问原因,患者答:说不清为什么,就是害羞、紧张。对该患者治疗的一线药物选择是

- A、 SSRI
- B、 三环类抗抑郁药
- C、 MAOI
- D、 第二代抗精神病药物
- E、 第一代抗精神病药物

答案： A

111、患者,男,18岁,咽痛、高热5天,在当地治疗。2天来尿量减少,腰疼来急诊,尿蛋白(+),RBC20~30个/HP。为明确诊断,需询问用药史,下列哪项最有意义

- A、红霉素
- B、庆大霉素
- C、氨苄西林
- D、环丙沙星
- E、氯霉素

答案： B

112、产妇,26岁,G₁P₀,孕41周。因第二产程延长行产钳助产,胎儿娩出后5分钟后突发阴道出血400ml。查体:血压13.3/8.0kPa(100/60mmHg),脉率100次/min,宫底平脐。此时最先采用的处理是

- A、静脉点滴催产素
- B、检查软产道有无裂伤
- C、行人工剥离胎盘
- D、按摩子宫
- E、纱布条填塞宫腔

答案： C

113、患者,男,21岁,踢足球后不慎淋雨,于当晚突发寒战,高热,左胸疼痛,呼吸加深时症状加重,咳少量铁锈色痰,左肺触觉语颤增强,叩诊呈浊音,可闻及支气管呼吸音。实验室检查:白细胞计数 $27 \times 10^9/L$,中性粒细胞92%,有核左移。临床诊断为大叶性肺炎,抗感染治疗后体温下降。其体温下降期体温调节的特点是

- A、体温调定点无变化,产热与散热处于平衡状态
- B、体温调定点从低位上移,产热大于散热
- C、体温调定点从高位下移,产热大于散热
- D、体温调定点从高位下移,散热大于产热
- E、体温调定点从低位上移,散热大于产热

答案： D

114、患儿,男,3天22小时,因少吃2天,下肢皮肤发硬1天入院。胎龄34⁺³周,自然产,否认窒息抢救史。查体:肛温32℃,哭声低弱,皮温低,双下肢及臀部皮肤较青紫,按之橡皮感,稍凹陷。本例诊断考虑

- A、新生儿硬肿症(轻度)
- B、新生儿硬肿症(中度)
- C、新生儿硬肿症(重度)

- D、 早产儿水肿
- E、 新生儿皮下坏疽

答案： B

115、患者,男,24岁。1年前经常出现寒战、发热、头疼,退热时大汗淋漓,退热后体温恢复正常,自觉明显好转,每2天发作1次,而近半年左右发作停止。体检发现脾脏肿大,血涂片检查有间日疟原虫。应给予下列何种治疗

- A、 磺胺类
- B、 米帕林+伯氨喹
- C、 乙胺嘧啶+伯氨喹
- D、 氯喹+米帕林
- E、 氯喹+伯氨喹

答案： C

116、患者,男,64岁。右季肋部皮肤疼痛8年,疼痛为烧灼样,每日发作3~5次,8年前右季肋部原皮肤处出现带状疱疹,经治疗后皮疹消失,但遗留疼痛。此患者疼痛为

- A、 癌性疼痛
- B、 神经痛
- C、 周围血管疾病性疼痛
- D、 头痛
- E、 心理性疼痛

答案： B

117、患者,女,23岁。双肘、腕、膝等关节疼痛2个月,伴脱发、口腔溃疡、光敏感。最可能的疾病是

- A、 类风湿关节炎
- B、 系统性红斑狼疮
- C、 骨关节炎
- D、 化脓性关节炎
- E、 关节结核

答案： B

118、患者,男,35岁,吸烟10年,咳嗽3个月伴低热盗汗。X线胸片示左上肺2cm×2cm结节阴影,周围可见卫星病灶。最好的治疗方法是

- A、 追踪观察
- B、 手术治疗
- C、 抗感染治疗
- D、 抗结核化疗

E、抗肿瘤化疗

答案： D

119、患者,女,30岁。妊娠3个月,面色发黄、食欲缺乏1个月。查体:轻度贫血貌,巩膜轻度黄染。心肺及肝脾无异常。实验室检查:ALT 270U/L, AST 380U/L。患者不可能出现的实验室检查结果是

- A、 结合胆红素中度增高
- B、 非结合胆红素轻度增高
- C、 总胆红素明显增高
- D、 尿胆原多为中度增高
- E、 尿胆红素阳性

答案： B

120、某医疗机构的医师与药厂达成协议,其在处方时使用该药厂生产的药品,由药厂按照药品使用量给予其药品提成。事情曝光以后对于医师的违法行为,有权决定给予其相应处罚的部门是

- A、 药品监督管理部门
- B、 工商行政管理部门
- C、 医师协会
- D、 消费者权益保护协会
- E、 卫生行政部门

答案： E

121、患者,男,32岁。右腰部痛,尿频,尿急,尿痛及向阴茎头放散痛。有排石史。查体:右肾叩击痛阳性。尿镜检:白细胞 3~5/HP,红细胞 10~20/HP。该患者可诊为泌尿系结石,其结石部位应在

- A、 输尿管下段
- B、 膀胱内
- C、 输尿管间壁段
- D、 后尿道
- E、 前尿道

答案： C

122、患者,男,40岁,一周前出现高热,维持在 39.5~40℃,全身乏力,大便次数增多,每天 5~6 次。肥达反应:TO 1:160, TH 1:320, PA 1:40, PB 1:40。引起这种疾病的病原体可能是

- A、 霍乱弧菌
- B、 伤寒沙门菌
- C、 克雷伯菌

D、 福氏志贺菌

E、 变形杆菌

答案： B

123、 患儿, 女, 5 岁, 因高热、 意识模糊而入院。 查体发现该患儿面色苍白, 昏迷, 时有惊厥, 呼吸微弱。 粪便: 白细胞 4 个/HP。 血常规: 白细胞数 $16 \times 10^9/L$ 。 脑脊液正常。 粪便取材培养, 革兰染色为阴性杆菌, 动力试验阴性。 诊断患儿感染

A、 鼠伤寒沙门菌

B、 肠产毒型大肠埃细菌

C、 肠致病型大肠埃细菌

D、 轮状病毒

E、 痢疾志贺菌

答案： E

124、 患者, 女, 33 岁。 其性格富有表演性, 有时诉自己是“观世音转世”, 称自己是在以“转世灵童”的身份说话。 其最有可能的临床表现为

A、 幻觉

B、 夸大妄想

C、 诈病

D、 附体体验

E、 双重人格

答案： D

125、 患者, 男, 42 岁, 有高血压史。 4 小时前因劳累而感头痛, 烦躁, 心悸, 多汗, 恶心, 面色苍白, 视力模糊, 收缩压 33.8kPa (260mmHg), 舒张压 18.6kPa (140mmHg)。 以下治疗最适宜的是

A、 氢氯噻嗪口服

B、 普萘洛尔口服

C、 静脉输液

D、 硝普钠静滴

E、 安定肌注

答案： D

126、 患者, 女, 28 岁, 心悸气促下肢水肿 3 年。 查体: 心界向两侧扩大, 心率 120 次/min, 心尖区有舒张期隆隆样杂音, 胸骨左缘第 3 肋间舒张期叹气样杂音, P_2 亢进, A_2 减弱。 诊断为

A、 二尖瓣狭窄并关闭不全

B、 二尖瓣狭窄

C、 主动脉瓣关闭不全并狭窄

- D、 主动脉瓣关闭不全
- E、 主动脉瓣关闭不全并二尖瓣狭窄

答案： E

127、患者,男,58岁。冠心病史5年,因近1个月心悸,气短,不能平卧来门诊。双肺底有湿啰音,心界不大,心率96次/min,无杂音。ECG示慢性冠状动脉供血不足,核素心功能检查示左室射血分数正常,峰充盈率明显降低,峰充盈时间明显延长。下列处理不宜用的是

- A、 β 阻滞剂
- B、 钙通道阻滞剂
- C、 洋地黄类制剂
- D、 硝酸酯类
- E、 控制钠盐摄入

答案： C

128、患者,女,25岁。会阴侧切顺产后三天,检查发现伤口红肿明显,无渗液,局部硬结,无波动感。目前处理不包括

- A、 伤口局部外敷活血化瘀中药
- B、 伤口局部理疗
- C、 会阴伤口清创缝合
- D、 会阴擦洗
- E、 酌情使用抗生素

答案： C

129、患者,女,28岁,全身水肿、关节痛、尿少3周。检查:血压135/90mmHg,血WBC $3.5 \times 10^9/L$,Hb132g/L,尿蛋白

4.7g/24h,ALB22g/L,BUN6.1mmol/L,Cr110 $\mu\text{mol/L}$ 。以下对于该疾病的诊断正确的是

- A、 急性肾小球肾炎
- B、 慢性肾小球肾炎
- C、 肾病综合征
- D、 IgA 肾病
- E、 膜性肾病

答案： C

130、患者,男,63岁,因肿瘤压迫中脑被盖后出现右上、下肢意向性震颤,右上、下肢及躯干意识性本体觉和精细触觉障碍,请问该患者可能损伤了哪些结构

- A、 右小脑丘脑纤维、右红核、右内侧丘系
- B、 左小脑丘脑纤维、左红核、左脊髓丘脑束

- C、 右小脑丘脑纤维、右红核、右脊髓丘脑束
- D、 左小脑丘脑纤维、左红核、左内侧丘系
- E、 左三叉神经脊束、左红核、左内侧丘系

答案： D

131、患者,女,27岁,说耳边有声音命令她不能吃饭。该患者最可能的诊断是

- A、 抑郁症
- B、 精神分裂症
- C、 焦虑症
- D、 脑器质性精神障碍
- E、 反应性精神障碍

答案： B

132、孕妇,28岁,足月妊娠,LSA来诊。腹部检查错误的是

- A、 胎心音在左下腹最清楚
- B、 子宫呈纵椭圆形
- C、 胎体与母体纵轴一致
- D、 宫底部触及胎头
- E、 耻骨联合上触到胎臀

答案： A

133、患者,女,27岁,孕10周。阴道排液增多4日。宫颈管分泌物涂片检查找到上皮细胞内包涵体,诊断为生殖道沙眼衣原体感染。首选处理为

- A、 人工流产
- B、 红霉素治疗
- C、 氧氟沙星治疗
- D、 阿昔洛韦治疗
- E、 青霉素治疗

答案： B

134、2岁小儿,PPD试验72小时结果:硬结直径18mm,提示哪种情况最可能

- A、 四周内接种了卡介苗
- B、 一周内接触了开放性肺结核患者
- C、 正在患结核病
- D、 过去患过结核病
- E、 出生时接种了卡介苗

答案： C

135、家长带5个月的婴儿进行营养咨询,要开始添加辅助食品,你认为在该月龄应该添加哪一项最为合适

- A、 菜汤、鱼肝油
- B、 配方米粉
- C、 粥、饼干
- D、 软饭、肉糜
- E、 蛋炒饭、苹果

答案： B

136、患者,男,17岁,全身水肿乏力3周,尿少3

天,BP16/10kPa(120/75mmHg),Hb160g/L,ESR60mm/h,尿蛋白(++++) ,RBC0~2个/HP,白蛋白2.0g/dl,血肌酐550 μ mol/L,尿蛋白定量5.6g/d,选择哪种药物治疗最合适

- A、 利尿剂
- B、 泼尼松
- C、 输血浆
- D、 肝素抗凝疗法
- E、 环磷酰胺

答案： B

137、患者,男,40岁。1年多来,劳动时,常发生心悸、疲乏、出冷汗,进食后上述症状即见缓解。近来发作频繁,并出现神情恍惚,压抑,偶有幻听幻视。查体:神志清,较肥胖,腹软,肝脾未及,亦未摸到肿块,神经系统无阳性体征。初步诊断胰岛素瘤,下列说法错误的是

- A、 多发的胰岛素瘤提示MEN-2可能
- B、 直径通常在1~2cm
- C、 生长抑素受体成像阳性率不高
- D、 术后可能出现反跳性高血糖
- E、 可能出现whipple三联征

答案： A

138、患者,男,28岁。2周前森林探险,发热、寒战、头痛7天。查体:注射部位可见淤斑。血常规示白细胞减少、血小板降低。血涂片中性粒细胞内发现桑葚状包涵体。针对病原体治疗,首选药物是

- A、 利巴韦林
- B、 更昔洛韦
- C、 氯霉素
- D、 青霉素
- E、 多西环素

答案： E

139、初孕妇,停经 37 周,抽搐 2 次,控制抽搐后 4 小时,血压 21.3/14.6kPa(160/110mmHg),胎心率 164 次/min,NST 为有反应型,无宫缩。处理最宜选择

- A、产钳助娩
- B、剖宫产
- C、胎头吸引术
- D、催产素引产
- E、人工破膜

答案: B

140、患者,男,45 岁,汽车撞伤后 30 分钟来诊。神志清,脉搏 120 次/min,呼吸 36 次/min,血压 130/80mmHg,自诉气短,右后背疼痛。胸片提示第 6 前肋骨折,未见明显移位。最佳治疗措施是

- A、胸壁内固定术
- B、胸壁固定,止痛治疗
- C、胸膜腔穿刺术
- D、胸膜腔闭式引流术
- E、开胸探查术

答案: B

141、患者,女,55 岁。乏力、食欲缺乏半个月,发热、咳嗽、痰中带血 6 天,以“右上肺继发性肺结核,痰结核菌涂片检查(+)”收住院治疗。致病菌的生物学特点是

- A、专性厌氧菌
- B、繁殖速度缓慢
- C、革兰染色阳性
- D、合成大量尿素酶
- E、能够产生硫化氢

答案: B

142、患者,女,28 岁,低热,腹胀半年。查体:消瘦,颈静脉无怒张,心肺无异常,腹部膨隆,肝大,剑下 2.5cm,脾未触及,腹水征阳性,脐至两侧髂前上棘距离相等,下肢无水肿,血沉 68mm/h,血清蛋白电泳 A60%, γ 24%,谷丙转氨酶 25U/L,最可能的诊断是

- A、肝硬化失代偿期
- B、结核性腹膜炎
- C、巨大卵巢囊肿
- D、心包炎
- E、心功能不全

答案： B

143、患者,男,35岁,2周前因左上腹剧烈疼痛伴恶心呕吐就诊于外院。查体上腹压痛、反跳痛、肌紧张,查血、尿淀粉酶增高,予抗感染、补液等治疗2周,效果不佳。既往有胆囊炎病史。就诊于我院门诊,右上腹轻压痛,无反跳痛、肌紧张,血尿淀粉酶正常。为预防胰腺炎复发,下列措施错误的是

- A、 积极治疗胆囊炎
- B、 避免暴饮暴食
- C、 戒酒
- D、 避免使用噻嗪类利尿剂
- E、 使用抑制胰酶活性的药物

答案： E

144、患者,男,60岁,因发热、骨骼疼痛而来门诊求医。检查皮肤有散在出血点,脾肋下2cm,血红蛋白60g/L,白细胞 $30 \times 10^9/L$,原始粒细胞0.30,早幼粒细胞0.03。患者迫切要求住院。以下处理不合适的是

- A、 收住院
- B、 施行骨穿刺检查
- C、 输血
- D、 确诊后进行联合化疗
- E、 因患者年老,预后不佳,动员患者回家

答案： E

145、某男,28岁,近1年来不敢自己锁门,因为总担心,怀疑门没有锁好,需反复检查,反复锁,明知这样做是多余的,没必要,但控制不住,内心痛苦,主动求治。该病例最可能的诊断是

- A、 精神分裂症
- B、 恐惧症
- C、 焦虑症
- D、 强迫症
- E、 抑郁症

答案： D

146、患者,女,52岁,反复呕血2年,1天前突然又呕血,胃镜确诊为食管曲张静脉出血。体格检查:贫血貌,血压11/8kPa,蛙状腹,脾肋下3cm。肝功能SGPT:120U(赖氏法),A/G比值为0.82:1,总胆红素(TB)35 $\mu\text{mol/L}$ 。最宜采用

- A、 静脉注射止血药
- B、 口服去甲肾上腺素
- C、 脾切除,贲门周围血管离断术

D、 限制性门腔分流术

E、 三腔管压迫止血

答案： E

147、患者,男,27岁,车祸致下肢挤压伤后4小时收治,诉明显口渴,查体神志清楚,表情淡漠,面色苍白,皮肤湿冷,脉搏细速,116次/min,血压90/60mmHg,尿量减少,血pH为7.4。该患者的情况是

A、 轻度低血容量性休克

B、 中度低血容量性休克

C、 重度低血容量性休克

D、 中度感染性休克

E、 重度感染性休克

答案： B

148、男婴,10个月。体重6.8kg,身长70cm,腹壁皮下脂肪厚度0.3cm,该患儿开始饮食调整,应首选

A、 热卡0.5mJ/(kg·d),蛋白质3g/(kg·d)

B、 热卡0.25mJ/(kg·d),蛋白质2g/(kg·d)

C、 热卡0.2mJ/(kg·d),蛋白质1.5g/(kg·d)

D、 热卡0.17mJ/(kg·d),蛋白质1.0g/(kg·d)

E、 热卡0.1mJ/(kg·d),蛋白质1.0g/(kg·d)

答案： B

149、患者,女,25岁。患地中海贫血2年,多次输血治疗,最近输血过程中出现发热,体温达40℃,经对症处理症状缓解。此次拟输血改善贫血症状,应输注

A、 浓缩血小板

B、 冷冻红细胞

C、 悬浮红细胞

D、 浓缩红细胞

E、 去除白细胞的红细胞

答案： E

150、患者,男,18岁。放学回家口渴误服装在饮料瓶中的敌敌畏,入院时患者已处于昏迷状态,全身湿冷,呼吸微弱,抽搐,嘴角有分泌物,小便失禁。查体:颜面青紫,针尖样瞳孔,肺部听诊湿啰音,全血胆碱酯酶活性降低。根据患者症状和体征,治疗可选用

A、 毒扁豆碱

B、 毛果芸香碱

C、 去甲肾上腺素

- D、阿托品
- E、糖皮质激素

答案： D

151、患者,男,35岁。因心悸、气短3年,发热1个月住院。既往有关节炎史。经体检和有关辅助检查,诊断风心病合并亚急性感染性心内膜炎(SBE)。关于SBE发病机制,不正确的是

- A、菌血症
- B、压力阶差和喷射效应
- C、血小板纤维蛋白微血栓形成
- D、机体产生特异性凝集抗体
- E、病前心脏正常者不得SIE

答案： E

152、患者,女,25岁,右下腹痛2小时入院,考虑卵巢囊肿破裂,需要腹腔穿刺以鉴别诊断,下列哪个部位穿刺可能穿出积液

- A、膀胱子宫陷凹
- B、右侧膀胱上窝
- C、右侧腹股沟内侧窝
- D、盲肠后窝
- E、直肠子宫陷凹

答案： E

153、患者,男,45岁。肝区疼痛,腹胀2个月余。无畏寒发热,颈静脉不充盈,心界正常,心音规律无杂音,肺部听诊无异常,腹软,肝肋下4.5cm,质较硬,脾未触及,有移动性浊音,下肢无水肿。腹水检查为血性。最可能的诊断是

- A、缩窄性心包炎
- B、原发性肝癌
- C、肝硬化失代偿期
- D、腹膜间皮瘤
- E、结核性腹膜炎

答案： B

154、患者,女,35岁,哺乳期。左侧乳房胀痛、发热2天。查体:T39.8℃,P103次/min。右乳外上象限7cm×5cm范围红肿,有明显压痛和波动感。急行切开引流术,术后抗感染治疗针对的主要致病菌是

- A、金黄色葡萄球菌
- B、白色葡萄球菌
- C、表皮葡萄球菌

D、腐生葡萄球菌

E、溶血性链球菌

答案： A

155、患者女, 22 岁, 职员。近 2 个月因入睡困难, 醒后难以再次入睡, 白天困倦。患者担心睡眠不好对身体影响大, 紧张焦虑。辅助检查未发现明显异常。该患者的正确做法是

A、患者夜间睡眠差, 为保证足量的睡眠时间, 白天时可延长睡眠时间

B、白天困倦会影响工作, 适量饮用浓茶或咖啡, 减少白天睡眠有助于晚上睡眠质量

C、若夜间睡眠入睡困难, 可坚持适量饮用红酒, 有助于夜间睡眠质量

D、尽早使用苯二氮卓类药物, 若效果较好则需坚持服用, 停药会引起症状反跳

E、认知行为治疗是该患者治疗的主要方法, 必要时才使用苯二氮卓类药物

答案： E

156、患者, 男, 25 岁。因剧烈头痛 1 天来门诊就诊。检查: 神志清醒, 颈强硬, 无瘫痪, 病理征阴性。头部 CT 外侧裂可见高密度影。为确诊, 下列哪项检查最有意义

A、脑电图

B、MRI 头颅扫描

C、脑血流图

D、脑血管造影

E、腰穿查脑脊液

答案： E

157、患者, 女, 54 岁, 主诉心前区疼痛, 呼吸困难两周。查体: BP 100/80mmHg, P100 次/分, 心音低钝、遥远。吸气时收缩压减低 15mmHg。最可能的诊断

A、急性心肌梗死

B、肺气肿伴右心衰

C、大量心包积液

D、肺栓塞

E、心肌炎

答案： C

158、患者, 男, 55 岁, 反复黑便 2 个月。入院前 3 小时突然呕出咖啡样胃内容物, 继之为新鲜血约 300ml。半年来因肩痛服用泼尼松。出血原因可除外

A、胃癌

B、出血性胃炎

- C、 胃溃疡
- D、 门静脉高压症
- E、 十二指肠球部溃疡

答案： D

159、患者,女,停经3个月以上,基础体温单相,妇科检查子宫偏小,阴道脱落细胞涂片、宫颈黏液检查显示体内雌激素作用水平偏低,子宫内膜呈增生反应。血促卵泡生长激素(FSH)、促黄体生长激素(LH)水平偏低或LH/FSH比值 <3 ,血泌乳素(PRL)正常水平。可能是什么结构病变引起的

- A、 下丘脑-垂体-肾上腺轴系
- B、 下丘脑-垂体甲状腺轴系
- C、 下丘脑-垂体-性腺轴系
- D、 下丘脑脊髓束
- E、 背侧纵束

答案： C

160、患者,男,76岁。11年前患急性下壁心肌梗死。近日受凉后发热,咳嗽,咳白黏痰,心悸、憋气,晚上觉得憋气加重,从睡梦中惊醒。查体:心率118次/min,律齐,双侧肺底可闻湿啰音。此时患者心率加快的机制是

- A、 心肌耗氧量增加
- B、 心室收缩末期压力升高
- C、 心脏迷走神经紧张性增高
- D、 心房容量感受器的传入冲动减弱
- E、 对主动脉弓和颈动脉窦压力感受器的刺激减弱

答案： E

161、患者,女,30岁,双眼上睑上抬无力伴复视2个月。X光检查发现上纵隔影增宽,CT扫描显示前纵隔内4cm $\times$ 3cm大小肿块。此患者最可能的诊断是

- A、 胸骨内甲状腺肿
- B、 淋巴瘤
- C、 畸胎瘤
- D、 神经纤维瘤
- E、 胸腺瘤

答案： E

162、患者,男,15岁。最近有下肢外伤史。查体见左足部不能跖屈。其损伤的肌肉为

- A、 臀大肌
- B、 胫前肌

- C、趾伸肌
- D、闭孔内肌
- E、腓肠肌

答案： E

163、患者,女,33岁。既往外阴疱疹病史,现妊娠14周,发现外阴皮肤出现密集小水疱,伴破溃。若为区分为原发性或继发性生殖器疱疹,首选的检查方法是

- A、皮损处病毒培养
- B、检测皮损中HSV抗原
- C、检测皮损中HSV-DNA
- D、血清HSV-IgM
- E、脐血HSV-DNA

答案： D

164、患者,男,32岁,自幼发作性呼吸困难,发作时经用药数小时至数日缓解。
查:BP140/90mmHg,心界不大,心尖部I级收缩期杂音,律齐,双肺布满哮鸣音,肝脏不大,下肢不肿。诊断首先应考虑为

- A、慢性支气管炎
- B、支气管扩张症
- C、风湿性心脏病左心衰竭
- D、支气管哮喘
- E、高血压性心脏病

答案： D

165、患者,男,45岁。主诉:阵发性全腹痛,伴恶心、呕吐8小时。现病史:病人于入院当日晨7时早饭后到田间劳动,9时左右突然感到全腹剧痛,以脐周为甚,如刀割样,恶心及呕吐,突出物为所进食的稀饭,并觉全身出冷汗,即到当地医院诊治,经注射止痛针后,症状略缓解,但半小时后又发作剧痛,呈持续性,阵发性加剧,无放射性,辗转不安,不愿平卧,呕吐频繁,自觉腹部逐渐膨胀,因而用车转送入院。起病后无发热,无大便及肛门排气,小便一次,量少而赤。体格检查发现肠型,有腹膜刺激征。X线腹部透视可见小肠扩张及有多个大小不等的、呈阶梯状的积液平段。初步诊断为肠梗阻。行开腹探查术。术中见小肠有坏死现象。行小肠切除术。需结扎肠系膜上动脉。有关肠系膜上动脉的说法,下列正确的是

- A、平第12胸椎发自腹主动脉
- B、营养全部小肠
- C、行于肠系膜内
- D、分布于全部结肠
- E、经十二指肠水平部的后方下行

答案： C

166、患者,男,48岁,颈增粗20年,近一年消瘦10kg,并有心悸。体检发现双侧甲状腺多个结节,基础代谢率+31%,2小时内甲状腺摄碘29%,最有效的治疗是

- A、 手术治疗
- B、 长期抗甲状腺药物治疗
- C、 放射治疗
- D、 甲状腺素治疗
- E、 中医治疗

答案： A

167、一位来访者离开你的咨询室后,其他科室的医生向你打听来访者的心理问题,你需要采取的应答策略是

- A、 告诉他,因他是医生
- B、 告诉他,因他关心他人
- C、 告诉他,要求他别外传
- D、 不告诉他,多管闲事
- E、 不告诉他,遵守保密原则

答案： E

168、患者,男,41岁,食用鱼胆后间断恶心呕吐,近2日少尿,每日约200ml,考虑急性肾衰竭,下列哪种情况最危险

- A、 血清钙 1.8mmol/L
- B、 pH7.2
- C、 血尿素氮 24mmol/L
- D、 血肌酐 374mmol/L
- E、 血清钾 6.5mmol/L

答案： E

169、男孩,体健,已接种一剂卡介苗,二剂乙肝,一剂脊髓灰质炎疫苗,该婴儿的年龄为

- A、 1个月
- B、 2个月
- C、 3个月
- D、 4个月
- E、 5个月

答案： B

170、患者,男,建筑工人,不慎从3米高处跌下,臀部着地。当时无不适,约1小时后感左腰痛,排尿呈红色;尿显微镜检查见红细胞满视野,体检腹平软,无明显肿块,IVU无异常发现。应考虑诊断



- A、尿道损伤
- B、肾挫伤
- C、输尿管损伤
- D、膀胱损伤
- E、腰臀部肌肉损伤

答案: B

171、各类动物使用的笼具应当保证每只动物都能实现自然行为,包括转身、站立、伸腿、躺卧、舔梳等。这些伦理要求基于的伦理原则是

- A、动物实验的审批
- B、动物实验的生产
- C、动物实验的管理
- D、动物实验的过程
- E、动物实验的运输

答案: C

172、老年患者,有糖尿病史12年,糖尿病视网膜病变1年,查尿常规正常。为尽早发现患者糖尿病肾脏损害,应选择下列哪项检查协助诊断

- A、尿微量清蛋白
- B、24小时尿蛋白定量
- C、尿液浓缩稀释功能
- D、尿渗透压
- E、尿比重

答案: A

173、患者欧某,男,28岁。1个月前出现紧张害怕,不与他人说话,称自己的想法不说出来周围人都知道了。还常听到去世的亲人和自己讲话。该患者最可能的诊断是

- A、 急性短暂性精神病性障碍
- B、 躁狂发作
- C、 抑郁症
- D、 精神分裂症
- E、 癔症

答案： D

174、患者,男,70岁,心前区持续性疼痛6小时,曾有15年的高血压病史及慢性支气管炎病史。查体:血压12/7.9kPa(90/60mmHg),心率100次/min,右背部听及少许湿性啰音。心电图见V₄~V₆ST下斜型下移0.3mV伴有深倒置T波,GOT 100单位、CK 2000单位。上述临床表现,首先要考虑

- A、 肺心病合并心衰
- B、 冠心病不稳定型心绞痛
- C、 高血压心脏病
- D、 急性心内膜下心肌梗死
- E、 慢性支气管炎合并肺部感染

答案： D

175、患者,女,24岁。停经2个月,腹痛,阴道流血量多于月经量,子宫如两个月妊娠大,宫口有羊膜囊膨出,宫颈无举痛。最可能的临床诊断为

- A、 异位妊娠
- B、 先兆流产
- C、 不全流产
- D、 难免流产
- E、 过期流产

答案： D

176、患儿,男,6岁。自幼发现心脏杂音,并有发绀和下蹲习惯入院。查体胸骨左缘2~3肋间可扪及收缩期震颤,胸骨左缘第2肋间有收缩期粗糙吹风样3/6级杂音向上传导,P₂略低,胸骨左缘第3肋间有收缩期粗糙吹风样3/6级杂音,向心前区传导。诊断应考虑为

- A、 法洛四联症
- B、 室间隔缺损伴右向左分流
- C、 重度肺动脉狭窄
- D、 动脉导管未闭
- E、 房间隔缺损伴右向左分流

答案： A

177、患儿,女,8天。因反复呛奶4天,拒奶发热2天入院。入院诊断为新生儿败血症。入院后应立即行何检查以发现其重要合并症

- A、 血培养
- B、 胸片
- C、 腰穿脑脊液检查
- D、 头颅 CT
- E、 尿培养

答案： C

178、患者,男,65岁。咳嗽咳痰反复发作20余年,近年来伴气促。要明确有无肺气肿,体检时下列体征最有帮助的是

- A、 肋间隙增宽
- B、 叩诊过清音
- C、 桶状胸,过清音,肺下界降低,移动度变小
- D、 心脏相对浊音界缩小
- E、 肺部干湿啰音

答案： C

179、糖尿病孕妇,正常女性骨盆,估计胎儿体重大于多少需考虑剖宫产

- A、 3500g
- B、 4000g
- C、 4500g
- D、 5000g
- E、 5500g

答案： B

180、患者,男,35岁。前年因右侧腹股沟疝嵌顿肠坏死而施行手术,今日上午突觉全腹痛,呕吐多次,腹胀,右下腹明显压痛,肠鸣音亢进,无排气排便,排尿1次,色正常。T37.5℃,白细胞 $13 \times 10^9/L$,血清淀粉酶1500U/L(Somogyi法)。其诊断为

- A、 急性阑尾炎
- B、 粘连性肠梗阻
- C、 伤寒肠穿孔
- D、 急性胰腺炎
- E、 乙状结肠扭转

答案： B

181、患者,男,40岁,一年前因头部外伤后诊断为滑车神经损伤,患者可能瘫痪的眼球外肌为

- A、 上直肌
- B、 上斜肌

- C、 上睑提肌
- D、 外直肌
- E、 下斜肌

答案： B

182、 患儿, 男, 7 天 10 小时, 因脐部渗血 1 天入院。足月顺产, 纯母乳喂养, 1 天前出现脐部渗血, 排黑便 1 次, 无发热, 无呕吐, 精神、食欲可。查体: T 36.8℃, RR 38 次/分, HR 125 次/分。反应可, 皮肤无淤点淤斑, 脐部渗血, 鲜红色, 脐轮无红肿, 腹软不胀, 肠鸣音 4 次/分, 首先考虑诊断为

- A、 脐炎
- B、 新生儿出血症
- C、 脐血管畸形
- D、 血小板减少性紫癜
- E、 应激性溃疡

答案： B

183、 患者, 女, 56 岁。10 小时前因持续胸闷、气短入院。血压 150/90mmHg, 心率 102 次/min, 心尖部闻及舒张期奔马律, 肺底细小湿啰音, 心电图示 V₃~V₅ST 段弓背向上抬高 0.3mv, 可见病理性 Q 波。以下处理不恰当的是

- A、 吸氧, 高枕卧位
- B、 静脉滴注硝酸甘油
- C、 静脉滴注硝普钠
- D、 毛花苷 C 0.4mg 缓慢静推
- E、 呋塞米静脉推注

答案： D

184、 患儿, 女, 生后 24 小时, 足月, 其母有早破水 32 小时, 羊水混浊有异味, 出生时无窒息, 体重 3 千克, 生后 12 小时出现发热、拒乳、皮肤发花, 查血糖为 9.4mmol/L, 考虑高血糖与下列有关的是

- A、 喂养不当
- B、 围产期窒息
- C、 吸入性肺炎
- D、 围产期感染的应激状态
- E、 可能有氨基酸代谢障碍

答案： D

185、 患儿, 男, 3 个月。出生后一直喂养困难, 头围较正常同龄婴儿增大。查体: 前囟膨隆, 叩诊 Macewen 征(+), 该患儿最有可能诊断是

- A、 甲亢

- B、先天性脑积水
- C、巨人症
- D、颅裂
- E、脑水肿

答案： B

186、患者,女,35岁。便秘多年,反复发作尿路刺激症状,多次中段尿培养大肠杆菌阳性,夜尿增多。尿检蛋白(±),WBC5~10个/HP,RBC3~5个/HP,尿渗透浓度下降。临床诊断为慢性肾盂肾炎,已施正规抗菌治疗。下列哪项最不具有预防复发的意义

- A、保持大便通畅
- B、注意经期卫生
- C、目前须继续用抗菌药物
- D、禁用肾毒性药物
- E、多饮水

答案： D

187、患者,女,48岁。外阴瘙痒伴灼痛4天。3周前考虑外阴阴道假丝酵母菌病,单次口服氟康唑150mg,症状消失。本次妇科检查见外阴抓痕,阴道黏膜红肿,真菌培养提示非白假丝酵母菌。以下治疗正确的是

- A、咪康唑栓剂,每晚200mg,连用7日
- B、制霉菌素栓剂,每晚10万U,连用10~14日
- C、氟康唑150mg,顿服;性伴侣同时治疗
- D、氟康唑150mg,顿服,72小时后加服1次
- E、氟康唑150mg,顿服,联合克霉唑栓剂,每晚150mg,连用7日

答案： D

188、患者,男,47岁,上腹部疼痛5年,餐后半小时疼痛明显,至下次餐前可缓解,近1周来节律性疼痛消失呈顽固性疼痛,腹痛放射至背部。下列诊断可能性最大的是

- A、幽门管溃疡
- B、球后溃疡
- C、复合性溃疡
- D、癌性溃疡
- E、穿透性溃疡

答案： E

189、患者,男,28岁,发热、咯血、呼吸困难伴少尿1周,尿蛋白(++),红细胞20个/HP,抗GBM抗体阳性。入院后诊断为急进性肾小球肾炎。患者肾脏疾病最有可能的病因是

- A、 循环免疫复合物沉积
- B、 原位免疫复合物形成
- C、 功能性蛋白尿
- D、 急性心肾综合征
- E、 循环容量不足

答案： B

190、患者,男,18岁,农民,因发热咳嗽2周,鼻出血、呕血2天而来急诊。查体:皮肤有片状淤斑,白细胞 $16 \times 10^9/L$,中性粒细胞 0.90,血红蛋白 70g/L,血小板 $12 \times 10^9/L$,凝血酶原时间 19秒(正常对照 13秒),纤维蛋白原 1g/L,网织红细胞 0.05,尿红细胞(++),尿胆原 1:10 阳性。最可能的诊断是

- A、 特发性血小板减少性紫癜
- B、 EVANS 综合征
- C、 溶血性尿毒综合征
- D、 血栓性血小板减少性紫癜
- E、 播散性血管内凝血

答案： E

191、患者,男,45岁。突发胸骨后压榨样疼痛,最可能的原因是

- A、 食管癌
- B、 自发性气胸
- C、 胸膜炎
- D、 心肌梗死
- E、 心包炎

答案： D

192、患者,男,40岁,反复饥饿时中上腹部隐痛10年,伴反酸嗝气,在进食和服制酸剂后可缓解,今晨中上腹剧痛后腹痛持续存在。如进行腹部检查,最具诊断价值的腹部体征是

- A、 腹肌紧张
- B、 腹壁柔韧感
- C、 肠鸣音亢进
- D、 肝浊音上界消失
- E、 Murphy 征阳性

答案： D

193、患者,女,25岁。因停经3个半月,阴道断续流血伴腹痛10天。妇科检查宫体增大如孕4个月大小,软,左侧附件区触及一手拳大小的囊性肿物,活动性良,其主要的辅助检查方法是

- A、 hCG 测定
- B、 B 型超声
- C、 多普勒胎心测定
- D、 X 线检查
- E、 CT 检查

答案： B

194、 患儿, 女, 9 岁, 发热 39℃, 咳嗽 5 天, 伴腹痛 2 天, 腹胀, 有广泛压痛、 反跳痛及肌紧张, 肠鸣音弱, 腹穿抽出稀薄无臭味脓汁。 应首先考虑

- A、 肠伤寒穿孔
- B、 肺脓肿破裂
- C、 阑尾穿孔
- D、 梅克尔憩室穿孔
- E、 原发性腹膜炎

答案： E

195、 患者, 男, 56 岁, 糖尿病患者, 既往曾使用胰岛素降糖。 近 2 日未使用胰岛素, 反复出现高血糖和低血糖交替, 考虑诊断为

- A、 肝源性低血糖症
- B、 特发性功能性低血糖症
- C、 胰岛素瘤
- D、 胰岛素自身免疫综合征
- E、 药源性低血糖症

答案： D

196、 患儿, 女, 5 天, 足月顺产, 生后无窒息, 生后 2~3 天出现轻度黄染, 今日略加重。 一般状况良好, 此黄疸发生主要的原理为

- A、 胆红素产生过多及肠肝循环增加
- B、 胆红素产生过多
- C、 肝酶系统发育不完善
- D、 胆红素产量过多及肝酶系统发育不完善
- E、 肝酶系统发育不完善及肠肝循环增加

答案： D

197、 某登山爱好者不幸遭遇雪崩, 被雪掩埋冻晕后获救。 由于低温和代谢抑制会影响细胞的钠-钾泵活动, 此幸存者的骨骼肌细胞电活动可能出现的变化是

- A、 静息电位值增大, 动作电位幅度减小
- B、 静息电位值减小, 动作电位幅度增大
- C、 静息电位值增大, 动作电位幅度增大
- D、 静息电位绝对值减小, 动作电位幅度减小

E、静息电位绝对值不变,动作电位幅度不变

答案: D

198、患儿,男,8岁,3天前从1米高处跳下后即感右膝稍有不适,但能走,未介意。3天后疼痛难忍。右胫骨上端稍上方肿胀,皮温高,但不红,深压痛明显。体温 39.5℃。血常规:白细胞 $23 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断是

- A、急性踝关节扭伤
- B、踝部骨折
- C、小腿下 1/3 骨折
- D、内踝上方蜂窝组织炎
- E、急性血源性骨髓炎

答案: E

199、患者,54岁,肥胖,5年来经常劳累后心前区疼痛,休息后好转,近日心绞痛发作频繁,来门诊检查血压 20/12kPa (150/90mmHg),医生应采取的措施不包括

- A、做心电图检查
- B、心脏彩超
- C、运动试验
- D、收院治疗
- E、向家属交代病情

答案: C

200、患者,男,27岁,教师。3年前戒毒,近1年来双下肢麻木、乏力,进行性加重,近1个月不能行走,便秘,排尿不畅。当地颅脑及胸腰椎 CT(-)。检查:双下肢肌力 4°,胸 10 以下痛觉减退,关节位置及音叉觉正常,下肢腱反射亢进,Babinski(+)。腰穿 CSF 压力 160mmH₂O,细胞 $35 \times 10^6/L$,蛋白 1275mg/L,按脊髓炎治疗无效。查血 RPR 1:32,TPHA 1:2560;腰穿 CSF 细胞 $25 \times 10^6/L$,蛋白 1344mg/L,RPR 1:2,TPHA 1:1280。该患者最有可能是什么疾病

- A、化脓性脊髓炎
- B、脊髓钩端螺旋体病
- C、脊髓血管梅毒
- D、病毒性脊髓炎
- E、结核性脊髓炎

答案: C

201、患者,男,75岁。咳嗽、咳痰、喘息 30 余年,5 年来间断加重,伴有双下肢水肿。1 周来咳喘并下肢水肿加重伴有嗜睡入院。以下检查对诊断具有重要意义的是

- A、MRI 检查

- B、心电图
- C、脑电图
- D、血气分析
- E、痰培养

答案： D

202、患者,女,18岁,劳力性心悸、气促3年,近日咯血,不能平卧。查体:发绀,颈静脉充盈,心尖区可闻舒张期隆隆样杂音。心脏B超示左房右室内径增大。ESR 33mm/h,抗“O”正常。诊断最可能为

- A、风心病二尖瓣狭窄左心衰
- B、风心病二尖瓣狭窄左心衰并右心衰
- C、右房黏液瘤
- D、急性风湿热并全心衰
- E、急性病毒性心肌炎并全心衰

答案： B

203、患者,男,60岁,因急剧胸痛8小时入院,含服硝酸甘油效果不佳,血压22.3/12.5kPa(168/94mmHg),心率110次/min,伴偶发室性期前收缩,心电图示胸导联T波高尖。下列用药,何者最佳

- A、静脉注射美托洛尔继以口服
- B、口服地尔硫草
- C、静脉注射利多卡因
- D、静脉注射毛花苷C
- E、口服普罗帕酮

答案： A

204、患者,男,64岁。车祸伤后被测得中心静脉压为0.36kPa(3.7cmH₂O),血压处于正常范围,此时患者可能是以下哪种情况

- A、心功能不全
- B、血容量不足
- C、血容量过多
- D、容量血管过度收缩
- E、以上情况都有可能

答案： E

205、70岁老人,出现进行性排便困难2个月,经纤维结肠镜检查证实为乙状结肠直肠交界处肿瘤,收住院。3天来出现急性肠梗阻,应选用哪种治疗方法最适宜

- A、应当立即行急诊手术切除肿瘤,断端直接吻合

- B、应在梗阻端作横结肠造口,然后二期行根治术
- C、应先用盲肠造口,然后二期行根治术
- D、应行急诊手术,回肠横结肠吻合
- E、先作肠道准备,然后来诊根治术

答案: B

206、患者,男,56岁,因头晕、恶心、水肿入院。既往高血压病史20年,有前列腺肥大,尿潴留史。贫血貌,血压24/16kPa(180/120mmHg),B超双肾缩小,BUN42mmol/L。哪种治疗不适宜

- A、纠正贫血
- B、血液透析
- C、肾移植
- D、降压治疗
- E、给予低蛋白饮食加必需氨基酸疗法

答案: C

207、患儿,女,1岁3个月。不明原因持续发热超过1个月伴反复皮疹,近期发现双手指间关节红肿。患儿热退后精神进食状况良好。入院后观察患儿充血性皮疹,发热时皮疹明显、热退后皮疹消失。查体:心、肺未发现异常。血WBC $15.2 \times 10^9/L$,中性0.82,血沉56mm/h,血培养(-)。首先考虑诊断

- A、败血症
- B、幼年型特发性关节炎
- C、川崎病
- D、伤寒
- E、风湿热

答案: B

208、患儿,女,5岁。骤起发热6小时伴寒颤、头痛、呕吐,病后4小时抽搐一次来急诊。入院体检:体温39.6℃,血压9.3/8kPa(70/60mmHg),意识朦胧,颈无抗力,心肺阴性,腹软,肝脾未及,肠鸣音活跃,四肢冷。WBC $15.0 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.82。最可能的诊断是

- A、败血症
- B、乙型脑炎
- C、化脓性脑膜炎
- D、中毒性细菌性痢疾
- E、脑型疟疾

答案: D

209、患儿,男,6个月。腹泻伴营养不良。精神萎靡,四肢肌无力,腱反射消失。腹胀,肠鸣音减弱,心率150次/分,心音低钝。首先应考虑

- A、低钠血症
- B、低钾血症
- C、高钾血症
- D、低镁血症
- E、低钾伴低钙血症

答案： B

210、初产妇,妊娠足月,临产 30 小时。查体:平脐处可见子宫缩复环,下段压痛,胎心微弱,已破膜,羊水混浊,宫口近开全,先露头, S⁺¹。最好的处理是

- A、立即剖宫产
- B、胎头吸引器
- C、产钳术
- D、穿颅术
- E、待其自然分娩

答案： A

211、一脑出血的患者,疼痛刺激能引起睁眼,该患者 Glasgow 睁眼反应评分为

- A、0 分
- B、1 分
- C、2 分
- D、3 分
- E、4 分

答案： C

212、患者因消化道出血住院 3 天,今晨起感头昏,心慌,查血压 11/8kPa(80/60mmHg),脉搏 118 次/min,血尿素氮 12.4mmol/L,最可能的原因是

- A、肾功能不全
- B、电解质紊乱
- C、酸中毒
- D、继续出血
- E、低血糖

答案： D

213、患者,男,22 岁,因高热、咳嗽 5 天急诊入院。患者 5 天前洗澡受凉后出现寒战,体温高达 40℃,伴咳嗽、咳痰,痰少呈铁锈色,无痰中带血,无胸痛。口服先锋霉素 VI 及止咳、退热剂 3 天后不见好转,体温仍波动于 38.5~40℃。查体:急性热病容,神志清楚,无皮疹,浅表淋巴结无肿大,巩膜无黄染,咽(-),气管居中,左中上肺叩浊音,语颤增强,可闻湿性啰音,叩诊心界不大,心率 100 次/分,律齐,无杂音,腹平软,肝脾未及,病理反射未引出。实验室检查:Hb 140g/L, WBC

12×10⁹/L, N 82%, L 18%, PLT 180×10⁹/L;尿常规(-);粪便常规(-)。初步诊断为大叶性肺炎。该病原体的主要致病物质是

- A、荚膜
- B、脂质
- C、鞭毛
- D、内毒素
- E、菌毛

答案： A

214、患儿,男,5岁。突发高热、呕吐、惊厥,数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致感染中毒性休克,应采取的抗休克药物为

- A、肾上腺素
- B、右旋糖酐
- C、阿托品
- D、酚妥拉明
- E、糖皮质激素

答案： E

215、患者,女,23岁,因风心病二尖瓣狭窄并关闭不全首次就诊,查体:心脏大,心率快,肝大,足背水肿。ECG示:快速房颤。最佳治疗是

- A、地高辛口服
- B、毛花苷C静脉注射
- C、阿替洛尔口服
- D、泼尼松口服
- E、胺碘酮口服

答案： B

216、患儿,男,5岁,肘部外伤,用哪种体征来鉴别肱骨髁上骨折和肘关节脱位最可靠

- A、肿胀明显
- B、肘关节活动受限
- C、疼痛
- D、畸形
- E、肘后三角关系有无改变


答案： E

217、成年患者,既往有双侧腹股沟部自行还纳的包块,本次肿物不能还纳伴恶心呕吐,不排气排便,腹痛腹胀已24小时。WBC 9×10⁹/L, N 90%,最可能是

- A、 滑动性疝
- B、 难复性疝
- C、 绞窄性疝
- D、 嵌顿性疝
- E、 肠管壁疝

答案： D

218、患者,男,56岁,咳嗽,咯血1月余,有吸烟史30余年,结合CT检查图像,最可能的诊断是



- A、 肺结核
- B、 肺炎
- C、 结节病
- D、 肺错构瘤
- E、 中央型肺癌

答案： E

219、患者,女,25岁,已婚。月经不规律,停经55天,阴道流血1个月,量多,无腹痛。妇科检查:子宫稍大,附件未触及包块。为明确诊断,首选的检查是

- A、 超声多普勒
- B、 盆腔CT
- C、 宫腔镜
- D、 妊娠免疫试验
- E、 腹部X光片检查

答案： A

220、患者,女,57岁,劳动后出现呼吸困难,采用体积描记法进行肺功能检测显示休息时耗氧量及呼吸功增加。下列哪项可降低呼吸肌的氧耗

- A、 气道阻力降低
- B、 肺扩散能力降低
- C、 肺顺应性降低
- D、 呼吸频率增快
- E、 潮气量增加

答案： A

221、患儿,男,8个月。确诊川崎病后出院,2个月后猝死于家中,死前无明显诱因,其死因可能为

- A、 脑出血
- B、 心肌炎
- C、 脑栓塞
- D、 冠状动脉瘤破裂
- E、 心包炎

答案: D

222、患儿,男,13岁,因肉眼血尿1天来门诊。尿常规检查蛋白++,红细胞满视野,红细胞管型1~3个/HP,白细胞2~3个/HP,抗链球菌溶血素“O”试验为1:800,血C3下降,内生肌酐清除率118ml/min,还需了解哪项病史以有助于该患儿的临床诊断

- A、 药物史
- B、 近期的感染史
- C、 剧烈体育活动
- D、 尿路刺激征
- E、 关节疼痛及皮疹史

答案: B

223、一贫血患者,网织红细胞0.05,Coombs试验阳性,其病因及发病机理最常见的是

- A、 骨髓造血衰竭
- B、 造血物质吸收障碍
- C、 造血物质缺乏
- D、 造血物质需要增加
- E、 红细胞破坏增加

答案: E

224、孕妇,女,38岁。慢性高血压,现孕2产0,孕37周,突发腹痛,阴道少量流血,血压下降。首先应考虑

- A、 羊水过多
- B、 先兆临产
- C、 子宫破裂
- D、 前置胎盘
- E、 胎盘早剥

答案: E

225、患者,男,26岁。半年前起病,表现为胡言乱语,认为有人跟踪监视他。入院后查体及神经系统检查未见异常,意识清晰,思维松弛,被害妄想,幻听。该患者最可能的诊断是

- A、偏执性精神病
- B、精神分裂症
- C、焦虑症
- D、内分泌疾病所致精神障碍
- E、抑郁症

答案: B

226、患者鞍区手术后高热不退,已排除感染因素,高热可能是手术中损伤了

- A、视上核
- B、下丘脑前部
- C、下丘脑后部
- D、室旁核
- E、乳头体核

答案: B

227、患者,女,32岁。左乳房外上象限扪及一3cm×2cm大小肿块,与皮肤粘连,左腋窝可触及一肿大淋巴结,尚可推动。临床诊断为左乳癌,按TNM分期法,应为

- A、T₁N₀M₀
- B、T₂N₁M₀
- C、T₃N₁M₀
- D、T₄N₁M₀
- E、T₁N₁M₁

答案: D

解析: D

228、患者,女,21岁。因昏迷不醒、呼之不应,间断抽搐30分钟入我院急诊。查体:R26次/分,皮肤湿冷,瞳孔明显缩小。下列哪种疾病可能性大

- A、巴比妥类药物中毒
- B、有机磷中毒
- C、CO中毒
- D、阿托品中毒
- E、脑血管意外

答案: B

229、初产妇, 28 岁, 孕 34 周, 规律宫缩 6 小时。肛查: 宫颈管消退 80%、宫颈进行性扩张至 3cm, 临床诊断为早产。为了进一步分析原因, 下列方法不常用的是

- A、 B 型超声检查
- B、 宫颈和阴道分泌物培养
- C、 pH 试纸检测
- D、 血常规和 CRP
- E、 羊水穿刺检查

答案: E

230、患者, 女, 30 岁, 四肢皮肤反复出现出血点, 淤斑 1 年余, 肝脾未触及。血红蛋白 95g/L, 白细胞 $4.5 \times 10^9/L$ 。为确诊应首选的检查是

- A、 出血时间
- B、 凝血时间
- C、 毛细血管脆性试验
- D、 骨髓穿刺
- E、 血块收缩试验

答案: D

231、患者, 男, 65 岁。3 天前出现上腹部持续性疼痛, 进行性加重。9 小时前腹痛加重伴呕血, 为鲜红色不凝血, 量约一盆; 1 小时前解柏油样大便 1 次, 约 1000ml。既往有“胃溃疡”病史。查体: BP70/50mmHg, P118 次/min, 面色苍白, 四肢湿冷, 脉搏细速, 上腹部有压痛, 无反跳痛, 肠鸣音弱, 呼吸急促, 表情淡漠, 嗜睡。初步诊断为失血性休克。试问该患者最可能发生的酸碱失衡是

- A、 代谢性酸中毒
- B、 代谢性碱中毒
- C、 呼吸性酸中毒
- D、 呼吸性碱中毒
- E、 代谢性酸中毒合并代谢性碱中毒

答案: A

232、患者, 女, 26 岁, 来诊, 近半年来胸闷, 曾晕倒 2 次, 体检示轻度贫血, 可闻及心尖区舒张期隆隆样杂音, 伴第一心音亢进。下一步最适宜的检查是

- A、 吞钡摄心脏正侧位片
- B、 超声心动图
- C、 心电图和心向量图
- D、 血常规和骨髓象检查
- E、 心血管造影

答案: B

233、患者,女,24岁,发热1天后出现肉眼血尿,无尿频、尿急、尿痛。尿常规:尿蛋白(+),红细胞30~40个/HP,白细胞10~20个/HP。为明确诊断,应进行的检查是

- A、尿蛋白定量
- B、膀胱镜
- C、肾盂造影
- D、尿细菌培养
- E、血常规检查

答案: D

234、患者,男,52岁,因肝硬化住院,发生肝性脑病后,用乳果糖治疗,其作用机制主要是

- A、保肝药物,促进肝细胞再生
- B、增加肠道内渗透压,抑制细菌繁殖
- C、导泻减少肠道内毒素
- D、改变肠道酸碱度,减少氨的形成和吸收
- E、供给糖,以提供热量

答案: D

235、患者,男,32岁,平素健康,某日骑自行车上班途中,险些与摩托车相撞,事后心慌心悸,来门诊看病,检查血压17.3/12.0kPa(130/90mmHg),心率124次/min,节律绝对不整,杂音不清。最可能的诊断是

- A、室性期前收缩
- B、窦性心律不齐
- C、交界区心动过速
- D、阵发性房颤
- E、阵发性室上速

答案: D

236、患者,女,30岁。停经8周,阴道少许出血3天,无腹痛。妇科检查:宫口闭,子宫增大如孕2个月大小,软,无压痛,两侧附件正常。最可能诊断为

- A、习惯性流产
- B、先兆流产
- C、正常妊娠
- D、难免流产
- E、过期流产

答案: B

237、患者,男,73岁,排尿困难4年,近1个月加重伴食欲下降。直肠指诊前列腺明显增大至5.5cm×5.5cm×5cm,叩诊膀胱脐下3横指。血BUN为40mmol/L,Cr为365μmol/ml,B超示双肾中度积水。合适的处理是

- A、耻骨上经膀胱前列腺切除术
- B、经尿道前列腺切除术
- C、服用α受体阻滞剂和5α还原酶抑制剂
- D、经尿道前列腺热疗
- E、留置导尿管或耻骨上膀胱穿刺造瘘

答案: E

238、患者,男,60岁,食欲缺乏、腹胀,考虑酒精性肝硬化失代偿来诊。下列查体可见,但应除外

- A、蛙状腹
- B、水母头样腹壁静脉
- C、肚脐突出
- D、腹式呼吸增强
- E、肝掌

答案: D

239、患者,男,35岁,水肿2年,近2周头晕,乏力,呕吐,尿少,BP20/14kPa(150/105mmHg)Hb60.9g/L,尿蛋白(++),颗粒管型8个/HP,蜡样管型8个/HP,BUN40mmol/L,Scr600μmol/L,目前应首选哪项治疗

- A、应用糖皮质激素
- B、输新鲜血浆
- C、氢氯噻嗪利尿
- D、进行透析疗法
- E、复方降压片降压

答案: D

240、患者,男,35岁,有十二指肠球部溃疡病史,今晨突起头晕、心慌、呕血2次、黑便1次,来院查:面色苍白,出冷汗,P 130次/min,BP 80/50mmHg。HCT 28%。估计失血量为

- A、200ml
- B、300ml
- C、500ml
- D、700ml
- E、1000ml

答案: E

241、患者,女,24岁,尿频、尿急、尿痛5天,腰痛伴发热1天,最高体温39℃。查体:双肾区叩击痛(+)。血常规:WBC $13 \times 10^9/L$,N85.6%。可能的诊断为

- A、急性膀胱炎
- B、急性肾小球肾炎
- C、慢性膀胱炎
- D、急性肾盂肾炎
- E、慢性肾盂肾炎

答案: D

242、患儿,男,2岁,3小时前误吸花生米阻塞气道,呼吸困难,烦躁不安。初步诊断发生了急性呼吸性酸中毒。试问此时机体的主要代偿调节方式是下列哪项

- A、肾脏的代偿调节
- B、肺脏的代偿调节
- C、肝脏的代偿调节
- D、细胞内外离子交换
- E、细胞外液中 HCO_3^- 缓冲系统的作用

答案: D

243、患者,男,28岁,发热,胸痛伴气短6天,1小时前气短加重,故来就诊。查体:BP8.2/6.2kPa(60/45mmHg),颈静脉怒张,心浊音界明显扩大,心率144次/min,律齐,心音遥远,吸气时脉搏减弱,胸透心影向两侧扩大,心脏搏动弱。最有效的抢救措施为

- A、静脉注射毛花苷C
- B、肌肉注射哌替啶
- C、静滴多巴胺与间羟胺
- D、持续高流量吸氧
- E、立即行心包穿刺

答案: E

244、孕妇,31岁,妊娠40周,G₃P₀,无产兆。常规产检:血压126/78mmHg,宫高35cm,腹围106cm,LOA,胎心138次/min。欲了解胎盘功能,应行哪项检查

- A、羊水量检查
- B、NST检查
- C、OCT试验
- D、孕妇血清胎盘泌乳素
- E、羊水卵磷脂/鞘磷脂

答案: D

245、患者,男,18岁,因溺水入院第3天出现呼吸困难。查体:R40次/min, BP90/68mmHg, HR100次/min, 口唇发绀, 两肺湿啰音。吸氧5L/min时, PaO₂56mmHg, PaCO₂28mmHg。患者最可能出现的并发症是

- A、心力衰竭
- B、急性呼吸窘迫综合征
- C、脑膜炎
- D、麻痹性肠梗阻
- E、消化道出血

答案: B

246、患儿,女,6个月。腹泻3天,无尿8小时,急诊入院。大便呈蛋花汤样稀便、无脓血,血压86/60mmHg,四肢厥冷,血钠129mmol/L。下列补液措施最合适的是

- A、1/3张溶液
- B、1/2张溶液
- C、2/3张溶液
- D、0.9%氯化钠溶液
- E、5%葡萄糖溶液

答案: C

247、患者,女,27岁。四肢无力10天。查体:四肢肌力2级,肌张力减低,四肢腱反射减弱,伴肌压痛,大小便能自控,感觉无障碍。腰穿脑脊液检查:白细胞数 $6 \times 10^6/L$,蛋白0.9g/L,糖2.9mmol/L,氯化物125mmol/L。诊断考虑为

- A、吉兰-巴雷综合征
- B、重症肌无力
- C、急性硬脊膜外脓肿
- D、脊髓灰质炎
- E、周期性瘫痪

答案: A

248、患者,女,25岁。右肱骨干中段骨折并发桡神经损伤,下列哪项临床表现不应该出现

- A、右手垂腕畸形
- B、右拇指不能背伸及外展
- C、右手第2~5指掌指关节不能伸直
- D、右手背虎口区感觉障碍
- E、右拇指不能对掌

答案: E

249、初孕妇, 26 岁, 因“妊娠 34 周, 无痛性阴道少量出血 3 天”来院就诊。查体: 枕左前位, 胎心率 140 次/min, 无明显宫缩。本病例最恰当的处理应是

- A、 期待疗法
- B、 立即行人工破膜
- C、 静脉滴注催产素
- D、 行剖宫产术
- E、 肌注黄体酮保胎

答案: A

250、患者, 女, 26 岁, 因反复黑便半年、加重伴呕血 2 次入院, 胃镜提示食道下段多发黏膜下曲张血管, 腹部增强 CT 提示门静脉主干未见显示, 脾大, 贲门周围大量曲张血管形成。患者门静脉高压症的病因为

- A、 肝硬化
- B、 布加综合征
- C、 脾大
- D、 门静脉海绵样变性
- E、 胰腺炎

答案: D

251、患者, 女, 28 岁。发现外阴肿物 5 天, 发热 2 天。体温最高 38.7℃。检查见左侧外阴部后下方鸡蛋大小肿物, 表面红肿、压痛, 局部有波动感。最可能的临床诊断是

- A、 前庭大腺炎
- B、 前庭大腺脓肿
- C、 前庭大腺囊肿
- D、 会阴脓肿
- E、 外阴癌

答案: B

252、一脑梗死的患者, 定向力正常, 该患者 Glasgow 言语反应评分为

- A、 1 分
- B、 2 分
- C、 3 分
- D、 4 分
- E、 5 分

答案: E

253、患者因口裂以下皮肤感觉障碍就诊, 经颅内 CT 检查发现其脑干有占位性病变。其感觉障碍可能是由于病变累及()引起的

- A、 眼神经
- B、 上颌神经
- C、 下颌神经
- D、 面神经
- E、 舌咽神经

答案： C

254、十岁小儿,便血,色新鲜,多在便后,伴腹痛。检查:腹软,左下腹按压痛,未触及肿块,肛门指检可触及带蒂的结节一个。最可能的诊断是

- A、 内痔
- B、 直肠癌
- C、 直肠息肉
- D、 痢疾
- E、 结肠息肉病

答案： C

255、患者,男,34岁,突起上腹痛3小时,伴恶心、呕吐,发病前有酗酒史。查体:血压90/60mmHg,腹平坦,脐周压痛,无反跳痛,Cullen征及Grey-Turner征阳性。最可能的诊断是

- A、 胆道感染
- B、 急性胰腺炎
- C、 消化性溃疡穿孔
- D、 急性单纯性胃炎
- E、 消化性溃疡

答案： B

256、突发心前区疼痛1小时来院急诊,疑为急性心肌梗死,下列可以不出现的是

- A、 动脉压下降
- B、 心率加快
- C、 白细胞升高
- D、 心电图病理性Q波
- E、 高大T波

答案： D

257、患儿,男,9岁。水肿,血尿3日,今日水肿加重,血压16.9/11.7kPa(130/90mmHg),心率150次/分,肺有少许水泡音,肝肋下3cm,应首选哪种治疗

- A、 快速利尿剂

- B、 硝普钠静脉滴注
- C、 硫酸镁静脉滴注
- D、 腹膜透析
- E、 加强抗感染治疗

答案： A

258、患者,男,33岁。劳力性心慌气促10年,心尖区可听到舒张期隆隆样杂音,胸部X线检查见心影增大呈梨形,并见“双心房阴影”。该患者二维或切面超声心动图检查可发现

- A、 二尖瓣瓣口狭窄
- B、 左心房变小
- C、 主动脉瓣瓣口狭窄
- D、 三尖瓣瓣口狭窄
- E、 肺动脉瓣瓣口狭窄

答案： A

259、患者,男,54岁,农民,因使用百草枯中毒引起的急性肾衰竭,肾脏损害的主要机制是

- A、 肾小球病变
- B、 肾小管坏死
- C、 肾血管损害
- D、 肾间质纤维化
- E、 肾间质水肿

答案： B

260、患者,男,32岁,有溃疡病史,5小时饱食后劳动时突发剑突下撕裂样疼痛,逐渐发展至右下腹,仍以剑下为重。查体:T 37.3℃,P 88次/min,半卧屈曲位,面色苍白,腹部“板样”硬,压痛反跳痛(+)。下列最可能的诊断是

- A、 急性阑尾炎
- B、 输尿管结石
- C、 胃溃疡恶变
- D、 胃溃疡穿孔
- E、 原发性腹膜炎

答案： D

261、患者,男,48岁,10年少量饮酒史。近1个月上腹疼痛,饥饿时加重,呈现疼痛-进食-缓解的规律。最可靠的诊断措施是

- A、 超声检查
- B、 上消化道内镜

- C、 上消化道钡餐
- D、 依据临床表现
- E、 根据药物的治疗效果

答案： B

262、患者,男,15岁,右膝外伤后出现酸痛,局部渐渐肿胀1个月余,经临床化验,X线检查和动脉造影等,拟诊为右胫骨上端骨肉瘤,胸片(-)。决定手术保肢,加其他综合治疗。家属询问存活率,其较正确的答复是

- A、 彻底痊愈可能性极大
- B、 存活率较单纯截肢大大提高,5年存活率可提高至50%以上
- C、 存活率达70%以上
- D、 存活率大约为40%左右
- E、 尚难以预断

答案： B

263、用 ^{15}N 标记谷氨酰胺的酰胺氮喂养鸽子后,在鸽子体内含 ^{15}N 的化合物是

- A、 嘧啶环的 N_1
- B、 GSH
- C、 嘌呤环的 N_1 和 N_7
- D、 嘌呤环的 N_3 和 N_9
- E、 肌酸

答案： D

264、中年男性,近3个月出现左侧面部麻木,怀疑有三叉神经病变,检查时最不可能出现的体征为

- A、 角膜反射减弱
- B、 咽反射消失
- C、 面部感觉障碍
- D、 张口歪斜
- E、 角膜溃疡

答案： B

265、患者,男,40岁,反复饥饿时中上腹部隐痛10年,伴反酸嗝气,在进食和服制酸剂后可缓解,今晨中上腹剧痛后腹痛持续存在。为确诊疾病,应选择的检查手段是

- A、 血清淀粉酶测定
- B、 癌胚抗原测定
- C、 胃镜检查
- D、 X线腹部平片

E、 腹部超声检查

答案： D

266、风心病二尖瓣狭窄合并房颤的患者, 血压 120/70mmHg, 心率 120 次/min, 不适合应用哪种药物治疗

A、 洋地黄类药物

B、 β 受体拮抗剂


C、 华法林

D、 地尔硫草

E、 伊伐布雷定

答案： E

267、患者, 男, 63 岁, 诊断左上肺鳞状细胞癌, 一个月前行左上肺癌根治术, 术后一周开始出现高热、气短、胸闷、咳脓痰等表现, CT 如下, 诊断支气管胸膜瘘, 后发展为慢性脓胸, 最有效的治疗方法是



A、 胸膜纤维板剥离术

B、 胸膜肺切除术

C、 胸廓成形术

D、 肋骨切除

E、 全肺切除

答案： A

268、初产妇, 妊娠 30 周, 孕前体健。查体: BP150/105mmHg, 水肿(++), 蛋白尿 2g/24h。应属下列何种诊断

A、 妊娠期高血压

B、 子痫

C、 妊娠合并慢性肾炎

D、 子痫前期

E、 子痫前期重度

答案： E

269、患者, 女, 左颈前肿块 2 个月来诊。查体: 甲状腺右叶上极触及 3cm×2cm 肿块, 表面光滑, 颈部未触及肿大的淋巴结。该患者首选的检查是

- A、 甲状腺 B 超
- B、 颈部 CT
- C、 肿块针吸细胞学检查
- D、 甲状腺核素扫描
- E、 颈部正侧位 X 线片

答案： C

270、患者,女,50岁,与丈夫吵架后服下敌百虫约100ml,出现头晕、恶心、呕吐,胸闷、视力模糊等。4小时后出现神志不清,被家属发现立即送到当地医院就诊,经检查后诊断为急性有机磷中毒,医生立即给予洗胃、导泻,阿托品、解磷定静脉注射等紧急处理,患者渐渐好转。有机磷化合物的作用机制是抑制

- A、 胆碱酯酶活性
- B、 酸性磷酸酶活性
- C、 巯基酶活性
- D、 羟基酶活性
- E、 碱性磷酸酶活性

答案： A

271、Buerger 病局部缺血期表现为

- A、 肢端坏疽
- B、 静息痛
- C、 5P 征
- D、 间歇性跛行
- E、 股青肿

答案： D

解析： D

(271~273 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 肢端坏疽
- B. 静息痛
- C. 5P 征
- D. 间歇性跛行
- E. 股青肿

272、急性动脉栓塞表现为

- A、 肢端坏疽
- B、 静息痛
- C、 5P 征
- D、 间歇性跛行
- E、 股青肿

答案： C

273、急性深静脉血栓形成表现为

- A、 肢端坏疽
- B、 静息痛
- C、 5P 征
- D、 间歇性跛行
- E、 股青肿

答案： E

解析： E

(274~276 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 氯喹
- B. 奎宁
- C. 乙胺嘧啶
- D. 伯氨喹
- E. 青蒿素

274、对红细胞内裂殖体有迅速而强大杀灭作用的是

- A、 氯喹
- B、 奎宁
- C、 乙胺嘧啶
- D、 伯氨喹
- E、 青蒿素

答案： A

275、能杀灭肝细胞内速发型和迟发型疟原虫, 杀灭各种疟原虫配体的是

- A、 氯喹
- B、 奎宁
- C、 乙胺嘧啶
- D、 伯氨喹
- E、 青蒿素

答案： D

276、杀灭各种疟原虫速发型, 对红细胞内未成熟裂殖体有抑制作用的是

- A、 氯喹
- B、 奎宁
- C、 乙胺嘧啶
- D、 伯氨喹
- E、 青蒿素

答案： C

解析： C

(277~279 共用备选答案)

共用备选答案

- A. Osler 结
- B. Ewart 征
- C. 肝脏扩张性搏动
- D. 肱动脉上闻及杜氏 (Duroziez) 血管杂音
- E. Beck 三联征

277、渗出性心包炎的特征性改变是

- A、 Osler 结
- B、 Ewart 征
- C、 肝脏扩张性搏动
- D、 肱动脉上闻及杜氏 (Duroziez) 血管杂音
- E、 Beck 三联征

答案： B

278、亚急性细菌性心内膜炎的特征性改变是

- A、 Osler 结
- B、 Ewart 征
- C、 肝脏扩张性搏动
- D、 肱动脉上闻及杜氏 (Duroziez) 血管杂音
- E、 Beck 三联征

答案： A

279、心包填塞的特征性改变是

- A、 Osler 结
- B、 Ewart 征
- C、 肝脏扩张性搏动
- D、 肱动脉上闻及杜氏 (Duroziez) 血管杂音
- E、 Beck 三联征

答案： E

解析： E

(280~282 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 减毒活疫苗
- B. 死疫苗
- C. 类毒素
- D. 外毒素
- E. 病原体的部分成分

280、乙肝疫苗属于

- A、 减毒活疫苗
- B、 死疫苗
- C、 类毒素
- D、 外毒素
- E、 病原体的部分成分

答案： E

281、麻疹疫苗属于

- A、 减毒活疫苗
- B、 死疫苗
- C、 类毒素
- D、 外毒素
- E、 病原体的部分成分

答案： A

282、破伤风疫苗属于

- A、 减毒活疫苗
- B、 死疫苗
- C、 类毒素
- D、 外毒素
- E、 病原体的部分成分

答案： C

解析： C

(283~286 共用备选答案)

共用备选答案

- A. I A 期
- B. I B 期
- C. IV 期
- D. II 期
- E. III 期

283、子宫稍大, 活动, 附件(-), 病灶侵犯肌层超过 1/2, 分期为

- A、 I A 期
- B、 I B 期
- C、 IV 期
- D、 II 期
- E、 III 期

答案： B

284、宫腔 8cm, 阴道顶端已有浸润, 双侧增厚, 但未达盆壁, 分期为

- A、 I A 期
 - B、 I B 期
 - C、 IV期
 - D、 II 期
 - E、 III期
- 答案： E

285、子宫经产大小,手术后切开子宫,癌组织浸润达子宫深肌层,分期为

- A、 I A 期
 - B、 I B 期
 - C、 IV期
 - D、 II 期
 - E、 III期
- 答案： B

286、子宫内膜癌手术病理报告:肿瘤局限在子宫内膜,分期为

- A、 I A 期
 - B、 I B 期
 - C、 IV期
 - D、 II 期
 - E、 III期
- 答案： A

解析： A

(287~289 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 高血磷、低血钙
- B. 低血磷、高血钙
- C. 低血磷、低血钙
- D. 高尿磷、高尿钙
- E. 高血磷、高血钙

287、甲状旁腺功能亢进症出现

- A、 高血磷、低血钙
- B、 低血磷、高血钙
- C、 低血磷、低血钙
- D、 高尿磷、高尿钙
- E、 高血磷、高血钙

答案： B

288、甲状旁腺功能减退症出现

- A、 高血磷、低血钙
- B、 低血磷、高血钙
- C、 低血磷、低血钙
- D、 高尿磷、高尿钙
- E、 高血磷、高血钙

答案： A

289、慢性肾功能不全出现

- A、 高血磷、低血钙
- B、 低血磷、高血钙
- C、 低血磷、低血钙
- D、 高尿磷、高尿钙
- E、 高血磷、高血钙

答案： A

解析： A

(290~291 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 30 天
- B. 42 天
- C. 45 天
- D. 60 天
- E. 90 天

290、孕产期保健是各级各类医疗保健机构为准备妊娠至产后一定天数的妇女及胎婴儿提供的全程系列医疗保健服务。该天数是

- A、 30 天
- B、 42 天
- C、 45 天
- D、 60 天
- E、 90 天

答案： B

291、产后进行母婴健康检查的时间是

- A、 30 天
- B、 42 天
- C、 45 天
- D、 60 天
- E、 90 天

答案： B

解析： B

(292~294 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 减毒活疫苗
- B. 死疫苗
- C. 类毒素
- D. 外毒素
- E. 病原体的部分成分

292、病毒的基本结构是

- A、 核心
- B、 衣壳
- C、 核衣壳
- D、 包膜
- E、 刺突

答案： C

293、裸露病毒的结构是

- A、 核心
- B、 衣壳
- C、 核衣壳
- D、 包膜
- E、 刺突

答案： A

294、决定病毒特性的是

- A、 核心
- B、 衣壳
- C、 核衣壳
- D、 包膜
- E、 刺突

答案： B

295、保护病毒核酸的结构是

- A、 核心
- B、 衣壳
- C、 核衣壳
- D、 包膜
- E、 刺突

答案： A

解析： A

(299~300 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 产伤
- B. 妇科手术
- C. 慢性咳嗽
- D. 重体力劳动者
- E. 先天发育不良

296、张力性尿失禁的最主要原因是

- A、 产伤
- B、 妇科手术
- C、 慢性咳嗽
- D、 重体力劳动者
- E、 先天发育不良

答案： A

297、尿瘘的最主要原因是

- A、 产伤
- B、 妇科手术
- C、 慢性咳嗽
- D、 重体力劳动者
- E、 先天发育不良

答案： A

298、乳母每次泌乳时,分泌浓度先高后低的营养成分是

- A、 碳水化合物
- B、 脂肪
- C、 蛋白质
- D、 矿物质
- E、 维生素 D

答案： C

299、乳母每次泌乳时,分泌浓度先低后高的营养成分是

- A、 碳水化合物
- B、 脂肪
- C、 蛋白质
- D、 矿物质
- E、 维生素 D

答案： B

300、母乳中含量低,婴儿需要额外补充的营养素是

A、 碳水化合物

B、 脂肪

C、 蛋白质

D、 矿物质

E、 维生素 D

答案： E

1、以下疾病哪一种预后最好

- A、 偏执狂
- B、 紧张型精神分裂症
- C、 单纯型精神分裂症
- D、 偏执型人格障碍
- E、 青春型精神分裂症

答案： B

2、关于雌激素的描述, 下列各项中哪项是错误的

- A、 雌激素为蛋白激素
- B、 雌激素来自胎盘及卵巢
- C、 妊娠早期由黄体产生雌二醇和雌酮
- D、 妊娠 10 周后由胎盘产生
- E、 由合体滋养细胞产生

答案： A

3、成人高血压的诊断标准中, 正确的是

- A、 收缩压 ≥ 18.7 kPa (140mmHg) 和 (或) 舒张压 ≥ 12 kPa (90mmHg)
- B、 收缩压 >20 kPa (150mmHg) 和 (或) 舒张压 >12 kPa (90mmHg)
- C、 收缩压 >21.3 kPa (160mmHg) 和 (或) 舒张压 >12 kPa (90mmHg)
- D、 收缩压 ≥ 21.3 kPa (160mmHg) 和 (或) 舒张压 ≥ 12.7 kPa (95mmHg)
- E、 收缩压 ≥ 21.3 kPa (160mmHg) 和 (或) 舒张压 >13.3 kPa (100mmHg)

答案： A

4、CIN I (LSIL) 级为

- A、 中 1/3
- B、 上 1/3
- C、 异型细胞局限在上皮层的下 1/3
- D、 下 2/3
- E、 上 2/3

答案： C

5、以下说法符合创伤后应激障碍的是

- A、 遭受创伤后数日至数月后, 罕见延迟半年以上发生, 病程至少持续 1 个月以上, 一般在 1 年内恢复正常

- B、 遭受心理社会刺激发生后 1 个月内发生, 病程至少持续 1 个月, 一般不超过 6 个月
- C、 表现为精神运动性兴奋或精神运动性抑制, 可有意识模糊
- D、 以抑郁、焦虑、害怕等情感症状为核心症状, 有退缩、不注意卫生、生活无规律等行为障碍
- E、 该疾病若应激源被消除, 预后良好, 缓解完全

答案: A

6、CD4 T 细胞识别的抗原表位不包括

- A、 线性表位
- B、 顺序表位
- C、 构象表位
- D、 蛋白降解后的多肽片断
- E、 MHC II 类分子提呈的表位

答案: C

7、血液中缓冲固定酸最强的缓冲对是

- A、 Pr^-/HPr
- B、 Hb^-/HHb
- C、 $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$
- D、 $\text{HbO}_2^-/\text{HHbO}_2$
- E、 $\text{HPO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{PO}_4^-$

答案: C

解析: C

8、属于特殊内脏运动核的神经核

- A、 动眼神经核
- B、 滑车神经核
- C、 面神经核
- D、 展神经核
- E、 舌下神经核

答案: C

9、仅在肝中合成的化合物是

- A、 糖原
- B、 尿素
- C、 脂肪酸
- D、 胆固醇
- E、 血浆蛋白

答案： B

10、肺转移性肝癌是指

- A、 肝癌和肺癌互相转移
- B、 肝癌转移到肺
- C、 肝和肺同时发生转移性癌
- D、 肺癌转移到肝
- E、 肝癌和肺癌同期转移到其他地方

答案： B

11、关于 AFP 的叙述, 下列错误的是

- A、 胎儿早期由肝脏和卵黄囊合成的一种血清糖蛋白
- B、 生殖腺胚胎肿瘤, 妊娠增加
- C、 是原发性肝癌的标志蛋白
- D、 AFP 不升高, 可除外原发性肝癌
- E、 急慢性肝炎、肝硬化可增加, 其升高与肝细胞坏死与再生程度相关

答案： D

12、鉴别肺炎球菌与甲型链球菌的试验是

- A、 胆汁溶菌试验和菊糖发酵试验
- B、 胆汁溶菌试验和甘露醇发酵试验
- C、 血浆凝固酶试验和甘露醇发酵试验
- D、 血浆凝固酶试验和菊糖发酵试验
- E、 乳糖发酵试验和蔗糖发酵试验

答案： A

13、关于 Ewart 征, 以下描述错误的是

- A、 左肩胛骨下方出现叩诊浊音区
- B、 该区有支气管呼吸音
- C、 该区语颤减弱
- D、 本征提示心包积液
- E、 各型渗出性心包积液

答案： C

14、关于左心室正确的记述是

- A、 入口周缘有三尖瓣
- B、 左上部为动脉圆锥
- C、 流出道与肺动脉口相延续
- D、 前内侧部为主动脉前庭

E、 内有绝缘肉柱

答案： D

15、酶促反应动力学是研究

A、 酶分子的空间构象

B、 酶的电泳行为

C、 酶的活性中心

D、 影响酶促反应速率的因素

E、 酶的合成

答案： D

16、下列哪种疾病最可能引起漏出液

A、 SLE

B、 结核病

C、 食管破裂

D、 肾病综合征

E、 胸膜间皮瘤

答案： D

17、急性肾炎在早期突然发生惊厥, 以下情况可能性最大的是

A、 高热惊厥

B、 低钙惊厥

C、 低钠综合征

D、 高血压脑病

E、 低血糖症

答案： D

18、小儿急性上呼吸道感染的最主要病原体是

A、 肺炎链球菌

B、 厌氧菌

C、 真菌

D、 病毒

E、 流感嗜血杆菌

答案： D

19、支气管哮喘患者, 接触外源性致敏原后, 浆细胞主要产生下列哪一种抗体而使人体处于致敏状态

A、 IgM

B、 IgG

- C、 IgE
 - D、 IgA
 - E、 IgH
- 答案： C

20、左侧卵巢动脉可来自

- A、 左髂外动脉
 - B、 左肾动脉
 - C、 右髂内动脉
 - D、 右髂外动脉
 - E、 阴部内动脉
- 答案： B

21、关于宫颈不典型增生, 哪项说法是错误的

- A、 底层细胞增生
 - B、 细胞排列较有条理
 - C、 甚至占据上皮大部分
 - D、 从一层增至多层
 - E、 核异型
- 答案： B

22、鉴别急慢性肾衰的重要指标

- A、 贫血程度
 - B、 血肌酐水平
 - C、 血尿素氮水平
 - D、 尿量
 - E、 肾脏大小和血流
- 答案： E

23、高渗性非酮症昏迷补液首先考虑使用

- A、 等渗生理盐水
 - B、 低渗生理盐水
 - C、 3%氯化钠溶液
 - D、 5%葡萄糖溶液
 - E、 胶体溶液
- 答案： A

24、乙型脑炎在我国的发病季节主要在

- A、 冬春季节

- B、 秋季
- C、 7、8、9 三个月
- D、 9、10、11 三个月
- E、 夏季

答案： C

25、自体输血时,采血量以血红蛋白多少为限

- A、 60g/L
- B、 100g/L
- C、 120g/L
- D、 140g/L
- E、 没有限制

答案： B

26、患者,男,29 岁,反复尿路结石,可能原因不包括以下哪项

- A、 甲状旁腺素分泌增多
- B、 甲状旁腺素分泌减少
- C、 肾小管酸中毒
- D、 痛风
- E、 高草酸尿症

答案： B

27、蜱传回归热包柔体感染出现 IgM 型抗体的时间

- A、 3 天
- B、 5 天
- C、 1 周
- D、 2 周
- E、 3 周

答案： C

28、就营养性巨幼红细胞性贫血来说,下列不正确的是

- A、 维生素 B₁₂ 缺乏,使四氢叶酸减少,RBC DNA 合成不足
- B、 维生素 B₁₂ 缺乏,使四氢叶酸减少,RBC RNA 合成不足
- C、 RBC 胞核发育落后,但血红蛋白发育正常
- D、 RBC 生成减慢但在血中和骨髓中破坏增加
- E、 粒细胞及巨核细胞系也有 RBC 类似变化

答案： B

29、蛋白质-能量营养不良的好发年龄为

- A、 3 岁以内
- B、 学龄前期
- C、 学龄期
- D、 青春期
- E、 好发于各年龄期儿童

答案： A

30、怀疑尿路结石, 应做

- A、 尿细菌培养+药敏
- B、 肾功能检查
- C、 CT 检查
- D、 KUB+IVP
- E、 放射性核素肾图

答案： D

31、急性白血病患者出血主要是

- A、 血小板减少
- B、 多种凝血因子缺乏
- C、 白血病细胞浸润血管壁
- D、 DIC
- E、 严重贫血使血管壁缺氧

答案： A

32、血清铁蛋白低于多少提示有缺铁

- A、 194~238 $\mu\text{g/L}$
- B、 100~200 $\mu\text{g/L}$
- C、 50~100 $\mu\text{g/L}$
- D、 18~91 $\mu\text{g/L}$
- E、 12 $\mu\text{g/L}$

答案： E

33、下列哪种先心病不能进行介入治疗

- A、 室间隔缺损
- B、 原发孔型房间隔缺损
- C、 动脉导管未闭
- D、 继发孔型房间隔缺损
- E、 肺动脉瓣狭窄

答案： B


34、下列化合物对嘌呤核苷酸的生物合成不产生直接反馈抑制作用的是

- A、 TMP
 - B、 IMP
 - C、 AMP
 - D、 GMP
 - E、 ADP
- 答案： A

35、糖尿病是由于什么原因所引起

- A、 血糖浓度过高
 - B、 糖代谢异常
 - C、 糖异生异常
 - D、 糖原合成异常
 - E、 糖原分解异常
- 答案： B

36、如图所示,下列关于姜片虫病的临床表现,错误的是



- A、 轻度感染时症状轻微, 仅有腹部不适或消化不良
 - B、 腹痛常位于下腹, 每天饭后发生
 - C、 腹泻为早期症状
 - D、 重度感染时, 有食欲减退、腹泻、腹痛等恶心呕吐等症状
 - E、 某些患者吐虫或自动排虫
- 答案： B

37、引起冠脉舒张的主要因素是

- A、 $\text{PaO}_2 \uparrow$
 - B、 $\text{pH} \uparrow$
 - C、 $\text{PaCO}_2 \downarrow$
 - D、 $\text{PaO}_2 \downarrow$
 - E、 $\text{pH} \downarrow$
- 答案： D

38、临床上自毁容貌征,是由于


- A、 腺嘌呤磷酸核糖转移酶缺陷
- B、 次黄嘌呤脱氢酶缺陷
- C、 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶缺陷
- D、 鸟嘌呤合成酶缺陷
- E、 PRPP 合成酶缺陷

答案: C

39、果酱样大便最常见于

- A、 小儿胃肠炎
- B、 小儿肠套叠
- C、 小儿嵌顿疝
- D、 小儿阑尾炎
- E、 小儿肠梗阻

答案: B



40、肩袖(如图)的构成包括

- A、 冈上肌, 冈下肌, 小圆肌
- B、 冈上肌, 冈下肌, 小圆肌, 肩胛下肌
- C、 冈上肌, 冈下肌, 肩胛下肌
- D、 冈上肌, 冈下肌, 小圆肌, 大圆肌
- E、 冈上肌, 冈下肌, 大圆肌

答案: B

41、下列关于腹泻的伴随症状和体征, 正确的有

- A、 伴里急后重提示病变多位于小肠
- B、 伴明显消瘦提示病变多位于结肠
- C、 伴脱水常见于吸收不良性腹泻
- D、 伴高热者常见于慢性腹泻
- E、 伴关节肿痛者可见于 Crohn 病

答案: E

42、下列哪种细胞不是通过变形运动离开血管的

- A、 中性粒细胞
- B、 红细胞
- C、 嗜酸性粒细胞
- D、 淋巴细胞
- E、 巨噬细胞

答案： B

43、迟发性外伤性颅内血肿发生率较高的时间是伤后

- A、 6 小时内
- B、 8 小时内
- C、 12 小时内
- D、 24 小时内
- E、 24 小时后

答案： A

44、弥漫大 B 细胞淋巴瘤的标准的化疗方案为

- A、 MOPP
- B、 R-CHOP
- C、 DA
- D、 ABVD
- E、 VDCP

答案： B

45、以下关于水痘的病后免疫的叙述,哪项是正确的

- A、 病后免疫不强,易反复感染
- B、 无病后免疫,病毒易于潜伏感染
- C、 病后免疫持久,但仍可发生带状疱疹
- D、 有多种血清型,因此病后免疫并无多大保护作用
- E、 病后免疫持久,病毒完全清除

答案： C

46、2 个月以内婴儿母乳喂养时不宜

- A、 尽早开奶
- B、 定时哺乳
- C、 餐间不加水
- D、 夜间可哺乳 1~2 次
- E、 母乳不足时可补充配方奶

答案： B

47、链霉素阻断蛋白质生物合成的机制是

- A、 与核糖体小亚基结合
- B、 与核糖体大亚基结合
- C、 阻碍氨基酸-tRNA 进入“受位”
- D、 抑制转肽酶活性
- E、 过早终止多肽链合成

答案： A

48、压迫性与非压迫性脊髓病变最主要的鉴别依据是

- A、 上下肢瘫痪的顺序
- B、 有无神经根痛
- C、 有无脊椎压痛、畸形和破坏
- D、 脑脊液蛋白是否增高
- E、 腰椎穿刺压颈试验是否通畅

答案： E

49、下列哪种疾病不引起肾病综合征

- A、 急慢性肾小球肾炎
- B、 糖尿病肾病
- C、 慢性肾盂肾炎
- D、 系统性红斑狼疮肾炎
- E、 过敏性紫癜肾炎

答案： C

50、急性呼吸性酸中毒时, 机体代偿的主要方式是

- A、 细胞外缓冲
- B、 肺代偿
- C、 细胞内缓冲
- D、 肾脏代偿
- E、 骨骼代偿

答案： C

51、胃部癌前病变主要是指

- A、 肠上皮化生
- B、 假幽门腺化生
- C、 胃腺体萎缩
- D、 胃腺体增生
- E、 胃黏膜不典型增生

答案： E

52、下列哪项不符合慢性肺心病肺、心功能代偿期的临床表现

- A、 慢性咳嗽、咳痰、气促
- B、 活动后心悸、呼吸困难
- C、 肺呼吸音减弱,可闻及干、湿性啰音
- D、 肺动脉瓣区第二心音减弱
- E、 三尖瓣区可听到III级收缩期杂音

答案: D

53、急性肾衰多尿期的致死因素主要是哪项

- A、 低血钾和感染
- B、 低蛋白
- C、 脱水
- D、 酸中毒
- E、 低钠

答案: A

54、无排卵性功能失调性子宫出血的病理改变常见

- A、 子宫内膜增生症
- B、 分泌期改变
- C、 增生期与分泌期子宫内膜共存
- D、 蜕膜样改变
- E、 子宫内膜炎性改变

答案: A

55、骨软骨瘤的临床表现

- A、 肿瘤生长迅速
- B、 局部红肿,疼痛
- C、 多数无症状,无意中发现骨性肿块
- D、 X片显示骨破坏,膨胀改变
- E、 常见部位是手或足的管状骨

答案: C

56、NK 细胞杀伤肿瘤细胞时

- A、 不需预先致敏
- B、 抗瘤谱较窄
- C、 通过表面的 IgE Fc 段发挥作用
- D、 有 MHC 限制性
- E、 在肿瘤晚期时杀瘤作用较强

答案: A

57、下列哪种不是治疗子宫内膜异位症的药物

- A、 甲羟孕酮
- B、 孕三烯酮
- C、 雌二醇
- D、 达那唑
- E、 GnRH-a

答案： C

58、急性胰腺炎时,淀粉酶肌酐清除率比值升高的原因为

- A、 血中有大量淀粉酶
- B、 血中有大量肌酐
- C、 肾小球对肌酐清除率减低、对淀粉酶清除率增加
- D、 肾小球对肌酐清除率增加、对淀粉酶清除率减低
- E、 肾小球对肌酐清除率不变、对淀粉酶清除率增加

答案： E

59、患者手术区消毒时,正确的方式为

- A、 如为感染伤口处手术,应自手术区外周向感染伤口处涂擦药液
- B、 手术区皮肤消毒范围要包括手术切口周围 10cm 的区域
- C、 已经接触污染部位的药液纱布,可以再返擦清洁处
- D、 如手术时有延长切口的可能,也不必扩大消毒范围
- E、 行左肘部手术时,左手可不必消毒

答案： A

60、不属于臂丛锁骨下分支的是

- A、 胸内侧神经
- B、 胸背神经
- C、 肌皮神经
- D、 胸长神经
- E、 胸外侧神经

答案： D

61、区别 B1 和 B2 细胞的重要表面标志

- A、 CD3
- B、 CD5
- C、 CD40
- D、 CD79
- E、 CD86

答案： B

62、临床习惯上对营养不良做如下描述,但应除外

- A、 皮肤黏膜干燥,弹性减低
- B、 皮下脂肪菲薄
- C、 肌肉松弛无力
- D、 指甲粗糙无光泽
- E、 甲床下有紫红色出血

答案: E

63、某种 RNA 在生物体内总量最多,约占 RNA 的 80%以上。其与核糖体蛋白结合形成核糖体,为蛋白质的生物合成提供空间环境,其类似于一个移动的多肽链“装配厂”。该种 RNA 是

- A、 mRNA
- B、 rRNA
- C、 tRNA
- D、 ncRNA
- E、 sncRNA

答案: B

64、人工流产时,部分病人出现心动过缓,血压下降,面色苍白。应首先考虑

- A、 羊水栓塞
- B、 吸宫不全
- C、 子宫穿孔
- D、 出血性休克
- E、 人工流产综合反应

答案: E

65、革兰阴性细菌的致热物质主要是

- A、 外毒素
- B、 螺旋毒素
- C、 溶血素
- D、 全菌体、肽聚糖和内毒素
- E、 细胞毒因子

答案: D

66、骨关节结核患者,体质虚弱,寒性脓肿混合感染,脓液黏稠。对脓肿最好的处理方法是

- A、 单纯非手术治疗
- B、 穿刺抽脓,注入抗结核药物
- C、 小切口引流
- D、 彻底的病灶清除术
- E、 脊椎融合手术

答案： C

67、X线表现游走性浸润的肺炎是

- A、 呼吸道合胞病毒肺炎
- B、 腺病毒肺炎
- C、 金黄色葡萄球菌肺炎
- D、 革兰阴性杆菌肺炎
- E、 肺炎支原体肺炎

答案： E

68、短暂性脑缺血发作(TIA)后神经功能完全恢复的时间最长不超过

- A、 1h
- B、 6h
- C、 12h
- D、 24h
- E、 36h

答案： D

69、跟腱反射中枢

- A、 L₂~₄
- B、 S₁~₂
- C、 L₁~₂
- D、 S₄~₅
- E、 S₃~₄

答案： B

70、精索静脉曲张可能的并发症不包括下列哪项

- A、 睾丸萎缩
- B、 腹股沟疝
- C、 鞘膜积液
- D、 隐睾
- E、 下肢静脉曲张

答案： D

71、关于蛋白质二级结构的描述, 错误的是

- A、 蛋白质局部或某一段肽链有规则的重复构象
- B、 蛋白质部分主链的空间构象
- C、 主链构象由每个肽键的两个二面角所确定
- D、 整条多肽链中全部氨基酸的位置

E、无规卷曲也属二级结构范畴

答案： D

72、下列关于精神活动的说法,哪项是错误的

A、精神活动以大脑为基础

B、精神活动是以客观现实为基础的

C、精神活动包括认知、情感、意志等过程

D、病态精神活动与客观现实脱离因此与客观现实无关

E、精神活动受到躯体营养代谢状况的影响

答案： D

73、麻疹的隔离期通常是

A、出疹后 10 天,伴有呼吸道并发症者延至出疹后 14 天

B、出疹后 7 天,伴有呼吸道并发症者延至出疹后 14 天

C、出疹后 5 天,伴有呼吸道并发症者延至出疹后 10 天

D、出疹后 2 天,伴有呼吸道并发症者延至出疹后 5 天

E、出疹后 2 天,伴有呼吸道并发症者延至出疹后 7 天

答案： C

74、根据《中华人民共和国传染病防治法》规定,医疗机构应当实行传染病预检、分诊制度,对以下人员应当引导至相对隔离的分诊点进行初诊的是

A、传染病病人和传染病病原携带者

B、传染病病人和疑似传染病病人

C、传染病病人和传染病病人密切接触者

D、传染病病人、疑似传染病病人和病原携带者

E、传染病病人、疑似传染病病人和密切接触者

答案： B

75、结核结节中的 Langhans 巨细胞来源于

A、支气管上皮细胞

B、上皮样细胞

C、肺泡上皮细胞

D、间叶细胞

E、纤维母细胞

答案： B

76、有关急性糜烂性胃炎的临床表现不正确的是

A、往往以上消化道出血为主要表现

B、出血量大,常难以自止

- C、起病前可无明显不适
- D、消化不良的症状常为原发病掩盖
- E、大多数患者可找到病因

答案： B

77、某药按零级动力学消除,其消除半衰期等于

- A、 $0.693/k_e$
- B、 $k_e/0.5C_0$
- C、 $0.5C_0/k_e$
- D、 $k_e/0.5$
- E、 $0.5/k_e$

答案： C

78、氯苯那敏抗过敏的作用原理是

- A、稳定肥大细胞
- B、松弛平滑肌
- C、促 IgE 合成转变为 IgG 合成
- D、灭活组胺
- E、拮抗组胺

答案： E

79、病理诊断慢性支气管炎的主要病变指标是

- A、支气管黏膜上皮细胞变性、坏死脱落
- B、支气管壁黏液腺体增生、肥大
- C、支气管壁充血、水肿、炎细胞浸润
- D、支气管黏膜鳞状上皮化生
- E、支气管壁平滑肌、软骨破坏

答案： B

80、中量咯血指

- A、一次咯血 50~100ml
- B、一次咯血 100~400ml
- C、咯血量 100~500ml/天
- D、咯血量 50~100ml/天
- E、咯血量 500~1000ml/天

答案： C

81、下列有关糖尿病患者的术前准备中,正确的是

- A、平时应用胰岛素者,术晨不能停用

- B、 仅以饮食控制者术前需要应用降糖药
- C、 酮症酸中毒患者行急症手术时无需特殊处理
- D、 口服长效降糖药者需术前一天停药
- E、 禁食患者需维持血糖轻度升高状态

答案： E

82、 下列均适用《人体器官移植条例》，除了

- A、 骨髓
- B、 肝脏
- C、 肾脏
- D、 心脏
- E、 胰腺

答案： A

83、 小儿体格测量指标中, 最能反映营养状况的是

- A、 身长
- B、 胸围
- C、 体重
- D、 头围
- E、 上臂围

答案： C

84、 神经胶质瘤占全部颅内肿瘤的

- A、 20%~30%
- B、 30%~40%
- C、 40%~50%
- D、 50%~55%
- E、 >55%

答案： C

85、 下列哪一项不是羊水进入母体血循环后引起的机体病理生理变化

- A、 肺动脉高压
- B、 过敏性休克
- C、 全身小血管痉挛
- D、 DIC
- E、 急性肾衰竭

答案： C

86、 肺癌的早期诊断中最有价值的检查是

- A、 早期症状的发现
- B、 纤维支气管镜活检
- C、 X 线检查
- D、 CT 检查
- E、 血液检查

答案： B

87、Courvoisier 征阳性见于下列何种疾病

- A、 急性胰腺炎
- B、 急性机械性肠梗阻
- C、 胰头癌压迫胆总管
- D、 幽门梗阻
- E、 急性胆囊炎

答案： C

88、女孩进入青春期较男孩

- A、 早 2 年
- B、 早 1 年
- C、 相同年龄
- D、 晚 1 年
- E、 晚 2 年

答案： A

89、乳房出现的哪项变化与妊娠无关

- A、 乳晕皮脂腺肥大形成蒙氏结节
- B、 乳头增大并变黑
- C、 乳头凹陷
- D、 可以挤出稀薄黄色液体
- E、 乳晕变黑

答案： C

90、苯丙酮尿症最主要的治疗方法是

- A、 大量维生素
- B、 限制苯丙氨酸摄入
- C、 限制蛋白质摄入
- D、 补充 5-羟色氨酸
- E、 对症治疗

答案： B

91、关于心理健康促进和精神障碍预防, 下列说法正确的是

- A、 用人企业没有任何义务
 - B、 只有特定学校应当对学生进行精神卫生知识教育
 - C、 村民委员会没有相关义务
 - D、 医务人员开展疾病诊疗服务, 应当按照诊断标准和治疗规范的要求, 对就诊者进行心理健康指导
 - E、 医务人员发现就诊者可能患有精神障碍的, 应当强制其到符合法律规定的医疗机构就诊
- 答案: D

92、肺结核的增殖性病变表现为

- A、 充血
 - B、 结核结节
 - C、 干酪样坏死
 - D、 水肿
 - E、 钙化
- 答案: B

93、原发性肾病综合征Ⅱ型经激素治疗后完全缓解, 半年又复发, 应首选下列哪一治疗方案

- A、 吲哚美辛+雷公藤+双嘧达莫
 - B、 双嘧达莫+吲哚美辛+环磷酰胺
 - C、 泼尼松+吲哚美辛+肝素
 - D、 吲哚美辛+双嘧达莫+泼尼松
 - E、 泼尼松+环磷酰胺+双嘧达莫
- 答案: E

94、输卵管妊娠和阑尾炎的主要鉴别点是

- A、 右下腹痛
 - B、 下腹反跳痛
 - C、 停经
 - D、 白细胞增多
 - E、 尿妊娠试验
- 答案: E

95、布氏杆菌病急性期的特点, 错误的是

- A、 高热时伴有明显中毒症状
- B、 关节痛主要在大关节, 呈游走性
- C、 典型热型为波浪型
- D、 主要为大神经的神经根、神经干病变
- E、 半数患者有肝、脾肿大和肝区病变

答案： A

96、三叉丘系为

- A、 同侧三叉神经半月节发出的纤维组成
- B、 对侧三叉神经半月节发出的纤维组成
- C、 同侧三叉神经感觉核发出的纤维组成
- D、 对侧三叉神经感觉核发出的纤维组成
- E、 对侧三叉神经感觉纤维的直接延续

答案： D

97、原核 DNA 复制中, ①DNA 聚合酶Ⅲ②解旋酶③DNA 聚合酶 I ④引物酶⑤DNA 连接酶⑥SSB 的作用顺序是

- A、 ④③①②⑤⑥
- B、 ②③⑥④①⑤
- C、 ④②①⑤⑥③
- D、 ④②⑥①③⑤
- E、 ②⑥④①③⑤

答案： E

98、献血法规定, 临床用血的包装、储存、运输, 不符合国家规定的卫生标准 and 要求的, 责令改正, 给予警告, 可以并处罚款的数额是

- A、 1 万以下
- B、 1 万以上 2 万以下
- C、 1 以上 3 万以下
- D、 5 万以下
- E、 10 万以下

答案： A

99、气胸的典型 X 线表现不正确的是

- A、 患侧胸腔透亮度增加
- B、 肺压缩征
- C、 可见气胸带
- D、 血气胸时可见液气平面
- E、 少量气胸不易发现时嘱患者深吸气, 从而易于显示气胸带

答案： E

100、关于肾脏损伤而无血尿的原因, 下列错误的是

- A、 合并输尿管断裂

- B、 肾盂断裂
- C、 贯通肾盏、肾盂的肾实质损伤
- D、 肾蒂血管断裂
- E、 输尿管被血块阻塞

答案： C

101、下列疾病中不会发生中心型发绀的是

- A、 Eisenmenger 综合征
- B、 慢性阻塞性肺病
- C、 原发性肺动脉高压
- D、 右心衰竭
- E、 大量胸腔积液

答案： D

102、运动时使拇指掌面与小指掌面相对的肌是

- A、 拇短展肌
- B、 拇长屈肌
- C、 拇短屈肌
- D、 拇对掌肌
- E、 拇收肌

答案： D

103、核糖体“受位”的功能是

- A、 催化肽键生成
- B、 从 tRNA 水解新生肽链
- C、 转肽
- D、 接受新进位的氨基酰 tRNA
- E、 活化氨基酸

答案： D

104、关于面静脉走行的正确的描述是

- A、 起自内眦静脉
- B、 注入颈外静脉
- C、 在颈内、颈外动脉的深面走行
- D、 通过面深静脉与乙状窦相通
- E、 位于面动脉前方

答案： A

105、关于肺结核,下面论述错误的是

- A、 肺结核浸润性病灶中见到空洞,可诊为慢性纤维空洞性肺结核
- B、 浸润性病灶,既可进展为干酪性肺炎,也可局限形成纤维化和钙化灶
- C、 结核球属于浸润型肺结核
- D、 干酪性肺炎也属于浸润型肺结核
- E、 在各型肺结核中浸润型肺结核最多见

答案: A

106、一老年患者,逐渐缓慢发病,有时出门后找不回家,经常通过派出所领回。近2年鼻子闻不出味。最有可能的诊断是

- A、 脑动脉粥样硬化
- B、 阿尔兹海默病
- C、 血管性痴呆
- D、 脑肿瘤

答案: B

107、患者,男,22岁,打篮球时突然呼吸困难,明确诊断为右侧大量气胸。关于该患者的体格检查,描述错误的是

- A、 右侧胸廓膨满
- B、 气管移向左侧
- C、 右侧叩诊为鼓音
- D、 右侧呼吸音弱
- E、 右侧可闻及支气管呼吸音

答案: E

108、患者,男,54岁。意识不清3小时。查体:昏迷,呼吸缓慢,双侧瞳孔缩小,对光反射存在。该患者最可能的诊断是

- A、 颠茄类中毒
- B、 有机磷农药中毒
- C、 酒精中毒
- D、 氰化物中毒
- E、 一氧化碳中毒

答案: B

109、患者,女,27岁。右下腹肿物多年,囊性,如孕3个月大小,排大便后突然左下腹持续性疼痛,其后肿物增大,拒按。应首先考虑

- A、 卵巢囊肿破裂
- B、 卵巢囊肿蒂扭转
- C、 卵巢囊肿伴感染
- D、 卵巢囊肿伴出血
- E、 卵巢囊肿伴恶变

答案： B

110、患者, 男性, 29 岁, 经常对一些常见的事情和现象反复的思考, 刨根究底, 自知毫无意义, 但不能自控。该症状为

- A、 强迫思维
- B、 强迫性怀疑
- C、 强迫性意向
- D、 强迫性回忆
- E、 强迫性联想

答案： A

111、风心病二尖瓣狭窄合并房颤的患者, 血压 120/70mmHg, 心率 120 次/min, 不适合应用哪种药物治疗

- A、 洋地黄类药物
- B、 β 受体拮抗剂
- C、 华法林
- D、 地尔硫草
- E、 伊伐布雷定

答案： E

112、患者, 女, 55 岁, 家庭妇女, 有吸烟嗜好。咳嗽、憋气 1 个月, 胸片示双肺门增大、左上肺纹理增重, 纤维支气管镜活组织检查示左上叶开口被菜花样肿物阻塞, 病理报告为小细胞癌。入院 3 天后呼吸困难加重, 发热 38℃左右, 不能平卧。首选处理方法

- A、 抗感染治疗后手术切除左上肺叶
- B、 抗感染治疗+放射治疗
- C、 抗感染治疗
- D、 化学药物治疗+抗感染治疗
- E、 免疫疗法+抗感染治疗

答案： D

113、患者, 女, 39 岁。闭经 1 年, 近半年来双眼视力下降, 视物模糊, 无其他神经系统阳性体征, 颅骨平片示蝶鞍呈球形扩大。最可能的诊断为

- A、 鞍区胶质瘤
- B、 颅咽管瘤
- C、 垂体腺瘤
- D、 鞍结节脑膜瘤
- E、 垂体脓肿

答案： C

114、1 型糖尿病患者局部反复注射胰岛素后导致注射部位出现红肿、出血和坏死,明确非感染所致,最可能的原因是局部发生了

- A、 I 型超敏反应速发相反应
- B、 I 型超敏反应迟发相反应
- C、 II 型超敏反应
- D、 III型超敏反应
- E、 IV型超敏反应

答案: D

115、初产妇,25 岁,妊娠 40 周,规律宫缩 16 小时。检查:左枕前位,估计胎儿体重 3000g,胎心 140 次/min,宫口开大 7cm,胎膜已破,宫缩逐渐减弱。恰当的处理

- A、 静注地西洋
- B、 肌注缩宫素
- C、 静注缩宫素
- D、 静注麦角新碱
- E、 立即剖宫产


答案: C

116、患者,男,22 岁。上腹疼痛 20 天,加剧 2 个小时,急诊入院。既往胃病史。查体:全腹压痛、反跳痛,呈板状腹,肝浊音界缩小,肠鸣音消失。腹腔穿刺抽出黄色混浊液体 10ml, WBC 18×10^9 /L, N85%, 诊断为腹膜炎。患者最可能发生的疾病是

- A、 胃及十二指肠溃疡穿孔
- B、 肝脓肿穿破
- C、 阑尾炎
- D、 肠穿孔
- E、 腹腔淋巴结结核穿破

答案: A

117、患者,女,68 岁,咳嗽伴胸痛胸闷 1 个月,CT 检查如图,最可能的诊断为



- A、左上肺不张
- B、左上肺周围型肺癌伴胸膜转移
- C、左上肺血管瘤
- D、左上肺软骨肉瘤伴胸膜转移
- E、左上肺结核

答案： B

118、患儿,女,14岁,车祸入院手术,用吗啡止痛。使用吗啡时不会出现下列哪项作用

- A、镇痛、镇静
- B、瞳孔缩小
- C、镇咳
- D、呼吸抑制
- E、止泻

答案： E

119、患者,女,24岁,左侧腰酸胀1年余。B超示左肾积水明显,左肾区有一1cm×1.5cm大小的强回声,KUB+IVP左肾结石,左肾积水,左肾输尿管交界线显影较细小。诊断最应考虑

- A、肾盂输尿管连接部狭窄
- B、结石梗阻
- C、迷走血管压迫
- D、炎性狭窄
- E、肾盂输尿管连接部狭窄+继发结石

答案： E

120、患者,女,38岁。双侧乳房月经前胀痛,月经后减轻。检查乳房发现双侧乳房多个结节状肿块,边界不清,无明显血流信号。最可能的诊断是

- A、乳腺纤维腺瘤
- B、乳腺癌
- C、乳腺囊性增生病
- D、急性乳腺炎
- E、乳腺肉瘤

答案： C

121、患者,男,28岁。半年来时有腹泻与便秘,3个月来腹部有隐痛,近2天大量便鲜血,直肠指检和腹部诊断没有发现肿物,X线钡餐灌肠示降结肠壁僵直,可见充盈缺损。最可能的诊断是

- A、乙状结肠癌

- B、 克罗恩病
- C、 降结肠癌
- D、 溃疡性结肠炎
- E、 肠结核


答案： C

122、 进行性梗阻性黄疸患者伴上腹胀痛, 经 B 超检查胆总管直径 1.8cm, 胆囊高度肿大, 壁薄, 肝内胆管轻度扩张。除 CT 检查外, 哪项检查意义最大

- A、 十二指肠低张造影
- B、 ERCP
- C、 PTC
- D、 选择性血管造影(腹腔动脉造影)
- E、 核素扫描

答案： B

123、 患者, 男, 68 岁, 呼吸困难、 发绀、 咯血 1 周, 有 40 余年采矿史。结合 CT,



最可能的诊断是

- A、 肺结核
- B、 硅沉着病
- C、 肺癌
- D、 肺脓肿
- E、 支气管扩张


答案： B

124、 患者, 男, 45 岁, 水肿 1 年, BP22.0/11.0kPa, A/G 1.7, 尿蛋白分析非选择性, 尿蛋白+++/HP, 尿红细胞++/HP。最可能的诊断是

- A、 急进性肾炎
- B、 慢性肾炎
- C、 急性肾炎
- D、 慢性肾盂肾炎
- E、 肾病综合征

答案： B

125、患者,男,64岁,突感胸部剧痛2小时,呈撕裂样,并向背部放射,有高血压病史10年,含服硝酸甘油3片不能缓解,CT检查如图所示。首先应考虑的诊断



是

- A、 主动脉夹层
- B、 急性胆囊炎
- C、 急性胰腺炎
- D、 急性胸膜炎
- E、 急性心肌梗死

答案: A

126、患儿,女,5个月。面部表情呆滞,不能扶坐,喂养困难,毛发稀黄,皮肤白晰,尿有特殊臭味,就诊时首选处理是

- A、 摄腕骨片
- B、 染色体检查
- C、 血 T_3 , T_4 检查及TSH测定
- D、 血苯丙氨酸测定
- E、 智力测定

答案: D

127、患者,男,42岁,下腹挤压伤伴鲜血便2小时入院。直肠指诊可发现新鲜出血。尿液中可见粪便残渣。可以明确的诊断是

- A、 结肠损伤
- B、 直肠损伤
- C、 后腹膜血肿
- D、 小肠损伤
- E、 十二指肠损伤

答案： B

128、患者,女,30岁。乏力、面色苍白1月。晨起尿色深。查体:贫血貌,巩膜轻度黄染,肝脾不大。血常规:Hb87g/L,网织红细胞0.12,WBC、PLT正常。该患者黄疸的主要特点是

- A、血中结合胆红素含量增高
- B、血中胆素原剧减
- C、尿中胆红素增加
- D、未结合胆红素浓度增高
- E、粪便颜色变浅

答案： D

129、患者,女,48岁。左肩痛4个月,逐渐加重,不能梳头,左肩外展、后伸受限,三角肌萎缩,无手臂麻木感。最可能的原因是

- A、颈椎病
- B、肩部肿瘤
- C、肩周炎
- D、关节结核
- E、风湿性关节炎

答案： C

130、患儿,男,14岁,突感咽痛,下肢水肿,并出现腹水征阳性,尿蛋白>5g/L,红细胞0~3个/HP,白细胞0~2个/HP,尿FDP(-)。患儿水肿的主要机制是

- A、蛋白丢失,血浆蛋白降低而致胶体渗透压下降
- B、继发性醛固酮增多,ADH增多
- C、心功能不全
- D、毛细血管通透性增加
- E、肾小球滤过率下降

答案： A

131、患者,男,30岁。1天前由马车摔下,伤后双下肢可正常活动,但腰痛不能排尿。第1腰椎棘突叩痛。排尿困难最可能因为损伤了

- A、腰段脊髓
- B、骶段脊髓
- C、腹膜后血肿刺激自主神经
- D、骶段脊髓及马尾神经
- E、马尾神经

答案： B

132、患者,男,20岁,外伤后自觉腰背痛,X线诊断为第十二胸椎压缩性骨折。
第十二胸椎的形态结构特征是

- A、椎体横断面呈椭圆形
- B、肋凹不典型
- C、棘突短而分叉
- D、上关节突关节面朝向前
- E、横突有横突孔

答案: B

133、患者,女,25岁。停经2月,突然剧烈下腹痛,阴道少量流血,昏厥一次。查体:血压75/45mmHg,脉搏120次/min,下腹压痛,移动性浊音(+)。双合诊:宫颈举痛明显,子宫稍大,右侧附件触及3cm×4cm囊性包块,有压痛,尿HCG(+),后穹窿穿刺抽出2ml暗红色不凝血液,最恰当的处理是

- A、输血补液
- B、升压药物
- C、输血补液同时剖腹探查
- D、腹腔镜
- E、等血压上升后再行手术

答案: C

134、患者,男,55岁,主诉左侧腹部包块,消化不良,腹部CT显示肿物压迫肠系膜下静脉,推测最可能引起扩张的静脉是

- A、中结肠静脉
- B、右结肠静脉
- C、胰十二指肠下静脉
- D、回结肠静脉
- E、左结肠静脉

答案: E

135、家长带5个月的婴儿进行营养咨询,要开始添加辅助食品,你认为在该月龄应该添加哪一项最为合适

- A、菜汤、鱼肝油
- B、配方米糊
- C、粥、饼干
- D、软饭、肉糜
- E、蛋炒饭、苹果

答案: B

136、患者,男,40岁,中上腹饥饿性隐痛反复发作10年,伴反酸,嗝气,进食和服用抑酸剂可缓解。该患者最可能的疾病是消化性溃疡,好发部位是胃的

- A、贲门部
- B、贲门切迹
- C、幽门部
- D、胃底
- E、胃体

答案: C

137、患儿,男,2岁。自1岁开始反复感染,已确诊为X连锁无丙种球蛋白血症。近1周来发热。咳嗽、咳痰,双肺听诊有中小水泡音。诊断支气管肺炎。此患儿肺炎的病原最可能的是

- A、病毒性肺炎
- B、细菌性肺炎
- C、卡氏肺囊虫肺炎
- D、真菌性肺炎
- E、支原体肺炎

答案: B

138、初产妇,28岁,孕30周。产前检查发现子宫大于孕周,羊水量较多。近几周孕妇体重增加过快,但无水肿。腹壁可触及较多肢体。应首选哪一项辅助检查

- A、多普勒胎心仪
- B、腹部X线摄片
- C、B型超声波检查
- D、血甲胎蛋白
- E、血常规检查

答案: C

139、患者,女,右下腹阵发性绞痛伴恶心呕吐5天。6个月前上环时发现右侧卵巢囊性肿物 $4\times 5\times 5\text{cm}^3$ 。查体: $T38^{\circ}\text{C}$,右下腹压痛(+),子宫正常大,其右侧触及 $8\times 6\times 6\text{cm}^3$ 囊性肿物,张力较大,压痛,活动受限,左侧附件正常。 $\text{WBC}12000/\text{mm}^3$, $\text{N}90\%$ 。最可能的诊断是

- A、卵巢囊肿扭转
- B、卵巢囊肿扭转合并感染
- C、卵巢囊肿破裂合并感染
- D、卵巢囊肿自发破裂
- E、子宫浆膜下肌瘤扭转

答案: B

140、一位患有足癣的患者需要局部应用抗真菌药,下列哪种药物不宜应用

- A、制霉菌素
- B、氟康唑
- C、克霉唑
- D、咪康唑
- E、益康唑

答案: B

141、患儿,女,6个月。母乳喂养,未加辅食,近1个月食欲差,欠活泼,面色苍白,能反映此患儿贫血原因的最早实验室检查指标是

- A、血清铁
- B、血清铁蛋白
- C、红细胞游离原卟啉
- D、红细胞计数
- E、血红蛋白量

答案: B

142、患者四肢麻木入院。查体发现四肢末梢存在手套、袜套样痛觉减退。考虑患者损伤位于以下哪一部位

- A、脊髓后根
- B、脊髓后角
- C、丘脑
- D、四肢末梢神经
- E、大脑皮层

答案: D

143、患者,女,29岁,已婚。近3周来无明显诱因出现情绪低落,晨重暮轻,兴趣缺乏,精力减弱,言语减少,动作迟缓,自觉脑子笨,觉得前途暗淡,悲观失望,早醒,食欲减退,便秘,性欲减退,自责,自罪,多次自杀未遂。该患者最可能的诊断为

- A、神经衰弱
- B、反应性精神障碍
- C、抑郁性神经症
- D、抑郁症
- E、隐匿性抑郁发作

答案: D

144、孕妇,27岁,G₁P₀,妊娠8周。终止妊娠最常用的方法是

- A、药物流产
- B、负压吸宫术
- C、天花粉肌注
- D、静脉滴注催产素
- E、利凡诺羊膜腔内注射

答案： B

145、患者,男,24岁,既往有肺结核病史,发现前胸壁肿物3周,逐渐增大,局部有波动感,无压痛,无发热、盗汗等表现,外观如图



,最可能的诊断为

- A、带状疱疹
- B、痈
- C、疔
- D、热脓肿
- E、冷脓肿

答案： E

146、患者,男,16岁,体查无名指掌指关节不能屈和内收。最有可能瘫痪的肌是

- A、指深屈肌
- B、指伸肌
- C、蚓状肌
- D、骨间侧背肌
- E、骨间掌侧肌

答案： E

147、患儿,女,9岁。水肿5天,明显尿少,深黄如茶,2天来伴头痛,头晕,有时眼花,视物模糊,血压24.9/15.9kPa(180/120mmHg),血尿素氮

7.2mmol/L(20mg/dl),尿常规:蛋白(++),红细胞10~20个/HP,颗粒管型0~2个/HP。首选药物是

- A、肼苯达嗪口服
- B、利舍平肌内注射
- C、硝普钠静脉滴注
- D、硫酸镁静脉滴注
- E、甘露醇静脉推注

答案： C

148、患儿,8个月,2周来显著多汗,睡眠不安,夜惊,纳差,精神欠活泼,方颅,前囟3cm×3cm,未出牙,肋膈沟,串珠肋。四肢肌活力稍差,为诊断首先应做的检查是

- A、头颅CT+脑脊液检查
- B、血钙、磷测定+颅骨X片
- C、血钙、磷,碱性磷酸酶+长骨X片
- D、血钙、磷测定+降钙素测定
- E、甲状旁腺激素+血镁测定

答案: C

149、魏某是一名15岁的在校学生,今年年初在本市医院进行全面体检时,被查出艾滋病病毒(HIV)抗体阳性,后经确证感染了艾滋病病毒。即使魏某本人同意,不经过下列有关人员的同意,该医院不可以公开魏某及魏某家属的姓名、住址、工作单位、肖像、病史资料以及其他可能推断出魏某具体身份的信息,该有关人员是

- A、魏某父母
- B、魏某监护人
- C、魏某亲属
- D、该市人民政府
- E、该市疾病预防控制机构

答案: B

150、患者,女,25岁。因“畏寒、发热、全身痛4天,皮疹2天,阴道出血1天”入院。2周前到柬埔寨旅游。查体:T38.5℃,BP121/82mmHg,全身散在红斑疹,肝脾肋下未扪及。实验室检查:WBC $3.7 \times 10^9/L$,PLT $96 \times 10^9/L$,Hb135g/L,ALT121U/L。最可能的诊断是

- A、登革热(普通型)
- B、登革热(重型)
- C、登革热(轻型)
- D、登革休克综合征
- E、登革病毒携带者

答案: A

151、患者,女,44岁。病理诊断为宫颈鳞状细胞癌,左侧穹隆有浸润。手术最好应选

- A、宫颈锥形切除术
- B、全子宫切除术
- C、全子宫切除术+盆腔淋巴结清除术
- D、子宫根治术

E、 子宫根治术加盆腔淋巴结清除术

答案： E

152、患者,女,30岁,工人。十二指肠球部溃疡已3年,1周来嗝气、腹胀、腹鸣,近3天频繁呕吐,有隔夜食。查体:脱水征明显,可见胃型蠕动浪。实验室检查: $[\text{Na}^+]$ 140mmol/L, $[\text{K}^+]$ 3.0mmol/L, $[\text{Cl}^-]$ 90mmol/L, pH7.5, $[\text{HCO}_3^-]$ 30mmol/L, 补液方案首选

A、 0.9%NaCl

B、 0.9%NaCl, 尿量>40ml/h 加 10%KCl

C、 0.9%NaCl 加等渗(0.1mmol/L)HCl

D、 0.9%NaCl 加等渗(0.8%) NH_4Cl

E、 0.9%NaCl 加盐酸精氨酸

答案： B

153、患者,男,56岁。排便形状改变,便不尽感,CT检查如图所示。下列说法正确的是



A、 肠壁上有蒂状新生物

B、 其表面光滑, 边界清楚

C、 肠腔未见狭窄

D、 此为直肠息肉

E、 此为直肠癌

答案： E

154、患者,女,50岁,因黄疸伴皮肤瘙痒7个月、肝脾肿大诊断为原发性胆汁性肝硬化,目前口服药物治疗,下列哪种药物对该病有肯定的疗效

- A、 硫唑嘌呤
- B、 熊去氧胆酸(UDCA)
- C、 免疫球蛋白
- D、 环孢素
- E、 布地奈德

答案: B

155、患者,男,42岁。因急性肾炎入院。入院后第3天出现少尿,继之尿闭、头痛、头昏、恶心、呕吐、抽搐,直至昏迷。此时应想到患者可能并发了

- A、 心力衰竭
- B、 急性肾功能不全
- C、 急性胃肠炎
- D、 高血压脑病
- E、 以上都不是

答案: D

156、患者,男,60岁。突发右侧胸痛、呼吸困难3小时。右侧股骨头坏死2个月,未行手术治疗。查体:巩膜黄染,右肺呼吸音低,心脏无异常,双下肢轻度凹陷性水肿。患者最可能出现的并发症是

- A、 自发性气胸
- B、 肺梗死
- C、 脑梗死
- D、 感染性心内膜炎
- E、 急性心肌梗死

答案: B

157、在胃癌HE染色切片中,癌细胞弥漫浸润于黏膜下层及肌层,有大量淡蓝色无结构的物质,其中漂浮小堆癌细胞,部分癌细胞核偏于一侧,胞浆内亦有上述物质。该切片应诊断为

- A、 印戒细胞癌
- B、 腺鳞癌
- C、 乳头状腺癌
- D、 管状腺癌
- E、 未分化癌

答案: A

158、患者,男,35岁,因高热,寒战,咳嗽黄痰带血丝,右胸痛伴气短1天来急诊。查体:T 39.6℃,BP17.3/10.6kPa(130/80mmHg),右肺下野叩浊,可听到支气管呼吸音。白细胞 $18.5 \times 10^9/L$,分叶0.85。下一步应采取的措施是

- A、庆大霉素16万U静脉滴注
- B、立即50%浓度氧吸入
- C、可待因30mg皮下注射
- D、酒精擦浴物理降温
- E、青霉素G 480万U静脉滴注

答案: E

159、患者,男,65岁。心电图表现为: $R_{V1}+S_{V5}=1.15mV$, V_1 呈Rs型,且 $R/S>1$,平均电轴 $+110^\circ$,应考虑为

- A、左房肥大
- B、右房肥大
- C、左室肥大
- D、右室肥大
- E、双房肥大

答案: D

160、患儿,男,8个月。牛奶喂养,腹泻2天,黄色稀便,每日4~5次,今开始尿少,微热来诊,体检心肺听诊无异常,咽赤,口腔黏膜略干。下列治疗方法错误的是

- A、有脱水可补液
- B、可口服思密达及助消化药
- C、用抗病毒药物治疗
- D、选用肠道能吸收的抗生素
- E、及早应用抑制肠蠕动药物

答案: E

161、患者,男,15岁。最近有下肢外伤史。查体见左足部不能跖屈。其损伤的肌肉为

- A、臀大肌
- B、胫前肌
- C、趾伸肌
- D、闭孔内肌
- E、腓肠肌

答案: E

162、患者,男,40岁,黄疸,经检查诊断为病毒性肝炎。下列血清学检查最具诊断价值的酶是

- A、 LDH1
- B、 LDH2
- C、 ALT
- D、 AST
- E、 LDH5

答案： C

163、患儿,2岁。因咳嗽、高热、呼吸困难伴呕吐腹泻3天就诊,体查:T 40℃,精神差,烦躁不安,呼吸52次/分,心率154次/分,口唇发绀,鼻扇和三凹征明显,肺部听诊无明显的湿啰音,X线检查呈线条状或单条状阴影增生,有的相互交叉成网状,伴有小点状致密影,肺气肿。该病可能为

- A、 间质性肺炎
- B、 毛细支气管炎
- C、 腺病毒肺炎
- D、 金黄色葡萄球菌肺炎
- E、 衣原体肺炎

答案： C

164、上消化道大出血合并肝性脑病时,下列最适用于清除肠内积血减少血氨形成的是

- A、 弱碱性液灌肠
- B、 口服50%硫酸镁50ml
- C、 弱酸性液灌肠
- D、 肥皂水清洁灌肠
- E、 中性溶液灌肠

答案： C

165、患儿,男,系33周早产儿,产后4小时出现气促,发绀,呈进行性加重,伴呼气性呻吟,吸气性凹陷。X线胸片示:两肺有细小颗粒阴影及支气管充气征。下列治疗最关键的是

- A、 持续呼吸道正压供氧(PAP)
- B、 采用机械呼吸(PEEP)
- C、 表面活性物质气管内给药
- D、 呼吸兴奋剂,静脉注射
- E、 纠正酸中毒和电解质紊乱

答案： C

166、患者,男,36岁,因腹胀2年来诊,临床疑为肠结核,哪项不符合

- A、 低热、盗汗、乏力

- B、右下腹疼痛
- C、黏液脓血便
- D、腹部包块
- E、胸片有肺结核

答案： C

167、慢性阻塞性肺疾病患者,频咳后出现一侧剧烈胸痛,张口呼吸,发绀,大汗淋漓,脉搏 100 次/min,呼吸 32 次/min,血压 12/8kPa(90/60mmHg)。下列哪项检查对目前诊断最重要

- A、胸部超声波检查
- B、胸部 X 线透视或照片
- C、心电图检查
- D、血气分析
- E、支气管镜检查

答案： B

168、患者,女,56 岁。全程肉眼血尿 1 周来诊,膀胱镜见膀胱后壁 1.1cm 直径大小乳头状肿瘤,有蒂。尿细胞学检查:移行上皮癌 I~II 级。其最佳治疗方案是

- A、膀胱内灌注噻替哌
- B、膀胱部分切除术
- C、经尿道膀胱肿瘤切除术
- D、膀胱全切除术
- E、膀胱切开肿瘤切除术

答案： C

169、患者,女,38 岁。3 年来,右下腹痛反复发作,诊为慢性阑尾炎,经抗感染治疗而缓解。近 5、6 天来再次发作,查右下腹压痛(+),反跳痛(±)。拟行手术治疗,其术前应做的检查是

- A、钡餐
- B、B 超
- C、肛门指诊
- D、腹腔穿刺
- E、钡剂灌肠

答案： E

170、患儿,男,7 岁。因期前收缩行心电图检查,诊断为房性期前收缩。下列哪项不符合其特征

- A、P' 波提前,可与前一心动的 T 波重叠
- B、P' -R>间期在正常范围

- C、期前收缩后代偿间歇不完全
- D、如伴有变形的 QRS 波则为心室内差异传导所致
- E、P' 波后不应出现无 QRS-T 现象

答案： E

171、患者,男,28 岁。近 3 年来水肿,夜尿多,经常头晕头痛。3 天前尿少,昏迷,急来院查得阳性体征,除外

- A、贫血
- B、全身水肿
- C、高血压
- D、肾区叩痛
- E、闻及心包摩擦音

答案： D

172、患者,女性,19 岁,5 岁时曾被流浪狗惊吓,此后只要一见到狗就紧张不安,呼吸急促,心慌,远远看见狗就绕道而行,而没有见到狗的时候则完全正常。该患者最可能的诊断是

- A、特定恐惧
- B、惊恐障碍
- C、广泛性焦虑障碍
- D、创伤后应激障碍
- E、适应障碍

答案： A

173、患儿,男,13 岁,颜面及双下肢水肿、尿少 10 天。病前 10 天曾有咽痛。化验:尿蛋白++,红细胞+++,Scr250 $\mu\text{mol/L}$,抗“O”阳性,血浆白蛋白 32g/L,Hb91g/L。最可能的诊断是

- A、慢性肾炎,急性发作
- B、肾病综合征
- C、急进性肾炎
- D、急性肾炎
- E、急性肾衰竭

答案： D

174、患者,男,52 岁,原有劳累性心绞痛,近 2 周来每于清晨 5 时发作,疼痛持续时间较长而入院。住院期间发作时心率 52 次/min,期前收缩 4~5 次/min,血压 12.5/8kPa(95/60mmHg),心电图示 II、III、aVF 导联 ST 段抬高。经处理后心电图恢复正常。以后加用硝苯地平后未再有发作,应用硝苯地平的机理是

- A、可减慢心率,降低心肌氧耗

- B、 增快心率, 增加心排量, 改善心肌血供
- C、 解除冠状动脉痉挛
- D、 提高血压, 改善心肌灌注
- E、 增快心率, 消除期前收缩

答案: C

175、患者, 男, 65 岁, 1 年来时有尿频、尿急、尿痛和排尿困难、尿流中断, 改变体位后又能继续排尿。首先考虑诊断为

- A、 膀胱肿瘤
- B、 前列腺炎
- C、 尿道狭窄
- D、 前列腺增生症合并膀胱结石
- E、 输尿管结石

答案: D

176、患者, 女, 48 岁, 左乳肿物 2 个月来诊。查体: 左乳外上象限 3.5cm 硬性不光滑肿物, 基底活动, 皮肤相应部位凹陷, 与肿物粘连, 左腋窝触到 2 个光滑活动硬性淋巴结, 胸片及肝 B 超无异常发现, 收入院。术先日针吸细胞学检查找到恶性细胞。治疗原则应选择

- A、 单纯乳房切除+放疗
- B、 保留胸肌的简化根治切除术
- C、 乳癌根治性切除术
- D、 乳癌根治性切除术+放疗
- E、 乳癌扩大根治性切除术

答案: D

177、患儿, 男, 1 岁。体重 6kg, 身长 70cm, 精神萎靡, 皮肤弹性差, 肌肉松弛。诊断是

- A、 匀称性矮小
- B、 营养不良
- C、 正常
- D、 脱水
- E、 贫血

答案: B

178、患者,男,44岁。突然中上腹痛,压痛、反跳痛,腹肌紧张,发热,白细胞计数升高,CT检查如图,最可能诊断是



- A、急性胰腺炎
- B、慢性胰腺炎
- C、胃小弯溃疡穿孔
- D、胰腺癌
- E、胃癌

答案: C

179、患者,女,26岁,工人。妊娠2个月,海南人,发病4天,畏寒、高热、大汗,经数小时后缓解,隔日发作一次,血片查到疟原虫,住院治疗。服氯喹3天后症状未能控制,今日又寒战、高热,伴有头痛、全身酸痛。对该患下一步治疗首先应考虑的方案是

- A、氯喹加伯氨喹
- B、奎宁加伯氨喹
- C、青蒿素加伯氨喹
- D、周效磺胺加伯氨喹
- E、氯喹加乙胺嘧啶

答案: C

180、患者,男,18岁,体检X片提示:枢椎齿突高于正常水平,查体见:颈项粗短,面颊耳廓不对称,该患者最有可能的诊断

- A、 狭颅症
- B、 先天性脑积水
- C、 颅底陷入症
- D、 颅裂
- E、 脊柱裂

答案： C

181、患者,男,46岁,患慢性肾衰竭多年,以下哪项不利于进行透析治疗

- A、 家属能够配合
- B、 较高的理智
- C、 较高的理解力
- D、 较多的防御态度
- E、 较多的身体反应

答案： D

182、患者,男,30岁。规律性上腹痛伴反酸、嗝气,服制酸剂可缓解。X线检查无阳性所见,BAO3mmol/h。对此患者的预防措施,下列哪项是错误的

- A、 服枸橼酸铋钾
- B、 避免有刺激的食物和药物
- C、 戒烟酒
- D、 服胃肠动力药物
- E、 缓解后口服抑酸剂半年,预防复发

答案： E

183、患者,57岁,慢性咳喘15年,近1周来加重,嗜睡,咯黄脓痰,呕吐咖啡色胃内容物,尿少。查体:轻度发绀,球结膜充血水肿,双肺可闻干湿啰音,剑突下可见心脏搏动,心率108次/min,有期前收缩,肝肋下3cm,双下肢水肿。最可能的诊断是

- A、 流行性出血热
- B、 胃、十二指肠溃疡合并消化道出血
- C、 慢性肾炎
- D、 肺心病合并肺性脑病
- E、 冠心病

答案： D

184、患者,男,45岁,2年前发生急性心肌梗死,近1个月活动后喘憋、口唇发绀、下肢水肿、双肺底可闻及湿啰音。该患者可能存在的病理生理学改变是

- A、 交感神经系统抑制
- B、 肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制

- C、心排出量增加
- D、心钠素分泌降低
- E、水钠潴留

答案： E

185、妊娠高血压疾病病人, 血压 204/110mmHg, 首选的降压药是

- A、利血平
- B、复方降压片
- C、甲基多巴
- D、复方卡托普利
- E、肼屈嗪

答案： E

186、患者, 男, 54 岁。进行性吞咽困难已半年。食管钡透见中段食管有 6cm 长狭窄。管壁僵硬, 黏膜破坏。最适宜的治疗方法是

- A、放射治疗
- B、化学治疗
- C、激光治疗
- D、手术治疗
- E、免疫治疗


答案： D

187、患者, 男, 18 岁。左小腿外伤后局部红肿热痛, 破溃伴脓性渗出液 2 个月。X 线片见左胫骨骨膜反应, 内有小片状游离骨片。其诊断是

- A、胫骨骨折
- B、急性骨髓炎
- C、尤因肉瘤
- D、慢性化脓性骨髓炎
- E、胫骨结核

答案： D

188、腹外斜肌腱膜形成的结构是



- A、 精索内筋膜
- B、 腹股沟镰
- C、 腹股沟管深环
- D、 提睾肌
- E、 腹股沟韧带

答案： E

189、患者,男,60岁,作业时引起火灾造成前躯干Ⅲ度烧伤面积达10%,伤后7天,出现寒战高热,体温达39.5℃,创面溶痂,有脓性分泌物,创面分泌物细菌培养为金黄色葡萄球菌。这个时候应采取的最佳治疗是

- A、 半暴露疗法,局部敏感抗生素湿敷
- B、 包扎疗法,局部应用敏感抗生素
- C、 切痂,去除坏死组织,全身应用抗感染治疗
- D、 包扎疗法,同时全身应用敏感抗生素
- E、 暴露疗法


答案： C

190、患者以眶后部疼痛与胀感、视物模糊1个月,视力明显降低2天入院,经颅脑CT检查发现眶区占位性病变。患者出现上述症状,可能是()受损引起

- A、 动眼神经
- B、 滑车神经
- C、 展神经
- D、 视神经
- E、 眼神经

答案： D

191、患者,男,65岁。胃溃疡行胃大部切除病史12年。近4个月腹胀,进食后加剧,伴恶心、呕吐,呕吐后腹胀有所缓解,并有食欲减退、消瘦明显,粪隐血持续阳性。胃镜检查如图。该患者最可能的诊断是



- A、 吻合口炎
- B、 吻合口溃疡
- C、 残胃溃疡
- D、 吻合口癌
- E、 残胃癌

答案： D

192、患者,女,60岁。刺激性咳嗽伴痰中带血1个月,查体无特殊阳性发现。胸片及CT检查示左上肺前段门处有一直径3cm块影,外周不整齐,呈毛刺状,纵隔内未见明确肿大淋巴结。最恰当的处理方法是

- A、 放射核素肺扫描检查
- B、 经胸壁穿刺活组织检查
- C、 肿块断层摄影
- D、 剖胸探查术
- E、 PET-CT检查或超声支气管镜活检

答案： E

193、患者,女,25岁,近3天反复大量咯血。查体:心尖区可触及舒张期震颤,可闻及隆隆样舒张期杂音, S_1 亢强, P_2 亢进分裂。该患者咯血的病理基础最可能是

- A、肺毛细血管破裂
- B、肺梗死
- C、急性肺水肿
- D、支气管静脉曲张破裂
- E、合并肺部感染

答案: D

194、患儿,女,10个月。母乳喂养,4个月添加辅食,近2个月来面色苍黄,毛发枯黄稀疏易脱落。查体,肝肋下2.0cm。脾肋下2.5cm。Hb 75g/l (7.5g/dl),RBC $3.0 \times 10^{12}/L$ (300万/ mm^3),大便中找到钩虫卵,该患儿贫血最主要是因为

- A、缺乏维生素B₁₂
- B、缺乏叶酸
- C、缺乏叶酸和维生素C
- D、缺铜
- E、缺铁

答案: E

195、患者,女,32岁。反复发热伴下肢关节痛2个月余。近1个月出现咳嗽、咳痰及气促。查体:面部蝶形红斑,双下肺少量小水泡音。胸片示双中下肺弥漫网格影。最可能的诊断是

- A、结节病
- B、系统性红斑狼疮肺损害
- C、浸润型肺结核
- D、特发性肺纤维化
- E、支气管扩张

答案: B

196、患者,女,36岁。外伤休克后行扩容治疗,测中心静脉压为13cmH₂O,血压正常,尿量15ml/h,尿比重<1.010,应考虑该患者出现

- A、血容量不足
- B、心功能不全
- C、酸中毒
- D、肾功能不全
- E、血容量过多

答案: D

197、初产妇, 26 岁, 孕 36 周。先兆子痫, 采取硫酸镁静脉滴注。在应用过程中, 反映无 Mg^{2+} 中毒反应或过量的是

- A、 膝反射消失
- B、 呼吸 14/min
- C、 尿量 200ml/24h
- D、 心率 100 次/min
- E、 血 Mg^{2+} 3.2mmol/L

答案: D

198、一患者因咳嗽、咯血就诊, 痰涂片染色镜检为结核分枝杆菌阳性。请问该菌应采用的染色方法是

- A、 革兰染色
- B、 复红染色
- C、 棉兰染色
- D、 抗酸染色
- E、 墨汁染色

答案: D

199、患者, 男, 75 岁, 以肺部感染及呼吸衰竭入院。患者发热、咳嗽、咳痰伴心悸、气短, 双下肺湿啰音, 痰为黄色、不易咳出。痰标本接种至沙保培养基 35℃ 培养, 菌落呈绒毛状, 表面呈深绿色、烟绿色, 背面淡黄色, 棉兰染色可见分生孢子头短柱状, 分生孢子梗壁光滑, 带淡绿色, 顶囊呈烧瓶状, 小梗单层, 分布在顶囊的上半部, 分生孢子球形, 绿色, 有小刺。该患者可能感染的真菌是

- A、 许兰毛癣菌
- B、 烟曲霉
- C、 放线菌
- D、 申克孢子丝菌
- E、 诺卡菌

答案: B

200、患者, 男, 27 岁, 教师。3 年前戒毒, 近 1 年来双下肢麻木、乏力, 进行性加重, 近 1 个月不能行走, 便秘, 排尿不畅。当地颅脑及胸腰椎 CT(-)。检查: 双下肢肌力 4°, 胸 10 以下痛觉减退, 关节位置及音叉觉正常, 下肢腱反射亢进, Babinski(+)。腰穿 CSF 压力 160mmH₂O, 细胞 $35 \times 10^6/L$, 蛋白 1275mg/L, 按脊髓炎治疗无效。查血 RPR 1:32, TPHA 1:2560; 腰穿 CSF 细胞 $25 \times 10^6/L$, 蛋白 1344mg/L, RPR 1:2, TPHA 1:1280。该患者最有可能是什么疾病

- A、 化脓性脊髓炎
- B、 脊髓钩端螺旋体病
- C、 脊髓血管梅毒

D、病毒性脊髓炎

E、结核性脊髓炎

答案： C

201、患者,女,绝经 6 年,阴道阵发性排血水样液体半个月,伴右下腹隐痛。首先要考虑的诊断为

A、宫颈癌

B、卵巢癌

C、子宫内膜癌

D、输卵管癌

E、子宫肌瘤恶变

答案： D

202、患者,女,34 岁,不规则阴道出血。妇科检查:宫颈口脱出 5cm 大肿物,质软。应

A、经阴道摘除

B、开腹探查

C、宫颈锥切

D、应用抗生素

E、先活检

答案： A

203、患者,男,65 岁,风湿性心脏病伴房颤,慢性心功能不全 10 余年,因发热、腹胀痛、不能进食、消瘦明显来院治疗。入院后检查发现肝大,中度腹水,AFP(+),确诊为肝癌晚期,并逐渐出现恶病质症状。患者要求安乐死以求尽早摆脱痛苦,但妻子要求积极抢救治疗,子女和领导表示尊重医院采纳的方案。下列关于医务人员的行为选择,正确的是

A、同意患者提出的安乐死要求

B、坚决不同意患者的安乐死要求

C、只要患者说服妻子同意,医务人员就可以实施安乐死

D、患者只要预立自愿安乐死遗嘱,医务人员就可以实施

E、进一步检查后,诊断明确,患者痛苦难忍,在家属和本人要求下,经一定的审批程序,可实施安乐死

答案： B


204、患者,女,32 岁,因上腹痛 10 小时,伴发热、呕吐,于急诊就诊,查血清淀粉酶 1000U/L(Somogyi),诊断为急性胰腺炎。其最基本的治疗方案是

A、肾上腺皮质激素

B、禁食补液

- C、 抗生素
 - D、 抑肽酶
 - E、 胰岛素
- 答案： B

205、某成年女性一侧左颈部淋巴结肿大,病理活体组织检查如图。最可能的是



- A、 胃肠道肿瘤转移
 - B、 鼻咽癌转移
 - C、 肺鳞癌转移
 - D、 食管癌转移
 - E、 喉癌转移
- 答案： A

206、患者,男,68岁,因剧烈持续胸痛4小时入院。心电图示 $V_1 \sim V_6$ 导联ST段明显上抬。患者气促不能平卧,BP130/70mmHg,心率90次/min,双肺闻及湿性啰音,静脉用药中首选

- A、 氢氯噻嗪+洋地黄类
 - B、 多巴酚丁胺+低分子右旋糖酐
 - C、 呋塞米+氨茶碱
 - D、 吗啡+呋塞米
 - E、 氨茶碱+美托洛尔
- 答案： D

207、患者,女,26岁,咽痛,刺激性咳嗽,伴有发热。双肺呼吸音稍粗,未闻啰音。血白细胞 $8.6 \times 10^9/L$,中性粒细胞66%。胸部X线示:左下肺部斑片状浸润阴影。血清冷凝集试验阳性。最好应选择的治疗药物是

- A、 利福平
- B、 青霉素
- C、 头孢菌素
- D、 四环素

E、 红霉素

答案： E

208、患者,男,55岁。数小时前右侧腰背部剧烈疼痛,难以忍受,出冷汗,服颠茄片不见好转,急来院就诊。尿常规检查可见红细胞。B型超声波检查肾结石。诊断为肾绞痛。患者宜选用何种药止痛

- A、 阿托品+解磷定
- B、 哌替啶+美沙酮
- C、 吗啡+纳洛酮
- D、 阿托品+哌替啶
- E、 阿托品+吗啡

答案： D

209、患者,女,46岁。近4个月月经周期紊乱,阴道大量流血5天,妇科检查无异常,Hb70g/L。首选的止血方法是

- A、 分段诊刮
- B、 肌注雌激素
- C、 肌注雄激素
- D、 肌注孕激素
- E、 肌注维生素K

答案： A

210、男患50岁,因十二指肠溃疡内科治疗1个月,2天前开始呕血、便血,每日需输血1000ml才能维持血压,其治疗应采取以下哪种方式

- A、 输血,补液,抗休克治疗
- B、 静滴西咪替丁
- C、 胃肠减压,冰盐水洗胃
- D、 抗休克同时积极手术治疗
- E、 出血已2天,不宜手术,只能保守治疗

答案： D

211、初孕妇,孕40周,临产20小时,估计胎儿3800g,宫口开全2小时,胎头S⁻²。产妇诉下腹痛,膀胱区隆起,有压痛,导尿有红细胞。最正确的处理是

- A、 立即行剖宫产
- B、 即行吸引器助产
- C、 静脉滴注催产素
- D、 产钳助产
- E、 再观察1小时

答案： A

212、初孕妇, 31 岁, 妊娠 31 周, 无自觉症状。肥胖, 血压升高一年余。查体: 血压 150/100mmHg, 尿蛋白(-)。应考虑诊断为

- A、 妊娠高血压
- B、 子痫前期
- C、 重度子痫前期
- D、 慢性高血压合并妊娠
- E、 慢性高血压并发子痫前期

答案: D

213、患者, 男, 30 岁, 右下腹痛、里急后重伴脓血便 2 年, 查体腹部无异常发现。大便多次细菌培养及阿米巴培养阴性, 服抗生素无效。首选的进一步检查方法是

- A、 腹部 B 超
- B、 X 线钡灌肠检查
- C、 血 CEA 检查
- D、 结肠镜检查
- E、 手术探查

答案: D

214、患者, 男, 35 岁, 幼年曾患百日咳, 反复咳嗽、咳痰 20 年, 5 年前曾因大量咯血住院治疗, 近 2 年咯血愈加频繁, 10 天前因严重咯血入院, 经治疗后症状好转。一般情况良好, 支气管碘油造影示左下肺叶各段支气管囊性扩张。下一步应建议患者

- A、 长期抗感染治疗
- B、 抗结核治疗
- C、 止咳、化痰治疗
- D、 手术治疗
- E、 停止任何治疗, 门诊随访

答案: D

215、初产妇, 26 岁, 未做产前检查, 主诉近一周有少量阴道流血。入院 BP14/9kPa(105/68mmHg), 胎心率 166 次/min, B 超见单胎 LOT, 羊水量正常, 估计孕周达 42 周。此时最好的处理方法是

- A、 输液+止血药物
- B、 宫颈评分行人工破膜引产
- C、 即刻剖宫产术
- D、 期待疗法
- E、 给氧纠正胎儿窘迫

答案: B

216、患者,女,28岁,1年来腹泻,每天2~3次,在进食蔬菜、蛋白质饮食后,腹泻加重。多次查大便常规,可见红细胞,严重时可见肉眼脓血便,大便培养多次(-)。为明确诊断,最有效的诊断方法是

- A、临床症状及体征
- B、纤维结肠镜检查
- C、大便常规及培养
- D、血清免疫球蛋白测定
- E、X线钡灌肠检查

答案: B

217、患者,男,60岁,患急性心肌梗死并发休克,动脉血压80/50mmHg,中心静脉压0.78kPa(8cmH₂O),肺毛细血管楔压1.33kPa(10mmHg)。下述药物最不宜应用的是

- A、极化液
- B、硝酸甘油
- C、低分子右旋糖酐
- D、碳酸氢钠
- E、多巴酚丁胺

答案: B

218、患者,女,35岁,因右上腹痛1小时就诊,初步诊断为胆绞痛,不宜选用吗啡镇痛的原因是

- A、抑制呼吸
- B、引起恶心
- C、兴奋Oddi括约肌
- D、抑制咳嗽
- E、引起体位性低血压

答案: C

219、一足月顺产分娩的新生儿,G₁P₁,生后6小时开始母乳喂养,12小时排胎粪,24小时时发现其头面、胸腹及下肢有黄染,最可能的诊断是

- A、新生败血症
- B、新生儿胎粪延迟排出
- C、新生儿溶血病
- D、新生儿母乳性黄疸
- E、地中海贫血

答案: C

220、患者,男,44岁。冬季发病,发热、乏力、眼红、头痛4天。查体:T40℃,结膜充血,胸背部见散在鲜红色充血性斑丘疹,腓肠肌无压痛,脑膜刺激征阳性。为避免病情加重。在实验室检查确诊前,首选哪种抗生素治疗

- A、青霉素
- B、氯霉素
- C、多西环素
- D、红霉素
- E、左氧氟沙星

答案: C

221、患者,女,32岁,眼睑水肿、尿少半月。Hb130g/L,尿蛋白(++),尿RBC++/HP,ALB35g/L,BUN9mmol/L,Cr140 μmol/L。下列哪种疾病可能性最小

- A、急性肾炎
- B、急进性肾炎
- C、肾病综合征
- D、狼疮性肾炎
- E、慢性肾炎

答案: C

222、患者,58岁,体检发现频发室性期前收缩,因顾虑心血管病风险前来门诊咨询。有关室性期前收缩,下列描述错误的是

- A、室性期前收缩不增加心脏性猝死的危险性
- B、急性心肌梗死发生后不预防性应用抗心律失常药物
- C、IC类抗心律失常药物增加室性期前收缩患者的死亡率
- D、β受体阻滞剂降低室性期前收缩患者的心脏性猝死发生率
- E、胺碘酮增加室性期前收缩患者的心脏性猝死发生率

答案: E

223、患者,男,61岁,体检发现肝左叶占位,进一步行腹部CT证实肝左叶实性占位,下述描述中对于肝内胆管细胞癌具有诊断价值的为

- A、病灶周围可见胆管扩张
- B、AFP正常
- C、患者乙肝五项检查结果均为阴性
- D、患者有长期饮酒史
- E、患者有胆囊结石病史

答案: A

224、李某是一名医疗机构的药剂人员,对于其调配处方时应当遵守的相关规定,以下行为中错误的是

- A、 查处方,对科别、姓名、年龄
- B、 对临床诊断
- C、 查药品数量
- D、 发现严重不合理用药,有权直接变更
- E、 查配伍禁忌

答案: D

225、患者,女,32岁。左乳房外上象限扪及一3cm×2cm大小肿块,与皮肤粘连,左腋窝可触及一肿大淋巴结,尚可推动。临床诊断为左乳癌,按TNM分期法,应为

- A、 T₁N₀M₀
- B、 T₂N₀M₀
- C、 T₃N₁M₀
- D、 T₄N₁M₀
- E、 T₁N₁M₁

答案: D

226、患者,女,25岁,近半个月来午后低热,脐周和右下腹隐痛,进餐时可加重,经常便秘。近3天来右下腹阵发性腹痛加重,伴腹胀及肠鸣音亢进,食欲减退、消瘦乏力、夜间盗汗,已3天未排大便。门诊查体时,最有诊断价值的阳性体征是

- A、 全腹压痛
- B、 腹壁柔韧感
- C、 右下腹压痛
- D、 右下腹轻度反跳痛
- E、 右下腹肿块

答案: E

227、患者,男,65岁,近来食欲缺乏,恶心,呕吐,体重减轻,贫血,但无明显腹痛。胃钡餐透视于胃角可见一凸出于胃轮廓之外的龛影。最可能的诊断是

- A、 胃癌
- B、 胃溃疡
- C、 胃平滑肌瘤
- D、 胃黏膜脱垂
- E、 胃息肉

答案: B

228、患者,男,32岁,突发性上腹部疼痛3小时。查体:腹平,全腹部压痛,腹肌呈板样强直,肠鸣音消失,肝浊音界缩小。诊断应首先考虑

- A、 急性胰腺炎
- B、 急性胆囊炎穿孔伴腹膜炎
- C、 急性阑尾炎穿孔伴腹膜炎
- D、 急性机械性肠梗阻
- E、 溃疡病穿孔伴腹膜炎

答案： E

229、患者,男,28岁,发热3周,胸部X线检查见右上肺大片状密度增浓影,密度不均,痰结核菌检查阳性。下列方案中,最适宜短程疗法的是

- A、 2HRSP/7HR
- B、 2HSEP/7HS
- C、 2HREP/7HP
- D、 2HREZ/7HR
- E、 2HSPZ/7HZ

答案： D

230、患者,女,28岁,自述心脏病8年。查体:心尖部舒张期隆隆样杂音,主动脉瓣区3/6级收缩期喷射样杂音向颈部传导,胸骨左缘3、4肋间舒张期吸气样杂音向心尖部传导,最正确的诊断应是

- A、 二尖瓣狭窄并主动脉瓣关闭不全
- B、 主动脉瓣狭窄并主动脉瓣关闭不全
- C、 二尖瓣狭窄并相对性肺动脉瓣关闭不全
- D、 二尖瓣狭窄并主动脉瓣狭窄
- E、 二尖瓣狭窄并主动脉瓣关闭不全及主动脉瓣狭窄

答案： E

231、患儿,女,10个月。腹泻1周,大便初为黄绿稀便,近2天大便深绿色,伴有脓血及黏液,镜检多量红白细胞,病后发热,精神差,该患儿腹泻的主要机理是

- A、 各种消化酶分泌少,活性低
- B、 肠绒毛被破坏,肠道水电解质吸收减少
- C、 cAMP, cGMP生成增多,肠道分泌增加
- D、 双糖酶活性减低导致高渗性腹泻
- E、 细菌侵袭肠黏膜

答案： E

232、尿路急性梗阻早期,由于肾盂内压增高,肾内“安全阀”开放,可起到保护肾组织的作用。下列哪项没有保护肾组织的作用

- A、 膀胱输尿管反流
- B、 肾盂静脉反流

- C、 肾盂肾窦反流
- D、 肾盂淋巴反流
- E、 肾盂肾小管反流

答案： A

233、患者,女,55岁,右手拇指晨起僵硬伴疼痛半年,近2周出现该处的肿胀及活动受限,被动活动患指可出现伴疼痛的弹响。临床诊断最可能是

- A、 类风湿关节炎
- B、 关节内游离体
- C、 骨关节炎
- D、 风湿性关节炎
- E、 狭窄性腱鞘炎

答案： E

234、患者,女,38岁。乘车后突然发生右下腹痛,恶心欲吐,既往曾有类似发作史。查体:腹软,右下腹有深压痛,尿检白细胞少许,红细胞(+++)。诊断应首先考虑

- A、 急性阑尾炎
- B、 右侧输尿管结石
- C、 右侧附件炎
- D、 肠道蛔虫症
- E、 梅克尔憩室炎

答案： B

235、患者,男,50岁,1周前突然发生脑血管意外,3日前患者呕血约500ml,伴黑便。过去无胃病与肝炎史,诊断最可能为

- A、 慢性胃炎
- B、 胃癌
- C、 急性糜烂出血性胃炎
- D、 胆道出血
- E、 胃黏膜脱垂

答案： C

236、风心病心衰患者用洋地黄和利尿剂治疗,出现食欲缺乏,头痛,心电图为室性期前收缩二联律。应首先考虑

- A、 洋地黄剂量不足
- B、 低钾
- C、 洋地黄中毒
- D、 风湿活动

E、心衰加重

答案： C

237、患者，男，24岁，由8米高处坠落，臀部着地，伤后12小时入院。脐下三指平面感觉明显减退，左（足母）趾稍能活动，双下肢自主运动消失，尿潴留，X线片示胸10椎体压缩，有骨折片突向椎管，最关键的治疗是

- A、积极而强有力的抗生素治疗
- B、导尿并留置导尿管
- C、做好护理，勤翻身以防褥疮发生
- D、尽早手术探查椎管，解除压迫
- E、高低桌法复位后，上石膏背心

答案： D

238、患者，男，48岁，因饱餐后突发上腹部剧痛2小时急诊入院。腹部X片示膈下半月形游离气体。该患者入院时可能的体位是

- A、被动体位
- B、辗转体位
- C、强迫侧卧位
- D、强迫仰卧位
- E、强迫俯卧位

答案： D

239、患者，男，30岁，突然大量呕血，量约1200ml，伴便血，每次量约200ml，积极补液输血治疗。查体：心率106次/min，血压90/60mmHg，尿量5ml/h。补液观察12小时仍持续无尿，肌酐上升至原来的3倍。该患者按RIFLE分级标准，应属于

- A、危险
- B、受损
- C、衰竭
- D、功能不全
- E、终末期肾病

答案： C

240、患者，女，8岁。发热4天，打喷嚏、流涕、流泪、眼结膜充血、面部出米粒样丘疹1天而入院。口腔检查：扁桃腺Ⅰ度肿大，口腔黏膜充血，颊黏膜处见帽针头大小白色斑点。考虑下列诊断最可能性的是

- A、风疹
- B、鹅口疮
- C、麻疹
- D、药物中毒

E、化脓性扁桃体炎

答案： C

241、患者,男,18岁。2个月前因急性脓胸经多次胸腔穿刺抽脓及抗菌治疗后,仍有低热、消瘦,胸部X线片右胸仍可见有包裹性脓腔。入院后行胸腔闭式引流术,每日引流脓液30~50ml,胸片及胸部CT显示右下胸部有一10cm×6cm残腔,壁厚约2mm,未见钙化,肺内未见病变。进一步治疗应选择

- A、继续改进胸腔引流
- B、将闭式引流改为开放引流
- C、胸膜纤维板剥除术
- D、胸膜肺切除术
- E、改善全身情况,消除中毒症状和营养不良

答案： C

242、患者,女,42岁,心慌气促2年,有风湿病史。查体发现心尖部舒张期隆隆样杂音,第一心音低钝, $P_2 > A_2$ 。心脏B超检查:二尖瓣口面积 0.8cm^2 ,两瓣叶同向运动,明显钙化,瓣下结构变形挛缩。其最佳治疗方案是

- A、抗风湿治疗
- B、抗结核治疗
- C、闭式二尖瓣分离术
- D、二尖瓣成形术
- E、二尖瓣置换术

答案： E

243、患儿,女,5岁,因间断咳嗽气喘2个月,加重1周就诊。查体:咽红充血,双肺呼吸音粗,可闻及痰鸣、喘鸣及中小湿啰音。胸片提示支气管肺炎。取呼吸道分泌物进行支原体培养,能分解葡萄糖,但不分解尿素及精氨酸;固体培养基培养3天,显微镜下可见“荷包蛋”样菌落。请问引起本病的病原体最可能是

- A、解脲脲原体
- B、人型支原体
- C、肺炎支原体
- D、肺炎嗜衣原体
- E、流感嗜血杆菌

答案： C

244、一患者胸痛常于夜间发作,心电图并有ST段上抬。以下治疗用药不当的是

- A、肠溶阿司匹林片
- B、双嘧达莫

- C、 美托洛尔
- D、 硝酸甘油
- E、 地尔硫草

答案： C

245、患者,女,47岁,无明显诱因突然高热,体温39℃,不伴寒战。周身不适,左上胸疼,咳嗽后加重,白痰,量不多。体检:左上可闻少量水泡音,血白细胞 $21 \times 10^9/L$,中性粒细胞87%,胸片左上肺纹理增粗,有一小片状模糊阴影。下列治疗错误的是

- A、 一经诊断应立即开始抗生素治疗
- B、 青霉素G为首选
- C、 患者应卧床休息,宜用有营养而易消化食物
- D、 应用阿司匹林或其他退热剂,以使体温尽快正常
- E、 如胸疼加重,可给予少量镇痛剂

答案： D

246、初孕妇,25岁,妊娠37周。突然头痛,伴恶心、欲吐。查体:BP22.7/14.6kPa(170/110mmHg),P80次/min。尿蛋白(++)。下述哪项治疗措施不正确

- A、 静滴硫酸镁
- B、 静滴甘露醇
- C、 静注地塞米松
- D、 静注安定
- E、 立即剖宫产

答案： E

247、一男性活动性肺结核患者服用异烟肼和乙胺丁醇,请问乙胺丁醇的作用是

- A、 促进异烟肼进入结核菌
- B、 促进异烟肼通过血脑屏障
- C、 延缓异烟肼肌注后的吸收
- D、 延缓耐药性产生
- E、 抑制异烟肼经肾排泄,增加血药浓度

答案： D

248、患者苗某,男,25岁。体查未见明显异常。意识清晰,可查及思维松弛,关系妄想,被动妄想,评论性幻听。患者上述症状至少持续多久才能诊断为精神分裂症

- A、 一周
- B、 一个月

- C、 三个月
 - D、 半年
 - E、 一年
- 答案： B

249、患者,男,54岁。突发抽搐8小时。查体:四肢肌肉呈持续性强直性痉挛,肌肉压痛剧烈。该患者最可能的诊断是

- A、 癫痫
 - B、 高血压脑病
 - C、 蛛网膜下腔出血
 - D、 破伤风
 - E、 颅内占位
- 答案： D

250、患者,女,54岁,胸闷入院,查体可见叹气样呼吸,余未见异常,该患者最可能的诊断是

- A、 酸中毒
 - B、 心功能不全
 - C、 急性胸膜炎
 - D、 抑郁症
 - E、 大叶性肺炎
- 答案： D

251、患者,女,27岁。有慢性盆腔炎病史,近4天高热伴下腹痛。妇科检查:子宫正常大小,左附件区触及7cm×6cm大包块,压痛,余(-)。静脉使用抗生素72小时无效。对该病合理的处理为

- A、 理疗
 - B、 中药
 - C、 手术
 - D、 后穹隆切开
 - E、 抗生素
- 答案： C

252、患者,女,29岁,近一年来常有低热、盗汗、咳嗽、痰中带血,X线胸片见右肺尖有直径3.5cm、边缘模糊不清的云雾状阴影,痰培养查见抗酸杆菌,据此应诊断为

- A、 右肺尖局灶型肺结核
- B、 右肺尖结核球
- C、 右肺尖浸润型肺结核

- D、 右肺尖肺癌
- E、 右肺尖干酪样肺炎

答案： C

253、某农民活动后心悸气促伴下肢水肿 2 年。查体：脉搏 120 次/min，有奇脉，血压 12/10 kPa (90/70mmHg)，颈静脉怒张，肝肋下 4.0cm。超声心动图报告：心包增厚，心脏舒张受限，以下哪项治疗最不适宜

- A、 给白蛋白 50ml
- B、 给利尿剂
- C、 给血管扩张剂
- D、 少量输血
- E、 积极准备手术治疗

答案： C

254、患者，男，35 岁。表现自我感觉良好，非常高兴。说话时语音高昂，眉飞色舞，表情丰富，经常使病友们开怀大笑。此患者可能存在的症状为

- A、 思维奔逸
- B、 思维迟缓
- C、 情感低落
- D、 情感高涨
- E、 情感不稳

答案： D

255、患儿，女，3 岁。身高 94cm，体重 16kg，因发现心脏杂音就诊，听诊发现该杂音位于心尖区柔和的 2/6 级收缩期杂音，局限，受呼吸、体位和运动影响。该女孩的杂音可见于

- A、 房间隔缺损
- B、 室间隔缺损
- C、 动脉导管未闭
- D、 生理性杂音
- E、 肺动脉狭窄

答案： D

256、患者，女，30 岁。反复喘息发作，近 1 年来发作频繁，夜间重。查体：HR110 次/min，R32 次/min，双肺散在呼气性哮鸣音，心音正常。血气分析：PH 7.46，PaO₂ 65mmHg，PaCO₂ 32mmHg。该患发生了哪种酸碱平衡紊乱

- A、 呼吸性酸中毒
- B、 呼吸性碱中毒
- C、 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

- D、 代谢性碱中毒
- E、 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

答案： B

257、患者,女,16岁,胸痛,呼吸困难。查体:气管向左侧移位,语颤右侧减弱,叩之实音。最可能的诊断是

- A、 气胸
- B、 胸腔积液
- C、 肺气肿
- D、 支气管扩张
- E、 支气管哮喘

答案： B

258、患儿,女,10岁。身高明显低于同龄组儿童,小学3年级,学习成绩良好。近半年来出现头痛,以晨起为重,症状逐渐加重,可能的诊断为

- A、 颅咽管瘤伴梗阻性脑积水
- B、 松果体瘤伴梗阻性脑积水
- C、 髓母细胞瘤伴梗阻性脑积水
- D、 中脑肿瘤伴梗阻性脑积水
- E、 交通性脑积水

答案： A

259、患者,男,60岁。四肢关节肿痛20年,以双手小关节为重。查体见双手尺偏畸形,右肘关节屈曲畸形。最可能的疾病是

- A、 类风湿关节炎
- B、 骨关节炎
- C、 软组织炎
- D、 退行性关节炎
- E、 痛风

答案： A

260、患者,男,32岁,有溃疡病史,5小时饱食后劳动时突发剑突下撕裂样疼痛,逐渐发展至右下腹,仍以剑下为重。查体:T 37.3℃,P 88次/min,半卧屈曲位,面色苍白,腹部“板样”硬,压痛反跳痛(+)。下列最可能的诊断是

- A、 急性阑尾炎
- B、 输尿管结石
- C、 胃溃疡恶变
- D、 胃溃疡穿孔
- E、 原发性腹膜炎

答案： D

261、患者,女,28岁,怕热多汗伴消瘦2月,体检颈前区肿大且可闻及血管杂音。
该患者的面容可能是

- A、面色苍白,颜面水肿
- B、面色晦暗,额部有褐色色素沉着
- C、表情淡漠,反应迟钝呈无欲状态
- D、面色苍白,表情疲惫
- E、面容惊愕,眼裂增宽,目光闪亮

答案： E

262、患者,男,58岁,因“左冠状动脉前降支闭塞,左心室广泛前壁心肌梗死”
入院治疗,治疗中最重要的措施是

- A、采用缺血后适应
- B、使用细胞保护剂
- C、使用自由基清除剂
- D、使用钙通道阻滞剂
- E、尽快恢复冠脉血流

答案： E

263、患者,男,56岁,因“上腹痛、恶心”入院。血常规提示大细胞高色素性贫血,胃镜检查患者有“慢性萎缩性胃炎”,贫血原因推测可能是由于缺乏

- A、维生素C
- B、维生素K
- C、维生素A
- D、转铁蛋白
- E、内因子

答案： E

264、患者,男,60岁,心前区痛间发1个月,多在夜间发作,与活动无关。每次发作15分钟,发作时心电图Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段抬高。最可能的诊断为

- A、稳定型心绞痛
- B、恶化型心绞痛
- C、急性心肌梗死
- D、卧位型心绞痛
- E、变异型心绞痛

答案： E

265、患者,男,46岁。活动耐力进行性下降5年。近半年来平地步行50米左右即感呼吸急促,并出现双下肢水肿。1周前上呼吸道感染后症状加重,伴夜间阵发性呼吸困难。查体:平卧位,颈静脉怒张,肝颈静脉反流征阳性,双肺可闻及细湿啰音,双下肢凹陷性水肿。目前该患者的心衰类型为

- A、急性右心衰
- B、急性左心衰
- C、全心衰竭
- D、慢性左心衰
- E、慢性右心衰

答案: C

266、患者,女,26岁,头痛,腰酸,口干,胸闷,心悸,少尿3天,水肿外观,表情淡漠,血压11/8kPa(80/60mmHg),心率120次/min,腹膨隆叩为浊音,双下肢凹陷性水肿,胸腔中等量积液。血红蛋白140g/L。尿蛋白(++++) ,白细胞4个/HP,红细胞6个/HP。血浆白蛋白14g/L。首先采取的处理措施为

- A、5%GS+间羟胺
- B、50%GS+毛花苷C
- C、50%GS+呋塞米
- D、输白蛋白
- E、放胸腹水

答案: D

267、患者,女,36岁。原发不孕6年,继发性痛经2年,月经失调1年。妇科检查:盆腔囊性包块固定、压痛。最可能的诊断是

- A、恶性卵巢肿瘤
- B、子宫肌瘤
- C、盆腔炎块
- D、卵巢内膜异位症
- E、子宫腺肌病

答案: D

268、患者,男,32岁,平素体健,因“反复咯血1周,进行性少尿4天”入院。血压165/105mmHg。尿常规:尿蛋白(+++),尿红细胞(++++)。入院后病情继续恶化,血压升高加重,血肌酐 $378\mu\text{mol/L}$ 。考虑诊断为

- A、急性肾炎
- B、急进性肾炎
- C、流行性出血热
- D、过敏性紫癜
- E、慢性肾炎急性发作

答案： B

269、患者,男,32岁,农民。发热、腰痛5天,无尿3天就诊。目前患者躁动不安,眼睑水肿,体表静脉充盈,心率120次/min, BP22.67/12kPa(170/90mmHg)。最有效的处理是

- A、口服硫酸镁导泻疗法
- B、静脉输注甘露醇
- C、静脉滴注地塞米松
- D、静脉滴注苄胺唑啉
- E、血液透析

答案： E

270、根据患者 BMR 检测结果 $225.6\text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 下列正确的是[正常 BMR 参考值为 $146.9\text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$]

- A、BMR 值在正常范围
- B、提示有肾上腺皮质功能亢进
- C、提示有肾上腺皮质功能低下
- D、提示有甲状腺功能亢进
- E、提示有甲状腺功能低下

答案： D

271、耻、坐骨骨折常并发

- A、缺血性肌痉挛
- B、褥疮
- C、膀胱、尿道损伤
- D、周围神经损伤
- E、缺血性骨坏死

答案： C

272、股骨颈骨折(如图)常并发

- A、缺血性肌痉挛
- B、褥疮
- C、膀胱、尿道损伤
- D、周围神经损伤


E、 缺血性骨坏死



答案： E

273、脊柱骨折(如图), 脊髓损伤常并发

- A、 缺血性肌痉挛
- B、 褥疮
- C、 膀胱、尿道损伤
- D、 周围神经损伤
- E、 缺血性骨坏死



答案： B

解析： B

(274~276 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 氯喹
- B. 奎宁
- C. 乙胺嘧啶
- D. 伯氨喹
- E. 青蒿素

274、对红细胞内裂殖体有迅速而强大杀灭作用的是

- A、 氯喹
- B、 奎宁
- C、 乙胺嘧啶
- D、 伯氨喹
- E、 青蒿素

答案： A

275、能杀灭肝细胞内速发型和迟发型疟原虫, 杀灭各种疟原虫配体的是

- A、 氯喹
- B、 奎宁
- C、 乙胺嘧啶
- D、 伯氨喹
- E、 青蒿素

答案: D

276、杀灭各种疟原虫速发型, 对红细胞内未成熟裂殖体有抑制作用的是

- A、 氯喹
- B、 奎宁
- C、 乙胺嘧啶
- D、 伯氨喹
- E、 青蒿素

答案: C

解析: C

(277~279 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 高血磷、低血钙
- B. 低血磷、高血钙
- C. 低血磷、低血钙
- D. 高尿磷、高尿钙
- E. 高血磷、高血钙

277、甲状旁腺功能亢进症出现

- A、 高血磷、低血钙
- B、 低血磷、高血钙
- C、 低血磷、低血钙
- D、 高尿磷、高尿钙
- E、 高血磷、高血钙

答案: B

278、甲状旁腺功能减退症出现

- A、 高血磷、低血钙
- B、 低血磷、高血钙
- C、 低血磷、低血钙
- D、 高尿磷、高尿钙
- E、 高血磷、高血钙

答案: A

279、慢性肾功能不全出现

- A、 高血磷、低血钙
- B、 低血磷、高血钙
- C、 低血磷、低血钙
- D、 高尿磷、高尿钙
- E、 高血磷、高血钙

答案： A

解析： A

(280~283 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 核心
- B. 衣壳
- C. 核衣壳
- D. 包膜
- E. 刺突

280、病毒的基本结构是

- A、 核心
- B、 衣壳
- C、 核衣壳
- D、 包膜
- E、 刺突

答案： C

281、裸露病毒的结构是

- A、 核心
- B、 衣壳
- C、 核衣壳
- D、 包膜
- E、 刺突

答案： A

282、决定病毒特性的是

- A、 核心
- B、 衣壳
- C、 核衣壳
- D、 包膜
- E、 刺突

答案： B

283、保护病毒核酸的结构是

- A、 核心
- B、 衣壳
- C、 核衣壳
- D、 包膜
- E、 刺突

答案： A

解析： A

(284~285 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 低血糖
- B. 酮症酸中毒
- C. 过敏反应
- D. 消化道的反应
- E. 高渗昏迷

284、长期使用胰岛素治疗的患者须警惕

- A、 低血糖
- B、 酮症酸中毒
- C、 过敏反应
- D、 消化道的反应
- E、 高渗昏迷

答案： B

285、一型糖尿病患者初次就诊的常见原因

- A、 低血糖
- B、 酮症酸中毒
- C、 过敏反应
- D、 消化道的反应
- E、 高渗昏迷

答案： B

解析： B


(286~288 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 胆道蛔虫病
- B. 急性胰腺炎
- C. 胃十二指肠溃疡穿孔
- D. 肠梗阻
- E. 急性阑尾炎

286、腹膜炎合并血尿淀粉酶升高, 多见

- A、 胆道蛔虫病
- B、 急性胰腺炎
- C、 胃十二指肠溃疡穿孔
- D、 肠梗阻
- E、 急性阑尾炎



答案： B

287、转移性右下腹痛多见于

- A、 胆道蛔虫病
- B、 急性胰腺炎
- C、 胃十二指肠溃疡穿孔
- D、 肠梗阻
- E、 急性阑尾炎

答案： E

288、上腹部阵发性绞痛多见于

- A、 胆道蛔虫病
- B、 急性胰腺炎
- C、 胃十二指肠溃疡穿孔
- D、 肠梗阻
- E、 急性阑尾炎

答案： A

解析： A

(289~291 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 严重湿疹
- B. 腹泻
- C. 消瘦
- D. 低热
- E. 惊厥

289、针对卡介苗的特殊禁忌证是

- A、 严重湿疹
- B、 腹泻
- C、 消瘦
- D、 低热
- E、 惊厥

答案： A

290、针对百白破混合制剂的特殊禁忌证是

- A、 严重湿疹
- B、 腹泻
- C、 消瘦
- D、 低热
- E、 惊厥

答案： E

291、针对脊髓灰质炎疫苗的特殊禁忌证是

- A、 严重湿疹
- B、 腹泻
- C、 消瘦
- D、 低热
- E、 惊厥

答案： B

解析： B

(292~293 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 慢性、周期性、节律性上腹痛
- B. 长期服用非甾体抗炎药、酗酒或应激状态者
- C. 有病毒肝炎史或长期饮酒史, 并有肝病和门静脉高压表现
- D. 中年以上患者, 上腹痛, 厌食, 消瘦
- E. 剧烈恶心、呕吐之后

292、胃癌引起的症状

- A、 慢性、周期性、节律性上腹痛
- B、 长期服用非甾体抗炎药、酗酒或应激状态者
- C、 有病毒肝炎史或长期饮酒史, 并有肝病和门静脉高压表现
- D、 中年以上患者, 上腹痛, 厌食, 消瘦
- E、 剧烈恶心、呕吐之后

答案： D

293、消化性溃疡引起的症状

- A、 慢性、周期性、节律性上腹痛
- B、 长期服用非甾体抗炎药、酗酒或应激状态者
- C、 有病毒肝炎史或长期饮酒史, 并有肝病和门静脉高压表现
- D、 中年以上患者, 上腹痛, 厌食, 消瘦
- E、 剧烈恶心、呕吐之后

答案: A

解析: A

(294~295 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 抑制纤维蛋白多聚体的形成
- B. 水解纤维蛋白原
- C. 激活纤溶酶原
- D. 水解凝血因子III
- E. 增加毛细血管通透性

294、纤溶酶的作用是

- A、 抑制纤维蛋白多聚体的形成
- B、 水解纤维蛋白原
- C、 激活纤溶酶原
- D、 水解凝血因子III
- E、 增加毛细血管通透性

答案: B

295、FDP 的作用是

- A、 抑制纤维蛋白多聚体的形成
- B、 水解纤维蛋白原
- C、 激活纤溶酶原
- D、 水解凝血因子III
- E、 增加毛细血管通透性

答案: A

解析: A

(296~300 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 尿频、尿不尽, 尿道口滴白
- B. 尿频、尿急、尿痛, 寒战高热, 尿潴留
- C. 腰痛, 高热, 尿频、尿急、尿痛
- D. 尿频、尿急、尿痛, 下腹部坠痛
- E. 尿道瘙痒, 尿道口流脓

296、急性细菌性膀胱炎可见

- A、 尿频、尿不尽, 尿道口滴白

- B、 尿频、尿急、尿痛,寒战高热,尿潴留
- C、 腰痛,高热,尿频、尿急、尿痛
- D、 尿频、尿急、尿痛,下腹部坠痛
- E、 尿道瘙痒,尿道口流脓

答案: D

297、急性肾盂肾炎可见

- A、 尿频、尿不尽,尿道口滴白
- B、 尿频、尿急、尿痛,寒战高热,尿潴留
- C、 腰痛,高热,尿频、尿急、尿痛
- D、 尿频、尿急、尿痛,下腹部坠痛
- E、 尿道瘙痒,尿道口流脓

答案: C

298、淋菌性尿道炎可见

- A、 尿频、尿不尽,尿道口滴白
- B、 尿频、尿急、尿痛,寒战高热,尿潴留
- C、 腰痛,高热,尿频、尿急、尿痛
- D、 尿频、尿急、尿痛,下腹部坠痛
- E、 尿道瘙痒,尿道口流脓

答案: E

299、急性细菌性前列腺炎可见

- A、 尿频、尿不尽,尿道口滴白
- B、 尿频、尿急、尿痛,寒战高热,尿潴留
- C、 腰痛,高热,尿频、尿急、尿痛
- D、 尿频、尿急、尿痛,下腹部坠痛
- E、 尿道瘙痒,尿道口流脓

答案: B

300、慢性前列腺炎可见

- A、 尿频、尿不尽,尿道口滴白
- B、 尿频、尿急、尿痛,寒战高热,尿潴留
- C、 腰痛,高热,尿频、尿急、尿痛
- D、 尿频、尿急、尿痛,下腹部坠痛
- E、 尿道瘙痒,尿道口流脓

答案: A

1、关于肺炎胸部 X 线表现的描述, 正确的是

- A、 肺炎链球菌肺炎—肺叶或肺段大片实变影, 经 4~8 周才能吸收完全
- B、 葡萄球菌肺炎—肺叶或小叶浸润, 多变, 易有空洞、液气囊腔形成
- C、 肺炎克雷伯菌肺炎—肺叶或小叶浸润, 3~4 周自行吸收
- D、 肺炎支原体肺炎—肺部多形态浸润影, 常伴液气囊腔
- E、 军团菌肺炎—肺小叶实变, 蜂窝状脓肿, 叶间隙下坠

答案: B

2、急性心力衰竭时, 快速的心外代偿主要表现在

- A、 红细胞生成增加
- B、 细胞线粒体数量增多
- C、 细胞色素氧化酶活性增强
- D、 回心血量增加, 增加后负荷
- E、 血流重分布, 保证心、脑的血供

答案: E

3、艾滋病皮肤黏膜的表现包括

- A、 卡氏肉瘤为一种恶性组织细胞病
- B、 卡氏肉瘤常侵犯下肢皮肤和口腔黏膜
- C、 卡氏肉瘤表现为紫红色或深兰色浸润斑或结节, 表面出现溃疡并向四周扩散
- D、 外阴疱疹病毒感染较常见
- E、 外阴尖锐湿疣感染较少见

答案: E

4、下列一般不考虑为肺癌转移的表现的是

- A、 声音嘶哑
- B、 血性胸水
- C、 吞咽困难
- D、 骨关节痛, 杵状指
- E、 持续剧烈的胸痛

答案: D

5、下列哪一种疾病不需与妊娠合并病毒性肝炎相鉴别

- A、 妊娠合并糖尿病
- B、 妊娠急性脂肪肝

- C、 妊娠期高血压疾病
- D、 妊娠期肝内胆汁淤积症
- E、 妊娠剧吐

答案： A

6、 仅在肝中合成的化合物是

- A、 糖原
- B、 尿素
- C、 脂肪酸
- D、 胆固醇
- E、 血浆蛋白

答案： B

7、 下列类型的室间隔缺损很少能自然闭合的是

- A、 肺动脉下或双动脉下的漏斗隔缺损
- B、 膜周部缺损
- C、 肌部小梁部缺损
- D、 膜周部及肌部小梁部缺损
- E、 膜周流入道

答案： A

8、 关于 AFP 的叙述, 下列错误的是

- A、 胎儿早期由肝脏和卵黄囊合成的一种血清糖蛋白
- B、 生殖腺胚胎肿瘤, 妊娠增加
- C、 是原发性肝癌的标志蛋白
- D、 AFP 不升高, 可除外原发性肝癌
- E、 急慢性肝炎、肝硬化可增加, 其升高与肝细胞坏死与再生程度相关

答案： D

9、 骨与关节结核的临床表现中以下哪种情况不正确

- A、 早期症状轻微, 病程发展缓慢
- B、 脓肿常发生于关节附近, 一般没有红热
- C、 多为多发, 很少单发
- D、 常伴有肌肉萎缩, 痉挛, 关节活动受限
- E、 夜啼的原因为翻身或关节活动时引起疼痛

答案： C

10、 AIDS 患者继发的 Kaposi 肉瘤来源于

- A、 滑膜细胞

- B、 血管内皮细胞
- C、 平滑肌细胞
- D、 淋巴细胞
- E、 血管周细胞

答案： B

11、人在社会中扮演多种角色, 其行为应随时间、环境不同进行调整, 这是

- A、 角色期待
- B、 角色矛盾
- C、 角色冲突
- D、 角色转换
- E、 角色扮演

答案： D

12、不常见腕关节变形的疾病是

- A、 尺神经损伤
- B、 强直性脊柱
- C、 骨折
- D、 腱鞘囊肿
- E、 桡神经损伤

答案： B

13、复杂部分性发作最常见的表现为

- A、 只有意识障碍
- B、 意识障碍和自动症
- C、 意识障碍和肢体强直
- D、 意识障碍和肌阵挛
- E、 意识障碍和特殊姿势

答案： B

14、关于雌激素的描述, 下列各项中哪项是错误的

- A、 雌激素为蛋白激素
- B、 雌激素来自胎盘及卵巢
- C、 妊娠早期由黄体产生雌二醇和雌酮
- D、 妊娠 10 周后由胎盘产生
- E、 由合体滋养细胞产生

答案： A

15、关于神经症的流行病学情况, 下面说法正确的是

- A、 国内报道患病率在 5%左右
- B、 不属于高发疾病
- C、 男性高于女性
- D、 以 20~30 岁年龄段患病率最高
- E、 国内 1982 年流调资料患病率为 2.2%

答案： E

16、 如图所示, 下列有关姜片虫成虫的描述, 错误的是



- A、 成虫呈椭圆形, 肉红色
- B、 背腹扁平, 质软肥厚
- C、 腹吸盘呈椭圆形
- D、 雌雄同体
- E、 是人体寄生吸虫中最大的 1 种

答案： C

17、 强直阵挛发作持续状态是

- A、 频繁的发作
- B、 一次发作后持续意识障碍
- C、 反复发作抽搐, 发作间期意识障碍未恢复
- D、 频繁的发作伴有颅内压增高
- E、 发作后持续精神异常

答案： C

18、 培养健康行为的关键期是

- A、 儿童期
- B、 青少年期
- C、 中年期
- D、 婴幼儿期
- E、 新生儿期

答案： A

19、 投射纤维是大脑髓质的主要纤维, 它们大都经过内囊, 其中下行的投射纤维不包括

- A、 丘脑中央辐射
- B、 皮质脊髓束
- C、 额桥束
- D、 皮质核束
- E、 顶枕颞桥束

答案： A

20、以下哪种不属于原发性痛风的并发症

- A、 高脂血症
- B、 肿瘤溶解综合征
- C、 糖尿病
- D、 高血压
- E、 动脉粥样硬化


答案： B

21、早期胃癌是指

- A、 局限于肌层的胃癌
- B、 局限于胃壁
- C、 局限于黏膜或黏膜下
- D、 无淋巴结转移者
- E、 肿瘤小于 1cm、无明显临床症状者

答案： C

22、如图是麻疹病毒,关于病原学的叙述,错误的是



- A、 麻疹病毒属于虫媒病毒
- B、 麻疹病毒只有 1 个血清型
- C、 分离麻疹病毒的最好方法是组织培养
- D、 麻疹病毒在外界生活力不强,对阳光及一般消毒剂很敏感
- E、 麻疹病毒核心为单股负链 RNA 和 3 种核衣壳蛋白组成的核壳体

答案： A

23、为诊断子宫内膜癌,作分段诊刮术,下列操作最正确的是

- A、 先探宫腔,再分别取四壁的子宫内膜
- B、 先作宫颈活检,再探宫腔后,取子宫内膜
- C、 先取宫颈管内膜,再探宫腔后,取子宫内膜
- D、 先刮取子宫内膜,然后探宫腔
- E、 先刮颈管内膜,再刮宫腔内膜,最后探宫腔

答案: C

24、 输卵管妊娠病因中, 哪项正确

- A、 有明显的痛经史
- B、 月经不规则
- C、 严重的心脏病
- D、 慢性输卵管炎
- E、 严重的肾炎

答案: D

25、 尿液细菌学检查, 采集尿液的最常用方法是

- A、 初段尿
- B、 中段尿
- C、 终末尿
- D、 导尿
- E、 膀胱穿刺抽尿

答案: B

26、 血清钙的正常参考值为

- A、 0.97~1.61mmol/L
- B、 1.29~1.94mmol/L
- C、 2.25~2.75mmol/L
- D、 3.9~5.6mmol/L
- E、 9.0~11.0mmol/L

答案: C

27、 以下哪项是厌恶疗法的适应证

- A、 酒瘾
- B、 恐惧症
- C、 神经症
- D、 精神分裂症
- E、 抑郁症

答案: A

28、 “传统模式” 的医患关系是指

- A、 医生是权威的,作出决定,病人听命于医生,执行医生的决定
- B、 与疾病相比,病人要重要得多,看病不应只看到疾病而应重视病人本身
- C、 病人是一个完整的人,身体和心理不能分割,两者均是医生考虑的重点
- D、 对病人的帮助不仅靠技术措施,还应充当教育、引导和促进的作用
- E、 医生未能掌握医疗新进展,使用陈旧的医学知识进行诊疗活动

答案: A

29、有关小儿的尿液性质,正确的是

- A、 新生儿尿渗透压平均为 200mmol/L
- B、 2 岁后尿渗透压接近成人水平
- C、 随机尿蛋白(mg/dl)/尿肌酐(mg/dl) ≤ 0.2
- D、 尿沉渣镜检红细胞 <5 个/HP
- E、 12 小时尿细胞计数红细胞 <100 万

答案: C

30、表面有结肠带的肠管

- A、 空肠
- B、 回肠
- C、 盲肠
- D、 阑尾
- E、 直肠

答案: C

31、急、慢性白血病的根本区别是

- A、 病程长短
- B、 贫血程度
- C、 出血程度
- D、 白血病细胞的数量
- E、 白血病细胞的分化程度

答案: E

32、对红核描述正确的是

- A、 发出红核脊髓束
- B、 支配骨骼肌运动
- C、 与小脑之间有往返的纤维联系
- D、 只接受对侧小脑的传入纤维
- E、 位于中脑下丘平面

答案: A

33、血浆脂蛋白琼脂糖凝胶电泳,从负极到正极的电泳图谱顺序是

- A、 CM→前 β -脂蛋白→ β -脂蛋白→ α -脂蛋白
 - B、 CM→ α -脂蛋白→前 β -脂蛋白→ β -脂蛋白
 - C、 α -脂蛋白→前 β -脂蛋白→ β -脂蛋白→CM
 - D、 CM→ β -脂蛋白→前 β -脂蛋白→ α -脂蛋白
 - E、 α -脂蛋白→ β -脂蛋白→前 β -脂蛋白→CM
- 答案： D

34、慢性感染是指病程超过

- A、 1 周
 - B、 2 周
 - C、 3 周
 - D、 1 个月
 - E、 2 个月
- 答案： E

35、下列不是扩张型心肌病的临床表现的是

- A、 肺动脉栓塞
 - B、 心包堵塞
 - C、 心力衰竭
 - D、 猝死
 - E、 心律失常
- 答案： B

36、典型支气管哮喘发作时,最主要的临床表现是

- A、 带哮鸣音的吸气性呼吸困难及双肺哮鸣音
 - B、 带哮鸣音的混合性呼吸困难,咯血
 - C、 带哮鸣音的混合性呼吸困难及双肺干湿啰音
 - D、 带哮鸣音的混合性呼吸困难,双肺呼吸音降低
 - E、 带哮鸣音的呼气性呼吸困难及双肺哮鸣音
- 答案： E

37、肝区叩击痛对下列诊断最有意义的是

- A、 肝硬化
 - B、 脂肪肝
 - C、 肝内胆管结石
 - D、 门静脉血栓
 - E、 肝脓肿
- 答案： E

38、慢性肺源性心脏病最多见的病因是

- A、 慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿
- B、 多发肺小动脉栓塞
- C、 严重胸廓及脊柱畸形
- D、 重症肺结核
- E、 支气管哮喘

答案： A

39、休克监测中最常用的项目是

- A、 心脏指数
- B、 血气分析
- C、 肺动脉楔压
- D、 中心静脉压
- E、 心排出量

答案： D

40、下列哪种激素是下丘脑分泌的

- A、 促甲状腺素释放激素 TRH
- B、 生长激素 GH
- C、 甲状腺素 T₄
- D、 促肾上腺皮质激素 ACTH
- E、 尿促卵泡素 FSH

答案： A

41、躁狂发作的睡眠障碍特点是

- A、 入睡困难
- B、 多梦
- C、 睡眠需求减少
- D、 早醒
- E、 睡眠过多

答案： C

42、干性支气管扩张的主要临床表现是

- A、 每年冬季、春季,咳嗽、咳痰
- B、 长期反复咯血
- C、 咳嗽、低热、乏力
- D、 高热、咳嗽、大量脓臭痰
- E、 咳嗽、喘息、活动后呼吸困难

答案： B

43、在婚恋与家庭的多因素系统中,最隐蔽的差异是

- A、 性格
- B、 生活习惯
- C、 兴趣爱好
- D、 人格深层的观念
- E、 经济条件

答案： D

44、冲击触诊法,检查者以三四个并拢的手指放于腹壁上的相应部位,与腹壁的角度是

- A、 $30^{\circ} \sim 50^{\circ}$
- B、 $50^{\circ} \sim 70^{\circ}$
- C、 $70^{\circ} \sim 90^{\circ}$
- D、 $90^{\circ} \sim 110^{\circ}$
- E、 $110^{\circ} \sim 130^{\circ}$

答案： C

45、苯丙酮尿症治疗的主要目的是

- A、 使头发及皮肤颜色转为正常
- B、 减少尿臭味
- C、 控制惊厥
- D、 减少皮肤湿疹
- E、 防止智力落后

答案： E

46、肝性脑病时,选用乳果糖口服,其主要治疗机理是

- A、 促进胃肠运动,排毒增加
- B、 乳果糖呈酸性,增加氨排出
- C、 使肠内呈酸性,减少氨的形成和吸收
- D、 乳果糖与 NH_3 结合
- E、 分解为乳糖、果糖, NH_3 生成减少

答案： C

47、慢性肾衰竭患者,以下哪种情况需要紧急处理

- A、 $\text{Hb} 55\text{g/L}$
- B、 $\text{K}^+ 7.5\text{mmol/L}$
- C、 $\text{HCO}_3^- 20\text{mmol/L}$
- D、 $\text{BP} 160/80\text{mmHg}$
- E、 $\text{Cr} 750\mu\text{mol/L}$

答案： B

48、有关隐睾的并发症,下列哪项是罕见的

- A、 造成不育
- B、 隐睾恶变
- C、 睾丸扭转
- D、 造成两性畸形
- E、 造成心理不良影响

答案: D

49、原发性肺结核典型 X 线表现是

- A、 哑铃型阴影
- B、 大片致密影,可出现蚕食样空洞
- C、 肺门淋巴结肿大
- D、 肺部球形病灶
- E、 散在的斑点状阴影

答案: A

50、慢性肾衰竭患者,临床出现高血磷和低血钙表现,其始发机制是

- A、 PTH 分泌增加导致骨钙释放
- B、 维生素 D₃活化减少导致肠道吸收钙减少
- C、 肾脏 GFR 降低导致肾脏排磷减少
- D、 代谢性酸中毒导致骨钙释放增加
- E、 消化道排磷减少

答案: C

51、早期先天梅毒的主要表现为

- A、 间质性角膜炎
- B、 骨膜炎
- C、 神经系统功能障碍
- D、 关节强直
- E、 皮肤黏膜损害

答案: E

52、可以确诊肝硬化的辅助检查方法是

- A、 血生化指标测定
- B、 B 超检查
- C、 CT 检查
- D、 胃镜检查
- E、 腹腔镜下加肝活检

答案: E

53、丙酮酸氧化时在哪个环节上进入呼吸链

- A、 CoQ
- B、 NADH-CoQ 还原酶
- C、 CoQH₂-Cyt b
- D、 Cyt 氧化酶
- E、 琥珀酸脱氢酶

答案： B

54、微血管扩张期血压下降的主要原因是

- A、 细胞缺氧
- B、 乳酸等酸性物质大量聚集
- C、 微动脉扩张
- D、 微静脉痉挛
- E、 血管内液体外渗

答案： E

55、肺气肿患者

- A、 肺弹性阻力增大
- B、 吸气困难明显
- C、 呼气困难明显
- D、 吸气时程延长
- E、 呼气时程缩短

答案： C

56、肺炎支原体肺炎最突出的临床症状是

- A、 年长儿多见
- B、 全身中毒症状不重
- C、 肺部体征不明显
- D、 高热
- E、 频繁、剧烈的咳嗽

答案： E

57、听到开瓣音常提示

- A、 二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全
- B、 二尖瓣严重狭窄,瓣膜钙化
- C、 二尖瓣狭窄分离术的禁忌证
- D、 二尖瓣狭窄伴左心衰竭
- E、 二尖瓣轻、中度狭窄,瓣膜弹性和活动性较好

答案： E

58、下列疾病最不可能是肺炎球菌肺炎的并发症的是

- A、 DIC
- B、 胸膜炎
- C、 心律失常
- D、 贫血
- E、 肺脓肿

答案： D

59、以下哪一项不符合双相情感障碍

- A、 躁狂与抑郁可交替发作
- B、 可首发为躁狂综合征
- C、 发病多与遗传因素有关
- D、 多发现为慢性迁延的病程
- E、 经充分治疗者产可彻底缓解

答案： D

60、喉腔的最狭窄处是

- A、 前庭裂
- B、 喉中间腔
- C、 声门下腔
- D、 声门裂
- E、 喉口

答案： D

61、关于生发中心的 FDC, 以下说法正确的是

- A、 这是 B 细胞分化中的一个阶段
- B、 这是一种脂肪细胞
- C、 始终与 T 细胞接触
- D、 这是具备抗原提呈能力的 DC
- E、 可将抗原浓缩、滞留在细胞表面

答案： E

62、肺间质是指

- A、 呼吸性支气管、肺泡管、肺泡囊
- B、 支气管、肺泡、间质腔
- C、 呼吸性支气管、肺泡管、肺毛细血管
- D、 肺泡间、终末气道上皮以外的支持组织, 包括血管和淋巴组织
- E、 各级支气管和肺泡结构

答案： D

63、颅内压增高引起的头痛特点是

- A、 较为少见
- B、 早晚较轻
- C、 额、颞部多见
- D、 头痛程度较少变化
- E、 头痛性质以阵发性隐痛多见

答案： C

64、我国门静脉高压症的最常见病因为

- A、 乙肝后肝硬化
- B、 丙肝后肝硬化
- C、 酒精性肝硬化
- D、 血吸虫性肝硬化
- E、 门静脉海绵样变性

答案： A

65、下列哪种药物可造成肾小管尿液高渗状态,减少水钠的重吸收

- A、 呋塞米
- B、 氢氯噻嗪
- C、 甘露醇
- D、 螺内酯
- E、 碳酸酐酶抑制剂

答案： C

66、人初乳含

- A、 糖类最高
- B、 蛋白质、糖类及脂肪均最低
- C、 脂肪量最高
- D、 脂肪量最少而蛋白质量最多
- E、 蛋白质量较低

答案： D

67、出现(足母)趾背伸肌力减弱的腰椎间盘突出间隙是

- A、 $L_1 \sim L_2$
- B、 $L_2 \sim L_3$
- C、 $L_3 \sim L_4$
- D、 $L_4 \sim L_5$
- E、 $L_5 \sim S_1$

答案： D

解析： D

68、汉坦病毒的主要宿主动物和传染源是

- A、 白纹伊蚊
- B、 鼠蚤
- C、 黑线姬鼠
- D、 人虱
- E、 亚洲璃眼蜱

答案： C

69、糖皮质激素类药物隔日疗法的给药方式是

- A、 隔日一次, 下午 4 时给药
- B、 隔日一次, 中午 12 时给药
- C、 隔日一次, 晨 8 时给药
- D、 隔日一次, 晚 8 时给药
- E、 隔日一次, 午夜 12 时给药

答案： C

70、强迫观念不包括下列哪一种症状

- A、 强迫性穷思竭虑
- B、 强迫性计数
- C、 强迫性怀疑
- D、 强迫性对立思维
- E、 强迫性回忆

答案： B

71、持续性枕后(横)位, 对母儿不良影响的描述, 下列哪项是错误的

- A、 易发生软产道裂伤
- B、 产程多数进展顺利
- C、 易发生生殖道瘘
- D、 产后出血发生率高
- E、 围生儿死亡率增高

答案： B

72、与运动调节有关的基底神经节结构不包括

- A、 旧纹状体
- B、 黑质

- C、 丘脑底核
- D、 新纹状体
- E、 杏仁核

答案： E

73、治疗小儿心力衰竭,最常选用的药物是

- A、 毛花甙丙
- B、 地高辛
- C、 多巴酚丁胺
- D、 多巴胺
- E、 钙剂

答案： B

74、我国急性肝衰竭最常见于以下哪种病毒性肝炎

- A、 甲型肝炎
- B、 乙型肝炎
- C、 丙型肝炎
- D、 丁型肝炎
- E、 戊型肝炎

答案： B

75、对于危重病人,医疗机构首先应当作出的处置措施是

- A、 立即汇报医疗机构负责人,确定抢救方案
- B、 立即征求家属意见,签署治疗知情同意书
- C、 立即抢救,对限于设备或者技术条件不能诊治的病人应当及时转诊
- D、 尽快帮助患者办理就诊手续,提供便利条件
- E、 在患者或其家属办完就诊手续后立即抢救

答案： C

76、母婴保健技术服务事项,下列表述不准确的是

- A、 有关母婴保健的科普宣传、教育和咨询
- B、 婚前医学检查
- C、 产前诊断和遗传病诊断
- D、 保障生殖健康
- E、 新生儿疾病筛查

答案： D

77、晚期产后出血发生的时间在

- A、 产后 2 小时~6 周

- B、 产后 24 小时~10 天
- C、 产后 24 小时~6 周
- D、 产后 48 小时~10 天
- E、 产后 6 周后

答案： C

78、链球菌可分为 20 个群,分群的根据是

- A、 P 抗原不同
- B、 C 多糖抗原不同
- C、 对氧的需要不同
- D、 M 蛋白不同
- E、 溶血素不同

答案： B

79、肺癌所致阻塞性肺炎有以下临床征象,除了

- A、 患者一般不发热或仅有低热
- B、 血白细胞计数常不增高
- C、 抗生素治疗后炎症很快吸收消散
- D、 经抗生素治疗炎症吸收后出现肿块阴影
- E、 短期内同一部位可反复出现炎症

答案： C

80、此图足月妊娠胎盘的大体图,下述哪项是错误的



- A、 重约 450~650g
- B、 厚 1~3cm
- C、 直径 18~20cm
- D、 中间厚
- E、 胎盘成椭圆形

答案： C

81、关于胫神经的叙述,错误的是

- A、 为坐骨神经主干的延续
- B、 在腘窝内,胫神经位于腘血管的浅面

- C、 在踝管内分为足底内侧神经和足底外侧神经
- D、 支配足底所有短肌
- E、 支配小腿外侧群肌

答案： E

82、在行腹股沟疝修补术中,术中不慎将髂腹股沟神经切断,下列哪项处理方法最适当

- A、 切断神经干作端口吻合
- B、 作双断端结扎
- C、 将切断的神经干埋入腹内斜肌内
- D、 用普鲁卡因作神经封闭
- E、 不作任何处理

答案： E

83、情绪认知理论认为决定情绪性质的关键因素是

- A、 认知过程
- B、 生理状况
- C、 环境刺激
- D、 行为模式
- E、 应激源

答案： A

84、下列传染病一般在发病 1~6 天内出疹,出疹时间先后顺序正确的一组是

- A、 猩红热—天花—麻疹—风疹—斑疹伤寒—伤寒
- B、 风疹—猩红热—麻疹—天花—斑疹伤寒—伤寒
- C、 风疹—猩红热—天花—麻疹—伤寒—斑疹伤寒
- D、 风疹—猩红热—天花—斑疹伤寒—麻疹—伤寒
- E、 风疹—猩红热—天花—麻疹—斑疹伤寒—伤寒


答案： E

85、不符合小细胞癌的描述是

- A、 常为中央型
- B、 支气管镜活检阳性率较低
- C、 起源于神经内分泌细胞
- D、 癌细胞常为燕麦样或淋巴细胞样
- E、 诊断时大多已有肺外转移

答案： B

86、如图所示正常胸部 X 线影像图像上, 该英文字母所代表的肺段为



- A、 左下叶内基底段
- B、 左下叶前基底段
- C、 左下叶外基底段
- D、 左下叶后基底段
- E、 左下叶背段

答案: E

87、尿酸性尿路结石表现不包括

- A、 泥沙样结石
- B、 尿频
- C、 血尿
- D、 肾绞痛
- E、 肾盂肾炎

答案: B

88、其中可见骨骼或牙齿阴影的纵隔肿瘤是

- A、 畸胎瘤
- B、 神经源性肿瘤
- C、 支气管囊肿
- D、 食管囊肿
- E、 恶性淋巴瘤

答案: A

89、诊断 I 型呼吸衰竭的血气诊断标准应是

- A、 动脉血氧含量 (SaO_2) 低于 20ml/dl
- B、 $\text{pH} < 7.35$
- C、 PaO_2 低于 8kPa (60mmHg), PaCO_2 低于 6.67kPa (50mmHg)
- D、 PaO_2 低于 8kPa (60mmHg), PaCO_2 高于 6.67kPa (50mmHg)
- E、 动脉血氧饱和度 (SaO_2) 低于 90%

答案: C

90、OCT 的目的,最可能是用于了解

- A、 子宫收缩的敏感性
- B、 胎儿储备能力
- C、 胎儿肺成熟度
- D、 胎儿胎盘功能
- E、 胎儿心脏功能

答案: B

91、锥体交叉

- A、 位于脑桥腹侧
- B、 位于中脑的大脚底
- C、 感觉传导束的交叉处
- D、 皮质脊髓束的交叉纤维
- E、 锥体外系纤维的交叉处

答案: D

92、腰椎结核临床常见的体征是

- A、 拾物试验(+)
- B、 “4”字试验(+)
- C、 Thomas 征试验(+)
- D、 Trendelenburg 征(+)
- E、 直腿抬高试验(+)

答案: A

93、以下属于Ⅲ型超敏反应性疾病的是

- A、 新生儿溶血症
- B、 输血反应
- C、 血清病
- D、 接触性皮炎
- E、 青霉素过敏性休克

答案: C

94、能增加毛细血管壁通透性的体液因子是

- A、 心肌抑制因子
- B、 组胺
- C、 儿茶酚胺
- D、 血栓素 A₂
- E、 血管加压素

答案: B

95、入口狭窄的临床表现, 下列哪项不正确

- A、 胎膜早破
- B、 内旋转困难
- C、 产力异常
- D、 胎位异常
- E、 衔接受阻

答案: B

96、关于妊娠诊断, 正确的是

- A、 黑加征是峡部极软, 宫体与宫颈似不相连
- B、 黑加征是宫体呈球形, 宫颈着色
- C、 黑加征是确诊妊娠的征象
- D、 体内 HCG 高峰在停经 40~48 天
- E、 体内 HCG 高峰在停经 4 个月时

答案: A

97、单纯型二尖瓣狭窄的典型表现不包括

- A、 心尖部第一心音增强
- B、 二尖瓣区舒张期杂音和收缩期杂音
- C、 X 线片肺淤血、梨形心影
- D、 超声发现二尖瓣活动曲线呈城垛状, 前后叶同向运动, 瓣口开放受限
- E、 窦性心律或心房纤颤

答案: B

98、下列哪项不是羊水栓塞的诱发因素

- A、 急产
- B、 剖宫产
- C、 子宫破裂
- D、 阴道分娩
- E、 前置胎盘

答案: D

99、尿毒症最早出现的症状是

- A、 心血管系统症状
- B、 血液系统症状
- C、 呼吸系统症状
- D、 神经精神和肌肉系统症状
- E、 胃肠道症状

答案: E

100、晕厥的临床表现不包括

- A、 短暂的意识丧失
- B、 有一过性广泛的脑供血不足所致
- C、 突然发作, 迅速恢复
- D、 发作时四肢肌张力消失而倒地
- E、 可以表现为持续的昏迷

答案: E

101、连续使用止血带的时间不宜超过

- A、 30 分钟
- B、 3 小时
- C、 2 小时
- D、 1 小时
- E、 4 小时

答案: D

102、5 岁以下儿童死亡的首位原因是

- A、 肺炎
- B、 化脓性脑炎
- C、 意外伤害
- D、 腹泻
- E、 营养不良

答案: C

103、脑外伤患者伤后意识障碍, 对言语无反应, 对痛刺激有回避动作, 此时意识程度为

- A、 清醒
- B、 模糊
- C、 浅昏迷
- D、 昏迷
- E、 深昏迷

答案: C

104、电镜下细胞凋亡的特征性改变是

- A、 细胞皱缩
- B、 胞浆致密
- C、 染色质边集
- D、 核碎裂
- E、 凋亡小体形成

答案： E

105、良性高血压最具特征性的动脉病变是

- A、 细动脉的玻璃样变
- B、 细动脉的纤维素样坏死
- C、 细小动脉内膜炎
- D、 动脉粥样硬化
- E、 动脉中层钙化

答案： A

106、患者,男,30岁,因中耳炎入院,经检查发现患者舌前 2/3 味觉传导障碍。其炎症可能损伤了什么结构

- A、 舌下神经
- B、 鼓索
- C、 舌咽神经
- D、 岩小神经
- E、 岩大神经

答案： B

107、患者,女,20岁,因右下腹包块剖腹探查。术中见:子宫正常大小,双输卵管,左卵巢、大网膜、阑尾外观未见异常,右卵巢包块直径 10cm,表面呈结节状,切面似脑组织,质脆。剥离的囊肿冰冻切片示:右卵巢未成熟性畸胎瘤。手术范围最佳应为

- A、 右附件切除术
- B、 右附件切除+子宫全切术
- C、 双附件切除+子宫切除术
- D、 双附件切除+子宫切除+大网膜切除
- E、 双附件+子宫+大网膜+阑尾切除

答案： A

108、患者,男,56岁,因头晕、恶心、水肿入院。既往高血压病史 20 年,有前列腺肥大,尿潴留史。贫血貌,血压 24/16kPa(180/120mmHg),B 超双肾缩小, BUN42mmol/L。哪种治疗不适宜

- A、 纠正贫血
- B、 血液透析
- C、 肾移植
- D、 降压治疗
- E、 给予低蛋白饮食加必需氨基酸疗法

答案： C

109、患者,女,28岁。4个月前曾因葡萄胎,在当地清宫2次,术后持续不规则阴道出血。近半月出现咳嗽,痰中带血丝。入院前突感头痛,恶心、呕吐。妇科检查:子宫增大,如孕2个月大。为确诊,下列无意义的是

- A、 诊断性刮宫
- B、 测血 HCG
- C、 盆腔超声
- D、 胸部 X 线摄片
- E、 头部 CT

答案: A

110、患者,男,35岁。上腹部规律性疼痛5年,多于秋季出现。1周以来每晚12点左右出现上腹痛。3小时前,患者进食后突然出现持续性剧烈腹痛,以上腹正中为重,不敢呼吸。腹部查体:板状腹,全腹压痛(+),反跳痛(+),肝浊音界消失,肠鸣音减弱。该患者可能的诊断为

- A、 急性胰腺炎
- B、 肠梗阻
- C、 十二指肠球部溃疡急性穿孔
- D、 幽门梗阻
- E、 急性胆囊炎

答案: C

111、患儿,男,3岁。高热、昏迷、抽搐2天于夏季就诊,疑为流行性乙型脑炎或中毒型痢疾,对两者的鉴别最有意义的临床表现是

- A、 起病是否急骤
- B、 是否有腹泻症状
- C、 是否有被蚊虫叮咬史
- D、 早期休克
- E、 DIC

答案: D

112、患者,男,67岁,因心前区痛就诊。心电图显示 S-T 段抬高,怀疑是心绞痛发作。如果处方中选用口服硝酸甘油,应选用较大剂量,是因为

- A、 胃肠道吸收差
- B、 在肠中水解
- C、 与血浆蛋白结合率高
- D、 肠道细菌分解
- E、 首过效应明显

答案: E

113、患者,男,58岁,慢性乙型肝炎20余年,肝大,质地硬,有明显压痛,近日因食入粗糙食物引起上消化道出血并诱发肝性脑病的发生,其主要机制是

- A、肠道细菌引起氨产生增加
- B、血浆胶体渗透压下降
- C、脑组织缺血缺氧
- D、血液苯乙胺和酪胺增加
- E、假性神经递质入脑

答案: A

114、患者,女,68岁,咳嗽伴胸痛胸闷1个月,CT检查如图,最可能的诊断为



- A、左上肺不张
- B、左上肺周围型肺癌伴胸膜转移
- C、左上肺血管瘤
- D、左上肺软骨肉瘤伴胸膜转移
- E、左上肺结核

答案: B

115、患者,男,35岁,平素无症状,体检胸骨左缘第3、4肋间3级收缩期杂音,心电图Ⅱ、Ⅲ、aVF呈QR型,Q波 $>1/4R$ 波,宽度 $>0.04s$,拟诊为“无症状性心肌缺血;下壁心梗不能除外”,转我院门诊确诊。以下检查最有帮助的是

- A、心电运动试验
- B、超声心动图
- C、核素心肌显像
- D、心肌酶检查
- E、冠状动脉造影

答案: B

116、青年女性患者于受凉淋雨后突发寒战、高热、胸痛、咳嗽、气急,咯铁锈色痰,体检左下肺有实变体征及湿啰音,治疗用药应首选

- A、安乃近
- B、地塞米松
- C、青霉素

D、 棕色合剂

E、 氨茶碱

答案： C

117、 年轻男性, 发热 5 天, 每天体温维持在 $39^{\circ}\text{C}\sim 41^{\circ}\text{C}$, 24 小时内体温波动相差不超过 1°C 。体检发现腹部玫瑰疹, 肝脾大。最可能的诊断为

A、 大叶肺炎

B、 流行性出血热

C、 风湿热

D、 疟疾

E、 伤寒

答案： E

118、 患者, 男, 53 岁。1 年前逐渐出现双下肢震颤, 休息时明显, 行动缓慢, 行走时小步向前冲, 面部表情少。最可能的定位诊断是

A、 壳核

B、 黑质

C、 尾状核

D、 丘脑底核

E、 内囊

答案： B

119、 患者, 男, 50 岁。胃溃疡已 15 年, 近日来节律性疼痛消失, 服胃药疗效不佳。为明确诊断, 首选的检查是

A、 胃镜

B、 X 线钡餐检查

C、 胃液分析


D、 便隐血试验

E、 血清促胃液素测定

答案： A

120、 患者, 女, 24 岁, 药物流产 10 日后再次就诊, 诉近几日白带增多, 带血丝, 有异味。妇检: 子宫附件正常, 扩阴器暴露阴道, 见后穹隆部有豆腐渣样块状分泌物, 宫颈口有少量血性黏液。分泌物涂片镜检发现如图所示病原体该病原体最

可能为



- A、单细胞真菌
- B、多细胞真菌
- C、丝状真菌
- D、支原体
- E、沙眼衣原体

答案： A

121、患者,女,33岁。发现晨起眼睑水肿1年,腰酸。体格检查:血压160/93mmHg,双踝部凹陷性水肿,血红蛋白101g/L,尿常规蛋白(++),红细胞10~15个/HP,白细胞0~3个/HP,24小时尿蛋白定量1.8g,血浆清蛋白34g/L,血Cr133.8 μ mol/L,BUN10.5mmol/L。最可能的诊断是

- A、缺铁性贫血
- B、急性肾小球肾炎
- C、慢性肾小球肾炎
- D、肾病综合征
- E、原发性高血压

答案： C

122、患者,男,31岁,2年前曾行阑尾切除术。阵发性腹部绞痛伴呕吐、肛门停止排便排气3天,腹胀2天,腹痛加剧且间歇期仍感剧痛。查体:右侧腹部较左侧膨隆,明显压痛、反跳痛、肌紧张,肠鸣音低、少。最可能的诊断为

- A、阑尾残株炎
- B、麻痹性肠梗阻
- C、绞窄性肠梗阻
- D、粘连性单纯性肠梗阻
- E、急性化脓性腹膜炎

答案： C

123、患者,男,30岁,溃疡病史10余年。突发上腹剧疼,迅速波及全腹。查体:腹部板状强直,广泛压痛、反跳痛,肝肺浊音界消失。腹部X线透视右膈下有新月状透亮影。首先应考虑

- A、 急性阑尾炎合并穿孔
- B、 绞窄性肠梗阻
- C、 急性胆囊炎合并穿孔
- D、 胃十二指肠溃疡急性穿孔
- E、 急性出血坏死性胰腺炎

答案： D

124、患者,男,17岁。右下肢肿胀,持续高热3天。查体:血压75/60mmHg,右下肢红、肿、压痛,腹股沟淋巴结肿大,右趾甲沟处结痂。患者最可能已发生

- A、 右趾甲沟炎
- B、 右下肢丹毒
- C、 脓毒症
- D、 感染性休克
- E、 低血容量性休克

答案： D

125、患者,女,35岁,慢性肠梗阻患者,1周来每日呕吐大量胃肠液,患者突发神志不清,肌痉挛性抽搐。查:P 130次/min, BP 80/60mmHg, 肱二头肌腱反射减弱,血清 Na^+ 120mmol/L, K^+ 3.5mmol/L, 尿比重1.010。下列治疗措施中错误的是

- A、 积极处理致病原因
- B、 补充血容量
- C、 晶体液用量一般要比胶体液用量大2~3倍
- D、 静滴高渗盐(5%氯化钠溶液)200~300ml
- E、 输注高渗盐水应严格控制滴速,每小时不应超过250ml

答案： E

126、患者,男,45岁,1小时前突然出现上腹剧痛,伴恶心,半小时后腹痛转移至右下腹,并向右肩部放射。全腹压痛,反跳痛及肌紧张,腹部未触及肿块,肝浊音界消失。血白细胞总数 $18 \times 10^9/\text{L}$ 。最可能的诊断是

- A、 急性阑尾炎
- B、 急性胰腺炎
- C、 消化性溃疡穿孔
- D、 绞窄性肠梗阻
- E、 急性胃炎

答案： C

127、患者,男,26岁。2周前感冒后出现口干、多饮、多尿,未重视。1天前因口干饮用大量碳酸饮料后突发昏倒,不能正确辨别时间、地点和周围亲人,但能保持简单的精神活动。患者意识状态应诊断为

- A、昏睡
- B、嗜睡
- C、意识模糊
- D、谵妄
- E、轻度昏迷

答案： C

128、初产妇, 39 周, 估计胎儿体重 3800g, 临产 16 小时, 宫口开 1cm, 以 5%葡萄糖、缩宫素 5U 静滴。4 小时后宫口开 9cm, 但产妇烦躁不安, 疼痛难忍, 腹部检查, 脐下两指处呈环状凹陷, 下段有压痛, 胎心正常, 导尿呈血性。最可能的诊断是

- A、羊水栓塞
- B、子宫破裂
- C、高张性子宫收缩乏力
- D、精神过度紧张
- E、先兆子宫破裂

答案： E

129、患者, 女, 22 岁。近来食量增加, 易怒, 出汗, 便频, 月经量少。如欲诊断甲状腺功能亢进, 下述哪项体征支持本诊断的价值最小

- A、脉压大
- B、安静时心率 116 次/min
- C、突眼
- D、甲状腺肿大
- E、甲状腺部位闻血管鸣音

答案： A

130、患者, 男, 66 岁, 脑干出血 10ml, 入院时深昏迷, 无自主呼吸, 接诊后立即给予气管插管, 呼吸机辅助呼吸, 随后进行侧脑室穿刺外引流术和血肿腔的立体定向穿刺外引流术, 术后自主呼吸恢复, 逐渐脱离呼吸机。在上述疾病发展过程中, 患者出现呼吸衰竭的主要机制是

- A、限制性通气不足
- B、阻塞性通气不足
- C、弥散障碍
- D、解剖分流增加
- E、肺泡通气血流比例失调

答案： A

131、患者, 男, 66 岁, 体检发现主动脉瓣狭窄伴心肌肥厚, 活动及休息时均无不适。患者目前为心力衰竭哪一阶段

- A、前心衰阶段
- B、前临床心衰阶段
- C、临床心衰阶段
- D、难治性终末期心力衰竭阶段
- E、顽固性心力衰竭阶段

答案： B

132、休克患者经补液处理后, 血压仍低, 中心静脉压不高, 10 分钟内经静脉补充等渗生理盐水 250ml, 如血压升高而中心静脉压不变, 提示

- A、血管张力过高
- B、心功能不全
- C、血容量过多
- D、血容量不足
- E、无法判断

答案： D

133、家长带 5 个月的婴儿进行营养咨询, 要开始添加辅助食品, 你认为在该月龄应该添加哪一项最为合适

- A、菜汤、鱼肝油
- B、配方米糊
- C、粥、饼干
- D、软饭、肉糜
- E、蛋炒饭、苹果

答案： B

134、疝容物为部分肠管壁者为



- A、滑动疝
- B、Littre 疝
- C、难复性疝
- D、Richter 疝
- E、闭孔疝


答案： D

135、患者, 男, 35 岁, 甲亢合并周期性瘫痪的血钾低是因为

- A、 钾排出过多
- B、 钾离子在体内重分布
- C、 甲亢致饮食不好
- D、 甲亢致钾离子不能吸收
- E、 甲亢致慢性腹泻

答案： B

136、女性患者心脏听诊时可闻及心搏脱漏, 心电图如图所示, 诊断考虑



- A、 二度 I 型房室阻滞
- B、 二度 II 型房室阻滞
- C、 一度房室阻滞
- D、 三度房室阻滞
- E、 以上均不正确

答案： A

137、患者, 男, 49 岁, 双手遇冷变紫变白半年, 手指皮肤变厚发硬 3 月, 伴吞咽困难、辅助检查 ACA(+), 诊断 CREST 综合征, 关于该综合征说法不正确的是

- A、 可有颈部受累
- B、 内脏受累出现晚
- C、 可有手指软组织钙化
- D、 10 年生存率 50%以下
- E、 可有毛细血管扩张

答案： D

138、患者, 男, 48 岁, 主诉复视(双物象)。医生检查发现左眼内收障碍, 并左眼角膜反射缺失。损伤部位最有可能是

- A、 眶下裂
- B、 视神经孔
- C、 眶上裂
- D、 圆孔
- E、 卵圆孔

答案： C

139、患者,男,50岁,既往体健。2个月前反复感下腹隐痛,时有腹胀感,排便欠畅,无脓液。大便隐血(++),直肠指检阴性。应首先选择的诊断手段是

- A、 定期复查大便隐血
- B、 便培养
- C、 纤维结肠镜
- D、 钡剂灌肠
- E、 B超

答案： C

140、患儿,男,3岁,因发热入院,既往史患儿多次发生肺炎,发病同时伴随心悸、气短等,心脏彩超检查发现患儿室间隔膜部发生缺损,关于室间隔膜部正确的说法是

- A、 室间隔缺损多发生于室间部
- B、 分隔右心室流出道与左心室流入道
- C、 后上部分隔右心室与左心房
- D、 占室间隔的 1/2
- E、 借二尖瓣前瓣分为两部

答案： A

141、患者,男,30岁,发现双下肢水肿6天。检查:血压 150/95mmHg。Hb120g/L;尿蛋白(++++),RBC4~6个/HP,24小时尿蛋白定量 4.5g;血 ALB 28g/L, BUN 10mmol/L, Cr 126 μ mol/L。最可能的诊断是

- A、 高血压病肾病
- B、 肾病综合征
- C、 急性肾炎
- D、 急进性肾炎
- E、 隐匿性肾炎

答案： B

142、一男孩因外伤损伤左眼球,手术后不久左眼球出现红肿热痛等炎症反应症状,该眼球局部的炎症反应针对的抗原属于

- A、 自身抗原
- B、 异嗜性抗原
- C、 同种异型抗原
- D、 独特型抗原
- E、 异种抗原

答案： A

143、一例贫血患者,红细胞 $2.8 \times 10^{12}/L$, 血红蛋白 7.6g/L, 网织红细胞 0.011, 给予铁剂口服治疗后 1 周复查, 红细胞和血红蛋白未见明显改变, 网织红细胞 0.046, 对此例的进一步治疗最应采取

- A、 继续口服铁剂
- B、 增大口服铁剂的剂量
- C、 应用注射铁剂
- D、 给予输血
- E、 改用维生素 B₁₂ 和叶酸

答案: A

144、患者, 女, 32 岁, 进行性膀胱刺激征, 经抗生素治疗不见好转, 伴右侧腰部胀痛及午后潮热。最合理的治疗措施是

- A、 积极对症治疗
- B、 服碱性药, 减轻尿路刺激症状
- C、 用抗真菌药
- D、 联合应用抗生素, 作局部处理
- E、 抗结核治疗

答案: E

145、患者, 女, 28 岁, 妊娠 3 个月, 经确诊妊娠合并急性胰腺炎。下列哪一项措施是错误的

- A、 禁食、胃肠减压
- B、 纠正酸碱及水电解质平衡紊乱
- C、 应用抗生素
- D、 给予阿托品解痉治疗
- E、 为防止炎症扩散危及孕妇生命, 应立即手术, 并终止妊娠

答案: E

146、患者, 男, 55 岁, 心电图检查显示胸导联 T 波直立, u 波倒置, 下列说法正确的是

- A、 多提示心肌病
- B、 多提示冠心病
- C、 多提示肺心病
- D、 多提示心包积液
- E、 多提示低钾血症

答案: B

147、患者, 女, 35 岁, 严重哮喘已 1 日, 张口呼吸, 大汗, 发绀, 双肺布满哮鸣音, 痰黏稠, 不易咳出。此时最有效的祛痰方法是

- A、 使用棕色合剂或氯化铵
- B、 使用抗生素
- C、 补充液体,纠正失水
- D、 雾化吸入
- E、 使用肾上腺皮质激素

答案: C

148、一位 65 岁退休的女士,去墨西哥度假并食用当地食物。36 小时后,她出现了大量的水样腹泻伴腹痛。她被诊断为大肠埃希菌相关性腹泻。下列哪种大肠埃希菌产生耐热和不耐热肠毒素

- A、 EIEC
- B、 ETEC
- C、 EHEC
- D、 EPEC
- E、 EAEC

答案: B

149、患者,男,28 岁。从三楼摔下左腹部跌伤,左侧第 7、8 肋骨骨折,脾破裂。入院时精神紧张, T38.5℃,面色苍白,四肢冰冷,脉搏细速,脉搏 110 次/min,血压 130/100mmHg,尿量减少。该患者的休克状态处于

- A、 休克前期
- B、 中度休克
- C、 重度休克
- D、 冷休克
- E、 暖休克

答案: A

150、患者,男,74 岁,咳嗽,咳痰 1 月余,咯血丝痰 1 周伴胸痛,胸片如图所示,最可能的诊断为



- A、 右上肺浸润型肺结核
- B、 右上肺不张

- C、 右侧中央型肺癌并右上肺不张
- D、 右侧包裹性积液
- E、 右肺上沟瘤

答案： C

151、患者,男,36 岁。右肾疼痛 3 天。尿常规:红细胞充满/HP,白细胞 2~3/HP。尿路平片可见右下段输尿管走行区高密度阴影 0.6cm。IVU 可见右输尿管下段结石,其上输尿管轻度扩张,右肾轻度积水。患者中西药物治疗和大量饮水及活动后绞痛解除,突然出现尿流中断及排尿终末痛,原因是

- A、 急性前列腺炎
- B、 结石在输尿管间壁段
- C、 结石到膀胱
- D、 结石到尿道
- E、 尿道炎

答案： C

152、患者,女,33 岁,劳累后心悸气促 7 年。检查:二尖瓣面容,第一心音亢进,心尖部可闻及隆隆样舒张期杂音,有开瓣音, $P_2 > A_2$,心律规则,本次为气促不能平卧伴咯血入院。该病例首先采取的治疗措施最合理的是

- A、 吸氧
- B、 镇咳剂
- C、 呋塞米静脉注射
- D、 毛花苷 C 静脉注射
- E、 止血剂

答案： C

153、一烧伤患者入院后 2 天出现寒战、高热,体温 40~41℃,呈弛张热,创面渗出绿色脓液伴有生姜味。实验室检查:白细胞总数和中性粒细胞升高,核左移并出现细胞内中毒性颗粒,嗜酸性粒细胞减少。临床诊断败血症,其病原菌可能是

- A、 大肠埃希菌
- B、 金黄色葡萄球菌
- C、 变形杆菌
- D、 铜绿假单胞菌
- E、 白假丝酵母菌

答案： D

154、患者,女,31 岁,闭经半年。查体:子宫略小,附件无特殊,孕激素试验阴性,雌孕激素试验阳性,血 FSH 为 15U/L。其最佳处理原则为

- A、 促性腺激素治疗

- B、 诱发排卵
- C、 口服溴隐亭
- D、 性激素人工周期
- E、 抗结核治疗

答案： D

155、足月儿,男,9天,出现呼吸急促、口唇发绀、吸气性凹陷1天。血气分析示血氧分压 45mmHg。鼻导管吸氧后,发绀及三凹征消失,氧分压上升至 68mmHg。初步诊断为

- A、 新生儿呼吸窘迫综合征
- B、 新生儿湿肺
- C、 先天性心脏病
- D、 动脉导管未闭伴肺高压
- E、 新生儿肺炎

答案： E

156、患者,男,30岁。3周前出现为尿道内不适,刺痛及烧灼感,并伴有不同程度的尿频、尿急、尿痛。尿道口轻度红肿并有浆液分泌物,附睾肿大,有触痛,分泌物镜检未见革兰阴性双球菌,最有可能是何种病原体感染

- A、 沙眼衣原体
- B、 淋球菌
- C、 梅毒螺旋体
- D、 人巨细胞病毒
- E、 白假丝酵母菌

答案： A

157、患儿,1岁,诊断为狭颅症,该患儿眼部可能出现下列症状,除了

- A、 眼球突出
- B、 眼球内陷
- C、 闭目不能
- D、 斜视
- E、 眼距异常

答案： C

158、某患者颈静脉压为 637Pa (65mmH₂O),肝大,腹水。以下支持心包积液的诊断而可以排除扩张性心肌病所致右心衰竭的是

- A、 心脏双侧增大
- B、 肝颈静脉反流征阳性
- C、 肺无啰音

D、奇脉

E、发绀

答案：D

159、患者,女,52岁,有“风心病”病史。入院后检查心电图:心室率85次/分,电轴 150° ,P I、P II、P aVL切迹明显,P波时限 $>0.13s$, V_1 Ptf为 $0.08mm \cdot s$, $V_1R/S>1$, $V_5R/S<1$,P-R间期 $0.22s$ 。应考虑为

A、右心室肥大

B、左心房、右心室肥大

C、右心房、右心室肥大

D、左心房、右心室肥大伴一度房室传导阻滞

E、右心室肥大伴一度房室传导阻滞

答案：D

160、患者,男,25岁,咳嗽、咳痰、胸痛、发热3天。查体:体温 $39.0^{\circ}C$,脉搏120次/min,血压 $16/9.3kPa$ (120/70mmHg),右下肺叩诊浊音,语颤增强,可闻支气管呼吸音。血常规:WBC $16 \times 10^9/L$,N80%。胸片示右下肺片状模糊阴影。考虑首先选用下列哪种药物

A、毛花苷C

B、氨茶碱

C、泼尼松

D、青霉素

E、先锋霉素

答案：D

161、患者,女性,17岁,学生,近1月来无明显诱因反复突发心慌、呼吸困难、大汗伴濒死感,持续十余分钟可自行缓解。发作间歇期也心神不宁,担心再发。既往体健,各项辅助检查均未见异常。该患者最适合的药物治疗方案是

A、单用奥氮平治疗

B、阿普唑仑联合多塞平治疗

C、艾司唑仑联合奥氮平治疗

D、阿普唑仑联合氟西汀治疗

E、阿米替林

答案：D

162、患儿,男,1岁。发热、神萎、呕吐3天,查体:神志模糊,血压测不出,颈项强直,皮肤有淤点、淤斑,肢端冰凉。引起患儿出现上述改变最可能的病原体是

A、肺炎链球菌

B、脑膜炎双球菌

- C、 大肠埃希菌
 - D、 结核杆菌
 - E、 葡萄球菌
- 答案： B

163、患者,女,30岁,头昏发热半年,无奎尼丁等药物应用史,巩膜黄染,Hb $90\times 10^9/L$,网织红细胞0.2,PLT $100\times 10^9/L$,Coombs 试验阳性。患者首选的治疗是

- A、 脾切除
 - B、 泼尼松
 - C、 硫唑嘌呤
 - D、 甲氨蝶呤
 - E、 丙卡巴肼
- 答案： B

164、患者,女性,20岁,因“反复发作性紧张、恐惧,伴胸闷、气促1月”来诊。近1月来患者于工作中无明显诱因突然出现紧张、恐惧、心慌、胸闷、气促、手脚冰凉、大汗,伴濒死感。发作间歇期患者仍心有余悸,担心再次发作,这一现象是

- A、 预期性焦虑
 - B、 回避行为
 - C、 惊恐发作
 - D、 被害妄想
 - E、 关系妄想
- 答案： A

165、某患者出现尿量增多,尿中检出红细胞及尿蛋白,血肌酐增加,血钾浓度降低。该患者可能的诊断为

- A、 急性肾衰竭多尿期
 - B、 非少尿型急性肾衰竭
 - C、 急性肾衰竭恢复期
 - D、 慢性肾衰竭早期
 - E、 肾性急性肾衰竭
- 答案： D

166、患者,男,55岁,教师。讲课时突然昏倒在讲台,呼之不应急送医院。体检:血压26/10kPa,昏迷,左侧瞳孔5mm,右侧瞳孔3mm,右侧肢体无力,呼吸深慢。下列处理不妥的是

- A、 20%甘露醇静脉滴注

- B、 保持呼吸道通畅
- C、 为明确诊断, 立刻行腰穿检查
- D、 调整血压
- E、 观察生命体征

答案: C

167、患者, 男, 88 岁, 肠梗阻、感染性休克入院。心电图如图所示, 提示



- A、 窦性心动过缓
- B、 一度房室传导阻滞
- C、 二度 I 型房室传导阻滞
- D、 二度 II 型房室传导阻滞
- E、 三度房室传导阻滞

答案: C

168、患者, 男, 27 岁, 由于胸小肌瘫痪而无法向前和向下拉伸肩胛骨。最可能病情的原因是

- A、 锁骨骨折
- B、 臂丛后索损伤
- C、 喙突骨折
- D、 腋神经损伤
- E、 腋窝后壁缺损

答案: C

169、患者, 女, 23 岁, 转移性右下腹疼痛 2 天, 以“急性阑尾炎”收入院。拟在持续硬膜外麻醉下行阑尾切除术, 术前应常规给予

- A、 山莨菪碱
- B、 阿托品
- C、 东莨菪碱
- D、 新斯的明
- E、 毛果芸香碱

答案: B

170、患者, 男, 53 岁。头痛 3 小时, 呈持续性, 程度剧烈。查体: T36℃, 意识模糊, 烦躁, 脑膜刺激征阳性。该患者最可能的诊断是


- A、 蛛网膜下腔出血
- B、 脑炎
- C、 脑膜脑炎

D、 脑肿瘤

E、 脑梗死

答案： A

171、 患者, 女, 43 岁, 右腰部疼痛不适 2 年余, 加重 3 天, CT 及 MR 检查如图, 应



诊断为

A、 右肾癌

B、 右肾错构瘤合并出血

C、 右肾脂肪瘤

D、 右肾脂肪肉瘤

E、 右肾海绵状血管瘤

答案： B

172、 患儿, 6 岁。 临床无症状, 自幼发现心脏有杂音。 经检查确诊为先天性心脏病: 房间隔缺损。 下列哪项体检最有诊断意义

A、 胸骨左缘第二肋间收缩期杂音, 肺动脉瓣区第 2 音增强, 固定分裂

B、 心尖搏动增强

C、 右心室增大、 心前区隆起

D、 心尖部收缩期杂音

E、 肺动脉瓣区第二音单一

答案： A

173、 患儿, 女, 8 岁。 水肿 4 天, 尿色如浓茶, 伴头昏眼花一过性失明, 惊厥 1 次, 尿常规: 蛋白(+), RBC 20~30 个/HP。 首选的检查为

A、 肾活检

B、 测血压

C、 肾功能

D、 肾脏 B 超

E、 尿培养

答案： B

174、患者,男,30岁,右上腹痛伴反酸2年余。胃镜检查发现十二指肠球前壁有1.2cm×1.2cm溃疡,伴有陈旧出血(A₁期)。尿素酶试验阳性。最好的治疗应该是

- A、西咪替丁+氢氧化铝凝胶+甲硝唑
- B、硫糖铝+庆大霉素+甲硝唑
- C、前列腺素+阿莫西林+甲硝唑
- D、多潘立酮+雷尼替丁+甲硝唑
- E、奥美拉唑+阿莫西林+甲硝唑

答案: E

175、患者,女,25岁,劳累后发生全身水肿,尿少。查体:BP150/95mmHg,明显脱发,口腔多个溃疡。尿蛋白++,RBC+/HP,BUN、Cr均正常,Hb120g/L,A36g/L,G45g/L,ESR100mm/h。应首先考虑的疾病是

- A、急进性肾炎
- B、狼疮性肾炎
- C、急性肾炎
- D、慢性肾炎急性发作
- E、急性肾盂肾炎

答案: B

176、临床上发现,新生儿相比儿童,不易患感染性疾病,因为新生儿可以从母体获得天然被动免疫,请问新生儿从母体获得的免疫球蛋白主要是

- A、IgM和IgE
- B、IgG和IgD
- C、IgG和IgE
- D、IgM和IgG
- E、IgG和sIgA

答案: E

177、某疟疾患者突起畏寒、寒战、体温38.5℃,此时机体的变化是由于

- A、散热中枢兴奋导致的
- B、皮肤血管扩张导致的
- C、产热中枢抑制导致的
- D、体温调节功能障碍导致的
- E、调定点上移导致的

答案: E

178、患者,男,49岁,心悸气短,并有晕厥史6个月。X光片心影大小正常,彩色超声显示左房内团状回声,心电图正常。最适合的处理是

- A、 强心利尿治疗
- B、 冠状动脉造影
- C、 尽早体外循环下手术治疗
- D、 溶栓治疗
- E、 介入治疗

答案： C

179、患者,男,30岁。从高处跌下,左腰部着地,伤后腰痛并有肉眼全程血尿,有小血块。查体:P100次/min, BP110/70mmHg,左腰部青紫压痛,腹部无压痛反跳痛。可初步诊断为

- A、 膀胱损伤
- B、 输尿管损伤
- C、 脾损伤并肾损伤
- D、 肾损伤
- E、 肾挫伤

答案： D

180、患者,女,25岁。分娩后2个月突起寒战、高热($39\sim 40^{\circ}\text{C}$), WBC $14\times 10^9/\text{L}$,中性粒细胞85%,胸片示双肺边缘多个小片阴影,中有透光区。考虑最可能的诊断是

- A、 大叶性肺炎
- B、 血源性肺脓肿
- C、 支气管肺炎
- D、 肺结核
- E、 转移性肺癌

答案： B

181、患者,男,70岁,前列腺癌病史2年。为评估血栓前状态,下列可用来评估纤溶活性的检查中,有利于区分原发纤溶和继发纤溶的是

- A、 D-二聚体
- B、 FDPs
- C、 血浆组织型纤溶酶原激活剂
- D、 血浆纤溶酶原激活抑制剂-1活动测定
- E、 优球蛋白溶解时间

答案： A

182、患者,男,22岁。上腹疼痛20天,加剧2个小时,急诊入院。既往胃病史。查体:全腹压痛、反跳痛,呈板状腹,肝浊音界缩小,肠鸣音消失。腹腔穿刺抽出黄色混浊液体10ml, WBC $18\times 10^9/\text{L}$, N85%,诊断为腹膜炎。患者最可能发生的疾病是

- A、胃及十二指肠溃疡穿孔
- B、肝脓肿穿破
- C、阑尾炎
- D、肠穿孔
- E、腹腔淋巴结核穿破

答案： A

183、患者,女,28岁,双手遇冷变白后变紫1年,近1个月发展至双手常温下变紫不恢复正常皮色,进一步检查包括

- A、舒张试验
- B、指静脉造影
- C、温水试验
- D、指动脉压力测定
- E、 β 受体阻滞剂激发试验

答案： D

184、患者,女,68岁,腹痛腹胀半年余,进食后加重。今日晨起排便,粪便呈黑色、发亮,遂来就诊。考虑诊断为

- A、肛裂
- B、胆道结石
- C、幽门梗阻
- D、上消化道出血
- E、过敏性肠炎

答案： D

185、患者,男,45岁。半天前跑步后出现右下腹疼痛伴发热、畏寒,6小时前转至脐周疼痛。此时最应注意的腹部体征是

- A、脐周有无压痛
- B、McBurney点是否压痛
- C、墨菲征是否阳性
- D、季肋点有无压痛
- E、肠鸣音是否改变

答案： B

186、慢性髓性白血病患者异基因造血干细胞移植后1年,PCR-bcr/abl从阴性(0)转为阳性(5%),骨髓形态仍为缓解状态,首选治疗是

- A、伊马替尼
- B、联合化疗
- C、羟基脲
- D、观察

E、 供者淋巴细胞输注(DLI)

答案： A

187、患者,女,48岁,左乳肿物2个月来诊。查体:左乳外上象限3.5cm硬性不光滑肿物,基底活动,皮肤相应部位凹陷,与肿物粘连,左腋窝触到2个光滑活动硬性淋巴结,胸片及肝B超无异常发现,收入院。术先日针吸细胞学检查找到恶性细胞。治疗原则应选择

- A、 单纯乳房切除+放疗
- B、 保留胸肌的简化根治切除术
- C、 乳癌根治性切除术
- D、 乳癌根治性切除术+放疗
- E、 乳癌扩大根治性切除术

答案： D

188、患者,女,42岁,突然上腹痛1天,渐重,恶心,呕吐。来诊后急查血尿淀粉酶,均明显高于正常。该患最可能的病因为

- A、 胆道结石
- B、 急性胰腺炎
- C、 病毒感染
- D、 磺胺类药物
- E、 遗传或代谢障碍

答案： B

189、患者,男,68岁。进行性贫血1年,剧烈腰痛3个月,近日因喷嚏导致肋骨骨折。肝、脾未触及。血红蛋白90g/L,白细胞 $3.4 \times 10^9/L$,血小板 $70 \times 10^9/L$ 。红细胞沉降率120mm/h,尿蛋白(+++),血清蛋白电泳出现M蛋白,IgG增高,骨髓异常浆细胞60%。腰椎X线片示骨质疏松和圆形穿凿样溶骨损害。本例最可能诊断为

- A、 反应性浆细胞增多
- B、 淋巴瘤
- C、 良性单克隆丙种球蛋白增多症
- D、 原发性巨球蛋白血症
- E、 多发性骨髓瘤

答案： E

190、患者,男,45岁,乙型肝炎30年。近2个月来,乏力明显,大便溏泻,睡眠倒错,性格与前不同,易急躁。化验:GPT 125U, A/G 2.5/3.2,血氨 $80 \mu g/dl$ 。B超显示肝回声不均匀,增强,门脉内径1.6cm,少量腹水。下列哪项措施是最正确的

- A、 服镇静药,卧床休息

- B、应用抗生素控制腹泻
- C、不必用降血氨药物
- D、积极应用利尿剂
- E、禁止蛋白质饮食

答案： E

191、患者,女,40岁,因活动后气短5年,下肢水肿1年,发热2个月来门诊,检查 BP17.3/10.7kPa (130/80mmHg), 心率 106 次/min, 体温 38.6℃, 心尖部可闻双期杂音, 主动脉瓣第二听诊区可闻及叹气样杂音, 肝大 3.0 厘米。医生动员住院进一步诊治, 因最可能的后果是

- A、慢性心力衰竭水肿加重
- B、肺栓塞出现咯血
- C、肺内感染, 感染性休克
- D、感染性心内膜炎心衰加重
- E、心律失常, 心源性休克

答案： D

192、慢性肺源性心脏病患者, 近3日出现嗜睡, 头痛, 计算力、定向力障碍。查体: R 28 次/min, 多汗, 颞浅静脉充盈, 颈静脉怒张。双肺散在干、湿啰音。急检动脉血气分析: pH7.34, PaO₂ 57mmHg, PaCO₂ 80mmHg, HCO₃⁻ 20mmol/L, BE-2mmol/L, 诊断考虑为

- A、呼吸性酸中毒失代偿
- B、呼吸性酸中毒代偿期
- C、呼吸性酸中毒并代谢性酸中毒
- D、呼吸性酸中毒并代谢性碱中毒
- E、呼吸性酸中毒并呼吸性碱中毒

答案： A

193、患者,女,26岁,因阵发性右上腹痛、向右肩放射5天入院,伴皮肤瘙痒,大便灰白。查体: 皮肤巩膜黄染、腹软, 右上腹紧张, 墨菲征(+), 脾未扪及。B超: 胆总管及肝内胆管扩张, 胆囊肿大。化验 TB150 μmol/L, CB100 μmol/L, ALT200U/L, ALP223U/L, GGT320U/L, 尿胆红素强阳性, 尿胆原阴性。其黄疸属于

- A、肝细胞性黄疸
- B、肝内阻塞性黄疸
- C、肝外阻塞性黄疸
- D、溶血性黄疸
- E、体质性黄疸

答案： C

194、患者,男,34岁,口服敌敌畏30ml入院。经反复、大量注射阿托品后,原有症状消失,出现兴奋、心动过速、皮肤潮红、瞳孔极度扩大、视力模糊、排尿困难等症状。此时应该采用的治疗药物为

- A、加大阿托品剂量
- B、新斯的明
- C、毛果芸香碱
- D、解磷定
- E、烟碱

答案: C

195、成年女性,患肝炎已3年,反复发作,近几个月症状加重。查体:肝病面容,肝掌(+),皮肤轻度黄染,肝右季肋下2.0cm,质硬Ⅱ°,脾肋下2.0cm。肝功能化验ALT150U/L,碱性磷酸酶80U/L,血白蛋白35g/L,球蛋白35g/L,类风湿因子(+),甲胎蛋白410ng/ml。下面病理变化可能性最大的是

- A、广泛性肝细胞水肿及嗜酸性变性
- B、肝细胞呈点状或小灶性坏死
- C、肝小叶呈广泛的坏死及形成再生结节
- D、肝组织广泛坏死及淤胆,不见再生
- E、肝细胞呈碎片状坏死及肝小叶被纤维组织分割

答案: E

196、患者,女,56岁,突感胸部疼痛3小时,面色苍白,大汗淋漓,昏迷,左侧偏瘫,测血压190/100mmHg,超声心动图检查可见主动脉根部扩张、升主动脉呈真假双腔征。最可能的诊断是

- A、脑出血
- B、主动脉夹层
- C、短暂脑缺血发作
- D、主动脉窦瘤破裂
- E、急性心肌梗死

答案: B

197、腕管综合征时下列哪项不可能出现

- A、掌心痛觉障碍
- B、示指指尖痛觉障碍
- C、拇指指腹痛觉障碍
- D、拇对掌障碍
- E、拇内收障碍

答案: E

198、患儿,男,10岁,驼背、疼痛6个月,消瘦,贫血,无神经症状。经检查双肺浸润性结核,胸6~7结核,伴椎旁脓肿,ESR 112mm/h。以下治疗与本病不符合的是

- A、立即行病灶清除术
- B、全身支持疗法
- C、抗结核药物治疗
- D、卧床休息(硬板床)
- E、全身性抗结核药物治疗下作病灶清除术

答案: A

199、患儿,男,11岁,晨起眼睑水肿,血尿、少尿1周。血压180/105mmHg,既往无肾病史,尿沉渣:红细胞满视野,大小不一,可见大红细胞,棘形红细胞。患者血尿类型为

- A、均一性血尿
- B、非均一性血尿
- C、血红蛋白尿
- D、肾后性血尿
- E、暂时性血尿

答案: B

200、患者,男,30岁。骨折后进行手术,术后出现大片皮肤淤斑、血肿、关节出血,可能原因是

- A、血管舒缩功能紊乱
- B、血小板质的异常
- C、血小板量的减少
- D、凝血因子缺乏
- E、弥散性血管内凝血


答案: E

201、患者,女,60岁。因外阴瘙痒就诊于妇科,经外用药物治疗,症状可好转,但常复发,为进一步诊治,应首选

- A、涂片查真菌
- B、细菌培养
- C、血常规检查
- D、血糖测定
- E、涂片查细菌

答案: D


202、患者,男,27岁,根据所示图像,最可能的诊断是



- A、 盆腔肾
B、 腰段肾
C、 胸内肾
D、 肾下垂
E、 游走肾

答案: A

203、腹外斜肌腱膜形成的结构是



- A、精索内筋膜
B、腹股沟镰
C、腹股沟管深环
D、提睾肌
E、腹股沟韧带

答案: E

204、患者,女,停经 50 天,尿 HCG(+)。2 天前开始少量阴道流血,今晨流血增多,并腹痛加剧,随后排出一肉样组织后流血减少。查体:阴道内少许血,宫口闭,子宫前位,稍大,双附件(-)。处理应首选

- A、 观察,无特殊处理
B、 抗生素
C、 刮宫
D、 缩宫素
E、 HCG 测定

答案: A

205、患者，男。10年前左肾因外伤被切除，近2~3年经常右腰酸痛，时伴发热。尿培养(-)，B超发现右肾中度积水，尿路平片和排泄性造影提示右输尿管下段结石直径为1cm。血BUN 8mmol/L，Cr 105μmol/L。目前最妥当的处理是

- A、继续抗菌治疗
- B、手术摘除右输尿管结石
- C、右输尿管逆行插管引流肾盂尿
- D、中药排石治疗
- E、右肾造瘘术

答案： B

206、患者，男，63岁。因背部疼痛、虚弱和呼吸短促被送往急诊室。检查发现在膈肌主动脉裂孔处有腹主动脉瘤。下列结构最有可能被压缩的是

- A、迷走神经和奇静脉
- B、食管及迷走神经
- C、奇静脉和胸导管
- D、胸导管与迷走神经
- E、下腔静脉和膈神经

答案： C

207、患者，男，30岁。近半年来，旁人常发现其发愣，对别人提问无反应，持续约1~2分钟，同时伴有口唇咀嚼动作，1天出现数次。神经系统检查无异常。脑电示右颞局灶性尖波活动。可诊断为

- A、短暂性脑缺血发作
- B、失神发作
- C、复杂部分性发作
- D、神经官能症
- E、局限性阵挛发作

答案： C

208、患儿，男，12岁，3周前足跟红肿流黄水。1周后痊愈。10天前眼睑水肿，尿茶色。近2日尿少，视力模糊。血压19.95/12.6kPa(150/90mmHg)，最可能的诊断是

- A、肾炎性肾病
- B、肾结核
- C、肾盂肾炎
- D、急性肾炎合并高血压脑病
- E、急进性肾炎

答案： D

209、患者,男,27岁,教师。3年前戒毒,近1年来双下肢麻木、乏力,进行性加重,近1个月不能行走,便秘,排尿不畅。当地颅脑及胸腰椎CT(-)。检查:双下肢肌力4°,胸10以下痛觉减退,关节位置及音叉觉正常,下肢腱反射亢进,Babinski(+)。腰穿CSF压力160mmH₂O,细胞35×10⁶/L,蛋白1275mg/L,按脊髓炎治疗无效。查血RPR 1:32,TPHA 1:2560;腰穿CSF细胞25×10⁶/L,蛋白1344mg/L,RPR 1:2,TPHA 1:1280。该患者最有可能是什么疾病

- A、化脓性脊髓炎
- B、脊髓钩端螺旋体病
- C、脊髓血管梅毒
- D、病毒性脊髓炎
- E、结核性脊髓炎

答案: C

210、患者,男,38岁,反复上腹痛6月,疼痛无明显规律性,应用抗酸剂治疗腹痛有时能缓解,伴腹胀、食欲减退、消瘦明显,查体:贫血外观,左锁骨上未触及肿大淋巴结,腹部可触及一包块。粪隐血阴性。胃镜检查如下图。该患者最可能



的诊断是

- A、胃黄斑瘤
- B、胃癌
- C、胃溃疡恶变
- D、胃泌素瘤
- E、胃淋巴瘤

答案: E

211、患者,女,43岁,满月脸、皮肤紫纹、月经不规则3个月余,请结合所提供图像,作出诊断



- A、左肾上腺腺瘤
- B、左肾上腺嗜铬细胞瘤
- C、左肾上腺转移瘤
- D、左肾上腺腺癌
- E、左肾上腺增生

答案： D

212、患者，男，25岁，肾病综合征病史，因“发热、头痛1月”入院。查体：颈强直，颈胸距3横指，Babinski征阳性。脑脊液检查：压力大于330mmH₂O，白细胞数 $50 \times 10^6/L$ ，蛋白3.5g/L，氯化物98mmol/L，糖1.3mmol/L。本病最可能的诊断是

- A、隐球菌性脑膜炎
- B、流行性乙型脑炎
- C、化脓性脑膜炎
- D、结核性脑膜炎
- E、钩体病脑膜炎

答案： A

213、患者，男，39岁，近半年向心性肥胖，皮肤明显变黑，血皮质醇(8AM)66pmol/dl(正常值5~25pmol/dl)，血ACTH146μU/ml(正常值0~46μU/ml)，pH7.46，血钾2.8mmol/L，CT示双侧肾上腺增生，最可能诊断为

- A、双侧肾上腺增生
- B、肾上腺皮质腺瘤
- C、肾上腺皮质癌
- D、异位ACTH综合征
- E、原发性醛固酮增多症

答案： D

214、一患者反复干咳，且有低热、盗汗等症状，经纤维支气管镜检查证实为支气管内膜有一占位性病变。该患在听诊时可出现的体征为

- A、两肺布满干啰音
- B、支气管语音
- C、耳语音
- D、局限性干啰音
- E、局限性湿啰音

答案： D

215、患者，女，20岁，感冒后第3天出现心悸、气促，心率120次/min，心尖区第一心音减弱，有奔马律，有心尖区收缩期吹风样杂音2/6级。对确诊最有价值的检查是

- A、心电图
- B、血清抗“O”滴定度
- C、ESR
- D、超声心动图
- E、血清病毒中和抗体

答案： E

216、患者,女,71岁,进食时有梗阻感,进行性加重半年,影像检查如图,最可能的诊断是



- A、贲门失弛缓症
- B、食管癌并纵隔淋巴结转移
- C、食管良性狭窄
- D、反流性食管炎
- E、食管静脉曲张

答案： B

217、患者,男,45岁,吸烟10年,10支/日,咳嗽,咳少量白痰,有时喘息1年余,临床很难诊断是慢性阻塞性肺疾病还是支气管哮喘,下列哪项试验有助于鉴别

- A、过敏原试验
- B、支气管激发试验
- C、低氧激发试验
- D、运动试验
- E、支气管舒张试验

答案： E

218、患者,女,35岁,无肾病病史,突发肾小球肾炎,检查发现患者急性感染溶血性链球菌,已能检测出抗体。推测该患者肾小球肾炎的发病机制为

- A、溶血性链球菌直接感染肾脏所致
- B、细菌中的超抗原诱发炎症反应所致
- C、链球菌感染所产生抗体与具有共同抗原的肾组织发生交叉反应
- D、抗双链DNA抗体沉积于肾小球
- E、特发性自身免疫病

答案: C

219、患者,男,23岁。右胸刀刺伤1小时,呼吸困难、发绀,胸部广泛皮下气肿,脉细速,右胸叩诊鼓音,呼吸音消失,气管左偏。该患者最可能的诊断是

- A、支气管哮喘
- B、大叶性肺炎
- C、急性左心衰
- D、气胸
- E、肺不张

答案: D

220、患儿,2个月,牛乳喂养,未加其他食品,因反复无热惊厥1天入院。血钙 1.75mmol/L (7mg/dl),血镁 0.99mmol/L (2.4mg/dl),血糖 $5\sim 6\text{mmol/L}$ (100mg/dl),应首先选用的治疗是

- A、10%葡萄糖酸钙10ml,稀释后静脉滴注或缓注
- B、50%葡萄糖 $2\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{次})$,静脉注射
- C、25%硫酸镁 $0.2\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{次})$,肌肉注射
- D、维生素D₃30万单位,肌肉注射
- E、10%葡萄糖酸钙10ml,静脉快速推注

答案: A

221、患者,女,23岁。哺乳期。乳房胀痛,局部红肿,有明显压痛及波动感,体温 38.3°C 。诊断为乳房深部脓肿,应行切开引流最好采用

- A、乳房表面放射切口
- B、乳晕边弧形切口
- C、乳房下缘弧形切口
- D、在脓腔最低部位做切口对切口引流
- E、于红肿皮肤处切开引流

答案: C

222、患儿,女,10岁。因尿少,水肿逐渐加重1个月入院。入院时血压 $96/68\text{mmHg}$,全身水肿明显,并有腹水,无肉眼血尿,尿蛋白(++++) ,血浆总蛋白

45g/L, 白蛋白 21g/L, 血胆固醇 6.56mmol/L。采用激素治疗有效, 但停药后复发。
下列描述哪一项是错误的

- A、 发病与免疫功能障碍有关
- B、 肾小球滤过膜通透性增大
- C、 尿量减少, 有钠水潴留
- D、 血容量增多, 静力压升高
- E、 水肿与低蛋白血症有关

答案: D

223、患儿, 男, 8 个月。腹泻 4 天, 大便 10 余次/日, 量多, 呈蛋花汤样, 精神萎靡, 眼泪少, 尿少, 血清钠 133mmol/L, 皮肤弹性差, 唇红, 呼吸深快, 应诊断为

- A、 重度等渗性脱水, 酸中毒
- B、 轻度等渗性脱水, 酸中毒
- C、 重度低渗性脱水, 酸中毒
- D、 中度等渗性脱水, 酸中毒
- E、 中度低渗性脱水, 酸中毒

答案: D

224、患儿, 男, 10 岁, 突然出现高热, T 39.4℃, 寒战, 右膝关节处疼痛, 不愿活动, 皮温高。查: 右膝处压痛, 活动受限, WBC $15 \times 10^9/L$, 诊断为

- A、 急性化脓性骨髓炎
- B、 慢性骨髓炎
- C、 骨关节结核
- D、 骨肿瘤
- E、 骨关节炎

答案: A

225、患者, 女, 58 岁, 突然出现心慌, 伴短暂晕厥。心电图: 宽大畸形的 QRS 波群的心动过速, QRS 波群的振幅和波峰方向呈周期性改变, 围绕等电基线扭转。该患者诊断为

- A、 室上性心动过速伴室内差异性传导
- B、 窦性心动过速
- C、 阵发性室性心动过速
- D、 加速性室性自主心律
- E、 尖端扭转型室性心动过速

答案: E

226、患者,男,75岁,多年高血压及糖尿病史。脑血管意外后卧床2月余,近期出现尿路感染表现,但抗菌治疗无效。中段尿接种到沙保培养基,菌落乳白色奶油样,镜检圆形或卵圆形,有芽生孢子。以下药物可以选择的是

- A、 氨苄西林
- B、 阿莫西林
- C、 苯唑西林
- D、 氟康唑
- E、 氧氟沙星

答案: D

227、患儿,5岁,在餐厅吃饭时被热油烫伤会阴及双侧大腿,被紧急送往医院。院前的急救措施中正确的是

- A、 不要触动患儿,保留现场,以备专业人员判断病情
- B、 迅速除去衣物,给创面涂抹龙胆紫
- C、 迅速除去衣物,给创面进行冷疗
- D、 不要除去衣物,以防创面污染
- E、 就地予以清创

答案: C

228、某患者十二指肠球部溃疡病史8年,突发剧烈上腹痛,迅速波及全腹。查体:板状腹,全腹压痛,反跳痛,肌紧张,高度怀疑十二指肠球部溃疡合并穿孔。此时最有诊断价值的检查为

- A、 急性胃镜
- B、 饮水超声
- C、 X线钡餐
- D、 立位腹平片
- E、 吞线试验

答案: D

229、患者,女,72岁,因摔伤致左下肢疼痛、无法活动。入院心电图提示:HR58次/min,P波与QRS波无关,P波频率大于QRS波频率,PP间距和RR间距各自规则。考虑心电图诊断为

- A、 窦性心动过缓
- B、 一度房室传导阻滞
- C、 二度I型房室传导阻滞
- D、 二度II型房室传导阻滞
- E、 三度房室传导阻滞

答案: E

230、患者,男,45岁,饮酒后出现持续上腹部疼痛10小时,伴恶心呕吐。查体:T37.3℃,中上腹部压痛(+),无压痛反跳痛。血淀粉酶860U/L,诊断为急性胰腺炎,主要治疗方法是

- A、ENBD
- B、经皮置管引流
- C、坏死组织清除+置管引流术
- D、对症治疗
- E、禁食水+营养支持+维持水电解质平衡

答案: E

231、孕妇,27岁,妊娠35+4周。血压155/100mmHg,尿常规(-),无任何不适。考虑诊断是

- A、子痫
- B、轻度子痫前期
- C、重度子痫前期
- D、妊娠合并慢性高血压
- E、妊娠期高血压

答案: E

232、十二指肠球部溃疡患者近2天来每天解成形黑便1次,量约50g,最佳处理是

- A、禁食、输液、冷盐水洗胃、雷尼替丁注射
- B、流质、输液、口服去甲肾上腺素、硫糖铝
- C、禁食、输液、注射酚磺乙胺、雷尼替丁注射
- D、流质、输液、硫糖铝、雷尼替丁口服
- E、流质、输液、注射酚磺乙胺、雷尼替丁注射

答案: D

233、患者,男,45岁,间发心前区闷痛1个月,常夜间发作。发作时心电图Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段上抬考虑为冠心病心绞痛,在缓解期治疗中最好选用

- A、戊四硝酯
- B、普萘洛尔(心得安)
- C、异山梨酯
- D、地尔硫草
- E、双嘧达莫

答案: D

234、患者,女性,27岁,因“反复发作性紧张、恐惧,伴胸闷、气促半年”来诊。患者近半年来多次在与陌生人讲话时出现紧张、恐惧、心慌、胸闷、气促、手脚冰凉、大汗,伴濒死感。该患者最可能的诊断是

- A、广泛性焦虑障碍
- B、惊恐障碍
- C、恐惧症
- D、适应障碍
- E、分离转换性障碍

答案: C

235、患者,男,28岁,参加校运会长跑后发现尿蛋白(+),潜血(-)。休息1周后复查均正常。该患者尿检异常最可能是因为

- A、急性肾小球肾炎
- B、慢性肾小球肾炎
- C、功能性蛋白尿
- D、泌尿系感染
- E、溢出性蛋白尿

答案: C

236、患者,男,20岁,3周前发热,咽痛,1周前面部水肿,尿少,腰酸,每天排尿7~10次。Hb120g/L,尿蛋白(++),RBC(+++),WBC2~3个/HP。透明管型偶见,诊断最先考虑

- A、急性肾盂肾炎
- B、慢性肾炎急性发作
- C、急性肾小球肾炎
- D、急性膀胱炎
- E、隐匿性肾炎

答案: C

237、患者,男,54岁,上班时突然感到持续性左胸痛1小时,急查心电图示窦性心动过速,心率110次/min,室性期前收缩7次/min, $V_1 \sim V_5$ 导联T波明显高尖,以下处理错误的是

- A、静滴硝酸甘油
- B、给予 β 受体阻滞剂
- C、密切随访心电图
- D、吸氧
- E、暂不处理,门诊随访

答案: E

238、患者,男,42岁,药物引起急性肝衰竭,极度乏力伴明显恶心、呕吐,近两日出现昏睡。引起肝性脑病的原因错误的是

- A、氨中毒
- B、氨代谢紊乱
- C、低血糖
- D、酸碱失衡
- E、蛋白合成无障碍

答案: E

239、患者,男,低热1个月,右侧胸痛3天,胸部X线可见右侧肋膈角少量胸腔积液。关于该患者体征描述正确的是

- A、气管移向左侧
- B、右侧胸廓饱满
- C、右侧叩诊呈过清音
- D、右侧可触及胸膜摩擦感
- E、右侧肺泡呼吸音增强

答案: D

240、患者20岁,男性,学生。突然出现头疼,高热,呕吐,并呈谵妄状态,出现幻觉、言语及行为增多,颈强(+),克氏征(+),考虑患者为

- A、病毒性脑炎所致精神障碍
- B、结核性脑膜炎所致精神障碍
- C、化脓性脑膜炎所致精神障碍
- D、脑囊肿所致精神障碍
- E、颅内肿瘤所致精神障碍

答案: C

241、患者,女,48岁。月经淋漓不净,检查发现宫颈中糜,子宫稍大,活检为慢性子宫颈炎。下一步处理为

- A、宫颈诊断性锥形切除
- B、LEEP术后病检
- C、宫颈管搔刮
- D、止血治疗
- E、分段诊刮

答案: E

242、患者,女,26岁。分娩半月后出现发热,右下腹和脐周隐痛,伴腹泻,黄色糊状大便,每日2~3次,持续一月。查体发现右下腹压痛及肿块。白细胞 $9.0 \times 10^9/L$ 。考虑最可能的诊断是

- A、盲肠肿瘤
- B、阑尾脓肿
- C、产后盆腔感染
- D、回盲部结核
- E、伤寒

答案： D

243、患者上腹部疼痛 10 小时后转移至右下腹痛, 恶心不吐; 4 天后发现右下腹有一界限不清, 不活动、压痛性包块, 发热 38℃, WBC $14 \times 10^9/L$ 。最恰当的处理是

- A、抗感染治疗
- B、手术腹部引流
- C、纤维结肠镜检查
- D、作钡剂灌肠检查
- E、剖腹探查包块切除

答案： A

244、患儿, 男, 2 岁, 3 小时前误吸花生米阻塞气道, 呼吸困难, 烦躁不安。初步诊断发生了急性呼吸性酸中毒。试问此时机体的主要代偿调节方式是下列哪项

- A、肾脏的代偿调节
- B、肺脏的代偿调节
- C、肝脏的代偿调节
- D、细胞内外离子交换
- E、细胞外液中 HCO_3^- 缓冲系统的作用

答案： D

245、患者, 男, 45 岁。因肝硬化 3 年、腹水增多伴尿少 1 周入院。诊断为肝肾综合征。关于此疾病, 以下哪种说法不正确

- A、多发生在有腹水、黄疸的失代偿期肝硬化患者
- B、自发性少尿或无尿
- C、尿钠常偏低
- D、肾小球滤过率正常
- E、肾脏无重要的病理改变

答案： D

246、患儿, 男, 5 岁。因咳嗽、发热 5 天, 伴抽搐 1 天入院。体检: T 38.5℃, 精神萎靡, 皮肤淤点、淤斑, 项强, 两肺少许湿啰音, 四肢肌张力增高, 克氏征阳性、布氏征阳性, 巴氏征阴性。脑脊液白细胞 $2000 \times 10^6/L$, S 70%, 糖 1.5mmol/L, 蛋白 2.5g/L, 涂片找到 G⁻双球菌, 首选治疗为

- A、大剂量青霉素
- B、氨苄青霉素
- C、苯甲异噁唑青霉素
- D、氨苄青霉素+庆大霉素
- E、邻氯青霉素+庆大霉素

答案： A

247、患者,女,48岁。有高血压病史及冠心病家族史,反复前胸刺痛多年。对确诊最有意义的检查手段是

- A、动态心电图
- B、放射性核素
- C、超声心动图
- D、冠状动脉造影
- E、运动负荷试验

答案： D

248、患儿,男,7岁,出生后即发现心脏杂音,无明显症状。查体:无发绀,胸骨左缘第3~4肋间全收缩期杂音,较响且粗糙,肺动脉瓣区第二心音增强。最可能的诊断是

- A、房间隔缺损
- B、室间隔缺损
- C、先天性二尖瓣关闭不全
- D、动脉导管未闭
- E、肺动脉瓣口狭窄

答案： B

249、患者,男,42岁,肝硬化腹水。近3天来有发热,体温在38.5℃左右,腹痛伴腹水量增加就诊。腹水检查:外观淡黄,比重1.017,蛋白24g/L,细胞总数 $0.6 \times 10^6/L$,白细胞 $0.1 \times 10^6/L$,中性粒细胞80%。最可能的并发症是

- A、结核性腹膜炎
- B、门静脉血栓形成
- C、自发性腹膜炎
- D、肝肾综合征
- E、原发性肝癌

答案： C

250、患儿,男,4岁。反复“上感,肺炎”,血清IgG 350mg/dl(3.5g/L),末梢血淋巴细胞绝对数2000。结核菌素试验(+)。最可能的诊断是

- A、肺结核

- B、 细胞免疫缺陷病
- C、 迁延性肺炎
- D、 体液免疫缺陷病
- E、 联合免疫缺陷病

答案： D

251、患者,女,27岁。有慢性盆腔炎病史,近4天高热伴下腹痛。妇科检查:子宫正常大小,左附件区触及7cm×6cm大包块,压痛,余(-)。静脉使用抗生素72小时无效。对该病合理的处理为

- A、 理疗
- B、 中药
- C、 手术
- D、 后穹隆切开
- E、 抗生素

答案： C

252、患者,女,45岁。因单侧面颊部发作性针刺疼痛1年余就诊。疼痛持续时间较短,数秒钟至2分钟不等。体检该患者时应特别注意

- A、 面颊部有无压痛
- B、 两侧瞳孔是否等大
- C、 两侧眼球运动及光反射是否正常
- D、 面部疼痛觉及角膜反射是否正常
- E、 咽部感觉、运动是否正常

答案： D

253、右侧大腿刀刺伤10小时,伤口被手绢覆盖,去除手绢,伤口已无新鲜血流出,创缘皮肤稍红,无渗出物,下列处置错误的是

- A、 沿原伤口切除皮肤创缘皮肤1~2mm
- B、 3%过氧化氢溶液清洗
- C、 紧密缝合创口
- D、 伤口内留置盐水纱条
- E、 此切口可以延期缝合

答案： C

254、患者,女,54岁。尿色发红1周,无膀胱刺激症状,无发热,无腰痛。不必要的措施是

- A、 腹部CT
- B、 尿找结核菌
- C、 双肾、输尿管及膀胱B超检查

D、 减少活动,1 周后复查尿常规

E、 口服抗生素并行 KUB 检查

答案: B

255、一 30 岁患者,半年来尿频、尿痛、尿血及脓尿,抗生素治疗效果不佳,尿普通细菌培养(-)。为明确诊断,最重要的检查方法是

A、 尿路平片

B、 B 超

C、 CT

D、 排泄性或逆行性肾盂造影

E、 肾动脉造影

答案: D

256、患儿,1.5 岁。不会独立行走,智力落后,查体:眼距宽,鼻梁低平,伸舌,皮肤细嫩。小指短向内侧弯曲,通贯手。最可能的诊断为

A、 先天性甲状腺功能减低症

B、 唐氏综合征

C、 佝偻病活动期

D、 软骨发育不良

E、 苯丙酮尿症

答案: B

257、患者,男,46 岁,患慢性肾衰竭多年,准备进行透析治疗。以下他的心理社会条件哪项不利于透析治疗

A、 较多的防御态度

B、 较好的教育背景


C、 较高的治疗动机

D、 家属能够配合

E、 信任医务工作人员

答案: A

258、患者,女,55 岁。绝经后阴道排液半年余,行 MRI 检查,如图所示,最佳答案



是

A、 子宫内膜异位症

- B、 子宫颈癌
- C、 正常子宫
- D、 子宫肌瘤
- E、 子宫内膜癌

答案： E

259、患者,男,32岁,有溃疡病史,5小时饱食后劳动时突发剑突下撕裂样疼痛,逐渐发展至右下腹,仍以剑下为重。查体:T 37.3℃,P 88次/min,半卧屈曲位,面色苍白,腹部“板样”硬,压痛反跳痛(+)。下列最可能的诊断是

- A、 急性阑尾炎
- B、 输尿管结石
- C、 胃溃疡恶变
- D、 胃溃疡穿孔
- E、 原发性腹膜炎

答案： D

260、患者,女,49岁,慢性上腹痛3年。近1个月来,胃泌酸功能检查减低,胃镜复查仍显示胃黏膜萎缩,但活检新发现有灶性胃黏膜细胞呈中至重度不典型增生。应考虑

- A、 病情无变化
- B、 癌前病变
- C、 早期胃癌
- D、 病情稳定
- E、 恢复期

答案： B

261、患者,男,60岁。咳嗽咯血6个月,施行左上肺癌切除术后合并支气管胸膜瘘引起左脓胸;2个月后到门诊,须进行胸膜内胸廓成形术。关于预后,不正确的是

- A、 术后胸廓会塌陷
- B、 术后不能参加体力劳动
- C、 术后预后好
- D、 手术可能不成功,而再次手术
- E、 手术中出血多,危险性大

答案： C

262、患者,男,62岁,四氯化碳接触史,突发急性黄疸,2周内出现极度乏力伴明显恶心、呕吐,近两日出现昏睡,该患者昏睡的病因最可能是

- A、 低血糖昏迷

- B、 酮症酸中毒
- C、 肝性脑病
- D、 脑血管意外
- E、 酸碱失衡

答案： C

263、患者,男,48岁,诊断为主动脉夹层 Stanford A型,拟行升主动脉+主动脉弓置换及人工象鼻植入术,合适的体外循环方法为

- A、 常温体外循环
- B、 浅、中度低温体外循环
- C、 深低温低流量体外循环
- D、 深低温停循环
- E、 上、下半身分别灌注体外循环

答案： D

264、患者,女,24岁。婚后半年,因停经2个月,腹痛伴阴道流血3天来就诊。妇科检查:宫口见有胚胎样组织物堵塞,子宫2个月妊娠大小。B超显示如图,诊



断为

- A、 先兆流产
- B、 难免流产
- C、 不全流产
- D、 完全流产
- E、 习惯性流产

答案： B

265、患者,女,36岁。半年前开始发现面色逐渐变白,甲床颜色亦变浅。1周前开始出现活动后易疲乏来医院就诊。既往体检曾发现子宫肌瘤,未处理。该患者就诊时的面容可能是

- A、 急性病容
- B、 慢性病容
- C、 黏液水肿面容
- D、 贫血面容
- E、 苦笑面容

答案： D

266、患者,女,26岁,尿频尿急尿痛,终末血尿3个月。近来出现夜尿6~8次症状。尿常规检查:红细胞、白细胞、脓细胞均满视野,尿普通细菌培养阴性。尿路平片未见明显异常。按膀胱炎治疗已半年未见好转,高度怀疑

- A、尿道炎
- B、泌尿系肿瘤
- C、慢性肾盂肾炎
- D、泌尿系结核
- E、间质性膀胱炎

答案: D

267、患者,男,35岁,因心律失常入院,经24小时动态心电图检查,诊断为室上性心动过速,这种疾病最有可能是哪个解剖结构异常造成的

- A、窦房结
- B、房室束
- C、房室结
- D、右束支
- E、左束支

答案: C

268、患者,男,24岁。查体时发现包皮翻起后,龟头不能露出。该患者最可能的诊断是

- A、尿道下裂
- B、假两性畸形
- C、包茎
- D、包皮过长
- E、包皮过短

答案: C

269、患者,男,20岁,工人。小肠痿3天,厌食,恶心,软弱无力,尿少。查体:P110次/min, BP13/9kPa(100/70mmHg),眼窝凹陷,皮肤干燥。实验室检查:Hb160g/L, RBC 5.8×10^{12} /L, Ht55%, 血钠140mmol/L, CO₂CP24mmol/L。应诊为

- A、高渗性缺水
- B、等渗性缺水
- C、低渗性缺水
- D、代谢性酸中毒
- E、代谢性碱中毒

答案: B

270、患者,女,34岁,反复水肿,腰酸,乏力1月余。尿常规检查蛋白+,白细胞少许,红细胞少许,颗粒管型少许。诊断为慢性肾炎,体检时最可能发现水肿部位是

- A、踝部
- B、胫部
- C、阴部
- D、腹部
- E、眼睑

答案: E

271、参与病毒释放和病毒扩散的蛋白是

- A、流感病毒血凝素(HA)
- B、流感病毒核蛋白(NP)
- C、流感病毒神经氨酸酶(NA)
- D、流感病毒基质蛋白(MP)
- E、流感病毒RNA聚合酶(PA、PB1、PB2)

答案: C

272、可刺激机体产生中和病毒感染性的保护性抗体的蛋白是

- A、流感病毒血凝素(HA)
- B、流感病毒核蛋白(NP)
- C、流感病毒神经氨酸酶(NA)
- D、流感病毒基质蛋白(MP)
- E、流感病毒RNA聚合酶(PA、PB1、PB2)

答案: A

273、参与吸附宿主细胞的蛋白是

- A、流感病毒血凝素(HA)
- B、流感病毒核蛋白(NP)
- C、流感病毒神经氨酸酶(NA)
- D、流感病毒基质蛋白(MP)
- E、流感病毒RNA聚合酶(PA、PB1、PB2)

答案: A

274、丙型流感病毒缺乏的是

- A、流感病毒血凝素(HA)
- B、流感病毒核蛋白(NP)
- C、流感病毒神经氨酸酶(NA)
- D、流感病毒基质蛋白(MP)

E、 流感病毒 RNA 聚合酶 (PA、 PB1、 PB2)

答案： C

解析： C

(275~277 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 隐性感染
- B. 病原携带状态
- C. 潜伏性感染
- D. 显性感染
- E. 既往有过感染

275、 既往患过水痘, 10 年后患带状疱疹为

- A、 隐性感染
- B、 病原携带状态
- C、 潜伏性感染
- D、 显性感染
- E、 既往有过感染

答案： C

276、 既往患过黄疸型肝炎, 现无症状, 肝功能正常, 化验 HBsAg (-), 抗-HBc (+), 抗-HBs (+) 为

- A、 隐性感染
- B、 病原携带状态
- C、 潜伏性感染
- D、 显性感染
- E、 既往有过感染

答案： E

277、 既往患过伤寒, 现无症状, 胆汁培养有伤寒杆菌生长为

- A、 隐性感染
- B、 病原携带状态
- C、 潜伏性感染
- D、 显性感染
- E、 既往有过感染

答案： B

解析： B

(278~280 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 速发短暂反应
- B. 速发持续反应
- C. 迟发持续短暂反应

- D. 白细胞介导的内皮细胞损伤
- E. 内皮细胞连接发育不成熟

278、由严重烧伤引起的血管通透性升高属

- A、 速发短暂反应
- B、 速发持续反应
- C、 迟发持续短暂反应
- D、 白细胞介导的内皮细胞损伤
- E、 内皮细胞连接发育不成熟

答案： B

279、由 X 线损伤引起的血管通透性升高属

- A、 速发短暂反应
- B、 速发持续反应
- C、 迟发持续短暂反应
- D、 白细胞介导的内皮细胞损伤
- E、 内皮细胞连接发育不成熟

答案： C

280、由血管活性胺引起的血管通透性升高属

- A、 速发短暂反应
- B、 速发持续反应
- C、 迟发持续短暂反应
- D、 白细胞介导的内皮细胞损伤
- E、 内皮细胞连接发育不成熟

答案： A

解析： A

(281~282 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 尿中细菌表面有无抗体包裹
- B. 尿中细菌的血清型
- C. 尿原浆型菌株培养
- D. 尿细菌培养及菌株培养
- E. 尿沉渣涂片找细菌

281、区别肾盂肾炎是复发还是新的再感染

- A、 尿中细菌表面有无抗体包裹
- B、 尿中细菌的血清型
- C、 尿原浆型菌株培养
- D、 尿细菌培养及菌株培养

E、尿沉渣涂片找细菌

答案： B

282、区别膀胱炎和肾盂肾炎

A、尿中细菌表面有无抗体包裹

B、尿中细菌的血清型

C、尿原浆型菌株培养

D、尿细菌培养及菌株培养

E、尿沉渣涂片找细菌

答案： A

解析： A

(283~284 共用备选答案)

共用备选答案

A. 远端肾小管分泌氢离子功能障碍

B. 近端肾小管分泌氢离子功能障碍

C. 远端肾小管重吸收碳酸氢根离子功能障碍

D. 近端肾小管重吸收碳酸氢根离子功能障碍

E. 远端肾小管分泌氢离子或重吸收碳酸氢根离子功能障碍

283、I 型肾小管酸中毒是

A、远端肾小管分泌氢离子功能障碍

B、近端肾小管分泌氢离子功能障碍

C、远端肾小管重吸收碳酸氢根离子功能障碍

D、近端肾小管重吸收碳酸氢根离子功能障碍

E、远端肾小管分泌氢离子或重吸收碳酸氢根离子功能障碍

答案： A

284、II 型肾小管酸中毒是

A、远端肾小管分泌氢离子功能障碍

B、近端肾小管分泌氢离子功能障碍

C、远端肾小管重吸收碳酸氢根离子功能障碍

D、近端肾小管重吸收碳酸氢根离子功能障碍

E、远端肾小管分泌氢离子或重吸收碳酸氢根离子功能障碍

答案： C

解析： C

(285~288 共用备选答案)

共用备选答案

A. I A 期

B. I B 期

C. IV 期

- D. II 期
- E. III 期

285、子宫稍大, 活动, 附件(-), 病灶侵犯肌层超过 1/2, 分期为

- A、 I A 期
- B、 I B 期
- C、 IV 期
- D、 II 期
- E、 III 期

答案: B

286、宫腔 8cm, 阴道顶端已有浸润, 双侧增厚, 但未达盆壁, 分期为

- A、 I A 期
- B、 I B 期
- C、 IV 期
- D、 II 期
- E、 III 期

答案: E

287、子宫经产大小, 手术后切开子宫, 癌组织浸润达子宫深肌层, 分期为

- A、 I A 期
- B、 I B 期
- C、 IV 期
- D、 II 期
- E、 III 期

答案: B

288、子宫内膜癌手术病理报告: 肿瘤局限在子宫内膜, 分期为

- A、 I A 期
- B、 I B 期
- C、 IV 期
- D、 II 期
- E、 III 期

答案: A

解析: A

(289~291 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 尿有鼠尿臭味
- B. 嗜睡、腹胀、便秘
- C. 四肢细长

- D. 高腭弓、通贯手
- E. 智力正常

289、三体综合征(唐氏综合征)

- A、 尿有鼠尿臭味
- B、 嗜睡、腹胀、便秘
- C、 四肢细长
- D、 高腭弓、通贯手
- E、 智力正常

答案： D

290、苯丙酮尿症

- A、 尿有鼠尿臭味
- B、 嗜睡、腹胀、便秘
- C、 四肢细长
- D、 高腭弓、通贯手
- E、 智力正常

答案： A

291、先天性甲状腺功能减低症

- A、 尿有鼠尿臭味
- B、 嗜睡、腹胀、便秘
- C、 四肢细长
- D、 高腭弓、通贯手
- E、 智力正常

答案： B

解析： B

(292~293 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 产后出血
- B. 胎儿产伤
- C. 胎儿畸形
- D. 产褥感染
- E. 宫内感染

292、肩难产对产妇最大的危险是

- A、 产后出血
- B、 胎儿产伤
- C、 胎儿畸形
- D、 产褥感染

E、 宫内感染

答案： A

293、肩难产对胎儿最大的危险是

A、 产后出血

B、 胎儿产伤

C、 胎儿畸形

D、 产褥感染

E、 宫内感染

答案： B

解析： B

(294~296 共用备选答案)

共用备选答案

A. 人工主动免疫

B. 人工被动免疫

C. 自然主动免疫

D. 自然被动免疫

E. 被动-主动免疫

294、胎儿通过胎盘接受来自母体的抗体称为

A、 人工主动免疫

B、 人工被动免疫

C、 自然主动免疫

D、 自然被动免疫

E、 被动-主动免疫

答案： D

295、隐性感染或患传染病或获得免疫力称为

A、 人工主动免疫

B、 人工被动免疫

C、 自然主动免疫

D、 自然被动免疫

E、 被动-主动免疫

答案： C

296、接种疫苗和类毒素后获得免疫力称为

A、 人工主动免疫

B、 人工被动免疫

C、 自然主动免疫

D、 自然被动免疫

E、 被动-主动免疫

答案： A

解析： A

(297~298 共用备选答案)

共用备选答案

A. 股疝

B. 腹股沟直疝

C. 交通性鞘膜积液

D. 切口疝

E. 腹股沟斜疝

297、中年经产妇易发,且易嵌顿的疝是

A、 股疝

B、 腹股沟直疝

C、 交通性鞘膜积液

D、 切口疝

E、 腹股沟斜疝

答案： A

298、手术后有切口感染或裂开病史者易发

A、 股疝

B、 腹股沟直疝

C、 交通性鞘膜积液

D、 切口疝

E、 腹股沟斜疝

答案： D

解析： D

(299~300 共用备选答案)

共用备选答案

A. 蜘蛛痣

B. 脾大

C. 黄疸

D. 下肢水肿

E. 肝大

299、肝硬化低蛋白血症可表现

A、 蜘蛛痣

B、 脾大

C、 黄疸

D、 下肢水肿

E、 肝大

答案： D

300、门脉高压症可表现

- A、 蜘蛛痣
- B、 脾大
- C、 黄疸
- D、 下肢水肿
- E、 肝大

答案： B

1、引起艾滋病患者肺部感染的最常见的病原体是

- A、 肺炎球菌
- B、 葡萄球菌
- C、 链球菌
- D、 肺孢子虫
- E、 肺囊虫

答案： D

2、关于慢性呼吸衰竭病理生理的特点,下述改变错误的是

- A、 肺泡氧分压下降
- B、 肺泡毛细血管氧分压下降
- C、 肺泡-毛细血管二氧化碳分压差增高
- D、 动脉血二氧化碳分压增高
- E、 肺泡二氧化碳分压增加

答案： C

3、特拉唑嗪属于

- A、 α 受体阻滞剂
- B、 α 受体激动剂
- C、 β 受体阻滞剂
- D、 β 受体激动剂
- E、 5α 还原酶抑制剂

答案： A

4、薄束核和楔束核发出的纤维构成

- A、 薄束和楔束
- B、 脊髓丘脑束
- C、 三叉丘系
- D、 内侧丘系
- E、 外侧丘系

答案： D


5、某地区流动人口较多,要防止麻疹发病,最有效的措施是

- A、 肌内注射丙种球蛋白
- B、 易感者按时接种麻疹减毒活疫苗

- C、 患者停留过的房间应及时消毒
- D、 易感者不到人群密集的场所
- E、 对麻疹患者早发现, 早隔离, 早治疗

答案: B

6、急性蛔蚴性肺炎是由蛔虫幼虫在肺内移行所致, 其突出症状是



- A、 高热
- B、 咯铁锈色痰
- C、 阵发性咳嗽
- D、 呼吸衰竭
- E、 荨麻疹

答案: C

7、可以在国家药品监督管理部门指定的医学、药学专业刊物上介绍, 但不得在大众传播媒体发布广告的药物是

- A、 非处方药
- B、 处方药
- C、 进口药品
- D、 保健品
- E、 贵重药品

答案: B

8、患儿腹泻伴轻度脱水, 不呕吐, 拟用口服补液盐治疗, 其所含葡萄糖的适宜浓度及主要作用是

- A、 10%, 补充一定热量
- B、 5%, 使液体具有一定渗透压
- C、 15%, 增加小肠对水、钠的重吸收
- D、 20%, 使液体具有一定的渗透压
- E、 2%, 增加小肠对水、钠的重吸收

答案: E

9、关于颞浅动脉的叙述, 错误的是

- A、 该动脉发自颈外动脉
- B、 该动脉主要供应腮腺和额、颞、顶部软组织
- C、 其体表投影为该动脉的根部位位于外耳门的前方, 向上分为两大分支
- D、 其压迫止血部位为在外耳门前方可摸到动脉搏动, 然后将其压向颞骨
- E、 压迫该动脉, 其止血范围为项背部

答案: E

10、外阴硬化性苔藓与何种激素有关

- A、 睾酮
- B、 雌二醇
- C、 HCG
- D、 FSH
- E、 LH

答案: A

11、下列哪项不是子宫内膜癌的易发因素

- A、 冠心病
- B、 肥胖
- C、 绝经延迟
- D、 高血压
- E、 糖尿病

答案: A

12、关于妊娠期母体生殖系统的变化, 哪项是错误的

- A、 妊娠早期子宫呈球形
- B、 妊娠 12~14 周起出现不规则无痛性收缩称 Braxton Hicks 收缩
- C、 妊娠期间有乳汁分泌
- D、 妊娠期阴道黏膜变软
- E、 接近临产时, 宫颈管变短并出现轻度扩张

答案: C

13、哺乳期母亲患的疾病不影响继续哺乳的是

- A、 活动性肺结核
- B、 HIV
- C、 急性胃炎
- D、 严重精神病
- E、 恶性肿瘤

答案: C

14、关于特殊类型急性阑尾炎, 下列处理原则错误的是

- A、 小儿急性阑尾炎应手术治疗
- B、 老年人急性阑尾炎应及早手术
- C、 孕期 6 个月内发生的急性阑尾炎应早手术
- D、 孕期末 3 个月的急性阑尾炎禁忌手术
- E、 伴高血压的老年人急性化脓性阑尾炎也应手术

答案： D

15、慢性脓胸的外科治疗基本原则应除外

- A、 改善全身情况
- B、 消除致病原因
- C、 促进脓腔闭合
- D、 尽可能恢复肺功能
- E、 胸膜外胸廓改形术

答案： E

16、新婚夫妇半年后生育, 首选哪一种避孕方法

- A、 宫内节育器
- B、 短效口服避孕药
- C、 安全期避孕
- D、 皮下埋植避孕
- E、 避孕套

答案： B

17、高钾血症时常合并

- A、 碱中毒
- B、 酸中毒
- C、 高渗性脱水
- D、 低渗性脱水
- E、 等渗性脱水

答案： B

18、特发性肺纤维化的主要突出临床症状是

- A、 咳嗽、咳黄痰
- B、 咳嗽, 活动后胸痛
- C、 发热, 活动后气促
- D、 多发关节痛, 气促
- E、 干咳, 进行性呼吸困难

答案： E

19、关于骨巨细胞瘤的描述, 不正确的是

- A、 常在 20 岁以前发病
- B、 虽然是良性的,也要切除
- C、 长管骨末端常见
- D、 约 1/2 者有局部复发和转移
- E、 病变常由含有肿瘤的薄层骨包绕

答案: A

20、应激时免疫功能减弱,主要是由于

- A、 生长激素分泌增加
- B、 盐皮质激素分泌增加
- C、 糖皮质激素分泌增加
- D、 胰高血糖素分泌增加
- E、 胰岛素分泌减少

答案: C

21、以下体征不是动眼神经麻痹引起的是

- A、 眼外展不能
- B、 瞳孔散大
- C、 眼睑下垂
- D、 眼内收不能
- E、 瞳孔光反应消失

答案: A

22、确诊病毒性心肌炎的可靠依据是

- A、 持续发热 1~10 天
- B、 心尖部闻及第三心音
- C、 出现房室传导阻滞
- D、 外周血检出肠道病毒核酸
- E、 心肌内检出病毒

答案: E

23、以下关于痫性发作不正确的表述是

- A、 发作期及发作间期脑电图均有异常
- B、 可表现运动性、感觉异常发作
- C、 常表现发作性意识障碍
- D、 伴有情绪、内脏、行为改变
- E、 脑神经元过度异常放电导致短暂的神经功能异常

答案: A

24、鉴别中毒性菌痢与乙型脑炎的重要依据是

- A、 高热、昏迷、惊厥
- B、 季节性
- C、 粪便检查
- D、 脑脊液常规
- E、 发病年龄

答案： C

25、重症急性肝衰竭患者最有效的治疗手段是

- A、 保守治疗
- B、 肝叶切除
- C、 肝移植
- D、 人工肝治疗
- E、 透析治疗

答案： C

26、关于呼吸性酸中毒的描述,下列哪项是正确的

- A、 由 HCO_3^- 原发性增高引起
- B、 由 HCO_3^- 继发性增高引起
- C、 由 PaCO_2 原发性增高引起
- D、 由 PaCO_2 继发性增高引起
- E、 由 H_2CO_3 继发性增高引起

答案： C

27、浅Ⅱ° 烧伤创面临床表现为

- A、 轻度发红,轻痛,无水疱
- B、 剧痛,创面均匀发红,有水疱
- C、 痛觉迟钝,创面苍白,有水疱
- D、 痛觉迟钝,创面苍白,无水疱
- E、 痛觉消失,创面腊白,无水疱

答案： B

28、关于副神经检查,下列叙述哪项不正确

- A、 观察胸锁乳突肌及斜方肌有无萎缩
- B、 有无斜颈及垂肩
- C、 嘱患者转颈测试胸锁乳突肌的肌力
- D、 嘱患者耸肩比较两侧肌力
- E、 观察双上肢肌肉有无萎缩

答案： E

29、关于乙型肝炎病毒相关性肾炎,正确的是

- A、 女性患者明显多于男性
- B、 病理类型以膜性肾病最为常见
- C、 常有非肾性血尿
- D、 激素治疗敏感
- E、 半数患儿血清 C3 增高

答案： B

30、HSV-1 的主要潜伏部位是

- A、 上皮细胞
- B、 唾液腺
- C、 B 淋巴细胞
- D、 三叉神经节
- E、 骶神经节

答案： D

31、关于肺炎支原体肺炎, 哪项不正确

- A、 可有发热明显
- B、 起病缓慢
- C、 肺部可闻及湿啰音
- D、 多发生于 8 个月以下婴儿
- E、 病理特征为间质性改变

答案： D

32、脑血流的自动调节主要靠的是

- A、 血脑屏障通透性的变化
- B、 血压的升降
- C、 颅内血液黏稠度的改变
- D、 脑血管(阻力血管)的舒缩变化
- E、 体位的改变

答案： D

33、对于妊娠合并糖尿病, 以下哪一项是不恰当的

- A、 孕期控制饮食
- B、 用胰岛素控制血糖, 不影响胎儿
- C、 已有严重心血管病史, 肾功能减退者不宜妊娠
- D、 孕晚期估计胎儿成熟度
- E、 产后继续用产前所用胰岛素剂量

答案： E

34、关于葡萄胎的描述, 下列正确的是

- A、 属于妊娠滋养细胞肿瘤的一种
- B、 可分为完全性葡萄胎和部分性葡萄胎, 其中主要是部分性葡萄胎
- C、 病变可累及子宫肌层
- D、 葡萄胎是滋养细胞层发育异常, 属于胚胎组织发生的一种变形
- E、 葡萄胎又称水泡状胎块, 为妊娠后胎盘绒毛滋养细胞异常增生, 间质水肿, 转变为水疱样相连成串

答案: E

35、临产后子宫收缩特点, 下列哪项不正确

- A、 节律性
- B、 高张性
- C、 缩复作用
- D、 极性
- E、 对称性

答案: B

36、钙拮抗药对心脏的作用是

- A、 加快心率
- B、 加快传导
- C、 减弱心肌收缩力
- D、 扩张血管
- E、 抑制血小板聚集

答案: C

37、婴儿出现听觉定向反应最早的时间为

- A、 1 个月
- B、 2 个月
- C、 3~4 个月
- D、 5~6 个月
- E、 7 个月

答案: C

38、流行性乙型脑炎的传播途径主要通过

- A、 借飞沫呼吸道传染
- B、 粪便污染水源和食物经口传染
- C、 输血输入乙脑病毒
- D、 带病毒的蚊虫叮咬经皮肤入血
- E、 苍蝇作为媒介污染食物经口传染

答案: D

39、典型的霍乱临床分期为

- A、 泻吐期和恢复期
- B、 泻吐期和反应期
- C、 泻吐期、脱水虚脱期和恢复及反应期
- D、 脱水虚脱期和反应期
- E、 发热期、泻吐期和反应期

答案： C

40、属于 5 α 还原酶抑制剂的是

- A、 他达拉非
- B、 阿夫唑嗪
- C、 西地那非
- D、 坦索罗辛
- E、 非那雄胺

答案： E

41、目前尚未广泛用于预防病毒感染性疾病的疫苗是

- A、 类毒素
- B、 减毒活疫苗
- C、 灭活疫苗
- D、 核酸疫苗
- E、 基因工程疫苗

答案： D

42、下列肾脏病理中符合急性肾盂肾炎的是

- A、 肾盂肾盏黏膜瘢痕形成, 黏膜下浆细胞浸润
- B、 肾盂肾盏黏膜充血水肿, 黏膜下浆细胞浸润
- C、 肾小管萎缩、纤维化、黏膜下淋巴细胞浸润
- D、 肾小管节段性扩张、纤维组织增多
- E、 肾小球周围有纤维组织增生, 白细胞浸润

答案： B

43、下列关于 tRNA 分子的叙述, 错误的是

- A、 含有 IMP
- B、 含有 TMP
- C、 含有假尿嘧啶核苷酸
- D、 含有二氢尿嘧啶核苷酸
- E、 碱基组成超过一半是稀有碱基

答案： E

44、引起腹痛的胃肠神经功能紊乱见于下列疾病,但除外

- A、 功能性消化不良
- B、 胃神经官能症
- C、 慢性胰腺炎
- D、 胆道运动功能障碍
- E、 肠易激综合征

答案: C

45、子宫肌瘤妊娠期或分娩后,最易出现的变性是

- A、 玻璃样变性
- B、 囊性变性
- C、 红色变性
- D、 肉瘤变性
- E、 钙化

答案: C

46、以下关于 B 细胞表位的描述,错误的是

- A、 由 BCR 识别
- B、 大多为构象表位
- C、 识别受 MHC 限制
- D、 无需蛋白酶降解就可识别
- E、 一般由 10 个左右氨基酸组成

答案: C

47、动物也是有尊严的道德主体,应当和人一样受到尊重。该观点源自

- A、 动物福利主义
- B、 动物权利主义
- C、 动物自由主义
- D、 动物保护主义
- E、 动物实验主义

答案: B

48、预防脊髓灰质炎进行人工自动免疫的主要对象是

- A、 野外工作者
- B、 青壮年
- C、 林区工人
- D、 老年人
- E、 5 岁以内的儿童

答案: E

49、妊娠期高血压疾病患者应用利尿药的禁忌证是

- A、 肺水肿
- B、 脑水肿
- C、 心力衰竭
- D、 红细胞压积>35%
- E、 全身水肿

答案： D

50、以下精神障碍在全球疾病负担中排首位的是

- A、 酒依赖
- B、 双相情感障碍
- C、 药物依赖
- D、 精神分裂症及相关障碍
- E、 单相抑郁

答案： E

51、向心性心肌肥大可见于下列哪种疾病

- A、 严重贫血
- B、 甲状腺功能亢进
- C、 二尖瓣关闭不全
- D、 高血压性心脏病
- E、 主动脉瓣关闭不全

答案： D

52、下列不是缩窄性心包炎的症状或体征的是

- A、 劳力性呼吸困难
- B、 食欲缺乏, 上腹部胀满或疼痛
- C、 乏力, 运动耐量下降
- D、 脉压增大
- E、 心包叩击音

答案： D

53、以内毒素作为主要致病物质的细菌是

- A、 布鲁菌
- B、 破伤风梭菌
- C、 结核分枝杆菌
- D、 金黄色葡萄球菌
- E、 肺炎链球菌

答案： A

54、幽门螺杆菌是一种致病菌, 与此菌关系最密切的疾病是

- A、 反流性食管炎
- B、 胃息肉
- C、 胃平滑肌瘤
- D、 Zollinger-Ellison 综合征
- E、 胃癌

答案： E

55、病毒性心肌炎治疗中不恰当的是

- A、 卧床休息
- B、 丙种球蛋白应用
- C、 常规剂量洋地黄应用
- D、 1,6 二磷酸果糖
- E、 维生素 C

答案： C

56、最有效的控制深部真菌感染药物为

- A、 制霉菌素
- B、 酮康唑
- C、 两性霉素 B
- D、 灰黄霉素
- E、 氟康唑

答案： C

57、恶臭痰见于

- A、 金黄色葡萄球菌感染
- B、 大肠杆菌感染
- C、 肺炎克雷白杆菌感染
- D、 厌氧菌感染
- E、 肺炎链球菌感染

答案： D

58、肺栓塞最常见的类型是

- A、 肺血栓栓塞症
- B、 脂肪栓塞综合征
- C、 羊水栓塞
- D、 空气栓塞
- E、 癌栓栓塞

答案： A

59、肝性脑病诱因中, 下列可能性不大的是

- A、 上消化道出血
- B、 大量排钾, 利尿, 放腹水
- C、 高蛋白饮食
- D、 便秘腹泻或感染
- E、 肾上腺糖皮质激素增多

答案: E

60、下列物质中, 不属于药品的是

- A、 中药饮片
- B、 抗生素
- C、 血液
- D、 血清
- E、 疫苗

答案: C

61、正常人胸部叩诊时能查到的是

- A、 Skoda 叩响
- B、 Traube 鼓音区
- C、 Garland 三角区
- D、 Grocco 三角区
- E、 Damoiseau 曲线

答案: B

62、同时累及脑膜、肾、肺、肠及骨的肉芽肿性病变常常是

- A、 风湿小体
- B、 伤寒小体
- C、 麻风小结
- D、 矽结节
- E、 结核结节

答案: E

63、婴儿消化系统解剖生理特点中哪一项不对

- A、 3~4 月后出现“生理性流涎”
- B、 3~4 月会常出现溢奶
- C、 出生时胰蛋白酶发育良好
- D、 出生时胰脂酶分泌少
- E、 出生时胰淀粉酶发育良好

答案: E

64、关于急性腹痛的叙述, 下列哪项是错误的

- A、 单纯的阵发性绞痛多为胃肠、胆道、输尿管平滑肌痉挛
- B、 逐渐加重的腹痛多为炎症
- C、 突发而剧烈的持续性腹痛多为空腔脏器破裂或穿孔
- D、 阵发性腹痛的间歇期无疼痛常为腹腔内化脓性感染
- E、 腹痛伴发热一般是感染的表现

答案: D

65、内分泌功能亢进的原因不包括

- A、 异位内分泌综合征
- B、 多内分泌腺瘤
- C、 功能性内分泌肿瘤
- D、 激素的敏感性缺陷
- E、 自身免疫病

答案: D

66、葡萄胎患者经彻底刮宫后, 连续监测血、尿中 hCG, 如持续升高, 说明

- A、 正常
- B、 胎儿仍存活
- C、 恶变
- D、 怀孕
- E、 复发

答案: C

67、对婴儿进行体检时, 前囟门应测量

- A、 二对角连接线长度
- B、 二对边中点连线的长度
- C、 二对边中点的连线的 $1/2$ 长度
- D、 一对角连接线长度
- E、 相邻二边长度

答案: B

68、关于补体三条激活途径的叙述, 下列哪项是错误的

- A、 三条途径形成的膜攻击复合物相同
- B、 MBL 途径一般在感染后期发挥作用
- C、 经典途径从 C_1 被激活开始
- D、 旁路途径从 C_3 被激活开始
- E、 MBL 途径中的 C_3 转化酶是 C_4b_2a 或者 C_3bBb

答案: B

69、现代医学实践中医患关系的常用模式是

- A、 主动-被动型
- B、 相互协作型
- C、 指导-合作型
- D、 指导-参考型
- E、 共同参与型

答案： E

70、生殖器结核一般首先侵犯的器官是

- A、 外阴
- B、 阴道
- C、 输卵管
- D、 子宫
- E、 宫颈

答案： C

71、关于急性胆囊炎的描述, 错误的是

- A、 不少患者在半夜出现腹痛
- B、 进油腻餐后易发病
- C、 右上腹持续性疼痛, 阵发性加剧
- D、 墨菲征阳性
- E、 多数患者出现黄疸

答案： E

72、生后 2 个月的患儿, 叩击颅骨有空瓮音, 该体征为

- A、 Horner 征
- B、 Myerson 征
- C、 Weber 征
- D、 Macewen 征
- E、 Battle 征

答案： D

73、风湿性心瓣膜病主动脉瓣狭窄时, 以下表现错误的是

- A、 主动脉瓣区喷射性收缩期杂音
- B、 主动脉瓣区第二心音减弱
- C、 左心室明显扩张
- D、 脉压小、脉搏弱
- E、 主动脉瓣区可触及震颤

答案： C

74、有关肺炎衣原体肺炎的描述,下列不正确的是

- A、肺炎衣原体是专性细胞内细菌样寄生物
- B、通过空气传染,人-人传播
- C、起病隐袭,症状较轻
- D、多伴有肺外症状
- E、X线胸片表现以单侧、下叶肺泡渗出为主

答案: B

75、维生素D缺乏性佝偻病在6个月内婴儿常见的骨骼改变有

- A、颅骨软化
- B、肋骨外翻
- C、手足镯
- D、鸡胸
- E、“O”形腿

答案: A

76、儿童支气管肺炎的常见病原为

- A、革兰阳性球菌和病毒
- B、革兰阴性杆菌和病毒
- C、革兰阴性杆菌和支原体
- D、病毒和衣原体
- E、细菌和霉菌

答案: A

77、特发性全面强直-阵挛发作的首选治疗药物是

- A、丙戊酸钠
- B、卡马西平
- C、苯妥英钠
- D、乙琥胺
- E、苯巴比妥

答案: A

78、麻疹的治疗原则及方法是以下几点,除外

- A、保持居室空气清新,通风良好
- B、勤翻身,清洁口、鼻和眼分泌物
- C、给足够饮水,补充维生素
- D、及时发现,处理并发症
- E、肌注退热剂,防止抽搐

答案: E

79、营养不良的实验室检查, 最早期的改变的指标是

- A、 血浆前白蛋白浓度降低
- B、 血浆白蛋白浓度降低
- C、 血浆胆固醇浓度降低
- D、 血浆牛磺酸浓度降低
- E、 血浆必需氨基酸浓度降低

答案: A

80、MEN-1 型的治疗方案首选

- A、 手术治疗
- B、 化疗
- C、 放疗
- D、 免疫调节剂
- E、 替代治疗

答案: A

81、下列精神活性物质中, 主要产生歪曲的时间与空间知觉, 增加使用前的心境和强度的物质是

- A、 吗啡
- B、 海洛因
- C、 大麻
- D、 摇头丸
- E、 可卡因

答案: C

82、关于胰腺炎和淀粉酶关系的描述, 不正确的是

- A、 血清淀粉酶一般在起病后 8 小时升高
- B、 水肿性胰腺炎一般是 48~72 小时后开始下降
- C、 胆石症, 肠梗阻, 肠道感染时亦可升高, 但不超过 500U/L
- D、 病情的严重程度与淀粉酶的水平基本一致
- E、 胰源性腹水中淀粉酶浓度也明显增高

答案: D

83、TF-VIIa 复合物经传统通路可激活

- A、 FV
- B、 FX
- C、 FIII
- D、 FXI
- E、 FIX

答案： B

84、流行性斑疹伤寒多发生于

- A、 夏季
- B、 秋季
- C、 冬春季
- D、 雨季
- E、 无明显季节分布

答案： C

85、局灶性节段性肾小球硬化的临床特点是

- A、 极少出现血尿和高血压
- B、 激素治疗效果不好
- C、 多表现为肾病综合征
- D、 多见于中、老年人
- E、 少量蛋白尿

答案： C

86、下列疾病出现皮肤慢性移行性红斑的是

- A、 莱姆病
- B、 梅毒
- C、 品他病
- D、 雅司
- E、 足菌肿

答案： A

87、关于脓胸渗出期的病理变化,下列错误的是

- A、 脏层胸膜充血
- B、 渗出液稀薄
- C、 细胞成分少
- D、 胸穿抽脓较易
- E、 排出渗液后肺不易复张

答案： E

88、葡萄球菌的致病物质主要是

- A、 病原体
- B、 毒素与酶
- C、 多糖荚膜
- D、 炎性介质

E、过敏反应

答案： B

89、下列不属于排尿困难的症状的是

A、 排尿时间延长

B、 排尿踌躇

C、 尿线无力变细

D、 尿频尿急

E、 尿后滴沥不尽

答案： D

90、调查人群对白喉棒状杆菌的免疫力可用

A、 结核菌素 (OT) 试验

B、 锡克试验

C、 肥达试验

D、 外斐反应

E、 狄克试验

答案： B

91、患者,男,64岁,反复咳嗽、咳痰,痰中带血2周。体温 38.3℃,WBC $12\times 10^9/L$,胸片右肺门肿块影,伴远端大片状阴影,予抗感染治疗后阴影不吸收。首先考虑的治疗方案是

A、 抗感染治疗

B、 抗炎止血治疗

C、 手术治疗

D、 抗结核治疗

E、 门诊随访

答案： C

92、下列哪一项不适用于病毒感染性疾病的快速诊断

A、 中和试验

B、 免疫荧光试验

C、 电镜检查

D、 酶联免疫吸附试验

E、 血凝抑制试验

答案： A

93、早期狭窄性腱鞘炎的初始治疗方法是

A、 腱鞘切开松解肌腱

- B、 保守治疗, 夹板固定, 使用 NSAID 药物
- C、 局部注射醋酸泼尼松
- D、 针灸及理疗
- E、 使用抗生素治疗

答案: B

94、只能外展肩关节的肌是

- A、 胸大肌
- B、 背阔肌
- C、 冈上肌
- D、 小圆肌
- E、 三角肌

答案: C

95、以下哪项不是经典型苯丙酮尿症的典型症状

- A、 智力低下
- B、 尿液有鼠尿臭味
- C、 肌无力
- D、 色素减退
- E、 精神行为异常

答案: C

96、哪项不是胆囊切除术的适应证

- A、 较大的胆囊结石
- B、 胆道蛔虫症
- C、 非手术治疗无效的急性胆囊炎
- D、 胆囊积水
- E、 胆囊积脓

答案: B

97、糖尿病患者最常合并的阴道炎类型是

- A、 细菌性阴道病
- B、 外阴阴道假丝酵母菌病
- C、 滴虫性阴道炎
- D、 萎缩性阴道炎
- E、 婴幼儿外阴阴道炎

答案: B

98、预激综合征患者最常见并发的心律失常为

- A、 窦性心动过速
- B、 房室传导阻滞
- C、 心房扑动
- D、 室上性心动过速
- E、 心房颤动

答案： D

99、下列临床表现中,不是二尖瓣狭窄应出现的是

- A、 心尖部可闻舒张期隆隆样杂音
- B、 左房明显扩大
- C、 左室扩大
- D、 右室扩大
- E、 心房颤动

答案： C

100、在器官移植排斥反应中,最可能存在直接作用的是

- A、 Th2 细胞与血管内皮细胞
- B、 CD8⁺ T 细胞与移植物细胞
- C、 TDTH 与单核细胞
- D、 过客白细胞与巨噬细胞
- E、 B 淋巴细胞与血管内皮细胞

答案： B

101、在生理 pH 情况下,下列氨基酸的混合物在电场中有多种氨基酸向正极移动,其中移动最快的是

- A、 Pro
- B、 Lys
- C、 His
- D、 Glu
- E、 Gly

答案： D

102、间歇热是指

- A、 高热持续,24 小时体温相差不超过 1℃
- B、 24 小时体温相差超过 1℃,但最低点未达正常
- C、 24 小时内体温波动于高热与常温之下
- D、 骤起高热、持续数日骤退,间歇无热数日,高热重复出现
- E、 发热数日,退热 1 日,又再发热数日

答案： C

103、解热镇痛药的解热特点是

- A、 可降低正常体温
- B、 可降低直接注入 PG 引起的发热
- C、 仅降低致热原引起的发热
- D、 解热作用受环境温度影响
- E、 外界温度高可升高体温

答案： C

104、急性脓胸可通过下列哪项检查确诊

- A、 体检发现患侧语颤减弱,叩诊浊音
- B、 胸部 X 线片示患侧呈大片浓密阴影
- C、 胸穿抽得脓液
- D、 胸片示液平面
- E、 胸部 B 超提示患侧胸腔积液

答案： C

105、关于腠淋巴结的叙述,正确的是

- A、 沿大隐静脉末端和腠血管排列
- B、 注入腹股沟浅淋巴结
- C、 输出淋巴管沿股神经上行
- D、 引流小腿深层结构的淋巴
- E、 分为浅、中、深三群

答案： D

106、患者,男,28 岁。经临床诊断,为双眼视野颞侧半偏盲,损伤部位可能是

- A、 一侧视神经
- B、 一侧视束
- C、 一侧视交叉外侧部
- D、 视交叉中部
- E、 一侧外侧膝状体

答案： D

107、患儿,女,5 天,早产儿,因不吃奶、哭声弱、周身凉 2 天入院。体检:体温不升,呼吸不规则,面色发绀,皮肤冷并呈紫红色,双下肢、臀部、下腹部及面颊部皮肤发硬,压之微凹陷,双肺可闻及少量湿啰音,最可能的诊断是

- A、 新生儿水肿并肺炎
- B、 新生儿硬肿症并肺炎
- C、 新生儿皮下坏疽
- D、 新生儿败血症

E、 新生儿肺透明膜病

答案： B

108、患者，男，47 岁，上腹部疼痛 5 年，餐后半小时疼痛明显，至下次餐前可缓解，近 1 周来节律性疼痛消失呈顽固性疼痛，腹痛放射至背部。下列诊断可能性最大的是

- A、 幽门管溃疡
- B、 球后溃疡
- C、 复合性溃疡
- D、 癌性溃疡
- E、 穿透性溃疡

答案： E

109、患者，男，33 岁，电工。咳嗽，高热 39℃，抗感染治疗症状稍缓解，1 周后，再次持续高热，入院治疗。体温 39℃，呼吸音减弱，肺部叩诊浊音。血常规白细胞 $21.9 \times 10^9/L$ ，X 线示右侧第 3 前肋以下大片致密影，胸穿抽出混浊胸液。最常见致病菌可能是

- A、 肺炎球菌
- B、 大肠杆菌
- C、 产气杆菌
- D、 淋病双球菌
- E、 变形杆菌

答案： A

110、患儿，男，9 岁。自幼即发现有心脏杂音，平时不喜活动，体格发育较同龄儿瘦小，喜蹲踞。查体：口唇青紫，杵状指(+)，胸骨左缘第 2~4 肋间收缩期杂音 3 级，肺动脉瓣区第二心音减弱。胸片见肺血减少，心腰凹陷，心尖上翘，呈靴形心。该患儿最有可能存在的畸形是

- A、 房缺+室缺+肺动脉瓣狭窄+主动脉骑跨
- B、 右房肥大+室缺+肺动脉口狭窄+主动脉骑跨
- C、 室缺+肺动脉口狭窄+主动脉骑跨+右心室肥大
- D、 室缺+肺动脉口狭窄+动脉导管未闭+右室肥大
- E、 房缺+肺动脉口狭窄+右心室肥大+主动脉骑跨

答案： C

111、患者，男，29 岁，右上腹饥饿痛反复发作 3 年，近 3 天解成形黑便量约 500g 左右，下列治疗最合适的是

- A、 禁食+输液+西咪替丁
- B、 立即输血+胃内持续滴注去甲肾上腺素冰盐水+氢氧化铝凝胶

- C、 输液+大量冰盐水洗胃+制酸剂
- D、 流汁饮食+输液+法莫替丁
- E、 手术治疗

答案： D

112、患者阑尾切除术后半年,突然阵发性腹痛,呕吐粪样物,排便排气停止 3 天。查体:腹膨隆,可见肠型,散在压痛,肠鸣音亢进,可闻气过水声。腹部 X 线透视见阶梯状气液平。首先应考虑

- A、 急性胃肠炎
- B、 粘连性肠梗阻
- C、 肠扭转
- D、 肠套叠
- E、 急性肠系膜淋巴结炎

答案： B

113、患者,女,23 岁。颈前肿物 3 个月。查体:右叶甲状腺可触及一质硬结节,直径 2cm;同侧颈淋巴结可触及 2 个,质中,活动。B 型超声:甲状腺右叶一低回声实性团块。为明确肿物良恶性,下一步首选检查是

- A、 放射性核素扫描
- B、 血清降钙素测定
- C、 针吸细胞学检查
- D、 颈部软组织显像
- E、 右侧颈淋巴结活检

答案： C

114、患者,35 岁,罹患中耳炎后出现颈内静脉血栓,下列说法正确的是

- A、 鼓室外侧壁受到炎症波及
- B、 鼓室后壁受到炎症波及
- C、 鼓室上壁受到炎症波及
- D、 鼓室下壁受到炎症波及
- E、 鼓室前壁受到炎症波及

答案： D

115、患者,男,68 岁,饮酒后不能自行排尿 5 小时,急诊住院,体检见耻骨上包块,有轻压痛。首先给予的治疗方式

- A、 导尿治疗
- B、 剖腹探查
- C、 耻骨上膀胱穿刺术
- D、 膀胱造瘘术

E、 抗炎、补液对症治疗

答案： A

116、患者,男,24岁,因街上斗殴被送往医院。影像学检查显示眶下壁骨折。最可能影响的结构是

A、 前群筛窦

B、 后群筛窦

C、 蝶窦

D、 额窦

E、 上颌窦

答案： E

117、患者,女,35岁,尿频、尿急、尿痛伴腰痛、发热、寒战1天,右侧肾区有压痛、叩击痛。其发热原因最可能是

A、 膀胱炎

B、 慢性肾盂肾炎

C、 急性肾盂肾炎

D、 急性肾小球肾炎

E、 慢性肾小球肾炎

答案： C

118、患者,女,32岁。药物流产术后5天,高热伴右下腹痛2天。妇科检查:白带脓性,宫颈举痛,子宫体压痛。本例最可能的诊断是

A、 急性阑尾炎

B、 异位妊娠

C、 流产后伴感染

D、 不全流产

E、 巧克力囊肿破裂

答案： C

119、患者,男,52岁,上腹隐痛10年,与饮食有关,无明显诱因突发中上腹持续剧痛5小时。查体:急性痛苦面容,面色苍白, T37.8℃, P110次/min, BP14/9kPa(105/70mmHg), 腹式呼吸消失,全腹压痛,反跳痛及肌紧张,以上腹部最显著,移动性浊音(±),肝浊音界稍缩小。为明确诊断,首先应采取的措施是

A、 于站立位拍摄腹部X线平片

B、 作腹腔诊断性穿刺并抽液检查

C、 测血清淀粉酶

D、 腹部B超检查

E、检测血白细胞总数及分类

答案： A

120、患者,女,月经规律,停经 40 天,要求人工流产。下列何项检查结果,能确诊为早孕

A、 B 超发现宫腔内有液性暗区之环形影像

B、 基础体温高温相持续超过 3 周

C、 妊娠免疫试验阳性

D、 黄体酮试验无阴道流血

E、 宫颈黏液涂片见排列成行的椭圆体

答案： A

121、患者,男,45 岁,心前区疼痛 12 小时,向上腹部和背部放散。查体:四肢厥冷,血压 80/60mmHg,心音低,心电图可见 $V_1 \sim V_6$ 导联 ST 段压低 0.5~1mm, T 波倒置。诊断最可能是

A、 急性心包炎

B、 变异型心绞痛

C、 急性心肌梗死

D、 急性肺动脉栓塞

E、 心室膨胀瘤

答案： C

122、患儿,6 岁。患肾病综合征,泼尼松治疗 8 个月,近 2 个月来低热、盗汗、食欲差、咳嗽,PPD 试验阴性,胸部 X 线片阴性。该患儿临床上应考虑合并哪种情况可能性大

A、 结核感染

B、 支气管炎

C、 败血症

D、 风湿热

E、 消化不良

答案： A

123、孕妇 35 岁,曾经流产 2 次,未得活婴。此次停经 56 天,确诊妊娠,高度忧虑流产再发。医生告诉她简单判断胎儿在宫内存活状态的最佳方法是

A、 基础体温测定

B、 宫颈黏液结晶检查

C、 B 超动态监测

D、 定期阴道检查

E、 动态监测尿 hCG

答案： C

124、进行性梗阻性黄疸患者伴上腹胀痛,经 B 超检查胆总管直径 1.8cm,胆囊高度肿大,壁薄,肝内胆管轻度扩张。除 CT 检查外,下列检查意义最大的是

- A、 十二指肠低张造影
- B、 ERCP
- C、 PTC
- D、 选择性血管造影(腹腔动脉造影)
- E、 核素扫描

答案： B

125、患者,男,64 岁。因巨脾和脾亢行脾切除术,术后 2 周查血小板 $1200 \times 10^9/L$,下一步最合适的措施为

- A、 安慰
- B、 华法林治疗
- C、 静注肝素
- D、 阿司匹林
- E、 静脉腔滤过

答案： D

126、患儿,女,14 岁。关节肿痛 2 个半月,伴低热。体检发现双侧腕关节,右侧肘关节和双侧膝关节肿胀,触之疼痛,活动受限,但不发红。足背可扪及黄豆大小皮下结节,质硬,不活动。肝未扪及,脾肋下刚及。血清类风湿因子阳性。该例应考虑诊断为

- A、 幼年特发性关节炎(全身型)
- B、 幼年特发性关节炎(少关节型)
- C、 幼年特发性关节炎(多关节型,RF 阴性型)
- D、 幼年特发性关节炎(多关节型,RF 阳性型)
- E、 幼年特发性关节炎(与附着点相关关节炎)

答案： D

127、患者,女,59 岁,发现蛋白尿 20 年,肌酐升高 5 年余。患者目前进行血液透析,每周 2 次。为防止透析器堵塞,应选择的抗凝药物是

- A、 水蛭素
- B、 链激酶
- C、 华法林
- D、 肝素
- E、 阿司匹林

答案： D

128、患儿,男,1岁。发热、咳嗽5天入院。查体:呼吸42次/分,双肺闻及中细湿啰音,胸部X线示两下肺模糊片影,最可能的诊断是

- A、大叶性肺炎
- B、腺病毒肺炎
- C、支原体肺炎
- D、毛细支气管炎
- E、支气管肺炎

答案: E

129、患者,男,25岁,反复双下肢水肿2年伴头昏,3天前昏迷来急诊。检查:贫血貌,神志不清,呼吸深大16次/min, BP20.8/13kPa(160/100mmHg),双肺(-)。血红蛋白5g/dl,尿蛋白+,血肌酐 $1200\mu\text{mol/L}$ 。PaCO₂8mmol/L。即给碳酸氢钠治疗,其后神志清楚,呼吸平稳,但患者出现手足频繁抽搐,是由于

- A、原发性癫痫
- B、高血压脑病
- C、血清磷酸浓度升高
- D、血清甲状腺激素升高
- E、血清游离钙离子浓度降低

答案: E

130、患儿,男,8个月,发热、腹泻2天就诊。体温38.5~40℃(肛表),大便10~15次/天,为黄色稀水样,量中等,有时有呕吐。体检:患儿较烦躁,哭无泪,尿量很少,下面检查最合理和急需的是

- A、大便常规+电解质测定+血培养
- B、大便常规+尿常规+大便培养
- C、大便常规+血气分析+电解质测定
- D、大便常规+血常规+大便病毒分离
- E、尿常规+血常规+电解质测定

答案: C

131、患者,女,22岁。明显水肿3周,尿量持续减少,血尿。入院时已进入昏迷状态。血压180/100mmHg,尿蛋白(++++) ,红细胞满视野,红细胞管型3~5个/HP,血尿素氮80mg/dl,肾活检见肾小球球囊中新月体形成约占60%。诊断是

- A、急性肾炎合并急性肾衰
- B、慢性肾炎急性发作
- C、急性肾小管坏死
- D、急进性肾炎
- E、急进性高血压

答案: D

132、患者,女,40岁,性生活后阴道点滴出血1周。妇科检查:阴道分泌物量中,宫颈充血明显,宫颈表面呈乳头状重度糜烂。对于该患者的首要处理,正确的是

- A、微波治疗
- B、子宫全切术
- C、阴道置药
- D、宫颈刮片
- E、全身应用抗生素

答案: D

133、患者,女,25岁。人工流产吸宫术中,出现头晕、胸闷,考虑为人工流产综合征。下列临床表现,不符合的是

- A、心动过速
- B、心律不齐
- C、血压下降
- D、面色苍白,出汗
- E、昏厥与抽搐

答案: A

134、患者,男,25岁,1年来一旦身处某些特定的场所,如超市、影剧院、火车站大厅、邮局等处,就会出现强烈的担心、紧张、害怕。患者为此很少走出家门,竭力回避这些场所。患者明知这种恐惧是不合理的,但无法控制,内心痛苦。该例最可能的诊断是

- A、强迫症
- B、恐惧症
- C、焦虑症
- D、神经衰弱
- E、癔症

答案: B

135、新生儿出生时窒息,经抢救后呼吸心率均达正常,一般状况好,但因外周血象 WBC $19 \times 10^9/L$, N 0.66, L 0.34,核左移,转入新生儿病房观察,给予抗菌治疗7天后 WBC $12 \times 10^9/L$ 。可能的诊断是

- A、新生儿败血症
- B、新生儿肺炎
- C、新生儿宫内感染
- D、新生儿上呼吸道感染
- E、胎粪吸入综合征

答案: C

136、1 岁患儿, 头部向左侧偏斜, 颜面偏向右侧, 颈部活动较困难, 应考虑为

- A、 先天性斜颈
- B、 重症肌无力
- C、 脑膜炎
- D、 颈椎结核
- E、 进行性肌萎缩

答案: A

137、孕妇, 25 岁, 妊娠 33 周。入院检查: 血压 160/100mmHg, 尿蛋白(+++), 血小板 $30 \times 10^9/L$, 尿呈酱油色。发生的并发症可能是

- A、 心衰
- B、 肾衰
- C、 胎盘早剥
- D、 HELLP 综合征
- E、 妊娠合并血小板减少症

答案: D

138、患者, 女, 60 岁, 患子宫 II 度脱垂并发阴道前后壁膨出。最有效的治疗方法是

- A、 宫颈部分切除及阴道前后壁修补
- B、 经阴道全子宫切除及阴道前后壁修补
- C、 阴道前后壁修补及主韧带短缩
- D、 宫旁注射药物及子宫托
- E、 经阴道全子宫切除

答案: B

139、一老年患者, 60 岁, 反复咳嗽、咳痰 10 余年, 加剧 3 天入院。查体: 桶状胸, 呼气相延长, 两肺可闻及干湿啰音。该患者还可能出现

- A、 双肺触觉语颤增强
- B、 双肺呼吸动度增强
- C、 双肺肺泡呼吸音增强
- D、 双肺听到较弱的支气管呼吸音
- E、 叩诊肺肝界下移

答案: E

140、某心衰病人长期口服地高辛, 疗效较好, 后因三叉神经痛应用苯妥英钠, 结果出现心衰症状, 这是因为

- A、 苯妥英钠有致心衰的不良反应
- B、 苯妥英钠与地高辛竞争血浆蛋白

- C、 苯妥英钠减少地高辛的吸收
- D、 苯妥英钠促进地高辛排泄
- E、 苯妥英钠诱导肝药酶加速地高辛代谢

答案： E

141、 患儿,男,1岁。3天前无明显诱因出现斜视伴复视,查体头围较正常同龄婴儿增大,前囟膨隆。该患儿最有可能的诊断是

- A、 甲亢
- B、 先天性脑积水
- C、 畸形
- D、 颅裂
- E、 脑水肿

答案： B

142、 患者,男,28岁,近1年来血压波动于23/13kPa(180/100mmHg),现Hb60g/L,尿蛋白(++++) ,应首先考虑

- A、 肾血管性高血压
- B、 原发性高血压
- C、 慢性肾炎高血压型
- D、 嗜铬细胞瘤
- E、 库欣综合征

答案： C

143、 患者,男,45岁,在横过马路时不慎被汽车撞伤,一小时后送到急诊室。体检时患者神清较淡漠,脸色苍白,脉搏110次/min,血压12/9.5kPa(90/70mmHg)。右下腹压痛,肌紧张,右髂部肿胀,局部压痛,骨盆间接压痛(+),尿道外口有血迹,肛旁有5cm长撕裂伤,深达括约肌。此时的处置首先应是

- A、 摄片,了解骨盆情况
- B、 导尿,了解尿道有无损伤
- C、 建立静脉通道
- D、 清创
- E、 腹部穿刺

答案： C

144、 一10岁男孩,因身材矮小就诊,测量身高为128cm,为了解该小儿骨龄,宜做的检查是


- A、 胸部X线片
- B、 膝关节X线骨片
- C、 右手及腕部X线骨片

D、左手及腕部 X 线骨片

E、头颅 X 线摄片

答案： D

145、患者,男,53 岁。便秘、血便,大便变细,CT 如图,应考虑为



A、肠克罗恩病

B、直肠结核

C、溃疡型直肠癌

D、慢性溃疡性结肠炎

E、直肠淋巴瘤

答案： C

146、某患者诊断急性原发性肺脓肿,根据痰细菌学检查结果,给予足量青、链霉素,积极支持疗法,治疗 2 周,痰量减少,但高热不退,白细胞持续增高。此时治疗应采取

A、气管内滴注抗生素

B、手术治疗

C、纤维支气管镜吸引

D、更换抗生素

E、雾化吸入抗生素

答案： C

147、患者,男,45 岁,因车祸导致第 1 胸椎粉碎性骨折,出现躯体内脏反射消失、血压下降、粪尿潴留等脊休克症状。经抢救治疗后,病情好转,腱反射等逐步恢复,但下肢感觉和随意运动能力没有恢复。该患者脊休克现象的产生和恢复,说明

A、脊髓具有完成各种感觉、运动和反射活动的完备能力

B、脊髓本身无任何功能,仅为中枢传出的最后公路

C、切断时脊髓功能全部消失,随后的恢复是由高位中枢代偿所致

D、脊髓可完成某些简单反射,但正常时受高位中枢调控

E、高位中枢对脊髓反射活动有易化作用,而无抑制作用

答案： D

148、患者,女,58岁,腹痛,高热寒战,黄疸。经检查诊断为胆管结石。不属于肝外胆道的结构是

- A、 肝管
- B、 肝总管
- C、 胆小管
- D、 胆囊
- E、 胆总管

答案： C

149、患者,女,55岁,慢性心力衰竭,胸闷气促1个月,下列哪项不是充血性心力衰竭的表现

- A、 左室舒张末期容量减少
- B、 心搏出量下降
- C、 中心静脉压升高
- D、 循环血容量增加
- E、 循环时间延长

答案： A

150、患者,女,58岁,双手前臂皮肤变厚发硬3年,进行性干咳3个月,需要进一步检查以明确,检查不包括

- A、 肺功能
- B、 肺动脉压测定
- C、 肺部高分辨率CT
- D、 肺活检
- E、 肺动脉造影

答案： E

151、患者,女,25岁,2年来反复脓血便,3~4次/天,伴里急后重,左下腹痛,排便后腹痛减轻,不发热。便培养阴性。结肠镜提示:直肠,乙状结肠充血,水肿,有浅表溃疡多处。首选的治疗是

- A、 甲硝唑
- B、 柳氮磺胺吡啶
- C、 异烟肼
- D、 庆大霉素
- E、 硫唑嘌呤

答案： B

152、孕妇, 29 岁, G₁P₀, 妊娠 7 周行人工流产, 术后吸出物中肉眼未见绒毛, 以下处理错误的是

- A、 血或尿 hCG 检测
- B、 妇科 B 超检查
- C、 刮出物送病理检查
- D、 一周后行负压吸引术
- E、 需要警惕异位妊娠

答案: D

153、患者, 女, 15 岁, 学生, 查体发现心尖部舒张期隆隆样杂音伴开瓣音, 心率 72 次/min, 律齐, 肺清, 肝脾未触及, 下肢不肿。超声心动图示二尖瓣瓣口面积 1.6cm², 平时活动不受限。应作的处理是

- A、 二尖瓣分离术
- B、 避免重体力活动, 定期随诊
- C、 洋地黄治疗
- D、 利尿剂治疗
- E、 休学休息

答案: B

154、患者, 男, 30 岁。外伤性血胸 2 周, 出现发热、胸痛等症状。经多次胸穿抽液后, 症状无明显改善, 胸液混浊。在全身应用抗生素的同时, 首选措施是

- A、 胸腔内注入抗生素
- B、 行胸腔闭式引流术
- C、 加强营养增强抵抗力
- D、 在 X 线下定位穿刺
- E、 尽早开胸手术

答案: B

155、患者, 男, 45 岁。肝区疼痛, 腹胀 2 个月余。无畏寒发热, 颈静脉不充盈, 心界正常, 心音规律无杂音, 肺部听诊无异常, 腹软, 肝肋下 4.5cm, 质较硬, 脾未触及, 有移动性浊音, 下肢无水肿。腹水检查为血性。最可能的诊断是

- A、 缩窄性心包炎
- B、 原发性肝癌
- C、 肝硬化失代偿期
- D、 腹膜间皮瘤
- E、 结核性腹膜炎

答案: B

156、患者,女,30岁,工人。十二指肠球部溃疡已3年,1周来嗝气、腹胀、腹鸣,近3天频繁呕吐,有隔夜食。查体:脱水征明显,可见胃型蠕动浪。实验室检查: $[Na^+]$ 140mmol/L, $[K^+]$ 3.0mmol/L, $[Cl^-]$ 90mmol/L, pH7.5, $[HCO_3^-]$ 30mmol/L, 补液方案首选

- A、 0.9%NaCl
- B、 0.9%NaCl, 尿量>40ml/h 加 10%KCl
- C、 0.9%NaCl 加等渗(0.1mmol/L)HCl
- D、 0.9%NaCl 加等渗(0.8%)NH₄Cl
- E、 0.9%NaCl 加盐酸精氨酸

答案: B

157、患者,女,78岁。胸片显示心影增大,心腰部由钝角变为近似直角,呈“靴形”。可能引起这种X线变化的疾病是

- A、 心肌炎
- B、 高血压病
- C、 肺动脉高压
- D、 室间隔缺损
- E、 甲状腺功能亢进

答案: B

158、患者,女,62岁,黏液脓血便4个月。一般情况尚好,直肠指检,距肛门10cm,直肠左侧壁触及一菜花样肿块的下缘,可推动,直肠镜检查,见该肿块大约2.5cm×2.6cm,活检报告为高分化腺癌。无远处转移现象,手术方式应选用

- A、 Miles 手术
- B、 Bacon 手术
- C、 Dixon 手术
- D、 Harfaman 手术
- E、 乙状结肠造口术

答案: C

159、20岁外伤患者,X线摄片发现第12胸椎椎体前方压缩1/3,双下肢感觉运动好,大小便正常。最适宜采取的治疗方法是

- A、 腰部垫厚枕,加强功能锻炼
- B、 石膏背心固定
- C、 手术复位,内固定
- D、 两桌法过伸复位加石膏背心固定
- E、 双踝悬吊法复位加石膏背心固定

答案: D

160、患者,女,38岁。外科创伤修复手术后,手术部位出现剧烈胀痛并伴随高热,血液培养分离出凝固酶阴性革兰染色阳性球菌。引起上述感染的可能性最大的病原菌是

- A、表皮葡萄球菌
- B、金黄色葡萄球菌
- C、肺炎链球菌
- D、脑膜炎奈瑟菌
- E、铜绿假单胞菌

答案: A

161、一名女工在工作时被机器切断了手指,被紧急送往医院行断肢再植手术。术后断指恢复红润,皮温回升;但术后6小时再植手指出现明显肿胀,皮温明显低于健指。出现该现象最不可能的原因是

- A、手术中血管未接通
- B、再灌注损伤
- C、再植断指组织细胞已发生严重缺血损伤
- D、断指保存不当
- E、感染

答案: A

162、患者,男,16岁,患有急性血行播散型肺结核。其最可能的临床表现是

- A、起病缓慢,有低热、乏力、咳痰
- B、病程经过较长,有咳痰、咯血、体重减轻
- C、病人常有高热,伴咳嗽气短,大量脓血痰
- D、起病急,高热,伴咳嗽气短
- E、咳嗽、血痰、气促,常无明显中毒症状

答案: D

163、患者,男,55岁,反复黑便2个月。入院前3小时突然呕出咖啡样胃内容物,继之为新鲜血约300ml。半年来因肩痛服用泼尼松。出血原因可除外

- A、胃癌
- B、出血性胃炎
- C、胃溃疡
- D、门静脉高压症
- E、十二指肠球部溃疡

答案: D

164、患者,男,30岁,工人。挤压综合征又输库存血,血钾6.9mmol/L,CO₂CP20mmol/L,治疗方案应首选

- A、 5%NaHCO₃ 60~100ml 静脉注射后再滴注 100~200ml
- B、 1.25%NaHCO₃ 60~100ml 静脉注射后再滴注 100~200ml
- C、 50%葡萄糖 100ml 静脉注射
- D、 25%葡萄糖 200ml+Insulin 12U 静脉点滴
- E、 阳离子交换树脂 15g, 日服 4 次

答案: A

165、患者,女,30岁,有风心病数年,2周来不明原因发热,乏力,食欲缺乏,经检查拟为亚急性感染性心内膜炎,体格检查不可能见到的体征是

- A、 环形红斑(皮肤)
- B、 皮肤淤点
- C、 心脏杂音发生变化
- D、 贫血
- E、 脾大

答案: A

166、患者,男,18岁。被刀刺伤右前胸,呼吸困难。查体:右胸第5肋有一3cm刀口,随呼吸可闻及“丝丝”的气体出入伤口声音。以下哪项是最佳急救方案

- A、 吸氧
- B、 输血输液
- C、 封闭伤口
- D、 立即拍胸片
- E、 闭式引流

答案: C

167、一病情稳定的风湿性心脏病、心功能Ⅱ级产妇临产入待产室,医生在考虑对她的处理时,下列何项应不列入考虑之列

- A、 临产即用抗生素,至少维持至产后一周
- B、 可适当应用镇静剂
- C、 若非病变需要,不主张常规使用洋地黄预防心衰
- D、 产程进展慢,估计有头盆不称可能时,早做剖宫产
- E、 产后流血较多时,尽量避免输血

答案: E

168、患者,男,40岁,黄疸,经检查诊断为病毒性肝炎。下列血清学检查最具诊断价值的酶是

- A、 LDH1
- B、 LDH2
- C、 ALT
- D、 AST

E、LDH5

答案： C

169、患者,男,71岁,既往有发作性关节炎病史,门诊查肌酐 $280\mu\text{mol/L}$,超声发现双肾多发结石,X光未见显影,最可能是以下哪种肾结石

- A、草酸钙性肾结石
- B、磷酸钙性肾结石
- C、尿酸性肾结石
- D、胱氨酸钙性肾结石
- E、磷酸铵镁性肾结石

答案： C

170、患者,女,23岁。停经4个月(以往月经正常),腹部渐增大,偶有尿频,但尿常规检查无异常。妇科检查(肛查):子宫大小不清,和肿物相连,有一 $15\text{cm}\times 16\text{cm}\times 14\text{cm}$ 大的肿物,囊性感,尚可活动;附件(-)。需要选用哪种辅助检查诊断

- A、B超检查
- B、腹部X片
- C、开腹探查手术
- D、尿妊娠试验
- E、黄体酮试验

答案： A

171、患者,男,35岁,突然发生剧烈头痛、恶心、呕吐和脑膜刺激征,怀疑蛛网膜下腔出血,需要抽取脑脊液进行诊断,腰椎穿刺抽取脑脊液应在

- A、骶管裂孔处
- B、第五腰椎与第一骶椎棘突间隙
- C、第三腰椎与第四腰椎棘突间隙
- D、第一腰椎与第二腰椎棘突间隙
- E、第十二胸椎与第一腰椎棘突间隙

答案： C

172、患者,男,65岁。乙肝病史30余年,2年前因反复上消化道出血行门静脉-下腔静脉分流手术,术后逐渐出现性格改变,偶有定向力障碍、嗜睡,多次检查ALT、AST轻度升高,总胆红素在 $30\mu\text{mol/L}$ 左右,最可能的原因为

- A、脑梗
- B、躯体疾病所致精神障碍
- C、肝功能不全
- D、门腔静脉分流所致肝性脑病

E、老年性痴呆

答案： D

173、患者,男,69岁。因突发腹部疼痛6小时入院。既往胃镜曾证实为胃溃疡。体质中等,无酗酒,脂肪餐史。伴有恶心,无呕吐,排大便一次,量少。有腹胀。查体:腹部平坦,腹肌紧张,全腹压痛,上腹部剑突下为重,伴反跳痛。肠鸣音弱。白细胞明显升高,尿淀粉酶正常。腹部立位平片可见2个小液平面,未见膈下游离气体。行开腹探查术。发现胃后壁穿孔。问手术涉及到的行于胃小弯侧的动脉是

- A、胃左动脉、胃右动脉
- B、胃左动脉、胃右动脉、肝总动脉
- C、胃网膜左动脉、胃网膜右动脉
- D、胃左动脉、肝总动脉、脾动脉
- E、胃短动脉、胃后动脉

答案： A

174、患者,女,32岁。阵发性劳力性呼吸困难3年,咳痰带血丝1个月。M型超声心动图检查可见二尖瓣前叶呈城墙样改变,后叶同向运动。下列体征具有诊断意义的是

- A、心尖区3级收缩期杂音,向腋下传导
- B、肺动脉瓣区第二心音亢进伴有分裂
- C、胸骨左缘第2肋间Graham-Steell杂音
- D、心尖区隆隆样舒张中晚期杂音
- E、心尖区隆隆样舒张早期杂音

答案： D

175、患者,男,23岁。排尿不适、尿道口流脓3天就诊,有不洁性史,临床怀疑淋病。关于淋病的病原体实验室检查错误的是

- A、分离培养具有很高的特异性,是诊断的“金标准”
- B、直接镜检发现革兰阴性双球菌可确诊
- C、PCR检查敏感性高,有利于早期快速确诊,但易出现假阳性
- D、血清学试验结果需结合其他方法加以证实
- E、培养阴性不能排除淋病

答案： B

176、4个月支气管肺炎患儿,体温40℃,两眼上翻,惊厥,昏迷,前囟饱满,张力增高。提示最可能出现

- A、心力衰竭
- B、高热惊厥

- C、 中毒性脑病
- D、 婴儿手足抽搦症
- E、 低血糖

答案： C

177、患者,男,30岁,上腹部规律性疼痛反复发作10年,加重1周,呕血、黑便2天。最可能的诊断是

- A、 出血性胃炎
- B、 消化性溃疡出血
- C、 胃癌出血
- D、 食管胃底静脉曲张破裂出血
- E、 胆道出血

答案： B

178、患者,女,60岁。刺激性咳嗽伴痰中带血1个月,查体无特殊阳性发现。胸片及CT检查示左上肺前段门处有一直径3cm块影,外周不整齐,呈毛刺状,纵隔内未见明确肿大淋巴结。最恰当的处理方法是

- A、 放射核素肺扫描检查
- B、 经胸壁穿刺活组织检查
- C、 肿块断层摄影
- D、 剖胸探查术
- E、 PET-CT检查或超声支气管镜活检

答案： E

179、患儿,男,5岁,因发热伴出疹症状就诊。其父母主诉小孩患“重感冒”多天并服用小儿感冒药多天,畏光。红色斑丘疹从患儿的耳后、前额、颈部扩散到身体的其他部分,部分部位皮疹变暗。查体发现该患儿还患有细支气管炎。尿检和颊部疹子刮取物镜检发现包涵体和多核巨细胞,咽喉拭子常规细菌培养阴性,抗链球菌溶素O试验阴性。该患儿所患疾病最可能的是

- A、 药疹
- B、 水痘
- C、 风疹
- D、 麻疹
- E、 猩红热

答案： D

180、患者,女,24岁,垂体瘤术后,半月前自行停服氢化可的松,后反复出现食欲缺乏、心悸、意识障碍,查血糖1.8mmol/L,补糖后好转,考虑低血糖原因为

- A、 垂体功能减退

- B、 食欲缺乏
- C、 伴瘤的低血糖症
- D、 胰岛素自身免疫综合征
- E、 药源性低血糖症

答案： A

181、患者,男,20岁。持续性喘息发作24小时来急诊,既往哮喘病史12年。查体:端坐呼吸,大汗淋漓,发绀,双肺布满哮鸣音。动脉血气分析结果显示:pH7.21, PaCO₂70mmHg, PaO₂55mmHg。此时应紧急采取的治疗措施是

- A、 机械通气
- B、 使用广谱抗生素
- C、 静脉滴注糖皮质激素
- D、 静脉注射氨茶碱
- E、 补充液体

答案： A

182、患儿,男,1岁。体重6kg,身长70cm,精神萎靡,皮肤弹性差,肌肉松弛。诊断是

- A、 匀称性矮小
- B、 营养不良
- C、 正常
- D、 脱水
- E、 贫血

答案： B

183、患者,女,21岁,反复关节红肿疼痛5年,活动后心悸气促1天入院。查:梨形心界,心率88次/min,律齐,心尖区舒张期隆隆样杂音,P₂亢进。Hb88g/L。胸片结果如图所示。可诊断为



- A、 左房黏液瘤
- B、 贫血
- C、 风心病、二尖瓣狭窄
- D、 冠心病
- E、 Austin-Flint 杂音

答案： C

184、妊娠高血压疾病病人,血压204/110mmHg,首选的降压药是

- A、 利血压
- B、 复方降压片
- C、 甲基多巴
- D、 复方卡托普利
- E、 肼屈嗪

答案： E

185、患者,男,30岁,3年来间断性上腹痛,多在春秋发作。近10天又有上腹痛,早晨呕血400ml,排柏油便4次,自觉头晕、心悸。BP13/8kPa(98/68mmHg),心率108次/min,肝脾未触及,HBsAg(+).可能的诊断为

- A、 消化性溃疡出血
- B、 肝硬化食管静脉曲张破裂出血
- C、 急性胃黏膜损伤
- D、 食道贲门黏膜撕裂症
- E、 胃癌出血

答案： A

186、患者,男,65岁,气短1周来门诊治疗。查体:肺底湿啰音,心率120次/min,心前区3/6级收缩期吹风样杂音,血压140/80mmHg,心电图II、III、aVF导联ST段水平下移0.2~0.3mV。医生考虑心衰最可能的原因是

- A、 高血压性心脏病
- B、 扩张型心肌病
- C、 肥厚型心肌病
- D、 先心病室间隔缺损
- E、 缺血性心脏病

答案： E

187、初产妇,27岁,孕42周。骨盆测量正常,胎头浮。B型超声检查见胎儿颅内大部分液性暗区,中线漂动,胎头周径明显大于腹周径。胎儿可能为

- A、 脑积水
- B、 巨大儿
- C、 胎头高直位
- D、 胎儿畸形
- E、 脊柱裂

答案： A

188、患者,女,35岁。便秘多年,反复发作尿路刺激症状,多次中段尿培养大肠杆菌阳性,夜尿增多。尿检蛋白(±),WBC5~10个/HP,RBC3~5个/HP,尿渗透浓度下降。临床诊断为慢性肾盂肾炎,已施正规抗菌治疗。下列哪项最不具有预防复发的意义

- A、 保持大便通畅
- B、 注意经期卫生
- C、 目前须继续用抗菌药物
- D、 禁用肾毒性药物
- E、 多饮水

答案： D

189、患者,男,50岁。创伤后休克30小时,抢救后血压恢复正常,但一直未排尿液,导尿获尿液100ml。为确定是否有急性肾衰,应做的检查是

- A、 PSP 试验
- B、 血常规
- C、 血细胞比容
- D、 中心静脉压测定
- E、 尿钠测定

答案： E

190、一患者因大量呕吐、腹泻突然晕厥,抽搐,颈动脉搏动消失。抢救首选方法为

- A、 静脉注射肾上腺素
- B、 静脉注射利多卡因
- C、 急速叩击心脏
- D、 胸外心脏按压
- E、 人工呼吸

答案： C

191、患者,男,晨起尿液呈红色,遂就诊。尿常规:尿潜血(+++),镜检发现尿中出现大量均一性红细胞,关于红细胞来源,错误的是

- A、 肾脏
- B、 输尿管
- C、 膀胱
- D、 前列腺
- E、 尿道

答案： A

192、产妇,26岁,G₁P₀,孕41周。因第二产程延长行产钳助产,胎儿娩出后5分钟后突发阴道出血400ml。查体:血压13.3/8.0kPa(100/60mmHg),脉率100次/min,宫底平脐。此时最先采用的处理是

- A、 静脉点滴催产素
- B、 检查软产道有无裂伤

- C、行人工剥离胎盘
- D、按摩子宫
- E、纱布条填塞宫腔

答案： C

193、患者,男,28岁。右大腿清创缝合术后6天,发热,局部伤口红肿,范围较大,疼痛明显。伤口局部见稀薄脓液,淡红色,量多,无异味。最可能感染的致病菌是

- A、大肠埃希菌
- B、铜绿假单胞菌
- C、溶血性链球菌
- D、金黄色葡萄球菌
- E、无芽孢厌氧菌

答案： C

194、患者,男,18岁。在一次考试中突然两眼向前瞪视,呼之不应,持续数秒钟恢复,可继续答题,但对发作过程无回忆。以后反复有类似发作,频繁时每日发作数次。本患可诊断为

- A、癔症
- B、失神发作
- C、局限性癫痫
- D、精神运动性发作
- E、肌阵挛发作

答案： B

195、患者,男,27岁。饱餐后上肢开放性骨折,拟急诊手术。麻醉前最重要的准备是

- A、补液
- B、血、尿、大便常规检查
- C、插粗大胃管排空胃内容物
- D、心电图检查
- E、血气分析

答案： C

196、患者,男,38岁,腹胀半年余。查体血压 90/76mmHg,颈静脉充盈,心界不大,心音低钝,心率 90 次/min,律齐,无杂音,两肺呼吸音清,腹膨隆,肝剑下 5cm,脾未及,全腹无压痛,移动性浊音(+),下肢水肿(+).腹水检查微黄,清亮,比重 1.016,蛋白 25g/L,细胞总数 100/ μ l,细胞 90/ μ l,核 50%,最可能的诊断为

- A、门脉型肝硬化

- B、 结核性腹膜炎
- C、 缩窄性心包炎
- D、 慢性充血性心衰
- E、 肝硬化合并原发性腹膜炎

答案： C

197、患者,女,36岁。外伤休克后行扩容治疗,测中心静脉压为13cmH₂O,血压正常,尿量15ml/h,尿比重<1.010,应考虑该患者出现

- A、 血容量不足
- B、 心功能不全
- C、 酸中毒
- D、 肾功能不全
- E、 血容量过多

答案： D

198、患者,女,32岁,因面色出现色素斑而来皮肤科就诊。查体发现其鼻梁部皮肤出现红色斑块,病损部高起皮面并向两侧面颊部扩展。最可能是下列哪种疾病

- A、 黑热病
- B、 肝脏疾病
- C、 系统性红斑狼疮
- D、 风湿性心脏病
- E、 酒渣鼻

答案： C

199、患儿,男,7岁。身材矮小,出生体重:3.2kg,出生身高:50cm,3岁后每年平均身高生长3cm,X光显示左腕部有3枚骨化核,智力正常,生长激素刺激试验阳性,相应的治疗为

- A、 口服锌片治疗
- B、 生长激素治疗
- C、 口服铁剂治疗
- D、 口服钙剂治疗
- E、 无需治疗

答案： B

200、患儿,女,7岁。平时无自觉症状。体检时发现心界正常,心率92次/分,可闻及期前收缩5次/分,心音正常,无杂音,心电图示单纯室性期前收缩。有助于诊治的检查应首选

- A、 动态心电图

- B、 运动平板试验
- C、 心脏超声检查
- D、 X 线胸片
- E、 心脏核素检查

答案： A

201、 62 岁, 男患, 退休干部, 近三个月来表现为悲观, 心情压抑, 没有兴趣, 自责, 认为自己拖累了家人, 认为自己退休前犯了很多罪, 欲去派出所自首, 该病人存在的属于抑郁发作时常见的精神病性症状为

- A、 罪恶妄想
- B、 被害妄想
- C、 虚无妄想
- D、 关系妄想
- E、 幻听

答案： A

202、 患者, 女, 25 岁, 孕 34 周。此时, 其血容量比未孕时约增加

- A、 0.3
- B、 0.35
- C、 0.45
- D、 0.5
- E、 0.6

答案： C

203、 患者, 男, 发热、 休克。3 日前开始头痛, 入院。当日意识不清, 昏迷, 体温 41℃, 血压 70/30mmHg, 躯干皮肤出现红色斑点。用药后血压仍继续下降, 第 3 天死亡。血培养发现 G⁻ 芽头状双球菌生长。请问其感染的病原菌可能是

- A、 溶血性链球菌
- B、 脑膜炎奈瑟菌
- C、 肠侵袭性大肠杆菌
- D、 肺炎链球菌
- E、 金黄色葡萄球菌

答案： B

204、 患者, 男, 20 岁。于 8 月来院, 8 小时前骤起腹泻, 呈稀便继转为水样便, 排便数十次, 体温 36.8℃, 脉细数, 血压 4/0kPa (30/0mmHg), 眼窝凹陷, 声音嘶哑, 少尿, 大便检查为水样, 镜检 WBC 0~2/HP。治疗应首先考虑

- A、 病原治疗
- B、 纠正低钾血症

- C、快速静脉补液
- D、肾上腺皮质激素
- E、血管活性药物

答案： C

205、患者,男,62岁。腹部阵发性疼痛伴腹胀,停止排气排便2天。既往有类似发作,但较轻,脉搏120次/min,血压11.7/7.8kPa(90/60mmHg),腹部极度膨隆,压痛明显,反跳痛阳性,移动性浊音阳性。最可能的诊断是

- A、麻痹性肠梗阻
- B、不全性粘连性肠梗阻
- C、完全性高位肠梗阻
- D、单纯性机械性肠梗阻
- E、绞窄性梗阻

答案： E

206、患者,男,40岁,血尿,膀胱镜检查发现左侧输尿管口周围膀胱黏膜充血、水肿,散在黄色结节。还应该进行的检查是

- A、膀胱造影
- B、膀胱区B超检查
- C、膀胱黏膜结节活检
- D、尿流动力学检查
- E、残余尿量测定

答案： C

207、患者,女,38岁,主诉:酱油色尿2周。2周前曾因“感冒”服用对乙酰氨基酚类药物,期间曾发现尿色呈酱油色。查体见贫血外貌,双下肢散在出血点,巩膜轻度黄染。血常规示 Hb 85g/L, WBC $10.3 \times 10^9/L$, PLT $64 \times 10^9/L$ 。考虑药物性溶血性贫血,哪型超敏反应是其发病机制

- A、I型超敏反应
- B、II型超敏反应
- C、III型超敏反应
- D、IV型超敏反应
- E、不是超敏反应

答案： B

208、患者,女,28岁。月经周期为28天,基础体温双相。月经周期第17天的子宫内膜应属于

- A、增殖早期
- B、增殖晚期

- C、 分泌早期
- D、 分泌晚期
- E、 排卵期

答案： C

209、患者,男,40岁。发热、腰痛5天,无尿2天入院。目前患者烦躁不安,眼睑水肿,体表静脉充盈,心率130次/min,血压170/100mmHg,解柏油样大便。应采取哪项治疗

- A、 积极补液
- B、 用止血剂
- C、 青霉素加庆大霉素
- D、 血液透析
- E、 硫酸镁导泻

答案： D

210、患者,女,32岁,劳累后翌日晨起发现尿色深,腰背痛且恶心伴呕吐3次来急诊。巩膜黄染,Hb76g/L,RBC 2.8×10^{12} /L,网织红细胞10.1%,WBC 3.4×10^9 /L,血小板 50.0×10^9 /L,冷热溶血试验(-),蔗糖水试验(+),Ham试验(+).该患者不宜选择的治疗是

- A、 泼尼松
- B、 紧急输全血
- C、 雄激素
- D、 碱化尿液
- E、 维生素E

答案： B

211、孕妇,32岁,G₁P₁,妊娠6周,拟采用药物流产,下列说法错误的是

- A、 适用于妊娠49天内
- B、 完全流产率达到90%以上
- C、 术前需要超声检查确诊宫内妊娠
- D、 不全流产出血量多需要紧急刮宫
- E、 药物流产失败可继续使用药物流产

答案： E

212、患者,男,42岁。2年前始有吞咽梗阻感,近期又出现胸骨后压迫感,入院行X线钡餐检查,结果如图所示,最有可能的疾病是



- A、食管癌
- B、贲门癌
- C、食管憩室
- D、食管平滑肌瘤
- E、贲门失弛症

答案: D

213、孕妇,超过预产期2周,仍未分娩,胎盘检查3级成熟。产科医生建议行静脉滴注,加强子宫平滑肌收缩。能促进宫缩的激素是

- A、生长激素
- B、催乳素
- C、黑色细胞刺激素
- D、抗利尿激素
- E、催产素

答案: E

214、患者,男,35岁,幼年曾患百日咳,反复咳嗽、咳痰20年,5年前曾因大量咯血住院治疗,近2年咯血愈加频繁,10天前因严重咯血入院,经治疗后症状好转。一般情况良好,支气管碘油造影示左下肺叶各段支气管囊性扩张。下一步应建议患者

- A、长期抗感染治疗
- B、抗结核治疗
- C、止咳、化痰治疗
- D、手术治疗
- E、停止任何治疗,门诊随访

答案: D

215、患者,男,35岁,因上腹部间歇性隐痛、进食后饱胀2个月就诊,经胃镜检查并活检诊断为胃癌。关于胃的叙述,错误的是

- A、胃癌多发生于胃底
- B、角切迹是胃小弯的最低处
- C、大部分位于左季肋区
- D、贲门位于第11胸椎体左侧
- E、幽门与十二指肠相通

答案: A

216、患者,女,40岁,发现颈部肿大6年,近半年来常感心悸,多汗,食量加大检查:无突眼、甲状腺Ⅱ度肿大、结节状,脉搏116次/min,心、肺、腹无异常发现,其诊断可能是

- A、结节性甲状腺肿
- B、原发性甲状腺功能亢进
- C、继发性甲状腺功能亢进
- D、高功能甲状腺腺瘤
- E、甲状腺腺癌

答案: C

217、患者,男,34岁,左腰部剧痛1天,尿常规示红细胞(+++),B超提示左肾积水。肾积水的原因最可能是

- A、左肾结核
- B、左输尿管结石
- C、左肾肿瘤
- D、肾盂输尿管连接部狭窄
- E、左输尿管肿瘤

答案: B

218、患者,男,30岁。患甲状腺功能亢进症,突然出现双下肢不能动。检查:双下肢肌力0级,膝腱反射减退,无肌萎缩。血钾测定2.3mmol/L。你认为最可能是下列哪种情况

- A、慢性甲亢性肌病
- B、周期性瘫痪
- C、周围神经炎
- D、重症肌无力
- E、癱症


答案: B

219、患者,女,25岁。因再生障碍性贫血需反复输血治疗,应为患者选择的最佳血液成分是

- A、 冷冻红细胞
- B、 去除白细胞的红细胞
- C、 悬浮红细胞
- D、 悬浮红细胞和血浆
- E、 洗涤红细胞

答案: B

220、患者,男,45岁,右下腹胀痛、并可触及质硬包块,结合图像,最可能的诊断




是

- A、 结肠 Crohn 病
- B、 结肠癌
- C、 肠结核
- D、 结肠淋巴瘤
- E、 慢性溃疡性结肠炎

答案: B

221、患者,女,18岁,自感胸闷,影像学检查如图,最可能的诊断为



- A、 纵隔畸胎瘤
- B、 上纵隔胸腺瘤
- C、 胸内甲状腺瘤
- D、 淋巴瘤
- E、 下纵隔胸腺瘤

答案： A

222、新生儿第一胎,羊水早破,生后第2天开始发绀、拒奶,体温不升,黄疸,白细胞 $15 \times 10^9/L$, RBC $7.0 \times 10^{12}/L$, 血型 O 型,胆红素 $205 \mu\text{mol}/L$,最可能的诊断是

- A、 新生儿溶血病
- B、 新生儿肺炎
- C、 新生儿颅内出血
- D、 新生儿低血糖
- E、 新生儿败血症

答案： E

223、患者,男,66岁,急性心肌梗死合并急性心力衰竭,肺部30%范围可闻及湿啰音,胸片可见肺淤血,killip 分级应该为

- A、 I 级
- B、 II 级
- C、 III级
- D、 IV级
- E、 V 级

答案： B

224、患者,男,60岁,有慢性阻塞性肺部疾病史,诊断为肺心病缓解期,应不出现下列哪项体征

- A、 肺气肿征
- B、 P_2 亢进
- C、 肝颈回流征阳性
- D、 剑下心脏搏动明显
- E、 下肢轻微水肿

答案： C

225、患者,男,55岁,进食时呛咳,为明确诊断应首选

- A、 胸部 X 线摄片
- B、 胸部 CT 检查(电子计算机体层 X 线扫描)
- C、 食管吞钡 X 线检查
- D、 食管超声波检查
- E、 胸部断层 X 线摄片

答案： C

226、患者,女,停经 3 个月后出现腹痛伴阴道出血。妇科检查示子宫增大,质软。双侧附件区均可扪及 4cm×5cm 囊性、活动好、无压痛之肿块。分泌物为血性,尿 HCG 阳性。则双侧附件肿块最有可能是

- A、 双侧输卵管积水
- B、 双侧输卵管卵巢囊肿
- C、 双侧卵巢巧克力囊肿
- D、 双侧卵巢黄素样囊肿
- E、 双侧卵巢浆液性囊肿

答案: D

227、患者,男,50 岁,有乙肝病史 30 年,饮酒史 20 年。近 1 个月来消瘦,并出现上腹部疼痛等症状。查体:巩膜黄染,上腹部触到质硬包块,表面可触及大小不等结节,有压痛。最可能的诊断是

- A、 原发性肝癌
- B、 晚期肝硬化
- C、 慢性肝炎
- D、 转移性肝癌
- E、 转移性胃癌

答案: A

228、患者,男,40 岁,双下肢水肿 3 个月,经检查后诊断为膜性肾病Ⅱ期,肾病综合征、高血压、乙肝病毒携带。患者水肿最可能因为

- A、 钠水潴留
- B、 血浆渗透压低
- C、 肝硬化
- D、 心衰
- E、 双下肢静脉血栓形成

答案: B

229、患者,男,52 岁。6 个月前发现进食哽噎感,其后症状逐渐加重,近 3 周只能进全流质。体重减轻,体力下降。查体:脉搏 80 次/min,血压 17/12kPa(128/90mmHg),体温 36.5℃,消瘦,颈、锁骨上淋巴结未触及。化验检查结果正常。食管钡剂造影:于食管中、下段见 8cm 狭窄,黏膜破坏。其诊断是

- A、 贲门失弛缓症
- B、 食管良性肿瘤
- C、 腐蚀性食管灼伤
- D、 食管炎
- E、 食管癌

答案: E

230、患者,男,70岁。近2个月无诱因出现全身无力,消瘦,蹲下时站起困难,并感口干,大便秘结,胸片示肺内占位性病变。查见:眼球运动自如,双上肢肌力正常,双下肢近端肌力4级,远端肌力正常,双膝、踝反射消失,病理征阴性。重频电刺激示高频波幅递增。关于此患者所患疾病,描述正确的是

- A、 病变部位在突触后膜
- B、 最常见于燕麦细胞肺癌
- C、 新斯的明试验不出现阳性反应
- D、 脑神经支配的肌肉受累常见
- E、 重频电刺激低频波幅递增

答案: B

231、患者,女,26岁,已婚。停经48天。阴道中等量流血2天,伴阵发性腹痛,并逐渐加重。妇科检查:宫口可通过一指,并见宫口内的胎囊,子宫稍大。此时最恰当的处理是

- A、 肌注黄体酮20mg
- B、 检测尿hCG
- C、 立即输液输血
- D、 紧急凝血功能检查
- E、 立即行刮宫术

答案: E

232、患者,男,60岁。主诉:咳嗽、咯血3月余。既往:吸烟30年,20支/日。查体:右肺呼吸明显降低,叩诊实音。右侧锁骨上淋巴结肿大。该患者最可能的咯血出血形式是

- A、 痰中带血
- B、 暗红色黏液痰
- C、 大咯血
- D、 脓血痰
- E、 粉红色泡沫痰

答案: A

233、患儿,男,6岁,从生后3个月开始出现口唇青紫,并逐渐明显。2岁时因剧烈哭闹,曾昏厥3次。查体:胸骨左缘第3肋间有3级粗造的收缩期喷射性杂音,肺动脉瓣区第二心音明显减弱。下列检查对本例的诊断和指导治疗最有意义的是

- A、 心电图
- B、 胸透
- C、 心脏负荷试验
- D、 心导管检查及心血管造影

E、 摄心脏三位片

答案： D

234、患者因急性肠梗阻开腹探查证实为降结肠癌，且近端肠管扩张充血水肿严重，充满干便块，下列各种术式不合理的是

- A、 横结肠造瘘，二期肠切除吻合
- B、 左半结肠切除，一期吻合术
- C、 肿瘤不能切除时行横结肠乙状结肠吻合术
- D、 局部肠段切除后近端肠造瘘
- E、 盲肠造瘘，二期左半结肠切除

答案： B

235、患者，男，35岁，诊断为重度主动脉瓣狭窄，拟行心内直视术下主动脉瓣人工瓣膜置换术，合适的体外循环方法为

- A、 常温体外循环
- B、 浅、中度低温体外循环
- C、 深低温低流量体外循环
- D、 深低温体循环
- E、 上、下半身分别灌注体外循环

答案： B

236、患者，女，76岁，胃癌根治术后7天，剧烈咳嗽后多量淡红色液体自切口溢出。最可能出现的情况是

- A、 切口裂开
- B、 切口血肿
- C、 切口脂肪液化
- D、 血清肿
- E、 切口感染

答案： A

237、患儿，男，1.5岁。流涕，轻咳1天，今早突然抽搐1次，持续2~3分钟，当时体温39.8℃，抽后状态良好，无呕吐，颈软，最可能的诊断是

- A、 中枢神经系统感染
- B、 败血症
- C、 癫痫
- D、 热性惊厥
- E、 中毒性脑病

答案： D

238、一患者突然发病,检查发现右侧上下肢的肌肉可收缩,但不能产生动作,该患者的肌力为

- A、 5 级
 - B、 4 级
 - C、 3 级
 - D、 2 级
 - E、 1 级
- 答案: E

239、患者,男,35岁,发现右侧甲状腺肿物3个月,生长较快。体检右甲状腺可触及一个3.5cm×2.5cm大小的肿物质硬界清随吞咽上下移动。左甲状腺不大,未及肿物;颈部未及肿大淋巴结。若确诊甲状腺癌,下列哪种病理类型预后最差

- A、 乳头状腺癌
 - B、 滤泡状腺癌
 - C、 未分化癌
 - D、 髓样癌
 - E、 甲状腺瘤恶变
- 答案: C

240、患者,男,18岁,大学新生,在体格检查中发现血压21.5/13kPa(159/99mmHg),眼底检查正常,尿常规蛋白++,红细胞15个/HP。以下哪一种情况是最可能存在的

- A、 肾血管性高血压
 - B、 原发性高血压
 - C、 体位性蛋白尿
 - D、 肾实质性高血压
 - E、 泌尿道感染
- 答案: D

241、患者,男,20岁,高热2天,X线胸片发现右上肺大片状实变影。该患最不可能出现的是

- A、 铁锈色痰
 - B、 咳嗽
 - C、 胸痛
 - D、 呼吸急促
 - E、 桶状胸
- 答案: E

242、患儿,8个月。智力发育较同龄儿差,时有抽搐和肌痉挛,毛发、皮肤和虹膜色泽较浅,进食后常呕吐,常出湿疹,尿有鼠尿臭味,该患儿最有可能的诊断是

- A、 21 三体综合征
- B、 先天性甲状腺功能减低症
- C、 苯丙酮尿症
- D、 癫痫
- E、 佝偻病

答案: C

243、一高血压患者,常年服用硝苯地平进行降压,近日发现踝部水肿,不见缓解。请问原因是

- A、 尿量减少
- B、 血浆晶体渗透压降低
- C、 血浆胶体渗透压降低
- D、 水钠潴留
- E、 毛细血管扩张

答案: E

244、患儿,女,7岁。多饮、多尿伴消瘦6个月来诊,多次尿常规检查发现尿比重在1.001~1.004之间。哪项检查可明确诊断

- A、 禁水试验
- B、 电解质
- C、 血气
- D、 禁水-加压素试验
- E、 血浆ADH

答案: D

245、患者,女,38岁,有SLE史。因贫血、脾大入院。实验室检查:Coombs 试验阳性。考虑溶血性贫血,最有可能的是

- A、 遗传性球形红细胞增多症
- B、 遗传性椭圆形红细胞增多症
- C、 丙酮酸激酶缺乏症
- D、 珠蛋白生成障碍性贫血
- E、 自身免疫性溶血性贫血

答案: E

246、患者,女,54岁,胸闷入院,查体可见叹气样呼吸,余未见异常,该患者最可能的诊断是

- A、 酸中毒
- B、 心功能不全
- C、 急性胸膜炎
- D、 抑郁症
- E、 大叶性肺炎

答案： D

247、患者,男,50岁,经理。在梅毒感染15年后出现记忆障碍,易激惹,情绪波动,并有夸大妄想,伴构音障碍,反射亢进。目前治疗中不正确的是

- A、 保证脑脊液中抗生素达有效治疗浓度
- B、 可使用相应的抗精神病药物
- C、 如又出现情绪低落可使用相应的抗抑郁药物
- D、 支持疗法
- E、 ECT 治疗

答案： E

248、患者,男,45岁,右肝叶切除术后入ICU。监测BP:73/50mmHg, CVP:1cmH₂O。正确的处理为

- A、 补充血容量
- B、 强心
- C、 应用血管收缩药物
- D、 应用血管舒张药物
- E、 利尿

答案： A

249、患者来院检查,接诊医生神经系统查体发现患者伸舌偏左。以此推测患者损伤以下哪一部分

- A、 左副神经
- B、 右副神经
- C、 左舌下神经
- D、 右舌下神经
- E、 左舌咽神经

答案： C

250、患者,女,34岁。冬季发病,发热、肌肉酸痛、头痛4天。查体:T39.6℃,结膜充血,胸背部见散在鲜红色充血性斑丘疹,脑膜刺激征阳性。可行哪项实验室检查进行确诊

- A、 血培养
- B、 脑脊液培养

- C、 外斐反应
- D、 间接血凝试验
- E、 间接免疫荧光试验

答案： E

251、患者,女,29岁,孕2产1。服用复方短效避孕药后,月经第8天出现不规则阴道流血,量偏多,但少于月经量。应用下列哪种治疗方法

- A、 氨甲环酸
- B、 丙酸睾酮
- C、 诊断性刮宫
- D、 戊酸雌二醇
- E、 黄体酮+戊酸雌二醇

答案： D

252、患者,男,66岁。行动迟缓,双手抖动6年。体检:瞬目动作减少,双上肢静止性震颤,慌张步态。应首选的药物治疗是

- A、 抗胆碱能药物—苯海索
- B、 金刚烷胺
- C、 左旋多巴或多巴丝肼
- D、 多巴胺能受体激动剂—溴隐亭
- E、 吩噻嗪类药物—氯丙嗪

答案： C

253、患者,男,34岁,突起上腹痛3小时,伴恶心、呕吐,发病前有酗酒史。查体:血压90/60mmHg,腹平坦,脐周压痛,无反跳痛,Cullen征及Grey-Turner征阳性。最可能的诊断是

- A、 胆道感染
- B、 急性胰腺炎
- C、 消化性溃疡穿孔
- D、 急性单纯性胃炎
- E、 消化性溃疡

答案： B

254、患者,女,30岁。反复喘息发作,近1年来发作频繁,夜间重。查体:HR110次/min, R32次/min,双肺散在呼气性哮鸣音,心音正常。血气分析:PH 7.46, PaO₂ 65mmHg, PaCO₂ 32mmHg。该患发生了哪种酸碱平衡紊乱

- A、 呼吸性酸中毒
- B、 呼吸性碱中毒
- C、 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

- D、 代谢性碱中毒
- E、 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

答案： B

255、心脏病患者,现妊娠 8 周,出现急性心力衰竭。最好的处理办法是

- A、 即刻终止妊娠
- B、 控制心力衰竭,继续妊娠
- C、 控制心力衰竭后,吸宫终止妊娠
- D、 控制心力衰竭后,剖宫取胎
- E、 边控制心力衰竭,边终止妊娠

答案： C

256、急性细菌性痢病程第 5 日,婴儿出现溶血性贫血、急性肾衰竭和血小板减少。这种被称为溶血性尿毒综合征的临床三联征是起因于

- A、 志贺毒素的作用
- B、 肠壁广泛性受损
- C、 细菌入血并释放内毒素
- D、 不耐热肠毒素的作用
- E、 细菌的侵袭力

答案： A

257、患者,男,28 岁,反复右下腹痛 4 年。在肠结核和克罗恩病的鉴别诊断中,更有助于克罗恩病诊断的是

- A、 间歇性低热
- B、 水泻
- C、 右下腹包块
- D、 病期有缓解与复发趋势
- E、 抗结核治疗 1 周无效

答案： D

258、患者,男,30 岁。面部抽搐 1 周余,表现为口角至一侧面部抽搐,每天发作 2~3 次,每次发作 30 秒至 1 分钟,均在白天发作,发作时意识清醒,既往有脑外伤病史。最可能的诊断是

- A、 失神发作
- B、 复杂部分性发作
- C、 部分运动性发作
- D、 肌阵挛发作
- E、 强直性发作

答案： C

259、患者,女,22岁。受凉后出现寒战、发热,咳嗽,咳少许黏痰3天,自服感冒药后热退,查体:T39.5℃,急性病容,右肺呼吸音减弱,语音震颤增强,下肺大片状模糊音影。该患者抗感染治疗不宜使用的是

- A、青霉素
- B、左氧氟沙星
- C、阿莫西林
- D、头孢曲松
- E、阿米卡星

答案: E

260、患儿,女,7个月。因独坐不稳来门诊。查体:前囟2cm×2cm,平,眼距宽,鼻梁低,舌伸出口外,流涎多,牙未出,心肺(-),贯通掌,下列检查有确诊意义的是

- A、腕部摄片测骨龄
- B、血钙、磷,碱性磷酸酶
- C、血清T₃、T₄测定
- D、尿三氯化铁测定
- E、染色体检查

答案: E

261、患者,男,48岁,10年少量饮酒史。近1个月上腹疼痛,饥饿时加重,呈现疼痛-进食-缓解的规律。最可靠的诊断措施是

- A、超声检查
- B、上消化道内镜
- C、上消化道钡餐
- D、依据临床表现
- E、根据药物的治疗效果

答案: B

262、初孕妇,29岁,妊娠37周。妊娠期糖尿病,胎心140次/min,无应激试验为无反应型。首选的处理措施是

- A、人工破膜
- B、B型超声检查
- C、宫缩激惹试验
- D、立即剖宫产
- E、3日后复查无应激试验

答案: B

263、患者,女,28岁。婚后未避孕未孕1年,平素月经5~7天/2~4月。停经35天自测尿妊娠试验阴性,停经45天曾每日肌注黄体酮10mg×5天,停药后无阴道流血。基础体温双相持续3周。停经的原因可能为

- A、 病理性闭经
- B、 早期妊娠
- C、 子宫结核
- D、 子宫发育不良
- E、 月经失调

答案: B

264、患儿,男,5个月。发热,咳嗽,喘憋2天。体检:T 38℃,R 68次/分,呈呼气性呼吸困难,两肺有明显哮鸣音。白细胞正常,最大可能的病原是

- A、 肺炎双球菌
- B、 腺病毒
- C、 呼吸道合胞病毒
- D、 金黄色葡萄球菌
- E、 肺炎支原体

答案: C

265、中年女性患者,拟于体外循环下行左房黏液瘤摘除术,给予肝素抗凝,转机前ACT应

- A、 >250s
- B、 >300s
- C、 >400s
- D、 >480s
- E、 >600s

答案: D

266、患者,男,20岁,咳嗽数周。1个月前开始感到疲劳,食欲减退,发热2周后咳痰中带血丝,体重减轻,体温38℃。临床怀疑患肺结核,取痰做下列处置,哪项是错误的

- A、 做结核菌素试验
- B、 痰浓缩集菌涂片进行抗酸染色
- C、 PCR查结核分枝杆菌核酸
- D、 痰结核分枝杆菌培养
- E、 痰培养物接种豚鼠进行动物实验

答案: A

267、患者,女,50岁,患盆腔炎1年,近2月来发现贫血。血红蛋白75g/L,MCV78fl,MCHC28%,血清铁 $7.0\mu\text{mol/L}$,总铁结合力 $35\mu\text{mol/L}$ 。骨髓铁染色:外铁(+++),铁粒幼细胞减少。其贫血诊断为

- A、 缺铁性贫血
- B、 巨幼红细胞贫血
- C、 慢性感染性贫血
- D、 失血性贫血
- E、 铁粒幼细胞贫血

答案: C

268、患者,女,31岁。因甲亢行甲状腺大部分切除术后3小时,切口深面进行性肿胀,患者出现呼吸困难。紧急行气管插管后,呼吸困难解除。下一步最佳处理措施是

- A、 拆开手术切口探查
- B、 静脉应用广谱抗生素
- C、 静脉注射葡萄糖酸钙
- D、 静脉应用大剂量激素
- E、 静脉注射止血药物

答案: A

269、患者,男,25岁,上腹疼痛反复发作4年余,夜间尤甚,疼痛放射至背部。曾发生过2次上消化道大出血。查体:剑突下偏右有压痛,肝脾不大,腹水阴性。可能性最大的疾病是

- A、 胃溃疡
- B、 慢性胃炎
- C、 胃黏膜脱垂
- D、 胃癌
- E、 十二指肠球后溃疡

答案: E

270、患者,21岁,近2天寒战高热、咳嗽,咳少许黏痰,略带血。因气急、发绀、休克死亡。病理切片见肺泡内充满红、白细胞和血浆,但肺泡壁尚完整。最可能的诊断为

- A、 干酪性肺炎
- B、 肺梗死
- C、 肺不张并感染
- D、 渗出性胸膜炎
- E、 肺炎球菌肺炎

答案: E

271、以 FAD 为辅基的一类酶称为

- A、 单加氧酶
- B、 黄素蛋白
- C、 过氧化物酶
- D、 氧化酶类
- E、 脱水酶

答案： B

272、主要存在于肝微粒体的酶

- A、 单加氧酶
- B、 黄素蛋白
- C、 过氧化物酶
- D、 氧化酶类
- E、 脱水酶

答案： A

273、细胞色素氧化酶属

- A、 单加氧酶
- B、 黄素蛋白
- C、 过氧化物酶
- D、 氧化酶类
- E、 脱水酶

答案： D

解析： D

(274~276 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 皮肤与黏膜呈青紫色
- B. 皮肤与黏膜呈明黄色
- C. 皮肤与黏膜呈玫瑰红色
- D. 皮肤与黏膜呈咖啡色
- E. 皮肤与黏膜呈苍白色

274、严重贫血时易出现

- A、 皮肤与黏膜呈青紫色
- B、 皮肤与黏膜呈明黄色
- C、 皮肤与黏膜呈玫瑰红色
- D、 皮肤与黏膜呈咖啡色
- E、 皮肤与黏膜呈苍白色

答案： E

275、高铁血红蛋白血症患者易出现

- A、 皮肤与黏膜呈青紫色
- B、 皮肤与黏膜呈明黄色
- C、 皮肤与黏膜呈玫瑰红色
- D、 皮肤与黏膜呈咖啡色
- E、 皮肤与黏膜呈苍白色

答案： D

276、肺源性心脏病患者易出现

- A、 皮肤与黏膜呈青紫色
- B、 皮肤与黏膜呈明黄色
- C、 皮肤与黏膜呈玫瑰红色
- D、 皮肤与黏膜呈咖啡色
- E、 皮肤与黏膜呈苍白色

答案： A

解析： A

(277~281 共用备选答案)

共用备选答案

277、HAV

- A、 生活能力较弱,不耐高温,不能在痂皮中存活,易被消毒剂灭活。但能在疱疹液中-65℃下存活 8 年
- B、 在体外抵抗力较强,在-20℃条件下保存数年,其传染性不变,能耐受 56℃ 30 分钟的温度及 pH3 的酸度;加热煮沸(100℃)5 分钟或干热 160℃ 20 分钟,紫外线照射 1 小时,氯 1mg/L 30 分钟或甲醛(1:4000)37℃ 72 小时均可使之灭活
- C、 在体外抵抗力很强,紫外线照射,加热 60℃ 4 小时及一般浓度的化学消毒剂(如苯酚,硫柳汞等)均不能使之灭活,在干燥或冰冻环境下能生存数月或数年,加热 60℃ 持续 10 小时,煮沸(100℃)10 分钟,高压蒸汽 122℃ 10 分钟或过氧乙酸(0.5%)7.5 分钟以上则可以灭活
- D、 对外界抵抗力较弱,加热 56℃ 30 分钟和一般消毒剂如 0.5%次氯酸钠,5%甲醛、70%乙醇 2%戊二醛等均可灭活,但对紫外线不敏感
- E、 对脂溶剂很敏感,易被紫外线及 γ 射线灭活,一般消毒剂(碘酒、酒精、福尔马林等)均可将病毒杀灭

答案： B

278、水痘病毒

- A、 生活能力较弱,不耐高温,不能在痂皮中存活,易被消毒剂灭活。但能在疱疹液中-65℃下存活 8 年

- B、在体外抵抗力较强,在-20℃条件下保存数年,其传染性不变,能耐受 56℃30 分钟的温度及 pH3 的酸度;加热煮沸(100℃)5 分钟或干热 160℃20 分钟,紫外线照射 1 小时,氯 1mg/L 30 分钟或甲醛(1:4000)37℃ 72 小时均可使之灭活
- C、在体外抵抗力很强,紫外线照射,加热 60℃ 4 小时及一般浓度的化学消毒剂(如苯酚,硫柳汞等)均不能使之灭活,在干燥或冰冻环境下能生存数月数年,加热 60℃持续 10 小时,煮沸(100℃)10 分钟,高压蒸汽 122℃ 10 分钟或过氧乙酸(0.5%)7.5 分钟以上则可以灭活
- D、对外界抵抗力较弱,加热 56℃ 30 分钟和一般消毒剂如 0.5%次氯酸钠,5%甲醛、70%乙醇 2%戊二醛等均可灭活,但对紫外线不敏感
- E、对脂溶剂很敏感,易被紫外线及 γ 射线灭活,一般消毒剂(碘酒、酒精、福尔马林等)均可将病毒杀灭

答案: A

279、HBV

- A、生活能力较弱,不耐高温,不能在痂皮中存活,易被消毒剂灭活。但能在疱疹液中-65℃下存活 8 年
- B、在体外抵抗力较强,在-20℃条件下保存数年,其传染性不变,能耐受 56℃30 分钟的温度及 pH3 的酸度;加热煮沸(100℃)5 分钟或干热 160℃20 分钟,紫外线照射 1 小时,氯 1mg/L 30 分钟或甲醛(1:4000)37℃ 72 小时均可使之灭活
- C、在体外抵抗力很强,紫外线照射,加热 60℃ 4 小时及一般浓度的化学消毒剂(如苯酚,硫柳汞等)均不能使之灭活,在干燥或冰冻环境下能生存数月数年,加热 60℃持续 10 小时,煮沸(100℃)10 分钟,高压蒸汽 122℃ 10 分钟或过氧乙酸(0.5%)7.5 分钟以上则可以灭活
- D、对外界抵抗力较弱,加热 56℃ 30 分钟和一般消毒剂如 0.5%次氯酸钠,5%甲醛、70%乙醇 2%戊二醛等均可灭活,但对紫外线不敏感
- E、对脂溶剂很敏感,易被紫外线及 γ 射线灭活,一般消毒剂(碘酒、酒精、福尔马林等)均可将病毒杀灭

答案: C

280、HIV

- A、生活能力较弱,不耐高温,不能在痂皮中存活,易被消毒剂灭活。但能在疱疹液中-65℃下存活 8 年
- B、在体外抵抗力较强,在-20℃条件下保存数年,其传染性不变,能耐受 56℃30 分钟的温度及 pH3 的酸度;加热煮沸(100℃)5 分钟或干热 160℃20 分钟,紫外线照射 1 小时,氯 1mg/L 30 分钟或甲醛(1:4000)37℃ 72 小时均可使之灭活
- C、在体外抵抗力很强,紫外线照射,加热 60℃ 4 小时及一般浓度的化学消毒剂(如苯酚,硫柳汞等)均不能使之灭活,在干燥或冰冻环境下能生存数月数年,加热 60℃持续 10 小时,煮沸(100℃)10 分钟,高压蒸汽 122℃ 10 分钟或过氧乙酸(0.5%)7.5 分钟以上则可以灭活
- D、对外界抵抗力较弱,加热 56℃ 30 分钟和一般消毒剂如 0.5%次氯酸钠,5%甲醛、70%乙醇 2%戊二醛等均可灭活,但对紫外线不敏感

E、对脂溶剂很敏感,易被紫外线及 γ 射线灭活,一般消毒剂(碘酒、酒精、福尔马林等)均可将病毒杀灭

答案: D

281、汉坦病毒

A、生活能力较弱,不耐高温,不能在痂皮中存活,易被消毒剂灭活。但能在疱疹液中 -65°C 下存活8年

B、在体外抵抗力较强,在 -20°C 条件下保存数年,其传染性不变,能耐受 56°C 30分钟的温度及pH3的酸度;加热煮沸(100°C)5分钟或干热 160°C 20分钟,紫外线照射1小时,氯 1mg/L 30分钟或甲醛(1:4000) 37°C 72小时均可使之灭活

C、在体外抵抗力很强,紫外线照射,加热 60°C 4小时及一般浓度的化学消毒剂(如苯酚,硫柳汞等)均不能使之灭活,在干燥或冰冻环境下能生存数月数年,加热 60°C 持续10小时,煮沸(100°C)10分钟,高压蒸汽 122°C 10分钟或过氧乙酸(0.5%)7.5分钟以上则可以灭活

D、对外界抵抗力较弱,加热 56°C 30分钟和一般消毒剂如0.5%次氯酸钠,5%甲醛、70%乙醇2%戊二醛等均可灭活,但对紫外线不敏感

E、对脂溶剂很敏感,易被紫外线及 γ 射线灭活,一般消毒剂(碘酒、酒精、福尔马林等)均可将病毒杀灭

答案: E

解析: E

(282~284 共用备选答案)

共用备选答案

A. 人工破膜术

B. 立即剖宫产

C. 缩宫素静脉滴注

D. 等待自然分娩

E. 抑制宫缩

282、孕妇,孕36周,血压130/90mmHg,尿蛋白(+),规律宫缩,强度中等,阴道少量流血,估计胎儿重2800g。B超检查怀疑胎盘早剥。首选的处理是

A、人工破膜术

B、立即剖宫产

C、缩宫素静脉滴注

D、等待自然分娩

E、抑制宫缩

答案: B

283、孕妇,孕34周,3小时前腹部外伤后出现持续性腹痛,并进行性加剧,阴道少量流血。检查:血压90/60mmHg,胎心120次/min。最佳处理为

A、人工破膜术

B、立即剖宫产

- C、 缩宫素静脉滴注
- D、 等待自然分娩
- E、 抑制宫缩

答案： B

284、 孕妇, 孕 33 周, 阴道少量出血 3 天, 无规律宫缩。B 超检查提示完全性前置胎盘。首选的处理是

- A、 人工破膜术
- B、 立即剖宫产
- C、 缩宫素静脉滴注
- D、 等待自然分娩
- E、 抑制宫缩

答案： E

解析： E

(285~287 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 减毒活疫苗
- B. 死疫苗
- C. 类毒素
- D. 外毒素
- E. 病原体的部分成分

285、 乙肝疫苗属于

- A、 减毒活疫苗
- B、 死疫苗
- C、 类毒素
- D、 外毒素
- E、 病原体的部分成分

答案： E

286、 麻疹疫苗属于

- A、 减毒活疫苗
- B、 死疫苗
- C、 类毒素
- D、 外毒素
- E、 病原体的部分成分

答案： A

287、 破伤风疫苗属于

- A、 减毒活疫苗

- B、死疫苗
- C、类毒素
- D、外毒素
- E、病原体的部分成分

答案： C

解析： C

(288~289 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 急性有机磷杀虫药中毒
- B. 急性氨基甲酸酯类杀虫药中毒
- C. 拟除虫菊酯类杀虫药中毒
- D. 有机氯杀虫药中毒
- E. 杀虫脒中毒

288、患者,男,39岁,调配农药4小时后感头痛、头晕、乏力、视物模糊、恶心、呕吐、多汗、瞳孔缩小并有肌肉颤动。血胆碱酯酶活力为60%。最可能的诊断是

- A、急性有机磷杀虫药中毒
- B、急性氨基甲酸酯类杀虫药中毒
- C、拟除虫菊酯类杀虫药中毒
- D、有机氯杀虫药中毒
- E、杀虫脒中毒

答案： B

289、患者,男,42岁,误服农药水剂100ml,出现头痛、头晕、恶心、呕吐、上腹部疼痛,很快昏迷伴呼吸困难,发绀,肺部干、湿啰音,四肢肌肉震颤和抽搐,心律失常。最可能的诊断是

- A、急性有机磷杀虫药中毒
- B、急性氨基甲酸酯类杀虫药中毒
- C、拟除虫菊酯类杀虫药中毒
- D、有机氯杀虫药中毒
- E、杀虫脒中毒

答案： C

解析： C

(290~292 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 如被切断,可导致肛门失禁
- B. 为肠壁环层肌增厚而成
- C. 分为皮下部、浅部和深部
- D. 参与构成盆膈
- E. 参与构成尿生殖膈

290、关于肛直肠环正确的是

- A、 如被切断,可导致肛门失禁
- B、 为肠壁环层肌增厚而成
- C、 分为皮下部、浅部和深部
- D、 参与构成盆膈
- E、 参与构成尿生殖膈

答案: A

291、关于肛门内括约肌正确的是

- A、 如被切断,可导致肛门失禁
- B、 为肠壁环层肌增厚而成
- C、 分为皮下部、浅部和深部
- D、 参与构成盆膈
- E、 参与构成尿生殖膈

答案: B

292、关于肛门外括约肌正确的是

- A、 如被切断,可导致肛门失禁
- B、 为肠壁环层肌增厚而成
- C、 分为皮下部、浅部和深部
- D、 参与构成盆膈
- E、 参与构成尿生殖膈

答案: C

解析: C

(293~294 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 螨
- B. 蚊
- C. 蚤
- D. 虱
- E. 蜱

293、汉坦病毒的传播媒介是

- A、 螨
- B、 蚊
- C、 蚤
- D、 虱
- E、 蜱

答案: A

294、克里米亚-刚果出血热病毒的传播媒介是

- A、 螨
- B、 蚊
- C、 蚤
- D、 虱
- E、 蜱

答案： E

解析： E

(295~297 共用备选答案)

共用备选答案

- A. ACTH
- B. ADH
- C. FSH
- D. LH
- E. OT

295、与 V_2 受体基因突变而致多尿和血浆渗透浓度升高有关的垂体激素是

- A、 ACTH
- B、 ADH
- C、 FSH
- D、 LH
- E、 OT

答案： B

296、能促进卵巢颗粒细胞内雄激素转化为雌二醇的垂体激素是

- A、 ACTH
- B、 ADH
- C、 FSH
- D、 LH
- E、 OT

答案： C

297、能促进靶细胞内胆固醇酯合成为皮质醇的垂体激素是

- A、 ACTH
- B、 ADH
- C、 FSH
- D、 LH
- E、 OT

答案： A

解析： A

(298~300 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 头颅 X 线片
- B. 头痛伴呕吐
- C. 脑定位体征
- D. CT
- E. 临床表现

298、颅盖骨折通常的诊断依据是

- A、 头颅 X 线片
- B、 头痛伴呕吐
- C、 脑定位体征
- D、 CT
- E、 临床表现

答案： A

299、颅底骨折通常的诊断依据是

- A、 头颅 X 线片
- B、 头痛伴呕吐
- C、 脑定位体征
- D、 CT
- E、 临床表现

答案： E

300、颅脑损伤的首选辅助检查是

- A、 头颅 X 线片
- B、 头痛伴呕吐
- C、 脑定位体征
- D、 CT
- E、 临床表现

答案： D

1、既往月经规律孕妇,末次月经为 2001 年 3 月 25 日,预产期应是

- A、 2001 年 12 月 2 日
- B、 2001 年 12 月 21 日
- C、 2002 年 1 月 2 日
- D、 2002 年 2 月 2 日
- E、 2002 年 3 月 2 日

答案: C

2、关于精神检查的技巧,不正确的是

- A、 学会观察病人的眼神、手势、身体姿态及对外界刺激的反应
- B、 耐心倾听病人的表述
- C、 开放性交谈为主
- D、 对有妄想的病人,可通过争辩,帮助其认识自身疾病
- E、 医生应主导谈话,使患者集中在相关话题上,不能过多纠缠于细枝末节

答案: D

3、不属于强迫症治疗的一线药物是

- A、 氟西汀
- B、 阿立哌唑
- C、 舍曲林
- D、 帕罗西汀
- E、 氟伏沙明

答案: B

4、妊娠期糖尿病患者,妊娠期 HbA1c 应该控制在()以内

- A、 0.035
- B、 0.045
- C、 0.055
- D、 0.065
- E、 0.075

答案: C

5、刺激机体产生类风湿因子(RF)的抗原是

- A、 变性 IgG
- B、 变性 IgD

- C、 变性 IgA
- D、 变性 IgE
- E、 变性 IgM

答案： A

6、雷诺现象的病理生理基础是

- A、 动脉血管壁的炎症
- B、 血管内皮细胞的功能异常
- C、 副交感神经活性过高
- D、 交感神经活性过高
- E、 迷走神经活性过高

答案： B

7、良性前列腺增生需与前列腺癌鉴别时,可进行的检查是



- A、 发病年龄、排尿困难程度
- B、 残余尿量
- C、 有无血尿
- D、 前列腺特异性抗原
- E、 膀胱造影

答案： D

8、以下有关主动脉瓣狭窄的体征错误的是

- A、 心尖冲动呈抬举样
- B、 主动脉区可闻及喷射样收缩期杂音
- C、 主动脉瓣区第二心音增强
- D、 脉压缩小
- E、 脉细弱

答案： C

9、免疫佐剂是

- A、 增强半抗原免疫原性的物质
- B、 增强对抗原免疫应答的物质

- C、 减少免疫原毒性的物质
- D、 增强免疫交叉反应性的物质
- E、 增强造血作用的物质

答案： B

10、单纯行胸膜纤维板剥除术, 最适用于

- A、 急性脓胸渗出期
- B、 慢性脓胸的早期
- C、 慢性脓胸的后期
- D、 慢性脓胸伴有肺病变
- E、 脓胸合并支气管胸膜瘘者

答案： B

11、腰椎间盘突出症下肢放射痛最常见于

- A、 阴部神经分布区
- B、 闭孔神经分布区
- C、 股神经分布区
- D、 坐骨神经分布区
- E、 股外侧皮神经分布区

答案： D

12、原发性肝癌最常见的组织学类型是

- A、 未分化癌
- B、 胆管上皮癌
- C、 肝细胞癌
- D、 类癌
- E、 混合性肝癌

答案： C

13、正常细胞膜外的 Na^+ 浓度约为膜内 Na^+ 浓度的

- A、 1 倍
- B、 5 倍
- C、 12 倍
- D、 15 倍
- E、 18 倍

答案： E

14、肾的被膜从内向外依次是

- A、 肾筋膜、脂肪囊、纤维囊

- B、 肾筋膜、纤维囊、脂肪囊
- C、 脂肪囊、纤维囊、肾筋膜
- D、 脂肪囊、肾筋膜、纤维囊
- E、 纤维囊、脂肪囊、肾筋膜

答案： E

15、包绕外侧沟后端的脑区

- A、 颞上回
- B、 颞中回
- C、 额下回
- D、 缘上回
- E、 角回

答案： D

16、判断慢性肾衰竭程度的最佳指标是

- A、 血钾浓度
- B、 血压高低
- C、 贫血程度
- D、 血液 pH 值
- E、 内生肌酐清除率

答案： E

17、白细胞分类计数时,应在油镜下选择哪个部位有秩序地检查

- A、 涂片头体部染色较好处
- B、 涂片体、尾交界处染色较好处
- C、 涂片体部染色较好处
- D、 涂片尾部染色较好处
- E、 涂片的两侧染色较好处

答案： B

18、决定病毒吸附易感细胞的因素是

- A、 病毒包膜
- B、 刺突
- C、 核酸
- D、 壳粒及排列
- E、 病毒表面的配体位点和敏感细胞表面的特异性受体

答案： E

19、胰岛素的主要作用是调节

- A、 水、盐代谢
- B、 蛋白质代谢
- C、 糖代谢
- D、 脂肪代谢
- E、 维生素代谢

答案： C

20、心力衰竭最常见的诱因是

- A、 静脉输液过多过快
- B、 情绪激动
- C、 不当使用 β 受体阻滞剂
- D、 肺部感染
- E、 缺血加重

答案： D

21、患者出现一侧眼部瞳孔缩小、眼裂变小、眼球内陷,考虑患者为

- A、 Hunt 综合征
- B、 Horner 综合征
- C、 Turner 综合征
- D、 一个半综合征
- E、 Adie 综合征

答案： B

22、WAIS-RC 的测验结果按常模可换算出()类智商

- A、 2
- B、 3
- C、 4
- D、 5
- E、 6

答案： B

23、肺癌中最常见的类型是

- A、 小细胞未分化癌
- B、 鳞状上皮细胞癌
- C、 腺癌
- D、 大细胞未分化癌
- E、 Pancoast 癌

答案： B

24、张力性气胸患者呼吸困难,最重要的治疗措施是

- A、 吸氧
- B、 呼吸机辅助
- C、 气管插管或切开
- D、 开胸手术
- E、 胸腔穿刺抽气减压

答案： E

25、 下列哪种物质有利于铁的吸收

- A、 牛奶
- B、 蛋
- C、 咖啡
- D、 茶
- E、 维生素 C

答案： E

26、 肝细胞性黄疸, 临床生化检查不应该出现

- A、 血清结合胆红素上升
- B、 血清总胆红素上升
- C、 血清未结合胆红素上升
- D、 尿胆红素阳性
- E、 粪便颜色呈陶土色

答案： E

27、 症状出现之前肝性脑病的早期诊断检测方法是

- A、 血氨
- B、 脑电图
- C、 视觉诱发电位
- D、 空腹血糖
- E、 肝功能

答案： C

28、 大量胸腔积液 X 线胸片的典型表现是

- A、 肋膈角变钝
- B、 纵隔向健侧移位
- C、 气管被推向健侧
- D、 患侧胸部外高内低反抛物线致密阴影
- E、 患侧膈肌抬高

答案： D

29、 下列哪种情况能使血管加压素释放增加

- A、 高钾饮食
- B、 大量饮清水
- C、 刺激颈动脉窦
- D、 刺激颈动脉体
- E、 大量出汗

答案： E

30、对疑似流脑患者留取标本, 进行病原学检查, 错误的是

- A、 在使用抗生素之前采集标本
- B、 立即送检
- C、 血培养阳性率高于皮肤淤点涂片或脑脊液涂片
- D、 培养阳性一般要进行菌株分型和药敏试验
- E、 脑膜炎球菌可从带菌者鼻咽、患者血液、脑脊液及皮肤淤点、淤斑中获得

答案： C

31、婴儿(不包括新生儿)呼吸频率平均值为

- A、 24 次/分
- B、 20 次/分
- C、 30 次/分
- D、 22 次/分
- E、 40~44 次/分

答案： C

32、休克治疗时, 观察内脏血液灌注状态最简单有效的方法是

- A、 口渴的严重程度
- B、 中心静脉压的高低
- C、 血压的高低及脉压的大小
- D、 脉搏的快慢及强弱程度
- E、 尿量多少


答案： E

33、能与亲和素特异性结合的是

- A、 抗原
- B、 补体
- C、 过氧化物酶
- D、 生物素
- E、 抗体

答案： D


34、如图所示,包虫病的主要传染源是



- A、 羊
- B、 猪
- C、 人
- D、 猫
- E、 狗

答案： E

35、如图所示,旋毛虫病的主要传染源是



- A、 猪及野猪
- B、 狗及熊
- C、 猪及鼠
- D、 熊及鼠
- E、 猫及狼

答案： C

36、髋关节属于

- A、 屈戌关节
- B、 车轴关节
- C、 椭圆关节
- D、 鞍状关节
- E、 球窝关节

答案： E

37、引起地方性甲状腺肿的最常见原因是

- A、 致甲状腺肿物质
- B、 碘缺乏
- C、 碘过多
- D、 TH 合成障碍
- E、 TH 需要量增加

答案： B

38、引起阴道出血最常见的原因

- A、 卵巢内分泌功能失调
- B、 与妊娠有关的原因
- C、 生殖器肿瘤
- D、 生殖器炎症
- E、 损伤、异物、药物

答案： A

39、C-反应蛋白是一种

- A、 热休克蛋白
- B、 急性期反应蛋白
- C、 酶
- D、 转录因子
- E、 核蛋白

答案： B

40、阵发性室上性心动过速的药物治疗,应首选

- A、 普鲁卡因胺
- B、 腺苷
- C、 普罗帕酮
- D、 毛花苷 C(西地兰)
- E、 胺碘酮

答案： B

41、既能明确病理学诊断,又能了解病变部位的最佳检查方法是

- A、 带网气囊食管脱落细胞检查
- B、 食管吞钡 X 线检查
- C、 计算机断层扫描(CT)检查
- D、 食管镜检查

E、 颈部淋巴结病理学检查

答案： D

42、椎管内有占位的脊髓压迫症,要迅速减压或切除占位。急性脊髓压迫症减压应在

A、 24 小时内

B、 18 小时内

C、 12 小时内

D、 6 小时内

E、 3 小时内

答案： D

43、疝环也称为疝门,它是

A、 壁腹膜经疝门向外突出而形成的囊袋

B、 疝囊与腹腔之间的通道

C、 进入疝囊的腹内脏器或组织

D、 指疝囊以外的各层组织

E、 疝突向体表的门户,亦即腹壁薄弱区或缺损所在

答案： E

44、肺炎球菌肺炎抗菌治疗首选

A、 链霉素

B、 氧氟沙星

C、 青霉素 G

D、 丁胺卡那

E、 红霉素

答案： C

45、膀胱上皮发生鳞状上皮化生后恶性变,这时所形成的恶性肿瘤称为

A、 膀胱移行细胞癌

B、 膀胱癌肉瘤

C、 膀胱鳞状细胞癌

D、 膀胱腺棘皮癌

E、 膀胱腺鳞癌

答案： C

46、出生后即有,且终生存在的神经反射是

A、 拥抱反射

B、 觅食反射

- C、吸吮反射
- D、膝腱反射
- E、握持反射

答案： D

47、尿潴留量超过(),应放置导尿管持续引流

- A、 100ml
- B、 300ml
- C、 500ml
- D、 800ml
- E、 1000ml

答案： C

48、可诱导肿瘤特异性免疫应答的是

- A、 LAK 细胞
- B、 TIL
- C、 抗独特型抗体疫苗
- D、 生物导弹
- E、 肿瘤疫苗

答案： E

49、下述哪项描述最符合急性肺水肿的肺部查体所见

- A、 两肺底细小水泡音
- B、 两肺底捻发音
- C、 两肺野布满湿啰音
- D、 两肺野布满干啰音
- E、 一侧肺底湿啰音

答案： C

50、妊娠合并梅毒患者,治疗首选的药物是

- A、 青霉素
- B、 红霉素
- C、 头孢
- D、 氧氟沙星
- E、 阿昔洛韦

答案： A

51、关于细菌核质的描述不正确的是

- A、 为细菌的染色体

- B、 存在于细胞核内
- C、 其核酸无组蛋白包绕
- D、 无核膜和核仁, 不显示核的形态
- E、 具有细菌生命活动所必需的遗传基因

答案: B

52、第4颈椎骨折脱位, 完全性截瘫, 伤后早期突然死亡的原因是

- A、 窒息
- B、 肺炎或肺不张
- C、 褥疮发生感染
- D、 泌尿系感染
- E、 尿潴留

答案: A

53、过量胰岛素产生低钾血症的机制是

- A、 大量出汗导致钾丧失
- B、 酮固酮分泌过多
- C、 肾小管重吸收钾障碍
- D、 结肠分泌钾加强
- E、 细胞外钾向细胞内转移

答案: E

54、下列不属于失语症检查的是

- A、 书写
- B、 听理解
- C、 构音
- D、 口语表达
- E、 复述

答案: C

55、患病后可获得终身牢固免疫力的病毒是

- A、 冠状病毒
- B、 鼻病毒
- C、 流感病毒
- D、 腮腺炎病毒
- E、 呼吸道合胞病毒

答案: D

56、为加速肘关节脱位后的功能恢复, 下列哪项措施是错误的

- A、 及早自主锻炼肘关节屈、伸和前臂旋转活动
- B、 可作被动锻炼,必要时于麻醉下进行
- C、 体疗
- D、 理疗
- E、 中药熏洗浸泡

答案: B

57、下述克雷白杆菌肺炎的临床表现中,哪一项诊断价值最大

- A、 呼吸困难、发绀
- B、 寒战、高热
- C、 早期可出现休克
- D、 红砖色胶冻样痰
- E、 胸痛

答案: D

58、吸入性肺脓肿不易发生的部位

- A、 左上叶后段
- B、 右侧下肺内基底段
- C、 双侧下叶背段
- D、 左上叶前段
- E、 左侧下叶后基底段

答案: D

59、婴儿 6 个月时应接种以下哪一种疫苗

- A、 卡介苗
- B、 乙肝疫苗
- C、 脊髓灰质炎疫苗
- D、 白百破疫苗
- E、 麻疹疫苗

答案: B

60、提出 DNA 双螺旋结构最直接的科学证据是

- A、 Chargaff 规则
- B、 特定组织的 DNA, 嘧啶和嘌呤克分子数的等量关系
- C、 X 线衍射图
- D、 $A=T, G=C$
- E、 在电镜下观察到了双螺旋结构

答案: C

61、下列选项中关于精神分析治疗的设置的设置,不正确的是

- A、 应保持房间安静
- B、 每次治疗时程约 2 个小时
- C、 应避免治疗受到电话打扰
- D、 应保持适宜的室温
- E、 需要预约治疗时间

答案： B

62、下列疾病不出现奇脉的是

- A、 阻塞性肺气肿
- B、 支气管哮喘
- C、 慢性缩窄性心包炎
- D、 急性心包炎心脏压塞
- E、 冠心病

答案： E

63、强迫行为不包括下列哪一项症状

- A、 强迫性洗涤
- B、 强迫性检查
- C、 强迫性计数
- D、 强迫性意向
- E、 强迫性仪式动作

答案： D

64、使某一生理过程很快达到高潮并发挥其最大效应, 依靠体内的

- A、 非自动控制系统
- B、 负反馈控制系统
- C、 正反馈控制系统
- D、 前馈控制系统
- E、 神经和内分泌系统

答案： C

65、浸泡手用的 1：1000 新洁尔灭溶液, 一般限用

- A、 10 次
- B、 20 次
- C、 30 次
- D、 40 次
- E、 50 次

答案： D

66、胆固醇在体内可转化为

- A、 维生素 A
- B、 辅酶 A
- C、 乙酰辅酶 A
- D、 肾上腺素
- E、 氢化可的松

答案： E

67、 卫生行政部门应当注销注册, 收回医师执业证书的情形是

- A、 死亡或者被宣告失踪的
- B、 中止医师执业满一年的
- C、 外出学习进修一年的
- D、 受到医院行政处分的
- E、 暂停执业活动的

答案： A

68、 抗精神病药物分类, 不正确的是

- A、 按作用机制分为多巴胺受体阻滞剂与肾上腺素受体阻滞剂
- B、 按临床特点分为低效价与高效价两类
- C、 按作用机制分为经典药物与非经典药物
- D、 非经典药物平衡阻滞多巴胺受体和 5-HT 受体
- E、 根据化学结构可分为吩噻嗪类、硫杂蒯类、丁酰苯类等抗精神病药物

答案： A

69、 关于子宫破裂的描述, 下列恰当的是

- A、 均发生在分娩期
- B、 破裂均在子宫下段
- C、 子宫破裂时临床表现不明显
- D、 不完全性子宫破裂需严密观察方能发现
- E、 使用子宫收缩药与子宫破裂无关

答案： D

70、 患者, 男, 62 岁, 患胃溃疡多年。近年来上腹痛频繁, 发作无规律, 体重减轻, 营养不良。胃钡餐透视见有龛影。该患者最需要进行的检查应为

- A、 粪便隐血试验
- B、 胃酸测定
- C、 胃镜和细胞学检查
- D、 腹部 B 超检查
- E、 ERCP

答案： C

71、抗生素治疗急性肺脓肿如有效,疗程至少应该

- A、 4 周
- B、 5 周
- C、 6~8 周
- D、 8~9 周
- E、 8~12 周

答案: C

72、不属于人工被动免疫方式的是

- A、 注射胸腺素
- B、 注射免疫核糖核酸
- C、 注射胎盘丙种球蛋白
- D、 注射人血清丙种球蛋白
- E、 通过胎盘从母体获得抗体

答案: B

73、脊髓空洞症首选的辅助检查

- A、 脊柱 X 线平片
- B、 脊髓造影
- C、 DMCT
- D、 脊髓 MRI
- E、 腰椎穿刺

答案: D

74、发病前 1~3 周有病毒感染病史,心功能不全的患儿,同时具备下列哪一项可确诊为病毒性心肌炎

- A、 心脏扩大
- B、 心电图改变
- C、 CK-MB 升高或心肌肌钙蛋白阳性
- D、 心脏活检分离到病毒
- E、 血液病毒学阳性

答案: D

75、伤寒病时最可能出现

- A、 斑丘疹
- B、 玫瑰疹
- C、 红斑疹
- D、 淤斑
- E、 疱疹

答案： B

76、肥皂刷手法, 刷手的范围是

- A、 从指尖到肘上 6cm
- B、 从指尖到肘上 10cm
- C、 从指尖到肘上 5cm
- D、 从指尖到肘关节
- E、 从指尖到肘上 3cm

答案： B

77、神经症, 旧称

- A、 神经质
- B、 神经官能症
- C、 精神病
- D、 自主神经功能紊乱
- E、 神经病

答案： B

78、100ml 母乳提供钙约为

- A、 30mg
- B、 40mg
- C、 50mg
- D、 60mg
- E、 80mg

答案： A

79、关于浆细胞的描述错误的是

- A、 来自 B 细胞
- B、 是 B 细胞分化的中间阶段
- C、 细胞质中富含粗面内质网
- D、 不再表达 BCR
- E、 不再表达 MHC II 类分子

答案： B

80、间日疟、三日疟与一般恶性疟常用的治疗方案是

- A、 氯喹+乙胺嘧啶
- B、 氯喹+伯氨喹
- C、 青蒿素+奎宁
- D、 奎宁+伯氨喹

E、奎宁+乙胺嘧啶

答案： B

81、不是造成偏头痛的原因

A、 食物或药物诱发

B、 高血压

C、 内分泌

D、 遗传

E、 过劳、紧张

答案： B

82、下列各项均可引起肝浊音界扩大,但除外

A、 肝癌

B、 肝炎后肝硬化

C、 多囊肝

D、 右心功能不全

E、 酒精性肝硬化

答案： B

83、下列用于培养病毒的方法中最常用的是

A、 家兔接种

B、 小白鼠接种

C、 鸡胚

D、 组织细胞

E、 灵长类动物

答案： D

84、《中华人民共和国母婴保健法》所称的婚前卫生指导内容中,未提及的是

A、 有关性卫生的保健和教育

B、 新婚避孕知识及计划生育指导

C、 受孕前的准备、环境和疾病对后代影响等孕前保健知识

D、 常见疾病的基本知识

E、 遗传病的基本知识

答案： D

85、下列关于小脑功能的描述,正确的是

A、 前庭小脑主要调节肌紧张

B、 脊髓小脑主要与维持身体平衡有关

C、 皮层小脑主要执行精巧运动

- D、 脊髓小脑主要协调随意运动
 - E、 皮层小脑主要完成本体感受传入冲动信息的处理
- 答案： D

86、低渗口服补盐液, 以下错误的是

- A、 ORS 中葡萄糖浓度为 75mmol/L
- B、 ORS 中钾浓度为 10~20mmol/L
- C、 ORS 为 2/3 张含钠液
- D、 可用于腹泻时脱水的预防
- E、 中度脱水一般按 75ml/(kg • d) 补充累积损失量

答案： C

87、关于头皮裂伤, 错误的是

- A、 可引起失血性休克
- B、 处理时着重检查有无颅骨和脑损伤
- C、 须检查伤口深处有无骨折或碎骨片
- D、 发现脑脊液或脑组织外溢, 须立即闭合裂伤头皮, 按闭合性脑损伤处理
- E、 清创缝合时间限制允许放宽至 24 小时

答案： D

88、外源性凝血从哪个因子开始激活

- A、 III
- B、 V
- C、 XII
- D、 X
- E、 II

答案： A

89、关于神经症的病因, 目前比较一致的看法是

- A、 外在的精神应激因素与内在的素质因素共同作用的结果
- B、 内在的素质因素是主要的
- C、 已发现有可疑的器质性改变
- D、 神经症具有遗传性
- E、 精神因素是次要的

答案： A

90、引起感染性休克的致病菌中, 比例最高的是

- A、 革兰阳性细菌
- B、 革兰阴性细菌

- C、 真菌
- D、 螺旋体
- E、 放线菌

答案： B

91、关于酒精性肝炎的临床表现, 以下说法错误的是

- A、 可有全身不适
- B、 可有食欲缺乏
- C、 可有发热
- D、 可有黄疸
- E、 常无症状

答案： E

92、苯丙酮尿症最主要的治疗方法是

- A、 大量维生素
- B、 限制苯丙氨酸摄入
- C、 限制蛋白质摄入
- D、 补充 5-羟色氨酸
- E、 对症治疗

答案： B

93、下列高血压病患者的心血管疾病危险因素中错误的一项是

- A、 吸烟
- B、 饮酒
- C、 高脂血症
- D、 糖尿病
- E、 高龄

答案： B

94、鉴别脑出血与蛛网膜下腔出血的最主要临床依据是

- A、 有无高血压
- B、 有无意识障碍
- C、 有无血性脑脊液
- D、 有无脑膜刺激征
- E、 有无神经系统的局灶性体征

答案： E

95、腹部叩诊鼓音, 可出现于

- A、 穿透性溃疡

- B、 不完全肠梗阻
- C、 大量腹水
- D、 巨大卵巢囊肿
- E、 胃肠穿孔

答案： E

96、关于宫颈浸润癌的形成, 哪项说法错误

- A、 不累及间质
- B、 有外来致癌物质刺激
- C、 宫颈上皮化生过度活跃
- D、 异型细胞突破基底膜
- E、 CIN 继续发展

答案： A

97、高位小肠梗阻的特点是

- A、 腹部可见明显肠型
- B、 腹胀明显
- C、 呕吐频繁
- D、 水电解质紊乱出现较慢
- E、 呕吐物常有粪臭

答案： C

98、子宫内膜异位症的发病率近年

- A、 增高
- B、 下降
- C、 无变化
- D、 明显下降
- E、 明显增高

答案： E

99、精子产生于

- A、 生精小管
- B、 精囊
- C、 睾丸小隔
- D、 睾丸网
- E、 睾丸间质细胞

答案： A

100、下列物质, 可作为卵磷脂和脑磷脂合成中的共同原料是

- A、 Gly
- B、 SAM
- C、 Ser
- D、 Thr
- E、 Met

答案： C

101、输卵管妊娠病因中,下列哪一项不正确

- A、 慢性输卵管炎
- B、 输卵管发育异常
- C、 盆腔子宫内膜异位症
- D、 孕卵游走
- E、 口服避孕药

答案： E

102、尿毒症肺炎主要属于

- A、 变态性
- B、 浆液性
- C、 化脓性
- D、 出血性
- E、 纤维素性

答案： B

103、应激时心率加快,心肌收缩力加强是因为

- A、 儿茶酚胺增多
- B、 糖皮质激素增多
- C、 促肾上腺皮质激素释放激素增多
- D、 胰岛素增多
- E、 甲状腺素增多

答案： A

104、动脉粥样硬化复合病变中最危险的并发症是

- A、 脉瘤的形成
- B、 血栓的形成
- C、 钙化
- D、 斑块内出血
- E、 斑块破裂

答案： D

105、精神疾病的概念是

- A、受精神创伤后的情绪悲观
- B、未达到个人目的的内心矛盾
- C、以精神活动失调为主要表现的疾病
- D、以上都不对
- E、精神疾病实际上是思想病

答案： D

106、患者,男,50岁,鼻咽癌放射性治疗后,口干咽干,喝水没有缓解,可选用

- A、阿托品
- B、新斯的明
- C、毒扁豆碱
- D、烟碱
- E、毛果芸香碱

答案： E

107、患者,女,30岁,患系统性红斑狼疮并肾功能不全,做左肾活检后5天出现低血压及贫血,左肾区压痛叩击痛,最可能的诊断是

- A、左肾脓肿
- B、左肾囊肿合并感染
- C、左肾出血
- D、左肾癌
- E、左肾结核

答案： C

108、患者,女,50岁,乏力、盗汗、咳嗽2个月入院,痰涂片抗酸杆菌(+),治疗过程中患者诉视物不清,视力减退。应立即停用下列哪种药物

- A、吡嗪酰胺
- B、乙胺丁醇
- C、链霉素
- D、异烟肼
- E、利福平

答案： B

109、患者,男,20岁,既往有气胸病史,突发胸闷,诊断为张力性气胸,下列哪项正确

- A、伤侧胸膜腔压力和大气压相等
- B、伤侧肺萎缩,健侧肺代偿性扩张
- C、呼吸极度困难,甚至发绀、休克
- D、一般不发生皮下气肿
- E、纵隔明显向伤侧移位

答案： C

110、患儿, 3 岁, 近 1 周出现明显性格改变, 精神淡漠, 少言, 易怒, 好哭, 且夜间睡眠不安伴低热, 偶然出现双眼凝视及手足抽动, 时诉头痛并伴呕吐该患儿首先应进行的检查是

- A、 头部 CT
- B、 脑电图检查
- C、 OT 试验
- D、 脑脊液检查
- E、 胸部 X 线检查

答案： D

111、患者, 男, 30 岁, 土墙倒塌, 腰部以下被埋。10 小时后急诊, 仍不能行走, 但双下肢感觉正常, 尿不能解, 小腹胀, 耻骨上叩浊三横指, BP

12. 8/91kPa(96/68mmHg), P 102 次/min, X 光片提示骨盆骨折。此时最佳的处理方法是

- A、 金属导尿管排尿
- B、 耻骨上膀胱造瘘术
- C、 经会阴尿道吻合术
- D、 急诊尿道拖入术
- E、 剖腹探查膀胱修补术

答案： B

112、患者, 男, 56 岁, 腹部包块伴高血压。CT 扫描如图所示, 下列说法错误的是



- A、 双肾体积明显增大
- B、 双肾内可见多个大小不等的囊性病灶, 呈蜂窝状改变
- C、 肝内可见多个大小不等的囊性病灶
- D、 考虑为多囊肾、多囊肝
- E、 考虑为双肾多发单纯性囊肿

答案： E

113、患者, 男, 65 岁, 夜尿增多伴蛋白尿 3 年。近 1 个月微热、咳嗽。痰液不多, 白色泡沫状, 体温 37. 4℃, 胸片示双侧中、下肺肺炎。抗菌治疗 3 周, 胸片复查:

肺炎无好转,将痰液二次送培养为正常菌群生长,真菌(-)。PPD 皮试为正常范围,痰找肿瘤细胞(-)。下一步应该首先做

- A、接收入院做支气管活检
- B、送检血尿素氮、肌酐和双肾 B 超
- C、经支气管镜以获取更好的痰标本
- D、双肺炎症部位 CT 扫描
- E、取三次痰标本做抗酸杆菌检查

答案: B

114、患者,男,50 岁。发热伴少尿 3 天入院。血压 160/100mmHg,血红蛋白 6.5g/dl,血肌酐 880 μ mol/L 尿氮素 35.5mmol/L,24h 尿蛋白 2.0g。X 线腹部平片提示双侧肾影长轴约 8cm。本例最可能的诊断是

- A、急性肾衰竭
- B、急进性肾炎
- C、急性肾炎
- D、慢性肾衰竭
- E、肾病综合征

答案: D

115、患者,男,52 岁。患高血压 10 年,间断服降压药。1 周前出差,归途中头痛、呕吐,认为系患感冒,自服“银翘解毒片”。次日发现左侧躯体运动障碍及解黑便,急诊就医。查体:左侧肢体瘫痪,血压 24/14kPa(180/105mmHg)。实验室检查:Hb90g/L,OB(++),SP7g/dl,A 4.5g/dl,G 2.5g/dl,SGPT<25U/L,HBsAg(+). 最可能的诊断是

- A、肝硬化食管静脉曲张破裂出血
- B、贲门黏膜撕裂症
- C、溃疡病
- D、胃癌
- E、急性胃黏膜病变

答案: E

116、患者,男,20 岁,因尿少、水肿伴腹胀 40 余天入院。查体:BP15/11.5kPa(112/84mmHg),全身高度水肿,腹水征(+).尿蛋白(++++) ,尿镜检 WBC0~3 个/HP, RBC 偶见,尿蛋白定量 30g/24h,呈选择性蛋白尿。血 BUN6.2mmol/L, Cr84 μ mol/L,血胆固醇 12mmol/L,甘油三酯 3.8mmol/L。估计患者的预后可能

- A、用糖皮质激素正规治疗 6~8 周后病情可能缓解
- B、尽管经积极适宜的治疗,病情仍趋迅速恶化的可能大
- C、半年内必将需依赖血液透析或腹膜透析维持生存

- D、糖皮质激素+环磷酰胺才能控制病情
- E、不经替代治疗,一年内必将死于尿毒症

答案: A

117、患者,男,24岁,因街上斗殴被送往医院。影像学检查显示眶下壁骨折。最可能影响的结构是

- A、前群筛窦
- B、后群筛窦
- C、蝶窦
- D、额窦
- E、上颌窦

答案: E

118、患者,男,49岁,长期大量饮酒20余年,因腹胀行腹部超声发现肝脏多发结节样病变,腹腔内大量腹水,进一步查AFP937ng/ml,患者最可能的诊断是

- A、肝硬化
- B、胆管细胞癌
- C、肝转移癌
- D、肝细胞癌
- E、不典型增生结节

答案: D

119、患者,女,50岁,全髋关节置换术后3天,发生股动脉破裂大出血,其最可能发生的缺氧类型为

- A、血液性缺氧
- B、组织性缺氧
- C、血液性缺氧合并组织性缺氧
- D、循环性缺氧
- E、血液性缺氧合并低张性缺氧

答案: D

120、松果体瘤患者出现大量排尿,尿比重在1.005以下,尿在4000ml/d以上,可能是因为肿瘤侵犯了

- A、下丘脑脊髓束
- B、乳头被盖束
- C、乳头丘脑束
- D、前脑内侧束
- E、视上核或视上核垂体束

答案: E

121、患者,女,21岁,左乳肿物4年,生长缓慢。查体:右乳外上象限扪及4.0cm分叶肿块,质硬,光滑,边界清楚,活动,不伴压痛,右侧腋窝未触及肿大淋巴结。最可能的诊断是

- A、 乳腺癌
- B、 乳房肉瘤
- C、 乳房纤维腺瘤
- D、 乳腺囊性增生症
- E、 乳管内乳头状瘤

答案: C

122、患者,女,28岁,G₁P₀。宫内妊娠20周,合并子宫壁间肌瘤。主诉下腹痛7天,合并低热,无阴道流血。白细胞 $9 \times 10^9/L$,中性粒细胞占60%。最可能的诊断是

- A、 子宫肌瘤合并感染
- B、 子宫肌瘤红色变性
- C、 子宫肌瘤囊性变
- D、 子宫肌瘤蒂扭转
- E、 妊娠合并阑尾炎

答案: B

123、患者,女,22岁。节律性上腹部疼痛2年。一周前复发。X线钡餐检查见十二指肠球部有一钡斑。本例的病因与下列哪项无关

- A、 PCM增大
- B、 Hp感染
- C、 迷走神经兴奋性增强
- D、 长期摄入NSAID
- E、 胃排空迟缓

答案: E

124、患儿,男,5岁。自幼瘦小苍白,不爱活动,易疲劳。无青紫,胸左缘第3、4肋间闻及3~4/6级全收缩期杂音,粗糙,伴震颤,肺动脉瓣第二音亢进。欲进一步确诊,首选哪项检查最有意义

- A、 X线胸片
- B、 心导管检查
- C、 心电图
- D、 心音图
- E、 超声心动图

答案: E

125、患者,男,35岁,与朋友共进晚餐并喝白酒后,家人发现昏迷在床上而急送医院。既往体健。体格检查:BP125/70mmHg,双瞳孔等大,直径3mm,呼吸时有酒味,心肺正常。患者最可能的诊断是

- A、急性乙醇中毒
- B、脑出血
- C、脑梗死
- D、低血糖昏迷
- E、食物中毒

答案: A

126、患者,女,45岁。双下肢大隐静脉曲张12年,近2年出现左下肢瘙痒,足靴区色素沉着,皮下硬结,湿疹。并有时出现轻度下肢肿胀。以下临床表现中哪项不是由于皮肤营养性变化引起的

- A、皮下硬节
- B、湿疹
- C、下肢肿胀
- D、瘙痒
- E、色素沉着

答案: C

127、儿保医生为一个8个月女婴进行健康检查时发现患儿为Ⅱ度营养不良,下列体格检查对诊断最有帮助的是

- A、体重5kg
- B、皮肤弹性较差
- C、面色苍白,肌肉松弛
- D、双下肢微肿
- E、腹部皮下脂肪厚度0.8cm

答案: A

128、患儿,5个月,诊断为狭颅症,常合并下列畸形,除外

- A、脊柱裂
- B、眼裂
- C、腭裂
- D、唇裂
- E、并指

答案: B

129、患者女, 28 岁, 经常怀疑做过的事情是否做好, 反复的检查, 如每次出门都要反复检查门是否关好, 煤气是否关掉等。虽意识到应该做好, 但仍不放心, 反复检查。该患者行为是

- A、 强迫思维
- B、 强迫性怀疑
- C、 强迫性意向
- D、 强迫性回忆
- E、 强迫性检查

答案: E

130、中年女性反复发作右上腹痛 3 年, 多于油餐后夜间发作放射右后背, 伴呕吐数小时后自行缓解或服药后缓解, 门诊拟诊为胆囊结石, 肝胆 B 超显示哪一项是错误的

- A、 肝不大、回声正常
- B、 胆囊正常大小胆囊壁稍厚
- C、 胆总管 0.6cm 直径
- D、 肝内外胆管扩张
- E、 胆囊内多个回声增强的光团后方有声影

答案: D

131、患者, 女, 26 岁, 孕 2 产 1。孕 4 月余, 出现全身皮肤瘙痒, 巩膜发黄及小便变黄 2 周, 第 1 次妊娠 6 个月时有同样病史。妊娠 8 个月时胎死宫内, 产生黄疸自行消退。化验: SGPT147u, 胆红素 68.4mmol/L。最可能的诊断是

- A、 妊娠高血压疾病肝损害
- B、 急性病毒性肝炎
- C、 妊娠脂肪肝
- D、 妊娠肝内胆汁淤积症
- E、 药物性肝损害

答案: D

132、一艾滋病患者, 患者单位询问他的病情, 医生拒绝回答, 这是因为

- A、 单位无权知道
- B、 保护患者隐私权
- C、 医生没有此义务
- D、 保护患者人身安全
- E、 医院的制度限制

答案: B

133、一 5 岁男孩, 目前只会说单词, 能独走, 大小便能自理, 无抽搐史, 来院进行体格测量, 您认为以下最重要的是

- A、 身高
- B、 体重
- C、 头围
- D、 胸围
- E、 臂围

答案: C

134、患儿, 男, 5 岁。因低热 2 天, 伴反复惊厥发作 3 次入院。病前健康, 无既往惊厥史。入院查体合作, 神志清楚, 无异常神经征。CSF 压力 250mmH₂O, 常规生化检查正常。EEG 示弥漫性异常慢波。入院后对症治疗, 病情逐日好转。4 周后复查, EEG 已明显改善。最可能的诊断是

- A、 结核性脑膜炎
- B、 病毒性脑炎
- C、 复杂性热性惊厥
- D、 癫痫(全身性发作)
- E、 化脓性脑膜炎

答案: B

135、患者, 女, 25 岁, 农民。因进不洁饮食而严重腹泻, 每日补充 5%葡萄糖 500ml, 0.9%氯化钠 500ml。来诊时 BP10.7/8kPa(80/60mmHg), P120 次/min, 精神萎靡, 呼吸加快, 血 pH7.26。该患者的酸碱平衡失调主要是

- A、 乳酸性酸中毒
- B、 酮症酸中毒
- C、 高氯性酸中毒
- D、 呼吸性酸中毒
- E、 代谢性碱中毒

答案: C

136、患者, 女, 36 岁。结婚 10 年未孕, 月经量较多, 经期较长, 深部性交痛 8 年。妇科检查: 子宫略有增大。B 型超声示: 子宫后位, 前壁 2.0cm, 后壁 3.2cm。血 CA125 40U/ml。最可能的诊断是

- A、 功血
- B、 不孕症
- C、 子宫肌瘤
- D、 盆腔炎
- E、 子宫内膜异位症

答案: E

137、患儿,男,2岁。胸骨左缘第3~4肋间闻及连续性杂音,肺动脉第二音增强,股动脉有枪击音,脉压增大,最可能的是

- A、 房间隔缺损
- B、 室间隔缺损
- C、 法洛三联症
- D、 急性心包炎
- E、 动脉导管未闭

答案: E

138、患者,女,35岁。右颈前肿块4个月。肿块生长快,无疼痛。查体:甲状腺右叶肿块,大小4cm×3cm,质地硬,表面不光滑,吞咽时上下移动度小。对诊断最有意义的体检结果是

- A、 气管向左侧移位
- B、 喉镜下见声带充血水肿
- C、 局部听诊闻及血管杂音
- D、 颈前浅静脉怒张
- E、 右颈部淋巴结肿大

答案: E

139、患者,男,67岁,胸痛半个月,胸片检查如图,最可能的诊断为



- A、 左上肺结核球
- B、 左上肺周围型肺癌
- C、 左上肺炎性假瘤
- D、 左上肺球形不张
- E、 左上肺脓肿

答案: B

140、患者,男,36岁,鸟语林工作人员。突然高热达40℃,剧烈头痛,伴恶心呕吐入院。查体:咽部充血疼痛,伴咳嗽,肺部听诊有湿啰音。胸片可见支气管炎型的肺浸润灶,以下叶为多。初步诊断为间质性肺炎,最可能是

- A、肺炎支原体感染
- B、肺炎嗜衣原体感染
- C、沙眼衣原体血清型 D-K 感染
- D、鹦鹉热嗜衣原体感染
- E、沙眼衣原体血清型 A、B、Ba、C 感染

答案： D

141、患者,女,30岁,工人,自觉乏力5年加重1周。月经偏多,食欲差,偏食, WBC $4.2 \times 10^9/L$, RBC $2.5 \times 10^9/L$, Hb 69g/L, MCV 60fl, MCH 20pg, MCHC 280g/L, 临床上给患者服用铁剂后,最先升高的指标是

- A、血红蛋白
- B、血小板
- C、网织红细胞
- D、红细胞总数
- E、白细胞

答案： C

142、患者,男,40岁,发现血压升高,并已排除了继发性高血压。以下可判断为1级高血压的是

- A、收缩压 21.3kPa (160mmHg)
- B、舒张压 13.3kPa (100mmHg)
- C、病程 5 年
- D、未发现心脑血管肾损害
- E、服降压药效果好

答案： D

143、患者,男,20岁,因肛肠手术,需行椎管内麻醉,麻醉药物可经何处注入骶管

- A、骶粗隆
- B、骶管裂孔
- C、骶前孔
- D、骶后孔
- E、骶角

答案： B

144、患者,女,55岁,工人,右颈部包块6月。颈淋巴结活检诊断:淋巴细胞分化不良型淋巴瘤。查体:肝未及,脾肋下6cm,腹腔触及肿块约3cm×4cm。骨髓片中发现12%的原始淋巴细胞。下列处理措施最佳的是

- A、局部淋巴结照射
- B、全身淋巴结照射

C、 全身淋巴结照射+化疗

D、 联合化疗

E、 化疗+脾切除

答案： D

145、患者,男,32岁,今日中午突然呕血150ml,继而排黑便2次,共约400ml。

查:剑突下轻压痛,肝脾未触及。上消化道出血的原因可能为

A、 应激性溃疡

B、 消化性溃疡

C、 胃癌

D、 慢性胃炎

E、 食道静脉曲张破裂

答案： B

146、患者,男,30岁。从5米高处跌下4小时,左腰部撞到石块上,当时无昏迷,主诉左腰部疼痛。查体:血压正常。左腰部轻压痛,尿常规:RBC++/HP。最可能的诊断是

A、 肾挫伤

B、 肾部分裂伤

C、 肾全层裂伤

D、 肾蒂损伤

E、 肾蒂损伤伴输尿管损伤

答案： A

147、患者,男,60岁。肝炎病史多年,近半年来除体力较差外无特殊。患者突然呕血,色泽较鲜红,有血块,量约1200ml。查体:贫血貌,心率120次/min,血压80/50mmHg,巩膜无黄染,心肺(-),腹平软,无压痛及包块,肝肋下扪及,质中,脾未及。血红蛋白60g/L,白细胞 $3.0 \times 10^9/L$,血小板 $52 \times 10^9/L$ 。诊断考虑为

A、 溃疡病出血

B、 胃癌出血

C、 胆道出血

D、 急性出血性胃炎

E、 门脉高压症食道胃底静脉曲张破裂出血

答案： E

148、患者,女,25岁,午后低热伴盗汗2个月,胸片示右上肺多形性不均匀的浓密病变,痰菌(-)。拟诊肺结核,下列条件必须具备的是

A、 呼吸道症状

B、 肺部体征

- C、 PPD 试验阳性
- D、 血沉明显增高
- E、 痰菌(+)

答案： C

149、患者,男,67岁。在打麻将时突然言语不清,并摔倒在地,二便失禁,并随即出现意识不清并短暂性肢体抽搐,呕吐频繁。体查:血压 200/105mmHg,双瞳孔等大等圆,脑膜刺激征阳性,此时首选的检查是

- A、 立即行头颅 MRI 检查
- B、 脑电图检查
- C、 经颅多普勒超声
- D、 腰穿
- E、 立即行头颅 CT 检查

答案： E

150、患者,男,52岁。3周前曾有疥疮伴继发感染,3天来出现少尿、水肿,血压 20/12kPa(150/90mmHg)。尿比重 1.018,蛋白(++),红细胞 30~40 个/HP,白细胞 4~8 个/HP,血红蛋白 120g/L。诊断应首先考虑

- A、 急性肾小球肾炎
- B、 慢性肾小球肾炎急性发作
- C、 急性肾盂肾炎
- D、 IgA 肾病
- E、 肾病综合征

答案： A

151、患者,女,36岁。无任何症状,体检时超声发现左侧肾上腺区占位,CT 扫描如图所示,应诊断为



- A、 左肾上腺腺瘤
- B、 左肾上腺囊肿
- C、 左肾上腺嗜铬细胞瘤
- D、 左肾上腺髓样脂肪瘤

E、左肾上腺转移瘤

答案： A

152、宫缩时，胎儿电子监护图形上可见胎心率上升 5~20bpm，持续约 20s，提示

A、胎儿良好

B、胎头受压

C、脐带受压

D、迷走神经兴奋

E、胎盘功能不良

答案： A

153、患者，男，47 岁，因外伤急性失血来诊。表情淡漠，皮肤苍白，毛细血管充盈迟缓，休克指数 1.3。最可能的诊断是

A、未发生休克

B、轻度休克

C、中度休克

D、重度休克

E、休克伴弥散性血管内凝血

答案： C

154、患儿，4 岁，因肺炎就诊，体检时发现心前区隆起，听诊胸骨左缘第 3~4 肋间闻及响亮而粗糙的 4/6 级收缩期杂音伴收缩期震颤。为明确诊断，进一步检查应首选

A、心电图

B、心脏正侧位片

C、心脏彩色多普勒

D、心内膜心肌活检

E、心脏核素扫描

答案： C

155、患者，男，18 岁，咽痛、高热 5 天，在当地治疗。2 天来尿量减少，腰疼来急诊，尿蛋白(+)，RBC20~30 个/HP。为明确诊断，需询问用药史，下列哪项最有意义

A、红霉素

B、庆大霉素

C、氨苄西林

D、环丙沙星

E、氯霉素

答案： B

156、一贲门失弛缓症患者,病史 10 余年,近 1 月症状加重,反复呕吐,其治疗方法为

- A、 少食多餐
- B、 饭后散步
- C、 应用平滑肌松弛药
- D、 扩张疗法
- E、 食管下段及贲门肌层切开


答案: E

157、初产妇,妊娠 40 周,胎膜早破,临产已 20 小时,宫口开大 7cm,胎头 S⁻¹。静滴缩宫素 10 分钟后,宫缩强不缓解,胎心率 90~100 次/min,耻骨上方压痛。首先考虑的诊断是

- A、 胎盘早期剥离
- B、 先兆子宫破裂
- C、 子宫收缩过强
- D、 痉挛性子宫收缩
- E、 高张性子宫收缩功能紊乱

答案: B

158、患者,男,65 岁,进行性排尿困难 3 年,夜尿 6~8 次,夜间偶有尿失禁。前列腺明显增大,有弹性,残余尿 150ml,血压 140/85mmHg,心肺功能正常,最好的治



疗方法是

- A、 经尿道气囊高压扩张术
- B、 耻骨上膀胱造瘘
- C、 前列腺切除术
- D、 5 α 还原酶抑制剂治疗
- E、 α 受体阻滞剂

答案: C

159、患者,男,25岁。因剧烈头痛1天来门诊就诊。检查:神志清醒,颈强硬,无瘫痪,病理征阴性。头部CT外侧裂可见高密度影。为确诊,下列哪项检查最有意义

- A、脑电图
- B、MRI头颅扫描
- C、脑血流图
- D、脑血管造影
- E、腰穿查脑脊液

答案: E

160、患者,男,28岁。2个月来左侧阴囊内有一包块,逐渐肿大,不痛,不发热。1个月前穿破,流脓,抗感染治疗无明显好转,应怀疑

- A、急性睾丸炎
- B、睾丸肿瘤
- C、急性附睾炎
- D、附睾结核
- E、阴囊内丝虫病

答案: D

161、患者,女,22岁,孕34周,G₁P₀。产前检查:胎背位于母体腹部右侧,胎心位于脐右上,宫底部触及浮球感,耻骨联合上方先露部较软,不规则。诊断何种胎方位

- A、RSA
- B、ROA
- C、RSP
- D、RST
- E、ROP

答案: A

162、患儿,男,10岁。发作性意识丧失伴四肢抽搐2年,服药后2年未发作,已自行停药。近1天出现有频繁、连续抽动。在2次发作间神志不清,就诊时有频繁抽搐伴昏迷。首先应采用的治疗是

- A、苯妥英钠 10mg/kg 肌内注射
- B、苯巴比妥肌内注射 15mg/kg
- C、地西泮静脉注射 0.2~0.3mg/kg
- D、副醛 8~10ml 保留灌肠
- E、异戊巴比妥静脉缓慢注射

答案: C

163、患者,男,30岁,工人。挤压综合征又输库存血,血钾 6.9mmol/L, CO_2CP 20mmol/L, 治疗方案应首选

- A、 5%NaHCO₃ 60~100ml 静脉注射后再滴注 100~200ml
- B、 1.25%NaHCO₃ 60~100ml 静脉注射后再滴注 100~200ml
- C、 50%葡萄糖 100ml 静脉注射
- D、 25%葡萄糖 200ml+Insulin 12U 静脉点滴
- E、 阳离子交换树脂 15g, 口服 4 次

答案: A

164、患者,男,40岁,空调修理工。两天前出现咳嗽,无痰,发热 39.2℃,伴腹泻。查体:神志恍惚,HR 70 次/min, R28 次/min, X 线胸片示右下肺斑片状浸润影。Na⁺ 127mmol/L。该患者首选的治疗药物是

- A、 红霉素
- B、 青霉素
- C、 两性霉素 B
- D、 大剂量 TMP-SMZ
- E、 美罗培南

答案: A

165、患者,女,36岁。2个月前突然发热、咽痛、咳嗽、少量黄痰,经消炎治疗不见好转。1个月前,咳嗽加剧,并有呼吸困难,经两次胸穿抽出脓液 300ml,症状不见好转,胸片如图,提示右侧胸腔有一液平。现应采取的治疗方法



- A、 消炎吸氧, 输血补液
- B、 锁骨中线第 2 肋间闭式引流
- C、 胸穿排脓
- D、 腋中线第 7 肋间闭式引流
- E、 腋前线第 9 肋间闭式引流

答案: D

166、患者,男,38岁,持续性上腹剧痛10小时就诊,伴恶心呕吐,腹痛最初位于上腹部偏左,逐渐波及全腹。查体:T39℃,血压12/8kPa,腹平坦,上腹肌紧张,压痛明显,有轻度反跳痛,立腹无膈下游离气体。B超提示有胆结石,血WBC $16\times 10^9/L$,N90%,血清淀粉酶2460U/L(Somogyi法)。最可能的诊断是

- A、消化性溃疡穿孔
- B、急性胆囊炎
- C、轻症急性胰腺炎
- D、重症急性胰腺炎
- E、急性胃炎

答案: D

167、患儿,2个月,患大肠杆菌脑膜炎,经静滴氨苄西林治疗1周余,患儿发热持续不退,频繁惊厥,有落日眼征。患儿治疗效果不佳的原因最可能是

- A、合并硬脑膜下积液
- B、合并脑脓肿
- C、对药物不敏感
- D、合并脑疝
- E、合并脑室管膜炎和脑积水

答案: E

168、患者,女,25岁,哺乳期。乳房胀痛2天,局部红肿,有明显压痛及波动感,体温37.6℃。抗感染治疗针对的主要致病菌是

- A、金黄色葡萄球菌
- B、表皮葡萄球菌
- C、结核分歧杆菌
- D、化脓性链球菌
- E、铜绿假单胞菌

答案: A

169、患者,男,50岁。左侧胸外伤半小时,明显呼吸困难,口唇发绀,气管向右侧偏移,左侧肋间隙饱满,听诊左肺呼吸音消失。应立即采取的治疗方法是

- A、气管切开
- B、加压给氧
- C、输血
- D、患侧胸腔闭式引流术
- E、剖胸探查

答案: D

170、患者,男,38岁,突然上腹剧痛,波及全腹。患者面色苍白,出冷汗。脉搏120/min,血压下降,全腹压痛、反跳痛、肌紧张。该患者首选的检查应为

- A、腹部CT
- B、立位腹部X线检查
- C、PTC
- D、血清淀粉酶
- E、十二指肠引流物检查

答案: B

171、患者,女,44岁,因尿路感染来诊。入院治疗后次日,体温突然下降到35.9℃,嗜睡,皮肤湿冷,尿量每小时20ml,脉压3kPa,脉搏细速。此时,最适合本患者的治疗方案是

- A、应用针对革兰氏阳性菌的抗生素
- B、应用针对革兰氏阴性菌的抗生素
- C、维生素C 1000mg,静脉注射,每日1次
- D、维生素B₁100mg,肌肉注射,每日1次
- E、间羟胺(阿拉明)2mg,肌肉注射

答案: B

172、患者,男,68岁,高血压20年,头晕,腰酸,夜尿多,颜面水肿1周,血压29.3/14.7kPa(220/110mmHg),心界向左下扩大,眼底示Ⅲ级视网膜动脉硬化,尿蛋白(+),白细胞10个/HP,红细胞8个/HP,尿蛋白定量1g/d,下列哪项治疗原则是最主要的

- A、应用降压药物降压治疗
- B、应用激素治疗控制蛋白尿
- C、应用利尿剂消肿和降压
- D、应用抗生素控制尿路感染
- E、应用补肾药物治疗腰酸夜尿

答案: A

173、患儿,女,12岁,自幼诊断为支气管哮喘,3天前因吃鱼虾再次气喘发作。引起患儿气喘的最主要机理是

- A、心率加快
- B、肺血管痉挛
- C、喉痉挛
- D、大气道阻塞
- E、支气管痉挛

答案: E

174、患者,男,53岁,反复咳嗽、咳痰、气喘12年,近3个月咳嗽喘息加重,经用泼尼松治疗后好转。1个月前出现午后低热,并有盗汗及痰中带血丝。血常规正常。胸片左上肺有淡薄片状阴影,中间似有透光区,双肺纹理增多。目前诊断可能为

- A、慢性阻塞性肺疾病合并浸润型肺结核
- B、支气管扩张并感染
- C、支气管肺癌
- D、慢性阻塞性肺疾病
- E、支原体肺炎

答案: A

175、患儿,男,生后6天。近2天吃奶减少,不哭,体温偏低,体检:肛温33℃,面颊,四肢皮肤暗红。小腿及大腿外侧发硬,心率89次/分。复温的方法宜选择

- A、用暖水袋包裹复温
- B、放入37~38℃的温水中进行温水浴
- C、即安置于箱温高于体温1~2℃的暖箱中
- D、即安置于37~38℃的暖箱中
- E、在室温26~28℃病室中,缓慢自然复温

答案: C

176、患儿,男,2岁。发热半个月,脑膜刺激征阳性;末梢血白细胞 $5.1 \times 10^9/L$,中性粒细胞80%,淋巴细胞20%;脑脊液检查:细胞数 $332/mm^3$,中性粒细胞55%,单核细胞45%,糖1.9mmol/L,氯化物169.2mmol/L,蛋白定量3g/L,涂片未找到细菌。诊断最可能是

- A、病毒性脑膜炎
- B、化脓性脑膜炎
- C、结核性脑膜炎
- D、中毒性脑病
- E、脑脓肿

答案: C

177、患者,男,23岁。排尿不适、尿道口流脓3天就诊,有不洁性史,临床怀疑淋病。关于淋病的病原体实验室检查错误的是

- A、分离培养具有很高的特异性,是诊断的“金标准”
- B、直接镜检发现革兰阴性双球菌可确诊
- C、PCR检查敏感性高,有利于早期快速确诊,但易出现假阳性
- D、血清学试验结果需结合其他方法加以证实
- E、培养阴性不能排除淋病

答案: B

178、患者,男,30岁,上腹部规律性疼痛反复发作10年,加重1周,呕血、黑便2天。最可能的诊断是

- A、 出血性胃炎
- B、 消化性溃疡出血
- C、 胃癌出血
- D、 食管胃底静脉曲张破裂出血
- E、 胆道出血

答案: B

179、患者,男,65岁。尿线变细,排尿不畅5年。查体:前列腺触诊发现前列腺略增大,中央沟变浅,表面光滑、质韧,未及无压痛及粘连。该患者最可能的诊断是

- A、 正常前列腺
- B、 急性前列腺炎
- C、 良性前列腺肥大
- D、 前列腺癌
- E、 前列腺钙化

答案: C

180、患者,女,24岁,已婚,体检发现心尖区局限性隆隆样DM,第一心音亢进呈拍击样,为避免病情加重其首要措施是

- A、 避免过劳,避免妊娠
- B、 预防和治疗链球菌感染
- C、 经皮穿刺二尖瓣球囊成形术
- D、 地高辛加强心肌收缩力
- E、 硝酸甘油,减轻心脏负荷

答案: B

181、患者,男,45岁,拔牙术后,突然畏寒高热,体温39℃左右,伴右侧胸痛、咳嗽,少量黏痰,10天后转脓性,痰量增至200毫升/日。体检右下肺叩诊浊音,听诊可闻支气管呼吸音及湿啰音。诊断最可能的是

- A、 肺炎球菌肺炎
- B、 肺炎支原体肺炎
- C、 干酪性肺炎
- D、 肺脓肿
- E、 肺癌伴感染

答案: D

182、一个1岁小儿临床诊断为甲状腺功能低下症,摄X线片测定骨龄时,应摄

- A、 左手腕 X 线片
- B、 右手腕 X 线片
- C、 左腕、膝 X 线片
- D、 右腕、膝 X 线片
- E、 以上都不是

答案： C

183、患者,女,45岁,以“右乳肿物”为主诉入院。查体:肿物位于右侧乳房外上象限,大小约4cm×3cm,质硬,边界不清,活动度欠佳,同侧腋窝可触及2个直径约1cm肿大淋巴结,可推动,诊断为“右侧乳腺癌”,临床各检查未发现远处转移。该患者乳腺癌应属于

- A、 0期
- B、 I期
- C、 II期
- D、 III期
- E、 IV期

答案： C

184、某男婚前医学检查时被查出艾滋病病毒抗体阳性,以下做法不符合法律规定的是

- A、 医师应当提出暂缓结婚的医学建议
- B、 医师应当将其患病情况通报其工作单位
- C、 准备结婚的男女双方应当暂缓结婚
- D、 医疗保健机构应当为其治疗提供医学咨询
- E、 医疗保健机构应当为其治疗提供医疗服务

答案： B

185、患儿,男,4个月。左耳流脓2天后发热5天,抽搐2次。查体:体温40℃,左外耳道积脓,左乳突处压痛,前囟紧张,布氏征(+)、克氏征(+).血白细胞 $20 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.88。CSF细胞数 $800 \times 10^6/L$,潘氏试验(+),糖1.8mmol/L。氯化物110mmol/L。最可能诊断为中耳炎、乳突炎合并

- A、 败血症
- B、 病毒性脑炎
- C、 高热惊厥
- D、 化脓性脑膜炎
- E、 脑脓肿

答案： D

186、患者,男,40岁,车工,因近2月以来经常加班劳动而引起腰背疼及活动障碍。约5天前又扭伤腰部,疼痛加剧,且向右下肢后侧放射,咳嗽时加重,跛行,

脊柱向左侧凸,腰 4~5 棘间和棘旁压痛,右小腿及右足背外侧痛、温觉减退,跟腱反射减弱,右侧直腿抬高试验(+)约 25°,加强试验(+),右足趾背伸力减弱,X 线照片仅见腰部脊柱变直,根据以上情况初步诊断

- A、 腰肌劳损
- B、 棘上、棘间韧带损伤
- C、 强直性脊柱炎
- D、 腰椎间盘突出症
- E、 腰椎结核

答案: D

187、患者,男,35 岁,3 天前于头部外伤后出现右眼上睑下垂,伴眼球不能向上、向内运动,诊断为动眼神经麻痹,下列眼球外肌中可能受累的是

- A、 上睑提肌和外直肌
- B、 上睑提肌和下斜肌
- C、 上睑提肌和上斜肌
- D、 内直肌和上斜肌
- E、 外直肌和下斜肌

答案: B

188、患者,男,54 岁。进行性吞咽困难已半年。食管钡透见中段食管有 6cm 长狭窄。管壁僵硬,黏膜破坏。最适宜的治疗方法是

- A、 放射治疗
- B、 化学治疗
- C、 激光治疗
- D、 手术治疗
- E、 免疫治疗

答案: D

189、患者,女,25 岁,心悸,气促,反复咯血。查体:心尖部可闻舒张期隆隆样杂音,P₂亢进,双肺可闻湿性啰音。最可能的诊断为

- A、 风心病,二尖瓣狭窄并左心衰竭
- B、 急性心肌梗死
- C、 急性病毒性心肌炎
- D、 支气管扩张
- E、 肺梗死

答案: A

190、患者,男,25岁。四肢无力4天。检查发现四肢为下运动神经元性瘫痪,四肢远端可疑痛觉减退。神经传导速度测定明显减慢,初步考虑为急性炎性脱髓鞘性多发性神经病,在病史询问中最有诊断意义的是

- A、 长期饮酒史
- B、 有机磷农药中毒
- C、 病前1~4周有上呼吸道或消化道感染症状
- D、 长期吸烟
- E、 近期曾服驱虫药物

答案: C

191、青年男性患者,饮酒后上腹剧痛,放射至腰背部,伴恶心、呕吐。查体:T 38.5℃,皮肤巩膜无黄疸。心肺正常,肝脾未及,Murphy征阴性,左上腹压痛,肠鸣音存在。查血WBC $9.2 \times 10^9/L$,N80%,血淀粉酶360U(正常80~180U)。首选的治疗药物是

- A、 哌替啶
- B、 青霉素
- C、 阿托品
- D、 地塞米松
- E、 三钾二橐络合铋

答案: C

192、患者,男,45岁。左侧输尿管内有一1.0cm×1.5cm的密度增高影,右肾盂内有大小分别为2.0cm×2.2cm、1.5cm×1.7cm的密度增高影。如果决定手术治疗,应先行

- A、 左输尿管套石术
- B、 左输尿管切开取石术
- C、 右肾部分切除术
- D、 右肾盂切开取石术
- E、 右肾实质切开取石术

答案: B

193、患者,男,40岁,急诊就诊,述上腹突发疼痛3小时,持续性,不敢平卧。查体:全腹肌紧张,呈板状硬,明显反跳痛,压痛。在询问病史时,哪项最重要

- A、 是否吸烟史
- B、 是否有消化性溃疡病史
- C、 是否有饮酒史
- D、 是否爱吃高脂肪饮食
- E、 是否有冠心病病史


答案: B

194、患者,男,58岁。上腹不适,食欲缺乏3个月。近1个月来,出现黄疸进行性加重,伴有低热。查体:全身黄染明显,右肋下可扪及胆囊底部。血胆红素 $225.5\mu\text{mol/L}$,尿常规示胆红素阳性。最可能的诊断是

- A、胆石症
- B、胰头癌
- C、慢性胰腺炎
- D、病毒性肝炎
- E、肝内胆汁淤积症

答案: B

195、腹外疝疝外被盖的组成不包括



- A、皮肤
- B、皮下组织
- C、筋膜
- D、肌肉
- E、壁腹膜

答案: E

196、患者,男,25岁,腰麻下行阑尾切除术,术后8小时患者诉下腹部胀痛,躁动不安,未解小便。最可能的情况是

- A、盆腔感染
- B、尿路感染
- C、尿潴留
- D、肠麻痹
- E、阑尾系膜出血

答案: C

197、慢性髓性白血病患者,男,33岁,伴有巨脾。家中活动后突发左上腹剧痛,应考虑诊断是

- A、脾梗死
- B、心绞痛
- C、胃穿孔
- D、胰腺炎

E、 胆囊炎

答案： A

198、患者,女,24岁。在妊娠17周时,测得血中AFP是正常人均值的6倍。下一步检查应该是

- A、 再次检查AFP
- B、 超声检查
- C、 羊膜腔穿刺
- D、 羊膜腔胎儿造影
- E、 胎儿镜检查

答案： B

199、患儿,女,1岁。人工喂养,面色苍白2个月,营养发育差,睑结膜苍白,心前区可闻2级收缩期杂音,肝脾轻度肿大,手有颤抖。Hb 5.5g/dl, RBC 250万/mm³。RBC大小不等,大细胞中空淡染,最可能的诊断是

- A、 营养性缺铁性贫血
- B、 再生障碍性贫血
- C、 慢性失血性贫血
- D、 慢性溶血性贫血
- E、 营养性混合性贫血

答案： E

200、患者,女,28岁,已婚。畏寒、寒战,继之发热,体温达39℃,伴剧烈头痛,持续4~6小时后热退,退热患者感体力尚正常,能进食,每2日发作1次,共3次。追问病史,停经已4个月。血象:WBC $7.7 \times 10^9/L$, N0.72, L0.28。应采取哪项治疗措施

- A、 氯喹+伯氨喹
- B、 氯喹快速静脉推注
- C、 奎宁注射液作快速静脉推注
- D、 米帕林+伯氨喹
- E、 奎宁+伯氨喹

答案： A

201、患者,女,32岁,因上腹痛10小时,伴发热、呕吐,于急诊就诊,查血清淀粉酶1000U/L(Somogyi),诊断为急性胰腺炎。其最基本的治疗方案是

- A、 肾上腺皮质激素
- B、 禁食补液
- C、 抗生素
- D、 抑肽酶

E、 胰岛素

答案： B

202、 青春期女性, 自月经来潮, 经量明显多于同龄人, 幼时常有皮肤黏膜出血表现, 检查发现血小板计数正常, vWD:Ag 减低, 该患者最可能的诊断是

A、 血友病 A

B、 血友病 B

C、 血友病 C

D、 血管性血友病

E、 以上均不是

答案： D

203、 某患鼻出血及皮肤紫癜, 胸骨压痛(+), 肝脾未触及, 血象及骨髓象中有大量原始细胞并有部分早幼粒细胞, 能找到 Auer 小体, 部分原始细胞过氧化酶阳性, 中性粒细胞碱性磷酸酶积分阴性, 非特异酯酶染色阴性, 最恰当常用的治疗方案是

A、 VP 方案

B、 VLP 方案

C、 DA 方案

D、 VLDP 方案

E、 HAD 方案

答案： C

204、 患者, 男, 32 岁, 因为车祸失血过多入急诊室, 神志不清, 口唇发绀, 心率 130 次/min, 血压 78/48mmHg。请问患者出现何种类型的休克

A、 低血容量性休克

B、 心源性休克

C、 感染性休克

D、 分布性休克

E、 血管源性休克

答案： A

205、 一肺心病呼衰患者, 经综合治疗后血气分析: pH7.36, PaO₂ 7.3kPa (56mmHg), PaCO₂ 8.7kPa (64mmHg), HCO₃⁻ 48mmol/L, BE+18mmol/L, 最可能存在的酸碱紊乱为

A、 呼吸性酸中毒

B、 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

C、 代谢性酸中毒

D、 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

E、 代谢性碱中毒

答案： B

206、 患儿, 男, 10 岁, 发热出疹 3 天。红疹始于面部, 后向肢体扩散。A 族链球菌抗原检测阴性, 诊断为传染性红斑。最可能导致该病的病原体是

A、 风疹病毒

B、 痘病毒

C、 人乳头瘤病毒

D、 单纯疱疹病毒

E、 细小 DNA 病毒

答案： E

207、 患儿, 女, 2 个月。拒食、 吐奶、 嗜睡 3 天, 查体: 面色青灰, 前囟张力较高。该患儿最关键的检查应为

A、 脐分泌物培养

B、 血常规

C、 脑脊液检查

D、 血气分析

E、 头颅 CT

答案： C

208、 患者, 男, 35 岁, 因慢性再生障碍性贫血 2 年, 头晕、 乏力、 心悸 2 天入院。查体: 贫血容貌, 血红蛋白 50g/L, 患者既往有多次输血史, 一个月前在输血过程中曾出现发热反应, 体温达 40℃, 经过对症处理缓解。此次给予输血治疗, 首选的血液制品是

A、 全血

B、 红细胞悬液

C、 去白红细胞

D、 浓缩红细胞

E、 洗涤红细胞

答案： C

209、 患者, 女, 72 岁, 主因眩晕、 努嘴、 半身不自主运动一天就诊。诊断为间脑出血并发症手足徐动舞蹈样半身舞蹈症。出血位置可能位于

A、 背侧丘脑

B、 底丘脑

C、 上丘脑

D、 下丘脑

E、 后丘脑

答案： B

210、初孕妇,孕 40 周,临产 20 小时,估计胎儿 3800g,宫口开全 2 小时,胎头 S⁻²。产妇诉下腹痛,膀胱区隆起,有压痛,导尿有红细胞。最正确的处理是

- A、 立即行剖宫产
- B、 即行吸引器助产
- C、 静脉滴注催产素
- D、 产钳助产
- E、 再观察 1 小时

答案： A

211、一哮喘患者因支气管哮喘患者急性发作就诊于医院急诊,下列哪项治疗不恰当

- A、 立即雾化吸入短效 β_2 -受体激动剂
- B、 应用白三烯受体拮抗剂
- C、 静脉应用糖皮质激素
- D、 静脉应用抗生素
- E、 静脉应用茶碱类药物

答案： D

212、一男性食管癌患者,既往无慢性咳嗽史,放疗中出现咳嗽,喝水呛咳,有发热,应警惕

- A、 放疗气管反应
- B、 肺部感染
- C、 纵隔穿孔脓肿
- D、 气管食管瘘伴肺部感染
- E、 放射性肺炎

答案： D

213、患者女,48 岁,中学教师。近 2 年带高考班,感觉压力大,逐渐出现入睡困难、胸闷、心慌、坐卧不安,伴有头昏、乏力、潮汗等。经常担心学生发生意外,不停的观察学生的行为,担心自己会患癌症。查体及辅助检查未见明显意外。该患者的诊断考虑为

- A、 抑郁症
- B、 更年期综合征
- C、 广泛性焦虑障碍
- D、 神经衰弱
- E、 急性应激障碍

答案： C

214、初孕妇, 31 岁, 妊娠 31 周, 无自觉症状。肥胖, 血压升高一年余。查体: 血压 150/100mmHg, 尿蛋白(-)。应考虑诊断为

- A、 妊娠高血压
- B、 子痫前期
- C、 重度子痫前期
- D、 慢性高血压合并妊娠
- E、 慢性高血压并发子痫前期

答案: D

215、患者, 女, 20 岁, 学生, 发热、咳嗽半月, 鼻出血及口腔黏膜出血 5 天。查体: T 39.5℃, 双肺散在湿啰音, 脾肋下 2cm。Hb90g/L, WBC 33×10^9 /L, PLT 25×10^9 /L。骨髓象: 原粒 5%, 早幼粒 28%, 粒红比 6:1。为明确诊断对骨髓片应再作的检查首选

- A、 碱性磷酸酶染色
- B、 过氧化物酶染色
- C、 糖原染色
- D、 非特异性酯酶染色
- E、 氟化钠抑制试验

答案: A

216、患者, 男, 40 岁。因自杀割腕大出血发生休克, 抢救处理后, 能够反映补充血容量成功的较好的指标是

- A、 口渴减轻
- B、 动脉血氧分压上升
- C、 呼吸频率减慢
- D、 尿量增加
- E、 血红蛋白浓度上升

答案: D

217、初孕妇, 28 岁, 孕 40 周, 双胎妊娠。胎盘功能检查提示有减退情况, 下一步处理应是

- A、 及早终止妊娠
- B、 期待疗法
- C、 给予保胎药物
- D、 等待自然发动宫缩
- E、 予维生素 D

答案: A

218、患者,男,61岁,体检发现肝左叶占位,进一步行腹部CT证实肝左叶实性占位,下述描述中对于肝内胆管细胞癌具有诊断价值的为

- A、病灶周围可见胆管扩张
- B、AFP正常
- C、患者乙肝五项检查结果均为阴性
- D、患者有长期饮酒史
- E、患者有胆囊结石病史

答案: A

219、患儿,男,10岁,低热,干咳5天。查体:两肺未闻及干湿啰音。WBC $8.9 \times 10^9/L$, N 75%, L 25%。肺部X线示:左下肺出现云雾状阴影。最恰当的处理应为

- A、用抗结核药
- B、用病毒唑
- C、用复方新诺明
- D、用头孢霉素
- E、用红霉素

答案: E

220、患者,男,28岁,左腰背酸胀5个月,CT检查如图所示,应诊断为



- A、左肾上腺髓样脂肪瘤
- B、左肾上腺错构瘤
- C、左肾上腺嗜铬细胞瘤
- D、左肾上腺腺瘤
- E、左肾上腺转移瘤

答案: B

221、患者,男,39岁。间断上腹部疼痛半年余伴反酸、剑突下烧灼感,夜间及空腹时明显,进食后可缓解,突发恶心呕吐12小时,呕吐物为咖啡渣样物,伴黑便。查体:轻度贫血貌,上腹部轻压痛,余(-),腹平片未见异常。考虑最可能的诊断为

- A、消化性溃疡出血

- B、胃癌出血
- C、食管静脉曲张破裂出血
- D、胆道出血
- E、应激性溃疡出血

答案： A

222、患者,女,20岁,转移性右下腹痛30小时,伴呕吐发热,体温38.5℃,下腹部有压痛,右侧为重,并有反跳痛、肌紧张,腹腔穿刺液应为

- A、黄色透明液体
- B、带臭味脓性液
- C、黄色浑浊无臭味
- D、浅红色水样液体
- E、暗红色血样液

答案： B

223、患者,女,停经3个月后出现腹痛伴阴道出血。妇科检查示子宫增大,质软。双侧附件区均可扪及4cm×5cm囊性、活动好、无压痛之肿块。分泌物为血性,尿HCG阳性。则双侧附件肿块最有可能是

- A、双侧输卵管积水
- B、双侧输卵管卵巢囊肿
- C、双侧卵巢巧克力囊肿
- D、双侧卵巢黄素样囊肿
- E、双侧卵巢浆液性囊肿

答案： D

224、患者,女,36岁。右侧周围性面瘫征伴右耳部疼痛,右舌前2/3味觉丧失,右侧外耳道小疱疹,触及疼痛。该病变部位最可能在

- A、脑干
- B、右侧内听道
- C、右侧膝状神经节
- D、右面神经管内
- E、右侧茎乳突孔内

答案： C

225、患儿,男,11岁。出生1个月时发现心脏杂音,当时查体:于胸骨左缘2肋间及3/6级粗糙收缩期杂音,伴P₂增强,S₂固定分裂。现患儿渐感劳力性心累气紧,活动后出现发绀,杵状指。诊断考虑

- A、左心功能衰竭
- B、右心功能衰竭

- C、 法洛四联症
- D、 肺静脉异位引流
- E、 艾森门格综合征

答案： E

226、患者,男,82岁,有10年肺心病及冠心病病史,既往曾诊断为十二指肠球部溃疡,于凌晨3点突发上腹痛,发病后10小时,目前最佳治疗方案不包括

- A、 半卧位,必要时超声引导下腹腔穿刺引流
- B、 禁食、胃肠减压
- C、 纠正水、电解质紊乱
- D、 应用广谱抗生素
- E、 急诊手术治疗

答案： E

227、孕妇,38岁,孕16周,风湿性心脏病,活动后有心慌胸闷等不适,孕前未发生过心衰。查体:安静状态下心率100次/min,呼吸18次/min。恰当的处理为

- A、 立即人工流产
- B、 严密监护下继续妊娠
- C、 严密监护下行剖宫取胎术
- D、 同正常妊娠,无须特殊监护
- E、 立即药物流产

答案： B

228、患者女,24岁,脑海中反复出现“佛”字及自己得了艾滋病躺在医院里的场景,总是认为自己得了艾滋病等想法。往往试图控制,但不成功。该症状为

- A、 强迫性怀疑
- B、 强迫性意向
- C、 强迫性回忆
- D、 强迫性联想
- E、 强迫思维

答案： E

229、孕妇,妊娠39周,来院前抽搐2次,现昏睡状,血压

26/16kPa(195/120mmHg),胎儿头位,胎心率140次/min,有不规则宫缩。以下哪项治疗是错误的

- A、 静脉滴注硫酸镁及冬眠合剂
- B、 减少声光,触动等刺激
- C、 备开口器,安装床栏防受伤
- D、 留置尿管观察尿量

E、立即配血行剖宫产

答案： E

230、患者,女,30岁。左颈无痛性淋巴结肿大半年,活检示淋巴结结构破坏,大量纤维束将病变分隔,病变内有炎细胞和陷窝细胞。诊断为结节硬化型霍奇金淋巴瘤。该陷窝细胞属于

- A、里-施细胞
- B、大无裂细胞
- C、大裂细胞
- D、巨噬细胞
- E、施万细胞

答案： A

231、患者,女,38岁。乘车后突然发生右下腹痛,恶心欲吐,既往曾有类似发作史。查体:腹软,右下腹有深压痛,尿检白细胞少许,红细胞(+++)。诊断应首先考虑

- A、急性阑尾炎
- B、右侧输尿管结石
- C、右侧附件炎
- D、肠道蛔虫症
- E、梅克尔憩室炎

答案： B

232、某老年男性患者,肺部感染入院。常规治疗后,疗效不佳。考虑到可能出现了耐药性菌株感染。此时,做抗生素敏感试验时,应选择细菌增殖的

- A、迟缓期早期
- B、对数生长期
- C、稳定期后期
- D、稳定期中期
- E、衰亡期早期

答案： B

233、患者,男,26岁。咳嗽、高热3天,1周前有淋浴受凉史。自述咳痰为铁锈色,可能是哪种细菌感染

- A、肺炎链球菌
- B、乙型溶血性链球菌
- C、肺炎克雷伯菌
- D、铜绿假单胞菌
- E、金黄色葡萄球菌

答案： A

234、医生帮一垂体瘤患者检查视野,发现存在双眼颞侧视野缺损。推测损伤是以下哪一部位

- A、 视神经
- B、 视网膜
- C、 视交叉
- D、 视束
- E、 枕叶

答案： C

235、成年女性患者,乏力、虚弱、食欲减退、消瘦 2 年,伴有闭经、阴毛及腋毛脱落,皮肤、黏膜色素沉着。诊断应考虑

- A、 甲亢
- B、 甲减
- C、 继发性肾上腺皮质功能减退症
- D、 Addison 病
- E、 慢性消耗性疾病

答案： D

236、患儿,男,8 个月,体重 7.2kg,头围 38cm,身长 66cm,能抬头,不会坐,乳牙 1 枚,前囟门已闭合,最为可能的诊断是

- A、 佝偻病
- B、 小头畸形
- C、 营养不良症
- D、 呆小病
- E、 侏儒症

答案： B

237、患者,男,22 岁,雪后滑倒骨折,伤处局部处理。关于创伤后的包扎,下列哪项是错误的

- A、 包扎固定应牢固,松紧适度
- B、 包扎的目的是保护伤口、减少污染、固定敷料和止血
- C、 包扎的常用材料是绷带和三角巾
- D、 三角巾包扎的优点是制作方便、操作简捷、便于加压、够牢固
- E、 紧急抢救中,可将衣物、巾单撕开作包扎用

答案： D

238、患者,男,36岁,因头晕胸痛半月来诊。血压 160/35mmHg,胸片提示靴型心。下列体征不可能出现的是

- A、 毛细血管搏动征
- B、 水冲脉
- C、 胸骨右缘 2 肋间的收缩期震颤
- D、 胸骨左缘 3/4 肋间的舒张早期递减性杂音
- E、 枪击音

答案: C

239、患者,男,18岁,因溺水入院第3天出现呼吸困难。查体:R40次/min, BP90/68mmHg, HR100次/min, 口唇发绀,两肺湿啰音。吸氧 5L/min 时, PaO₂56mmHg, PaCO₂28mmHg。患者最可能出现的并发症是

- A、 心力衰竭
- B、 急性呼吸窘迫综合征
- C、 脑膜炎
- D、 麻痹性肠梗阻
- E、 消化道出血

答案: B

240、患者,男,41岁,既往因输血后感染丙肝病史 23 年,诊为肝硬化、门静脉高压症 7 年,腹部查体视诊可能发现的最典型的体征为

- A、 腹部膨隆
- B、 肠形
- C、 腹壁浅静脉曲张
- D、 脐疝
- E、 腹股沟疝

答案: C

241、一男性活动性肺结核患者服用异烟肼和乙胺丁醇,请问乙胺丁醇的作用是

- A、 促进异烟肼进入结核菌
- B、 促进异烟肼通过血脑屏障
- C、 延缓异烟肼肌注后的吸收
- D、 延缓耐药性产生
- E、 抑制异烟肼经肾排泄,增加血药浓度

答案: D

242、患者,男,25岁,患有脑炎,呼吸不规则,并有暂停,神志不清。血气分析:PaO₂5.33kPa(40mmHg), PaCO₂4.67kPa(35mmHg)。氧疗时宜采用

- A、持续低流量给氧
- B、鼻塞低浓度间歇给氧
- C、高浓度给氧
- D、鼻导管低浓度给氧
- E、鼻塞给氧

答案： C

243、患者,女,40岁,咳嗽、低热、乏力3个月,胸片见双肺门增大,双肺网格状影,PPD皮试阴性。为明确诊断,下列检查最有价值的是

- A、支气管肺泡灌洗
- B、肺功能
- C、胸部CT
- D、肺活检
- E、血清免疫学

答案： D

244、患儿,2岁。精神运动发育落后,有特殊面容,呈两眼外眦上翘,两眼内眦距离增宽,鼻梁低平,通贯手,手足心皮肤粗糙,临床上已诊断为先天性愚型。做染色体核型分析,下列哪一组是最常见的

- A、 $47xx(xy), +21$
- B、 $46xy(xx), -14, +t(14q, 21q)$
- C、 $46xx(xy)/47, xy(xx)+21$
- D、 $46xx(xy), -22, +t(21q, 21q)$
- E、 $46xx(xy), -22, +t(21q, 22q)$

答案： A

245、患者,男,50岁,近3个月有刺激性咳嗽,有时痰中带血,不发热,胸片显示右肺上叶前段不张,最可能诊断为

- A、肺炎
- B、肺结核
- C、肺门淋巴结结核合并肺不张
- D、中央型肺癌并发肺不张
- E、肺脓肿

答案： D

246、患者,男,50岁,经理。在梅毒感染15年后出现记忆障碍,易激惹,情绪波动,并有夸大妄想,伴构音障碍,反射亢进。目前治疗中不正确的是

- A、保证脑脊液中抗生素达有效治疗浓度
- B、可使用相应的抗精神病药物

- C、 如又出现情绪低落可使用相应的抗抑郁药物
- D、 支持疗法
- E、 ECT 治疗

答案： E

247、 患儿 3 岁, 房间隔缺损, 拟行不停跳下房缺修补术, 合适的体外循环方法为

- A、 常温体外循环
- B、 浅、中度低温体外循环
- C、 深低温低流量体外循环
- D、 深低温体循环
- E、 上、下半身分别灌注体外循环

答案： A

248、 胸骨左缘第 3 肋间 3 级收缩期喷射性杂音, X 线肺血减少, 肺动脉段隆凸, 右室大, 最可能的诊断是

- A、 房间隔缺损
- B、 室间隔缺损
- C、 动脉导管未闭症
- D、 肺动脉口狭窄
- E、 三尖瓣关闭不全

答案： D

249、 患者, 女, 32 岁, 农民。急性机械性肠梗阻 4 天收入院, 虚弱无力, 脱水征明显, BP12/8kPa(80/60mmHg), P120 次/min, 血钠 120mmol/L, 血钾 3.0mmol/L, CO₂CP18mmol/L。其补液首先应是

- A、 补钠
- B、 补钾
- C、 纠正酸中毒
- D、 补充血容量
- E、 补充水

答案： D

250、 患者, 男, 60 岁, 因痰多咳嗽就诊, 怀疑为下呼吸道感染。可能感染的结构是

- A、 鼻腔
- B、 口腔
- C、 喉腔
- D、 气管
- E、 胸膜顶

答案： D

251、患者,女,26岁,腹泻1年,每日2~3次,进食蔬菜、蛋白后腹泻加重,多次查粪常规,可见红、白细胞,严重时可见肉眼脓血便。粪培养多次(-)。为明确诊断,最有效的诊断方法是

- A、 依靠临床表现
- B、 粪常规及培养
- C、 X线钡剂灌肠
- D、 纤维结肠镜检
- E、 血清免疫球蛋白

答案: D

252、患儿,女,10岁。身高明显低于同龄组儿童,小学3年级,学习成绩良好。近半年来出现头痛,以晨起为重,症状逐渐加重,可能的诊断为

- A、 颅咽管瘤伴梗阻性脑积水
- B、 松果体瘤伴梗阻性脑积水
- C、 髓母细胞瘤伴梗阻性脑积水
- D、 中脑肿瘤伴梗阻性脑积水
- E、 交通性脑积水

答案: A

253、患儿,女,7个月。因独坐不稳来门诊。查体:前囟2cm×2cm,平,眼距宽,鼻梁低,舌伸出口外,流涎多,牙未出,心肺(-),贯通掌,下列检查有确诊意义的是

- A、 腕部摄片测骨龄
- B、 血钙、磷,碱性磷酸酶
- C、 血清T₃、T₄测定
- D、 尿三氯化铁测定
- E、 染色体检查

答案: E

254、患者,男,30岁,车祸导致近侧腕骨损伤。最有可能损伤的骨是

- A、 头状骨
- B、 钩骨
- C、 大多角骨
- D、 三角骨
- E、 小多角骨

答案: D

255、患者,男,25岁,有肾功能不良病史,本次因大面积烧伤后并发绿脓杆菌感染,应选用的抗菌药物是

- A、庆大霉素
- B、氨苄西林
- C、氯霉素
- D、头孢哌酮
- E、林可霉素

答案： D

256、腰椎间盘突出在神经根外侧时,功能性腰椎侧突应是

- A、腰椎无侧凸变化
- B、腰椎凸向健侧
- C、腰椎凸向患侧
- D、腰椎侧凸方向不定
- E、腰椎前凸增加

答案： C

257、患者,男,20岁。昨日进食海产品,今日开始较频繁腹泻,水样便,继之呕吐,但无腹痛,不发热,口渴,腓肠肌疼痛。查体:T36℃,BP60/40mmHg,脱水,呼吸平稳,心肺正常,腹平软、无压痛,四肢微凉。血象:WBC $20.0 \times 10^9/L$,粪便镜检:WBC0~2/HP。抢救该患者,最紧急措施是

- A、大量补液
- B、抗生素
- C、给升压药
- D、给止泻药
- E、给氢化可的松静滴

答案： A

258、患者,男,46岁,劳力性胸痛2个月,突感心悸、胸闷,血压为90/60mmHg,心尖S₁强弱不等;心电图示心室率150次/min,P波与QRS波群无固定关系,QRS波增宽为0.14s,可见室性融合波。最可能的诊断为

- A、频发室性期前收缩
- B、心房颤动
- C、心房扑动
- D、阵发性室上性心动过速
- E、阵发性室性心动过速

答案： E

259、患者,男,26岁,农民,哮喘严重持续发作24小时以上,下列哪项不符合发作时的临床表现

- A、张口呼吸

- B、 大量出汗
- C、 发绀明显
- D、 端坐呼吸
- E、 四肢厥冷

答案： E

260、患儿,5个月。夜间烦躁不安、多汗、枕秃、有颅骨软化。血钙 2mmol/L (8mg/dl)、血磷 1.0mmol/L (3mg/dl)、碱性磷酸酶 310U/L (金氏单位), 25-(OH)D_3 下降。诊断及治疗应为

- A、 佝偻病初期,维生素D治疗
- B、 佝偻病激期,维生素D治疗
- C、 佝偻病恢复期,维生素D治疗
- D、 佝偻病恢复期,维生素D预防
- E、 佝偻病后遗症期,不需治疗

答案： B

261、患者,男,33岁,近半个月来乏力、低热。查体:体温 38°C ,右下胸饱满,叩诊呈实音,呼吸音消失。胸透示右胸凹面向上,外高内低的致密阴影。为明确诊断,最主要的检查是

- A、 胸片
- B、 超声波检查
- C、 痰细菌学及细胞学检查
- D、 胸穿抽液常规及细胞学(或细菌学)检查
- E、 血常规、血沉或OT检查

答案： D

262、患者,男,20岁,咳嗽数周。1个月前开始感到疲劳,食欲减退,发热2周后咳痰中带血丝,体重减轻,体温 38°C 。临床怀疑患肺结核,取痰做下列处置,哪项是错误的

- A、 做结核菌素试验
- B、 痰浓缩集菌涂片进行抗酸染色
- C、 PCR查结核分枝杆菌核酸
- D、 痰结核分枝杆菌培养
- E、 痰培养物接种豚鼠进行动物实验

答案： A

263、患者,男,52岁,是一位搬运工,一次搬重物后,腰部疼痛,一侧下肢麻木、疼痛症状。经检查医生诊断为腰4~5腰椎间盘突出症。椎间盘的纤维环破裂,髓核易向

- A、 后外侧脱出
- B、 后内侧脱出
- C、 前外侧脱出
- D、 前内侧脱出
- E、 向正前方脱出

答案： A

264、患者, 16 岁。今日突发呼吸困难, 发作前有鼻痒、喷嚏、流涕、干咳。查: 血压正常, 端坐呼吸, 肺有哮鸣音, 心率 110 次/min, 律齐无杂音。首先应考虑的诊断是

- A、 上呼吸道感染
- B、 慢性支气管炎喘息型
- C、 支气管哮喘
- D、 心源性哮喘
- E、 过敏性肺炎

答案： C

265、患者, 女, 55 岁, 家庭妇女, 有吸烟嗜好。咳嗽、憋气 1 个月, 胸片示双肺门增大、左上肺纹理增重, 纤维支气管镜活组织检查示左上叶开口被菜花样肿物阻塞, 病理报告为小细胞癌。入院 3 天后呼吸困难加重, 发热 38℃左右, 不能平卧。首选处理方法

- A、 抗感染治疗后手术切除左上肺叶
- B、 抗感染治疗+放射治疗
- C、 抗感染治疗
- D、 化学药物治疗+抗感染治疗
- E、 免疫疗法+抗感染治疗

答案： D

266、患儿, 女, 1 岁 2 个月。近 2 周烦躁, 不规律发热 38.5℃, 近 2 日来呕吐, 便秘, 易激惹, 脑脊液细胞数 $380 \times 10^6/L$ ($380/mm^3$), 中性 0.60, 蛋白 1.8g/L, 糖 1.4mmol/L (25mg/dl), 氯化物 102.6mmol/L (600mg/dl), 首先考虑为

- A、 化脓性脑膜炎
- B、 病毒性脑膜炎
- C、 结核性脑膜炎
- D、 中毒性脑病
- E、 隐球菌性脑膜炎

答案： C

267、重度妊高征患者, 血压 204/110mmHg, 首选的降压药是

- A、 利血压
- B、 肱屈嗪
- C、 甲基多巴
- D、 复方卡托普利
- E、 复方降压片

答案： B

268、患者,女,左颈前肿块2个月来诊。查体:甲状腺右叶上极触及3cm×2cm肿块,表面光滑,颈部未触及肿大的淋巴结。该患者首选的检查是

- A、 甲状腺B超
- B、 颈部CT
- C、 肿块针吸细胞学检查
- D、 甲状腺核素扫描
- E、 颈部正侧位X线片

答案： C

269、一名病后3周的伤寒患者,在住院过程中体温骤降,脉细速、烦躁、血压下降,应首先考虑为

- A、 中毒性心肌炎
- B、 肠穿孔
- C、 肠出血
- D、 支气管肺炎
- E、 中毒性休克

答案： C

270、某患者诊断为铜绿假单胞菌感染,治疗药物选择第三代头孢菌素头孢他啶。有关第三代头孢菌素的特点,叙述错误的是

- A、 对β内酰胺酶有较高的稳定性
- B、 对铜绿假单胞菌作用强
- C、 对G⁺菌作用不如第一、二代
- D、 体内分布较广
- E、 基本无肾毒性

答案： C

271、提早出现P波,形态与窦性P波略异,其后无相关QRS波,为

- A、 房性期前收缩
- B、 交界性期前收缩
- C、 室性期前收缩
- D、 房性期前收缩未下传
- E、 交界性逸搏

答案： D

272、提早出现 QRS 波,时限 $>0.12s$,其前无相关 P 波,为

- A、 房性期前收缩
- B、 交界性期前收缩
- C、 室性期前收缩
- D、 房性期前收缩未下传
- E、 交界性逸搏

答案： C

273、提早出现 P 波,在 aVR 导联直立, II、III、aVF 导联倒置, $P-R<0.12s$,QRS 形态正常,为

- A、 房性期前收缩
- B、 交界性期前收缩
- C、 室性期前收缩
- D、 房性期前收缩未下传
- E、 交界性逸搏

答案： B

274、提早出现 P 波, $P-R$ 为 $0.16s$,QRS 形态正常,为

- A、 房性期前收缩
- B、 交界性期前收缩
- C、 室性期前收缩
- D、 房性期前收缩未下传
- E、 交界性逸搏

答案： A

解析： A

(275~278 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 垂体前叶
- B. 下丘脑
- C. 肾上腺
- D. 甲状腺
- E. 胰岛

275、分泌人生长激素的是

- A、 垂体前叶
- B、 下丘脑
- C、 肾上腺
- D、 甲状腺

E、 胰岛

答案： A

276、分泌促生长激素释放激素的是

A、 垂体前叶

B、 下丘脑

C、 肾上腺

D、 甲状腺

E、 胰岛

答案： B

277、分泌三碘甲腺原氨酸的是

A、 垂体前叶

B、 下丘脑

C、 肾上腺

D、 甲状腺

E、 胰岛

答案： D

278、分泌性激素的是

A、 垂体前叶

B、 下丘脑

C、 肾上腺

D、 甲状腺

E、 胰岛

答案： C

解析： C

(279~281 共用备选答案)

共用备选答案

A. 腹部超声

B. 腹部 CT

C. 肝脏穿刺活检

D. FibroScan

E. 肝功能检查

279、哪项是脂肪性肝病的首选检查

A、 腹部超声

B、 腹部 CT

C、 肝脏穿刺活检

D、 FibroScan

E、 肝功能检查

答案： A

280、哪项是诊断慢性肝纤维化最佳的无创检查

A、 腹部超声

B、 腹部 CT

C、 肝脏穿刺活检

D、 FibroScan

E、 肝功能检查

答案： D

281、哪项是诊断肝纤维化的最佳检查

A、 腹部超声

B、 腹部 CT

C、 肝脏穿刺活检

D、 FibroScan

E、 肝功能检查

答案： C

解析： C

(282~283 共用备选答案)

共用备选答案

A. 数小时至数天

B. 一周内

C. 7~20 天

D. 30~40 天

E. 2~3 个月

282、急性链球菌感染后肾炎一般发生于链球菌感染后

A、 数小时至数天

B、 一周内

C、 7~20 天

D、 30~40 天

E、 2~3 个月

答案： C

283、IgA 肾病发作的潜伏期为

A、 数小时至数天

B、 一周内

C、 7~20 天

D、 30~40 天

E、 2~3 个月

答案： A

解析： A

(284~285 共用备选答案)

共用备选答案

A. 普鲁卡因胺

B. 去甲基肾上腺素

C. 维拉帕米

D. 胺碘酮

E. 阿托品

284、患者,男,68岁,急性下壁心肌梗死入院,突然出现眼前发黑,BP88/60mmHg,心电监测:心动过缓,40次/min。应选用的药物是

A、 普鲁卡因胺

B、 去甲基肾上腺素

C、 维拉帕米

D、 胺碘酮

E、 阿托品

答案： E

285、患者,男,72岁,急性前壁心肌梗死入院,心电监测:频发室性期前收缩,部分二联律。应选用的药物是

A、 普鲁卡因胺

B、 去甲基肾上腺素

C、 维拉帕米

D、 胺碘酮

E、 阿托品

答案： D

解析： D

(286~287 共用备选答案)

共用备选答案

A. 30 天

B. 42 天

C. 45 天

D. 60 天

E. 90 天

286、孕产期保健是各级各类医疗保健机构为准备妊娠至产后一定天数的妇女及胎婴儿提供的全程系列医疗保健服务。该天数是

A、 30 天

B、 42 天

C、 45 天

D、 60 天

E、 90 天

答案： B

287、产后进行母婴健康检查的时间是

A、 30 天

B、 42 天

C、 45 天

D、 60 天

E、 90 天

答案： B

解析： B

(288~290 共用备选答案)

共用备选答案

A. 低钾血症

B. 高钙血症

C. 低渗性缺水

D. 等渗性缺水

E. 水中毒

288、患者,男,50 岁,因胰十二指肠切除而并发肠痿,每日消化液丢失约 1000ml。近日患者出现腹胀、恶心和呕吐,四肢无力。腱反射消失,肠鸣音减弱。最可能发生了

A、 低钾血症

B、 高钙血症

C、 低渗性缺水

D、 等渗性缺水

E、 水中毒

答案： A

289、患者,女,56 岁,行左乳腺癌根治术 3 年。近 1 个月来感腰痛,并有厌食、恶心、呕吐、口渴和多尿。核素骨扫描发现第 3 腰椎、右侧第 3 和第 4 肋骨有放射性浓聚。最可能发生了

A、 低钾血症

B、 高钙血症

C、 低渗性缺水

D、 等渗性缺水

E、 水中毒

答案： B

290、患者,男,65岁。腹部阵发性绞痛3天,并恶心呕吐,同时肛门停止排便排气,尿量少,但无明显口渴。诊断为急性肠梗阻。入院检查:眼窝凹陷,皮肤干燥,脉搏细速,BP90/60mmHg。最可能发生了

- A、低钾血症
- B、高钙血症
- C、低渗性缺水
- D、等渗性缺水
- E、水中毒

答案: D

解析: D

(291~293 共用备选答案)

共用备选答案

- A. Osler 结
- B. Ewart 征
- C. 肝脏扩张性搏动
- D. 肱动脉上闻及杜氏(Duroziez)血管杂音
- E. Beck 三联征

291、渗出性心包炎的特征性改变是

- A、Osler 结
- B、Ewart 征
- C、肝脏扩张性搏动
- D、肱动脉上闻及杜氏(Duroziez)血管杂音
- E、Beck 三联征

答案: B

292、亚急性细菌性心内膜炎的特征性改变是

- A、Osler 结
- B、Ewart 征
- C、肝脏扩张性搏动
- D、肱动脉上闻及杜氏(Duroziez)血管杂音
- E、Beck 三联征

答案: A

293、心包填塞的特征性改变是

- A、Osler 结
- B、Ewart 征
- C、肝脏扩张性搏动
- D、肱动脉上闻及杜氏(Duroziez)血管杂音
- E、Beck 三联征

答案： E

解析： E

(294~297 共用备选答案)

共用备选答案

A. 氨基酸

B. 胆盐

C. 盐酸

D. 植酸

E. 植物固醇

294、促进钙、铁吸收的是

A、 氨基酸

B、 胆盐

C、 盐酸

D、 植酸

E、 植物固醇

答案： C

295、抑制胆固醇吸收的是

A、 氨基酸

B、 胆盐

C、 盐酸

D、 植酸

E、 植物固醇

答案： E

296、促进胆固醇吸收的是

A、 氨基酸

B、 胆盐

C、 盐酸

D、 植酸

E、 植物固醇

答案： B

297、抑制钙、铁吸收的是

A、 氨基酸

B、 胆盐

C、 盐酸

D、 植酸

E、 植物固醇

答案： D

解析： D

(298~300 共用备选答案)

共用备选答案

- A. 累及副神经
- B. 累及膈神经
- C. 脊髓后索受损
- D. 病变波及后颅窝
- E. 累及小脑

298、高位颈髓(颈 1~颈 4)病变出现吞咽困难、饮水呛咳、共济失调、眩晕及眼球震颤,甚至波及延髓血管运动和呼吸中枢时,可能为

- A、 累及副神经
- B、 累及膈神经
- C、 脊髓后索受损
- D、 病变波及后颅窝
- E、 累及小脑

答案： D

299、高位颈髓(颈 1~颈 4)病变出现胸锁乳突肌和斜方肌肌力减退和肌萎缩,转头和耸肩困难时,可能为

- A、 累及副神经
- B、 累及膈神经
- C、 脊髓后索受损
- D、 病变波及后颅窝
- E、 累及小脑

答案： A

300、高位颈髓(颈 1~颈 4)病变出现呃逆,或膈肌麻痹、呼吸困难时,可能为

- A、 累及副神经
- B、 累及膈神经
- C、 脊髓后索受损
- D、 病变波及后颅窝
- E、 累及小脑

答案： B