

分圆多项式

$$\begin{aligned}\Phi_r(x) &:= \prod_{1 \leq d \leq r, \gcd(d,r)=1} (x - e^{2\pi i d/r}) \\ &= (x^r - 1) \prod_{k \geq 1} \left[\prod_{\substack{p_1 \cdots p_k | r \\ p_1, \dots, p_k \\ \text{为互不相同之素数(若存在)}}} (x^{r/(p_1 \cdots p_k)} - 1) \right]^{-1} \\ &= \prod_{d|r} (x^d - 1)^{\mu(r/d)}.\end{aligned}$$

其中 $\mu(m) = 0$ 若且仅若 m 有素数平方因子, $\mu(m) = (-1)^{k(m)}$ 若且仅若 m 无素数平方因子且素因数个数为 $k(m)$. 最末二行变换可通过容斥原理证明: 其实质乃 Möbius 反演定理(证明见文末).

注意到对任意 $d \mid n$, $\Phi_n(x)$ 之零点为 $x^n - 1 = 0$ 之根, 同时并非 $x^d - 1 = 0$ 之根. 因此 $\Phi_n(q) \mid \frac{q^n - 1}{q^{n(x)} - 1}$. 从而 $\Phi_n(q) \mid q - 1$. 注意到

$$|\Phi_n(q)| = \prod_{1 \leq d \leq n, \gcd(d,n)=1} |q - e^{2\pi i d/n}| \geq |q - 1|^{\varphi(n)} > q - 1$$

矛盾, 从而 $n = 1$.

Möbius 反演公式

Möbius 变换建立在局部有限的偏序集 (P, \leq) 上. 其中, 局部有限是谓

$$\forall x, y \in P, |\{z : x \leq z \leq y\}| < \infty.$$

今考虑 $I(\mathbb{Q})$ 为一切映射 $f : \{(x, y) : x \leq y\} \rightarrow \mathbb{Q}, (x, y) \mapsto f(x, y)$ 之集合, 构造环 $(I, +, *)$ 如下

1. 对于加法, $(f + g)(x, y) := f(x, y) + g(x, y)$ 恒成立.
2. 不妨设 $x \leq y$, 则对于乘法(卷积)有 $(f * g)(x, y) := \sum_{x \leq z \leq y} f(x, z)g(z, y)$.
3. 单位元即 Kronecker 映射 $\delta(x, y) := \delta_{x,y} = \begin{cases} 1 & x = y, \\ 0 & x < y. \end{cases}$

定义 Möbius 逆函数 $\mu^{-1}(x, y) \equiv 1, \forall x \leq y$. 下先说明映射 μ^{-1} 之可逆性.

一般地, 有结论 $U(I) = \{f : f(x, x) \neq 0, \forall x \in P\}$. 由于 $\{f : f(x, x) \neq 0, \forall x \in P\}$ 构成半群, 下仅需证明对任意 $x \in P$, $f(x, x)$ 恒非零与 f 左可逆等价 (考虑乘法群之单边定义).

若存在 $g = f_l^{-1}$, 则 $g(x, x) * f(x, x) = \delta(x, x) \implies g(x, x) = [f(x, x)]^{-1}$. 对任意 $x \leq y$ 且 $x \neq y$ 之序对 (x, y) 有

$$0 = \delta(x, y) = g(x, y) * f(x, y) = \sum_{x \leq z \leq y} g(x, z) f(z, y).$$

从而 $g(x, y) f(y, y) = - \sum_{x \leq z < y} g(x, z) f(z, y)$. 由此可得唯一确定的 g . 职是之故, 可作 I 之单位集 $\{f : f(x, x) \neq 0, \forall x \in P\}$. Möbius 函数及其逆函数存在. 特别地, 展开 $\mu^{-1} * \mu = \mu * \mu^{-1} = \delta$ 有

$$\delta(x, y) = \sum_{x \leq z \leq y} \mu(x, z) = \sum_{x \leq z \leq y} \mu(z, y).$$

下给出 Möbius 反演定理: 对任意 $x \in P$ s.t. $|\{y \in P : y \leq x\}|$ 有限, 则对 $f, g \in I(A)$,

$$g(x) \equiv \sum_{y \leq x} f(y) \iff f(x) \equiv \sum_{y \leq x} g(y) \mu(y, x).$$

其中 (A, \cdot) 为任意乘法 Abel 群.

证明: 注意到左式导出

$$\begin{aligned} \sum_{y \leq x} g(y) \mu(y, x) &\equiv \sum_{z \leq y \leq x} f(z) \mu(y, x) \\ &\equiv \sum_{z \leq x} \left(\sum_{z \leq y \leq x} \mu(y, x) \right) f(z) \\ &\equiv \sum_{z \leq x} \delta(z, x) f(z) \\ &\equiv f(x). \end{aligned}$$

右式导出

$$\begin{aligned} \sum_{y \leq x} f(y) &\equiv \sum_{z \leq y \leq x} g(z) \mu(z, y) \\ &\equiv \sum_{z \leq x} \left(\sum_{z \leq y \leq x} \mu(z, y) \right) g(z) \\ &\equiv \sum_{z \leq x} \delta(z, x) g(z) \\ &\equiv g(x). \end{aligned}$$

从而等价.

考虑局部有限的偏序集 $(\mathbb{N}_+, |)$, 其中 $|$ 为整除偏序. 由唯一分解定理知存在偏序同构使得下图可交换

$$\begin{array}{ccc} \pi : & \prod_{p \in \mathbb{P}} (\mathbb{N})_p & \longrightarrow \mathbb{N}_+ \\ & \prod_{p \in \mathbb{P}} (n_p)_p \xrightarrow{1:1} \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{n_p} \\ & ((n_p)_p, (m_p)_p) \xrightarrow{\mu'} \mu(\prod_{p \in \mathbb{P}} p^{n_p}, \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{m_p}) \\ & \uparrow \pi, \sim \quad \quad \quad \mu \\ & (\prod_{p \in \mathbb{P}} p^{n_p}, \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{m_p}) \end{array}$$

由同态关系知

$$\mu \left(\prod_{p \in \mathbb{P}} p^{n_p}, \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{m_p} \right) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \mu(p^{n_p}, p^{m_p}).$$

其中诸 $n_p \mid m_p$ 为必然要求, 从而偏序集 $(\prod \mathbb{N}, \leq)$ 上的偏序关系为 $\{a_n\} \leq \{b_n\} \Leftrightarrow a_n \leq b_n, \forall n$. 下构造相应之Möbius函数.

对于以大小关系为序关系的全序集 (\mathbb{N}, \leq) , 取 $\delta(m, n) = \delta_{m,n}$. 从而不待计算即可构造Möbius函数

$$\mu_0(m, n) := \begin{cases} 1 & n = m, \\ -1 & m + 1 = n, \\ 0 & \text{else.} \end{cases}$$

从而在指数同构下有

$$\mu(p^{m_p}, p^{n_p}) := \begin{cases} 1 & n_p = m_p, \\ -1 & m_p + 1 = n_p, \\ 0 & \text{else.} \end{cases}$$

易见对满足偏序 $a \mid b$ 之序对 (a, b) , $\mu(a, b) = \mu(1, b/a)$. 下记 $\mu(d)$ 为一切 $\mu(n, dn)$ 之值, $n \in \mathbb{N}_+$.

端详上式即得

$$\mu(x) = \begin{cases} (-1)^{n \text{ 的素因子个数}} & n \text{ 无素平方因子} \\ 0 & \text{else.} \end{cases}$$

分圆多项式等价形式之补充说明

对 \mathbb{C} 上某一适当的全纯区域, 对一切 $d \mid n$, 诸分圆多项式 $\Phi_d(z)$ 于某一区域 D 内全纯且诸 $\log \Phi_d(z)$ 无branch cuts. 置 $g_n(z) = z^n - 1$, 则 $g_n(z) = \prod_{d \mid n} \Phi_d(z)$, 亦即 $\log g_n(z) = \sum_{d \mid n} \log \Phi_d(z)$. 由Möbius反演定理知

$$\log \Phi_n(z) = \sum_{d \mid n} \mu(n/d) \log g_d(z).$$

从而

$$\prod_{d \mid n} (z^d - 1)^{\mu(n/d)} = \Phi_n(z).$$

由全纯函数之极大模原理知 $\frac{\prod_{d \mid n} (z^d - 1)^{\mu(n/d)}}{\Phi_n(z)} \equiv 1, z \in \mathbb{C}$.