



Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет «Фундаментальные науки»

Кафедра «Математическое моделирование»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4

Циклы

по дисциплине

«Качественная теория ОДУ»

Вариант №4

Студент группы ФН12-71

_____ Д.Д. Девяткин
(подпись, дата)

Руководитель

_____ А.Н. Канатников
(подпись, дата)

Содержание

Постановка задачи	3
1. Исходные данные	3
2. Реализация	3
2.1. Область цикла	3
2.2. Численное построение цикла	3
2.3. Период	4
2.4. Мультипликаторы цикла	5

Постановка задачи

Для заданной системы 2-го порядка:

- а) проанализировать фазовый портрет и выделить область существования цикла;
- б) задав трансверсальную кривую, найти точку на цикле и построить цикл численно;
- в) определить период γ цикла;
- г) вычислить мультипликаторы цикла.

1. Исходные данные

$$\begin{cases} \dot{x} = -x^2 + \frac{17}{9}xy - \frac{9}{10}y^2 + \frac{40}{9}x - \frac{19}{3}y + \frac{8}{15}; \\ \dot{y} = -x^2 + \frac{7}{4}xy - y^2 + 4x - \frac{9}{2}y + \frac{3}{2}. \end{cases}$$

2. Реализация

2.1. Область цикла

Для понимания существует ли вообще цикл в системе, необходимо построить отображение Пуанкаре. Эта кривая должна пересекать ось x . Для его построения производится интегрирование системы в точке, до того момента, пока разность после интегрирования между начальной точкой кривой и конечной не будет меньше некоторого ε . Идем по лучу, который направлен в $+\infty$, идём с шагом h — это координата x в начальных условиях интегрирования. В качестве начальных условий координаты y берем координату y положения равновесия. Координаты отображения Пуанкаре — это 2 массива: X, Y . Массив X представляет собой точки на луче, массив Y — это разность последней и первой координаты кривой после i -го интегрирования. На рис. 1 представлен фазовый портрет системы. По этому портрету видно, что цикл находится в области $[-5, 5][4, 3]$.

2.2. Численное построение цикла

Для численного построения цикла используем похожий подход. Начинаем идти по лучу оси x с шагом h и брать эту точку в качестве начальной координаты x , начальная координата y — координата y положение равновесия. Продолжаем интегрирование до тех пор пока разность между начальной и конечной точкой кривой не будет меньше ε . Интегрирование производится по следующей схеме: интегрирование идет до тех пор, пока не будет пройдено 2π , то есть пока не будет перехода из 4 четверти в 1-ую. Для этого задаем настройки интегрирования с помощью *opts* и функции *stopInt*, где указываем параметр **isterminal** равной 1. Это значит, что будем останавливать расчёт при условии, если пересекаем ось x снизу вверх. Также вводим параметр δ для того чтобы не было остановки интегрирования на 1-2 шаге, в случае близости к положению равновесия.




Рис. 1. Отображение Пуанкаре.

2.3. Период

При интегрировании с помощью функции *ode45* получаем массив координат и массив t точек времени за один оборот. Для получения периода из последнего значения массива t вычитаем первое. Период равен 3.3383.




Рис. 2. Фазовый портрет системы и цикл.

2.4. Мультипликаторы цикла

Матрицу $C = e^{RT}$ для нормированной матрицы $\Phi_0(t)$ называют **матрице монодромии**, где $\Phi_0(t)$ фундаментальная матрица : $\Phi_0(0) = I$. $\Phi_0(T) = Z_0(T)e^{RT} = e^{RT}$, где $Z(t)$ — T -периодическая невырожденная матрица, R — постоянная матрица. Матрица монодромии представляем собой нормированную матрицу, вычисленную через период: $C = \Phi_0(T)$. Собственные числа матрицы R называются **характеристическими показателями**, а собственные числа матрицы монодромии **характеристическими множителями** или **мультипликаторами**. При поиске мультипликаторов в качестве начальной матрицы берем единичную. Считаем полусумму матриц линейного приближения в моменты времени t_{i+1} и t_i , обозначим эту матрицу A , дальше возводим матричную экспоненту в степень $A(t_{i+1} - t_i)$. Проходим по всему массиву времени, который был найден при интегрировании. В итоге получаем матрицу, находим её собственные числа — это и есть мультипликаторы. В нашем случае это 0.2528 и 0.9999.